

世醫湯竹林傳女科方

婦人之症一百有十治法七十二方

第一症

月經前。論其症血來如胆水。五心作熱。腰痛并小腹痛。面色黃痿。不思飲食。乃血氣虛。先用黃芩散退其五心熱。後用調經丸。次月血勝而愈。

黃芩散

黃芩 下

川芎 下

當歸 日

白芍 日

甘草 下

知母 下

花粉 下

蒼朮 日

水煎服。

調經丸

三稜分

莪術分

當歸分

白芍分

熟地分

玄胡分

川芎分

白茯苓分

大茴香分

烏藥分

砂仁分

香附分

生地分

小茴香分

以上諸藥用米糊為丸不拘時老酒送服

第二症

月經後。經來如漏水頭昏目眩小腹作痛更兼白帶喉中臭如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯後用

內補當歸丸即愈。

理經四物湯

當歸日

川芎日

生地日

柴胡日

白朮日

玄胡日

白芍日

黃芩日

三稜日

香附日

水煎臨卧服。

內補當歸丸

當歸日

續斷日

白芷日

川芎日

茯苓日

茯苓日

蒲黃日

萸肉日

厚朴日

甘草日

乾薑日

製附子日

阿膠 身

熟地 身

煉蜜為丸如桐子大。空心酒下八十九丸。

第三症

月經或前或後。論其症因脾土不勝。不思飲食。由此血衰。經水或前或後。服藥不須理血。只宜補脾。脾土勝。血旺。氣勻。自然應期。宜服紫金丸。

紫金丸

陳皮 身

良姜 分

義木 分

檳榔 分

紅花 分

枳壳 分

烏藥 分

三稜 分

砂仁 分

米糊為丸。飯後米湯送百丸。

第四症 血虛發熱

論其症因婦人性急或行經時房事觸傷脇中結塊如雞子大左右兩脇痛月水不行變成五心煩熱頭昏目暗咳嗽生痰先逍遙散止熱後用紫苑湯止嗽若半年一載失醫肉瘦水瀉百無一生

逍遙散

當歸日

白芍日

柴胡日

花粉日

地骨皮日

石蓮肉日

薄荷日

胆草日

黃芩日

水煎空心服

紫苑湯

光杏仁 日下

阿膠 日下

桑白皮 蜜炙

五味子 日下

知母 炒

欵冬 下

紫苑 下

桔梗 下

蘇子 下

川貝 炒

枳實 日下

水煎空心服

第五症 經閉發熱

論其症。或行經時。或產時。多食生冷。併吃水菓。蓋血見水。或冷則凝滯。故也。初起一二月。生寒作熱。五心煩躁。若脾土勝。自然經血流通。萬無一失。倘半年一年不治。變作骨蒸。子午面熱。肌膚消瘦。泄瀉不止。百

無一生。急宜治之。病重者急宜用牙片三厘。調甘草湯送服。有起死回生之力。次用逍遙散紫苑湯二方。詳開第四症。

第六症 行經氣血作痛

論其症。經來一半。血未曾盡。腹中作痛。發熱或不熱。須用紅花散破其餘血。熱止痛安。

紅花散

枳壳 下

紅花 日

牛膝 日

當歸 日

蘇木 日

五稜 下

莪木 下

川芎 下

赤芍 下

水煎空心服

第七症 經水不止

經水十日半月不止。乃妄流行。當審此婦曾吃椒物
度否。是為寔症。須用金狗散。

金狗散

續斷日

金毛狗脊日

炒日

地榆日

當歸日

白芷日

川芎日

白芍日

熟地日

黃芩日

水煎空心服

第八症 經來如黃水

此症人虛用藥不可太涼務暖經和血次月血勝而愈須用加味四物湯

加味四物湯

當歸

川芎

元胡

小茴香

熟地

烏藥

白芍

加薑三片棗二枚

水煎空心服

第九症

經來如綠水

此症全無血色乃大虛大寒不可用涼藥要用烏雞丸服半月不但症愈兼能懷孕

烏雞丸

天雄附子

鹿茸五

山藥五

茯苓五

蒲黃五

當歸五

山萸五

白芍五

川芎五

肉桂五

烏雞肉去皮油不用酒蒸三

一方加熟地五

米糊為丸空心酒下一百丸

第十症 經來臭如夏日之腐

此乃血弱更兼吃熱物譬如溝渠水涸天時無雨久則臭矣身衰舊血新血不接則臭宜用龍骨丸

龍骨丸

龍骨

海螵蛸

牡蠣

生地

川芎

白芍

茯苓 黃芩 當歸 蜜丸酒下百丸另服煎方

煎藥方

當歸 三稜 莪朮 赤芍 丹皮

香附 條芩 陳皮 木通 白芍

薑一片水煎服

第十一症 經來成塊

如葱白色又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻此虛症也即用內補當歸丸服之立效 丸方詳開第二症

第十二症 經來全白色

此症無血色。五心煩熱。小便作痛。面色青黃。乃血氣虛。亦用烏雞丸服。其效如神。丸方詳開第九症。

第十三症 經來不止如魚腦

雙脚疼痛。不能行履。乃下元虛冷。更兼風邪所致。宜活血行氣。須用疎風止痛散。

疎風止痛散

當歸 獨活 天麻 烏藥 姜蚕

牛膝 川芎 石南藤 紫金花

骨碎補 乳香 姜 葱白

三枚

酒煎服。

第十四症 經來如牛膜片

經來不止。如牛膜片色。一般昏迷倒地。乃氣血變結而成。雖驚無事。急用硃砂丸立效。

硃砂丸

硃砂二

茯苓五

水法為丸。姜湯下五十九丸。

第十五症 經來下血胞

此經來下不止。或下血胞三四個。如雞子大如絮。用

刀剖開如石榴子。且昏迷不知人事。宜用十全大補湯。即十全大補湯去甘草肉桂。加薑三片。棗二枚。三五帖立效。

第十六症。經來小便痛如刀割。

此乃陰門不開。如八珍散無效。宜用牛膝湯。一服即愈。

牛膝湯

土牛膝

乳香

水鍾半。先煎牛膝一鍾。後磨乳香麝香。投入。

藥內。如係火症。可用硃砂六一散。

第十七症。經來。弔陰痛不可忍。

此症筋二條。從陰中弔起。乳上疼痛。身上發。宜用

川棟湯。

川棟湯

川棟子 下

猪苓 下

澤瀉 下

白朮 日

小茴

香 日

烏藥 日

玄胡 日

乳香 日

木香 下

大茴香 日

麻黃 下

檳榔 下

姜三片。蔥一根。水煎服。如大發汗。二帖愈。

第十八症 經來未盡潮熱氣痛

此症經來一半。又覺口渴小腹痛。此因傷食生冷。血滯不行。有餘血在內。不可用補劑。宜用涼藥。熱去經盡。熱退痛止。宜用莪木散。

莪木散

三稜日

紅花日

牛膝日

蘇子日

莪木日

水煎空心服

第十九症 經來已盡作痛

此症手足麻痺。乃腹中虛冷。氣血衰甚。宜用人參四

物湯。

人參四物湯

人參

當歸

白芍

川芎

姜棗

水煎服

第二十症

經來小腹結成塊

如皂角一條橫過痛不可忍。不思飲食。面色青黃。急用玄胡散。

玄胡散

玄胡

髮灰

共為末。酒下。服之半月。其塊

自消。

第二十一症

經來脇氣痛

經來脇內一塊如杯大。其色淡黃色。急宜治塊。先用
四物玄胡湯。

四物玄胡湯

當歸下

川芎下

白芍下

玄胡下

熟地下

姜三片。酒煎加沉香下。

再用川芎白芍玄

胡當歸四兩。沉香三分為末。作四服。酒送下。

第二十二症

經來遍身疼痛

經來二三日。遍身疼痛者。乃寒邪入骨。或熱或不熱。急宜解表。用烏藥順氣湯。

烏藥順氣湯

烏藥中

姜蚕中

白芷三下

陳皮三下

枳壳中

乳香中

甘草中

麻黃のト
去節

姜三片

葱一根

水煎服。發汗即愈。

第二十三症 觸經傷寒

經來誤食生冷。遍身潮熱。痰氣緊滿。惡寒。四肢厥冷。急服五積散。

五積散

厚朴 陳皮 桔梗 白芷 茯苓 枳壳

半夏 香附 蒼朮 柴胡 川芎 乾薑

青皮 當歸 姜三片 葱一根 水煎熱服即愈

第二十四症 逆經上行

經從口鼻而出。因過食椒姜熱毒之物。其血亂行。急

用犀角地黄丸。

犀角地黄丸

犀角日

白芍日

丹皮日

枳實日

生地日

百草霜 下

黃芩 下

橘紅 下

桔梗 下 甘草 下

第二十五症 又

經來從口鼻咳嗽氣緊不往下而上行五心煩熱宜
推血下行用紅花散七帖次用欵冬花散止嗽下氣
不須五帖熱去全安

紅花散

紅花 下

黃芩

蘇木 下

花粉 下

水煎空心服

冬花散

栗壳下 桔梗下 枳實下 蘇子下 紫苑下

冬花蕊下 桑皮下 杏仁下 知母下

水煎空心服

第二十六症 逐日往來

此症經來日有幾點則止。或五日十日又來數點。一月來三四次。面色青黃。宜用三劑。

膠艾湯

熟地 川芎 阿膠 艾葉 棗三枚

水煎空心服。服後用紫金丸詳第服一月即愈。

第二十七症 經來狂言如見鬼神

此症經來時或因家事怒氣觸阻逆血攻心不知人事狂言鬼語先用麝香散寧心定志次用茯神丸

麝香散

辰砂三下

麝香三下

甘草三下

木香半

人參下

柴胡下

茯神下

遠志志

桔梗下

水煎服

茯神丸

茯神分

茯苓分

遠志分

硃砂三下

猪心一個

米糊為丸金銀湯送五十九丸即愈

散
第二十八症 經來常嘔吐。不思飲食。宜用丁香

丁香散

乾薑半

丁香半

白朮半

為末。每清晨米湯送三茶匙。

第二十九症 經來飲食後即嘔吐

此乃痰在腸。阻米穀不能下胃。宜用烏梅丸。

烏梅丸

木香三

草果一個

乳香半

沒藥半

雄黃三

烏梅肉為丸。每早含化一丸。去涎痰後用。

九仙奪命丹

草果一個 次朴二 枳壳二 茯苓二 木香二

陳皮二 焦查二 蒼朮二 荳果一個 共為末 姜湯下

此方不但婦女經症即男人噎膈水穀不下者
先用烏梅丸後用此方奇效無比

第三十症 經來遍身浮腫

此脾土虛弱不能尅水變而為腫宜用木香調胃散

木香調胃散

大腹皮二 陳皮二 蒼朮二 木通二 木香三下

甘草三片

紅花片

義木片

山查片

草薺三片

姜三片

水煎服

第三十一症

經來泄瀉

經動之時。五更水瀉如乳兒屎。乃腎氣虛。不必治脾。

宜用調中湯。

調中湯

人參片

白朮片

甘草三片

五味子三片

乾薑片

生姜三片

水煎服

第三十二症

經來大小便俱出

此名錯經。因吃熱物過多。積久而成熟毒。宜調其陰陽。須用五苓散。

五苓散

猪苓子

澤瀉子

白朮子

赤苓子

川芎子

當歸子

阿膠子

水煎服

第三十三症 婦人白帶

用白槿花酒煎服即愈。一方白雞冠花。

第三十四症 經來常咳嗽

此症咽中出血。乃肺金枯燥。急止其咳嗽。再除其

根。先用茯苓湯。

茯苓湯

茯苓 下

蘇葉 下

前胡 下

桔梗 下

枳實 下

半夏 下

陳皮 下

人參 下

乾薑 下

桑白皮 下

甘草 三下

姜 三片

或加歸芍生地

水煎服。

雞蘇丸

萊菔子 牙

川貝母 的女

蜜丸。每服五十丸。

第三十五症 經來腹大如鼓

此症經阻二三月。或七八月。人以為孕。忽一日崩下。

如血胞有物如蝦蟆大昏迷不醒體瘦者不治體壯者宜用十全大補湯詳十五症

第三十六症 經來小便如白蟲

此症經來血內有白蟲如雞腸滿腹疼痛只宜推蟲於大小便出則無事矣宜用退蟲丸

退蟲丸

續隨子

♀

栴榔

♀

大戟

♀

麝香

♀

甘遂

♀

芫花

♀

牽牛

♀

米糊為丸酒下十丸再服

建中丸

黃芪牛

肉桂牛

甘草牛

白芍五

共為細末。白湯下。

第三十七症 經來潮熱終日不思飲食

此症係胃氣不開之故。宜開胃。投以鴨血酒。將老雄鴨頭頂上取血。調酒飲之。立效。

第三十八症 女子經閉

室女月水初行。不識保養。歸人不自謹飭。用冷水洗手足。血見冷則凝滯不出。面色青黃。遍身浮腫。治之不效。宜用通經丸。

通經丸

三稜公

莪術公

赤芍公

當歸公

紫苑公

劉寄奴公

川山甲一片

川芎公

米糊為丸酒送

第三十九症 血山崩

此症初起時宜用十灰丸若久崩者乃虛弱之故宜用雞子湯若小腹疼痛宜用加味四物湯

十灰丸

阿膠牙

側柏葉牙

棕櫚牙

蘄艾牙

頭髮一團

百草霜

芋根

白茅根

綿

當是棉花布一束

絹一束

俱燒灰存性。白湯送下。一方加丹皮茜草各一錢。

雞子湯

雞脊肉之子。葱三根。薑一兩。共搗如泥。

用麻油鍋內同炒去渣。酒沖熱服。加味四物湯詳

開第八症。

第四十症

經來吐蛔蟲

此症經來寒熱。四肢厥冷。大汗吐蟲。痰氣緊滿。百死無生。

第四十一症

胎前惡阻

胎前吐逆不思飲食腹中作痛乃胎前血氣不和之故宜用和氣散。

和氣散

陳皮下

桔梗下

厚朴下

小茴香下

益智

仁下

丁香下

甘草下

木香下

砂仁下

蒼木下

藿香下

水煎飽服一劑即愈。

第四十二症 胎前潮熱氣痛

此乃受熱毒之故宜用五苓散。

五苓散

赤茯苓 下

豬苓 下

澤瀉 下

白朮 下

水煎。二三帖即安。

第四十三症 胎前寒熱

胎前瘧疾。小腹作痛。口燥舌乾。乃受熱過多。陰陽不和。宜用草果飲。

草果飲

草果 一個

青皮 下

柴胡 下

黃芩 下

甘草 下

水煎服

第四十四症

腹內孩子頂心不知人事

此乃過食椒薑雞肉極毒等物積胎中。又熱天蓋棉
被受熱。如難過。双足亂動。胎母俱不安也。宜用調中
和氣湯。

調中和氣湯

大黃日

石膏日

檳榔个

知母个

黃連个

柴胡三

黃柏个

枳壳个

水煎。空心服。後用

勝紅丸

江子去壳油

百草霜日

末糊為丸。白湯送下。
七九。子母俱安。

第四十五症

胎前氣緊不能卧

此症過食生冷兼有風寒中胃肺金生疾先用紫蘇湯。

紫蘇湯

紫蘇葉 个

桔梗 个

枳實 个

大腹皮 个

貝母 个

桑皮 个

五味子 个

石膏 个

甘草 个

當歸 个

水煎服。一方有知母。次服安胎散。

安胎散

阿膠 日

茯苓 日

當歸 日

人參 日

生地 日

甘草 日

小茴香 个

大茴香 个

川芎 日

水煎空心服

第四十六症 胎前咳嗽

此因每食生冷又吃椒薑中傷胎熱胃氣不勝宜用

五虎湯

五虎湯

杏仁

石膏

枳實

蘇子

知母

桔梗

麻黃

甘草

陳皮

一方有五味子

水煎温服

第四十七症 胎前衄血常從鼻中來

此因傷熱。血熱亂行。冲腸胞絡。只用涼胎之藥。不可用四物湯。宜用衄血立效散。

衄血立效散

丹皮 黃芩 白芍 側柏葉

一方有蒲黃無芍藥

米糊為丸。白湯送下。

第四十八症

第四十九症 胎前漏血

有雜紅來如經行。應期一至。此是漏胎。宜用小烏金丸。

小烏金丸

海金沙 三斤

姜蚕 牙

側柏葉 牙

小茴香 牙

百草霜 牙

蒼朮 牙

防風 下

當歸 下

厚朴 下

早米為丸。白湯送百粒。

第五十症 胎前白帶

此乃胎氣虛熱。先白篇豆花炒。酒煎服。後用閉日丸。

閉日丸

龍骨身

海螵蛸身

牡蠣身

赤石脂身

米糊為丸酒送百丸

第五十一症 胎前赤帶

漏血如豬血水。日夜不止。精神短少。急用側柏葉丸。

側柏葉丸

側柏葉身

黃芩身

蜜煉為丸。白湯送百丸。

第五十二症 胎前氣緊動紅

久嗽不止。其紅每月應期而來。日午心熱氣緊。人人

皆作勞症治不效。先用逍遙散退熱。後用紫苑湯止
嗽。二方詳開第四症。

第五十三症 胎前動

此因飲食損傷。惡血驟來如水不止。急用艾膠湯止
血。次用安胎散固胎。壯者三五劑。瘦者不治。二方見
前二十六及四十五症。

第五十四症 胎前小便不通

此症名為轉脬。急用車前八珍散。如不效。再服八味
丸。

車前八珍散

車前日

白朮炒日

白茯苓日

川芎日

熟地日

炙甘草下

當歸日

人參日

水煎服

八味丸

製附片下

山萸肉下

丹皮下

山藥日

肉桂日

甘草下

澤瀉下

茯苓日

一方有熟地無茯苓湯丸俱可。

第五十五症

胎前小產

懷孕三五月或七八月皆曰小產。若不調治恐再如

前須服益母丸

益母丸

益母草

のみ

當歸

のみ

蜜煉為丸空心白湯下

第五十六症

第五十七症 胎前怔忡

心常恍惚。遍熱煩悶。乃血氣衰之故。宜用硃砂湯。

硃砂湯

不落水猪心一個。水煎湯一鍾。研硃砂一錢調服。

第五十八症 胎前腹脹

此因血氣衰弱。切忌通利之藥。恐傷胎氣。宜用大腹皮湯。

大腹皮湯

大腹皮 二

五加皮 二

青皮 二

陳皮 二

姜皮

第五十九症

胎前遍身酸懶

此症面色黃瘦不能飲食精神困倦因血不勝難養胎元宜用四物湯

第六十症

胎前陰門腫

此乃胎不運動而致宜用順氣散

順氣散

訶子一個水一鍾煎溫服

第六十一症

胎前下血動胎

壯盛者三五日內。即以安胎散救之。若形瘦有冷汗。面如灰色。四肢無力。乃積久之病。不治。方詳四十五症。

第六十二症 胎前脚痛

此乃血氣衰弱。下元又虛。亦兼風邪。宜止血行氣之劑。須用烏藥順氣散。詳開二十二症。

第六十三症 胎前中風

牙關緊閉。痰氣壅滿。不知人事。因食生冷。兼坐風中。而致。先用黃蠟膏。

黃蠟膏

枯礬 黃蠟 麻黃 各等分為末。共鎔化擦牙。

排風散湯

麻黃下 白朮下 防風下 甘草下 川芎下

茯苓下 白狝皮下 獨活下 當歸下

姜三片 棗三枚 水煎服。

第六十四症 胎前癱瘓

此症手足不動。乃胃腕有疾。住血氣而致。宜用烏藥

順氣散。詳二十二症。

第六十五症 胎前腰痛

此乃血虛。陰胎不能養腎。腎水不足所致。宜用猪腎丸。

猪腎丸

猪腰一对

青鹽のり

入腰子内蒸熟。焙乾為末。蜜丸。空心酒服。

第六十六症 胎前頭痛

此乃寒邪入腦。陽氣衰也。宜用三帖芎芷湯。

芎芷湯

川芎下

菊花下

白芷下

白芍下

藁本下

茯苓下

甘草三下

石膏下

姜三片

水煎服。如不止。加細辛八分。如有頭痛者。不速效。

第六十七症 胎前泄瀉

此症隨治之。再宜臨症斟酌。春宜服平胃散。夏宜服三和湯。秋宜服藿香正氣湯。冬宜服理中湯。

平胃散

茯苓 炙甘草 山藥 廣皮 各等分。煎服。

第六十八症 胎前心痛不可忍

亦因胎氣不順。宜用順氣散。

順氣散

草果 二箇

玄胡 一个

五靈脂 日

沒藥 一个

辛時服 饑

第六十九症

胎前忽然倒地

此乃血養兒胎。母少精神。承胎不住。以致目花眼昏。一時倒地。不須服藥。只宜飲食補之。

第七十症

胎前大便虛急

此因脾燥。大腸澁滯。只宜理脾通大腸。不可硝黃二味下之。宜服枳實湯。

枳實湯

枳實二方 水二鍾煎七分不拘時服

第七十一症 胎前遍身搔癢出風瘰

此症有風不可服。但用樟腦酒洗之。

第七十二症 胎前陰門甚癢

此症有孕後房事不節。陽精留蓄。因而作癢。宜用川椒白芷湯。

川椒一方 白芷一方 水煎服其渣湯洗之。

第七十三症 胎前乳腫

兩乳腫痛作寒熱。名曰內吹。用皂角一條。燒灰存性。

酒送下。立愈。

第七十四症 胎前咽痛

此風寒攻下咽。胃有痰涎。宜去痰化寒。用升麻桔梗湯。

升麻桔梗湯

升麻 个 桔梗 个 甘草 个 防風 日 元參 日

水煎服。

第七十五症 胎前消渴

此乃血虛。三焦火熾而然。宜用四物湯加生地川柏。

或六味丸。

第七十六症 胎前耳鳴

此乃腎虛。宜用猪腎丸。詳六十五症。

第七十七症 胎前不降生。臨產水乾。

孩子不下。可用益母草生其水。水至胎下。若閉不生者死。

益母草散

麝香

下
白芷

滑石

肉桂

下
益母草

水煎服。

第七十八症 秘傳難產奇方

用高牆蛇脫一條。要頭向下者佳。瓦上焙乾為末。一錢加麝香三分。乳調為膏。貼臍上。即刻產下。不可久貼。

第七十九症 胎衣不下

此因身弱血少水乾而然。宜用芎歸散。若衣在胸膈者難治。若在小腹。用破靈丹。若婦人面色青黃。口舌黑。指甲青。此子已死。當用朝爛散打下死胎。以救其母。若指甲紅色者。其子猶生。不可輕用。

芎歸散

川芎二

當歸二

益母草二

取汁。和老酒煎服即下。

破靈丹

紅花二

蘇木二

老酒煎服。

第八十症 產後血氣痛

此乃餘血不盡。腹中作痛。遍身發熱。惡血在腹。當去其血。熱自退矣。宜用紅花當歸散。

第八十一症 產後血盡作痛

此乃虛痛。若有潮熱。亦是虛潮。宜用四物湯加烏藥
小茴香乳香沒藥五靈脂。詳二十二十一症。

第八十二症 產後咳嗽

此產後傷風咳嗽也。宜用小青龍丹。

小青龍丹

乾薑

五味子

杏仁

甘草

半夏

薑三片水煎服

第八十三症 產後惡血發熱

此乃內傷外感之症 方未抄全

第八十四症 產後子宮突出

用鯉魚燒灰存性。調青油搽之。

第八十五症 產後惡露重來如流水不止

以致昏迷倒地不知人事。此乃生產一月。夫婦交媾。搖動骨節。因而血崩。急用金狗散立效。詳第七症。

第八十六症 產後痲癩突出

先用連翹散。後用黃蠟膏。方詳六十三症。

連翹散

連翹

炙芪

花粉

防風

梔子

甘草

水煎服。

第八十七症 產後氣急或泄瀉

氣緊不止。煩熱口渴。此乃內虛外實。必死之症。

第八十八症 產後舌黑如塵

口乾絕無津液。此乃必死之症。

第八十九症 產後譫語又水瀉

此乃惡血攻心。上盛下虛。必死之症。

第九十症 產後吊陰 方詳第十七症

第九十一症 產後浮腫 方詳第三十症

第九十二症 難產奇方

用老鼠腎一對。加麝香三分。搗爛。分作三丸。好硃砂為衣。白湯送下一丸。男左女右捻出。若死胎頭上頂出。屢經試驗。此丹用清水洗淨。尚可再用一次。

又方 金毛狗脊一個。銼碎。酒水各一盃。煎成一盃。用密布濾淨。乾後服。甚效。子母俱安。或不飲酒。只用水煎亦可。

附方 產後血氣痛。用益母草一兩。當歸五錢。丹參三錢。服一劑。永保無虞。

第九十三症 難產方

用伏龍肝五錢。錫臍對下泥。用酒送之。立下。其藥由兒頭頂出。如不能飲酒。白湯送下。

第九十四症 難產及子死腹中

此名龍虎散。用敗龜板一個。醋炙。蛇蛻二條。頭尾俱全。新瓦焙乾。蟬退四十八個。頭足俱全。新瓦焙乾。婦人亂頭髮一團。皂角洗去油。火煨存性。滑石水飛過二錢。共研細末。磁罐收貯。黃蠟封口。每服二錢。老酒送下。不能飲者。白湯下。立刻產生。如有益母草煎湯。

送下更妙。

第九十五症 產後百病仙方

熟地の

白芍の

白朮の

茯苓の

麥冬の

杜仲炒

續斷の

益母草下

牛膝

薑炭下

蓮子十粒

燈心一丸 水煎服

第九十六症 難產

或橫或逆。或血海乾枯。以致孩死不下。急用皮硝二錢。壯者三錢。或寒天加附子。煨去皮臍三五分。用好

酒半鍾。童便半鍾。皮硝煎三沸。溫服。神效無比。

又方

歸尾子

苦參子

百草霜子

牛膝子

細磁屑三下

水一碗煎半碗熟服庶產母保安矣。

第九十七症 產後惡露不盡

或胎衣不下腹中血塊凝滯作痛急用大黃一兩為末好醋三升同熬成膏丸如桐子大溫醋送下。

第九十八症 產後

產後三日牙關緊閉眼目直視四肢厥冷急用炒黑乾薑五錢水煎沖入童便溫服。

第九十九症 產後乳汁不通 宜用源泉湯

源泉湯

當歸分 川芎分 木通分 通草分 瞿麥分

麥冬分 龍骨分 王不留行生炒 各一兩

共為末。每服一錢。溫酒調下。再用猪前蹄煮湯

淡食。乳即通矣。

第一百症 產後心悶不知人事

於羊角燒灰。以東流水調服一茶匙。即安。

第一百一症 產後陰門腫痛

用蛇床子二兩。水煎頻洗。腫消痛止。

第一百二症 產後陰門痛極不可忍 宜用

桃仁泡去皮尖。炙存性。研末塗之。

第一百三症 產後陰門癢極不可忍 宜用

花椒三粒。食鹽五錢。研末搽上。

第一百四症 產後血枯

陰門生瘡。癢不可忍。用豬肝一具。白水煮熟。照陰門之大小切片。每片搽杏仁末一分。白礬末一分。用棉線一莖。穿入豬肝內。捺入陰戶。過一宿。其蟲死入肝。

內即愈。

第一百五症 產後大便不通

氣緊坐卧不安。用麥芽為末。酒一合。調服即通。

第一百六症 產後大小便不通 急用

熟地一兩。水煎服。立通。或飲牛乳二三日亦可。

第一百七症 產後口渴

用蓮子心二錢。研末。澆水調服。

第一百八症 產後兒枕作痛

此乃惡露凝滯。宜用山查二錢。炒黑。沙糖五錢。煎服。

第一百九症 治婦人血崩方

熟地身

當歸身

白芍身

阿膠身

蛤粉炒

荆芥身

炒

地榆炭身

水煎服

第一百十症 婦人產後血暈不省人事

眼黑耳鳴。口吐涎沫。手足痲痺。宜用。

當歸身

川芎身

炒荆芥身

水煎。加童便一

鍾服。即安。