



四種須知

總教

六科

13  
1494  
6





門 4加8  
號 1494  
卷 8-6

急救須知目錄

內科

風痰諸中  
中風  
中氣  
中痰  
喘風

癆怯

鼓脹  
食積  
血脹  
氣脹  
水腫

噎膈反胃

血症  
吐血  
衄血  
諸症

痰飲

急救  
目錄

錦州書齋



欬嗽 喘 哮 孔

五 疽

諸積 蟲積 食積 瘡積 疔積

心腹諸痛 心氣 心胃 冷氣 鬱火  
絞腸 腹痛

腰脇痛

風濕諸痛 風痺 脚氣 手足

傷寒 風寒

天行 瘴癘

中 暑

瘧 疾

嘔吐 寒 虛 胃 熱 飢 逆 吞 酸

霍亂 乾 霍亂 吐 瀉 轉 筋

頭 風

痢 疾

便 血 溺 血

二便 癰 閉 大便 小便  
石 淋 尿 淋 血 尿

急 報

目 錄



淋濁白濁

赤濁

遺

急救須知凡例

一古今藥業醫書汗牛充棟昔賢對病立方因時用藥由人意表弗能窺度刀圭入口隨手應驗後人極力穿鑿執見居身精於工巧者略其藥性偏於寒熱者鮮得中和暇時與武陵沈蘧夫先生采輯各家議論彙成一編高確古今發明醫理稍有餘力再梓壽世先渴本州單方目之急救忘取易辨以濟遠也

急救

凡例

一



一 所集藥不過五品症不能悉載只就案囊中  
秘授及選本料由單方倘遇急症不必求諸  
市肆而平常日用之物亦能治病一切珍奇  
貴重性毒雜製并遠方希見之藥不及遍選  
原為窮鄉僻壤倉卒無醫便於口傳易記耳  
一 分別各症陰陽詳晰諸方寒熱方多則另列  
行款方少則總入本條藥標書頂開卷了然  
今在辨明陰陽寒熱切勿亂試妄投內科方

藥之中兼有女幼外科方雖急救病要緩查  
欲求奏功於簡捷須憑圓活于隨宜尚望高  
明為人解說

一 過輕物命瘡疾方因秘傳未敢多選蓋天道  
好生豈仁者所忍若以此為效速而并欲必  
知我妙垂之永久其深尊不可勝計矣其間  
有一二方不得已仍選入者物微可以救急  
且在倉儲所需聊將所重者在人以自解耳



非敢明知故犯實因經驗難測仰冀仁人君子原其初心當存戒殺善念印此本名之劇有異常功效但人自求勇探究先是集又限于藥物不能過多俟有餘閒當不拘品數另容後集清正也

凝陽子謹識

急救須知



古歛

朱本中

道名凝陽子纂

風痰諸中

中風中氣

中痰白厥

暗風

細牙包腐者

中風卒然倒仆痰盛口禁牙緊目閉遠視卒猪牙已

角者五分麝香三厘為細末紙捲蘸藥指鼻得嚏

即醒極

半夏末少許吹鼻效

生烏頭青礬

半夏烏頭青礬

等分為末用一字嚼鼻取涕吐涎立效無比

白礬鹽花

牙關緊急白礬鹽花等分搽牙涎出即閉

急救

中風

一



烏梅南星  
細辛

白芥子

龜尿

青黛研砂  
冰片牛黃

薄荷

雄黃荆芥

荆芥穗

白朮

烏梅肉搽南星細辛末中指蘸藥擦牙自閉保元

卒中不語苦酒煮白芥子敷頭一週帛包一晝夜

痰涎舌強不語龜尿少許點舌下神妙域舌

大不能言青黛研砂各二錢冰片牛黃各三分南

薄荷葉三錢為細末先以客水洗舌上後用薑汁

搽之將藥客水調稀搽舌保元舌強用雄黃荆芥

穗等分為末豆酒調服二錢端口噤荆芥穗為

末酒服二錢立愈錄總口噤不知人事白朮四兩

酒三升煮一升頓服針口噤身冷不知人事獨

獨活  
韭菜種蠶

活四兩好酒一升煎半升服針失音用韭菜蠶

水红花

或以白蠶蠶末酒服保元風濕癱瘓半身不遂或

手足麻木不知痛癢水红花秋後采連苗花實剉

碎陰乾葉濃汁乘熱薰洗一日二三次再用熟酒

和花汁飲取汗出為度數日自愈急青荆

荆芥薄荷

急報

中風

二



蒼木川楸

乾為未存膏和九梧子大白湯下三十丸早晚各  
一服忌食魚腥風物經 半身不遂茅山蒼木十  
兩米泔浸咬咀真川楸四兩先酒五斤共貯瓶內  
口用箬札封固安米在上以重湯煮至箬上米熟  
為度初飲每醉出一身臭汗即愈濟世 半身不遂  
手足疼痛者蒼木川楸酒飲之如神世 手足拘  
攣不伸牙皂木香等分水煮一服立效保 手足  
不遂皮膚不仁用仙靈脾一斤切碎以生絹袋盛

蒼木川楸

牙皂木香

仙靈脾

稀蒼州

磁罈內用好酒浸之厚紙封固春夏三日秋冬五  
日開罈隨量飲之常醺莫渴大醉合時忌婦人雞  
犬見之保 失音不語口眼喎斜手足不遂時吐  
痰涎五月五日或六月六日采稀蒼州葉每去地  
五寸用刀剪刈以清水洗去泥土摘去老梗花實  
曝乾入甑層層灑酒与蜜蒸之又曝如此九蒸九  
晒為末客九梧子大空心溫酒或米飲下二三十  
丸以飯三五匙磨之更佳急 中風諸病麻黃一

麻黃

急散

中風

三



秤去根以五相日乙卯取東流水三石三斗用淨  
鐺盛五斗先煮五沸掠去沫逐添水盡至三  
五斗漉去麻黃渣定濾去渣取清者再熬至一斗  
再澄再濾取汁再熬至汁半為度密封收之一二  
年不妨每服一二匙熱湯化下熱汁時要攪勿  
令着底恐焦忌陰人雞犬見此劉守真秘方宣  
烏荆丸治諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛皮膚癢  
瘡及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止者

川烏製法  
若德

服之尤效有痛風牽搐顛顛不收者服六七服即  
瘡川烏頭炮去皮臍一兩並芥穗二兩為末醋打  
糊丸梧子大溫酒或白湯下二十丸和 紫萍一  
粒丹法左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎  
斜大風癩風一切無名風及脚氣並打撲傷折或  
胎孕者傷服過百粒即為令人素昔浮萍曬乾為  
細末煉蜜丸彈子大每服一丸豆淋酒化下汗出

紫萍浮萍

白芷獨活  
薄荷

印愈獨 正顏丹治眼唱斜白芷獨活薄荷等

急散

中風

四



白薑大考

分爲末每丸彈子大每服一丸細嚼茶清下元保

南星薑汁

中脘口眼喎斜瓜蔓絞汁和大考麩作餅炙熱熨之正使上勿大過輕天南星生研爲末加自然

蓖麻子

薑汁調之左唱貼右右唱貼左印正存仁 蓖麻子

仁七七粒研作餅右唱安左手手心左唱安右手心

却以銅盂盛熱水坐藥上冷中更換五六次印正

新石灰

良方 新石灰醋炒調如泥右塗左左塗右立便瘡

皂角

正義 皂角膏大皂角五兩去皮子爲末三年末

醋和成膏左唱塗右右唱塗左乾更塗之元保

白礬牙皂

中風痰厥四肢不收氣閉膈塞白礬一兩猪牙皂角

五錢爲末溫水服一錢吐痰效如神 痰迷心竅左

南星防風

不能言南星一兩防風五錢爲細末麩糊丸梧子

旋覆花

大五眼薑湯下五十丸保 風痰癱瘓旋覆花洗

淨焙乾研末煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸

至七丸十丸經 立效散治一切風痰危急喉閉

膽礬木香  
麝香

湯水不下一服立解膽礬一錢木香三錢麝香一

急散

中風

五



分葱汁調梅口灌即甦救急 痰厥氣絕心頭尚溫

千年石灰

若千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞

煎極滾澄清滌之少頃痰下自愈急 痰中欲絕

芥子糯米

大芥子一顆糯米七粒為細末少許吹鼻吐出稠

痰即甦救急

山茨茹

晴風痲疾山茨茹一箇以茶酒研如泥日中時時茶

調下即臥良久吐出雞子大物永不散如不出以

熟茶搗之妙 化痰丸治風痰痲病生白慧一酒

生熟細茶

細茶五錢為末煉蜜丸梧子大一歲十丸茶湯下

大人五十丸久服痰自大便出斷病根神 暗風

蛇膏

痲疾忽然仆地不知人事良久方甦蛇黃火燉熟

滓七次為末每酒調服二錢數服即愈年深者七

效得 逐心丹治風痰迷心痲痲及婦人心風血

甘遂辰砂  
猪心

邪用甘遂二錢為末以猪心取三管血和藥入猪

心內縛定紙裏煨熟取末入辰砂末一錢分作四

丸每服一丸將心煎湯調下大便下惡物為效不

急救

暗風

中氣

六



細辛

下再服生

暗風卒倒不省人事細辛末吹鼻即

甦效

木香

中氣不省閉目不語如中風狀末香為末冬瓜子英

湯灌下三錢痰盛者加竹瀝薑汁

血厥者無疾忽死目閉口紫或微知人事腦暈移時

方寤者名鬱冒也汗過多血少陽氣獨上氣塞不

行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦

人尤多此證白微者歸者一兩人參半兩甘州一

白微者兩  
人參甘州

錢半每服五錢水二盞煎一盞溫服

急救

中氣

血厥

七



癆怯

男婦癆瘵腰腿疼痛咳嗽吐痰七日見效九月份霜

桑葉紅棗

桑葉陰乾一片紅棗去皮核一片無灰酒五斤浸

入鐘內懸炭文武火二炷香空心服三小鐘上海

青蒿

虛勞寒熱肢體倦痛不拘男婦八九月青蒿成窠

時采之去枝梗以童便浸三日曬乾為末每服二

錢高梅一箇魚湯服乾 效嗽唾血勞瘦骨蒸日

地黃汁

既寒熱生地黃汁三合煮白粥服熟入地黃汁攪

急投

癆怯

八



勾空心念之心鏡 傳尸癆瘵五瓜煨膏末每酒  
 服一錢神書 五種尸注飛尸去遊走皮膚洞穿  
 臟腑每發刺痛變動不常也隨尸去附骨入肉攻  
 鑿血脉每發不可見死尸聞家哭便作也風尸去  
 淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作  
 也沈尸去纏結臟腑冲引心脇每發後地遇寒冷  
 便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每  
 節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪宜用

忍冬莖葉剉數斛煮取濃汁急稠每服雞子大許  
 溫酒化下一日二三服後 燒香治癆云卷一斤  
 甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓶中封閉地中  
 埋窖十日取出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入  
 瓶更窖五日取出燒之常令聞香疾自愈初入瓶  
 中封固煮一伏時破瓶取搗入甕別以瓶蓋埋地  
 中窖過用忌可重衣經 男女一應癆怯但有脈  
 脈有神者無不效用上好黃頭砂一兩舊坑烟雄



錫膏

黃五錢如無單用硃砂亦可看細書單層綿紙包  
因恐未經行童女一角將藥貼於女子臍內汗巾  
拾縛一週時取下稱藥比前多重二錢鐘表更妙  
即於病人臍上先備人乳十餘碗候病去口乾發  
燥自乳飲之渴止乳去止然後解下臍上之藥其  
病自去再用補劑十人九活總傳尸病病皆脊  
內必然有氣取鷓鴣糞三五合炒極熱布包從尾闕  
起擦背脊上至大椎又從大椎擦背脊下至尾闕

赤黃連

如此上下數十遍冷則易之日擦十餘次夜擦五  
六次三日內外長擦其氣必死服藥可愈也 傷  
怯用赤黃連搗汁和童便煎熱露至五更時服之被  
蓋暖一睡而起頓服此藥其神方也 總

急收

傷怯

十



鼓脹

食積

血脹

氣脹

水腫

黃牛黃

草靈丹沈鼓脹四五月黃牛黃陰乾微微火炒薑香

為末每服一兩並半時瀉清脹之不過三脹全效

苦薺

臨危亦可回生梅 通身腫滿苦薺炒四兩看

末枣肉丸梧子大桑白皮湯下十五丸日三服此

兔絲子

方人不可信試之甘驗梅 身面卒腫浮大兔絲

子一升酒五升漬二三宿每飲一升日三服不消

大薤白厚

再造術 遍身浮腫出過子薤白厚薤白浸湯

急叔

鼓脹

十一



烏豆

飲之<sup>至</sup> 身面浮腫烏豆一升水五升煮汁三升  
入豆五升更煮三升分過三服不瘥再合煎

綠礬百叶  
粟五倍子  
木香

青礬百叶  
百叶藥

脾積黃腫綠礬四兩百叶粟五倍子各一兩木香一  
錢為末<sup>下</sup>豆豉麩九枚子大每服五枚空心倍送  
下便 青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒浸  
七日煨甘草三兩為末以浸藥酒打糊丸枚子  
大每服五丸至七丸溫水下一月後去立效此  
方祖傳七世餘 脾胃不和氣血凝滯腹內盈脹

枳殼四兩

五倍神麩  
綠礬針炒

枳殼去穢切作兩指大四兩分四分用蘿蔔子  
為末乳漆小茴香各一兩每日枳殼一兩炒揅去  
香末仍將揅出四華用水二碗煎至一碗去滓煮  
糊丸枚子大每服五枚下五十九丸 綠礬丸法  
去腫最捷五倍子炒黑神麩炒各八兩綠礬薑  
汁炒白針砂醋炒紅各四兩為末生薑汁煮紅  
枣肉為丸枚子大每服六七十丸溫酒下不能飲  
酒末湯下終身忌食蒼麥麩<sup>保</sup>

急散

倉積

白脹

十二



山参 黑枣

绿碧石 霜炒

黄茄子

葡萄子 研 砂仁

血積黃腫山参淘淨一斤白礬半斤同炒黃為末黑  
 枣肉半斤搗勻末搗打糊丸梧子大每薑湯下八  
 九十九丸一日三服便 血滯黃腫绿碧石四两石州  
 霜一斤炒越半斤為末炒糖和丸梧子大每服三  
 四十丸后食薑湯下 婦人血豆用黃茄子  
 刀切陰乾為末每服二錢温酒下  
 氣脹氣壅葡萄子研以水澆汁浸縮砂一两一石炒  
 乳又浸又曬凡七次為末每末飲服一錢神驗立

皮硝 黑糖

黑牽牛 核 柳

香薷 葉白

急散

氣脹

水腫

十三

皮硝四两黑糖四两入大碗內水頓乾滾  
 澄清去滓滾黃酒冲服照量大小多飲為妙氣脹  
 至重者不過一服 牛郎丸治氣築奔衝不可  
 忍兼能取積名消水腫黑牽牛五錢炒橫柳二  
 錢半為末每服一錢姜葱湯下 蟲積及水腫用酒  
 下消

薤白丸治暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為  
 效香薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加



鼠粘子

鹿葱根葉  
席下塵  
甜葶藶大  
束

白朮末七兩和丸粘子大每服十九水飲下日五  
夜一服兩服 凡水身腫欲裂鼠粘子二兩炒研為  
末每溫水服二錢日三服 大腹水腫小便不  
利者身子灰葶藶末等分水下二錢日二針 通  
身水腫鹿葱根葶藶乾為末每服二錢入席下塵  
半錢辰砂末飲服 水腫尿澀甜葶藶二兩炒  
為末以大棗二十枚水一斗升煎一斗去棗入末  
煎至可丸粘子大每飲服二十丸漸加心微白為

馬鞭草鼠  
尾神

黑牽牛苗  
食

白朮澤信

大豆

度師梅 大腹水腫馬鞭草鼠尾神各十斤水一石  
煮取五斗去滓再煮令稠心粉和丸大豆大每服  
二三丸加至四五丸神效附 禹功散法諸水飲  
病黑牽牛頭末四兩茴香一兩炒為末每服一二  
錢生薑自然汁調下當轉下氣也附 水濕腫脹  
白朮澤信各一兩為末或為丸每服三錢黃芩湯  
下保命 新久水腫大豆一斗清水一斗煮取八  
升去豆入葶酒八升再煎取八升服之再三服水

急救

水腫



大冬瓜  
小豆

當從小便中出注 十種水氣浮腫以蒲大冬瓜  
一枚切蓋去瓢以毒小豆填實仍將蓋簽定紙筋  
泥因倚日乾用糯糠兩大羅入瓜在內煨至火盡  
取出切片同豆煨熟為末水糊丸梧子大每服七  
十九丸為瓜子湯下日三服小便赤者為度藏氣  
虛水腫浮脹垂危者大蒜十箇搗如泥入饅粉為  
丸梧子大每食前白湯下二十丸小便下數桶即  
愈若虛不汗降即以大蒜一枚每瓣切開逐瓣內

大蒜粉

大蒜苗香

天蒜丁香

硫黃粉  
巴豆

入茴香七粒紙濕裏煨熟爛嚼白湯下不拘多少  
如下不止即以丁香照茴香法煨服每瓣用三粒  
者丹方奇術專治腹中腫脹不服藥自去水生  
硫黃一錢真水銀粉二錢淨巴豆仁去油四兩共  
碾成餅以新綿紙層鋪臍上將藥餅當臍掩住  
外用帛拴如人行二三里時自然汗下惡水三五  
日去藥以粥補之欠患去隔日加水一餅可救二  
三十人秘之加麝香更妙秘 水腫面浮甘遂一

四逆散  
子

急散

水腫

十五



明礬青礬  
白麩

黑豆

惡實即牛  
蒡

山豆根

錢有束猪腰子一枚切為七片將逐束勻捲於內

分以紙裏水濕煨熟至五片為服鳴二便日

作一服全盡極推車如此黃腫水腫咽礬二兩

青礬一兩白麩半斤同炒令毒醋煮末粉糊此

湯下三十丸急水腫用黑豆煮去皮煨乾為末

米飲調服二錢元保水腫腹大惡實微炒一兩為

末麩糊丸核子大每束飲下十丸張文仲方水腫腹

大者聲而少色黑者山豆根末酒服二錢金

紅芽大戟  
紅棗

粟米菴豆  
猪肝

田螺涎

棗仙方治腫脹紅芽大戟一斤紅棗三斤水煮一

日夜去戟用枣曬乾食之立消保粟米菴豆各

一抄猪肝一葉切碎三味煮作粥食至重不過五

次其腫自消切忌氣怕生冷保田螺不拘多少

水漂加香油一盞於水內甚涎自然吐出其涎

曬乾為末每服不過三分活調下水自小便下氣

自大便出腫即消再服養脾胃藥全愈保黃胖

病腫黃末六十粒甜瓜蒂焙乾研末加小紅豆十

黃米瓜蒂  
紅豆

急救

水腫

十



二粒男左女右用力吹入鼻孔內各竅出黃水愈  
未效再吹如法見水即愈極

### 噎膈反胃

陳倉米

秘授神治噎膈反胃用陳倉米一斗同黃土炒令米  
熟去土為末以粟米煎湯調下再服後藥昔金州  
肉禪師得於異人君子製收可救人命名正胃散  
用白水牛喉管一條去兩頭而并筋膜脂肉而節

白水牛喉  
管

取下如阿膠片以米醋一碗浸之頻翻動令勻微  
火炙乾踏碎再炙再碎乾為度勿見太陽只宜  
火焙研細末厚紙包收或遇陰濕時連紙微火烘

急救

噎膈翻胃



螺師泥

果上塵黑  
驢尿

白礬硫黃  
硃砂

枯礬

茅根蘆根

豨薟草

焙收藏如遇前症每服一錢食前陳米飲調下輕

者一服立效解 活螺師一斗水浸養取泥曬乾

每服一錢火酒調下螺師放生李時方 果上塵黑

驢尿調服集 白礬硫黃各二兩鈹內燒過入硃

砂一分為末麩糊丸小豆大薑湯下十五丸濟善

白礬煨枯三兩蒸餅丸梧子大空心米飲服十五

丸濟善 茅根蘆根各二兩水四升煮二升頓服得

下良濟善 豨薟草焙為末客丸梧子大每沸湯下

陳米飯沉  
香

雷擊丁香

乾柿

甘蔗生薑

綠絲湯

白橫死

晉能蘭雅

五十九百一 陳食米炊飯焙研每五兩入沉香

末五錢和勻米飯服二三錢濟善 大雪壅一箇以

丁香十五粒刺入梨肉濕紙包裹四五重煨熟食

之濟善 乾柿三枚連蒂搗爛酒服甚效切勿以他

藥雜之瘡 甘蔗汁七升生薑汁一升俱取自然

汁和勻日細呷之魚治乾嘔不止梅 綠絲湯煮

粟米粥食之濟善 千葉白橫死陰乾為末陳糯米

湯調送三五口不轉再服神 晉能蘭十箇煮汁烹

急叔

噎膈翻胃

十八



硫黃水銀  
狗寶

雞子三枚食之以無灰酒下日二服神妙  
丹卷祀傳狗寶托硫黃水銀各一錢同炒成金色  
入狗寶三錢為末以雞卵一枚去白留黃和藥攪  
勻紙封泥因煆火煨半日取出研細每燒酒調五  
分不過三服驗方  
生薑不拘多少自五月  
盡日浸入廁中至六月六日取出洗淨揀虛浮者  
白漿去空中吊曬不可差物方效乾收確確封固  
臨服為末每三分入麝香一二厘甘州末少許火

生薑麝香  
甘州

乾錫糖印  
鉛糖洋

酒服之忌鹽物肉食  
薑四兩二味同搗作餅或煆或曬入炙甘州末二  
兩鹽少許每用點湯服此利胸膈養脾胃止嘔吐  
進飲食切勿忽之  
皮真病人聞其香食之食後少頃即打噴涕而收  
再食棗即知錢要食宜粥  
嚼燕良瀝 蒼麥稻燒灰淋汁入鍋內煎取白漿  
一錢入研砂一錢研末每酒服五分  
急報 噎膈翻胃 十九

皂角紅棗

白蘿蔔

蒼麥稻  
研砂



糖稻粉灰  
丁香豆蔻

馬蹄香

豆蔻縮砂  
丁香降米

蘆根

威靈仙

細稍燒灰滾湯一碗隔絹淋汁三次取汁入丁香

一枚白豆蔻半枚米一錢煮粥食神效馬蹄

香四兩為末好酒三升熬膏每服二匙好酒調下

日三服雞 大倉丸白豆蔻縮砂仁各二兩丁香

一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸

核子大每脈百丸薑湯下蘆根五兩剉以水

三大盞煮至一盞去滓溫服金匱 威靈仙一把

酌客各半盞益五分服之必必宿疾愈經 反胃

柳樹草

懷師殼

吐痰柳樹草五七箇並湯服即愈人 白玉散

次膈氣疼痛用壁上陳白懷師殼燒研每服一錢

酒下甚效經



血症 吐血

舌衄血

齒血

荆芥

吐血不止荆芥連根洗搗汁半盞服或用乾穗為末

白茅根

生地黄汁調服二錢 經 白茅根一握水煎或搗

白雞冠花

汁日飲一合 針 白雞冠花醋浸煮七次為末每

蘆荻冠花

服二錢熟酒下 經 蘆荻外皮燒灰勿令白為末

入蚌粉少許研勻麥門冬湯服一二錢三服可收

天芥子即

一人 經 天芥子苗五錢人參二錢五分為末每

瓜蒌

服二錢新汲水下 濟 瓜蒌泥裏煨存性研末搗

急板

吐血

二十一



嫩荷葉

翻白艸

木耳槐花

山茶花

鏡面草

川鬱金

皺面草印  
地松

麥門冬

米飲下三錢日二服輕 嫩荷葉七箇搗水服之

甚妙濟 翻白艸每用五七科吹咀水二鍾並一

鍾空心服極 木耳槐花各一兩為末井水調服

三錢極 山茶花焙乾為末每酒調服三錢驗效

鏡面草水洗搗酒服驗 川鬱金為末井水服二

錢甚老再服簡 皺面草曬乾為末每服一二錢

以茅花泡湯調服日二次錫 麥門冬去心一斤

搗取自然汁入者二合分作二服即止心法統人 硃

硃砂粉

山漆

胡黃連生

地黃熟膠  
柳紫

敗荷葉生  
蒲黃

砂粉粉等分為末服二錢濟 山漆一錢自嚼

末湯送下 集 地黃連生地黃等分為末熟膠汁

丸梧子大臥時茅花湯下五十九濟 柳紫焙研

末飲服一錢經 經霜敗荷葉生蒲黃等分為末

每服三錢桑白皮煎湯或麥門冬湯調下濟 雞

藕薑葉並汁飲之 梅 槐花砂研每服三錢糯米

飲下仰臥一樽飯後 錫底墨炒過研細井華

水服二錢連進三服 急 黃春二錢半紫背浮萍

急救

吐血

三十二

錫底墨

黃春浮萍

雞藕  
槐花



蒲黃黃葉子

白葉

茜根

蒲黃生地  
髮灰

人參荆芥  
側柏葉

五錢為末每服一錢薑煮水下濟在 蒲黃黃葉子  
等分為末掌中紙之圖方 白葉燒存性糯米飲  
服三錢乾 茜根一兩搗末每服二錢水煎冷服  
亦可水和二錢服乾 蒲黃末每服半錢生地黃  
汁調下暑人加減或入髮灰等分濟 七情所感  
酒色白傷氣血妄幻口鼻俱出心脾脈破血如涌  
泉須臾不收用人參焙側柏葉蒸焙荆芥穗燒存  
性各五錢為末每二錢入飛羅麩二錢以新汲水

藕節荷蒂

飛羅麩

荆芥

糯米蓮子  
心

調如稀糊服少次再服一服立止中藏 卒暴吐  
血用藕節荷蒂各七箇以卷少許搗爛用水二鍾  
並至八分去滓溫服或為末丸服亦可名為雙荷  
散乾 內損吐血飛羅麩醫學 炒以金墨汁或藕節  
汁調服二錢集成 酒色過度口鼻出血如涌泉  
荆芥燒研陳皮湯服二錢石過二服直 勞心吐  
血糯米五錢蓮子心七枚為末活服或以墨汁作  
丸服之瘡 酒食傷飽依頭掬損肺臟口鼻妄行

急救

吐血

衄血

二十三



百草霜 槐花

但聲未失者村莊百草霜末湯服二錢或百

州霜五錢槐花末二兩茅根湯下二錢經 穠熟

吐血馬勃為末以糖丸如彈子大每服半丸冷水

化下珍袖 心熱口乾刺薊葉及根搗取汁每頓服

二小盞經 心熱吐血生葛根搗汁半升頓服立

瘡癩 貝母炮研末溫漿水服二錢經

衄血不止用麥門冬去心生地黃各五錢水煎服之

上經 服藥不應服蒜一枚去皮研如泥作錢

生蒜 地黃 貝母

柏葉子葉 榴花 新汲水

大餅子厚一豆許左鼻血出貼左足心右鼻血出

貼右足心兩鼻俱出俱貼之立瘥簡要 柏葉榴

花研末吹之濟 用新汲水隨左右洗足即止累

用有效經 用冷水噴面或以百草霜末吹之立

止濟 用冷水浸紙貼顙門上以熨斗熱熨立止

後肘 枯礬末吹之妙濟 津調白芨末塗山根上

仍以水調服一錢立止經 用鮮薄荷汁滴之或

以乾老水煮綿裹塞鼻內轉 就以所出血調白

白芷 枯礬 白芨 薄荷

急救

衄血

三十四



芷末塗山根立止便 艾灰吹之亦可艾葉煎

湯服輕 青蒿搗汁服之并塞鼻如驗端 剪金

花連莖葉陰乾濃煎汁溫服立效南 馬蹄決明

炒研茶調貼心脘即止濟 生車前葉搗汁飲之

甚妙本 薑根艾葉各一兩烏梅肉二錢五分

為末煉桑扈梧子大每烏梅湯下五十九丸紙

條蘆真麻油入鼻取嚏即愈有人一夕衄血盈盆

用此而效濟 韭根葱根同搗棗大塞入鼻中頻

剪金衣即  
王不留行  
馬蹄決明  
車前葉  
薑根艾葉  
烏梅  
真麻油  
韭根葱根

葱汁

易兩三度即止針 取葱汁入酒少許滴鼻中即

覺血從腦散下也金 甚危者蘿蔔自然汁和與

灰酒飲之即止秘 累醫不效葉殼燒存性研末

粥飲服二錢輕 取千葉石榴花研末吹入鼻中

立效頤 柵葉搗汁一小盞頓服即止輕 藕節

搗汁吹并通鼻中輕 山桅子燒灰吹之屢用者

效錫 刀刮指甲細末吹之即止試驗便 生葛

根搗汁三服即止輕 當歸焙研末每米飲調服

急救

衄血

二十五

千葉石榴  
柵葉  
藕節  
山桅子  
指甲  
生葛根  
當歸



硼砂

香薷

雞蘇

蒼耳草

殼精

浮萍

瓦苔

血竭

一錢濟 硼砂一錢水調服立止集 骨蒸根末

水服一錢濟 香薷研末水服一錢濟 茅根為

末半甘水服二錢輕 雞蘇二兩防風一兩為末

每服二錢過水下仍以茅塞鼻輕 蒼耳莖葉搗

爛取汁一小盞服輕 殼精草為末熟麩湯調服

二錢輕 浮萍末吹之輕 蓖麻葉油塗多起發

顛門上大脛菴 瓦苔研末煎水服二錢時

血竭蒲黃等分為末吹之集 白糯米十四粒

糯米半及  
麩屑考

線札

人參童便

糯米

玄明粉  
延胡索

半及四粒枯白麩一錢麩香一分沉香三分共末

麩糊丸菴豆大每用二丸綿裏塞兩耳如耳中如

血塞兩鼻立止輕 不止者以紙塞住將線札中

指根左右出札左右出札右髮用梳之去紙紙收干

葉石榴花陰乾塞鼻更妙輕 人參一錢並湯同

童便服即止至重者用二錢輕 服藥不應時用糯

米微炒黃耆末每服二錢煎水調下仍吹少許

入鼻名獨聖散濟 玄明粉二錢水服濟 延胡

急散

吐血

二十六



牽牛綿裹塞耳左咽塞右右咽塞左普 毒芍藥

為末水服二錢七事林廣記 弱茶燒灰白麩三錢研

勻并藥水服二錢濟 口鼻皆出白麩入鹽少許

冷水調服三錢濟 人乳童便好酒等分碗盛重

湯煮熱飲之立止保 菜豆粉細茶為末凉水調

服立止保 小兒胎髮燒灰吹之立止保

齒縫出血人參赤茯苓各二錢水一鍾煎七

分食前溫服日再試 苦參一兩杜松一錢為末

白麩鹽  
人乳童便  
豆粉細茶

胎髮

人參赤茯苓  
苦參

苦參杜松

考心冬

日三搯之濟 考心冬煎湯漱之寶 五倍子燒

五倍子

存性研末敷之即止易 出而不止齒牙搖動的

白茯苓  
百草霜

疾藜末每日搽之藏 百叶霜搽之立止集

杏仁青黛  
柿餅

肺病咯血杏仁四十箇以黃蠟炒黃研細入青黛一

錢作餅用柿餅一角破開包藥濕紙裏煨熟食之

取效丹 香附末一錢米飲下日二服百一 甲

香附

乙餅吹嗽出血片涎內有血絲不問久新即聲音

啞者一服效者黛一分牡蠣二錢杏仁七粒去皮

青黛牡蠣  
杏仁

急救

齒血

肺血

二十七



人參

尖炒研勻用黃蠟溶化和丸捏成餅子三枚每日  
中用乾柿餅一枚去核入藥石內濕紙裏煨約藥  
溶方取出去火毒食後細嚼糯米飲下效喘  
上氣及喘急嗽血吐血脈無力者人參末每服三  
錢雞子清調之五更初服便睡去枕仰臥只一服  
愈年候去再服各血者服盡一兩甚效忌醋醃腥  
紫麩鮓醉飽花靈痰嗽帶血青物大柿餅飯上蒸  
細批開每用一枚揆真青黛一錢臥暗食之薄荷

柿餅青黛

人參乳香  
辰砂

湯下暴 欬嗽吐血人參乳香辰砂等分為末烏  
梅肉和丸彈子大白湯化下一丸日一服集 久

白前桔梗  
桑皮甘州

嗽唾血白前桔梗桑皮三兩炒甘州一兩炙水  
六升煮一升分三服忌猪肉菘菜外 痰嗽帶血

熟地百  
合

款冬花百合蒸焙等分為末罌丸就服大每臥時  
嚼一丸薑湯下生濟

槐花  
刺薊

舌衄出血槐花末敷之即止集 刺薊搗汁和酒服  
乾老烏末冷水服魚鱗丸竅出血濟 香薷煎汁

香薷

急叔

肺血

舌血

二十八



蓖麻油

木賊叶

紫菀赤豆

服一升日三服後 紙攤蘸蓖麻子油燒烟薰鼻

中目止痛 舌硬出血木賊煎水漱之

法失血病紫菀不拘多少入大鍋內水煎令乾去滓

熬膏以炒熟赤豆為末和丸梧子大每服下三五

十九常服心 法服血病水蘆花紅花槐花白雞

冠花茅花等分水二鍾並一鍾服積善 九竅出

血荆芥並任通口服之植 灸瘡出血任炒黃芩

二錢為末任服即止怪 血氣脹滿劉寄奴穗實

荆芥  
黃芩  
劉寄奴

五苑

王瓜

蒲黃

雞骨風  
鳳衣

為末每服二錢任並服不可過多令人吐利此破

血之仙藥也錫 瘡血作痛王瓜燒存性研末與

灰任空心服二錢集 身中出血蒲黃炒黑研末

搽入集 脚縫出血行去不得雞骨鳳凰衣研

細各一兩集 因火般為末燭油調入縫內次早即

能行集



痰饮

砂仁白蔻

痰气膈胀砂仁捣碎以蔻蔻汁浸透焙乾为末每服

一二钱食远沸汤服餲 暖胃除痰消滞进食肉

由豆蔻半  
及木香

豆蔻二箇半及薑汁炒五钱木香二钱半为末葱

饼丸芥子大每丸浸酒下五七十九粒 停痰

香附半夏  
白礬

宿饮成气上攻胸膈不利香附皂荚水浸半冬各

一朶白礬五钱为末薑汁熬糊丸核子大每服三

四十粒薑汤随时下 存仁 停痰宿饮喘咳嘔逆全

急救

痰饮

三十



成靈仙半  
及

白礬

半多者

不入食成靈仙煨半及薑汁浸煨為末用皂角水  
熬膏九菜豆大每服七丸至十丸薑湯下一日三  
服一月為驗忌茶麪糖 胸中痰游頭痛不欲食  
白礬一兩水二升煮一斗約客半合頓服須臾大  
吐未吐飲少熱湯引之外 金珠化痰丸治痰嗽  
如神又治勞嗽半及十斤末泔水浸十日換水三  
次取出切作兩半晒乾用白礬五斤水一桶入鐵  
鍋內化開將半及入礬水內浸二十日取出切作

梨汁薑汁  
白蜜薄荷

黃老茄子  
苦參

四辨晒乾生薑十斤另研取汁再入半更浸二十  
日晒乾為細末粉艸十斤去皮切片水熬成膏和  
作劑病重者二錢五分輕者二錢金箔十張為一  
大丸喻化忌房事又名一秤金保 痰壅用梨汁  
一鍾生薑汁白蜜各半鍾南薄荷末三兩和勻重  
湯煮十餘沸任意食降痰如奔馬保 大風執痰  
用黃老茄子不計多少以新瓶盛埋土中經一季  
盡化為水取出入苦參末同丸梧子大食後及卧

急救

痰飲

三十一



石青石綠

時酒下三十九甚效經圖 頑痰不化石青一兩石  
綠半兩並水飛為末麴糊丸茶豆大溫水下十九  
吐太痰一二盃不損人瑞竹堂方

效嗽喘嗽哮喘

人參明礬

止嗽化痰人參末一兩明礬二兩以醞醋二升熬礬  
成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大一丸放舌下

蚌粉青黛

嗽即止痰自消簡 真蚌粉新瓦上炒紅入青黛  
少許以淡蘆水滴麻油數點調服二錢類編 白明

明礬建茶  
明礬

礬建茶等分為末糊丸茶服難 明礬為末醞糊  
丸梧子大每睡時茶下三十九定西 熟瓜萼  
十箇明礬二兩搗和餅陰乾研末糊丸梧子大每

瓜萼明礬

急救

效嗽



葶藶知母  
貝母

瓜蒌仁文  
蛤

萊菔子

貝母厚朴

薑湯下五七十九摘 合奇丸用曹州葶藶子一

兩紙襯炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉五

錢砂糖一兩五錢和丸彈子大每以新綿裹一丸

含之嚥津甚者不過三丸中 瓜蒌仁一兩文蛤

七分為末以薑汁澄濃脚丸彈子大噙之摘 萊

菔子半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和丸芡子大

綿裹含之嚥汁甚炒勝 化痰降氣止嗽解鬱消

食除脹有奇效貝母太心一兩厚朴薑制五錢蜜

明礬山梔

五味子真  
茶

馬勃

甘艸

沙參

丸梧子大白湯下五十九鄧筆 火嗽化痰甚效

明礬半生半煨山梔炒黑等分為末薑汁糊丸睡

時茶下二三十丸摘 久嗽不止五味子一兩真

茶四錢晒乾為末以甘艸五錢煎膏丸棗豆大沸

湯下三十九數日愈攝 嗽久用馬勃為末蜜丸

梧子大每服二十丸白湯下即愈譜 久嗽肺痿

涕唾痰多骨節煩悶寒熱甘艸三兩炙搗為末每

日取小豆三合調末一錢服之續 肺熱效嗽沙

急救

效嗽



天花粉人

梨椒

紫苑款冬  
百部

熟山萸白  
雄名

瓜萸仁青  
黛

參五錢水煎服之飭 虛熱效嗽天花粉一兩入  
參三錢為末每服一錢米湯下集 卒得效嗽好  
梨太核搗汁一碗入椒四十粒煎一沸太滓納黑  
錫一大兩消訖細細含嚥立定上海 久嗽不瘥紫  
苑款冬花各一兩百部五錢為末薑三片烏梅一  
箇煎湯調下三錢日二服甚效經圖 乾嗽無痰熟  
瓜萸搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頻含  
嚥汁簡 酒痰效嗽用此救肺瓜萸仁青黛等分

橘皮神麴  
生薑

松子桐朮

明礬粟殼  
烏梅

研末薑汁蜜丸芡子大每嚥一九潤 經年氣嗽  
橘皮神麴生薑焙乾等分為末蒸餅和托棧子大  
每服三五十九丸後夜臥各一服有人連服三  
弄舊證膀胱氣喘愈也新 鳳髓湯治肺燥效嗽  
松子仁一兩桐朮仁二兩研膏和熟蜜五錢收貯  
食後湯點服二錢外 賈同知百勞散治效嗽  
多年目汗久效虛嗽粟殼二兩五錢去蒂膜功  
炒取一兩烏梅五錢焙為末臨臥時每白湯下二

急效

效效

三十四



紫苑

紫苑五味

錢暄 肺傷欬紫苑五錢水一盞並七分溫服

日三次飭 吐血後欬者紫苑五味炒為末蜜丸

茨子大每含化一丸 三奇救法一切欬嗽不

問久近晝夜無時佛耳草五十文欬冬花二百文

熟地黄二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒

吸煙嚥下有涎吐去 暴欬嗽用百部藤根搗

自然汁和蜜等分沸湯並膏嚥針 新久欬嗽

并連嗽四五十聲連皮生薑自然汁一勾生薑二

薑汁生卷

百部藤根

佛耳草俗名綿細頭欬冬花熟地黃

菴子河子杏葉並

匙同放碗內重湯煮一滾溫服 嗽久語言不

出真菴子二兩訶子三箇杏仁三十箇百葉並二

兩為末熱酒調服二錢 老人欬嗽多年不愈

不能臥者菴板油四兩蜂蜜末糖各四兩熬化成

膏時挑一匙口中嚥化三五日嗽止 銀杏膏

治久年欬嗽吐痰陳細茶四兩罌煨為細末銀杏

肉四兩一半去白膜一半去紅膜搗爛切批肉四

兩搗爛加蜜半斤煉成膏不拘時服 欬嗽秘

菴油降卷末糖

細茶銀杏切批密

急救

欬嗽

喘嗽哮喘

三十五



款冬膏  
甘草礞砂

治欬冬花石膏甘草各三錢礞砂七厘為末吹入  
喉內用細茶漱下即好保

瓜蒌  
桔梗

痰嗽氣喘瓜蒌二箇明礬一棗大同燒存性研末以  
乳蘿蔔蘸食藥盡病除普 桔梗一兩五錢為末  
用童便半升魚四合去滓溫服縮 五味子白礬

五倍子  
礬

等分為末每服三錢以生猪肺炙熟蘸末細嚼白

生薑  
蔗

湯下兩服病即不發普 生山藥搗爛半碗入甘  
蔗汁半碗和勻煎熱飲之立止便 好梨剗空細

梨黑豆

銀杏麻黃  
甘草

小黑豆令滿留蓋合住繫定糠火煨熟搗作餅每  
日服之至效縮 鴉李殼銀杏五箇麻黃二錢五  
分甘草炙二錢水一鍾半煎入分臥時服根 相

胡椒生薑

桃肉三顆生薑三片臥時嚼服即飲湯兩三呷又  
嚼桃薑如前數即靜臥必愈普 苧麻根煨存性

苧麻根

苧麻葉  
紫雲英殼

為末生豆腐蘸食三五錢即效末愈以肥猪肉  
二三片蘸食甚妙普 無憂丸經霜苧麻葉經霜  
桑葉紫雲英殼炒各一兩為末密丸彈子大日一

急救

喘嗽哮喘

三十六



萊菔子皂  
莢

服白湯化下滑 萊菔子炒皂莢炒存性等分為  
末薑汁和煉蜜丸梧子大白湯下五七十九簡

乳薑皂莢  
想

合州乾薑炮皂莢炮去皮子及酥去樹心紫色者  
去皮等分為末煉蜜和搗三千杵丸梧子大每飲  
下三九嗽發即服日三五服忌葱麪油膩貝類如  
神者醫傳藥不傳方恐不信也儲 喘急欲絕韭

生茅根

汁飲一升效後 如神湯治肺熱氣喘生茅根一  
握吸咀用水二盞並至一盞後溫服甚者三服

相類子枋  
巾天蓬奶

出醜 肺虛短氣喘咳劇者取相類子葉焙研末  
飲服二錢有人患喘三十年服之頓愈甚者服藥  
後胸上生小癭瘰作瘰則瘵也虛甚加人參等分  
名清肺散方出中藏經李時珍方 久患喘呷效嗽喉

白苧

中作聲不得眠者取白苧焙搗為末每溫酒服二  
錢喉 哮喘痰促遇厚味即發者萊菔子淘淨蒸

萊菔子

熟晒研薑汁浸蒸餅丸菜豆大每服三十丸以口

石相莢印  
鵝不食州

津啞下日三服名清金丸成 寒痰哮喘石相莢

急救

喘嗽哮喘



胡椒杏仁  
生薑

青橘皮  
豆

甜葶藶

白規殼

研汁和酒服即住  
凡人喘嗽氣促睡臥不得  
服此立定切桃肉去皮杏仁去皮尖生薑各一兩  
研膏入煉蜜少許和丸彈子大每臥時嚼一丸薑  
湯下海  
寒疾氣喘青橘皮一片展開入豆一  
筒麻紫定火上燒存性研末薑汁和信一鍾呷服  
天台李翰林用汝莫秀才到口便止神方也  
肺濕痰喘甜葶藶炒為末枣肉丸服  
咳白規殼多年陳者燒過存性為極細末末飲調

鴿糞

雞子  
白  
強香

知母  
芍藥

小薊  
獨

服一錢日三服  
鴿糞在上自然成灰研細好酒下立止  
用鷄子一枚頂部一孔入人中白末二厘調勻紙  
糊煨熟食之  
米湯或茶酒下  
貝母去心各二兩百藥並一兩為細末烏梅肉蒸  
熟搗爛為丸梧子大每服三十丸臨臥或食後連  
皮薑湯送下  
喘嗽哮喘  
喘嗽喘氣或鹽水劍肺小薊一

急救

喘嗽哮喘

三十八



蘇子白芥  
子萊菔子  
枳椇和茶

砂仁生薑

紫菀冬

真蘇子

蒼麥粉茶  
烏生麥

把猪精肉四兩入水日煮令熟食內并湯飲之立  
已祿 三子湯治氣喘如神蘇子白芥子萊菔子  
水並服立止祿 定喘丸枳椇肉一兩細茶書五  
錢加蜜三四匙搗成丸彈子大不時噙化世濟 上  
氣欬逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分搗爛蒸酒  
令透泡服便 欬逆短氣紫菀薑蘇二錢人參一  
錢水一鍾煎服 上氣欬逆真素蘇子入水研  
濾汁同粳米煮粥食便 欬嗽上氣蒼麥粉四兩

石膏白粉

蒼麥二錢生密二兩水一碗順手攪下下飲之良  
久下氣不止即愈事親 老年痰火咳嗽石膏一  
塊炭火煨紅碎入好燒酒內響定取出又煨又碎  
如此七次燒酒頻換取研細末少加白粉拌勻每  
茶匙挑服二三錢津嚥下周義方

急報

喘嗽哮喘

三十九



五痘

黃痘 鼓痘 酒痘 女勞痘 黃汗 此謂五痘 黃汗者乃火

生茅根

汗出入水所致 身體微腫 汗如黃藥汁 用生茅根

一把 細切以豬肉一片 合作羹 名後 鼓痘 因食

熟但苦參

而得勞痘 因勞而得 用熟膽一兩 苦參三兩 為末

牛膽汁和丸 核子大 每前勞飲服 五九日 三服不

就胆槐子

效 稍增勞痘 加熟膽一兩 槐子仁三七枚 狹膽汁

田陳槐子

和丸 翹 男子酒痘 苗陳蒿四根 槐子七箇 大田

急報

五痘

甲



燈草根

扁蓄

紫花地丁

赤根

熨一角連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之  
 秘方也外 濕熱黃疸燈草根四兩酒水各半入  
 瓶內廣半日露一夜溫服藥 熱黃疸扁蓄搗汁  
 頓服一升多年者再服性 內熱黃疸紫花地丁  
 末酒服三錢經 黃疸變黑醫所不能治土瓜根  
 汁平日溫服一小升午刻黃水當從小便出不出  
 再服後 逐黃散酒疸及小兒黃疸眼黃脾熱青  
 瓜萹焙研每服一錢水一盞並七分臥時服五更

青瓜萹

蔓菁子

蔓菁根

車前根

瀉下黃物立瘥海 黃疸如雀睛黃小便赤生蔓  
 菁子末熱水服方寸七日三服散 黃疸如雀意  
 治根並湯頻服針 絲瓜連子燒存性為末每服  
 二錢因熱得疸熱湯下因酒渴疸溫酒下連進數  
 服金飴 黃疸如雀睛明暗清晨勿令雞犬為人  
 見故車引桃根細如箸若釵服者一握切細以水  
 一大升煎一小升空腹頓服服後三五日其黃離  
 離如薄雲散開百日方平後也黃散後可時時飲

急散

五疸

四十一



柳枝

不白爛因

清酒一盞則眼中易散否則散遲忌食煎炒燥魚  
等物去徐之才家傳秘方也效 黃疸初起柳枝  
煮濃汁半升頓服效 黃疸初起法用連紙一張  
裁為四條筆後捲如爆竹式口上糊粘因外用豆  
蠟一兩鐵杓溶化將紙筒四圍繞勻不可使蠟入  
內患人仰臥筒套臍上外以麩作圈護定勿倒頭  
上點火燒至麩所盡即易換新筒若臍中有黃水  
如雞子餅者取出輕者四五根重者六七根取盡

黃為度救急 含勞黃病身目俱黃者鑿錫由安炭

煨赤米醋拌為末卷肉和丸梧子大丸後薑湯下

二三十丸效 痼黃如金好眠吐涎茵陳蒿白蘚

皮等分水二鍾煎日二服麩 目黃好睡按蒼耳

葉安舌下吐涎自去 五般急黃山豆根末水

煎二錢若帶蟲氣以酒下 如聖丸治脾勞黃

疸地錦草羊糝州桔梗蒼朮各一兩母州五錢為

末先以陳醋二碗入鍋下皂礬四兩煎乾良久之下

茵陳蒿白蘚皮

蒼耳葉

山豆根

地錦草羊糝州桔梗

蒼朮甘州皂礬皂煎

急救

五疸

甲子二



星薑

瓜蒂下矣

雞子跖

雞蛋括胆

藥末再入白麵不拘多少和成一塊丸如小豆大  
 空腹醋湯下三五丸一日二服數日面色復舊  
 也和 濕熱發黃生薑时时周身擦之其黃自退  
 加茵陳蒿尤妙和 遍身如冬瓜蒂下黃各四十  
 九枚甘錫內燒存性為末每用一字吹鼻取效  
 水亦可擦牙追涎經 三十六黃用雞子一枚連  
 殼燒灰研碎一合和之濕服鼻中能化為效身體  
 極黃者不過三枚神效和 黃疸用雞蛋一枚猪

雞的如子  
茅根

膽一箇調勻不拘時服如心翻不下以乳糕噉之  
 三次即愈和 濕熱黃疸案切一兩甘州二錢半  
 作一劑以水一盞白茅根一握煎至七分任意時  
 時服盡和



法積

中積

食積

痞積

疔積

礞石

威靈仙  
根烏梅

金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癰塊魚刺心

腹及婦人崩中漏下青礞石半斤為末礞石末一

兩日鍋內鋪頭蓋底按實炭火二十斤煨過取出

入赤石脂末二兩滴水丸芡子大候乾入甘鍋內

小火煨紅收之每服一丸至二三丸空心溫水下

少許屢之久病宿痢加至五七丸家男婦氣痛

不拘久近威靈仙五兩土蘇根二錢半烏梅五分

急救

法積

四十四



好酒一盞雞子一箇灰火煨一宿五更視雞子殼

軟石度去滓區服以乾物磨之側臥向塊邊薄每

次日服覺塊刺痛是其驗也補 香烏散洗男

婦法病香附烏藥等分為末每服一二錢飲食不

進薑棗湯下腹中者蟲檳榔湯下瘡疾乾薑白鹽

湯下頭風虛腫茶湯下婦人冷氣米飲下產後血

攻心脾痛童便下婦人血海痛男子疝氣茴香湯

下韌 奔豚氣痛薤白搗汁飲附 大腸冷積成

薤白

威靈仙

靈仙蜜丸梧子大一更時薑湯下十九至二十經

白礬

男婦小兒進蠶屎積白礬五錢入上白饅頭內火煨

礬紅麩磨末空心好酒下五分一次見效二服

石榴根皮

急極 寸白蠅蟲石榴根皮煎水煮米粥食上

馬齒莧

腹中白蟲馬齒莧水煮一碗和鹽醋空腹食之少

項蟲盡出瘰

白麩

傷米食積白麩一兩白酒麩二九炒為末每服二匙

白湯調下如傷肉食山查湯下便 食鴨肉不消

急殺

急積

急積

四十五



糯米

馬牙硝

芒草

糯米泔飲一盞消積特 食物過飽不消遂成

痞膈馬牙硝一兩吳茱萸半斤煎汁投硝乘熱服

之良久未轉更進一服立效症 快氣湯治一切

氣疾心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痞逆嘔惡及宿酒

不解香附子一片縮砂仁八兩甘州香四兩為末

每日湯入鹽點服為損末無服亦可和 食魚鱧

及生肉在膈膈不化敗癥瘕馬鞭料搗汁飲一升

即消軒 米穀食積炒麴末白湯調服二錢日三

麴

馬鞭料

香附縮砂  
甘草

陸神麴

服陸 衣積心痛陳神麴一塊燒紅淬酒二大碗

服之搗 衣果腹脹不拘老少用肉桂末飯和托

茶豆大白湯下五六丸未消再服陸 酒積年久

但飲腸即痛及吐者挑水不拘多少吞末酒服三

錢以神麴 淫肉過多脹滿不快鹽花擦牙溫

水漱下二三次如湯沃雪微

雄黃白礬

腹脇痞塊雄黃白礬各一兩為末麴糊調膏攤貼即

急散

急散

急散

急散



皮初獨蒜  
大黃  
葶藶獨蒜  
穿山甲鹽

愈秘方也集 皮硝一兩獨蒜一箇大黃末八分  
搗作餅貼瘡塊處以酒為度經 葶藶獨蒜穿山

水荏花子

甲車倉鹽入好醋搗成餅量瘡大小貼之兩炷香  
為度化為膿血從大便出得毒 水荏花子一

碗水三碗藥末文武火煎成膏量瘡大小攤貼仍

以酒調膏貼忌葷腥油膩得毒 化鐵丸治腹中

瘡積感靈仙核桃兒各一兩為末酒服三錢得毒

吳茱萸三升搗和瓦灰熟布裏熨之冷再炒乾更

感靈仙核  
桃兒  
吳茱萸

觀音柳

番頻熱癰後走逐熱之消乃止集 觀音柳煎湯

露一夜五更空心飲數次瘡後自消得毒 脾積結

塊雞子五箇阿魏五分黃蠟一兩共煎化分作十

服每空心細嚼溫水送下該物不忌腹痛無妨十

日後大便下血乃積化也經 艾揀去梗揉如綿

四兩捏如患大川椒四兩拌入艾中粗草紙包安

瘡積上以湯壺熱熨內有响聲即消得毒 癰瘕血

塊砂仁一錢五靈脂醋蒸焙乾一錢苦為末白水

砂仁五靈

急散

瘡積

四十七

雞子阿魏  
黃蠟

艾綿如樹



陳刀豆殼

服之救急 消血瘡陳筆刀豆殼煨燂為末好酒服

一錢加麝香五厘亦妙也 瘡氣成塊在腹不散

華菱大黃

華菱大黃各一兩並生為末入麝香少許煉蜜丸

梧子大每冷酒服三十丸類 月水不通結成癥

牛蒡根

塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤剉蕪三遍生絹袋

盛酒二斗浸五日每夜前溫服一盞漸 婦人經

馬鞭草

閉結成癥塊肋脹欲死馬鞭草根苗五斤剉細水

五斗煎至一斗去滓熬成膏每服半匙好酒化下

日二服 聖

黃泥砂糖

黃病愛在壁泥用黃泥一斤砂糖四兩同炒乾為末

黃連膏丸梧子大空心糖湯下五六十丸保 男

蒼朮

婦面色萎黃好食生米蒼朮末泔水浸一夜剉塊

為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食煎米飲下日

樞子

三服藏 好食茶葉面黃者每日食樞子七枚以

愈為度兼以可白龜板 食生米久則成癥好吐

白糯米

清水得米則止米不消化久不斃人白糯米五斤

急救

積滯

甲子八



雄黃

鷄屎一升同炒焦為末水一升頓服少時吐出癥  
如研米汁或白沫淡水乃愈也針好食油者誤  
吞髮入胃痰血氣蒸成形用雄黃半兩研細水調  
眼吐出愈

急救

心腹諸痛

心氣 蛇虫

急心 心胃

絞腸 冷氣

腹 鬱火 痛

失笑散治男女老少心痛腹痛少腹痛小腸疝氣諸

藥不效者能行能止妊娠心痛及產後心痛少腹

痛血氣痛尤妙五靈脂入酒研細澄汰去沙土晒

乾蒲黃炒焦等分研末每用二三錢先以醋二極

調末坐湯內熬成膏入白滾水半盞化開連藥熱

服未止再服一方以酒代醋或以醋糊丸童便酒

服和艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣

急救

心腹諸痛

四九

五靈脂  
蒲黃



香附新文

炒鹽生薑

官桂白芍  
甘草

黃連附子

枳仁五靈  
脂

痛不可忍者，煎治虛浮氣腫，香附子二兩，蘄艾葉半兩，以醋湯同煮，熟去艾，炒為末，米醋糊丸，梧子大，每白湯服五十九丸。集胃脘痛，用炒鹽一錢，生薑七片，水煎溫服，立上。救急心腹痛，官桂一錢，五分白芍藥二錢，炒甘草五分，水煎，不論寒熱，新久一服立上。元保胃脘痛甚，諸藥不效者，黃連六錢，大附子炮去皮，胎一錢，生薑三片，棗一枚，水煎，熟服。救急諸般心腹氣痛及瘀血作痛，枳仁炒五靈

白蠟

當歸

水香皂角

薑黃官桂

芭蕉花

水荭花

脂去沙石各五錢，為末，醋糊丸，梧子大，每服二十丸，醋湯或酒下。元保心氣疼痛或死血作痛，白蠟三錢，痛時滾酒化下。世濟心下刺痛，當歸為末，酒服，方寸匕。效心氣刺痛，木香一兩，皂角灰一兩，為末，糊丸，梧子大，湯服五十九丸，甚效。攝生心痛難忍，薑黃一兩，官桂三兩，為末，醋湯服一錢。驗心痺痛，芭蕉花燒存性，研鹽湯點服二錢。華心氣疔痛，水荭花為末，熟酒服二錢，又法，男用酒水各

急救

心腹諸痛

五十



赤麴香附  
乳香

小蒜

枳實  
枳殼

陳米

白螺獅殼

半女用醋水各半煎服一服立效云痛 心腹作痛

赤麴香附乳香等分為末酒服云痛 積年心痛不

可忍不拘十年五年濃煮小蒜食飽勿著鹽立效

不發集手 心脾作痛鷄心枳實高良薑各一錢半

陳米百粒同心水煎服之指直 濕痰心痛白螺獅

殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立上正 心腹

惡吐口吐清水艾葉搗汁飲冬月以乾艾煎汁服

之救急 心腹堅脹痛悶欲絕鹽五合水一斗煎服

硝石雄黃

吐下即定不吐更服梅 心腹腰痛硝石雄黃各

一錢研細末每點少許入昔名火龍丹集 心煩

脇痛連腦欲死者當搗汁服一二升後肘 胃腕血

氣作痛水荏花一大撮水二鍾前一鍾服驗屢 血

氣攻心痛不可忍麥根洗剉浸酒飲門 心腹脹

滿短氣茅荳蔻一兩去皮為末木瓜生薑湯調服

半錢金干 痞滿用飴糖漿溫服一二碗意

諸心氣痛不可忍者明礬一兩燒枯硃砂一錢金器

明礬硃砂  
全備

急救

心腹諸痛

心氣痛

五十一



生礬

馬兜鈴

菜豆胡柿

高粱根

桂心

晚蚕沙

吳茱萸雞  
蛋

三張為末每服一錢五分輕者一錢空心白湯調

下即真生礬一皂子大用醋一盞煎七分服五

止親大身兜鈴一箇燈上燒存性為末溫酒服

不拘大小男女五效驗 菜豆廿一粒胡柿十四

粒同研末白湯調服即止驗 高粱根煎湯溫服

其效便 桂心二錢半為末酒一盞半煎至半盞

飲五效驗 晚蚕沙一兩滾湯泡過濾淨取清水

服中心 吳茱萸一兩雞蛋七枚同煮熟去

白礬研沙

藥食胥即愈救急 白礬枯一兩白礬砂一錢五分

蜂蜜好酒

桂枝

五靈脂桂

礬

白皮石榴

皮

大芎

陳香圓

為新末薑汁打糊為丸黃豆大每服一九溫酒送

下元 蜜一小鐘酒一碗同煎滾調桂枝末一錢

溫服出汗元 五靈脂一錢桂礬二分為末溫酒

調下收 白皮石榴皮各三錢為末煉蜜丸黃豆

大每服三九艾醋湯下生 大芎一箇為末燒酒

服之一箇住一年西箇住二年集 陳香圓燒灰

急救

心氣痛

心胃痛

五十二



男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒

及受寒而起逆致終身俗言心氣痛者非也高良

良薑香附

薑酒洗七次香附子醋洗七次各焙研各記收之

病因寒得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末

二錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以米飲如生

石菖良薑  
乳香沒藥

薑汁一匙鹽一捻服之立上醫 石菖蒲十兩一

寸九節者佳寸良薑十兩廣東出者佳乳香一兩

沒藥五錢共為細末每服二錢重者三錢小兒一

生礬枯礬

錢清米湯調下心胃氣疼千金石換秘 生礬枯

礬等分為末麩糊丸如櫻桃大每服三九燒酒送

砂糖燒酒

下立上如神保 心胃刺痛黑砂糖半鐘燒酒熟

調服秘

一切冷氣搶心作痛發即欲死久患心腹痛不時發

蓬萊茂木  
香

者此可絕根蓬萊茂木二兩醋煮木香一兩煨為末

山奈丁香  
當歸甘草

每服半錢淡醋湯下家 心腹冷痛山奈丁香膏

歸甘草等分為末醋糊丸梧子大每服三十九酒

急收

心胃氣

冷氣心痛

五十三



乾薑官桂  
蒼朮半夏

下集 心胃冷氣刺痛不可忍乾薑炒官桂蒼朮

米泔浸炒半夏薑汁炒加薑生水煎服元保 心脾

高良薑五  
靈脂

冷痛高良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋

良薑吳  
茱萸胡  
椒

湯調下元保 一切冷氣心腹肚痛良薑一兩五錢

吳茱萸四兩炒胡椒一兩為末每服五分輕者三

燒酒飛鹽

分用飛過鹽三分溫酒調服元保 冷氣心痛燒酒

良薑

入飛鹽飲即上便 胃脘寒痛良薑末三分米湯

調下元保

梔子香附  
枳芎

鬱火所致心氣胃脘諸痛者肥梔子去殼十五枚薑

汁炒黑香附童便炒撫芎各一錢水煎三滾入薑

汁三四匙再煎一滾去渣入百草霜二匙調和服

之元保 心胃痛不可忍或心神恍惚梔子炒黃連

梔子黃連  
茯苓茯神

炒等分茯苓茯神減半水煎服元保 胃脘鬱

熱當心而痛皆因多食煎炒炙煨或嘔吐不已漸

成翻胃黃連六錢甘草一錢水煎溫服元保 平

熱心痛生麻油一合服之良元保 四磨湯治七情

生麻油

黃連甘草

急救

鬱火心痛

蛇虫心痛

五十四



人參烏菜  
沉香檀柳

鬱法上氣喘急降中兼升馮中帶補人參烏菜沉  
香檀柳各麻濃汁七分合煎細噉

鶴虱

蛇蟲心痛鶴虱十兩搗篩蜜丸梧子大空腹蜜湯下

四五十九忌酒肉便愈錄心痛如刺或口吐清

熟艾

水白熟艾一升水三升煮一升服吐虫出或取生

生艾

艾搗汁五更食香肉脯一片乃飲汁一升當下虫

鶴虱

出後肝淡醋和鶴虱末半匕服立瘥開蔓苡根

蔓苡根

一片切水七升煮三升服虫死盡出也梅葱莖

葱白鉛粉

白二寸鉛粉二錢搗丸服之即上葱酥通氣粉能

槐耳

殺虫驗經槐木耳燒存性為末水服棗許若不上

苦練根

飲熱水一升蛇虫立上備苦練根皮洗淨水煎

露一宿次早先以燒猪肉一塊嗅其氣然後服之

須上半月用其虫盡下保

老葱白麻油

卒心急痛牙關緊閉欲絕老葱白五莖去皮鬚搗汁

以匙送入咽中再灌麻油四兩但得下咽即甦少

頃虫積皆化黃水下永不復屢救人瑞竹心頭

急板

急心痛

絞腸沙痛

五十五



蒲葦

胡椒棗子

桑耳

急痛不能當我有仙人海上方篇葦醋煎通口噉

管教時刻便安康上海胡椒一箇棗子一枚去核

夾紙裏煨熟以生葦湯一鐘細嚼送下永不發

名蓋落陽陰心下急痛桑耳燒存性熱酒服二

錢集

絞腸沙痛苦陰沙則腹痛手足冷但身上有紅點以

油燈

燈草蘸油點火燂點上陽沙則腸痛手足暖以針

針刺

刺大手指近爪甲處一分半許先自西臂持下要

馬鬃根

蕎麥麩

童便

炒鹽

乾猪糞

砂仁

血令聚指頂刺出即安急馬鬃根葉細嚼嚥汁

五安壽蕎麥麩一撮炒水烹服便童便服立

上聖炒鹽一兩熱湯調灌入病人口中鹽氣一

到其痛即上急乾猪糞一塊如指頭大砂仁二

箇研末白湯調服神效勿以穢污輕之急神異

散治緊沙肚疼雄黃一錢射香一分為細末以一

二厘點眼角上即止兼治赤眼吹鼻立效急

肚腹疼痛五灵脂火煨白芍藥厚朴各三錢水一鐘煎

急救

絞腸沙痛

腹痛

五十六

五灵脂白

芍藥



露蜂房  
葱白

服立效救急 陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白

薤仁吳茱  
萸

五寸同研為末男左女右着手中握陰暖臥汗出即愈聖 脾元氣痛發歇不可忍薤仁一兩用吳

木瓜桑葉  
大棗

菜萸一兩同炒菜萸揀去取仁去皮尖研細葱白三莖煨熟酒浸溫服經 胛下絞痛木瓜三片桑

山豆根

葉七片大棗三枚水三升煮半升頓服愈食療 卒

椎黃白礬

患腹痛山豆根研半盞服入口即定急備 三仙

栝榔

丸治蟲痛椎黃白礬栝榔等分為末飯丸黍末大

白艾

食遠白水下五分乾痛有時為蟲保元 脾胃冷痛

葱白

白艾末沸湯服二錢簡易 腹皮麻痺不仁者多煮葱白食之即自愈危

急救

腹痛

五十七



腰脇痛

人參 白朮 當歸

腎虛腰痛人參白朮當歸各三分為末用不落水搥

魚鱉

猪左腎一枚竹刀剖去皮膜將藥摻入粗紙厚裏

水濕火煨熟至重服七次全愈世傳魚鱉炒成珠

杜仲 破紙 小苗人參

好酒淬入稍溫通口服神效保元杜仲薑酒炒三

錢破古紙炒五分小苗香鹽酒炒人參各三分為

末猪腎二枚切開入藥蒸熟食之或加青鹽濕紙

包煨空心酒下右妙效香附子五兩生薑二兩

香附生薑 青鹽

葱椒

腰痛

五十八



黑大豆

八角茴香  
杜仲木香

絲瓜根

橘核杜仲

茶醋

黑丑硫黃

取自然汁浸一宿炒黃為末入青鹽二錢擦牙數

次腰疼即止生卒然腰痛大豆六升水拚濕炒

熱布裏熨之冷即易秘思仙散八角茴香杜仲

各炒研三錢木香一錢水一鐘酒半鍾煎服治腰

痛如刺統心腰痛不止絲瓜根燒存性為末溫酒

服二錢神效甚捷雜橘核杜仲各二兩炒研末

鹽酒下二錢便簡腰痛雜轉煎茶五合投醋二合

頓服食黑丑半生半炒取頭末水和九梧子大

橘核

黃丹雄黃  
焰硝

芥子黑  
大豆

大黃生薑

硫黃末為衣空心鹽酒下五十九治一切腰痛如

神京東橘核去皮取仁炒研細末空心酒下二

錢世腰痛不能轉側黃丹一錢雄黃二錢焰硝

三錢為細末患人仰臥銀簪蘸點眼大角頭少許

一二次神效吉日修合忌鷄犬見元保腰脊脹痛

芥子末酒調貼之立效橘腰脇卒痛大豆炒二

升酒三升煮二升頓服之後時瘀血腰痛大黃半

兩生薑半兩同切如小豆大鍋內炒黃投水二碗

急救

腰痛

脇痛

五十九



牙疳  
雄黃  
射香

橙子核

小茴香  
枳角

白芥子

枳角  
甘草

煎好五更初頓服天明取下瘀血如鷄肝樣痛即

止保 閃挫腰痛不能屈伸牙疳一厘雄黃射香

各半厘共研極細少許點眼中令人扶患者周

圍行數次其疼如失未效再點再行神妙救 橙

子核炒研酒服三錢閃挫腰疼立愈攝

脇下刺痛小茴香一兩炒枳角五錢麩炒為末鹽酒

調服二錢神效珍袖 脇肋痛白芥子水研而敷服

亦可甚效救 脇痛如錐刺枳角麩炒黃色二兩

地膚子

炒鹽

五錢甘草炙七錢五分為末葱湯下二錢不拘時

眼救 脇下疼痛地膚子末酒服方寸七壽 天

行病後兩脇脹滿炒鹽慰之外

急救

脇痛

六十



風濕諸痛

風痺

脚氣

手足

蒼耳子子風濕攣痺一切風氣蒼耳子三兩炒為末以水一升

半煎七合去滓呷之醫

骨軟風疾腰膝疼痛行

何首烏牛膝

步不得遍身癢癢大何首烏牛膝各一斤好酒一

升浸七宿曝乾木臼杵末棗肉和丸梧子空火心

菴蓂即金剛根

酒下三五十九經驗

風毒脚軟痺滿上氣菴蓂洗

剉一斛以水三斛煮取九斗去滓漬麩如常釀酒

每日任意飲之時手足麻木不知痛癢霜降後

急救

風痺

六十一



桑葉  
凌霄花  
醃醋葱

桑葉煎湯頻洗急救 通身風癢凌霄花為末酒服

一錢傳正 白虎風毒三年醃醋五升煎五沸葱白

三升煎一沸瀉出布沾熱裹痛止乃已外 感風

濕成白虎歷節風症徧身裂肘疼痛足不能履也

木通 二三年百藥不效身體羸瘦木通二兩切細取長

流水煎汁服之後一時許周身發癢或發紅點勿

懼上下出汗即愈急救 鵝掌風水龍骨為末生桐

油調搽患處用青松枝燒烟薰一炷香未效再搽

水龍骨  
桐油

白木

丹薰救 中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難

忍者白木去蘆土炒一兩好酒煎溫服保 濕氣

蒼朮

作痛或腫或脹或黃或瀉蒼朮米泔浸刮去黑皮

切片水熬成膏白湯調服如暴發紅腫痛甚者以

臘糟敷之保 二妙湯治筋骨疼痛濕熱流注腰下

黃柏

作痛川黃柏鹽酒炒五錢蒼朮米泔浸炒一兩為

末每用一匙沸湯入薑汁調食前服痛甚者加葱

三根水煎空心熱服保 夏月患濕不能行走指

急救

風痺



薤根

金銀花酒  
糲

生薑葱汁  
生膠射香

生薑香  
油

獨活羌  
活松節

腫者九月間收薤根懸簷下煎湯洗之便濕氣  
流注痛不可忍金銀花帶葉和酒糲研爛用淨瓦  
罐放火中烘熟敷之立已元保 濕氣骨節疼痛生  
薑帶皮取汁一碗葱汁一碗半膠半斤慢火熬成  
膏入射香一錢布帛攤貼水出即愈元保 兩足痛  
如刀割不可忍者先用生薑切片蘸香油擦痛處  
隨用生薑火燒熟搗爛敷患處須更乾薑而痛上  
神效元保 歷節風痛獨活羌活松節等分用酒煮

廣木香

紫蘇子

車前草  
葱棗

甘遂  
蓖麻子  
樟腦

甘菊陳皮

急散

風痺

六十三

過每日空心飲一盃外 一切走注氣痛廣木香  
溫水磨濃汁入熱酒調服便元保 風寒濕痺四肢攣  
急脚腫不可踐地紫蘇子二兩杵碎水三升研取  
汁煮粳米二合作粥和葱椒薑豉之食聖 濕氣  
腰痛車前草連根七科葱白連鬚七科棗七枚煮  
酒一瓶常服終身不發使葉勿使葺莖便 萬靈  
膏治麻木疼痛甘遂二兩蓖麻子仁四兩樟腦一  
兩搗作餅貼之內飲甘草湯摘 膝風疼痛甘菊



花陳艾葉作護膝久則自愈扶 腰脚冷痺風痛

川烏

川烏三箇頭生去皮脬為散醋調塗帛上貼之須

更上痛聖 神授散治年久麻痺或痿節走氣疼

草烏豆腐

痛不仁不拘男兒草烏頭半斤去皮為末以袋一

箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆腐填滿壓乾

入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出曬乾為末每

服五分冷風濕氣心生薑湯下麻木不仁以葱白

草烏細辛  
防風

湯下心 遠行脚腫及膝風作痛草烏細辛防風

等分為末搽靴襪鞋底內及護膝中如草鞋以水

微潤搽藥用之可行千里能除風濕健步扶 筋

刺薔薇  
五加皮木  
木瓜

骨疼痛刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓

二錢酒二盞煎一盞日服一次雜 筋骨寧痛王

王仙子

瓜子炒開口為末酒服一錢日二服集 膏腰疼

生芎根

痛生芎根嚼之噓汁取效乃止味 皮裏作痛不

何首烏

問何處何首烏為末薑汁調成膏塗之帛裏熱鞋

小芥子

底熨之驗經 走注風毒作痛用小芥子末和鷄子

急救

風痺



馬齒莧五  
加皮蒼木

白塗之聖 筋骨疼痛不拘風濕氣楊梅瘡及女

人月家病先用此藥上灸然後調理乾馬齒莧一

斤濕馬齒莧二斤五加皮半斤蒼木四兩春碎以

水煎湯洗澡急用葱薑搗沖爛熱湯三碗服之暖

處取汗立時痛上上海 筋骨疼痛騾子剝下蹄甲

騾蹄甲

八罐內煨紅存性為末麩糊為丸梧子大每服三

錢黃酒下不拘時服一二次即愈不發急 寒濕

鳳仙草  
蒼耳草

氣痛鳳仙花草蒼耳草等分連根帶葉搗爛煎湯

洗隨愈救急

救急

老人風濕久痺筋攣骨痛服此壯腎

牛蒡根  
黃大豆

潤皮毛益氣力牛蒡根一升切生地黃一升切大

豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任意空

肥皂五倍  
皮硝

心溫服二三盞日二服集

集

鶴膝風肥皂二箇去

子五倍子去灰皮硝各一兩共研末用頭酒糟四

兩砂糖一兩薑汁半茶鍾搗和敷膝上乾加燒酒

潤十日即愈救急

救急

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連

牛蒡根

手足赤腫觸着痛者牛蒡根洗淨研爛酒煎成膏

急救

風痺



大豆

王胡索  
歸辣桂

牛蒡根  
枸杞子  
膝地黃

漏攤貼腫處仍以熱酒服一二匙腫消痛減門  
走氣作痛醞醋拌麩皮炒熟袋盛熨之編註 頭項  
強硬不得顧視大豆一升蒸變色囊裏枚之針  
筋絡拘挛血脉凝滯肢節疼痛行步艱難立胡索  
炒當歸辣桂等分為末酒服二錢名舒筋散元保  
一切風疾十年二十年者牛蒡根一升生地黃枸  
杞子牛膝各三升用袋盛藥浸無灰酒三十升任  
意飲之外

白礬

薑汁牛膝  
乳香沒藥

木瓜

鹽

白芷芥子

白芍甘草

急救

脚氣

六十六

脚氣冲心白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈元保  
脚氣腫痛及鶴膝風不能動履生薑汁一碗入牛  
膠一兩熬成膏加乳香沒藥末各一錢攪勻絹帛  
攤貼腫消痛上元保 脚氣腫痛木瓜為末好酒調  
敷患處立上元保 脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至  
足甲淹少時以熱湯泡洗急救 脚氣腫痛白芷芥  
子等分為末薑汁調塗要摘 脚氣腫痛白芍藥六  
兩甘草一兩為末白湯點服元保 一切冷疼風濕



紫蘇子高  
良薑橘  
皮

胡盧巴破  
木介

蓖麻子蘇  
合油  
蓖麻葉

附子

脚氣紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸梧子大每服  
十九空心酒下性藥寒濕脚氣腿膝疼痛行步無

力胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末

以木瓜切頂去瓢安藥在內令滿用頂合佳簽定

蒸爛搗丸梧子大空心溫酒下七十九楊氏脚

氣作痛蓖麻子七粒去殼研爛同蘇合油塗足心

即止外脚氣風腫不仁蓖麻葉蒸搗裏之日二

三易即消蘇脚氣腿腫久不瘡者附子黑一箇

生烏草

生去皮臍為散生薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫  
消烏草簡脚氣製痛或膝間有核生草烏為末

以薑汁或酒糟同搗貼之永脚氣入腹脹同喘

威靈仙

急威靈仙末每服二錢酒下痛減一分則藥亦減

金銀花

一分簡脚氣作痛筋骨引疼金銀花為末每服

大豆

二錢熱酒調下簡脚氣冲心坎悶不識人以大

豆一升水三升濃煮汁服未定再服廣脚氣走

白蘿蔔

痛蘿蔔煎湯洗仍以蘿蔔晒乾為末鋪襪內即

急救

脚氣

手足痛

六十七



皂角赤小豆

愈聖

脚氣腫痛皂角赤小豆為末酒醋調貼腫

牛皮膠

處即消類永

寒濕脚氣牛皮膠一塊細切麩炒成

廣膠薑

葱糟油

珠研末每服一錢酒下立止萬氏

脚氣神應膏廣

膠三兩薑葱各半斤搗汁另將好陳酒糟取油一

二盞或用米醋一碗和陳糟椿細瀘取汁共熬

成膏布攤貼之立刻止痛消腫救急

上坑

天行餘毒手足腫痛欲斷作坑深三尺燒熱灌酒着

醬清蜜

履坐坑上以衣擁之勿令洩氣要類

手指掣痛醬

知母

清和蜜溫熱浸之愈乃上金 嵌甲腫痛知母燒

苦參

存性研搽之能多 毒熱足痛作腫欲脫苦參煎酒

陳皮

漬之驗集

嵌甲作痛不能行走濃煎陳皮湯浸良

虎骨末

久甲肉自離輕手煎去虎骨敷之未妙要集

行路

草鞋

足腫被石墊傷草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒

紅置鞋磚上將足踏之熱氣入內即消救急

手指

忽腫痛如割烏梅仁十枚搗爛苦酒和以痛指浸

酒內須臾即瘥救急

急救

手足痛

烏梅仁醋



傷寒

神白散又名聖僧散治時行一切傷寒不同陰陽輕

白芷甘草  
生薑葱白

大棗豆豉

重老少男女孕婦皆可服之煎法一切風邪白芷  
一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五  
十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘日未  
得汗者皆可服之比藥可卜人之好惡也如煎得  
黑色或誤打翻即難愈如煎得黃色無不愈者煎  
時要至誠忌婦人雞犬見

衛生家寶

傷寒頭痛如破

急救

傷寒

六十九



蓮鬚葱  
白生薑  
橘皮

者連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服法人橘皮

湯治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷者用

橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呬之即

上仲傷寒發狂草龍膽為末入鷄子清白蜜化

涼水服二錢薑傷寒刻逆服藥無效雄黃三錢

酒一盞煎七分乘熱嗅其即氣上法傷寒舌出

不收水片少許摻舌上收進如忽然脹出者以椎

鷄冠血盛酒鍾將舌浸就嚥下即縮急陰毒傷

水片椎雞  
冠血

草龍胆鷄  
子清白蜜  
雄黃

寒四肢逆冷吳茱萸一升酒拌濕絹袋二箇包蒸

極熱互慰旦心候氣透痛即上累效聖腹痛厥

逆芥菜子研末水調貼臍上生生鷄子放臍服

內一時一換四五換即愈矣陰氣盡收子內急救

危篤者用黑豆炒乾投酒熟飲或灌之吐則復餘

汗出為度居家傷寒無汗代赭石乾薑等分為

末熟醋調塗兩手心合掌握定夾於大腿內側溫

覆汗出乃愈時疾頭痛發熱者以連根葱白

急救 傷寒

七



馬蹄香

二十根和米煮粥入醋少許熟食取汗即解魚鱗  
數種傷寒初起一二日不能分別者用上法取汗

海生

傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香為末

每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盃催之出汗

即愈名香汗散

要攝

苦參

熱毒狂邪不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每

服十九薄荷湯下或為末二錢水煎服千金心熱

木通生地

尿赤面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生長黃

炙甘草等分入竹葉七分水煎服錢氏

紫蘇葉  
豆豉

勞復食復欲死者紫蘇葉煮汁二升飲之亦可入生

蘆根

薑豆豉同煮飲後時並以蘆根搗濃汁飲後時舌

薄荷白蜜

胎語塞薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之集傷寒

葱白

勞復因交接者腹痛卵腫用葱白搗爛苦酒一盞

和服千金

白芷荆芥風寒流涕香白芷一兩荆芥穗一錢為末臘茶點服

脂麻 二錢一百偶感風寒脂麻炒焦乘熱搗酒飲之暖

急救

傷寒

風寒

七十一



臥取微汗出良集

天行瘧癘

牛蒡根  
桑葉

天行時疾生牛蒡根搗汁五合空腹分為二服服訖

取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓服取汗

木香

無葉取枝食忌天行發斑赤黑色木香一兩水二

芭蕉根

升煮一升服外治天行熱狂芭蕉根搗汁飲華

藍澱

時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新汲水一盞服

大黑豆  
草

聖疫癘發腫大黑豆二合炒熟炙甘草一錢水

二盞煎汁時服之立效急救疫癘不染五月五

急救

天行 瘧癘



蒼耳葉

日午時多采蒼耳嫩葉陰乾收之臨時為末冷水服二錢或水煎舉家皆服能辟邪惡針

五葉莓

項下熱腫俗名蝦蟆瘟五葉莓藤搗敷之要纂

生地薄荷射者

熱瘡昏迷煩悶飲水不止至危者一服見效生飲黃

根生薄荷葉等分搗爛自然汁取入麝香少許并

華水調下覺心下頓涼勿再服普濟山嵐瘴氣生

大蒜

熟大蒜各七斤其食之少頃腹鳴或吐血或大便

芎藭根

泄即愈生撰辟瘴不染生芎藭根搗汁一小盞服去

桃仁吳茱萸青鹽

熱毒氣也聖惠預辟瘴癘桃仁一斤吳茱萸青鹽

各四兩同炒熟以新鮮密封一七取出揀去萸鹽

將桃仁去皮尖每嚼一二十枚山居尤宜聖惠

急救

瘴癘



中暑

滑石甘草 益元散能解中暑脹悶嘔吐煩熱白滑石水飛過六

兩粉甘草一兩為末每服三錢燈心湯放冷調下

或蜜小許溫水調實熱用新汲水解利用葱豉湯

小青葉 直 下指 中暑發昏小青葉并水浸去泥控乾入沙

皂莢甘草 糖搗汁急灌之 毒 不省以皂莢一兩燒存性甘

草一兩微炒為末溫水調一錢灌之 瀝 救生散

胡麻 治中暑毒死用新胡麻一升微炒令黑攤冷為末

急救

中暑

七十四



生於黃  
地衣草

新汲水調服三錢或九彈子大水下驗經 熱暈昏

沉生地黃汁一盞服之聖 地衣草研末新汲水

調服時 夏月人在途中熱死不可用涼水灌及

一切冷物得冷即無救也宜移陰處急取道上熱

土擁臍作窩令人溺窩內暖氣透則甦又取熟土

同大蒜研爛水調去渣灌之急 中暑中風中氣

中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童便

服立可解散附

道正熱生  
入溺  
熱土大蒜

薑汁童便

### 瘡疾

常山知母  
貝母草果

驅瘡湯奇效不能盡述切勿加減萬一無吐者常山

酒煮晒乾知母貝母草果各一錢半水一鐘半煎

半熟五更熱服渣以酒浸發前服養生  
主論 瞻仰丸

常山草果

治一切瘡常山四兩炒存性草果二兩炒存性為

末薄糊九梧子大每臥時冷酒服五十九五更再

常山紅棗

眼忌鵝羊熟物和 常山二兩切薄片圓大如紅

棗二十枚入砂鍋內水二碗煮棗黑為度取棗去

急救

瘡疾



川芎當歸  
柴胡貝母

皮清晨臨來之日空心用白滾湯送下二十枚徐  
徐服之急則恐疾涌忌鷄犬鵝茶葱小兒減半或  
五六枚瘡母二次即消餘者當日即上百發百中  
急 救 川芎當歸柴胡貝母各一兩二錢共為末每  
服二錢一日減半次日漸減三日全愈屢驗救

枯礬

枯礬為末醋煮麩糊丸如芡實大每服一九東南  
桃心七箇煎湯下霍亂薑湯下紅痢甘草湯下白  
痢薑湯下忌葷腥油膩煎炒之物救 諸瘡寒熱

赤脚馬圍

赤脚馬圍搗汁入水小許發日早服或入少糖亦

蒼耳子

可錄 久瘡不瘡蒼耳子或根莖亦可焙研末酒

常山栝柳  
丁香烏梅

糊丸梧子大每酒服三十九日二服生者搗汁服  
集 常山一錢半栝柳一錢丁香五分烏梅一枚

大麻葉

酒一盞浸一宿五更飲之一服便止永不再發如  
神醫 大麻葉不問祭枯鍋內文武火慢炒香搗

龜版

起以紙蓋之令汗出盡為末臨發前用茶或酒下  
移病人原睡處其狀如醉醒即愈急 救 龜版燒存

急救

瘡疾



性研末酒服方寸匕上海勞瘡積久不上者長牛

牛膝

膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服

當歸

未發前一服臨發時一服外溫瘡不上當歸一

燒酒白糖

而水煎日一服聖濟絕瘡以燒酒內加白糖飲之

旱蓮草

即上如神急繫臂絕瘡旱蓮草搥爛男左女右

置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂

梔仁獨蒜

之天灸其瘡即上甚效資生梔仁半斤放內関穴

上将獨蒜搥爛或可黃丹拌勻罨之縛住男左女

馬遮莧

右即上用此治人屢效便簡馬遮莧搥扎手寸口

男左女右急

石胡荽

脾寒瘡石胡荽一把杵汁半盞入酒半罈和服甚

效集脾寒諸瘡不拘老少孕婦只西服便上真

橘紅青州棗

橘皮去白切生薑自然汁浸過一指銀器內重湯

煮乾焙研末每服三錢用隔年青州棗十箇水一

盞煎半盞發前服以棗下之通



嘔吐虛寒 胃熱 飢逆 吞酸

生薑食鹽

嘔吐不已急惡心生薑一大塊直切勿令折斷每層

摻鹽在內水濕苧麻密纏外用紙包水濕火煨令熱去麻紙取薑搗爛和稀米飲服之救急 嘔噦不

蘆根

上厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升必效

白豆蔻

用童便煮服不過三升愈後時 忽然惡心多噦白

大麻仁

豆蔻仁最妙後時 嘔逆不上大麻仁杵熬水研取

火酒井水

汁加少鹽服立效外 嘔逆不上真火酒一杯新

急救

嘔吐

虛寒

七十八



汲井水一盃和服甚妙開 聞藥即嘔百方不下

伏龍肝水丸塞鼻孔服藥不再吐元保

細辛子香 虛寒嘔噦飲食不下細辛去葉五錢丁香二錢五分

為末柿蒂湯下一錢聖 胃冷惡心食即欲吐白

豆蔻仁三枚搗細好酒一盞微溫調服併飲數服

吳茱萸生薑 人參大棗 佳急 冷涎作吐陰疰乾嘔吳茱萸湯泡炒生薑

各一兩五錢人參三分大棗五箇用水煎食前服

之元保

半夏乾薑 竹茹甘草 胃熱嘔吐手足心皆熱者是半夏薑汁浸乾葛青竹

茹生甘草加薑棗煎服或加前胡元保 熱嘔不上

山梔朴硝 梔子炒黑朴硝等分為末滾水服二三匙元保 胃

黃連石膏 熱嘔吐黃連薑炒一錢石膏火煨二錢為末滾水

下元保

荔枝 飢逆不止荔枝七箇連皮核燒存性為末白湯調下

柿蒂 五止要 柿蒂七枚燒存性為末用黃酒調服立

生薑沙糖 上元保 生薑搗汁沙糖等分調勻重湯頓熱徐服

急救

嘔吐

飢逆

吞酸

七十九



硫黃乳香

立效世濟

服藥無效用硫黃乳香等分為末酒煎

雄黃

急令患人嗅氣

元保

雄黃二錢酒一盞煎至七分

急令嗅熱氣即上

元保

病後飢逆不上聲聞隣家

刀豆子

刀豆子燒存性白湯調服二錢即止

普濟

蘄艾

吞酸口吐清水乾蘄艾煎湯啜之

救急

醋氣上攻心

吳茱萸

如齧破吳茱萸一合水一鐘煎七分頓服

元保

食

乾薑吳茱萸

後吐酸水乾薑吳茱萸各二兩為末酒調服方寸

蘿蔔

七日二服胃冷者立效

元保

食物作酸蘿蔔生嚼

生菜

數片或嚼生菜亦佳胃熱者效

集解

食物醋心胡

胡椒

槌嚼爛以生薑湯下立上

傳信

急效

吞酸

八十



霍亂 乾霍亂 吐瀉 轉筋

鹽童便

上不得吐下不得利冷汗欲絕名乾霍亂鹽一大抄

炒令黃入童便一碗溫服少頃吐下即愈保元 干

千年石末

年石灰沙糖水調服二錢或淡醋湯亦可名落蓋

紫蘇

湯搗 脹滿未得吐下用生紫蘇搗汁飲之或乾

蘆根麥冬

蘇煮汁亦可後時 煩悶蘆根三錢麥門冬一錢水

蘆根生薑

煎服金針 脹痛蘆根一升生薑一升橘皮五兩水

橘皮

蘆葉

八升煎三分服聖 煩渴腹脹蘆葉一握水煎

急救

霍亂

吐瀉

八十一



厚朴

服<sup>總</sup> 腹痛厚用朴薑汁炙研末新汲水服二錢

高良薑

如神<sup>聖</sup> 高良薑一兩剉水三大盞煎二盞半去

草豆蔻

滓入粳米一合煮粥食使上<sup>聖</sup> 煩渴草豆蔻黃

蓮

連各一錢半烏豆五十粒生薑三片水煎服<sup>聖</sup>

高良薑

冰壺湯治霍亂嘔甚不上高良薑生剉二錢大棗

一枚水煎冷服立定<sup>聖</sup> 乾霍亂死而心頭微熱

鹽艾炙

者以鹽填脘內用艾炙不計數以醒為度<sup>總</sup>

藿香陳皮

霍亂吐瀉藿香葉陳皮各五錢水二盞煎一盞溫服

菜豆粉白

垂死者服之回生<sup>一百</sup> 菜豆粉白糖各二兩新汲

糖

水調服即愈<sup>生</sup> 韭菜搗汁一盞重陽煮熱服

韭菜

藕汁

之立上<sup>聖</sup> 生藕搗汁服<sup>聖</sup> 鹽醋煎服甚良

鹽醋

枯白礬

宜如 枯白礬末一錢百沸湯調下<sup>華</sup> 山豆根末

樟樹皮

橘皮湯下三錢<sup>急</sup> 樟樹皮一把水煎溫服立上

艾

效<sup>世</sup> 艾一把水二升煮一升頓服<sup>秘</sup> 肉豆蔻

肉豆蔻

為末薑湯服一錢<sup>普</sup> 屋下倒挂塵滾湯澄清服

百沸湯并

即上<sup>急</sup> 吐瀉腸痛服藥即吐用百沸湯半碗并

急救

霍亂

八十二



炒鹽

泉水半碗合服即安名陰陽散救急 炒熟鹽布包

熨心服令氣透皮以一寸熨其背救急 煨湯飲絕

粳米竹瀝

用粳米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合

頓服治普 伏暑霍亂或吐或泄或瘧小便赤煩渴

滑石著香  
丁香

玉液散用桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢

為末米湯服二錢治普

皂角

霍亂轉筋皂角末吹小豆許入鼻中得嚏即愈保元

白扁豆  
大蒜

白扁豆為末醋和服治普 乾濕霍亂轉筋用大蒜

手法

搥塗足心立愈永 轉筋不住男子以手搥其陰

女子以手牽乳近兩邊即止針 轉筋入腹殺人

小蒜鹽炙

以小蒜鹽各一兩搥散胷中灸七壯立止聖 飲

生薑酒

死者生薑三兩搥酒一升煮三兩沸服仍以薑搥

釜底墨

貼痛處治外 釜底墨酒服一錢時 轉筋飲冷吳

吳茱萸木  
瓜食鹽

茱萸木瓜食鹽各五錢同炒焦石沸湯煎之隨病

硃砂黃礬

人意冷熱任服保元 轉筋身冷心下微溫者硃砂

研二兩蟬三兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿

急救

霍亂

八十三



滾湯白木  
鹽炙

令烟洩魚牀下着火令腹微暖良久當汗出而甦  
矣外吐瀉腹痛轉筋滾湯半盞白水半盞和勻  
入鹽少許頓服吐瀉即止痛即定又將鹽納脐中  
灰之死亦可活救急吐利後轉筋生搗白扁豆葉  
一把入少酢絞汁服立瘥

白扁豆葉

頭風

偏正頭風白芷防風等分為末煉蜜丸梧子大每嚼

白芷防風  
旱蓮草

三丸茶清下善旱蓮草汁滴鼻中聖生蘿蔔

生蘿蔔

汁一規設仰臥隨左右注鼻中神效王荆公病此  
道人傳方移時遂愈以之治人不可勝數宜如香

白芷川芎  
甘草烏頭

白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半  
熟各一兩為末每服一錢細茶薄荷湯調下百藥

芝麻茶葉  
槐花

不治一服便瘥天下第一方也試效芝麻茶葉槐

急救

頭風

八十四



穀精草

花各五錢水煎服救急 穀精草一兩為末以白麩

黃蠟

糊調攤紙上貼痛處乾換集 黃蠟三兩溶花以

白紙闊二寸長五寸在蠟上拖勻真蘄艾揉軟薄

攤蠟上箸捲為筒挿耳內一頭火燃烟氣透腦其

痛即止不發左疼挿右耳右疼挿左耳至重不過

射香皂角

二次救急 痛久不除晴明時將發分開用麝香五

分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒熟鹽於

上熨之冷則另易數次更不再發便 至靈散雄

雄黃細辛

黃細辛等分為末每以一字吹鼻左痛吹右右痛

硝石博

吹左博 硝石末吹鼻即愈炮炙論方 片黃芩酒浸

當歸

透晒乾為末每服一錢茶酒任下秘藏 當歸二兩

高良薑

酒一升煮取六合飲之日再服外 高良薑生研

華菱

頻嚙鼻內善 華菱為末口含溫水隨左右痛以

蘄艾

左右鼻吸一字有效經 蘄艾揉為丸時勤嗅之

穀精草銅

黃水出為度雜 穀精草末銅綠各一錢硝石半

南星川芎

分隨左右嚙鼻聖 南星川芎等分為末入連鬚

急救

頭風

八十五



黑豆

葱搗成餅貼太陽穴帕包救 黑豆枕黑豆一升

香圓以香  
桐鴨蛋

炒熟布包枕痛處即止未愈再炒枕之救 香圓

不拘新書一枚切用鴨蛋一箇煮熟切作兩半入

香圓內每邊包在太陽上得熱即愈救 截竹筒

鹽

圈高一指將鹽填入筒內以艾火灸七壯加荷葉

火硝青黛  
川芎薄荷

錢反炒救 青火金針火硝一兩青黛川芎薄荷

附子菜豆

各一錢為末口含冷水用此吹鼻救 附子一枚

生去皮脬菜豆一合同入銚內煮豆熟為度去附

食豆豆瘡每附可煮五次後為末服修真 藁本

藁本細辛  
白芷辛夷

細辛各五分白芷一錢辛夷八分為末分作四

劑用紙條四捲實將火點以烟熏鼻吸入即愈屢

試有效世

半夏百辛

八般頭風半夏末入百草霜少許作紙撚燒烟熏鼻

魚膠

吸入口含清水有涎吐出再含生 魚膠燒存性

玄精石羊

為末臨臥葱酒服二錢針 頭風腦痛立精石末

入羊膽中陰乾水調一字吹鼻中立上針 腦風

總救

頭風

八十六



遠志

痛不可忍遠志末噀鼻明言 風氣頭痛不可忍者

乳香 蓖麻仁

乳香蓖麻子等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗或用蓖麻油紙煎花貼之亦效德生堂方 蓖

蓖麻油

麻仁五錢棗肉十五枚搗塗紙上捲筒挿入鼻中

甘菊石膏 川芎

下清涕風氣腫即上聖惠 風熱頭痛甘菊花石膏

川芎茶葉

川芎各三錢為末茶調下一錢五分便 川芎一錢茶葉二錢水一鍾煎五分食前熱服風熱痛自

荆芥石膏

除便 風熱痛者荆芥石膏等分為末茶調服二

芭蕉根

錢類承 芭蕉根搗爛塗風熱痛效後 馬蹄决明

馬蹄决明

山豆根

子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之風熱痛一夜即愈牙 山豆根末油塗兩太陽穴能止風熱頭

黃芩白芷

痛鼻 眉眶作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷等分

川芎梔子

為末茶下二錢家 風熱上攻頭目眩運川芎梔

子各一兩為末茶清調下三錢胸中不利以水煎

眼元 氣厥頭痛婦人氣盛頭痛及產後頭痛川

川芎烏藥

芎窮天台烏藥等分為末每服二錢茶葱調下御

急救

頭風

八十七



藥院方加白朮水煎服集 一品丸治氣熱上攻

大香附

頭目昏眩及偏正頭痛大香附子去皮水煮一時

搗晒焙研為末煉蜜丸彈子大每服一九水一盞

牛蒡子旋覆花

煎八分服女人醋湯煎之奇 痰厥頭痛牛蒡子

炒旋覆花等分末臘茶清服一錢日二服聖 風

苦壺盧

痰頭痛苦壺盧膜取汁以葦管灌入鼻中其氣上

衝腦門須臾惡涎流下其病立愈除根勿以昏運

苦壺盧

為超乾者浸水亦效其子為末吹人亦效年久頭

杏仁

風皆愈普 風虛頭痛欲破者杏仁去皮尖晒乾

研末加水再研濾汁煎如麻腐狀和羹粥食七日

後出大汗諸風漸減此真神妙秘法慎風冷猪雞

魚蒜醋針 都梁丸治頭風眩運女人胎前產後

白芷

傷風頭痛血氣頭痛香白芷洗晒為末煉蜜丸彈

子大母嚼一九茶清或荆芥湯送下百 頭痛連

睛鼠粘子石膏等分為末以茶清調服摘 頭風

牛蒡無反酒鹽

掣痛不可禁牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一

急救

頭風

八十八



蒼耳

升鹽花一匙慢火煎膏以摩痛處極力令熱風毒  
自散冬月用根中諸風頭運蒼耳葉晒乾為末

每服一錢酒調下日三服若吐則以密九梧子大

每服二十九十日全愈經一切血勞風氣頭痛

荆芥穗

及頭旋日眩眼疾荆芥穗末酒服三錢龍頭風

蒼朮

畏冷蒼朮粉二升水調作二餅更互合頭上微汗

蘿蔔子生

薑射石

即愈怪年久頭風蘿蔔子生薑等分搗取汁入

朴硝

麝香少許搗入鼻中立上普時氣頭痛朴硝末

香附

二兩生油調塗頂上聖女人頭痛香附子末茶

蒼耳子

服三錢日三五服經婦人血風切腦頭旋悶絕

忽死倒地不知人事者蒼耳草嫩心陰乾為末酒

服一大錢其功甚速此物善通頂門連胸門斗通

藜蘆黃連

頂散治諸風頭痛藜蘆五錢黃連三分為末噙入

辛夷枇杷

鼻內聖頭風鼻流清涕辛夷仁枇杷花各一兩

華薜旋覆

出細末醋酒調服或搗服亦可世華薜旋覆花

虎頭骨酥炙等分為散頭痛欲發汗時以溫酒服

急救

頭風

八十九



地房子生

董

葶藶子

葱葉

二錢暖臥取汁立瘥

聖消

雷頭風腫不省人事地

膚子同生董研爛熱酒冲服取汗即愈

聖消

頭風

疼痛葶藶子為末以熱湯淋取汁沐頭三四度即

愈

時後

頭目重閉疼痛葱葉挿入鼻內二三寸并

耳內氣通即便清爽

時珍

痢疾

赤白瀉痢

暴瀉冷痢

血痢熱痢

噤口

苦參木香  
甘草

痢疾神效苦參六分木香四分二味為末用甘草煎

膏為丸每丸乾重一錢為度紅痢甘草湯白痢淡

薑湯紅白痢小米湯或黃米湯噤口痢砂仁蓮肉

湯水瀉猪苓澤瀉湯下

徐南岡傳

赤白痢疾水瀉大

大黃麥芽  
車前草

黃五斤酒煮麥芽粉五升為末車前草搗汁丸每

服二三十丸菘豆大白湯下

急救

痢疾腹痛不問

冷熱老生薑細茶各三錢熱痢留薑皮冷痢去皮

生薑細茶

急救

赤白痢

九十



益母草  
鹽梅

新汲水煎服救急 二靈散治白雜痢疾困重者益

母草日乾陳鹽梅燒存性等分為末每服三錢白

痢乾薑湯赤痢甘草湯下生衛 陰陽交帶不問赤

劉寄奴烏梅

白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑

胡荽子

宜如 胡荽子一合炒搗末每服二錢赤痢砂糖水

赤石脂

白痢薑湯瀉血白湯下普 赤石脂末米飲服一

蒼耳草

錢普 蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去渣入

馬鞭草  
陳茶

蜜用武火熬成膏每服一二匙白湯下括 馬鞭

金剛根蠟  
茶白梅

草五錢陳茶一撮水煎服神效括要 金剛根蠟茶

等分為末白梅切搗丸荻子大每服五七丸小兒

鷄冠花

三九白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下簡易 鷄冠花

山豆根

煎酒服赤用紅白用白集 山豆根末蜜丸梧子

薤白

大每服二十九空服白湯下三服自止急備 薤白

荷葉

一握同米煮粥日食醫會 荷葉燒研每服二錢紅

地榆

痢蜜湯白痢砂糖湯下救急 骨立者地榆一斤水

三升煮一升半去滓再煎如稠餒絞濾空腹服三

急救

赤白痢

九十一



川烏

合一再服兼治小兒疳痢<sub>上海</sub> 獨聖丸用川烏頭

一箇灰火燒烟盡取出地上盞蓋良久研末酒化

蠟丸如大麻子大每服三九赤痢黃連甘草黑豆

煎湯放冷吞下並空心服之忌熱物白痢甘草黑

豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞下治久痢赤白

效驗<sub>經</sub> 白龍丹白礬飛過為末好醋打飛羅麩糊

為丸梧子大每服二二十九赤痢甘草湯白痢薑

湯泄瀉米湯瘡疾寒熱用東南桃心七箇煎湯下

白礬

訶子

<sub>生</sub> 嬰粟子炒嬰粟殼炙等分為末煉蜜丸梧子

大每服三十九米飲下<sub>南指</sub> 訶子十二箇六生六

煨去核煨為末赤痢生甘草湯白痢炙甘草湯下

不過再服<sub>急</sub>

車前子

暴瀉不止小便不通車前子炒為末米飲調下二錢

其根葉亦可搗汁飲此藥利水道而不動元氣故

妙<sub>急</sub> 陳艾一把生薑一塊水煎熱服<sub>生</sub> 麩米

丸治飲食所傷暑月暴瀉能壯脾溫胃用神麩炒

陳艾生薑

神麩蒼朮

急救

赤白痢

九十二



苧麻葉

蒼朮米泔浸一夜焙等分為末糊丸梧子大每服  
三五十九米飲下和劑驟然水瀉日夜不止欲死  
不拘男婦用五月五日采苧麻葉陰乾為末每服  
二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只喫冷物小  
兒半錢兼治冷痢白痢命護氣虛暴瀉日夜二三  
十行腹痛不止夏月路行備急最妙朝真丹用硫  
黃二兩枯礬五錢研細水浸蒸餅丸梧子大硃砂  
為衣每服十五丸至二十九溫水下或鹽湯注下

硫黃枯礬  
硃砂

益智仁

秘寶腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用

益智子仁二兩濃煎飲之立愈得效風寒泄瀉火

火枚草即  
碎蒼草

枚丸治風氣行於腸胃泄瀉火枚草為末醋糊丸  
梧子大每服三十九白湯下聖濟寒濕泄瀉小便

燒酒

清者以頭燒酒飲之即止急救脾瀉久有熱者黃

黃連生薑

連一兩生薑四兩俱切碎慢火同炒待薑枯去之  
取連為細末空心米湯服二錢急救久有寒者肉

肉豆蔻乳  
香

豆蔻一箇剉一孔入乳香少許麩裹煨去麩為末

急救

暴瀉

九十三



枯白礬訶  
黎勒

作一服空心陳米湯下急救 老人泄瀉不上枯白

白豆蔻乳  
香

礬一兩訶黎勒煨七錢半為末米飲服二錢取愈

骨碎補猪  
腎

聖 老人虛瀉肉豆蔻三錢麩裏煨熟去麩研乳

白豆蔻木  
香

香一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九

白木茯苓  
糯米連切

米飲下瑞竹堂方 腎虛久瀉及耳鳴牙疼骨碎補研

山藥蒼朮

末猪腎夾煨空心食之時珍 久瀉不上肉豆蔻煨

川椒蒼朮

一兩木香二錢半為末棗肉丸米飲服四五十九

一百 久瀉滑腸白木炒白茯苓各一兩糯米炒二

命保

乾薑

兩為末棗肉拌食或丸服之簡便 濕熱虛泄乾山

大麻子葉

藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜經 餐

地膚子地  
榆黃芩

瀉不化及久痢川椒一兩炒蒼朮二兩土炒研末

急救

血痢

九十四

豆

醋糊丸梧子大每米飲服五十九患痢久者加桂

急救

血痢

九十四

下神妙驗 以大麻子水研濾汁煮菜豆食之極

效粥食亦可效必 地膚子五兩地榆黃芩各一兩



苦參 為末每服方寸匕溫水調下聖 苦參炒焦為末

地錦草 水九梧子大每服十五丸米飲下孫 地錦草晒

蛇含石 研每服二錢空心米飲下乾坤 蛇含石二枚火

白鹽 煨草萍研末每服三錢米飲下普 白鹽紙包燒

薄荷葉 研調粥喫三四次即上意 薄荷葉煎湯常服炒

貫衆 普 貫衆五錢煎酒服效集 血痢及瀉血不上

木賊草 以木賊草五錢水煎溫服一日一服聖 便痢膿

烏梅 血及酒痢久痢不上烏梅一兩去核燒過為末每

服二錢或醋煮米糊九梧子大空心服二十九米

飲下立上聖 血痢血崩楮樹皮荆芥等分為末

冷醋調服一錢血崩以煎七神效服不可具述也

得 熱毒血痢忍冬藤濃煎飲聖

噤口痢糯穀一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒

為末每服一匙白湯下三服即上經 上好沙糖

四兩生薑四兩烏梅十五箇三味共搗以滾湯調

勻服即愈兼治番胃尤妙總 烏梅一錢細茶三

急救

噤口痢

九十五



蒼麥麩

錢為末米飲調服救急 蒼麥麩每服二錢砂糖水

水龍仁

調下仙坦 水龍仁六箇研泥分作二分用麩燒餅

一箇切作兩半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人脘上一時再換半箇熱餅其痢即止遂

思飲食經

黃連木香

痢症泄瀉香連九黃連吳茱萸炒過四兩水香麩煨

一兩粟米飲九菜豆大米飲下救急 一切瀉痢白

扁豆正開花者擇淨勿洗以滾湯淪過和

小豬脊

牛膝

脂肉一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以淪花

汁和麩包作小餛飩炙熟食之療食 痢下腸蠱凡

痢應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝二兩搗

碎以酒一升漬經一宿每飲一兩杯日三服後肘

黃連豬腸

諸痢脾泄臟毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥

豬大腸內紮定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研

末搗腸和九梧子大每服百丸米湯下極效直指

暴作瀉痢百草霜末米飲調下二錢金針 久痢久

百草霜

急救

瀉痢

九十六



石榴皮

瀉陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲下患

艾葉陳皮

二三年或二三月百方不效者服之便止不可輕

忽也普諸痢久下艾葉陳皮等分煎湯服亦可

小蓊

為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下二十九聖久

痢五色大蓊小蓊一箇煨存性出火毒為末作一

酸石榴

服溫酒下本黑神散治腸滑久痢及久瀉不止

用酸石榴一箇煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸

當歸

石榴一塊煎湯服一錢神效無比普勝金丸治

久痢不上當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不

煎根石榴皮

用為末蜜丸梧子大每服三十九米飲下普茄

小粉乳香沒藥

根燒灰石榴皮等分為末沙糖水調服即上便

封臍膏治痢疾水瀉小粉半斤炒焦色如球發泡

為度入乳香沒藥各一兩用醋調粘油紙攤成膏

大蒜

封臍上立止癆病用攤大膏貼背心亦炒凡淨粉

二兩入乳沒六錢為例急泄瀉暴痢大蒜搗貼

急救

瀉痢

冷痢

九十七



硫黃 范麻子仁

針 下痢虛寒硫黃半兩范麻子仁七箇末填臍中以衣隔熱湯熨之上乃已存仁 下痢肛痛不可

忍著熬鹽包坐熨後

鹽 內豆蔻

冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麩裏煨

搗末每服一錢粥飲調下唐聖 老小白痢艾葉丸

艾葉

用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸

梧子大每服七十九空心米飲下甚有奇效永類

炒麩

寒痢白色炒麩每以方寸七八粥中食之能療日

大豆 皂

瀉百行師不能救者治外 水痢不止大豆一升炒

白朮半兩為末每服三錢米飲下南指 水痢百病

馬蘭子 六月日麩

馬蘭子以六月六月日麩熬各等分為末空心米飲

服方寸匕如無六月六月日麩常麩亦可牛骨灰亦

馬蘭子 乾薑 黃連

可急備 馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟湯服二

方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神效不得輕

之忌猪肉冷水急備

胡黃連

熱痢腹痛胡黃連末飯丸梧子大每米湯下三十九

急救

冷痢

熱痢

九十八



柴胡黃芩

玄 鈞

積熱下痢柴胡黃芩等分半酒半水煎七分

枯礬

浸冷空心服

急 濟

伏暑泄瀉玉華丹白礬煨為末

醋糊為丸量大小用木瓜湯下

經 驗

伏暑瀉痢及

腸風下血或酒毒下血一服見效遠年者不過三

服硝石舶上硫黃各一兩白礬滑石各半西飛麩

四兩為末滴水丸梧子大每服汲水下三五十九

名甘露丸

消 善

熱痢不止車前葉搗汁入蜜一合

煎溫服

聖 更

硝黃舶硫  
白礬滑石  
飛麩

車前草

便血

溺 血

蒼木皂

腸風便血蒼木不拘多少以皂角按濃汁浸一宿煮

乾焙研為末麩糊丸梧子大空心米飲下五十九

荆芥

日三服

婦人 良方

荆芥炒為末每米飲服二錢婦人

荆芥槐花

用酒下亦可拌麩作餛飩食之

經 驗

荆芥二兩槐

花一兩同炒紫為末每服三錢清茶下

簡 要

茶葉

箬葉

箬內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入

旱蓮子草

射香少許

百一 選方

旱蓮子草瓦上焙研末每服二

急救

便血

九十九



瓜蒌小豆

錢米飲下經 瓜蒌一箇燒赤小豆五錢為細末

何首烏

每空心酒服一錢普 何首烏二兩為末食前米

威靈仙白  
鷄冠花

飲服二錢聖 威靈仙鷄冠花各二兩米醋二升

煮乾炒為末以鷄子白和作小餅灸乾再研每服

水饅樓欄  
烏梅粉草

二錢陳米飲下日二服聖 水饅頭燒存性樓欄

皮燒存性烏梅去核粉草等分為末每服二錢而

骨碎補

水一盞煎服初劑 骨碎補燒存性五錢酒下或

金星草  
陳乾薑

米飲服存 金星草陳乾薑各三兩為末每服一

卷栢側栢  
樓欄

錢新汲水下本 卷栢側栢樓欄等分燒存性為

萱葶子  
甘草

末每服三錢酒下亦可飯丸服存 萱葶子主用

卷栢地榆

甘草為炙末每服二錢水煎普 卷栢地榆煨等

分每用一兩水一盞煎數十沸通口服選 確

黑小豆

黑豆緊小者以皂角湯微浸炒宿去皮為末煉猪

白蘿蔔

脂和九梧子大陳米飲下三十九中藏 蜜炙蘿

經霜茄

茄任意食之昔一婦人服此有效選 經霜茄

連蒂燒存性為末每日空心溫酒服二錢七取效

急救

便血

一百



乾柿  
銀杏百葉

乾柿燒灰飲服二錢即愈急 銀杏四十九

煎

蕪臍

箇去殼生研入百葉煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送下證治要訣 蕪臍搗汁大半鐘

稜樹心姜

好酒半鐘空心溫服三日見效神效 稜樹皮半斤

瓜萋一箇燒灰每服二錢米飲調下百一選方 山茨

山茨茹甘  
草

茹五錢大甘草三錢水二鐘煎七分露一宿次早空心入無灰酒半鐘溫服除根急 百草霜五錢

百草霜

以米湯調露一夜次早空心服下急 下甚脫肛

蛇黃

蛇黃二顆火煨醋淬七次為末每服三錢陳米飲

白芷

下普 香白芷為末每服二錢米飲下神效兼治

痔漏出血并煎湯熏洗選 腸風下血便前近肝

胡刺胡桃  
故紙槐花

腎便後近心肺皂角刺灰二兩胡桃仁破古紙炒

槐花炒各一兩為末每服一兩米飲下普 糞後

艾葉生薑

下血艾葉生薑煎濃汁服三合千金 糞後下血白

白鷄冠花  
王不留行

鷄冠花并子炒煎服聖 糞後下血王不留行末

桑上白蘚

水服一錢聖 糞後下血桑樹上白蘚花水煎服

急救

便血



白鷄冠花  
樓欄羌活

或末服亦能止吐血聖惠 脫肛下血白鷄冠花炒

樓欄灰羌活各一兩為末每服二錢米飲下類永

白鷄冠花  
防風

下血脫肛白鷄冠花防風等分為末糊丸梧子大

小薊  
卒瀉鮮血小薊葉搗汁

空心米飲服七十九類永

蒼朮地榆

溫服一升師梅 脾濕下血蒼朮二兩地榆一兩分

作二服水一盞煎一盞食前溫服保命集方 大便溏

編砂

血三代相傳者編砂仁為末米飲熱服二錢服至

香附  
病愈為度便十 諸般下血香附童便浸一日搗碎

香附百草  
霜射香

米醋拌焙為末米飲服二錢聖惠 香附子末二錢

入百草霜麝香各少許同服效速戴原禮方 熱毒下

生葛根  
藕汁

血食熱物即發生葛根二斤搗汁一升入藕汁一

鼠尾草地  
榆

升和服師梅 下血連年鼠尾草地榆各二兩水二

升煮一升頓服二十年者不過再服亦可為末米

麩麩

飲服之針 酒毒便血麩一塊濕紙包煨為末空

黑豆

心米飲服二錢神效針 男子便血黑豆一升炒

焦研末熱酒淋之去豆飲酒神效活人心統 酒痢便

急救

便血

百二



絲瓜

血腹痛或如魚胸五色者乾絲瓜一枚連皮燒研空心酒服二錢一方煨食之經下血危篤不可

絲瓜槐花

救者絲瓜一箇燒存性槐花減半為末空心米飲

劉寄奴

服二錢濟普大小便血劉寄奴為末空心茶調二

茅根

錢服即上集茅根不拘多少水煎去滓溫服立

馬鞭草  
白芷

上急酒積下血馬鞭草四錢白芷一錢並炙蒸

黃栢

餅丸梧子大每米飲下五十九橘金虎丸治下

血數升者黃栢一兩去皮雞子白塗炙為末水丸

山漆

菘豆大每服七丸溫水下普山漆研末同淡白

酒調服一二錢三服可愈或加五分入四物湯亦

黃連木香  
烏梅

妙魚治婦人血崩集黃連二兩切片煎汁浸水

香四兩慢火焙乾為末烏梅肉搗為丸梧子大空

地錦草

心白滾水下六十九保臟毒赤白地錦草洗曝

地錦草

乾為末米飲服一錢五上經大腸瀉血地錦草

少許薑汁和搗米飲服訣

香附地榆

小便溺血香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯

急救

便血

溺血

百三



茅根

三五呷後服如榆湯至盡未效再服指茅根煎

荆芥編砂

湯頻服證楚荆芥編砂等分為末糯米飲下三

益母草

錢日三服集益母草搗汁服一升五瘧始當

當故

白芷當故

歸四兩剉酒三升煮一升服後白芷當故等

地黃生薑

分為末米飲服二錢驗生如麥汁半升生薑汁

降蜜

車前草

半合蜜一升和服魚治吐血及耳鼻出血聖車

旱蓮草車前草

芡草搗汁五合空心服始旱蓮草車前草等分

五葉莓

搗取自然汁空心服一盃愈為度醫五葉莓

胡麻

藤陰乾為末白湯服二錢易胡麻三升杵末以

栢葉黃連

東流水二升浸一宿平旦絞汁頓熱服金栢葉

地骨皮

黃連焙研酒服三錢急新地骨皮洗淨搗自然

汁無汁則以水煎汁每服一盃入酒少許食前溫

荷蒂

服便荷蒂七箇不拘新舊燒灰而酒服救血

土牛膝

出覺疼土牛膝三兩水四碗煎一碗加乳香少許

茅根乾薑

服四五次愈救勞傷溺血茅根乾薑等分八蜜

一匙水二鐘煎一鐘日一服急血淋痛不可忍

急救

溺血

百四



香附子  
赤茯苓

香附子陳皮赤茯苓等分水煎服便十

血淋用苧

苧麻根

麻根煎湯頻服大炒亦治諸淋

溺後出血鏡

鏡面草

面草汁入少蜜水進兩服愈

血淋疼痛茄葉

茄葉

熏乾為末每服二錢溫酒或鹽湯下隔年者尤佳

腸風下血以米飲下

經

二便癃閉  
不禁

大便  
尿淋

小便  
脫肛

荆芥黃

倒換散治癃閉不通小腹急痛無問新久荆芥大黃

酸漿草  
前草砂糖

末每溫水三錢服小便不通大黃減半大便不通

荆芥減半普濟二便不通三葉酸漿草一大把車

前草一握搗汁入砂糖一錢調服一盞不通再服

皂莢摘皂莢燒研粥飲下三錢立通針脹急者生

冬葵根  
生薑

冬葵根二斤搗汁三合生薑四兩取汁一合和勻

白礬

分二服連用即通也急白礬末填滿臍中以新

急救

二便

百五



明月即膠  
月兔藥

汲水滴之覺冷透服內自然而即通臍平者以紙  
圍環之經 明月砂一匙安臍中冷水滴之令透

皂莢相

自通聖 皂莢燒烟於桶內坐上熏之即通聖

當歸白芷

大便不通當歸白芷等分為末米湯下二錢聖 葵

葵菜子  
人乳

葵子研末人乳汁等分和服立通聖 大便卒結

羊蹄根  
即虎菜

羊蹄根一兩水一大盞煎六分溫服聖 虛秘松

栢子松子  
麻子白蠟

子仁栢子仁麻子仁等分研泥溶白蠟和丸梧子

蘿蔔子  
皂莢

大每服五十九黃鬻湯下宗 風秘氣秘用蘿蔔

生薑鹽

子炒一合搗水和皂莢末二錢服立通壽 用蜜  
二合銅器中微火熬至可丸乘熱捻任挺令頭銳  
大如指長寸半許候冷即硬納穀道中少頃即通  
若加皂角細辛末少許尤速傷寒論方 生薑削長二

寸塗鹽內下部立通外

樓桐

小便不通樓桐毛燒存性以水酒服二錢即通和屢

苧麻根  
給粉

試甚驗攝 苧麻根給粉半兩為末每服二錢空

馬蘭草  
香茅草

心新汲水下聖 馬蘭草炒茴香炒茅草炒為末

急救

二便

百六



竹鷄草即  
鴨路草

萱草根

瓜萋

葱白

葱蜜

螺泥膩粉  
鹽射香

酒服二錢救急

竹鷄草一兩車前草一兩搗汁入

蜜少許空心服之簡集

萱草根煎水頻飲要搗腹

脹用瓜萋焙研每服二錢熱酒下頻服以通為度

聖惠小便閉脹不治殺人葱白三斤剉炒帕盛二

箇更互熨小腹氣透即通事本葱白連烟搗爛入

蜜合外腎上立通類永用活田螺不拘多少清水

養之將所吐泥留下逼去清水入膩粉五分鹽一

匕麝香少許塗臍下良久即通螺仍放生救急蒿

蒿苣子  
菴麻仁

苧麻根

鹽

蒿苣菜

蒿菜滑石

紫苑

苣子搗餅貼臍中即通上海

菴麻仁三粒研細入

紙撚內挿八莖中少頃便通搗玄

苧麻根洗研攤

絹上貼少腹連陰際須臾即通搗玄

濕紙包白鹽

燒過吹少許入尿孔中立通濟普不通及尿血簡

苣菜搗敷臍上甚效簡易小便澁滯不通及男婦

轉脬乾菹葉一兩燒灰滑石五錢為末每米飲服

三錢濟普婦人小便卒不得出者紫苑為末并華

水服三撮即通小便血者服五撮立止千金水腫

急救

二便

夏



茯苓史椒

尿澁茯苓史椒目等分煎湯日飲取效

普濟 馬蘭

馬蘭黑豆

菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一鐘煎一鐘

小麥

食前溫服以利小便四五日愈備 虛後水鐘日

茅根小豆

飲水多小便不利用白茅根一把小豆三升而水

三升煮乾去茅食豆水隨小便下也後時 腫毒尿

葱油

閉因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑

色去葱取油時塗腫處即通普濟

赤石脂牡蠣鹽

小便不禁赤石脂煨牡蠣煨各三兩鹽一兩為末糊

薔薇根

九梧子大每鹽湯下十五丸普濟 薔薇根煮汁飲

或為末酒服野生白花者更良聖惠 小便頻數乃

益智烏藥  
山藥

脬氣不足也雷州益智子鹽炒去鹽天台烏藥等

分為末酒煮山藥粉為糊九梧子大每服七十九

桑螵蛸

空心鹽湯下名編泉丸集驗 婦人遺尿桑螵蛸酒

炒為末薑湯服二錢千金

炊飯

人尿牀以新炊熟飯一盞傾尿牀處拌與食之勿令

野薔薇根

病者知時珍 少小便牀野薔薇根五錢酒煎夜飲

急效

二便

頁八



尿紙

外 老少尿牀白紙一張鋪席下待遺上取紙晒

尿草薦

乾燒灰酒服集 取本人所卧薦草燒灰水服立

瘡金

木饅頭杖  
苓猪苓

大腸脫下水饅頭連皮子切炒茯苓猪苓等分為末

磁石

每服二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹普 磁石

胡荽

為末麩糊調塗顛上入後洗去簡 胡荽切一升

苧麻根

燒烟熏之即入秘 苧麻根搗爛煎湯熏洗聖

白礬五倍

槿樹皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍子末敷之

五倍子白礬  
木賊草

救急

五倍子末三錢入白礬一塊水一碗煎湯洗

薑蜜

之再用木賊草燒灰搽肛上即收立效三 腸出

不收生薑自然汁一合蜜一合和勻用鷄翎掃上

黃連 即收急 痢痔脫肛冷水調黃連末塗經

急救

二便

百九



淋濁 白濁 赤濁 夢遺

魏元君濟生丹治男子白濁女人赤白帶下用蕎麥

炒焦為末雞子白和丸梧子大每服五十九鹽湯

下日三服 濟普 男子白濁女子帶下陳冬瓜仁炒

為末每空心米飲服五錢 救 椿根白皮滑石等

分為末粥丸梧子大空腹白湯下一百丸 丹 椿

根白皮一兩半乾薑炒黑白芍藥炒黑黃柏炒黑

各二錢為末粥丸梧子大每空腹白湯下百丸 丹

急救

淋濁

百十

椿樹白皮滑石

椿皮乾薑白芍黃柏



海金沙 白濁靈驗真海金沙二錢飲酒者沖酒服不飲者白

青黛白礬 滾湯下一二 服即愈急 青黛白礬為細末糊丸

羊角 豆腐皮裹吞急 羊角火煨刮灰末三錢酒下立

白果仁 除急 生白果仁十枚搗水飲日一服取效集

益智厚朴 不拘男婦白濁腹滿用益智仁鹽水浸炒厚朴薑

汁炒等分薑三片棗一枚水煎服類 白濁頻數

凝面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒單解

分清飲單解石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢

單解菖蒲 益智烏藥

水一盞八鹽一捻煎七分食前溫服日一服效乃

止普 氣虛白濁黃耆鹽炒半兩茯苓一兩為末

每服一錢白湯下經 漏精白濁雪白鹽一兩餅

穿緊固濟煨一日出火毒白茯苓山藥各一兩為

末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯下三十九益甘以

濟鹹脾腎兩得也直 白濁遺精蓮肉白茯苓等

分為末白湯調服即愈普 尿白如注小腹氣痛

茶籠內翁葉燒存性入麝香小許米飲下經 膏

翁葉麝香

淋濁

厚

黃耆茯苓 鹽白茯苓 山藥



海金沙滑石甘草梢

淋如油海金沙滑石各一兩甘草梢二錢半為末  
每服二錢麥門冬煎湯服日二次在 諸淋百濁  
苦中痛欲死者及小便不通牛膝不拘多少煎濃  
汁加麝香少許空心服救急 葱白二莖鹽一撮熟

葱白鹽

水薰陰虛愈救急

小便赤濁心腎不足精少血燥口乾煩熱頭暈怔忡

兔絲子麥門冬  
側柏葉人乳

兔絲子麥門冬等分為末蜜丸梧子大鹽湯下七  
十救急 血淋用向陽側柏葉一兩人乳一茶鐘

蓮香麝香

將不搗爛同乳以布絞汁空心服救急 乾柿三  
枚燒存性研末陳米飲服氏葉 蓮房燒存性為末  
入麝香少許每服二錢半米飲調下日二驗經 生

生地車前地錦草

葵花根車前子

地黃汁車前葉汁各三合和煎服聖 地錦草并  
水搗服三度即愈驗經 葵花根二錢車前子一錢  
水煮下服之便 血淋作痛車前子晒乾為末每

服二錢車前葉煎湯下濟 男子血淋脹痛欲死

藕汁調髮灰每服二錢三日血止痛除時珍 血淋



芭蕉根  
旱蓮根

痛澁但利水道則清濁分之海金沙末新汲水或  
沙糖水服一錢普濟 芭蕉根旱蓮草各等分水煎

眼日一惠聖 血淋或出砂膏如條痛如刀割真麝

射慈兒  
茶琥珀

香五分葱白一根同麝搗取汁孩兒茶三錢五分

琥珀二分五厘冬為細末用百沸湯調前藥入葱

葶草酢

汁空心同服如神救急 膏淋尿血淋瀝葶草生搗

馬蔴莧

汁三升酢二合和頓服當尿下白汁行獨 熱淋馬

乾柿燈心

遠心搗汁服之惠聖 熱淋澀痛乾柿燈心等分水

扁竹即扁  
薹

煎氏朱 扁竹煎湯頻飲生 熱淋澀血不拘

赤小豆煨  
葱

男女用赤小豆三合慢炒為末煨葱一莖搗熟酒

大黃鷄子

調服二錢秘真 赤白淋濁好大黃為末每服六

分以鷄子一枚破頂入藥攪勻蒸熟空心食之不

過三服愈便簡 瞑眩膏治沙石諸淋疼不可忍用

蘿蔔

蘿蔔切片蜜浸少時炙乾數次不可過焦細嚼鹽

石首魚頭  
內石當歸

湯下日三服普濟 石淋諸淋石首魚頭內石十日

箇當歸等分為末水二升煮一升頓服立愈外始

急

淋濁

百十三



兔絲子雞  
四金

葵花根

缸底青苔

苧麻根

苦乳香  
麝香

淋瀝兔絲子煮汁飲范 淋瀝痛不可忍雞內金

陰乾五錢燒存性任一服白湯下立愈醫林 葵花

根老到水煎五七沸服之如神生衛 乳石發動小

便淋瀝心神悶亂缸底青苔半雞子大煎汁溫服

日三四次第治王淋聖 五種淋疾苧麻根兩莖

打碎以水一盞半煎半盞頓服即通大妙門 男

婦諸般淋疾苦杖根洗淨剉一合以水五合煎一

盞入乳香麝香少許服一夕而愈事本 男女

瓜甲

小麥通草

剪金花即  
王不留行  
白微芍藥

地膚草

淋瀝及小便轉胞自取瓜甲燒灰水服之後 老

人五淋身熱腹滿小麥一升通草二兩水三升煮

一升飲之即愈親奉 婦人患淋臥久諸藥不效用煎

金花十餘葉煎湯再服即瘥既 婦人遺尿及血

淋熱淋不拘胎前胎後白微芍藥各一兩三末酒

服方寸七日三服針 諸淋地膚草搗自然汁服

之自 諸淋赤痛三葉酸漿草洗研取自然

汁一合酒一合和勻空心溫服立通靈

心

淋濁

百十四

酸漿草



苦參白朮  
牡蠣猪膽

煎遺食減苦參三兩白朮五兩牡蠣粉四兩為末用

雄雞膽一具洗淨砂罐煮爛石臼搗和藥乾則入

汁丸小豆大每服四十九丸米湯下日三次服身

食進夢遺五上保壽虛勞傷腎夢中泄用此

子二兩微炒為末食前溫酒二錢七服普夢泄

以紫花地丁草搗為膏貼臍即止救急

韭子

紫花地丁



