

遠西醫方名物考

遠(知)
加(利)

卷六

十武
857
45-6

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
册 6 第



武 857
卷 45-6

京都府立総合資料館蔵

遠西醫方名物考標目

卷六

知 鎮痙散

黜失刺獲

丁香油

丁幾去爾

蔣蘿油

利 龍骨木脂

律比丸

里沒奈埏

龍骨木摩油方
龍骨木脂膏
實亞格日温
實百兒油
鹿角油
私篤倭謨
私篤倭謨
私篤倭謨
私篤倭謨
私篤倭謨

大正七年九月廿四日
内田 糸子氏 贈

蔵書印

遠西醫方名物考標目 卷六 標目 風雲堂藏

栗リベツス斃ベツ子

栗リベツス斃ベツ子傑列イ

栗リベツス斃ベツ子コンセルフ昆設爾弗

栗リベツス斃ベツ子舍利別

龍腦ノ羯布羅

龍腦ノ同乳上

龍涎香ニ麝香後

綠礬ノ石膽條

綠礬油同綠礬精同

綠礬揮發鹽同上

遠阿利襪

阿利襪油

屋施茂兒

鴿栗オリバヌム技奴謨

加カ密ミツ列レ煎煎

加カ密ミツ列レ蒸蒸餾餾油方 加カ密ミツ列レ煎煎油



遠西醫方名物考 卷六

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴技補

知

鎮痙散

「ヒルヒス、アンテスパスモヂカ」
「ポイドル、テージェン、デ、カラム、プ」
蘭

製法

消石 精製乾淨者

孕礬酒石 四錢

朱砂 製造者 二錢

右各別ニ研末シ能ク調勻シ硝子ニ内レ貯フ

主治 一切痙攣搐掣。痲衝逆等ノ諸症ヲ治ス○服量

半錢ヨリ一錢ニ至ル

遠西名物考 卷六

丁幾去爾テイニキテウル 羅ラ アフヘルフセルル 蘭

是ハ藥品ヲ燒酒ニ淹ヒタシ藥氣並ニ其色ヲ浸出スル
藥液ノ總稱ナリ此ニ冷浸温浸ノ二種アリ冷浸ハ
其藥ヲ硝子壘ニ入レ燒酒ヲ加ヘ硝子壘ツチヲ以テ固
ク閉トヂ藥氣ヲ浸シ出スナリ温浸ハ其藥ト燒酒ヲ
潤キ硝子ノ格兒弗コルノ半ニ充ミタシメ獸ノ膀胱ヲ水ニ
濕シノ其口ヲ封閉シ針ヲ以テ其上面ヲ刺穿サシテ許多
ノ細孔ヲ作り其格兒弗コルヲ爐邊或ハ微温火上ニ置
キ其間ミマコレヲ數振湯シ藥氣ヨク出テ後布片ヲ以
テ是ヲ絞リ瀝コシテ液ヲ取り又紙ニテ瀝コシシ硝子壘ニ

入レ固封シ貯フ其燒酒ノ強弱多少並ニ其淹ヒタス日
數等ハ丁幾去爾テイニキテウルト爲ス藥品ノ各條ニ載ス 〔校〕

黝失刺チウシラゴ 羅ラ フーフラドラド 蘭

○榕按ニ黝失刺チウシラゴハ款冬ノ一種ニノ花葉款冬
ト異コトナリ和産未ダ詳ナラズ是レ證類本草ニ出
ス所ノ秦州款冬ナリ 是レ長雋足立氏嘗テ圖ヲ
檢ノ予ニ示ス所ナリ又
〔校〕此草款冬ノ一種ナリト云○舶來ノモノヲ見
ルニ葉厚ク背灰白ニ毛茸アリ乾葉ヲ剉ムニ
稍粘著ノ熟艾ノ如シ味微甘收 ○款冬根和蘭ニ
溢シス故ニ味亦款冬ト異コトナリ 〔校〕
說ク所ノ主治。開塞。發汗。利尿。殺蟲。祛疫等ハ此草

峻効アリ殊ニ肺虛損シ或ハ氣管脆弱ニノ酷厲液
 侵刺シ發スル痰効或ハ肺傷乾効勞嗽或ハ粘液質
 ノ勞瘵トナルベキ症ニ偉効ヲ稱シ或ハ肺瘍ヲ淨
 刷シ或ハ肺焮衝。胸脇痛或ハ喘急。聲嘎及ビ冒寒傷
 冷毒等ノ粘痰ヲ化メ略易カラシメ一切肺病ヲ治
 スル要藥トス○總テ瘰癧毒アル諸症ノ良藥トス
 ○瘰癧毒ヲ夾ム肺瘍ノ膿腫。肺中ニ硬結シ稍々ニ
 膿ヲ成シ終ニ勞瘵トナル症ニ効アリ○瘰癧ノ潰
 瘍ハ此葉ヲ水ニ浸メ服シ或ハ此草ノ絞汁ヲ服メ
 甚ダ驗アリ幾那ヲ用ヒテ効ナキ症ニ開大効アリ

○瘰癧毒アル小兒。腹肚膨脹。顔面黧澹灰綠色或ハ
 眼及ビ瞼。潰瘍ヲ生シ其他瘰癧毒ノ諸症アルハ此
 藥ヲ長服メ殊効アリ○此葉一弓ヲ取り水一比半
 ヲ以テ煎シ減メ半比トシ用フ或ハ幾那或ハ鐵ノ
 丁ラインキテウ幾テウ去爾ル或ハ薯草等ヲ加ヘ用ヒテ良○或ハ水ニ
 浸シ或ハ泡劑トシ或ハ末トシ沙糖ヲ加ヘ或ハ舍
 利別トシ用フ○生葉ヲ取り焮腫。熱性ノ潰瘍。火傷。
 乳頭坼裂等ニ貼メ疼ヲ甘メ毒ヲ消ス

伍依福
 物叔

丁香油

オレウム。カレイヲペイルリ

製法

丁香

分量適宜

右搗テ粗碎トシ罐ニ入レ適宜ニ水ヲ加ヘ或云丁
 水四煖處ニ置キ淹スト五日、硝子ノ格コ兒弗ルニ入レ
 蛇管ヲ屬シ沙火ヲ以テ其水ノ半ヲ蒸餾スレバ油。
 其露水ニ交テ底ニ沉ム。是ヲ悉契瓦刺斯ニ入レ分
 泌ノ其油ヲ取り硝子壘ニ入レ固封シ貯フ。○其露
 水ニ丁香ヲ加ヘ復蒸餾ノ油ヲ取ルト前法ノ如ク
 ス斯ノ如ク數回ニ多ク油ヲ取ルベシ。○此油ハ白
 色鮮明ニメ稠厚ナラズ芳烈ナルヲ擇ムベシ稠厚
 ニメ暗黒色。舌ニ觸テ辛辣燒ガ如クナルハ的テ列レ並シ

油或ハ丁香ノ越幾斯劑ヲ加ヘ或ハ粘稠ノ油ヲ和
 ノ偽リ販ク者ナリ。○肉豆蔻。桂府利薩撒弗刺斯草。
 菓。益智。胡椒等ノ蒸餾油モ亦此製法ト同シ。按伍
 主治。腦。心。胃。子宮。神經ヲ强健ニシ呃逆ヲ治シ失氣
 昏冒。胃虛冷痛。寒疝。子宮衝逆。經閉ニ驗アリ。○服量
 一二滴ヨリ四滴ニ至ル。○此油ヲ綿ニ滴シ齧孔ニ
 内テ齒痛ヲ治ス。是レ齒神經ヲ侵蝕メ麻痺セシム
 レバナリ。○是ヲ舌ニ塗テ舌神經ヲ衝動健運シ舌
 非言蹇語ヲ治ス。國

蔣蘿油

「オレウム・ア子」
「オレイ・ハン・ダ」
「ルレ」
蘭

製法

薄荷油製法ト同シ
主治 茴香油ト同シ 醫

實亞格日温

「セイル」
「ラス」
「デア」
「コ」
「ヂ」
「ヲ」
「ン」
羅

製法

白罌粟舍利別

過爾託亞舍利別

各等分

右調勻ス

主治 白罌粟舍利別ト過爾託亞舍利別トノ主治ニ

舉ル病ニ良驗アリ

亞 疾

利

龍骨木脂

「エウ」
「ボル」
「ビ」
「ウム」
羅 甸 和
蘭 通 稱

龍骨木ヲ鑽刻スレバ乳汁ノ如キ脂液出ツ是ヲ取

リ集メ曝乾スレバ凝結ノ顆粒ヲ爲シ或ハ碎塊ト

ナル此即チ龍骨木脂ナリ其質瓊樣ノ華爾斯ト

ス○上品ハ黃白色乾固ノ碎ケ易ク淨潔ニシテ沙土

等ノ汚物ナク顆粒ヲ成スナリ○印度地方及比亞

弗利加洲ノ諸國ニ多ク産ス

主治 性焚熱シ酷厲ナル揮發鹽及ビ窟透ノ油氣ア

リ是ヲ嚼ニ味辛熱ニシテ佳ナラズ舌ニ侵刺ノ速ニ

消散セズ皮膚ニ貼スレバ侵蝕ノ泡ヲ發ス著キ香

本草綱目

卷六

龍骨木脂

臭ナシ○峻攻ノ下劑トス僅ニ半匁ヲ服スレバ留
 飲停水粘稠ノ汚液ヲ瀉下シ又稠厚ノ血液ヲ溶解
 稀渙ス故ニ水腫緊滿脚腫經閉等ニ捷効アリ○然
 凡此藥ノ酷厲毒動モスレバ胃腸ヲ侵刺ノ欲衝ヲ
 發スルコトアル故ニ感觸ノ鈍キ人或ハ輕キ下劑ヲ
 與ヘテ通利ナキ症ニ非レバ是ヲ用ヒズ或ハ一二
 匁許ヲ緩和ノ劑ニ加ヘ與フベシ○嘔藥トシ峻効
 アリ此末半匁ヲ嗅引ノ大ニ嘔ヲ發シ頭中ノ惡液
 ヲ漏泄シ頭部ノ諸症ニ捷効アリ然レバ過用スレバ
 涕液大ニ漏泄ノ止マズ或ハ困難ノ衄血ヲ發スル

恐レアリ○腐骨疽ニ此末ヲ摻メ腐壞ヲ祛キ良肉
 ヲ生ス○擦油或ハ軟膏ト作シ施メ汚液ヲ淨除シ
 凝結ヲ溶解シ細絡ノ壅塞ヲ疏通シ神經ヲ刺戟衝
 動ノ頑麻不遂肢節強硬等ヲ療シ或ハ顛顛ニ擦メ
 昏睡ヲ省復ス即チ左ノ摩油方良驗アリ

龍骨木摩油方

龍骨木脂 半錢 未 的列竝底那 一匁 燒酒 一錢

右調勻シ微火ニ上セ煉和ス○左ノ膏亦良効アリ

龍骨木脂膏

龍骨木脂 一錢 阿利襪油 半匁 黃蠟 適宜

遠西各物考 卷六 六 風雲堂藏

右文火ニ上セ煉和シ軟膏ト作ス 伍 伍 依

律比丸 リッヒ ヒルウ リツヒ 羅

製法 盧會 上好者 二弓

沒藥 半弓

雜股蘭 二錢

右細末トシ燒酒少許ヲ加テ丸藥ト爲ス 伍 或ハ舍利別少許ヲ加テ丸藥ト爲ス 後

主治 胃及ビ腸ヲ健運シ大便ヲ利ス緩下ノ良劑トス又寒性ノ患者内藏ニ壅滯セル惡液ヲ消化ノ驅

逐ス故ニ飲食消化ヲ助ケテ良液ヲ生シ萎黃病及ビ經閉等ニ尤^モ効アリ○服量半錢ヨリ一錢マデ用ヒテ瀉下ス微利ノ効ヲ取ント欲セバ四五日宛^ク日ニ三次用フベシ 亞 疾 綱

里沒奈堙蘭 リモナーデ

製法 枸橼皷汁 或ハ橙皷汁 二十弓

沙糖 一比

右先ヅ枸橼汁ヲ取り緻布ニテ瀝シ磁壺ニ入レ又其實ノ黃皮ヲ薄ク剔^カリ取テ其汁ニ加ヘ沙糖ヲ攪

和シ是ヲ重湯ト爲シ砂糖ヨク烱化スルニ至テ沫ヲ抄スヒ去リ放冷ノ再ビ瀉シ其汁ヲ取テ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

主治 壯熱病。腐敗熱。惡性熱。等ニ用ヒテ血液ノ燥涸ヲ滋潤シ汗ヲ發シ津ヲ生シ渴ヲ止メ口舌枯燥ヲ柔潤ス○冷水或ハ大麥煮汁一碗ニ此液一二匙ヲ攪和シ服ス 〔疾〕〔服〕

栗リベッス斃子ス

羅

リベス。リュアリム上同

アルベイン蘭

形狀 栗リベッス斃子スハ一種ノ灌木ニ生スル子ナリ是ニ赤

白黒ノ三種アリ○第一種ハ其樹枝柔撓ニノ皮褐色。葉葡萄葉ニ似テ小ク深綠色。邊ニ鋸齒アリ葉間嫩梗ヲ生ノ單瓣五出。黃綠色ノ花攢簇シ穂ノ如ク懸垂シ一心蕊。五鬚蕊アリ皆短シ。萼五出。尖ラズ花後許多ノ小子ヲ結ビ攢簇ノ房ヲ爲ス。形チ圓ク葡萄ニ似テ跗ナキアリ大ナルハ杜松實ノ如ク。小ナルハ胡椒粒ノ如シ地ノ肥瘠ニ隨テ一様ナラズ熟スレバ赤色透亮光澤アリ軟ニノ汁多ク酸甘。葡萄汁ノ如ク清爽賞スベシ圓核多シ○第二種ハ形狀前種ノ如クノ樹差高ク葉背毛茸アリ。子黑色ニノ味佳

ナラズ或ハ花赤色ナルアリ○第三種モ亦前種ト
 同フノ子差大ク白色透亮或ハ淡黄味發甘或ハ甚
 ダ酸或ハ過^大甘シ其樹前種ニ比スレバ高ク枝葉
 淡白ナリ但是ニ三種アリ一ハ花實^花氏ニ多シ一ハ
 花多ク實少シ一ハ花少ク實ヲ結バズ○第一種ハ
 園ニ培養シ或ハ枝條密茂スルヲ以テ藩籬ニ作リ
 又嫩枝ヲ^{サシ}拵テ速ニ長育シ當年子ヲ結ブ但五六年
 ヲ經レバ子ヲ結ブ^少ク味亦惡キ故ニ毎年枝ヲ
 拵^{サシ}テ嫩苗ト爲スニ宜シ○第二種第三種ハ荒野濕
 地水邊ニ生ス○又一種多ク子ヲ結ビ大^サ榛子ノ如

ク赤クノ味酸花帶赤色ノ者アリ或ハ葉多クノ小
 ク子甘味ノ者アリ (物) (度)

○按ニ此樹和漢產未ダ詳ナラズ但覆盆子懸鉤
 子桑椹蓬蘽越橘等ヲ代用スベシ大抵性功同シ

○榕按ニ木^クヒヨドリゼウゴ和産灌ハ栗斃子ニ
 似タリ然^カ子攢簇セズ唯葉間二三顆宛生^シ頗
 ル硬クノ透亮ナラズ味亦酸甘ナラズノ發澁ナ
 リ故ニ栗斃子ニ充^{ラズ}

主治子赤色ノ者ヲ藥用トス清凉滋潤シ解熱ノ効
 アリ一切壯熱病焮衝ノ諸症ニ用ヒテ血液ノ熱燥

ヲ潤シ渴ヲ止メ心胃ヲ爽涼ニス○尤腐敗ヲ過ル
 効アリ故ニ膽液ノ腐敗酷厲毒ヲ解シ膽液熱腐敗
 熱ヲ治スルニ用フ○肝及ビ胃ノ焮衝ニ發スル惡
 心嘔氣ヲ止メ或ハ赤痢吐血霍亂等ニ用テ熱毒ヲ
 解シ煩悶ヲ消ス或ハ夏月酷暑ノ時用ヒテ煩熱ヲ
 解シ精神ヲ清爽ニシ口熱舌燥ヲ潤シ口腫ヲ消ス
 ○痘疹ノ熱毒ヲ解シ酒醉ヲ醒シ汗ヲ發ス○子ノ
 汁ヲ取り貯ヘ宛モ橙汁葡萄汁ノ如ク藥用或ハ飲
 膳ニ供ス或ハ蜜少許ヲ加ヘ酒ノ如クシ用ヒテ甘
 美清爽ノ飲料トス○此汁ヲ傑列乙次ト作シ防

腐清涼驅熱ノ飲料トシ多ク用フ 福 伍 依

栗ベッス釐ス子ゲ傑レ列イ乙イ ア ロ ブ リ ベ シ ノ リ ム ロ シ ン ゲ レ イ ハ ン シ ン ゲ レ イ

子ノ汁少キ者ハ子ニ水少許ヲ加ヘ煮テ子破綻ス
ルニ至リ篩ニ入レ前法ノ如ク製スベシ〔按〕

主治 栗斃子ニ説ク所ト同シ○此劑半多ヲ取り大
麥煮汁十五多ニ和シ服メ前説ノ諸症ニ飲料トシ

用ヒテ尤良〔叔〕
〔疾〕

栗斃子リベッス昆設爾コシセル弗フ

栗斃子傑列ゲレ乙ト同シ

栗斃子舍利別 製法主治。覆盆舍利別ト同シ

遠

阿利襪カレイ蘭ノオリハア」羅」オレア」此樹ノ
羅甸名

○按ニ阿利襪ハ西洋諸地ニ産スル一種喬木ノ
實ナリ土人は是ヲ搾シホリテ油ヲ取り藥用及ビ飲膳燈
油ニ供シ又四方ニ貨ス和蘭ニテ此油ヲ「オレイ
フ。オリイ」ト名ク左ニ舉ル阿利襪油ナリ舶來ア
リ俗間藥舖「ホルトガル」ノ油ト呼ブ○平賀鳩溪
ノ物類品薦並ニ小野蘭山翁ノ本草啓蒙ニ時珍カ
綱目篤耨香ノ附録ニ出ル膽八香ヲ以テ阿利襪
油ニ充アテ又膽八樹ヲ以テ阿利襪樹ニ充アテツ又膽八
樹ヲ以テ 本邦豆州等ニ産スル「ハボソト」云ル

樹ニ充ツ物類品隲ニ云紀伊方言ヅクノ木キ本草
 啓蒙ニ云此樹本邦暖地ニ多シ俗名ヅクノキ
 州紀シラキ州九ハボソ州豆ト云々。今豆州産ノハボソ
 ヲ以テ阿利オ襪レ樹ノ説ニ較考スレバ其樹葉花實
 ノ形狀大抵相似タレ凡但阿利オ襪レ樹ノ葉ハ對生
 シ且ッ紅色トナラズハボソハ葉互生シ又葉落ル
 片皆鮮紅色トナル又壬午ノ春駿州及ビ豆州ノ
 ハボソノ熟實並ニ未熟ノ者ヲ多ク得テ數シ榨ニ
 入レ搾リ試ルニ唯滋味ノ稀汁出ルノミニテ油
 出ルトナシ是ニ火ヲ點シ或ハ煎熬シ試ルニ絶シ

テ油氣ナシ然レバハボソハ阿利オ襪レ樹ニ非ルカ
 或ハ左ノ譯説ニ載ル一種野生ノ者カ若クハ地
 性ノ異トナルニ由テ其實ニ油ヲ生セザルカ未ダ
 詳ナラズ又物類品隲ニ云ク此實ノ仁ヲ取テ油
 ヲ搾リタル者所謂ホルトガルノ油ナリト又本
 草啓蒙ニ云ク核中ニ仁アリ是ヲ搾リテ油ヲ取
 ル即ホルトガルノ油ナリト西洋諸説ヲ考ルニ
 阿利オ襪レ油ハ核中ノ仁ヲ搾リ取ル者ニ非ズ全果
 ノ肉盡ク油トナルト左ノ阿利オ襪レ油譯説ニ述ル
 如シト乃チ阿利オ襪レ樹ノ形狀並ニ其油ノ製法主治

等ヲ記ノ考證ニ備フ

形状 此樹園生野生ノ二種アリ○園生ハ喬木ニシテ
 幹塊節多ク皮灰色滑澤枝多クノ四敷シ葉經冬凋
 マズ狹長ニシテ柳葉ノ如ク末尖リ稍厚ク硬シ面淡
 緑背灰白毛茸ナシ短梗ニ著キ對生ス葉間嫩莖ヲ
 抽テ單瓣淡白ノ碎花攢簇ノ接骨木花ノ如ク筒様
 未開テ四叉ヲ爲ス花後楕圓ノ實ヲ結ブ初緑熟ス
 レバ淡黒色皮滑澤肉柔ニシテ油質ノ液充チ裏ニ稍
 長キ一堅核アリテ兩端尖リ内ニ仁アリ其實產地
 ニ隨テ大小アリ尤大ナルハ肉豆蔻ノ如ク或ハ鵝

卵ノ如ク或ハ榲實ノ如シ形チ或ハ圓キアリ或ハ
 赤色ヲ帶ルアリ味苦澁ニシテ佳ナラズ木材頗ル固
 ク淡黄或ハ赭色ヲ帶フ味苦ク微香氣アリ箱匣等
 ニ造ル○野生ハ樹及ビ葉實ニ小ク嫩枝方莖葉
 背白色多シ實ニ油少シ○此樹意太里亞イタリア伊斯把尼
 亞アホルト波爾杜瓦ドワ爾蘭アイルランド牛鐸ドク古福撈察フック等以上歐羅巴洲其他歐
 羅巴洲ノ南方煖地ニ生ス夏月花生シ秋實熟ス種
 ヲ下シ或ハ藥ヲ分チ裁テ培息シ或ハ園生ノ枝ヲ
 野種ノ幹ニ接ゲバ八九年ニシテ實ヲ結ブ皆油ヲ取
 テ四方ニ貨ス○未熟ノ實ヲ取り鹽醬或ハ醋ニ漬

厚ナラス其他不潔ノ異色ナシ深黄或ハ帶緑。透明
 ナラズ滋味アルハ内服ニ用ヒ難シ○此油久ク貯
 レバ必ズ澁敗シ色變ス。預メ是ヲ防グニハ其桶ヲ
 ヨク固封シ冷處ニ貯ヘ冬月ハ少許ノ炒鹽或ハ沙
 糖或ハ消石少許ヲ加フベシ是ニ由テ油ヨク溶化
 シ嚴寒ト雖モ凝固セズ且汚濁自澄テ淨潔トナル
 ナリ或ハ燂シタル蠟ヲ入レ或ハ蒸餅心一塊ヲ加
 ルモ良其油ノ汚濁不潔ノ物。惡キ味等ヲ是ニ吸ヒ
 取ルニ由テ澁敗スルヲナシ○若シ油ニ惡臭ヲ生
 スル片ハ蒸餅心ニ鹽ヲ加ヘ油ノ桶ニ投シ置ベシ

○油濁ル片ハ天日或ハ火ニテ燂シ或ハ沸湯ヲ加
 ヘ澄メ其汚濁ヲ去リ湯ヲ分チ除クベシ○油既ニ
 澁敗スル片ハ熱湯ヲ加テ攪滾シ其湯ヲ徐ク傾
 ケ去リ數斯ノ如クメ洗淨シ澁味盡ク除クニ至ル
 ベシ○姦商罌粟子油ヲ以テ此油ニ偽リ販クア
 リ是ヲ用ヒテ害ナシト雖モ阿利襪油ニ若カズ罌
 粟子油ヲ風日ニ曝セバ上面ニ膜ヲ生シ乾ケル油
 ノ如シ是ヲ燃スニ燄鮮明ナラズ。阿利襪油ハ曝メ
 膜ヲ生セズ冬月凝固セズ燃メ光リ鮮明ナルヲ以
 テ分チ辨スベシ蘭山翁本草啓蒙ニ云。近來續隨子
 油ヲ以テ偽リ賣ル者アリ麻油

ノ如クノ色白シト○江戸藥舖清雅樂只亭云、舶來ノホルトカノ油、二種アリ、ハ澄清ニ水ノ如シ、ハ凝テ獸脂ノ如シ、是ヲ豆腐滓ト云○
按ニ其凝テ獸脂ノ如キ者ハ藥用ニ堪ヘズ

主治 甘潤滑利、緩和ノ功アリテ、且、滲透シ凝結ヲ解キ、堅硬ヲ柔ラゲ、痙攣ヲ鎮メ、内藏ノ刺戟疼痛ヲ止ム。故ニ諸疝、淋疾、赤痢等ノ劇痛ヲ消シ、燥屎ヲ軟ゲ、大便ヲ滑利ス。○肺、氣管ヲ滑利シ、咽喉、口舌ヲ滋潤シ、粘痰ヲ化シ、欬嗽、喘急、聲啞等ヲ治ス。此油ニ沙糖、或ハ蜜ヲ加ヘ用フ。○酷暑ノ頃ニ發スル諸症、霍亂、膽液ノ酷厲毒ヨリ起ル劇キ腹痛、攣急痛等ニ此油ヲ雞子黃ニ研和シ、水ヲ加テ乳汁ノ如クシ用ヒテ

良○痛風、走注痛ニ此油四弓マデ、毎日服、良驗アリ。催睡鎮痛ノ劑ヲ用ヒテ功ナキ症モ間治スルヲアリ○労働セザル人及ビ老人ハ大便閉ノ患多シ、此症ニ蒸餅一片ヲ取りヨク炙リ、是ヲ上好ノ阿利襪油ニ投シ、浸メ、毎朝空心ニ用レバ、能ク燥屎ヲ軟ゲ、通利セシム。○虚症ノ下利、赤痢ニ肉豆蔻末、或ハ拳參根末ヲ此油ニ加ヘ、沙糖ヲ摻シ用ヒテ効多シ。○酷烈刺戟ノ毒ヲ包攝甘和スルヲ以テ諸中毒ニ効アリ、凡ソ亞兒加利鹽毒、或ハ礬石、升汞、膽礬等ヲ服シ劇症ヲ發スルガ如キハ、此油ヲ多服シテ速効アリ

リ○但此油ヲ屢多ク服スレバ胃腸ニ在テ酸敗シ
 或ハ纖維ヲ弛弱シ飲食消化ヲ妨ケ下利腹痛ヲ發
 スルヲアリ○吉利詞爹兒ノ藥汁ニ加ヘ施メ急迫
 ヲ緩メ堅硬ヲ軟ゲ痛ヲ止ム○外敷ノ酷厲毒ヲ緩
 和シ硬強ヲ軟化弛緩スル効アリ故ニヨク關節硬
 強ヲ柔撓ス或ハ腹水ノ症ニ此油ヲ全腹ニ擦テ日
 ニ兩次或ハ是ヲ毛布ニ濕シ腹ニ貼メヨク小便ヲ
 利シ治スルヲ多シ○服量ニ匙許適宜ノ飲液ニ加
 ヘ或ハ砂糖ヲ和シ服ス○疔疔硬結メ耳痛ヲ發ス
 ル等ニ是ヲ耳中ニ滴シ入テヨク其硬結ヲ軟化シ

治ス○諸創ヲ愈シ腫瘍ヲ消散シ或ハ化膿セシム
 ルニ塗藥トシ用フ○扁桃油。亞麻油。胡桃油。罌粟子
 油モ阿利襪油ノ性功アリ闕ルニ遇バ代用スベシ
 ○凡ソ藥草花實皮根等ヲ此油ニ浸シ硝子壘ニ收
 メテ天日ニ温メ或ハ煮ルキハ其藥ニ含メル性能
 及ビ油氣ヲ此油ニ引出シ良効ヲ奏ス○此油ヲ以
 テ上好ノ石鹼ヲ製ス或ハ厨房調理ニ用ヒ蔬菜ニ
 和シ乳酪或ハ脂膏ノ類ニ代用ノ尤良

叔伍依按
 福慶裴

屋施蔑兒

「オツイメルシムフヘクス」
 「エーインホウダゲアセイインホーニク」
 羅蘭

製法

醋 一匕

白蜜

氷火許ヲ如ヘ文火ニ煮テ泡沫ヲ
拭ヒ去リ毛篩ニテ濾ス者ニ比

右調和シ磁鍋ニ入レ文火ニ煮テ舍利別ノ稠トス

主治 粘痰ヲ疏解メ吐キ易カラシメ欬嗽喘急ヲ鎮

メ肺。氣管ヲ滋潤シ一切肺病ニ驗アリ○膽液熱腐

敗熱ノ飲料トシ燥涸ヲ潤シ攣急ヲ緩和シ口舌ヲ

濡スニ尤良○服量半匙或ハ一匙ヲ用フ○漱藥ニ

加ヘ或ハ和胸ノ祛劑ニ加ヘ用フ叔後
亞庚

鵠栗技奴謨羅

「ウイロク」又「テス」蘭

鵠栗技奴謨オハ亞刺比亞アニ産スル一種ノ喬

木ヲ鑽刻メ取ル所ノ樹質ト華爾斯質ヲ兼樹脂

ナリ微黃白色。硬固膠粘凝塊ヲ爲シ火ニ投メ燃易

ク佳香アリ味苦クメ佳ナラズ○上品ハ鮮白微黃

透亮ニメ顆粒ヲ爲シ碎ケ易ク燃テ佳香アリ

主治 性温揮發鹽及ビ油氣多シ微收瀉シ創ヲ愈シ

惡液ヲ除キ汗ヲ發シ下利ヲ止メ粘痰ヲ除キ欬嗽

胸痛齒痛等ヲ治ス○服量半錢ヨリ一錢許舍利別

ニ和シ用フ○此末ヲ外敷シ或ハ膏藥ニ和シ貼メ

血ヲ止メ創傷潰瘍ノ腐爛ヲ淨除シ良肉ヲ生シ神

經ヲ強壯ニス 叔伍 疾

○按ニ此物性功大抵乳香ト同シ代用スベシ 疾
云。松香ノ自然ニ滴瀝ノ鮮白微黃汚物ヲ雜ヘズ
顆粒ヲ爲ス者亦「ウィーロク」ト名ク代用スベシト

加

加^カ密^{ミツ}列^レ蘭

「カミルラ」又「マトリカリア」カ
モミルラ、リンナ、羅「カミル」蘭

形状

此草二種アリ一ハ尋常加^カ密^{ミツ}列^レナリ一ハ羅^ロ謨^ム

設^セ加^カ密^{ミツ}列^レナリ二種^ニニ藥用トス○尋常ノ品ハ春

月細キ圓莖叢生スル一ニ二尺許枝多ク葉細裂シ

朝霧草^{アサギリサウ}ニ似テ綠色夏月枝頭ニ小黄花簇生ス但重

瓣ノ者アリ單瓣ノ者アリ或ハ黃心白瓣或ハ重瓣

白色ノ者アリ 舶來ノ者ヲ見ルニ白色ノ者ハ香味

微ニノ性功劣レリ皆瓣ノ端刻缺シ綠萼鱗次ス花

後多ク楕圓ノ細子ヲ結ブ花葉^ニ味苦クノ竄透

ノ香氣アリ根細ク鬚多シ原野或ハ耕地ニ生ス宿

遠西名物考 卷六 風雲堂藏

根セズ○一種黃球ノミニノ瓣ナキ者アリ○羅謨
 設セカミツレ加密列ノ種類ハ皆宿根シ每春苗ヲ生シ圓莖低
 屈ノ直立セズ或ハ地ニ塌ス葉前種ノ如クニノ差
 大ク花亦前種ト同フノ味苦ク香氣尤強シ乾セ
 其氣久ク消セズ此一種重瓣白色甚ダ稠密ニノ黃
 心ヲ掩フ者アリ或ハ黃球ノミニノ瓣ナキ者アリ
 或ハ莖細ク柔脆ニノ地ニ塌シ葉稍白ク小ナルア
 リ氣味大抵前種ト同シ○其他野生ノ者三種アリ
 皆藥用トセズ形狀相似テ混シ易キガ爲ニ是ヲ舉
 グ其第一種ハ「スチンケンデカミツレ」ト名ツク此皆

尋常ノ品ニ比スレバ莖長ク太ク綠色軟脆ニメ折
 レ易ク葉亦大ニノ稍ヤ潤ク深綠色花ハ尋常ノ如シ
 然ルニ花葉ニ臭氣アリ味苦シ宿根セズ○第二種
 ハ「グヂルレ」ト名ク尋常ノ品ニ比スレバ葉長ク灰
 色ヲ帯ビ花差大ニノ香氣ナシ○第三種ハ「ストレ
 イキブルム」ト名ク莖細ク柔葉青蒿葉ニ似テ大ク
 厚ク灰白花ハ前種ノ如クニノ瓣黃色ナリ香氣ナ
 シ○以上野生ノ三種ハ花心凸ナリ尋常藥用ノ二
 種ハ花心扁平ナリ○又一種海邊ニ生スル者アリ
 「セークヂルレ」ト名ク莖小ク地ニ塌シ葉緑ニメ刻缺

アリ金盞花葉ノ如シ花。前種ノ如シ臭氣アリ是モ亦藥用トセズ

○榕按ニ苧蒿ノ一種。花戸ニ「ギンコウライ」又「テウセンギク」ト呼ブ者花葉ニ「加密列」ノ如クナレ。凡香氣ナシ右ニ「云野生ノ類ニノ藥用ニ充テ難シ苧蒿モ亦右ノ類ニノ香氣微ナリ」○其海邊ニ生シ葉。金盞花葉ニ似テ臭氣アルハ濱菊ナリ
○崎港在館ノ和蘭人苦蕒ヲ以テ「加密列」ニ充用フト云其氣味性功略相似タルヲ以テ代用スルナルベシ

主治 性温。苦。揮發鹽。油アリ竄透衝動シ温煖開達シ汗ヲ發シ疼痛ヲ止メ腐敗ヲ防キ衰弱ヲ強壯シ凝結ヲ疏シ堅硬ヲ軟ラゲ小便ヲ利シ又破氣驅風ノ良効アリ○發汗利尿解凝ノ効アルヲ以テ間歇熱。脾病。黃疸。水腫。或ハ月經不調及ビ經閉ヲ治ス○間歇熱ノ初發吐下劑ヲ用テ胃腸ニ鬱滯セル病毒ヲ驅除シ其後。發作七八回ニノ仍治セザル者ハ左ノ煎劑ヲ用ベシ幾那ノ効ナキ症モ治スル者多シ
加密列煎 加密列 一弓 酒石鹽 二錢 水 四北
右煮。減ノ十六弓ト爲シ熱ノ發作ナキ時。每服四弓

或ハ五弓。日ニ三四次用フ○往古未ダ幾那ヲ用ヒ
 ガル頃ハ加密列ヲ用テ峻効アル驅熱劑トス故ニ
 今時モ其毒深ク潜滯セズ其熱甚ダ頑固ナラザル
 症ハ幾那ニ勝リテ効アリトス是ヲ末トシ或ハ水
 ニ浸シ或ハ泡劑トシ用_レ或ハ幾那キーナ。カゴサウ纈草等ヲ加ヘ
 水煎シ用フ○痙攣ノ諸症ヲ治シ疼痛ヲ止ルニ良
 効アリ水煎或ハ泡劑。浸劑トノ内服シ或ハ葡萄酒
 ヲ加テ蒸湯劑トシ或ハパッパ琶布或ハ吉利詞キリス。テール爹兒トシ
 施ノ皆良故ニ又子宮衝逆ノ諸症。胃腸ノ攣急痛或
 ハ腎痛。淋疾痛或ハ孕婦臨月ニ發スル臨産痛ノ如

キ腰痛或ハ産後腰痛等ニ驗アリ○痛風走注痛。傷
 冷毒痛等ノ焮衝ナキ症ニ泡劑或ハ浸劑トシ或ハ
 亞的爾アデルヲ加テ用ヒ或ハ是ヲ外敷スルモ良○下利
 赤痢ニ多ク用フ痢ノ腹痛頑固ニノ休ヤガル症ニハ
 泡劑トシ用ヒテ効アリ是レ能ク攣急痛ヲ緩解シ
 衰弱ヲ強壯シ腐敗ヲ防ク性功アレバナリ○赤痢
 ヲ治スルニ是ヲ葡萄酒ニ浸シ甘消石精或ハ芙蓉
 少許ヲ加ヘ用テ偉効アリ或ハ是ニ傷冷毒ヲ兼テ
 發汗スベキ症アル片ハ殊ニ良○破氣驅風ノ効ヲ
 稱ス故ニ風氣痞滯ニ因ル心腹痛。疝痛。腹鳴等ヲ驅

散ス○服量末ハ半錢ヨリ一二錢ニ至ル。泡劑浸劑
ハ四錢ヨリ六錢許ヲ取テ沸湯ハ多ニ泡出シ用フ
水ニ浸スモ或ハ水煎或ハ葡萄酒乳汁等ニ煮テ温
是ニ同シ
服ス○外敷ノ輕ク衝動シ硬腫ヲ軟化シ急迫ヲ緩
メ痛ヲ止メ腫瘍ヲ消散シ或ハ化膿ス或ハ經久ノ
潰瘍ヲ淨除シ或ハ虚弱ノ嗽衝ヲ消シ或ハ頭痛膠
攣急痛支節痛或ハ子宮衝逆膀胱瘻膀胱攣急ノ小便淋瀝或ハ尿
閉ス等ニ蒸濕劑或ハ琶布トシ或ハ吉利詞參兒ト
シ施メ効アリ○此藥ハ特ニ腐敗ヲ遏メ血液ノ炸
解ヲ防グノ効ヲ稱ス或說ニ一片ノ肉ヲ此浸劑ニ

淹シ貯フレバ全夏腐敗セズト云故ニ腐敗ノ潰瘍。
寒壞疽ニ此末ヲ摻シ癩瘡或ハ臭穢ノ鼻瘍ハ水銃
ヲ以テ此浸劑ヲ注入シ洗フテ驗アリ○壞疽ニハ
幾那キナ或ハ罌樹皮ノ煎汁ニ是ヲ加ヘ蒸濕ノ良○虛
弱ニ屬スル咽喉口中焮腫或ハ懸壅垂ノ緩弛ノ腫
脹スルニ是ヲ葡萄酒等ニ浸シ含漱ノ治ス○是ヲ
葡萄酒ニ加ヘ煮テ琶布トシ温ナルヲ焮腫ニ貼メ
能濃ヲ釀ス○羅斯様ノ焮腫ハ左ノ熨方尤効アリ

加密列熨方

加密列

刺賢堙兒花

芸香葉

大麥粉 握各一 羯布羅 末一 錢半

右合和シ二個ノ布袋ニ入レ更換シ温メテ患部ニ貼ス○加密列ハ諸獸咬傷一切毒螫傷ニ内服外敷ノ良○羅護設加密列ハ性功尤峻ナリ故ニ尋常ノ品ニ比スレバ服量少ク用フベシ感觸シ易キ人ハ腹痛嘔吐等ヲ發スルコトアリ斯依遇劫

加カ密列蒸餾油 オレウムカモミルラヂスチルリ羅
製法 花ヲ採リ陰乾シ細ニ搗キ温湯ニ浸スコト一宿ニ蒸餾ス其法薄荷油ノ條ニ説ク如シ其油ハ天藍色ナリ但油ヲ得ルコト甚ダ少シ凡ソ花一北ヨ

リ油僅ニ三斗許出ツ故ニ多クハ加カ密列煎油ヲ代用ス主治加密列主治ノ諸病ニ内服ノ尤モ効アリヨク閉塞ヲ開キ汗ヲ發ス服量五六滴ヨリ十滴ニ至

加カ密列煎油 オレウムカモミルラヂコク左ム羅

製法 加カ密列 新乾者 六斗

阿利襪油 二北

右花ノ瓣ヲ去リ黄心ヲ取り硝子壘ニ入レ油ヲ加ヘ固封シ沙火ニ入レ藥氣ヲ浸出スルコト十二時ニノ取出シ布袋ニ入レ絞テ油ヲ取り放冷メ其稠厚

ノ渣脚ヲ去リ硝子曇ニ入レ固封シ貯フ○乙切草
 油。百合油ノ製法モ是ニ同シ〔按〕
 主治 外敷ノ堅硬ヲ軟ラゲ腫瘍ヲ化熟シ痛ヲ止メ
 内服ノ風氣ヲ驅リ肢節痛及ビ淋疾痛ヲ祛キ痙攣
 硬強ヲ緩弛ス〔疾〕〔叔〕

遠西醫方名物考卷六終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭 內景醫範提綱 棟齋宇由先生著

全三冊 宇由川格庵先生著 八五三冊

同 內象銅版圖 同上

全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完

增補和蘭藥鏡 同上

全八冊 醫療正始 十善伊東先生著 每篇三冊完

遠西醫方名物考 同上

全八冊 泰西名醫彙講 蘇川實作先生著

同 補遺 同上

全九冊 要術知新 八幡堂先生著 全三冊

瘍醫新書 去澤大龜先生著

全四冊 醫方例幾 保羅足立先生著 每篇三冊完

蘭學階梯 同上

全三冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上


全一帖 西音發微 大龜堂先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著

病學通論 出雲精乃先生譯述 初篇三冊出完 一篇三篇四篇

濟生二方 杉田成卿先生譯

四冊 青藜閣 江ノ改草芳町三丁目 須原屋伊八



榛齋字田川先生著

二篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

天澤氏