


三因極一方

八九

癩癩	便血	衄血	健忘	七氣	六聚	三焦精府辨正	内 ^卷 所因論	五臟六府虛實寒熱
狂証	風刺下血尿血	吐血	虛煩	五噎	息積	疝冬積熱		
心痛		瘀血	五痿	五膈	五勞	五積		
	癥瘕	汗血	失血論	胸痞 ^卷	六極			




糊等で貼り付けられている部分がめくれない箇所あり

内閣文庫	漢書
三〇〇函	架
一八	冊
九	號
九	類

漢書門	一三五
八四九九	冊架函號類

内閣文庫	番號	漢 12539
冊數	8 (4)	
函號	300	208




三因

一病

論

卷之六

內所因論



夫臟腑合手足三陰三陽為十二經各有所主故為十二官
 心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉脾者將
 軍之官謀慮出焉脾者諫議之官公正出焉腎者作強之官
 伎巧出焉膽者中正之官決斷出焉膾中者臣使之官喜樂
 出焉小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳送之官變化出
 焉胃者倉廩之官五味出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀
 胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故五臟為陰六腑
 為陽此十二官不得相失者正由陰陽消息盈虛當隨四序
 而調養之不可使其偏勝偏勝則偏復偏復則偏害勝剋流
 變則真病生焉夫陰陽虛實者乃臟腑更相勝復也若其子
 母相感則母虛能令子實子實能令母安也曰實則厚其母

虛則補其子如肝實則浮腎肝虛則補心如百姓足君孰與不足此經之本意也難經則及是及觀金匱之論其得為多肝實補用酸助用焦若益用甘味之藥酸入肝焦若入心甘入脾脾能制腎策微弱則水不行水不行則心火盛心火腎盛則肺金受制肝氣乃舒肝氣舒則肝病自愈此補子之意也虛肝則用此實則反之千金亦云肝虛當補心心旺則感於肝皆此類也此正本截十二官冷熱盈虛而為病非外感淫邪及故為背理者之比然內所因惟屬七情交錯愛惡相勝而為病能推而明之比約而不濫學者宜留神焉

內所因治說

論云治傷寒有法醫雜病有方方即義方法即法令外病用法令猶奸邪外擾非刑不除內病用義方猶父兄子弟不足以禮格之而已故內外之治由是而分外邪難辨當以例明

內證易知只叙方證學者不可不審

肝膽經虛實寒熱證治

浮肝湯治肝實熱陽乘伏邪脹痛忿怒發熱喘逆滿悶目痛視物不明狂悖非意而言乍寬乍急所依反常

前胡去苗 紫胡 秦皮去麩 細辛去苗 梔子仁
黃芩 升麻 麩仁 決明子各等分

右剉散每服四錢水兩盞苦竹葉車前葉各五片葉至盞半內藥再實至八分去滓入芒消一錢匕葉鑿不以時服

浮膽湯治膽實熱及酒人惡寒腹中築滿腹下硬口苦咽乾頭疼不欲食

半夏三兩湯洗去滑 地黃五兩 酸棗仁二兩 黃芩一兩
遠志去心姜汁合炒 茯苓各二兩 甘草炙一兩

右劉散長流水一斗糯米一升煮蠲浪沸湯二三千遍
澄清每用二盞抄藥四錢七薑七片剪七分去滓不以
時服

補肝湯治肝虛寒兩股滿筋急不得太息寒熱腹滿不欲飲
食愠悒不樂四肢冷發搶心腹痛目視眩或左股偏痛
筋萎脚弱及治婦人心痛乳癰膝熱消渴瓜甲枯面青

山茱萸 甘草 桂心 細辛 茯苓
桃仁 麸炒 柏子仁 防風 川烏頭 炮去皮
去皮去 各一 兩 各二 兩 各一 兩 各一 兩

右劉散每服四大錢水盞半薑五片棗三枚剪至七分
去滓空心服

溫膽湯治膽虛寒眩厥足痿指不能搖臂不能起僵仆目黃
失精虛勞煩擾因驚膽懾奔氣在胸喘滿浮腫不睡
半夏 湯洗 麥門冬 去心 各 一兩半 茯苓 二兩 酸棗仁 炒 三兩

甘草 桂心 遠志 黃芩 草薢 人參
去心姜 汁合炒 各一 兩 各一 兩 各一 兩 各一 兩 各一 兩

右為劉散每服四大錢用長流水一斗糯米煮如浮膽
湯法一方見虛煩門

心小腸經虛實寒熱證治

浮心湯治心實熱心下痞滿身重發熱乾嘔不安腹中雷鳴
淫澀不利水穀不消欲吐不吐煩悶喘急

黃連 半夏 黃芩 甘草 人參
去毛 湯洗 各一 兩 各一 兩 各一 兩 各一 兩 各一 兩

右為劉散每服四大錢水兩盞棗三枚剪七分去滓服
并治霍亂若塞加附子一枚炮去皮臍若渴加栝樓根
嘔加橘皮痛加當歸容熱以生薑代乾薑

清脈湯治小腸實熱身熱手足心熱汗不出心中煩滿結塞
不通口瘡身重

寒寒

柴胡 澤泻 橘皮 芒消 枳實去穢炒 生地黃各等分

右判散每服四錢水盞半藥七分去滓下芒消再藥

服不以時

茯苓補心湯治心虛寒苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒病恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓 人參 前胡 半夏湯洗七次去滑 川芎各三分
橘皮 枳殼去穢炒 紫蘇 枳梗 甘草炙
乾薑各半兩 當歸一分兩 白芍藥二兩 熟地黃一兩半
右判散每服四大錢水盞半薑五片棗一枚藥七分去滓食前服

分氣補心湯治心氣鬱結怔忡噎悶四肢浮腫上氣喘急

大腹皮炒 香附炒去毛 白茯苓 桔梗各一兩 木通
甘草炙 川芎 前胡去苗 青橘炒 枳殼去穢炒
白木各三分 細辛去苗 木香各半兩

右判散每服四大錢水一盞薑三片棗一枚藥七分去滓食前服
溫脾湯治水腸虛寒苦頭偏痛類頰 疔疔痛裏急後重

乾薑一兩 當歸 黃蘗 地榆各二兩
阿膠炒 茴香炒 檳榔炒 黃連各一兩
右判散每服四錢水盞半藥七分去滓溫服
脾胃經虛寒熱證治

清脾湯治實熱病苦足寒腫熱腹脹滿煩擾不得卧舌本脾強躄重面黃頭痛右腿滿痛偏脹口唇乾裂寒熱如瘧

柴胡 澤泻 橘皮 芒消 枳實去穢炒 生地黃各等分

右判散每服四錢水盞半藥七分去滓下芒消再藥熱

服不以時

茯苓補心湯治心虛寒苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒病
恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽
喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻吐嘔
眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓 人參 前胡 半夏湯洗七次去滑 川芎各三分
橘皮 枳殼去穢炒 紫蘇 枳梗 甘草炙
乾薑各半兩 當歸一分兩 白芍藥二兩 熟地黃一兩半
右判散每服四大錢水盞半薑五片棗一枚藥七分去
滓食前服

分氣補心湯治心氣鬱結怔忡噎悶四肢浮腫上氣喘急

大腹皮炒 香附炒去毛 白茯苓 桔梗各一兩 木通
甘草炙 川芎 前胡去苗 青橘炒 枳殼去穢炒
白木各三分 細辛去苗 木香各半兩

右判散每服四大錢水一盞薑三片棗一枚藥七分去
滓食前濕脹

溫脾湯治水腸虛寒苦
疔痛裏急後重

乾薑一兩 當歸 黃蘗 地榆各二兩
阿膠炙炒 苗 石橘皮 黃連各一兩
右判散每服四錢水盞半藥七分去滓溫服
脾胃經虛寒熱證治

清脾湯治實熱病苦足寒腫熱腹脹滿煩擾不得卧舌本脾
強躄重面黃頭痛右腿滿痛偏脹口舌乾烈寒熱如瘧

茯苓 橘皮 草葉去皮 白朮各二兩 人參
桂心 白芷 甘草各 川芎各一兩 半夏洗

右為對散每服四大錢水二盞姜七次紫蘇三葉葉七
分去滓服欲通利加大黃

平胃散治胃實熱口唇乾嘔噦煩悶大小便秘澁及熱病後
餘熱不除蓄于胃中四肢發熱口渴渴曾滿无汗

厚朴去皮姜製炒 射干未洗 升麻 茯苓各一兩
芍藥二兩 枳殼去穢炒 大黃蒸 甘草各一兩

右為對散每服四錢水一盞葉七分去滓空心熱服
補脾湯治脾虛寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得卧腸鳴

虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噫四肢逆冷多卧少起
人參 茯苓 草葉去皮 乾薑炮各一兩

麥蘖炒 甘草各一兩 厚朴去皮姜製炒 橘皮 白朮各三兩

右為對散每服四錢水一盞半葉七分去滓食前服
養胃湯治胃虛寒脘寒不得卧漸二惡風洒灑惡寒腹中痛

虛鳴寒熱如瘧唇口乾面目虛浮嘔吐瀉四肢疼痛不
思飲食或傷寒濕骨節皆痛

厚朴姜製 藿香去梗 半夏湯洗七次 茯苓各一兩 人參
甘草各 附子炮去皮臍 橘皮各三分 草葉去皮 白朮各半兩

右對散每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半分葉
七分去滓空心服常服溫胃消痰進食下氣辟寒疫

肺大腸經虛實寒熱證治
清肺湯治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆咳嗽咽中塞如

嘔狀短氣客熱或唾膿血
薏苡仁 防己 杏仁 冬瓜子仁三分

雞子白皮一分

茯苓 橘皮 草菓皮去 白朮各二兩 人參
桂心 白芷 甘草各 川芎各一兩 半夏洗三兩

右為對散每服四大錢水二盞姜七次紫蘇三葉葉七
分去滓服欲通利加大黃

平胃散治胃實熱口厚乾嘔噦煩悶大小便秘澁及熱病後
餘熱不除蓄于胃中四肢發熱口渴胃滿无汗

厚朴去皮姜製炒 射干未洗 升麻 茯苓各一兩半
芍藥二兩 枳殼麸炒 大黃蒸 甘草各一兩

右為對散每服四錢水一盞葉七分去滓空心熱服
補脾湯治脾虛寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得卧腸鳴

靈脹飲食不消勞倦虛羸喜噫四肢逆冷多卧少起
人參 茯苓 草菓去皮 乾薑炮各一兩
麥蘖炒 甘草各一兩半 厚朴去皮姜製炒 橘皮 白朮各三分

右為對散每服四錢水一盞半葉七分去滓食前服

養胃湯治胃虛寒脘寒不得卧漸二惡風洒灑惡寒腹中痛
虛鳴寒熱如瘧言思飲食或傷寒得胃節皆痛

厚朴姜製 藿香去梗 半夏湯洗七次 茯苓各一兩 人參
甘草各 附子炮去皮 橘皮各三分 草菓去皮 白朮各半兩

右對散每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半分葉
七分去滓空心服常服溫胃消痰進食下氣辟寒疫

肺大腸經虛實寒熱證治

清肺湯治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆咳嗽咽中塞如
嘔狀短氣客熱或唾膿血

薏苡仁 防己 杏仁 冬瓜子仁三分
雞子白皮一分

右為剉散每服四錢先以葶葉切半握水二盞煎盡半入藥同煎至七分去滓食前服

瀉白湯治大腸實熱腹脹不通俠臍痛食不化喘不能久立口生瘡

橘皮 淡竹茹 黃芩 梔子仁

藥皮各一兩 茯苓各一兩 芒消各一兩 生地黄各一兩

右為剉散每服四錢水盞半姜棗煎七分空心服

補肺湯治肺寒虛逆滿上氣咽中悶塞寒從背起口中如含

冰雪詔无音舌本乾燥吐沫唾血不能飲食

款冬花 桂心各一兩 桑白皮各四兩 人參 紫菀茸各一兩

白石英各一兩 五味子 鐘乳粉各一兩 麥門冬各二兩

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚粳米一撮同煎七分去滓食前服

固腸湯治大腸虛寒利下青白腸中雷鳴相逐大便不節小便赤黃

便赤黃氣上衝胃不能久立身腫腹急當臍痛甚主之

酸石榴皮各半兩 黃連炒 地榆各一兩 罌粟殼各一兩 茯苓各一兩

右剉散每服四錢水盞半薑五片烏梅一個煎七分去滓空心服

腎膀胱經虛實寒熱證治

清厚湯治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾滑熱小便赤黃

腰脊離解及伏水等

茯苓 黃芩 葛蒲各五兩 玄三 細辛各四兩

大黃水浸 甘草各一兩 磁石各八兩

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓熱服

瀉浮瀉治膀胱是八寶各一兩 腰脊痛閉塞不通舌乾咽腫甚主之

茯苓 梔子仁 知母各三兩 生地黄

三國藥典

右為對散每服四錢先以葶葉切半握水二盞煎盡半入藥同煎至七分去滓食前服

瀉白湯治大腸實熱腹脹不通便臍痛食不化喘不能久立口生瘡

橘皮 淡竹茹 黃芩 梔子仁

藥皮各一兩 茯苓各一兩 芒消各一兩 生地黄各一兩

右為對散每服四錢水盞半姜棗煎七分空心服

補肺湯治肺寒虛逆滿上氣咽中悶塞寒從背起口中如含

冰雪詔无音舌本乾燥吐沫唾血不能飲食

款冬花 桂心各一兩 桑白皮各一兩 人參 紫菀茸各一兩

白石英各一兩 五味子 鐘乳粉各一兩 麥門冬各一兩

右對散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚粳米一撮同煎七分去滓食前服

固腸湯治大腸虛寒利下青白腸中雷鳴相逐大便不節小便赤黃氣上衝胃不能久立身腫腹急當臍痛甚主之

酸石榴皮各半兩 黃連各一兩 地榆各一兩 罌粟殼各一兩 茯苓各一兩

右對散每服四錢水盞半薑五片烏梅一個煎七分去滓空心服

腎膀胱經虛實寒熱證治

清厚湯治腎實熱小腹脹滿四肢心黑耳聾脊熱小便赤黃腰脊離解及伏水等

茯苓 黃芩 菖蒲各一兩 玄三 細辛各一兩

水浸 甘草各一兩 磁石各一兩

右為對散每服四錢水一盞煎七分去滓熱服

瀉浮油 此是扱腰脊痛閉塞不通舌乾咽腫甚主之

茯苓 梔子仁 知母各一兩 生地黄

淡竹葉 各五兩 石膏 八兩 煨

右為對散每服四錢水盞半煨七分入蜜半匙煨兩沸 煎服須利加芒消一錢七

溫腎散治腎虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱足腰不可以接語 音混濁陽氣頽絕

熟乾地黄 酒浸 麥門冬 去心 牛膝 酒浸

五味子 去心 甘草 炙各 茯神 去木

乾姜 炮各 杜仲 去蘆皮剉姜汁

右為末每服二錢溫酒調下空心日二三服

補浮瀉治膀胱虛冷脚筋急腹痛引腰背不可屈伸耳聾目 眩坐欲倒小便數遺白面黑如炭

黃芪 各一兩 杜仲 去皮剉姜汁淹

磁石 煨碎 五味子 各三兩 白木 炒新絲各三兩 白石英 搗碎各

右為對散每服四錢水盞半煨七分去滓空心溫服

心主三焦經虛寒熱證治

清腫瀉治右腎實熱身熱脊脹相引痛足冷小便黃赤如梔 子藥汁每欲小便即莖頭痛

榆白皮 各五兩 冬葵子 各五兩 石葦 四兩 黃苓 去毛

通草 各三兩 瞿麥 各三兩

右為煎末先以水二盞入車前葉數片煨至五盞半入藥 末四錢再煨七分去滓煎服

潤焦湯治三焦實熱目亢皆急痛腰脊連膈中煩悶 飲食未定頭面汗出闔格不通不吐不下或氣逆不續走 哺不禁或泄瀉溺澁遺瀝

地骨皮 半斤 柴胡 湯洗七次 澤瀉 各五兩 茯苓

麥門冬 去心 甘草 炙 人參 各一兩

右劉散每服四錢水二盞姜伍片竹茹如指大前七分去滓空心服

益志湯

治右腎虛寒小便數腰肢引痛短氣欬逆四肢煩疼耳鳴面黑骨間熱夢遺白濁目眩諸虛困乏

廉茸酢塗去毛

巴戟去心

熟乾地黄

酒浸

枸杞子

菖蓉酒浸

牛膝酒浸

附子炮去皮

桂心不焙

山茱萸

白芍藥

防風

去義

甘草

右劉散每服四大錢水盞半姜五片鹽少許麥七分去滓食前服

安中散治三焦虛寒短氣不續腹不安食隨即洩下小便赤濁精洩不禁脚腫酸疼小腹脹滿

熟地黄

巴戟天

去心

龍骨

各二兩半

遠志

去心炒

茯苓各三兩

天雄

炮去皮

五味子

山藥

各三兩半

菖蓉酒浸

續斷

各四兩

蛇床子

略炒

兔絲子

酒浸各四兩半

右為細末每服二錢七溫酒調下夫三焦屬精腑臟精以養身係累于心脾腎三經人多以醉飽心虛而合陰陽故此病作唯謹之為得

三焦精府辨正

古人謂左腎為腎截其腑膀胱右腎為命門其腑三焦三焦者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉自中出夾脊而上貫于腦所以經云丈夫截精女子繫胞以理推之三焦當如上說有形可見為是扁鵲乃云三焦有位无形其意以為上中二焦如漚如霧下焦如瀆不可遍見故曰有位無形而王叔和輩失其旨意遽云无状空有名伴後輩承繆不已且名以召寔无寔矣召果其无形尚何以截精繫胞為哉其所謂三焦者何也上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下

焦在脐下即肾间动气分布人身有上中下之異方人湛寂
慾相不興則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火
熾然翕撮三焦精氣流溢並命門輸写而去故號此府為三
焦耳柔者不悟可為長太息

痼冷積熱證治

夫以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方論
中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不
寔復啖生冷雪之屬致腸胃虛寒陰既停癡陽不能正大
便洞泄小便頻併鼻多清涕嘔吐涎沫水穀不化洒灑漸
皆陽虛陰盛之所為也積熱者臟腑燥也多因精血既衰三
焦煩壅復耐丹石酒炙之屬致腸胃蘊毒陽既熾盛陰不能
制大便秘澀小便赤淋口苦咽乾涎膠淡眼淚元度揮
熯皆陰虛陽盛之所為也治各有方

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨杜陽道除久寒痼冷補勞傷

虛損治男子腰腎久冷心腹積聚腹下冷癖腹中諸虫失
精遺溺疲羸力弱脚膝疼痛冷瓜頑痺上氣衄血咳逆寒
熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蘞生瘡下血不止及
婦人血結寒熱陰疽瘡

硫黃一斤先飛煉去砂石秤為末用瓷合盛以研

水和赤石脂封口鹽泥固濟臘乾地內先埋一
小錐子盛水令滿安合子心上下泥固濟訖慢
火養七日七夜候足加煨候冷取出

右研為細末每一兩用炊餅一兩湯浸握去水脉為丸
如梧子大每服三十九多至百回温米飲下空心服之
又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利自汗不
止或小便不禁不拘回教併服得身熱脉出為度

震靈丹補虛壯氣暖腎祛邪益精髓温脾胃進飲食悅顏色
治真氣虛備脐腹冷痛肢躄酸疼腰背拘急脚膝緩弱面

焦在脐下即肾间动气分布人身有上中下之異方人湛寂
慾相不興則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火
熾然翕撮三焦精氣流溢並命門輸写而去故號此府為三
焦耳柔者不悟可為長太息

痼冷積熱證治

夫以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方論
中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不
寔復啖生冷雪之屬致腸胃虛寒陰既停癡陽不能正大
便洞泄小便頻併鼻多清涕嘔吐涎沫水穀不化洒灑漸
皆陽虛陰盛之所為也積熱者臟腑燥也多因精血既衰三
焦煩壅復耐丹石酒炙之屬致腸胃蘊毒陽既熾盛陰不能
制大便秘澀小便赤淋口苦咽乾稠眵淡飲食无度揮
熇昏陰虛陽盛之所為也治各有方

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨杜陽道除久寒痼冷補勞傷
虛損治男子腰腎久冷心腹積聚腹下冷癖腹中諸虫失
精遺溺形羸力弱脚膝疼痛冷風頑痺上氣衄血咳逆寒
熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蘊生瘡下血不止及
婦人血結六經

硫黃

一斤先飛煉去砂石秤為末用麩合盛以研
水和赤石脂封口鹽泥固濟臘乾地內先理一
小錐子盛水令滿止在二用泥固濟訖慢
火養七日七夜候足加煨候冷取出

右研為細末每一兩用炊餅一兩湯浸握去水脉為丸
如梧子大每服三十九多至百回温米飲下空心服之
又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利自汗不
止或小便不禁不拘回數併服得身熱脉出為度

震靈丹補虛壯氣暖腎祛邪益精髓温脾胃進飲食悅顏色
治真氣虛備脐腹冷痛肢躄酸疼腰背拘急脚膝緩弱面

色痿黃目眩耳鳴心怔氣短大便自利小便頻數口乾煩渴飲食无味大治婦人崩中帶下參拾陸病小兒驚疳及一切痼冷風虛志主之常服育神養氣輕身延年此藥制合陰陽功伴造化苗心胎餅百病不生真濟世衛生之室

丁頭代赫石 各四兩 禹餘糧石 揀紅紫色者 紫石英

赤石脂 各四兩 右各為細末並入砂合內用赤石脂固口縫以炭一秤簇頂煨候火消及七分存三分火取出合子令冷開却合先於地上掘一坑深尺餘用厚紙兩重襯定傾藥在上以新瓦盆子覆之四畔將黃土遍壅一宿取出再入乳香沒藥二兩五靈脂二兩都為細末一處將前藥合和勻再研極細煮糯米糊和勻杵教于下山如雞頭大每服二回或五回空心濃煎薑棗湯下忌六畜血

涼膈散治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥謔妄及腸胃燥澀便溺秘結一切風壅

大黃 莖 朴消 甘草 各三兩 山梔子仁 黃芩 薄荷 各一兩 連翹 四兩

右為末每服二錢水一盞竹葉七片蜜少許同煎七分去滓食後服

洗心散治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼淚睛疼及大小便秘澀

大黃 莖 甘藷 大 當歸 芍藥 麻黃 去節 荊芥 穗各六兩 白木 一兩半

右為末每服一錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去

澤溫服小兒豆瘡欲發先狂語多渴及驚風積熱可服
一錢臨卧服如大人五臟壅實欲要瀉轉加至四五錢
乘熱服

五積證治

五積者五臟之所積皆臟氣不平也時相近而成其病如夏
傷脾以所勝傳肝遇長夏脾王傳剋不行故成肝積名曰
肥氣肥氣者以其積氣藏於肝木之下猶肥遁於山林也失
志傷腎以所勝傳心遇秋肺王傳剋不行故成心積名曰
伏梁伏梁者以其積氣橫架於脊原也怒則傷肝肝以所勝
傳脾遇冬腎王傳剋不行故成脾積名曰痞氣痞者以積氣痞
寒中脘也喜則傷心以所勝傳肺遇春肝王傳剋不行故
成肺積名曰息責者以積氣喘息責溢也思則傷脾脾息責
以所勝傳腎遇夏心剋不行故成腎積名曰奔豚奔豚

者猶水畜奔衝於心火也難經以肥氣成於戊巳伏梁成於
庚辛以至奔豚成於丙丁者正合陰陽施化休王乘剋之大
義也又論曰病有積有聚有聲響氣積者藏病也終始不移聚
者府病也發无定處展轉痛移為可治聲響氣者即宿食也由
聲響鉗之邪從口入更有息積病乃氣息癱滯於腹下非導引
不行

肥氣山治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久久
不愈發欬逆嘔痰瘧連歲月不已其脉弦而細

青皮炒二兩 當歸鬚 蒼朮各一兩 蛇含石煨醋淬
蓬朮切 三稜切 鐵孕粉各三兩 醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸菜豆大每服四十丸當飯後酒下

伏梁山治心之積起於臍上上至心大如小久久不已病煩
心身躄股脊腫壞而痛其脉沈而芤

淳溫服小兒豆瘡欲發先狂語多渴及驚風積熱可服
一錢臨臥服如大人五臟壅實欲要滯轉加至四五錢
乘熱服

互積證治

互積者五臟之所積皆臟氣不平也時相近而成其病如夏
傷脾以所勝傳肝過長夏脾王傳剋不行故成肝積名曰
肥氣肥氣者以其積氣藏於肝木之下猶肥遁於山林也失
志傷腎以所勝傳心過秋肺王傳剋不行故成心積名曰
伏梁伏梁者以其積氣橫架於脊原也怒則傷肝肝以所勝
傳脾過冬腎王傳剋不行故成脾積名曰痞氣者以積氣痞
寒中脘也喜則傷心以所勝傳肺過春肝王傳剋不行故
成肺積名曰息賁者以積氣喘息者溢也思則傷脾脾息賁
以所勝傳腎過夏心王傳剋不行故成腎積名曰奔豚奔豚

者猶水畜奔衝於心火也難經以肥氣成於戊巳伏梁成於
庚辛以至奔豚成於丙丁者正合陰陽施化休王乘剋之大
義也又論曰病有積有聚有聲香氣積者藏病也終始不移聚
者府病也發无定處展轉痛積為可治聲香氣者即宿食也由
聲響鉗之邪從口入更有息積病乃氣息癱滯於腹下非道引
不行

肥氣山治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如鼃蟄狀久久
不愈發欬逆嘔痰連歲月不已其脉弦而細

青皮 炒二兩 當歸 鬚 蒼朮 各一兩 蛇含石 煨醋滓 各半
蓬朮 切 三稜 切 鐵孕粉 各三兩 與三稜蓬朮 日入醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸菜豆大每服四十丸當飯浸酒下

伏梁山治心之積起於臍上上至心大如小久久不已病煩
心身躄股脊腫壞而痛其脉沈而芤

茯苓

厚朴

姜汁製炒

人參

枳殼

麸炒

白朮

半夏

湯洗七次

三稜

慢火煨熟乘熱搗

右等分爲末煮糊丸梧子大米飲下二十日食前日兩

服作散酒調服絕勝

痞氣山治脾之積在胃管覆大如盤久久不愈病四肢不

黃瘴飲食不爲肌膏心痛徹背久痛徹心脉浮大而長

大烏頭

一分炮

附子

半兩炮

赤石脂

煨醋

川椒

炒出

乾薑

炮各

桂心

半兩

右爲末蜜丸如梧子大朱砂爲衣每服五七丸米湯下

漸至十日

息賁湯治肺之積在右腹下大如覆杯久久不愈病洒洒寒

挾氣逆喘咳發爲肺癰其脉浮而毛

半夏

湯洗

吳茱萸

湯洗

桂心

各二

人參

甘草

炙

栝白皮

炙

葶藶

炒各二

右爲剉散每服四錢水一盞半姜七片棗兩枳殼七分

去滓食前服

奔豚湯治腎之積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下无

時久不已病喘逆骨痠少氣其脉沈而滑

甘季根皮

焙

乾葛

各一分

當歸

各一分

川芎

白芍藥

甘草

黃芩

各二

半夏

湯洗七

右爲剉散每服四錢水盞半姜七分去滓服

六聚證治

六府者大小腸胃膽膀胱三焦者也屬於三陽太陽利清氣

陽明泄瀉氣少陽化精氣如都會之府主轉輸以爲常也六

府失常則壅聚不通故實而轉虛而輸隨氣往來痛无定不

處在上則格在下則脹傍攻兩腹如有坵塊易於轉變非互

茯苓 厚朴姜汁製炒 人參 枳殼麸炒

白朮 半夏湯洗七次 三稜慢火煨熟乘熱搗

右等分爲末煮糊丸梧子大米飲下二十日食前日兩服作散酒調服絕勝

痞氣山治脾之積在胃管覆大如盤久久不愈病四肢不收

黃瘴飲食不爲肌膏心痛徹背人痛徹心脉浮大而長

大烏頭一分炮去皮尖 附子半兩炮去皮臍 赤石脂煨醋

川椒炒出 乾薑炮各二兩 桂心半兩

右爲末蜜丸如梧子大朱砂爲衣每服五七丸未湯下漸至十日

治肺之積在右腋下大如覆杯久久不愈病洒洒寒

熱氣逆喘咳發爲肺癰其脉浮而毛

半夏湯洗七次 吳茱萸湯洗 桂心各二兩 人參

甘草 桑白皮 葶藶炒各二兩

右爲剉散每服四錢水一盞半姜七片棗兩枚煎七分去滓食前服

奔豚湯治腎之積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下无時久不已病喘逆骨痠少氣其脉沈而滑

甘季根皮干焙 乾葛各一分 當歸 川芎

白芍藥 甘草 黃芩各二兩 半夏湯洗七次四兩

右爲剉散每服四錢水盞半姜七分去滓服

六聚證治

六府者大小腸胃膽膀胱三焦者也屬於三陽太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣如都會之府主轉輸以爲常也六府失常則壅聚不通故實而轉虛而輸隨氣往來痛无定不處在上則格在下則脹傍攻兩脇如有坵塊易於轉變非互

臟比

散衆湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰腹上室室^如而咳滿悶小腹腹脹大小便不利或復泄瀉淋瀝无度遺精白濁狀若虛勞

若^下如^上

半夏湯洗七次

檳榔各三分

橘皮二兩

當歸三分

杏仁皮去

桂心各二兩

茯苓

甘草炙

附子炮去

川芎

枳殼去穢

厚朴姜汁製

吳茱萸湯洗各壹兩

右劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服大便不利加大黃

息積證治

病者腹下滿氣逆息難頻歲不愈名曰息積因氣由滯癖於腹下不在臟腑榮衛之間積久成氣不干胃故不妨飲食

之則火熱內燥刺之則反動其經雖脹消化之藥不能得治且積以導引助而行之

磨積山治腸胃因虛氣癖於育膜之外流於季膜氣逆息難揚^下揚^上可^心可^心回所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰為癰膿

多致不救

胡椒一宿五粒

木香一分

全蝎十個至毒

右為末粟米飲^山如菜豆大每服十五^山橘皮湯下

化氣湯治息積癖于腹腹之下偏脹鼓滿不妨飲食鐵藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾^血

縮砂仁

桂心

木香各一分

甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

生薑乾

蓬朮炮各半兩

胡椒

沈香各一錢一字

右為末每服二錢姜蘓鹽湯調下婦人醋湯調服

臍比

散衆湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺氣室空喘咳滿悶小腹腹脹大小便不利或復泄瀉淋瀝无度遺精白濁狀若虛勞

若如十

半夏湯洗七次

檳榔各三分

橘皮二兩

當歸三分

杏仁皮去

桂心各二兩

茯苓

甘草炙

附子皮去

川芎

枳殼去穢

厚朴姜汁製

吳茱萸湯洗各壹兩

右劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服大便不利加大黃

息積證治

病者臍下滿氣逆息難頻歲不愈名曰息積因氣由滯癖於臍下不在臍臍榮衛之間積久成氣不干胃故不妨飲食

之則火熱內燥刺之則反動其經雖脹消化之藥不能得治且積以導引助而行之

磨積山治腸胃因虛氣癖於育膜之外流於季臍氣逆息難暢日頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰為癰膿多致不救

胡椒一宿五粒

木香一分

全蝎十個至毒

右為末粟米飲日如菜豆大每服十五日橘皮湯下

化氣湯治息積癖于腹臍之下偏脹鼓滿不妨飲食鐵藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血

縮砂仁

桂心

木香各一分

甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

生薑乾

蓬朮炮各半兩

胡椒

沈香各一錢一字

右為末每服二錢姜蘓鹽湯調下婦人醋湯調服

導引法

以兩手母指壓无名指本節作拳按髀跂坐扣齒三十
六屏氣二十一燕（燕十）三口再屏息再燕如是三作以
氣通為效過子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多
隨意行之皆可不必拘此法

五勞證治

五勞者皆用意施為過傷五臟使五神不寧而為病故曰五
勞以其尽力謀慮則肝勞曲運神機則心勞意外致思則脾
勞預事而憂則肺勞矜持志節則腎勞是皆不量稟賦臨事
過美遂傷五臟以臟氣本有虛實因其虛實而分寒熱世醫
例以傳尸骨蒸為五勞者非也彼乃瘵疾各一門類不可不知
猪膏湯治肝勞實熱閉格牢洩閉塞不通毛悴色夭
猪膏（猪膏） 生薑汁（生薑汁） 青蒿汁（青蒿汁） 天门冬汁（天门冬汁）

右以微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不拘

時候

虎骨酒治肝勞虛寒口苦關節疼痛筋牽縮煩悶

虎骨

五兩 炙焦 碎豆大

三參 十兩

地骨皮

乾薑

芎藭

各一兩

熟地黄

一兩 三分

猪椒根

五加皮

枳實

炙炒 去穢 白朮

各一分

右為剉散以絹袋盛淳酒四斗浸四日初服二三合漸
加至一盞日再服食前

泄熱湯治心勞實熱口舌生瘡大便閉澀不通心滿痛小腸

澤瀉

梔子仁

黃芩

各三兩

桂心

通草

各二兩

石膏

八兩

大黃

莖

甘草

各一兩

右為剉散每服四錢水盞半藥七分去滓食前後熱盃
者更熱加芒消一錢更不以時服

定心湯治心勞虛寒驚悸恍惚多忘寢寐驚 神志不定

導引法

以兩手母指壓无名指本節作拳按脚趾坐扣齒三十
六屏息息燕氣三口再屏息再竅如是三作以
氣通為效過子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多
隨意行之皆可不必拘此法

五勞證治

五勞者皆用意施為過傷五臟使五神不寧而為病故曰五
勞以其尽力謀慮則肝勞曲運神機則心勞意外致思則脾
勞預事而憂則肺勞矜持志節則腎勞是皆不量稟賦臨事
過美遂傷五臟以臟氣本有虛實因其虛實而分寒熱世醫
例以傳尸骨蒸為五勞者非也彼乃瘵疾各一門類不可不知
猪膏湯治肝勞實熱閉格牢段閉塞不通毛悴色夭

猪膏

生薑汁各二 青蒿汁 天门冬汁各一

右以微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不拘
時候

虎骨酒治肝勞虛寒口苦關節疼痛筋牽縮煩悶

虎骨

五兩 炙焦 三參 十斤 兩 地骨皮 乾薑 芎藭各一

熟地黄

一分 兩 猪椒根 五加皮 枳實炙炒 各兩 白朮一分

右為剉散以絹袋盛淳酒四斗浸四日初服二三合漸
加至一盞日再服食前

泄熱湯治心勞實熱口舌生瘡大便閉澀不通心滿痛小腸

澤瀉

梔子仁 黃芩各三 桂心 通草各二

石膏

八兩 大黃莖 甘草各一兩

右為剉散每服四錢水盞半莖七分去滓食前後熱盪
者更熱加芒消一錢更不以時服

定心湯治心勞虛寒驚悸恍惚多忘寢寐驚 神志不定

導引法

以兩手母指壓无名指本節作拳按脚趾坐扣齒三十
六屏息息燕氣三口再屏息再葵如是三作以
氣通為效過子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多
隨意行之皆可不必拘此法

五勞證治

五勞者皆用意施為過傷五臟使五神不寧而為病故曰五
勞以其尽力謀慮則肝勞曲運神機則心勞意外致思則脾
勞預事而憂則肺勞矜持志節則腎勞是皆不量稟賦臨事
過羸遂傷五臟以臟氣本有虛實因其虛實而分寒熱世醫
例以傳尸骨蒸為五勞者非也彼乃瘵疾各一門類不可不知
猪膏湯治肝勞實熱閉格牢澁閉塞不通毛悴色夭
生薑汁各二 青蒿汁 天门冬汁各一

猪膏

右以微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不拘

時候

虎骨酒治肝勞虛寒口苦關節疼痛筋牽縮煩悶

- 虎骨五 三升二兩 地骨皮 乾薑 芎藭各一
- 熟地黄一兩三分 猪椒根 五加皮 枳實炙炒 白朮各兩

右為剉散以絹袋盛溽酒四斗浸四日初服二三合漸
加至一盞日再服食前

泄熱湯治心勞實熱口舌生瘡大便閉澀不通心滿痛小腸

- 澤瀉 梔子仁 黃芩各二 桂心 通草各二
- 石膏八兩 大黃莖 甘草炙各一兩

右為剉散每服四錢水盞半葉七分去滓食前後熱盞
者煎熟加芒消一錢煎不以時服
定心湯治心勞虛寒驚悸恍惚多忘夢寐驚 神志不定

茯苓 四兩 桂心 甘草 芍藥 白芍藥

乾薑 炮 遠志 去心 人參 各二兩

右剉散每服四錢水盞半棗兩枚剪七分去滓食前服

半夏湯治脾胃實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安

茯苓 白木 杏仁 各二兩 半

橘皮 芍藥 各二兩 半夏 湯洗 四兩

右剉散每服四錢水盞半生薑七片棗兩枚剪七分去

滓不以時服

茱萸膏治脾胃虛寒氣脹咽滿食不下通噎宿食臭

吳茱萸 湯先 一分 白木 五兩 猪膏 五兩 宿姜汁 八兩

右搗茱萸白木二味為末內薑汁膏中藥成膠飴每服

一大匙食前溫酒調下

引氣湯治肺勞實熱氣喘鼻張面目苦腫

橘皮 半兩 細辛 去苗 白木 桂心 各三兩 紫蘂 一兩

麻黃 湯 去節 杏仁 麩炒 石膏 八兩 半夏 各一兩二分

右剉散每服四錢水兩盞姜七片竹葉五片棗七分去

滓食後服

人參厚朴湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆持氣胃脹氣滿後會

連背痛嘔逆飲食即吐虛乏不足

人參 厚朴 姜製 甘草 各二兩 桂心 四兩

半夏 湯洗 五兩 橘皮 麥門冬 去心 各三兩

右剉散每服四錢水兩盞姜七片去滓食前服腹痛加

當歸

梔子湯治腎勞實熱小腹脹滿小便赤黃末有餘瀝數而少

葉中痛陰囊生瘡

梔子仁 芍藥 通草 石膏 各三兩

茯苓 四兩 桂心 甘草 各二 白芍藥

乾薑 炮 遠志 去心 人參 各二

右剉散每服四錢水盞半棗兩枚煎七分去滓食前服

半夏湯治脾胃勞實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安

茯苓 白木 杏仁 各二 各二兩半

橘皮 芍藥 各二 半夏 湯洗七

右剉散每服四錢水盞半生薑七片棗兩枚煎七分去

滓不以時服

茱萸膏治脾胃虛寒氣脹咽滿食不下通噎宿食食

吳茱萸 湯先一 白木 五兩 猪膏 五兩 宿姜汁 八兩

右搗茱萸白木二味為末內薑汁膏中藥成膠飴每服

一大匙食前溫酒調下

引氣湯治肺勞實熱氣喘鼻張面目苦腫

橘皮 半兩 細辛 去苗 白木 桂心 各三 紫蘘 一兩

麻黃 湯 去節 杏仁 麩炒 各一兩 各一兩二分

右剉散每服四錢水兩盞姜七片竹葉五片棗七分去

滓食後服

人參厚朴湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胃脹氣滿從胃

連背痛嘔逆飲食即吐虛乏不足

人參 厚朴 姜製 甘草 各二 桂心 四兩

半夏 湯洗 橘皮 麥門冬 去心 各

右剉散每服四錢水兩盞姜七片去滓食前服腹痛加

當歸

梔子湯治腎勞實熱小腹脹滿小便赤黃末有餘瀝數而少

葉中痛陰囊生瘡

梔子仁 芍藥 通草 石葦 各三兩

滑石 八兩 紫苓 四兩 熟地黄 榆白皮 各五兩
右劉散每服四錢水盞半淡竹葉七片同煎七分去滓
不以時服

五加皮湯治腎勞虛寒恐慮失志傷精損髓噁吸短氣遺泄
白濁小便赤黃陰下溫痒腰脊如折顏色枯悴

五加皮 十兩 丹參 八兩 石斛 八兩 杜仲 絲煎 附子 炮去皮臍 各五兩
牛膝 酒浸 秦艽 川芎 防風 桂心
獨活 各六兩 茯苓 四兩 麥門冬 去心 地骨皮 各三兩 薏苡仁 一兩
右為劉散每服每服四錢水盞半姜五片大麻子一
撮研破同煎七分去滓食前服

六極證治

臟猶庫藏主秘藏腑如會府主轉輸藏實則腑无不實腑虛
則臟亦因而致虛故六極者由腑虛致臟虛陰陽失度米衛

走本无以養筋脉皮肉骨髓故六物皆極人者窮絕之謂也
与洪範六極同意

犀角地黄湯治筋實極欬而兩眼痛不可轉動脚下滿不
得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩滿

生地黄 犀角 一兩 乾葛 玄參
枳子仁 升麻 各三分 大黃 半兩 芍藥 一兩
右為劉散每服四錢水盞半姜七分去滓不以時服惡
寒眩痛加麻黃頭疼加石膏姜半兩

烏麻酒治筋虛極好悲思四肢噁吸脚手拘牽伸動縮急腹
內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌卷知縮唇青面色蒼白
不得飲食

烏麻 十兩 人參 防風 茯苓 細辛
秦椒 炒出汗 黃芪 當歸 牛膝 桔梗 各二兩半

鑄多
絶極
紫一黃

乾地黄 丹参 暑預 礬石 山茱萸
 川芎各二兩 麻黄去節 白木各二兩半 五加皮 生乾姜各五兩
 大棗 鍾乳粉各三兩別以

右為對散用清頂二斗半同浸五宿溫服三合日再服
 地黄湯治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇舌赤甚則言語不
 快色不澤飲食不為肌膚

麥門冬去心 生地黄乾各五兩 人參 茯苓 芍藥各三兩
 萎蕤四兩 石膏六兩 遠志去心十兩 甘草二兩 白木三兩

右對散每服四錢水盞半七分去滓不以時服

防風圓治脉虛極則欬則心痛喉中令人如哽甚則腫腫十
 防風 桂心 通草 茯苓 人參
 遠志去心炒 甘草炙 白石英 麥門冬去心各三兩
 右為細末蜜丸如梧子大食前酒服三十日

石南散治由實極肌痺淫人如鼠走津液脫膝理開汗大泄

或不仁四肢急痛或復緩唇口壞皮膚變色

石南一兩 天雄炮去 山藥 桃仁製炒去 芍藥
 甘菊花 甘草炙 升麻 萎蕤各一兩半 黃芪
 辰砂別研各三分 石膏二兩 山茱萸一分

右為細末每服二大錢食前溫酒調下

大黃芪湯治由虛極肺重怠惰四肢不欲卒闕節疼痛不嗜
 飲食食則欬則右眼痛陰引背及肩不可轉動

黃芪 桂心 巴戟去心 石斛酒浸 澤泻
 茯苓 乾薑炮各三兩 防風 獨活 人參各二兩
 天雄炮去 芍藥 附子炮去 半夏湯洗七次 細辛去苗
 白木 黃芪 栝樓根各兩

右為對散每服四錢水二盞生姜七片葉七分去滓食

乾地黄 丹参 暑預 礬石 山茱萸
 川芎各二兩 麻黄去節 白木各二兩半 五加皮 生乾姜各五兩
 大棗 鍾乳粉各三兩別以

右為對散用清酒二斗半同浸五宿溫服三合日再服
 地黄湯治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇舌赤甚則言語不
 快色不澤飲食不為肌膚

麥門冬去心 生地黄乾各五兩 人參 茯苓 芍藥各三兩
 萎蕤四兩 石膏六兩 遠志去心十兩 甘草二兩 白木三兩

右對散每服四錢水盞半七分去滓不以時服
 防風圓治脉虛極則欬則心痛喉中令人如噎咽睡

防風 桂心 通草 茯苓 人參
 遠志去心炒 甘草炙 白石英 麥門冬去心各三兩
 右為細末蜜丸如梧子大食前酒服三十日

石南散治由實極肌痺淫人如鼠走津液脫膝理開汗大泄
 或不仁四肢急痛或復緩唇口壞皮膚變色

石南一兩 天雄炮去 山藥 桃仁製炒去 芍藥
 甘菊花 甘草炙各一兩 升麻 萎蕤各一兩半 黃芪
 辰砂別研各三分 石膏二兩 山茱萸一分

右為細末每服二大錢食前溫酒調下
 大黃芪湯治由虛極躄重怠惰四肢不欲卒闕節疼痛不嗜
 飲食食則欬則右股下痛陰引背及肩不可轉動

黃芪 桂心 巴戟去心 石斛酒浸 澤瀉
 茯苓 乾薑炮各三兩 防風 獨活 人參各二兩
 天雄炮去 芍藥 附子炮去 半夏湯洗七次 細辛去苗
 白木 黃芪 括樓根各兩

右為對散每服四錢水二盞生姜七片棗七分去滓食

前服

前胡湯治氣實極喘息衝胃常欲自恚心腹滿痛內外有執
煩嘔不安甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾

前胡八兩 半夏湯洗七次去滑 麻黃湯去節 芍藥各六兩

黃芩三兩 枳實燒燬去穢一兩

右剉散每服四錢水二盞姜七片棗一合棗七分去滓

不以時服

鍾乳散治氣虛極皮毛焦津液不通力乏腹脹甚則喘急氣

短息定差多收甚

煉成重乳別碎 乾薑炮 桔梗 茯苓

附子炮去皮臍 細辛去苗 桂心 人參各一兩一分

白朮一兩 防風 牡蠣燬 栝樓根各二兩半

右為末每服二大錢溫酒調下食前

竹葉湯治精實極眼視不明齒焦髮落形衰通身虛熱甚則

胃中瘖痛煩悶泄精

生乾地黄五兩 芍藥四兩 黃芩 茯苓

澤瀉 甘草炙 麥門冬去心各三兩

右剉散每服四錢水盞半姜三片淡竹葉十片棗七分

去滓不以時服

磁石山治精虛極冠羸驚悸夢中遺泄尿後遺瀝小便白濁

甚則莖弱核微小腹裏急

磁石煨醋 鼈齒煨 茯苓酒浸 茯苓各二兩 人參

麥門冬去心 遠志去心 續斷 赤石脂煨醋

麻茸酥炙各一兩半 地黄乾者三兩 韭子炒 栝子仁 丹麥各一分

右為末蜜丸梧子大食前溫酒下三十圓至五十圓

三黃山治骨實極耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦

前服

前胡湯治氣實極喘息衝胃常欲自恚心腹滿痛內外有執
煩嘔不安甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾

前胡 八兩 半夏 湯洗七次去滑 麻黃 湯去節 芍藥 各六兩

黃芩 三兩 枳實 燒燬去穢一兩

右剉散每服四錢水二盞姜七片棗一合棗七分去滓

不以時服

鍾乳散治氣虛極皮毛焦津液不通力乏腹脹甚則喘急氣

短白... 晝夜甚

煉成重乳 別碎 乾薑 炮 桔梗 茯苓

附子 炮去皮臍 細辛 去苗 桂心 人參 各一兩

白朮 一兩 防風 牡蠣 燬 栝樓根 各二兩

右為末每服二大錢溫酒調下食前

竹葉湯治精實極眼視不明齒焦髮落形衰通身虛熱甚則

胃中瘡痛煩渴泄精

生乾地黄 五兩 芍藥 四兩 黃芪 茯苓

澤瀉 甘草 炙 麥門冬 去心各三兩

右剉散每服四錢水盞半姜三片淡竹葉十片棗七分

去滓不以時服

磁石山治精虛極眩羸驚悸夢中遺泄尿後遺瀝小便白濁

甚則莖弱核微小腹裏急

磁石 煨醋 鼈齒 燬 茯苓 酒浸 茯苓 各二兩 人參

麥門冬 去心 遠志 去心 續斷 赤石脂 燬醋

麻茸 酥炙各一兩半 地黃 乾者 三兩 韭子 炒 栝子仁 丹麥 各一分

右為末蜜丸梧子大食前溫酒下三十日至五十日

三黃山治骨實極熱耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦

髓苦痛手足酸疼大小便閉

黃芩八兩冬用三兩 大黃二兩冬用四兩夏用三兩 黃連春用七兩夏用茶兩秋用六兩冬用二兩

右三味搗和蜜丸豆大每服十丸至十五丸米飲下

廉角山沿骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立氣衰髮落齒槁

腰背相引痛甚則喜唾不了方見五痔門

七氣叙論

夫五臟六腑陰陽升降非氣不生神靜則寧情動則亂故有
喜怒憂思悲恐驚七者不同各隨其本臟所生所傷而為病
故喜傷心其氣散怒傷肝其氣擊憂傷肺其氣聚思傷脾其
氣結悲傷心胞其氣急恐傷腎其氣怯驚傷膽其氣亂雖七
診自殊无踰於氣黃帝曰余知百病生於氣也但古語有寒
熱憂志而无思悲恐驚似不倫 於理未然 六府无說唯
膽有者蓋是奇情淨府非轉輸例故能蓄驚而為病

七氣證治

夫喜傷心者自汗不可疾行不可久立故經曰喜則氣散怒
傷肝者上氣不可忍熱未溫心短氣欲絕不得息故經曰怒
則氣擊 憂傷肺者心系急 焦閉榮衛不通夜卧不安
故經曰憂則衆氣聚 脾者氣苗不 貴衆氣積聚 不得飲
食腹脹滿四肢惰 經曰思則氣結悲傷心胞者善忘不
識人置物在處還取不得筋牽四肢浮腫故經曰悲則氣急
恐傷腎者上焦氣閉不行下焦回還不散猶豫不決嘔逆惡
心故經曰恐則精却驚傷膽者神无所歸慮无所定說物不
竟而迫故經曰驚則氣亂七者雖不同本手一氣藏氣不行
鬱而隨 不積衆氣大如塊在心腹中或塞咽喉如竹
吐不出噦不下時去時來每發欲死狀如神慮所作逆害飲
食皆七氣所生所成治之各有方

髓苦痛手足酸疼大小便閉

黃芩八兩冬用三兩 大黃二兩冬用四兩夏用三兩 黃連春用七兩夏用紫兩秋用六兩冬用二兩

右三味搗和蜜丸豆大每服十丸至十五丸未飲下

廉角山沿骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立氣衰髮落齒槁

腰背相引痛甚則喜唾不了

方見五痔門

七氣叙論

夫五臟六腑陰陽升降非氣不生神靜則寧情動則亂故有
喜怒憂思悲恐驚七者不同各隨其本臟所生所傷而為病
故喜傷心其氣散怒傷肝其氣擊憂傷肺其氣聚思傷脾其
氣結悲傷心胞其氣急恐傷腎其氣怯驚傷膽其氣亂雖七
診自殊无踰於氣黃帝曰余知百病生於氣也但古語有寒
熱憂志而无思悲恐驚似不倫 於理未然 六府无說唯
恬有者蓋是奇怕淨府非轉輸例故能蓄驚而為病

七氣證治

夫喜傷心者自汗不可疾行不可久立故經曰喜則氣散怒
傷肝者上氣不可忍熱未溫心短氣欲絕不得息故經曰怒
則氣擊 憂傷肺者心系急 焦閉榮衛不通夜卧不安
故經曰 衆思傷脾 青衆在中腕不得飲
食腹脹 忘情故經曰思則氣結悲傷心胞者善忘不
識人置物在處還取不得筋牽四肢浮腫故經曰悲則氣急
恐傷腎者上焦氣閉不行下焦回還不散猶豫不決嘔逆惡
心故經曰恐則精却驚傷膽者神无所歸慮无所定說物不
竟而迫故經曰驚則氣亂七者雖不同本手一氣藏氣不行
皆從隨氣積衆堅大如塊在心腹中或塞咽喉如竹
吐不出嚥不下時去時來每發欲死狀如神靈所作逆害飲
食皆七氣所生所成治之各有方

七氣湯治截膈神氣不守正位為喜怒哀思悲恐驚忤鬱不行衆聚以結積堅牢有如坏塊心腹絞痛不能飲食時發時止發則欲死

半夏湯洗去滑五兩 人參 桂心 甘草各一兩

右剉散每服四錢水盞半姜七片棗一枚炙七分去滓食前服

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致截氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙膏吐噦不下皆七氣所生

半夏湯洗七兩 白茯苓四兩 厚朴木香炒三兩 紫蘇二兩

右剉散每服四錢水盞半姜七片炙七分去滓食前服

五噎證治

夫五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎雖五種不同皆以氣

為主所謂氣一者心悸上氣多通噎噦不徹胃背痛憂一者遇天陰寒手足厥冷不能自溫一噎一氣上壅服下支滿胃中填塞攻背疼痛思一者心忪喜忘日視眈人食噎者食无多少胸中苦寒疼痛不得喘息皆由喜怒不常憂思過度恐慮无時鬱而生涎人與氣搏外而不降逆客飲食與五膈同但此在咽嗝故名一噎一飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼痛淚五噎散治五噎

人參 茯苓 厚朴去蘆皮剉 枳殼麸炒 桂心 甘草炙 訶子炮去核 白朮 橘皮 白薑炮 三棱炮 神麴炒 麥蘖炒各二兩 木香炮 檳榔 蓬朮炮各半兩

右為末每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚炙七分

七氣湯治藏腑神氣不守正位為喜怒憂思悲恐驚忤鬱不
遂眾涎飲結積堅牢有如坏塊心腹絞痛不能飲食時
發時止發則欲死

半夏湯洗去滑五兩 人參 桂心 甘草各一兩
右剉散每服四錢水盞半姜七片棗一枚炙七分去滓
食前服

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致藏
氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙
齏吐噦不下皆七氣所生

半夏湯洗七兩 白茯苓四兩 厚朴木香炒三兩 紫蘇二兩
右剉散每服四錢水盞半姜七片炙七分去滓食前服

五噎證治

夫五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎雖五種不同皆以氣

為主所謂氣一者心下不通噎噦不徹胃背痛憂一者
遇天陰寒手足厥冷不能食一者氣上衝膈下支滿胃
中填塞攻背疼痛思一者心忪悸喜忘日視眈眈食噎者食
无多少胸中苦寒疼痛不得喘息皆由喜怒不常憂思過度
恐慮无時鬱而生涎与氣搏外而不降逆客飲食与五膈
同但此在咽喉
一
五噎如
一食飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼痛淚
与涎俱出

人參 茯苓 厚朴去藤皮剉姜汁製妙 枳殼麸炒
桂心 甘草炙 訶子炮去核 白朮
橘皮 白薑炮 三棱炮 神麴炒
麥蘖炒各二兩 木香炮 檳榔 蓬朮炮各半兩
右為末每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚炙七分

空心温脹鹽湯點亦得

沈香散治五噎五膈胃中久寒諸氣衆聚聚一全食飲不

化結氣不消常服寬氣通一寬中進食

白木 茯苓各半 木通 當歸 橘皮

青皮 大腹皮 大腹子 木香 芍藥各一

甘草各一 白芷三兩 紫蘆葉 枳殼各一

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空腹

温脹

嘉禾散治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶助脹

滿心腹刺可示飲食如中焦虛痞不任攻擊臟腑虛寒

不受峻補或因病氣衰不復常稟受怯弱不能多食尤宜

服之

枇杷葉去毛 薏苡仁 縮砂仁 人參 茯苓各一

石斛 大腹子微 沈香 木香 藿香

杜仲 隨瓜子 桑白皮 丁香 檳榔 青皮各半

五味子微 神麴各一 甘草各一 陳皮三 白木炒二

半夏餅各一 右為末每服二錢水一盞生姜三片棗三枚煎至七分

温脹不計時五噎入乾柿一枚日煎拾服見效膈氣吐

逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎

鹽津田治五瘡八瘡

獨頭蒜

丁香 橘紅 木香 草撥 胡椒

右等分為末用蒜膏為丸如梧子大先嚼鹽少許令生

津液乾噤二粒漸加至三五日臨卧服

廣五行記求微中有僧維則病噎不能食語弟子曰互死之

空心温脹鹽湯點亦得

沈香散治互噎互膈胃中_天寒_也一匙食飲不

化結氣不消常服寬氣通一寬中進食

白朮 茯苓_{各半} 木通 當歸 橘皮

青皮 大腹皮 大腹子 木香 芍藥_{各一}

甘草_{各一} 白芷_{三兩} 紫蘆葉 枳殼_{炒去裏}

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空腹

温脹

嘉禾散治中滿下虛互噎互膈脾胃不和胸膈痞悶助脹

滿心_痛可思飲食如中焦虛痞不任攻擊臟腑虛寒

不受峻補或因病氣衰不復常稟受怯弱不能多食尤宜

脹之

枇杷葉_{去毛} 薏苡仁 縮砂仁 人參 茯苓_{各一}

石斛 大腹子_微 沈香 木香 藿香

杜仲 隨風子 穀蘖_微 白芷_微 薤

互味子_微 栝白皮 丁香 檳榔 青皮_{各半}

半夏_餅 神麴_{各一} 甘草_{各一} 陳皮_三 白朮_{炒二}

右為末每服二錢水一盞生姜三片棗三枚煎至七分

温脹不計時互噎入乾柿一枚日煎拾服見效膈氣吐

逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎

鹽津山治互瘧八痞

獨頭蒜 丁香 橘紅 木香 草撥 胡椒

右等分為末用蒜膏為丸如梧子大先嚼鹽少許令生

津液乾噤二粒漸加至三五回臨卧服

廣五行記求微中有僧維則病噎不能食語弟子曰互死之

後使可開五竇喉視有何物言絕而卒弟子果開視胸中得一物形似菓而有两頭遍牀皆由棘弟子置器中跳躍不止戲以諸味皆隨化尽時真中藍盛作澱有一僧以澱置器中此虫遂遠器中走須臾化為水此乃生癡非五噎比後人因以藍治噎誤矣

五膈證治

病有五膈者胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣名憂膈中腕臂滿噎則醋心飲食不消大便不利名曰思膈胃脹逆滿噎塞不通嘔則筋急惡聞食臭名曰怒膈五心煩挾口舌生瘡四肢倦重身常發熱胃痺引背不能多食名曰喜膈心腹脹滿欬嗽氣逆腹下若冷雷鳴遠膈痛不能食名曰恐膈此皆五情失度動氣傷神致陰陽不和結于胃膈之間病在膈中之下故名五膈若在咽噎即名五噎治之五病同法

五萬山治憂思慮膈塞不通及食冷物即發其病若心病

不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮痛欲吐即緊

差食欲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆甚主之

麥門冬去心 甘草炙各五兩 人參四兩 川椒炒出 遠志去心炒
細辛去苗 桂心各三兩 乾薑炮二兩 附子炮一兩

右為末蜜山彈子大含化日三夜二胸中當挾七日愈亦可丸如梧子大米湯下二三十日延年方夏加麥門冬甘草人參各二兩經心錄以吳茱萸代桂治遇寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入食飲減少並可服之不拘時候

寬萬山治氣不升降胸膈結痞

木香 京三棱炮 青皮各半兩 半夏三兩湯洗十次
大腹子一分

右為細末姜汁糊為丸梧子大食後末湯下二三十丸
嘉禾散 沈香散並治五葯 方見前五噎門

三因極一病證方論卷之九

胃痞證治

病者心下望滿痞急痛肌中苦痺緩急如刺不得悅仰其胸
前皮皆痛手不得犯胃中幅之而滿短氣欬唾引痛咽塞不
利習之如痒喉中乾燥時欲吐嘔煩悶白汁時出痛引徹背
不治則數日殺人病名胃痞由下虛極廉上控膈使然其脉
陽微陰結

栝樓丸治胃痞胸中痛徹背氣塞喘息咳喘心腹痞門

栝樓 去穢取子炒香熟 枳殼 麸炒去穢

右二味為細末先取栝樓皮穢研末水熬成膏和二物
末為丸如梧子大熱熟水下二十五丸日二食後服

橘皮生薑湯治胃痞胃中噎塞幅之如滿習之如痒喉中淡
咳唾燥末

橘皮 一两

枳實 麸炒去穢 二两

生姜 半两

右為劉散分二服水二盞藥七分為一服去滓食前

杷子湯治胃痞功痛方

此方年倉卒散賣製不同故別出之

杷子 二两

附子 炮 二两

右為劉散每服三錢水一大盞煎白三寸月藥至五分

食前温服

健忘證治

脾主意與思意者記所往事思則兼心之所為也故論云言心未必是思言思則必是心破外人議思心同時理甚明也今脾受病則意舍不清心神不寧使人健忘尽心力思量不來者是也或曰常人喜忘故謂之健忘二者通治小定志曰治心氣不定互臟不足甚者憂人愁人不樂忽人喜忘朝暮暮刻暮暮朝發及因事有所大驚夢寐不祥登

高涉險致神鬼不安驚悸恐怯

菖蒲 炒

遠志

去心姜汁淹各二两

茯苓

茯神

人參

各三

辰砂 為衣

右為末蜜曰如梧子大每服五十元末湯下一方者茯

神石開心散飲服二錢匕不以時

菖蒲益智曰治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲 炒

遠志

去心姜汁淹炒

人參

桔梗 炒

牛膝

酒浸各二两一分

桂心

三分

茯苓

一两三分

附子

炮去皮臍一两

右末蜜丸如梧子大每服三十九温酒末湯下食前服

虛煩證治

虛煩者方論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛生外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒大病不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產後多有此病其

證內煩身不覓熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清人不寐皆虛
煩也方例有虛煩近傷寒之說不可不辨又平人自汗小便
頻併遺泄白濁皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩屬內
因虛亂兼不內外因多者當辨析而調治
淡竹茹湯治心虛煩悶頭眩短氣內熱不解心中悶亂及婦
人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬 去心 各二 小麥 各二 甘草 各一 人參
白茯苓 各一 半夏 湯洗七
右為劉散每服四大錢水二盞姜七片棗三片淡竹茹
一塊如指大剪七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之
溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又治
驚悸

半夏 湯洗七次 竹茹 枳實 炒去穢 各二兩 陳皮 三兩

甘草 一兩 茯苓 一兩
右為劉散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚剪七
分去滓食前服

酸棗仁湯治霍亂吐下增劇虛勞煩授奔氣在胸中不得眠
或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁 炒一兩 人參 桂心 各一分 知母
茯苓 各三錢 石膏 煨半 甘草 各二錢
右劉散每服四錢水一盞半姜三片棗一枚剪七分去
滓食前服

五痿叙論

夫人身之有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成致內則有肝心
脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒不節勞佚兼并致內藏精
血虛耗榮衛失度發為寒熱使皮血筋骨肌肉痿弱无力以

運動故致痿臂狀与柔風脚弱皆類以脉證并所因別之相
不可混濫柔風脚兼皆外所因痿臂則属内臟氣不足之所
為也審之

五痿證例

病者肺熱皮虛弱薄着足痿臂其色白而毛敗名曰皮痿由
肺熱葉焦使然也肺為五臟長有所失亡所求不得則發肺
鳴肺鳴則肺葉焦論曰五臟因肺熱焦發為痿臂是
病者心下熱膝腕樞紐如折去而不相提挈胫筋緩不能
任其地其色赤而絡脉溢名曰脉痿由悲哀太甚陽氣內動
教澀血故本病論曰大經空虛發為肌痺傳為脉痿
病者肝熱口苦筋膜乾筋急而牽其色蒼而爪枯名曰筋痿
由思想无窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱及為
白淫故下經曰筋痿者生於肝使内也

病者脾熱胃乾而渴肌肉不仁其色黃而肉蠕動名曰肉痿
由漸於湿地以水為事居处下澤濡漬痺而不仁故下經曰
由痿者得之湿地也
病者腎熱腰脊不举骨枯而髓減其色黑而齒槁名曰骨痿
因有所遠行勞倦遇大熱而渴陽氣内乏熱於腎致水不
勝火則骨枯而髓虛故下經曰骨痿者生於大熱也

五痿治法

諸治痿法當養陽明与衝脉陽明主胃乃五臟六腑之海主
潤宗筋束骨以利機關衝脉者諸經之海主滲灌谿谷与陽
明合養於宗筋會於氣衝屬於帶脉絡於督脉故陽明虛則
宗筋縱帶脉不引故足痿不用也治之各補其榮而通其輸
調其虛實和其逆順至筋脉骨由各得其旺時病乃已矣
加味四介丸治腎臟肝虛熱淫於内致筋骨痿弱不自勝持

起居煩人足不任地驚恐戰掉潮挾時作飲食无味不生氣力諸虛不足

茯苓 酒浸

牛膝 酒浸

天麻 木瓜乾

廉茸 燎去毛切酥矣

熟地黄

兔絲子 酒浸軟細 五味子 酒浸各一分

右為末蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒末湯食前下一法不用五味子有杜仲

麋茸丸治五痿皮緩毛痒血脉枯槁肌肉薄着筋骨羸弱飲食不滋庶事不與四肢无力瓜枯髮落眼昏唇燥疲憊不能支持

麋茸 鎊一斤酒浸一宿

熟地黄 四兩

大附子 生去皮臍一兩半

右用大麥米二升以一半藉底一半在上以二布巾高覆炊一日取出藥與麥剝焙乾為末以浸藥酒添清酒煮麥粉為糊搜和得所杵三千下丸如梧子大每服五

十九丸溫酒末湯任下食前服

王啓玄傳玄珠先生耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝剋流變則真病生焉猶閩苗不長而樞之者也若稟氣受血不強合脈此而不脹反忽畧之是不耘苗者也

上丹養五臟補不足祕固真元均調二氣和暢榮衛保神守中又脫軀身耐老健力能食明目降心火交腎水益精氣男子絕陽庶事不堪女子絕陰乃不能妊腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑心勞志昏寐恍惚煩憤多倦餘瀝遺遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘠上熱下冷難任補藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅懌開心境安惠魄消飲食養胃氣

五味子 半斤 百部 酒浸一宿焙 兔絲子 酒浸 由茯苓 酒浸

杜仲炒新 巴戟去心 遠志去心 枸杞子

防風去心 白茯苓 蛇床子 山藥 栝子仁別研各五兩

右為末蜜丸梧子大食前温酒鹽湯任下三十九丸春寒乾棗湯夏加五味子四兩四季月加茯苓六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩食後兼服衛生湯

衛生湯補虛勞強五臟除煩養真退邪契順血脉緩中安和

神志潤澤容色常服通暢血脉不生癰瘍養曾益津

當歸 白芍藥各四兩 黃芪八兩 甘草炙一兩

右為劉散每服四錢水盞半七分去滓不以時年老加酒半盞五錢

中丹補百損躄者少氣善驚昏憤上焦客熱中脘冷痰不能

多食心腹弦滿脾胃氣衰精血妄行容色枯悴

黃芪 白芍藥 當歸各四兩 白茯苓 人參

桂心各二兩 川椒炒出汁一兩 大附子炮去皮臍 黃苓各二兩為末

右為末粟米飲搜和得所搗千杵丸如梧子大酒飲任下三五十九丸食前服

小丹補勞益血去風冷百病諸虛不足老人精枯神耗女子

絕傷斷緒久脂益壽延年安寧神志魂流滋氣血脉絡

開益智惠釋散風濕耳目聰明筋力強壯肌虛悅懽氣宇

秦定

熟地黄 肉苁蓉酒浸各六兩 五味子 兔絲子

栝子仁研別 天門冬去心 蛇床子炒 覆盆子

巴戟去心 石斛各三兩 續斷 澤厚

人參 山藥 遠志去心 山茱萸

菖蒲 桂心 白茯苓 杜仲

天雄炮去皮 煉成鍾乳粉扶衰三兩續老二兩常

右為未蜜丸如梧子大食前酒服三十九至五十九忌
五辛生葱羌荑錫鯉虛人多起去鍾乳倍地黃多志倍
遠志茯苓少氣神虛倍覆盆子欲光澤倍栢子仁風虛
倍天雄虛寒倍桂心小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉吐
逆倍人參

芎桂散治四肢疼痛軟弱行履不便 方見中風門

藿香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛

宗筋无所養遂成痿躄

藿香

白朮

白茯苓

神麴 炒

烏藥 去木

縮砂仁

薏苡仁 炒

半夏麴

人參 各半

葶澄茄

甘草 各三兩半

右為簾末每服四錢水一盞半生姜五片棗二枚同煮
七分去滓不以時服

失血叙論

夫血猶水也水由地中行百川皆理則無壅決之虞血之周
流于人身榮經府俞外不為四氣所傷內不為七情所鬱自
然順適可一微爽節宣必至壅閉故血不得循經流注榮養
百脉或泣或散或下而 反或逆而上溢乃有吐血衄使利汗
痰諸證生焉十種走失元重於斯隨證別之乃可施治

外因衄血證治

羌荑異燕

病者因傷風寒暑濕流傳經絡陰陽相勝故血得寒則 泣
得熱則淖溢各隨臟腑經絡湧泄于清氣道中衄出一升一
斛者外所因治之各有方

桂枝栝樓根湯治傷風汗下不解鬱于經絡隨氣湧泄衄出
清血或清氣道閉流入胃管吐出清血遇寒泣之色必瘀

黑者

桂心 白芍藥 枳椇根 甘草 川芎各等分

右為劉散每服四大錢水一盞半姜三片棗一枚煎至七分去滓服頭痛加石膏

麻黃升麻湯治傷寒發熱解利不行血隨氣壅世謂紅汗者是也

麻黃去節湯二兩半 升麻一分 黃芩 芍藥

甘草生 石膏煨 茯苓各一兩

右劉散每服四大錢水一盞半姜三片棗七分去滓服服微汗解

五苓散治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅滯發衄或胃氣虛血滲入胃停而不散吐出一二升許言見傷暑門治衄則以芎花黃湯下屢用得効除濕湯治胃兩着濕鬱于經絡血溢作衄或脾不和濕着經絡血流入胃滿吐血

茯苓 乾姜各四分 甘草 白朮各一分

右為劉散每服四錢水一大盞棗六分去滓服頭痛加川芎二錢最上浴室中發衄

內因衄血證治

病者積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血蓄聚不已停滯胃間隨氣上溢入清氣道中發為鼻衄名互臟衄

止衄散治氣鬱發衄无此神方

黃芪六分 赤茯苓 白芍藥各三分 當歸 生乾地黄 阿膠各三分

右為細末黃芪湯調下二錢七末知再作

不內外因證治

病者飲酒過多及啖炙博互辛熱食動於血隨氣溢發為

鼻衄名酒食衄或墮車馬打撲傷損致血淖溢發為鼻衄名折傷衄

加味理中因治飲酒過多及咬炙燒熱食動血發為鼻衄

人參 白朮 甘草 乾姜

乾葛 川芎 各等分

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

花菜石散治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷並於傷處糝傳

或內損血入臟腑壅溢作衄及婦人產後敗血不散

花菜石 研細 上色硫黃 研細四兩

右二味拌勻入截瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令
熱透以磚藉用白炭一秤頂上發火燒灰盡候令取出
再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小
便溫酒調一二錢匕取瘀血即知

白及散治鼻衄立知

白及 不拘多少

右為末冷水調用紙花貼鼻竅中一方用黃膠湯令軟

貼鼻竅中

三因吐血證治

病者諸血積聚合發為衄而清氣道閉渴道湧溢凝停胃胃
中因即滿悶吐出教斗至于一石者名曰內衄或因四氣傷
于外七情動于內及飲食房勞墜墮傷損致榮血留聚膈間
滿則吐溢世謂妄行

桂枝枳椇湯治傷風吐血五苓散治傷暑吐血除濕湯治傷

濕吐血 三方並見外因衄血證治

金屑丹治三因吐血及衄血下血一切血溢妄行

葉子雌黃

右一味為簾末入棗肉內線繫定滿着湯煮用黑錫對
雌黃斤兩鎔作汁傾入湯煮一日添湯候冷取出雌黃
洗淨乾研為細末却以煑藥棗肉和丸如梧子大每服
五七丸黑錫煑湯下

傷胃吐血證治

病者因飲食過度傷胃或胃虛不能消化致嘔吐逆物与
氣上衝臍胃口决裂所傷吐出其色鮮紅心腹絞痛曰汗自
流名曰傷胃吐血

理中湯能止傷胃吐血者以其功最理中脘分利陰陽安定
血脉方證廣如局方但不出吐血證者當自知之

人參

白朮

甘草

白姜

炙

炮各等分

右為劉散每服四錢水一盞煑七分去滓不以時服或
只煑乾姜甘草湯飲之亦妙 方見養生必用

肺疽吐血證治

病者因飲吹辛熱燥傷肺血得熱則溢因作嘔吐出血一
合或半升許名曰肺疽傷於府則屬胃傷於臟則屬肺右以
此分不可不究
二天散治肺疽吐血并妄行

紅棗

百藥葉

煑各等分

右為細末每服二錢米湯調下

折傷吐血證治

病者因墜閣脚致傷五臟損裂出血停留中脘臟熱則吐鮮
血臟寒則吐瘀血如豆羹汁此名內傷治之各有方
加味芎藭湯治打撲傷損敗血流入胃腕嘔吐黑血或如豆

羹汁

川芎

當歸

白芍藥

百合

水浸

半日荊芥穗

各等分

右為劉散每服四錢水一盞酒半盞同煮七分去滓不
以時服

折傷瘀血證治

病者有所墜墮惡血由內或因大怒肝血滯濕停蓄不散兩
眼疼痛脚善癩骨即時腫氣上不上皆由瘀血在內治之各
有方

雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡見傷損血瘀凝積氣絕

欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀

血即愈此藥推陳致新治折傷神效

大黃 酒蒸 兩

杏仁

右研細酒一 藥至六分

下瘀血即愈若便齋氣絕不能言取藥不及急擊口

以換小便灌之

病餘瘀血證治

病者或因發汗不徹及吐血不尽瘀蓄在內使人面黃唇白
大便黑脚弱氣喘甚則狂悶皆瘀血所致治之各有方

犀角地黃湯治傷寒及濕病應發汗而不汗內蓄為瘀血及

鼻衄吐血不尽餘血停由致面黃大便黑

犀角 一兩

生地黄 八兩

芍藥 三兩

牡丹皮 二兩

右為劉散每服四錢水一盞半藥七分去滓狂者加大

黃二兩黃芩三兩其人脈大未遲腹不滿自言滿為无

熱但依方不須加也

汗血證治

病者汗出正赤汚衣名曰汗血皆由大喜傷心喜則氣散血
隨氣行婦人產後多有此證

葎草汁治產婦大喜汗出汚衣赤色及膏淋尿血

葎草 不拘多少

右搗取汁二升醋二合和空腹飲一盃或濃煮汁飲亦
滋淋瀝尿血

便血證治

病者大便下血或清或濁或鮮或黑或在便前或在便後或
与泄物並下此由内外有所感傷凝停在胃隨氣下通亦妄
行之類故曰便血

伏菴汗陽治先便後血謂之遠血兼治吐血

伏龍肝

斤半

甘草

炙

白朮

阿膠

乾地黄

斤金作
乾姜

黃芩

各三兩

右為劉散每服五錢水一盞煎七分去滓空腹温服
一法有附子三兩炮入

當飯赤小豆散治先血而後便謂之近血

赤小豆

當飯

一兩

右為末漿水服方寸匕日三四服

風痢下血證治

病者因風停於膏腠乘虛入腸胃風動血故便清血或下瘀
血注下无度名曰風利古方以此為益痢非也
胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注
下及腸胃濕毒下如豆汁或下淤血日夜无度

人參

白茯苓

芎藭

桂心

當歸

白芍藥

白朮

右等分為劉散每服四錢水一盞半入粟米百餘粒日
煎七分去滓空心稍熱服

科簡

夫便血有腸痔蓋毒熱痢酒痢血枯肺痿等別有門類其如

凡痢亦當在痢門以純下清血故附于此不可不知

尿血證治

病者小便出血多因心腎氣結所致或因憂勞房室過度此乃得之虛寒故養生云不可專以血得熱為導溢為說二者皆致尿血与淋不同以其不痛故屬尿血痛則當在血淋門髮灰散治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也

髮灰

本草云能消瘀血通閉格利水道

右一味每用二錢以米醋二合湯少許服之井花水調

亦得兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已一法樓欄燒灰米飲調下大治大小便下血又一法同葵子等分為末飲服二錢治胞尤妙

五層膏治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪

人參

各等分

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸尺蜜二兩為度而令焦炙熟點黃芪人參末喫不以時仍以鹽湯送下

癥瘕證治

癥瘕積聚隨氣血以分門故方云以癥瘕屬肝部積聚屬肺部不亦明矣况七者大數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝虫曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者煨也假物成形然七癥八瘕之名經論亦不詳出虽有蛟鼃蛇蟻由髮其米等七證初非定名偶因食物相感而致患耳若婦人七癥入瘕則由內外不內外因動傷五臟氣血而成古人將婦人病為瘕疾以蛟鼃等為生瘕然亦不必如此

批泥婦人癥瘕並屬血病毒蛇與蠱等事皆出偶然但飲食
間誤中之苗聚腹臟假血而成自有洛性亦猶永微中僧病
噎者腹有一物其狀如粟即生瘕也予天宿血停凝結為胎
塊雖內外所感之不同治法當以類相從所謂醫者意也如
以敗梳治癥瘕剝屑治癩癧麩蘗治米瘕石灰治髮瘕如此
等類方論至多不復繁引予者可以理解

大消石丸治七癥八瘕聚結塊及婦人帶下絕產并欲脹
丹葉腹中有癥瘕者當先下之此藥但去癥瘕不令人困

消石

六兩

大黃

八兩

人參

甘草

各三兩

右為末以三年苦酒三升置銅器中以竹作每一升
作一刻柱器中先內大黃常攪不息使微沸一刻乃
內餘藥又盡一刻極微火熬使可元則丸如雞子中黃
若不能脹大丸則作小丸如梧子大米湯下三十九四

日一服婦人脹之或下如雞肝或如米泔正赤黑等三

二升下後忌風冷自養如產婦

小三稜莢治食癥酒癖血瘕氣塊時

滯不消心腹堅脹疾逆嘔噦噫酢吞酸脇肋刺痛胸膈痞
悶并脾氣橫世

京三稜

蓬莪朮

各四兩

芫花

一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋伍升浸滿封器口以灰火煨令
乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊
丸如棗豆大每服十五丸生姜湯下婦人血分男子脾
氣橫泄腫滿如水用茱白皮煎湯下

三聖丸治積年癥瘕癖塊諸藥療理不差至効

舶上硫黃

一兩

水銀

半兩

硃砂

去砂石一分

右三物乳盆內裹研如粉却以生鐵鈔內用文武火熬

鎔成汁以火筋攪令勻停冷刀割下以布裏置地坑內埋一宿取出再研細次以

赤芍藥 當歸 荊三稜 蓮莪朮 紅花各一分

並細剉以法酒一升葉及一半麻出砂盆內研生布裂

汁再熬放冷入羅麵為糊搜丸如菜豆大治因產後飛

傷於飲食結伏在腹脹時發疼痛不可忍者當飯浸酒

一升遂旋取酒煖下七丸至十丸每服磨癥塊空心溫

酒下三丸至五丸所是藥滓裂了焙乾為末別入

乾地黄兩半 真蒲黃 芫花各一分醋炒焦黃

右為末以前一般糊丸如菜豆大治女人血臟冷氣攻

小三心疼及一切血疾溫酒下十丸

壹搗七丸治臟腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結為癥瘕

坏塊及婦人血癥腸胃中塞飲食不下欬逆脹滿及下痢

赤白霍亂轉筋及踳躄拳腰脊脚膝疼痛行步不能常
服建脾暖胃堅骨強陽

神麴半斤炒黃 大附子二个炮去皮臍 甘草二兩炙

右末蜜丸每左手一搗分作七丸每服一丸細爵米飲下

妙應丹治諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中盡毒或食水陸藥

菴子卵入腹而成虫蛇魚蟹或宿食苗飲婦人產後敗血

不消女子月水不通結為癥瘕時發寒熱唇口焦黑肢体

瘦削嗜卧多魘食少腹痛大便糟拍變成冷痢

附子四个六七分重者生去皮臍

葶藶 木香炮 青皮 破故紙炒各三兩半

右為末麴糊搜丸如梧子大每服三十九粒生姜橘皮湯

下泄利米湯下加至五十丸

癩癩叙論

夫癩癇病皆由驚動使臟氣不平鬱而生從閉塞諸經厥而
乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑濕或飲食不節逆
於臟氣詳而推之三因備具凡寒暑濕得之外驚恐震懼得
之內飲食飢飽為不內外三因不同忤氣則一傳變互臟散
及六腑溢諸絡脉但一臟不平諸經皆閉隨其臟氣證候殊
分所謂象六畜分五声氣色脉證各隨本臟所感所成而生
諸證古方有三癩五臟癩六畜癩乃至一百二十種癩以其
稟賦不同臟腑弱性理躁靜故諸證蜂起推其所因元越三
候病由都尽矣

癩癇證治

病者旋暈擗倒吐沫搖擗騰踴作馬嘶鳴多因狹執着驚
心動膽懼鬱涎入心之所致也名曰馬癩以馬屬 午手
少陰君火主之故其病生于心經病者暈眩四肢煩疼昏悶

擗倒掣縱吐沫作羊叫色多因少小脐瘡未愈教洗浴濕襲
脾經之所致也名曰羊癩以羊屬未坤位足太陰濕土主之
故其病生于脾經病者昏暈擗倒兩手頻伸叫作雞色頭史
即醒 後復發多因少小燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之
所致也名曰雞癩以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生于
胃經病者眩暈擗倒眼目相引牽縱急強作猪叫鳴吐涎沫
食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰猪癩以猪屬
亥手厥陰心胞風木主之故其病生于右腎經病者眩暈擗
倒目反口噤癩縱吐沫作牛吼色多因少小濕熱傷肺涎苗
肺系遇燥熱則發動名曰牛癩以牛屬丑手太陰濕土主之
故其病生于肺經

六珍丹治風癩失性擗倒欲死或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪
嗥等色腑臟相引氣爭掣縱吐沫流涎久而方蘇

通明雄黃 葉子雌黃 朱鑽真珠 各一兩
鈔 二兩 癸 丹砂 半兩 水銀 一兩半

右研令極勻蜜丸如梧子大每服三丸至五丸姜棗湯下頂搗二三百杵乃可丸

礬丹治五癩百癩无間陰陽冷熱

礬丹 晉礬各一兩

右用塲鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在上以白炭五斤煨令炭尽取出細研以不經水猪心血為丸如菜豆大每服十九至二十九橘皮湯下

大鎮心丹治一百二十種癩癩驚狂譫妄顛倒昏不知人嘔吐涎沫及心驚膽寒清人不睡或左眼偏疼

辰砂 用黃松節酒煮 龍齒 用遠志苗醋煮

右只取辰砂竜齒各等分為末猪心血為丸如雞頭大

每服一丸以麥門冬葉菜豆灯心生姜白蜜水菜豆熟為度臨卧嚥下小兒磨化半丸量歲數与之

蛇黃丹治五臟六腑諸凡癩癩掣縱吐涎沫不識人及小兒急慢驚風

蛇含 四枚建盞內股紅以楮樹汁一椀泮乾 天南星 胞 白附子

右為末糯米糊丸如梧子大每服温湯磨化一丸量大小与服大人嚼細三五丸温酒末湯任下

凡例

夫五癩合屬五臟而无腎有胃者以腎屬單非畜養物神无主治故不作癩 屬雞係六畜物故有象兼胃為五臟海非餘府比又犬屬戌手少陽小腸經主之虫屬六畜初无大癩者以辰戌為魁罡四殺沒処不與癩象古方類例未之究也

考者宜知之

狂證論

夫三陽并三陰則陽虛而陰實故癩三陰併三陽則陰虛而陽實故狂論曰陽入陰其病靜陰入陽其病怒則狂矣病者發狂不食棄衣奔走或自称神聖登高竽歌踰牆上屋所至之處非人所能罵詈妄言不避親屬病名狂多因陽氣暴折畜怒不決之所致故經曰陽明常動太陽少陽不動不動而動為大疾此其候也

鎮心丹治心氣不足病苦驚悸自汗心煩悶短氣喜怒悲憂恚不自知之魂失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

光明辰砂 研

白礬

煨汁 各等分

右為末水丸如雞頭大每服一九葉人參湯下食後服

治憂思慮慮過多致神志不寧魂魄失守靈陽外

泄則自汗嘔吐浮利頻數諸陰不生則語言重復怙悖眩

暈兼治大病後虛煩不得眠羸瘦困乏及婦人胎前產後

恚能主之常服安心神調血脈鎮驚補虛

黃芪 蜜炙

茯神

人參

酸棗仁 炒

熟地黃 各一兩

兩

遠志 去心

五味子

柏子仁 各半兩

別研

右為末蜜丸如梧子大用辰砂為衣每服三十九丸米湯

溫酒任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參黃骨湯

下卒暴心痛乳香湯下肌熱虛煩麥門冬湯下吐血人

參卷栢湯下大便下血當歸地榆湯下小便尿血赤茯

苓湯下中風不語薄荷牛黃湯下風癩涎潮防風湯下

礬丹亦治狂方見癩癩門

凡傷寒陽毒及蓄瘀血皆發狂各見本門

九痛叙論

夫心痛者在方論則曰九痛內經則曰卒痛一曰卒痛種人
不同以其痛在中腕故摠而言之曰心痛其實非心痛也若
真心痛則手足青至節若甚且發晝死晝發夕死不在治療
之教方中所載者乃心主包絡經也若十二經絡外感六淫
則其氣閉塞鬱于中焦氣與邪爭發為疼痛屬外所因若五
臟內動以七情則其氣痞結聚于中腕氣與血搏發為疼
痛屬內所因飲食勞逸觸忤非類使臟氣不平痞壅于中食
飲通症變亂腸胃發為疼痛屬不內外因治之當詳分三因
通中解散破積^下墮隨其所因无使混濫依經具錄諸證以清^上
備治法云尔

外所因心痛證治

足厥陰心痛兩脇急引小腹連陰股相引痛手心主心痛徹

背心煩掌中熱咽乾目黃赤脈滿足大陰心痛腹脹滿瀆人
然大便不利甚閉咽塞于大陰心痛短氣不足以息季脈空
痛遺失无度胃滿煩心足小陰心痛煩刺面黑心懸若肌胸
滿腰脊痛背

諸府心痛難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸
經諸俞諸府涉邪所致病屬外所因

內所因心痛證治

肝心痛者色蒼人如死灰狀終日不得太息真心痛者手足
青至節且發夕死夕發且死脾心痛者如針錐刺其心腹溫
蘊然氣滿肺心痛者若從心間起動作痛益甚色不変腎心
痛者与背相引善癢如物從後觸其心身僂俛胃心者腹脹
滿不下食人則不消皆臟氣不平喜怒憂鬱所致屬內因
不內外因心痛證

久積心腹痛者以飲啖生冷菓實中寒不能消散結而為積甚則教日不能食便出乾血吐利不定皆由積物客於腸胃之間遇食還發名積心痛及其臟寒生虵致心痛者心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹熱涎出病屬不內外因方證中所謂九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫曰注曰去來痛者除風熱冷屬外所因餘皆屬不內外更婦人惡血入心脾經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊尸症使人心痛亦屬不內外因

三因心痛總治

蜜附湯治心腹疼痛或吐或泄狀如霍亂及療冒涉濕寒賊

瓜入腹拘急切痛

附子

生去皮臍切作四片以白蜜塗令附子變色以湯洗去蜜切半兩

桂心

芍藥

各三分

甘草

各四分

右為劉散每服四大錢水一盞薑五片棗二枚棗七分

去滓食前大便秘結入白蜜半匙日啜

麻黃桂枝湯治外因心痛惡發熱內攻五臟拘急不得轉寒

麻黃

去節湯浸焙乾

桂心

白芍藥

細辛

去苗

乾姜

炮

甘草

各三分

半夏

湯洗七次

香附

炒去毛各半兩

右為劉散每服四大錢水盞半姜五片棗七分去滓食前服大便秘入大黃如博碁大兩枚棗

加味小建中湯治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈昏

虛寒證服此藥并針灸不效此藥主之

桂心

三分

甘草

各半兩

白芍藥

一兩

遠志

去心半兩

右為劉散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚棗七分

分去滓入錫糖一塊如皂夾子大棗令鎔食前溫服

雞舌香散治心腹卒痛安胃進食調冷熱定泄瀉老少通用

丁香 一百枚
甘草 半兩
高良姜 一兩
白芍藥 二兩

右為細末每服二錢七陳米飲調下空心食前服王啓
玄子序云初余為禁隊因此證處與御醫曾使令施用後
至富貴乃由此始

訶子散治心脾冷痛不可忍一服見效及老幼霍亂吐瀉其
効如神

訶子 炮去核
甘草 炙
厚朴 姜製炒
乾姜 炮
草菓 去皮
陳皮
良姜 炒
茯苓
神麴 炒
麴蘖 炒各等分

右為末每服二錢候發刺不可忍時用水一盞煎七分
入鹽脹如速則鹽點

九痛山治九種心痛虫痛痙痛瓜悸痛食痛飲痛冷痛熱痛
痛往來兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷痛
流在心胃并冷腫痛上氣落馬墮車疾血等疾

附子 三兩炮
去皮臍
狼毒 炙香
巴豆 去皮心
炒耗一兩

人參
乾姜 炮
吳茱萸 浸洗各一兩炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服空腹溫酒下三丸卒中
惡心痛不能言服三丸

藜合香丸治傳屍骨蒸癘瘵肺痿痙疔鬼氣卒心痛霍亂吐
利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痲癩疔腫驚癇鬼
疔中人小兒吐乳大人狐狸等病方

蘇合香油 入安息
香內
薰陸香 研別
龍腦 各一兩
白木
丁香
朱砂 研水
青木香
白檀香
沈香
烏犀 鑿
安息香 別為末用元灰
一外熬膏
香附子 去毛
訶子 煨去核
麝香
華撒 各二兩

右為末用安息香等膏同煉蜜施丸如梧子大早朝并
花水溫冷任意化下四丸老人小兒一九溫酒化服亦

得辟邪用蠟紙裹一丸如彈子大縫袋盛帶之

撞氣阿魏圓治九種心痛五種噎疾痰癖氣塊冷氣攻刺及

脾胃停寒胃滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦

人血氣血刺等

阿魏 二分半酒浸一宿以麩為 胡椒 二分半 甘草

茴香 炒 川芎 青皮 陳皮

丁香皮 炒 蓬朮 各一兩炒 縮砂仁 桂心

白芷 炒各兩 生姜 四兩切作片用鹽一兩淹一宿炒黑色

右為末阿魏糊為丸如雞頭大每藥一斤用朱砂七錢

為衣丈夫氣痛炒姜鹽湯下二粒至三粒婦人血氣醋

湯下常服茶酒任下二粒並嚼細嚥食前

倉卒散治氣自腰腹間牽急疼痛不可屈伸腹中冷重如石

痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不羸垂死方

山梔子 四十九個連皮燒半過 附子 一枚胞去皮臍

右為末每服二錢酒一小盞入鹽少許藥七分溫服又

治胃痞切痛

失笑散 方見前疝門

三因極一病證方論卷之九

