

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十九

時氣門

時氣發狂論

夫時氣發狂者由熱毒氣盛則棄衣而走登高而歌或不食數日踰垣上屋非是素所能也皆陰陽爭氣外並於陽四肢者諸陽之本也熱盛則四肢實則能登高而

明 周玉 朱 撰



歌熱盛於身故棄衣而走狂言妄見聞皆熱毒氣盛所為也

方

梔子散 出聖惠方 治時氣熱毒攻心面目俱赤發狂不識人

梔子仁 葳蕤 茯苓 麥門冬 去心 川升麻 知

母 犀角屑 沙參 去蘆頭 黃芩 川大黃 剉碎 甘

草 炒微赤剉各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治時氣心神狂躁言語無度 出聖惠方

雞子 二枚取清 白蜜 半合 生地黄汁 一合 川大黃 半兩剉碎

右相和令勻頓服之以利為度

白蘚皮散

白蘚皮 一兩半 大青 羚羊角屑 元參 梔子仁

黃芩 川大黃 剉碎 甘草 炙微赤剉 地骨皮 各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

又方 出聖 惠方

麥門冬 三兩 去心 杏仁 二兩 湯浸去皮尖 雙仁麴炒微黃 甘草 一兩 炙 微赤剉

白蘚皮 二兩 生乾地黄 二兩 黄芩 一兩

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五

分去滓不計時候温服

犀角散 出聖 惠方 治時氣熱毒攻心狂煩亂不得睡卧

犀角屑 龍齒 子芩 沙參 去蘆 頭 葳蕤 麥門

冬心 去 川升麻 赤茯苓 赤芍藥 杏仁 湯浸去 皮尖 雙

仁麴炒微 黃各一兩 大青 枳殼 麴炒微 黃去瓢 甘草 炙微赤剉 各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

治時氣發狂呼叫不識人 出聖 惠方

黄連 去 鬚 秦朮 去 苗 梔子仁 各一 兩 鐵粉 二 兩

右為散每服不計時候以新汲水調下二錢

又方 出聖 惠方

梔子仁兩半 豉一合 葱白五莖

右以水二大盞煎去滓分溫二服

治時氣發狂出聖惠方

寒水石兩 馬牙硝各一兩

右細研如麵不計時候以新汲水調下一錢

又方出聖惠方

秦艽去苗 大青 甘草灸微赤剉
各半兩

右為散不計時候以生地黄汁調下二錢服

治時氣熱盛癩狂或時昏沈出聖惠方

寒水石兩半 硃砂 鉛霜各一分

右都研如粉以軟飯和丸如梧桐子大每服不計時

候以溫水下十丸

治時氣得汗後心神狂亂出聖惠方

鐵粉兩半 野猪糞炒 生地黄二兩
燒灰

右為末以粟米飯和丸如梧桐子大不計時候以人

參湯下二十丸

大黃丸出聖惠方治時行氣已得汗熱毒不解心煩躁悶言語不定小便赤澁大便不通狂亂欲走

大黃二兩剉二兩微炒 黃芩一兩 梔子仁一兩 大青二兩 龍膽

一兩去蘆頭 苦參一兩 川朴硝二兩 剉 細研

右為末入朴硝勻煉蜜和搗三五百杵圓如梧桐子大不計時候以麥門冬湯下三十丸

鐵粉丸出聖惠方治時氣熱毒心神發躁狂亂欲走

鐵粉一兩 犀角屑一兩 硃砂半兩 苦參一兩 甘草二兩 剉 細研

剉生用 朴硝一兩 細研

右為末研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以人參湯下三十丸

治時氣天行發狂熱疾

用糞清以臘月截淡竹去青皮浸滲取汁服

鎮心散 治時氣汗出發狂

用緊白龍骨不拘多少為細末每服二錢新汲水調

下效

治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者

右絞人屎汁飲數合一方治時行大熱狂走用多年乾者搗末沸湯沃汁服之

治瘟病大熱狂言

出本草

取白頸蚯蚓破去土鹽拌日暴須臾成水飲其汁皆瘥

若患天行熱狂

出本草

以甘蔗搗絞汁服甚良

治天行熱狂煩悶消渴

出本草

以芭蕉根絞汁服之

除煩悶解時疾狂熱退胃膈熱及消酒毒

出本草

用小麥苗絞汁服之

時氣發斑論

夫時氣在表已發汗未解或吐下後毒氣不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令滄開泄更增斑爛虛故也

方

升麻散出聖惠方 治時氣表裏不解熱毒在臟致瘡

升麻 犀角屑 元參 秦艽去苗 子芩 柴胡去苗

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 甘草炙微赤剉各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

又方出聖惠方

元參 川升麻 甘草炙微赤各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

羚羊角散出聖惠方 治時氣壅毒不退發斑徧身煩熱大小

便不利

羚羊角屑 梔子仁 麥門冬去心 川麻黃 川大

黃剉碎微炒 元參 黃耆剉 甘草炙微赤剉 赤芍藥各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

葛根散 出聖惠方 治冬温未即為病至夏得熱其冬温毒氣

始出肌中斑爛癩疹如錦文喘咳悶嘔吐清涎

葛根 剉 陳橘皮

湯浸去白瓢焙

麻黃

去根節

知母

黃芩

甘草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮雙仁麩炒微黃各一兩外壹秘要用各二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候服外壹秘要切以水七升煮取三

升分温三服嘔吐當先定便宜消息忌海藻菘菜名

葛根橘皮湯

治時氣赤斑瘡出後胃中惡熱瘡盛

出聖惠方

雞子

二枚去殼

醎醋

二合

猪膽汁

三合

右藥相和煎十餘沸放温不計時候分温三服

治時氣熱毒在臟腑中欲發赤斑

出聖惠方

地黄汁

五合

豉

二合

麝香

一錢細研

右於鍋中以煉成猪脂半斤相和煎十餘沸瀝去滓

入麝香攪令勻每服二合盡服之毒當從肉中為汗

出便愈

又方 出聖惠方

以生蝦蟇一枚去腸肚爛研以水一大盞絞取汁頓服之或五月五日午時收者燒灰細研冷水調服益佳

治天行熱病若發赤黑斑如疹 出活人書

用青木香二兩以水二升煮取一升頓服之效

卑膏湯 出活人書 治時行瘟毒發斑大疫難救病源夫人冬

月觸胃寒毒者至春始發病初在表或已發汗吐下

而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天氣溫暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬溫毒始發出於肌膚斑爛癢疹如錦文也

生地黄 半斤切 打碎 好豉 一升

右以猪膏二斤合前藥煎五六沸令三分減去滓研雄黃麝香如大豆者內中攪勻盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑

黑奴丸出肘後方治瘟毒發斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救

方見本門時氣六日類黑奴丸同

治天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此是惡毒氣

用冬葵菜葉煮以蒜齏啖之則止

治天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝如火燒瘡皆

戴白漿隨沒隨生不治數日必死治後瘡盤黯黑一

歲方減此惡毒之氣所為

用水煮升麻綿漬洗之酒煮尤妙但痛難忍

黃連橘皮湯出活人書治冬溫未即病至春被積寒所折不

得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛癩

疹如錦紋而咳心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部生瘡

黃連四兩去鬚橘皮去皮尖杏仁雙仁枳實一名枳殼麻黃

去節葛根各二兩厚朴炙甘草炙各一兩

右剉以水八升煮取三升分三服令盡且消息下當

先止忌猪肉冷水海藻菘菜等

漏蘆橘皮湯 治冬温未即病至春被積寒所折不得

發至夏熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛癩疹

如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部赤生瘡

漏蘆 橘皮 甘遂 麻黃去節 杏仁去皮尖 黃芩

各二兩

右剉以水九升煮取三升分四服得下為佳下後餘

外證未除更服葛根橘皮湯方在前小品方忌海藻

松菜等一方有知母枳實白薇升麻大黃甘草為十

二味

治天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白

漿隨沒隨生若不急治數日即死

方見本門時氣發踈豆瘡類治時行病發瘡

治時氣發瘡癰

用葡萄酒食之甚效

治時行病發瘡

用升麻五兩以水二升入蜜同煎三沸半服半傳瘡

上瘰

時氣發碗豆瘰論

夫時氣發碗豆瘰者是熱毒氣攻於臟腑餘氣流於肌
肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘰此瘰所出如碗豆顆
因以名之但以解熱毒之藥其瘰即止脈洪數者是其
候也

方

犀角散

出聖
惠方

治時氣發碗豆瘰出後疼痛心神煩悶

犀角屑

丁香

薰陸香

木香

各半
兩

元參

川

升麻

各一
兩

麝香

一分

右為散每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候服

又方

出聖
惠方

用黃連二兩去鬚為散每服三錢以水一中盞煎至
五分去滓不計時候溫服

治時氣發碗豆瘰如爪甲大赤黑色者

出聖
惠方

羊膽七枚 羊脂三兩

右二味相和於鍋銀中煎五七沸待冷摩傅瘡上日四五用之

又方

出活人書

用川芒硝二兩細研以猪膽汁和塗於瘡上勿令動著直候痂落無癥仍卧黄土末上良此病小便澁有血者中壞瘡皆黑靨不出膿者死不療

治時氣發豌豆瘡

出聖惠方

以好白蜜通身塗於瘡上亦可救數食蜜如瘡爛痛可用細研黄土傅之

治時氣熱毒攻發豌豆瘡

出聖惠方

用苦參二兩細剉以水二大盞煎至一盞去滓分為二服日三四服之

治時氣發豌豆瘡初覺

出聖惠方

用川大黃半兩剉碎微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服日三四服之

又方 出千金方

用清黛半兩細研以新汲水調服之日三四服之一方用真波斯青黛大如棗

又方 出千金方

用木香一兩搗碎以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服聖濟錄用二兩以水三升煮取一升頓服之

治時氣發豌豆瘡亦治時及六畜時氣熱病 出千金方

用濃煮黍穰汁洗之若誤使糝穰不即瘥聖濟總錄瘡若黑者搗蒜封之

治傷寒時氣熱毒豌豆瘡 出初新書

用樺皮木剉煎汁溫服取安

又方治時氣熱病豌豆瘡

用雲臺煮汁洗之

又方 出千金方

若赤黑發如芥大者煎羊脂摩傳之

又方 出千金方

用小豆屑鷄白和傳

又方 出千金方

用婦人月水帛拭之

又方 出千金方

小兒著用取月水汁和水浴之

治時行病發瘡 出肘後方

用好蜜遍身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數拭

之外臺秘要肘後此歲有病天行發斑瘡頭面及

身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨沒隨生不即療

劇者數日必死得瘥後瘡癩紫蘇黥彌歲方滅此惡

毒之氣也世人云已建武中於南陽擊虜所得仍乎

為虜瘡諸醫參詳治療用之有效

治傷寒時行熱毒發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡

皆帶藥漿隨沒隨生

葵菜 煮 蒜薹 各不拘多少

右拌勻初患急食之不早治殺人但瘡後瘡癢色黑
彌歲方滅此是惡毒時氣也

又方 出肘後方

用水濃煮升麻汁漬綿洗之苦酒漬彌佳但燥痛難
忍

水解散 治天行熱氣則生疱瘡疼痛解肌出汗

麻黃 一兩 去節 黃芩 芍藥 桂心 各二分

右搗篩煖水調服二方寸七覆令出汗日再服瘡者

減之忌海藻菘菜

龍腦散 治時疾天行豌豆瘡赤瘡子未透心煩狂躁
氣喘妄語或見神鬼

以龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭大每服
一丸紫草湯下少時心神便定得睡復發透依常將
息取安

治時氣病骨中熱生豌豆瘡疱瘡

飲鐵漿瘥

治豌豆瘡出本草

服油麻一升須利即不生白漿大效

又方

用蔓菁根搗汁挑瘡破傳在上三食

時氣口瘡論

夫時氣發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未散攻心脾上焦熱躁故口舌生瘡也

方

升麻散出聖惠方治時氣熱盛口中生瘡

川升麻一兩木通一兩射干 麥門冬去心 蘆根 羚羊

角屑各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

大青散出聖惠方治時氣咽痛口瘡煩躁頭重

大青 黃芩 川升麻 麥門冬去心 梔子仁 甘

草灸微赤剉各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方治時氣熱盛昏沈如醉及腹脇痛百節

痠痛舌裂生瘡

麥門冬一兩川升麻三分柴胡一兩赤芍藥三分石膏

二兩淡竹葉三分甘草三分豉二分

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心脾臟熱毒舌裂滿口生瘡出聖惠方

川升麻一兩黃蘗半兩苦竹葉半兩射干三分大青半兩龍

膽元參生乾地黄各半兩

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓入蜜半合攪勻不計時候徐徐含嚥之

犀角散出聖惠方治時行氣心脾臟熱毒上衝遍口生瘡

大青半兩犀角屑元參各一兩胡黃連半兩川升麻

甘草生剉各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

黃連散出聖惠方治時氣兼口舌生瘡

黃連一兩半去鬚 川大黃 川升麻 黃芩 甘草生剉

各三兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣壅熱口内生瘡出聖惠方

黃連一兩半去鬚 甘草生剉 麥門冬去心 元參 柴胡去苗各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

酪酥煎丸 治天行熱盛口中生瘡病既發汗表裏俱

虛而毒氣未盡薰蒸上焦故喉口生瘡

酪酥 蜜各三合 大青一兩

右三味合煎三沸稍稍傳口以差為度

又口瘡方 治天行熱盛口中生瘡

取蛇莓五升搗絞取汁稍稍飲之一方絞汁一斗煎取五升飲之

升麻湯 治天行時熱病口瘡

升麻二兩通草四兩射干二兩羚羊角屑三兩芍藥三兩生薑

根切一升

右切以水七升煮取三升分為三服如人行五里時更服

柴胡湯 治天行病後乍寒乍熱昏昏不省覺脇下痛

百節骨痛不能下食兼口舌乾生瘡

柴胡八分升麻 芍藥 黃芩 麥門冬去心香豉綿裹

生薑各六分甘草五分石膏三分葱白十分竹葉切一升洗

右切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服如人行六七里進一服不吐不利瘥忌海藻菘菜熱麪

油膩

治天行熱盛口中生瘡

用黃栢皮削去上麤皮取裏好處入薄荷蜜漬之一宿惟欲令濃含其汁良吐更含若胃中熱有瘡時飲三五合尤佳

時氣結胃論

夫時氣結胃者謂熱毒氣結聚於心胃也此由病發於陽而下之太早熱毒之氣乘虛而痞結按之乃痛其寸口脈浮關上脈沈細是也脈大不下下之即死脈沈而大下之為逆若陽脈浮關上沈緊者名為臟結病舌上

白胎滑者為難治不往來寒熱其人反靜舌滑者不可攻之也

方

桂心散 出聖惠方 治時氣結胃心下堅實滿痛

桂心 一兩 甘遂 半兩 煨人參 一兩 去蘆頭 菰菰 一枚 取子用

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

猪苓散 出聖惠方 治時氣結胃心下滿實煩悶

猪苓 一兩去黑心 澤瀉 一兩 桂心 兩半 赤茯苓 三分 川朴 兩 硝石 兩

右為散不計時候以粥飲湯調下二錢

陷胃湯 出聖惠方 治時氣結胃心下堅實按之即痛其脈沈

滑

瓜蒌 一枚大者取子 黃連 去鬚 半夏 湯浸七遍去滑各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

檳榔丸 出聖惠方 治時氣結胃煩悶喘急

檳榔 兩半 馬蘭花 一分 甜葶藶 兩半 猪牙皂角 兩

半兩去皮灸令黃焦

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下二十丸

苦參丸 出聖惠方 治時氣結胃熱毒在內

苦參 半兩 黃連 一兩 黃芩 一兩 川大黃 一兩 梔子 兩

仁兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下二十九

陷胃丸 出聖 惠方 治時氣結胃熱實在內其脈沈堅心下痛

滿按之如石

川大黃 三兩 剉 碎 微炒 甜葶藶 二兩 剉 碎 微炒 川芒硝 二兩 杏仁 二兩

湯浸去皮尖 麩炒微黃

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸用甘遂末半錢蜜一小匙水一中盞同煎至七分溫溫化丸藥不計時候服之以利為度

治時氣熱毒在胃膈六七日垂死者破棺名千金煮湯

出聖 惠方

用苦參一兩剉搗碎以酒二大盞去滓看冷煖所得不計時候都為一服服後當聞苦參氣即吐毒如羊膽汁便愈一方以醋二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗愈一方救急療天行嘔逆不下食食入即出下又方同方見本門後時氣嘔逆類

凝雪湯 出方 治時氣天行毒病七八日熱結在胃中煩

亂欲死

用莞花一升以水三升煮一升半漬布薄胃上不過

三薄熱則除當溫煖四肢護厥也

萬金丸

出王氏博濟方

治時氣及疎理臟腑通理胃腸調順榮

衛

木香

乾薑

炮

大黃

生

陳橘皮

湯浸去瓢各一兩

芭豆

皮去

膜一兩冷水浸一宿焙乾研令細或與前藥一處搗羅

右藥五味同細搗羅為末用沙糖為丸如梧桐子大

患者三日外酌其毒氣傳入未曾疎利不計時早晚

以粥飲下五丸如藥未行熱茶投之上有疾即吐下

有疾即瀉汗出或吐瀉不止即以黃連湯止之老幼

虛實加減丸散懷身人不得與喫此藥有返魂之功

如四季覺熱但有此藥疎轉自然不染時氣若患常

惡轉於五更時亦用粥飲下

治時氣熱毒在胃腸六七日垂死者破棺

以雞子一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熟則吞之良

時氣欬嗽論

夫時氣欬嗽者由熱邪客於肺則上焦有熱心胃煩躁咽乾頭痛其人必飲水停心下則上乘於肺故上氣欬嗽也其脈洪數者是其候也

方

麥門冬散出聖惠方治時氣心胃痰嘔虛煩欬嗽時時氣促

麥門冬一兩去心人參三分去蘆頭葛根一兩剉桔梗去蘆頭前

胡去蘆頭半夏湯浸七遍去滑各三分貝母炙微黃甘草三分炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

木通散出聖惠方治時氣欬嗽咽喉不利心胃煩悶

木通剉桑根白皮剉各一兩葛根剉射干去苗土各紫苑去苗土各

分三馬兜鈴兩半半夏一兩湯浸七遍去滑

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候温服

天門冬散出聖惠方治時氣肺虛熱壅氣喘欬嗽

天門冬去心紫苑去苗赤茯苓甘草炙微陳橘皮

湯浸去白焙桑根白皮剉杏仁湯浸去皮尖人參去蘆

麻黃半兩去根節

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候温服

欬冬花散出聖惠方治時氣發熱欬嗽煩躁或時時氣喘

欬冬花一兩天門冬三分去心黃耆一兩剉石膏一兩半紫苑

去苗土杏仁湯浸去皮尖雙仁甘草三分炙

麻黃散出聖惠方治時氣頭痛欬嗽煩悶

麻黃去根節黃耆剉各一兩石膏一兩半天門冬三分去心人參

去蘆杏仁湯浸去皮尖甘草三分剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至八

分去滓不計時候温服

前胡散出聖惠方治時氣壯熱欬嗽頭痛心悶

前胡

去蘆頭

川升麻

各二兩

百合

貝母

煨令微黃

紫苑

去苗

桔梗

去蘆頭各頭兩半

石膏

三兩

麥門冬

二兩去心

甘草

半兩炙微

杏仁

赤一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服五錢水一大盞入竹葉二十七片煎至五

分去滓不計時候溫服

石膏散

出聖惠方

治時氣壯熱頭痛欬嗽

石膏

六兩

葛根

剉

百合

赤芍藥

貝母

煨令微黃

桔梗

去蘆頭

川升麻

瓜蒌

各二兩

梔子仁

一兩

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖豉五十

粒煎至五分去滓不計時候溫服

生乾地黄散

出聖惠方

治時氣肺熱欬喉中生瘡

生乾地黄

川升麻

元參

赤芍藥

紫苑

去苗

土柴胡

去苗

天門冬

去心

麥門冬

去心二兩

貝母

一兩半煨令微黃

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓入蜜

半匙更煎沸不計時候溫服

紫苑散

出聖惠方

治時氣欬嗽

欬嗽

紫苑 二兩半 去苗土 貝母 二兩 煨 令微黃 甘草 灸微赤 剉 桑白皮 剉 麥

門冬 去心 人參 去蘆頭 各一兩 陳橘皮 半兩 湯浸 去白瓢 焙 杏仁 一兩 半湯

浸去皮尖雙 仁麩炒微黃

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

柴胡散 出聖惠方 治時氣熱未退壅滯虛羸欬嗽

柴胡 去蘆頭 黃芩 桔梗 去蘆頭 元參 地骨皮 各一兩

麥門冬 一兩半 去心 焙 甘草 灸微黃 半兩 赤茯苓 人參 去蘆頭

紫苑 去苗土

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣肺熱胃膈壅滯欬不止 出聖惠方

貝母 一兩 煨 令微黃 紫苑 三分 去苗土 甘草 一分 灸微赤 剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

防風百解散 治傷寒風頭痛項強身體疼痛肌熱惡

寒欬嗽喘促老幼皆宜温半不躁

麻黄

去根剉 三兩

甘草

剉 炒 各二兩

防風

各二兩

蒼朮

半斤為末炒黃

右為細末每服三錢水一鍾半葱白三寸同煎七分去滓温服無時進二三服微汗周而已

地黄湯

治天行肺熱欬喉有瘡

生地黄

切一升

升麻

元參

芍藥

柴胡

麥門

冬

去心各八分

貝母

六分

竹葉

切一升

白蜜

一合

右切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再煮三沸含

咽無停中間不防食下利忌蕪荑熱麩猪犬肉油膩

前胡湯

治天行壯熱欬頭痛心悶病源熱邪壅於

肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故

上氣而欬也

前胡

升麻

麥門冬

去心各八分

貝母

紫苑

各六分

石膏

十二分碎綿裹

杏仁

三十枚去皮尖雙仁

竹葉

切一升

甘草

二分炙

右切以水八升煮取二升五合絞去滓分温三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油

膩猪肉等

生薑煎出一便良方 治天行病上氣咳嗽多睡黏涎日夜不

定

用生薑三兩去皮切如豆粒大以錫半斤和微煎令爛每日無間早晚少少含仍嚼薑滓一時噦之

治天行病後因食酒麪肺中熱壅滯遂成欬下止

桑白皮十二分 桔梗十分 麻黃六分 肥乾棗二十一 曹

州葶藶子十分 熬令紫為膏湯盛下

右切以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓下葶藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

華蓋散出醫學切問 治傷風冒濕頭目昏重憎寒壯熱四肢

疼痛欬嗽失音涕唾稠粘不問老幼皆可退之

蒼朮二兩 桔梗 厚朴各一兩 杏仁 陳皮 烏梅各半

兩 麻黃二錢 甘草一兩

右為粗末每服三錢以水一盞生薑三片煎至七分

去滓如發汗加葱頭

時氣口乾論

夫時氣熱毒攻於心肺則膈上壅躁若胃中有熱則津液竭少咽喉不利頭目痛心煩故口乾也

方

葛根散

出聖惠方

治時氣經下後未退頭疼口乾煩躁恍惚

葛根

剉 麥門冬

去心

黃芩

川升麻

甘草

灸微赤剉各一

兩 石膏 一兩半

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣胃熱口乾煩躁不止

赤茯苓

瓜蒌根

麥門冬

去心

生乾地黄

各一兩

知母 半兩

右為散每服五錢以水一大盞入小麥五十粒淡竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

蘆根散

出聖惠方

治時氣口乾

蘆根

二兩 剉

麥門冬

去心

黃芩

瓜蒌根

各一兩

甘草

兩半

灸微 赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

又方

出聖 惠方

石膏

人參

去蘆頭 各二兩

葛根

剉

麥門冬

去心 各一兩

右為散每服五錢以水一大盞竹葉入二七片煎至五分去滓不計時候溫服

瓜蒌根散

出聖 惠方

治時氣心脾壅熱煩悶口乾

瓜蒌根

犀角屑

川升麻

麥門冬

去心

葛根

剉

甘草

灸微 赤剉

梔子仁

各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣口乾舌縮心神煩悶不得睡臥

出聖 惠方

瓜蒌

一枚去殼留蓋去子留瓢

白蜜

竹瀝

酥

生藕汁

各一

合

右相和勻內於瓜蒌中以麩裹火煨候麩黃熟即傾入器中放溫每服半合不計時候服

黃連丸

出聖惠方

治時氣煩悶口乾

黃連

去鬚

瓜蒌根

知母

赤茯苓

麥門冬

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以牛

浮下三十丸

治時氣口乾喜睡

出聖惠方

乾棗

二十枚去核

烏梅肉

十枚微炒

甘草

炙微赤剉為末三錢

右入少蜜合搗令熟常含如杏核大嚥津

時氣熱毒攻咽喉論

夫時氣熱毒在臟陰陽隔絕邪熱客於少陰之絡毒氣上薰攻於咽喉故令腫痛或生瘡也

方

射干散

出聖惠方

治時氣熱毒上攻咽喉疼痛

射干

川升麻

麥門冬

去心

甘草

炙微赤剉

犀角屑

各二

分馬蔞根

兩半

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

前胡散 出聖惠方 治時氣熱毒上攻咽喉不利

前胡 去蘆頭 川升麻 各一兩 犀角屑 赤芍藥 甘草

灸微赤剉 天門冬 去心 桔梗 去蘆頭 絡石 射干 枳殼 炒

微黃去蘘各半兩 赤茯苓 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣毒氣攻心咽喉疼痛煩悶

半夏 湯浸七遍去滑 桂心 射干 甘草 灸微赤剉 麥門冬 去心

黃栢

右為散每服五錢以水一中盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

升麻散 出聖惠方 治時氣熱毒攻心咽喉腫塞不通

川升麻 木通 射干 赤芍藥 羚羊角屑

馬蘭根 甘草 灸微赤剉 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

元參散出聖惠方治時氣熱毒上攻咽喉噎塞腫痛

元參 射干 川升麻 百合 前胡去蘆頭 白蒺

痢炒微赤剉 犀角屑 枳殼麩炒微黃 杏仁湯浸去皮尖雙

甘草灸微赤剉 桔梗去蘆頭 木通剉 麥門冬去心各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒上攻咽喉噎塞不能下食出聖惠方

射干 川升麻 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白瓢焙 半夏

湯浸七遍去滑 甘草灸微赤剉各一兩

右為末每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

太陰元精丸出聖惠方治時氣熱毒攻咽喉

太陰元精細研 川升麻 元參 射干 寒水石細研

甘草灸微赤剉各半兩 馬牙硝一兩細研

右為末都研令勻煉蜜和丸如小彈子大常含一九
燕津

治時氣毒氣攻咽喉閉塞不通名烏扇湯出聖惠方

生烏扇半斤切 猪脂半斤

右相和煎五七沸絞去滓候冷常取如棗大含嚥之

治時氣熱毒攻咽喉腫痛出聖惠方

以商陸根切搗令爛炒熟以手帕子裹熨咽喉腫處
冷即復換

黃連馬通湯 治天行時毒病或下不止咽喉痛病源

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上薰攻於咽喉
疼痛生瘡

小豆一升 黃連去毛 吳茱萸各一兩 馬通汁三升

右以馬通汁令煮取一升盡服不差服作有效忌猪
肉冷水

青木香湯 治春夏忽咽喉痛而睡兼下痢

青木香 白頭翁各二兩 黃連一兩去毛

右切以水五升煮取一升半分溫三服小兒若病此服一合忌猪肉冷水

時毒藥出御藥丸方治時疾生熱臃膈在咽喉間增寒壯熱

頭痛面目赤腫其狀若瘡最相傳染無可救者並宜服之

大黃生用寒水石生用當歸各等分

右為細末每二三錢至五錢無根水調下食後服臨時觀虛實加減服之

石膏蜜煎 治天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴

石膏半斤蜜一分

右以水三升煮石膏取二升及內蜜復煎取一升去滓含如棗核許

通氣散 治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則瘥若看病人用此藥必不傳染

元胡一兩 藜蘆半兩 躑躅花二錢 猪牙皂莢 川芎

各一兩

右為細末用紙撚子蘸一米許維於鼻中取嚏為效

時氣嘔逆論

夫時氣胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔逆也
或吐下後飲水過多胃氣虛冷亦為嘔逆也

方

前胡散 出聖惠方 治時氣惡寒壯熱食則嘔逆

前胡 去蘆頭 麥門冬 去心 生乾地黄 葛根 剉各一兩 陳橘

皮 湯浸去白瓢焙 甘草 炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

人參散 出聖惠方 治時氣大下後胃氣虛冷嘔逆不止

人參 去蘆頭 麥門冬 去心 草豆蔻 各一兩 陳橘皮 湯浸去白瓢焙

黃耆 剉 甘草 炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散 出聖惠方 治時氣煩熱嘔逆不止

麥門冬 去心 蘆根 剉 人參 去蘆頭 葛根 剉各二兩 陳橘皮 一兩

湯浸去白瓢焙

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

半夏散 出聖惠方 治時氣腹脇虛脹心膈壅滯嘔逆不能食

半夏 湯浸七遍去滑 柴胡 去苗 黃耆 剉 赤芍藥 人參 去蘆頭

桂心 陳橘皮 湯浸去白瓢焙 大腹皮 剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心胃煩悶逆不下食

人參 去蘆頭 前胡 去蘆頭 甘草 炙微剉 黃芩 赤茯苓

蘆根 剉各一兩 枳實 麩炒微黃 木通 剉各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生蘆根半兩煎至

五分去滓不計時候溫服

枇杷葉散 治時氣頭痛壯熱食即嘔逆

枇杷葉

拭去毛
灸微黃

人參

去蘆
頭

黃芩

陳橘皮

湯浸去
白瓢焙

梔子仁

各一
兩半

石膏

一
兩

右為散每服五錢以水一大盞生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

陳橘皮散

治時氣壯熱嘔逆不下食

陳橘皮

湯浸去
白瓢焙

麥門冬

去
心

人參

去
蘆

甘草

灸微
赤剉

根

剉各
一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

前胡散

治時氣嘔逆頭痛不能食

前胡

去
蘆

蘆根

石膏

各一
兩

犀角屑

葛根

剉
人

參

去
蘆

陳橘皮

湯浸去
白瓢焙各三分

麥門冬

一兩半
去心焙

甘艸

一分灸
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片生薑

半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

蘆根散

治時氣心胃煩悶嘔逆不下食

蘆根 一握 去蘆頭 前胡 去蘆頭 甘草 灸微赤 剉 各半兩 桔梗 一兩 去蘆頭

枇杷葉 半兩 拭去毛 灸微黃

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十七片煎至五分去滓不計時候溫服

犀角散 治時氣十日已上時有嘔逆欲得飲水此胃

中伏熱不散

犀角屑 三分 麥門冬 一兩半 去心 焙 黃芩 川朴硝 蘆根

剉各一兩 石膏 二兩

右為散每服三錢以水一中盞入竹青茹生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣嘔逆不下食

生薑汁 半兩 蜜一兩 合

右相和令勻不計時候溫服

治時氣嘔逆欲死不下食兼主傷寒

半夏 半兩 湯浸洗七遍 去滑外 臺秘要作五兩 生薑 一兩 外臺秘要作八兩 切令薄 細勿

令溫惡經 水浸為妙

右剉碎以水一大盞煎至六分去滓分為二服不計時候溫服外臺秘要方以水三升別煮各取一升半去滓二汁相和一處共煮取二升分三服服相去如人行十里久當令下食其噦不過俄頃此方得之明侍御來豕來豕與方郎中隣居後乃得之大效忌羊肉鰾

又方

以臘月兔頭并毛皮燒灰令煙盡搗細為散每服以

粥飲調下一錢不計時候頓服外臺秘要服方寸則下食不噦更服燒之勿令大耗無所忌此用頓效

又方

以枇杷葉一兩拭去毛炙微黃為末每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

救急薤鼓粥 治天行乾嘔手足逆冷

薤白切 香豉各一升 白米四合

右以水一升煮豉一沸漉去滓薤及米煮為稀粥進

兩碗良

又方

前胡

橘皮

甘草

各灸一兩

麥門冬

三兩去心

竹茹

生

薑

各二兩

生地黄

四兩切

右切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服

如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麩猪肉

油膩

小青龍湯

治天行數日或十許日而表不解心下有

水熱毒相搏遂嘔時服有效者增損

麻黃

去節

芍藥

甘草

灸各二兩

桂心

細辛

各一兩

右切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等分

雖未當用嫌其太溫余增損其分兩以療十餘人皆

愈忌海藻菘菜生葱生菜等

橘皮湯 治天行壯熱嘔逆不下食

橘皮

茯苓

各三兩

生薑

四兩

右切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中

間任食一日服盡忌大酢蒜麪

救急療 治天行嘔逆不下食入則出出肘後方

取羊肝如食發生淡食不過三兩度則止

又方出肘後方

以雞子一枚於沸湯中煮三兩沸則出水津之熟內熱吞之神效

生蘆根湯 治天行後氣膈嘔逆不下食

燈心一分 生麥門冬十二分 人參四分 生蘆根一大握切

右以水一大升煎取八合去滓分溫三服

茅根湯 治瘟病有熱飲水暴冷呃者

茅根 葛根各切半斤

右以水四升煮取二升稍溫飲之呃止則停

治瘟病熱未除重被暴寒入胃熱蘊結不散變呃者

以單煮梓皮稍稍飲之佳瘟病積飲冷結胃中熱入

腎中變壯熱大呃者服梓皮溫呃得止者也夫腎中

有熱者病瘥後足心皮膚喜剝脫去頭鬚禿落是其

候也

治温病有熱飲水暴冷枇杷飲子

枇杷葉

拭去毛

茅根

各半斤

右切以水四升煮取二升稍稍飲之

前胡湯 治時行疫癘壯熱惡寒食即吐逆

前胡

去蘆頭

生地黄

焙

麥門冬

去心焙

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙人參

各半兩

右麤搗篩每服三錢以水一鍾竹葉二七片煎至七

分去滓温服即瘥

柴胡湯 治時行病疫癘數日未得汗渾身壯熱嘔逆

不下食

柴胡

去苗

升麻

大黃

剉炒各一兩

麻黃

去根節一兩半

桂

去粗皮

甘草

炙

枳實

去瓤炒

知母

焙各三分

鼈甲

醋炙

去裙襴一分

梔

子仁

一分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑三片煎至

七分去滓温服

前胡湯 治時氣壯熱頭痛嘔逆

前胡去蘆頭 知母焙 犀角屑 葛根剉 赤芍藥各一兩

石膏二兩碎

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入生薑三片拍碎

葱白二寸切煎至八分去滓溫服不拘時候

白朮湯 治時氣出汗吐下後四肢羸劣嘔逆減食

白朮剉 黃耆剉 人參 厚朴去粗皮生薑汁炙透 白茯苓去黑皮

桔梗剉 桂皮去粗皮 陳橘皮湯浸去白瓢焙 甘草炙剉各一兩

右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫

服不拘時候

治天行嘔逆吐不下食

用半夏半兩湯浸洗七遍去滑用生薑一兩同剉碎

以水一大盞煎至六分七分滓分二服不拘時候溫服

時氣心腹痞滿論

夫時氣太陽少陰併病脈浮緊反入裏則作痞痞者心

下滿也病發於陰者不可下下之則心下痞按之自軟

但氣痞爾故不可復下也若熱毒氣心乘則下心痞滿面赤目黃狂言恍惚者此為有實宜吐下之

方

鼈甲散

出聖惠方

治時氣熱毒不退大便秘瀝心腹痞滿飲

食不下精神昏亂恍惚狂言脈候洪數

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襖

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

人參

去蘆頭

檳榔

榔

茵陳

白蘚皮

麥門冬

去心

川大黃

剉碎微炒各一

兩陳橘皮

湯浸去白瓢焙

枳殼

麩炒微黃去瓢

甘草

炙微剉赤各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑汁半分煎至

五分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治時氣心下痞滿胃膈不利

前胡

去蘆頭

赤芍藥

木香

青橘皮

湯浸去白瓢焙

檳榔

各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

半夏散

出聖惠方

治時氣若吐下後發汗後心下痞滿氣上

衝胃起即頭眩脈沉緊者

半夏湯洗七遍去滑 白朮 甘草灸微赤剉 赤茯苓 桂心

人參去蘆頭 訶藟勒用皮 前胡去蘆頭各一兩

右為散每服五錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

前胡散出聖惠方 治時氣心腹痞滿身體疼痛煩熱嘔逆

前胡去蘆頭 半夏湯浸七遍去滑 枳殼麩炒微黃去瓢 黃芩 人參

去蘆頭 桔梗去蘆頭 檳榔各一兩 赤芍藥半兩 甘草灸微赤剉半兩

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

陳橘皮散出聖惠方 治時氣已汗下後脾胃氣虛心下痞滿

腹中雷鳴

陳橘皮三兩湯浸去白瓢焙 人參半兩去蘆頭 甘草灸微赤剉 乾薑炮剉

半夏湯浸七遍去滑 赤茯苓 桔梗去蘆頭 白朮 木香各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

桔梗散

出聖惠方

治時氣心腹痞滿氣喘痰涎不絕

桔梗

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑

赤芍藥

各三分

前胡

一兩去蘆頭

施復花

大腹皮

剉

枳殼

麩炒微黃去瓢

赤茯苓

甘草

灸微赤剉

各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候温服

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣氣壅上衝心腹痞滿坐卧不安

赤茯苓

赤芍藥

紫蘇莖葉

各三分

枳殼

麩炒微黃去瓢

大腹皮

剉

甘草

灸微赤剉各半兩

百合

郁李仁

湯浸去皮尖微

炒各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

治時氣飲水過多水心下痞滿

出聖惠方

川大黃

剉碎微炒

川朴硝

各一兩

甘遂

一錢煨金黃

右為散每服不計時候温服調下一錢以水為度

治時氣飲水過多心下痞硬痛出聖惠方

用芫花半斤以醋拌令勻以慢火炒熟用帛裏慰之冷即更炒以效為度

治瘟氣痺腫出本草

用赤小豆和桑根白皮煮食之

普濟方卷一百四十九

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十

明 周王朱橚 撰

時氣門

時氣宿食不消論

夫時氣吐之後或病新瘥脾胃氣皆虛不能化於水穀致有宿食難消頭目多疼時發寒熱或心腹煩滿大腸結躁此皆是其候也

方

枳實散出聖惠方治時氣後脾胃氣虛心腹虛脹喫食不消

枳實麩炒令黃 人參去蘆頭 乾薑炮裂 甘草炙微赤剉 半夏湯浸

七遍去滑 木香各半兩 白朮 桂心 桔梗去蘆頭 各三兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓食前服

麥蘖散出聖惠方治時氣後宿食不消不思飲食

麥蘖微炒 前胡去蘆頭 白朮 檳榔 人參去蘆頭 厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓食前溫服

人參散出聖惠方治時氣後胃虛心膈壅悶時有寒熱宿食

不消

人參二兩去蘆頭 大腹皮剉 枳實一兩麩炒微黃 赤茯苓

訶梨勒皮用 白朮 桔梗去蘆頭 麥門冬一兩半去心焙

甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

白朮散 出聖惠方 治時氣後宿食不消心胃壅滯乍寒乍熱

白朮 去蘆 人參 去蘆 陳橘皮 湯浸去白瓢培 大腹皮 剉 黃耆

枳殼 剉 麩炒 微黃 甘草 炙 微赤 剉 訶梨勒 用皮 沈香 各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

大黃散 出聖惠方 治時氣後宿食不消不思飲食

麥蘖 微炒 前胡 去蘆頭 白朮 檳榔 人參 去蘆頭 厚朴

去蘆皮塗生薑汁 炙令香熟各一兩 甘草 半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前

溫服

厚朴丸 出聖惠方 治時氣後腸胃虛冷食不消化

厚朴 去粗皮塗生薑汁 炙令香熟 人參 去蘆頭 枳殼 麩炒 黃 神麩

炒 微黃 大麥蘖 炒 微黃 杏仁 湯浸去皮尖雙仁 麩炒 微黃 各一兩 乾薑 炮製

剉 白朮 各兩 半 甘草 半兩 炙 微赤 剉 茱萸 桂心 各三

右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以棗湯下

三十丸

白苳蔻丸

出聖惠方

治時氣後脾胃氣冷食不消化

白苳蔻

去皮

草苳蔻

去皮

白朮

去蘆

人參

去頭

陳橘皮

湯浸

去白焙

桂心

神麴

炒黃三分

乾薑

炮製

甘草

灸微赤

各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯

下三十丸

木香丸

出聖惠方

治時氣後脾胃虛冷宿食不消

木香

乾薑

炮製到各三分

人參

去蘆頭

枳殼

麴炒微黃去瓢

麥蘖

炒黃熟

檳榔

各一兩

白朮

一兩半

甘草

半兩灸微赤

右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯

下三十丸

黑神散

出聖惠方

治瘟疫時氣有積食

巴豆

新好者一兩輕搗去皮以急流水兩碗浸一宿然後更煮三五沸候冷瀝出去心膜以

帛拂去水然後研如膏用厚帛十數重裏壓去油

五靈脂

二分黑色者為上

杏仁

半兩燒過後研入蒜煮研

豆豉

二兩新軟者為妙不得令乾與巴豆膏同細研

大戟

半兩

用生去皮其裏
面如粉者妙

三稜

半兩
生用

右三味為極細末入巴豆豉研細後入杏仁更研細別入飛羅麵半匙以井花水調如漸次拌藥和得所入臼中搗三二千下丸如菜豆大晾乾入瓶盒內或微火焙亦得如遇傷寒有食積者脈沈身體不熱即宜服之量患人臟腑虛實加減丸數服用煎薑棗湯吞下取微利為度不可太過溏泄身熱下之則為病氣結胃若病再上可吐者同生薑乾嚼五丸

時氣煩躁論

夫時氣病煩者由陰氣少陽氣多故身而煩躁也其毒氣在心上而煩躁者由陰氣少伸陽氣多故身熱而煩躁也則令人悶而欲嘔者若其人胃內有燥結而煩躁者或則譫語時遠臍痛其腹脹滿皆當察其證候而治之也

方

竹葉湯

出聖
惠方

治時氣表裏未解煩躁不可忍者

竹葉二兩 石膏二兩 麥門冬半兩 半夏半兩 人參七兩

蘆頭半兩 甘草一分 陳橘皮一分 生薑半兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎五分去滓不

計時候溫服

犀角散出聖 治時氣頭目煩痛心神躁壅大小便不利

犀角屑半兩 防風半兩 檳榔一兩 川升麻一兩 秦艽一兩

去苗木通一兩 白蘚皮一兩 甘草半兩 川麻硝二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

大黃散出聖 治時氣表裏如火煩躁欲死

川大黃半兩 寒水石 川升麻 石膏

川麻硝 甘草灸赤 葛根半兩

右為散每服不計時候以新汲水調下二錢

水解散出聖 治時氣煩躁頭痛壯熱

方見本門時氣二日類

大黃散出聖 治時氣頭痛壯熱不解心神煩躁

川大黃半兩對 黃連半兩 麥門冬一兩 梔子仁半兩

柴胡一兩 甘草半兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉半合葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服

苦參散出聖 治時氣壯熱不解心神煩悶毒氣在胃腸

苦參一兩 黃芩一兩 川升麻二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服頻服當吐為效

治時氣已五六日心神煩躁不解出聖

竹瀝半小盞 新汲水半小盞

右相和攪令勻不計時候頓服

又方出聖

用大地龍二條破腹去泥細切似小豆大小便一中盞煮令熟去滓不計時候溫服

又方出聖

鷄子清一錢 芒硝末一錢

右以新汲水半盞調服一方用新汲水三合調服

竹葉湯 治煩躁而渴不止惡寒但熱盛者崔氏療常

用亦佳不徒療天行凡虛羸病及病後胃上痰熱者

服之皆妙

甘草一兩黃芩一兩棗十五枚半夏一兩芍藥三兩前胡一兩

小麥五合人參二兩粳米一升知母二兩麥門冬四合竹葉一把

入水瓜蒌一兩生薑四兩

右切以水一斗五升煮取五升分五服若天行而虛

羸久病胃上痰熱亦可服之加黃耆二兩除黃芩減

知母一兩除瓜蒌用之大效忌羊肉海藻松菜

救生散 治疫癘病壯熱煩躁頭痛體疼

人參 五味子 白朮各半兩麻黃去根節三兩桂去粗皮

厚朴去粗皮大黃剉灸各二兩附子麩炒去皮尖甘草灸各二兩

右搗羅為散每服三錢匕新汲水調下後用熟水嗽

口良久喫生薑熱茶一盞投以綿被覆之如陽毒汗

出陰毒瀉下即瘥

治時氣表裏大熱欲死方

大黃 寒水石 芒硝 石膏 升麻 麻黃

葛根 紫草

右搗篩水服方寸

發汗麻黃湯 治天行壯熱煩悶

麻黃 五兩 去節 葛根 四兩 梔子 二十枚 擘 葱 切 一升 香豉 一升 綿裹

右以咀以水八升先煮麻黃葛根二味沸去沫內諸藥煎二升五合去滓分為三服服別相去如人行五

十里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸熟食

葛根解肌湯 出肘後方

葛根 四兩 芍藥 二兩 麻黃 一兩 去節 大青 一兩 甘草 一兩 黃芩 一兩

一兩 石膏 一兩 研 大棗 四枚 擘 桂心 一兩

右切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取

汁瘥忌海藻菘菜

治天行病心悶 出本草

以水中細草搗絞汁服之

治時氣熱毒心神煩躁

出肘後方

取生杼木削去黑皮細切裏白者一升以水二升五

合煎去滓一服八合三服

又方

出肘後方

取木九子二七枚以水五升按之熟去滓食服汗吐

即愈

又方

出肘後方

取古錢一百五十七枚以水一斗煮取七升服汁盡
之須臾復以五升水更煮令得一升以水二升投中
合得三升出錢飲汁當吐毒出也

又方

出肘後方

取猪膽膏如彈子大者溫服之日三服三日九服

勝金方

出肘後方

治時氣疾熱病狂言心躁

用苦參不拘多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎
至五分溫服連煎三服者有汗無汗皆瘥

治天行病心悶

出本草

以絡石草煎服

治時氣五六日心神煩躁不解

用竹瀝半盞新汲水半盞和勻服之

時氣煩渴論

夫時氣煩渴者此由熱氣入於腎臟故也腎惡燥今熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

方

知母散

出聖惠方

治時氣頭疼骨肉煩疼口燥心悶外寒內

熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服

知母

人參

去蘆頭

地骨皮

葛根

剉

甘草

炙微赤剉各一

兩石膏

三兩

瓜蒌根

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

赤芍藥散

出聖惠方

治時氣數日不解心躁渴小腹脹急臍

下悶痛宜服

赤芍藥 知母 黃芩 元參 麥門冬去心 柴胡

去苗各三分 石膏二兩 甘草三分
灸微赤對

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡散出聖惠方 治時氣頭疼骨肉煩疼口燥心悶外寒內

熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服

柴胡一兩 川升麻三分 黃芩三分 石膏二兩 麥門冬一兩
去苗

犀角屑三分 葛根三分 甘草三分
灸微赤對

右為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

赤茯苓散出聖惠方 治時氣頭痛雖時有汗煩渴不止宜服

赤茯苓二兩 甘草灸微赤對 澤瀉 桂心 葛根對各一兩

石膏二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

猪苓散出聖惠方 治時氣煩熱煩渴欲飲水小便不利宜服

猪苓

去黑皮

赤茯苓

澤瀉

阿膠

搗碎炒令微黃

滑石

各一

兩

右為散每服三錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治時氣壯熱煩渴

麥門冬

二兩去心

五味子

一兩

人參

一兩去蘆頭

石膏

二兩

甘草

一兩灸微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

土瓜根散

出聖惠方

治時氣大熱心胃煩渴

土瓜根

半兩

乾棗

五枚

麥門冬

半兩去心

甘草

三分灸微赤剉

豉

半合

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治時氣煩渴不止

出聖惠方

地骨皮

半兩

阿膠

半兩搗碎炒微黃

葱白

二莖并鬚

右細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治時氣煩渴身熱頭痛嘔逆不能食宜此方

出聖惠方

柴胡

二兩半
去苗

赤茯苓

二兩
兩

枳殼

二兩
微黃去瓢

甘草

一兩
微

赤剉
細

麥門冬

二兩
去心

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

升麻散

出聖惠方

治時氣下後煩渴不止

川升麻

三分

知母

三分
微赤剉

石膏

一兩
半

葛根

一兩

剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片粳米

一百粒煎至五分去滓不計時候溫服

葛根散

出聖惠方

治時氣煩渴飲子即嘔吐心胃不利者宜

服

葛根

剉

猪苓

去黑皮

赤茯苓

桂心

白朮

澤瀉

瓜蒌

各一兩

右為散每服不計時候以溫水調服二錢令亟飲水

小便利汗出便愈

又方 出聖惠方

黃連 一兩 去鬚 瓜蒌根 一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候煎大

麥湯溫下三十九

治時氣煩渴不止 出聖惠方

葛根 二兩 剉 葱白 五莖 切

右以水二大盞煎至一大盞去滓內白粳米半合豉

半合以生絹裹煎良久候爛去米豉放冷不計時候

溫服

治時氣煩渴不止 出聖惠方

取生藕搗絞取汁一中盞入生蜜一合攪勻不計時

候分為二服

芍藥湯神方 治毒溫病及吐下後有餘熱煩渴

芍藥 五分 黃連 四分 甘草 二分 炙 黃芩 二兩 桂心 二兩 瓜蒌 二分

右切以水五升煮取三升分三服一日令盡忌猪肉

冷水海藻菘菜生葱等

乾糞湯

一名破棺湯

解大熱天行病若大困患舌燥如鋸極

渴不能服藥者宜服

用陳久乾人糞一大升以沸湯一大升沃糞一食久
澄清瀝取一升頓服如渴不止者依前法更服此灸
從心厭骨下一寸半名巨闕取患人中指節為寸灸
三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上岐
骨上兩頭築着骨當橫量下前一寸當中直下則是

巨闕也

時氣鼻衄論

夫時氣鼻衄者由五臟絡熱所為心主於血邪熱中於
手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻
中出也

方

石膏飲子

出聖惠方

治時氣鼻衄血煩躁不止頭痛氣逆

石膏

搗碎

竹茹

各二兩

甘草

炙微赤

桂心

各半兩

赤芍藥

黃芩

柴胡

去苗各一兩

生地黄

三兩

右剉碎和勻每服半服先以水一大盞半浸伏龍肝二兩澄清一大盞煎至五分去滓不拘時候溫服

治時氣心肺中熱鼻衄不止

出聖惠方

胡粉

炒令黑細研

乾薑

炮製為末

亂髮灰

細研

釜底墨

細研

伏龍

肝

細研各少許

右藥末少許吹入鼻中便止若吹一大豆許更效

治時氣鼻衄心膈躁悶面赤目黃起卧不定

出聖惠方

烏賊魚骨

刺蘇

蒲黃

各二兩

右為散每服不計時候以冷飲粥調下二錢頓服以定為度

治時氣鼻衄諸藥無效者宜用此方

出聖惠方

白馬通

七枚絞取濃汁

阿膠

半兩槌碎炒令黃燥為末

右同和熟攪以滴鼻中仍用新汲水微浸足即止

治時氣鼻衄日夜不止面色如黃金

出聖惠方

取韭根一握搗取汁內於餅中用繩懸於井中浸良

久急取出滴二七滴鼻中即止

治時氣卒患鼻衄不止 出聖 惠方

以鬱金為末服不拘時候以冷水調下二錢以定為

度

又方 出聖 惠方

熟艾 一鷄子大 牛皮膠 一片如手大杵碎炒令黃燥

右以豉汁二大盞煎至一大盞去滓分溫二服

清涼散 治時氣頭目昏疼久積熱毒鼻口中出血

大黃 剉 芍藥 各一兩 麻黃 去節根煎去沫一兩

右為散每服一錢以沙糖冷水調下食後服

生地黄飲 治時氣壯熱頭疼鼻血不止

生地黄 汁 生藕 汁 生薑 汁 生蜜 各三合

右和勻分作三服每服微煎過食後臨卧服

治天行毒病鼻血是熱毒血下數升者病源天行衄血

者五臟熱結所為心主於血邪熱中於手少陰之經客

於足陽明之絡故衄血者血從鼻出也 出肘後方

右勿療自瘥亦無所苦亦可取好松煙墨搗之以鷄子白和丸如梧桐子大水下一服十九並無所忌或用生地黄汁下二十九

大病瘥後小勞便鼻衄方出肘後方

左顧牡蠣十分石膏五分

右搗末酒服方寸匕三四日亦可蜜丸如梧桐子大服之

龍骨散出嚴氏濟生方治時氣鼻衄三升以上恐多宜此藥止

龍骨不拘多少

右為細末用少許吹入鼻中九竅出血皆用此藥吹之

時氣熱毒攻眼論

夫肝開竅於目肝氣虛熱毒氣則乘虛上攻於目故赤疼痛或主赤醫白膜瘖肉及瘡也

方

升麻散出聖惠方治時氣熱攻於肝臟目赤色痛宜服

川升麻 地骨皮 元參 甘草灸微赤剉 黃芩各半

赤茯苓 梔子仁 防風 羌活 桑木白皮剉

決明子各半兩 石膏三兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片黑豆

五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

梔子散出聖惠方 治時氣熱毒未除心胃煩悶毒氣上攻而

眼赤腫宜服

梔子仁 黃連去鬚 枳殼麩炒微黃去瓢 龍膽去蘆皮 赤芍藥

甘草灸微赤剉 川大黃剉碎微炒各半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食後

溫服

羚羊角散出聖惠方 治時氣肝臟虛熱眼昏赤痛宜服

羚羊角屑 赤茯苓 防風去蘆頭 麥門冬去心 甘草

灸微赤剉 地骨皮 枳殼麩炒微黃去瓢 麩仁各半兩

右為散每服五錢以水一鍾煎至五分去滓入蜜一

茶匙更煎兩沸食後溫服

地骨皮散

出聖惠方

治時氣熱毒攻眼疼痛心中躁悶宜服

地骨皮

防風

去蘆皮

赤芍藥

葛根

剉

羚羊角屑

川大黃

剉碎微炒各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白一

莖煎至五分去滓食後溫服

治時氣熱毒攻眼不見物

出聖惠方

川升麻

一兩

決明子

一兩

細辛

半兩

麩仁

一兩

黃連

一兩

去鬚

犀

角屑

半兩

右為散每服食後以溫漿水調下二錢

洗眼竹葉湯

治時氣目赤疼痛及痒不可忍宜服

竹葉

一百片

秦皮

三分

防風

三分

甘菊花

三分

葳蕤

三分

麩仁

甘草

一分三分生用

右細剉以水二大盞煎至五分以綿漚去滓避風處

洗眼目三五度瘥

積猪膽點眼方

出聖惠方

治時氣熱毒攻眼中有努肉瞼裏

有瘡日夜下淚不見物

獐猪膽

汁一枚

川朴硝

黃連末

半錢

龍腦

一碗豆大研令細

右都研與猪膽相和勻浸一宿晝夜點眼若熱氣淚至多當時便止

治時氣熱毒攻眼腫痛不可忍洗眼方

出聖惠方

以水煮蜂窠洗之日六七度甚效

獐猪肝貼眼方

出聖惠方

治時氣後因喫葵蒜熱麪損眼暗

不見物晝夜疼痛不可忍宜服

以獐猪肝一具薄切以清水浸淘如法貼眼臉上乾

即換之連日及夜貼之重者不過一二日效

漏蘆連翹湯 治時氣熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫

及眼赤腫生障

漏蘆 連翹 黃芩 麻黃 白薇 升麻 甘

草

各一兩

枳殼

大黃

各二兩

右以水九升煮取三升分三服相去如人行五

里久更服熱盛者可加芒硝二兩

時氣餘熱不退論

夫時氣病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脈洪大實數腸胃脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤此為腑臟有結熱故也

方

大黃散出聖惠方治時氣餘熱不退發渴躁悶宜服

川大黃

剉碎微炒

梔子仁

犀角屑

麥門冬

去心

黃連

地骨皮

甘草

炙微赤剉

黃芩

柴胡

去苗

白蘚皮

各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治時氣餘熱不退心膈時發煩躁宜服

麥門冬

去心

犀角屑

竹茹

黃芩

石膏

川大

黃

剉碎微炒

川朴硝

甘草

炙微赤剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

解肌散

出聖惠方

治時氣五七日頭痛餘熱不解宜服

次定回車全書

葛根一到兩

柴胡去苗

麻黃三分去

赤芍藥兩半

黃芩兩半

甘草半兩灸

桂心兩半

石膏兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服之

知母散出聖

治時氣三五日餘熱不解心躁煩渴宜服

知母三分

川升麻三分

鈎藤一分

地骨皮三分

赤茯苓三分

麥三分

門冬三分

石膏一分

甘草一分

赤芍藥一分

黃芩一分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑三七片煎至

五分去滓不計時候溫服

犀角散出聖

治時氣餘熱不解心煩躁渴表裏虛

犀角一分

葛根一分

麻黃一分

黃芩一分

甘草一分

赤芍藥一分

黃芩一分

甘草一分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

麻黃散出聖

治時氣餘熱不解身體疼痛

赤芍藥一分

麻黃一分

柴胡一分

赤茯苓一分

地骨一分

黃芩一分

甘草一分

皮三分人參一兩去蘆頭

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方治時氣餘熱不解心膈壅悶四肢煩熱

川芒硝一兩麥門冬一兩去心 梔子仁三分枳殼三分炒微黃

芩三分甘草半兩灸微赤剉

右為散每服五錢以水一中盞入竹葉七片煎至五分去滓不計時候溫服

又方出聖惠方

大青三分剉去心 枳殼三分麩炒微黃 去瓢 甘草一分灸微赤 剉 川升麻

一兩黃芩三分 川朴硝一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

葛根散出聖惠方治時氣餘熱不解頭重宜服

葛根一兩剉 赤芍藥一兩 黃芩一兩 梔子仁一兩 豉二合

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣十數日餘熱不解或時發寒熱宜服

出聖惠方

歲莖

一兩 去苗

羚羊角屑

三分 石膏

黃芩

一兩

甘草

半兩 炙 微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞生薑半分煎至五分

去滓不計時候溫服

瓜蒌根散

出聖惠方

治時氣餘熱不退

瓜蒌根

一兩 三分 去苗

地骨皮

一兩 枳殼

半兩 麩炒 微黃去瓢

赤

茯苓

一兩 兩 塗酥炙

鼈甲

金黃去裙襴

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入生

地黃汁半合更煎一兩沸不計時候溫服

大黃丸

出聖惠方

治時氣餘熱不退發渴不止大便秘澀

川大黃

三兩 剉 碎微炒

柴胡

去苗

黃芩

去須

白蘚皮

梔子仁

秦艸

去苗

龍腦

去蘆頭

赤芍藥

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下三十九以利為度

柴胡丸 出聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食

能飲食

柴胡 去苗 桔梗 去蘆頭 子芩 赤芍藥 黃耆 剉 枳殼

麴炒微黃去氈 鼈甲 塗酥灸金黃去裙襴 人參 去蘆頭 甘草 半兩灸微赤剉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候溫水

下三十九

治時疾內外熱不解 出本草

以柴胡單煮服之良

生地黄湯 治天行二七日外至三七日不歇或寒或

熱來去翕翕四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不

安

生地黄 汁一升 生麥門冬 汁一升 赤蜜 一升 人參 二兩 白朮

三兩 桂心 一兩 甘草 一兩 升麻 三兩 薄心 一升 石膏 八兩碎綿裹

生地黄 四兩 骨皮 四兩

右細切以水九升煮諸藥取二升去滓下地黄汁更

煎三兩沸分溫五服晝四夜一忌蕪荑生葱海藻菘

菜菔李雀肉等物

鼈甲湯 治天行三七日至四七日勞瘠未歇熱毒不

止乍寒乍熱乍劇乍瘥發動如瘧

鼈甲

三兩 灸

大青

二兩

石膏

八兩 碎 綿裹

牡丹皮

二兩

烏梅肉

常山

三兩

竹葉

切一兩

牛膝根

三兩

甘草

一兩

香豉

一升 綿裹

右切以水九升煮取三升分溫三服日三忌生葱生菜鯉魚海藻菘菜苜蓿菜蕪荑一方有生天門冬生地黃各一升

治時氣餘熱不解煩躁發渴四肢無力不能飲食

出聖惠方

用牛蒡根搏絞取汁不計時候服一小盞

治天行壯熱

出本草

以陳白芨煮服之

治天行熱疾

出本草

以石蟬熟水磨服之

治天行寒熱

出本草

取藍麩子乾搗為末食之

治天行時氣內外俱熱出本

以前胡單煮服之

時氣發黃論

夫時氣病者因溫毒氣盛稽於脾胃有熱則新穀鬱蒸不能消化大小便細澁故令身面變黃或如橘色或如桃枝色也

方

秦艽散出聖 治時氣壯熱腹滿下硬不能食發黃宜服

惠方

秦艽去苗 柴胡去苗 芎藭 桔梗去蘆頭 葛根 黃芩

甘草灸微赤剉 川大黃剉碎微炒 桑根白皮各一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

柴胡散出聖 治時氣五六日壯熱骨節煩疼連心兩肋

惠方

氣脹急硬痛不能食變為黃宜服

柴胡去苗 枳殼麩炒微黃 瓜蒌根 黃芩 梔子仁 茵

陳龍膽去蘆頭 川大黃剉碎微黃 甘草半兩灸微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

梔子散

出聖惠方

治時氣三日外若忽覺心滿堅硬脚手心

熱則變為黃不療殺人宜服

梔子仁

紫草

白蘚皮

黃芩

秦艽

去苗各一兩

甘草

半兩灸微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

茵陳丸

出聖惠方

治時氣熱毒不退心胃躁悶變為黃宜服

茵陳

一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

豉

一合

梔子仁

一兩

鼈甲

一兩塗醋

灸令黃去裙襴

川芒硝

二兩

杏仁

一兩

湯浸去皮尖雙仁麴炒微黃

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹

葉湯下三十丸以利為度

大黃丸

出聖惠方

治時氣徧身發黃心膈煩熱宜服

川大黃

剉碎微黃

黃連

去鬚

黃蘗

剉

黃芩

麴衣

梔子

仁各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下二十九

治時氣發黃宜服此方 出聖惠方

甜葶藶

二兩隔紙炒令紅色

川大黃

二兩剉碎微炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時候以溫水服下二十九以利為度

又方 出聖惠方

以生小麥苗搗取汁每服一小盞日三四服即愈

治時氣三日外忽覺心滿堅硬脚手心熱則變微黃不

治殺人宜服此方名瓜蒂搐鼻法又治傷寒鼻塞頭

痛 出德生堂

取甜瓜蒂七枚為末用一大豆許吹兩孔冷黃水出殘末水調服之得吐黃水一二升即瘥

又方 出聖惠方

以萱草根苗搗絞汁二小盞分為三服以利為度

茵陳蒿散 治時氣發黃疼痛

茵陳蒿 黃芩去黑心 梔子仁 大青各一兩 大黃剉

朴硝各五兩 白蘚皮 葛根剉 升麻各一兩半

右為散每服二錢匕新汲水調下取利即瘥

茵陳黃芩湯 治時氣面黃腹堅氣急言語錯亂

茵陳蒿 大黃蒸過 生麥門冬去心 梔子仁各四兩 青黛

升麻各三分 黃芩去黑心

右㕮咀如麻豆大每服二錢水一盞半煎至八分去

滓下芒硝末半錢更煎三沸溫服

許仁則療急黃此病始得與前天行病不多異五六日

但加身體黃甚者洩淚汗唾小便如麤色眼白睛正

黃其更重狀與天行病俟最重者無別如至此困自

須依救治天行最重半夏七味湯救之若未至是者

宜依後法急黃狀始得天行類天行病經三兩日宜

合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢

麻黃三兩去節 乾葛五兩 石膏八兩研 生薑六兩 茵陳二兩

右切以水八升煮取升七合去滓分溫三服每服相

去如人行十里久服訖欲汗則覆被微取汗以散之
依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後味歇經三五日
又合梔子等五味湯以取利

梔子 二十枚擘 柴胡 三兩 黃芩 三兩 茵陳 三兩 芒硝 六兩

右切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒硝攪
令硝盡分溫三服如人行十里更服之

療時疾發黃心誑煩熱悶不識人者

用大瓜萎一枚黃老者以新汲水丸合浸取汁下蜜

半大合朴硝八分合攪令硝盡分再服便瘥

治時氣黃病發初唯覺四體沉沉不快須臾見眼中黃
漸至面黃及舉身皆黃急令溺白紙即如藥染者此
熱毒已入內急治之若初覺便作

用瓜蒂赤豆散吹鼻中黃汁出數升者多瘥若深應
看其舌下兩邊有白脉彌處蘆刀割破之柴血出數
升亦歇然此須慣解剖者不解割忽係亂舌下青脉
血出不止便然人方可燒紡織以灼此脉令焦兼瓜

蒂雜巴搗為丸服之大小便亦去黃汗破灼已後禁諸雜食又云有依黃坐黃須要分別之一方竹粥煮飲之

又方

用醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚

又方

竹葉五升切 小麥七分 石膏三兩

右為末綿裹之以水五斗煮取七升一服盡喫即瘥

也

又方

生葛根汁二升 梔子三七枚 茵陳一升切

右水五升煮取三升去滓內葛根汁分為五服

又方

用金色脚雞雌血引治如食法熟食寅飲汁令盡不再作亦可下少鹽鼓佳

茵陳湯 治時氣行痧熱在裏鬱蒸不散化為發黃

茵陳六兩 大黃二兩 梔子仁三錢

右以咀每服四錢以水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

茵陳黃連湯 治天行急黃身如金色

茵陳各半 黃連去鬚 黃芩去 大黃剉炒各一兩 甘草炙人

參各半

右麤搗節每服五錢以水一盞煎至一盞去滓食後溫服之

梔子丸 治時氣病急黃及瘴癘疫癘

茵陳 梔子 芒硝各三分 大黃蒸一分 杏仁去皮尖炒三分

豆豉一分半湯浸別研 常山 鼈甲醋炙各半兩 巴豆去皮油一分

右為末錫飴為丸如梧桐子大每服三丸飲下吐利為效未瘥加一九覺體有異急服之

茵陳丸 治天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心

滿喘氣

茵陳三兩 大黃五兩 梔子仁二兩 黃芩二兩 鼈甲二兩 常山

芒硝 二兩 巴豆 一兩 去皮 灸 豉 三合 升麻 二兩

右為搗篩以蜜和丸如梧桐子大每服三丸以得吐利則瘥忌苜蓿生菜葱生菜野猪肉

秦艽湯 治天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手

心熱則變為黃不療殺人

秦艽 一兩 紫草 一兩 白蘚皮 一兩 黃芩 一兩 梔子仁 一兩

右切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分為二服老小以鐘量之一劑不愈更喫有效

治時行黃病

用冬葵子葉單煮汁服之

治疫氣結黃瘧瘴

以千里及煮服之

時氣毒氣攻手足論

夫時氣毒氣從臟腑中出攻手足則炘熱赤腫疼痛也人五臟六腑其各輸皆出於手足指故毒氣從內出攻手足也

方

治時氣毒攻手足赤腫疼痛欲斷及傷寒

出聖
惠方

豉

半斤一
作豉 羊肉 一斤

右以水一斗同煮候肉熟以汁看冷暖得以漬手足

日三度外臺秘惡方用鹽豉一斤

又方

出聖
惠方

先掘地作坑子深三尺大小容兩足燒中令熱以酒灌坑中著屐踞坑上衣擁勿令泄氣日再服之

又方

出聖
惠方

以羊肉桃葉煮取汁漬之加鹽少許尤佳一方鹽豉尤好

治時氣熱毒攻手足腫熱疼痛欲死脫方

出聖
惠方

取虎杖二斤剉以水三斗煮取二斗去滓溫漬手足

日三度

又方

出聖
惠方

以苦參一斤剉酒一斗煮五七沸去滓溫溫漬之日

三四度

治時氣熱毒攻手足焮熱疼痛

用煮馬通汁漬之日三度

又方

出聖惠方

用猪膏和馬通塗之亦佳

治時氣熱毒攻手足腫痛似脫不可忍

出聖惠方

用猪蹄一具去毛淨洗剉碎葱白一握切以水一斗

煮五七沸去猪蹄等稍熱漬之外臺秘要內方鹽少

許肘後方同

又方

出聖惠方

用黃蘗半斤細剉以水三斗煮十沸用漬手足差外

臺秘要方用黃蘗五斤水煮漬之

治時氣毒攻手足腫痛欲脫亦治傷寒

出聖惠方

以生牛肉裏腫消痛止

神聖熱藥

一名裏白散出御藥院方

治時疾

白花蛇肉

錢二

黑花蛇肉

錢二

紫色雄黃

錢二

錦文大黃

兩半

右各生用搗羅為細末大人每服三四錢水一盞半同煎三五沸食後稍熱服病大者每日三四服若十餘歲以下小兒每服一錢半至二錢煎服同法

治熱病手足腫欲脫兼主天行

出肘後方

用稻穰灰淋汁漬之佳

治熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方

出肘後方

取煮馬糞若羊糞汁漬之一方猪膏和羊糞塗之亦

佳

時氣下痢論

夫時氣吐下之後表裏俱虛熱毒乘虛入於腸胃則下痢黃赤或下膿血徧身壯熱臍腹疼痛其脈數者自愈脈沉弦者必重脈大者為未止此皆熱毒氣所為也

方

升麻散

出聖惠方

治時氣熱毒攻於腸胃下痢不止

川升麻

當歸

剉微炒

黃連

去鬚微炒

甘草

炙赤剉

桂心

善濟方

三九

赤芍藥 黃蘗 微灸 劉 各半兩

右為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服外臺秘要方治天行毒病酷熱下痢用水三升煮取一升頓服之忌海菜菘菜猪肉冷水生葱等物一名七物升麻湯

龍骨散 出聖 惠方 治時氣諸痢不止宜服

龍骨 三兩 黃連 去須 炒 黃蘗 微灸 炒 當歸 劉 炒 阿膠 杵碎 炒 令黃 各

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

擲葉散 出聖 惠方 治時氣大腸實熱下血不止臍下痛宜服

擲葉 一兩 地榆 三分 劉 木賊 三分 劉 當歸 三分 劉 赤芍藥 三分

伏龍肝 二分

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連散 出聖 惠方 治時氣四五日大熱下痢宜服

黃連 去須 微炒 黃蘗 微灸 炒 艾葉 微炒 黃芩 各一兩 龍骨 二兩

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

木香散

出聖惠方

治時氣熱毒痢膿血腹中疼痛宜服

木香

半兩

黃連

一兩去須微炒

青橘皮

半兩湯浸去白瓢焙

梔子仁

一分

地榆

半兩

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連丸

出聖惠方

治時氣熱毒痢宜服

黃連

二兩去須微炒

當歸

一兩剉微炒

黃芩

一兩

赤石脂

一兩

龍骨

一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥

飲下三十九

治時氣下痢不能食

出聖惠方

烏梅肉

十枚微炒

黃連

二兩去須微炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥

飲下十九

黃連湯

出聖惠方

治時氣熱毒下痢

當歸

二兩炒

黃連

二兩炒

黃蘗

二兩剉灸

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜一茶匙再煎一兩沸溫服不計時候外臺秘方治天行諸下痢可用水六升三服良驗忌猪肉冷水

治時氣赤白痢方

出聖惠方

鼈甲

二兩塗醋炙黃去裙襖

阿膠

一兩碎炒黃燥

赤小豆

一合炒熟

右為散每服不計時候以粥飲調下三錢

雄黃丸 治時氣熱毒下痢赤白及下部毒氣下細蟲

如布絲長四五寸黑頭銳尾

雄黃

研一分

丹砂

研

乾薑

炮

附子

炮製去皮臍各半兩

右搗研為末煉蜜和丸擣五百下丸如菉豆大每服十九丸憲米飲下

麝香丸 治天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒

氣常下細蟲如布絲縷大或長四寸黑頭銳尾

麝香

一分

附子

三分炮

雄黃

丹砂

乾薑

各二分

右五味各搗下篩訖復更合治之蜜和丸如小豆大每服一九老小半之效驗忌猪肉生血物等

治天行四五日大下熱病痢

方見本門時氣四日類黃連青龍湯同

竹茹飲 治痢後得天行頭痛三四日食即嘔吐者

竹茹 二兩 橘皮 二兩 生薑 四兩 人參 二兩 蘆根 切一升 粳米 一合

右切以水六升煮取二升五合去滓分溫五六服中
間任食忌熱麪生冷

時氣下部蠶瘡論

夫時氣下部瘡者蠶由毒熱結在腹內穀氣衰毒氣盛

三蟲動作長食人五臟多冷洩痢下部生瘡痒不暫止
若唇内生瘡但欲寤者此蟲蝕下部也重者則肚腸爛
傷於五臟其人即死

方

雄黃散 出聖惠方 治時氣蠶蝕下部生瘡宜服

雄黃 半兩細研一方用醋灸 青箱子 三兩 苦參 三兩 黃連 三兩去須

微炒 杏仁 一兩半湯浸去皮尖雙仁

右為散每服食前粥飲調下二錢外臺秘要方搗篩

綿裏如半棗核大內下部亦可米汁服方寸一日三服忌猪肉冷水及熱麪灸肉蒜等物

治毒病下部生瘡者出肘後方

搗蛇莓汁服之三合日三漬烏梅令膿并內崖蜜數數飲之

治天行下部瘡爛方出肘後方

搗烏梅二十七枚去瓢 大蒜二十枚 屋塵半升節取細者

右搗篩為散苦酒一升和調於銅器中煎成膏作長

挺內下部

治時氣下部蠶瘡疼出聖惠方

桂心二兩 藍葉二兩

右為末分為三服以生猪肝半斤去膜細切拌藥一服入伍味同煮每日早晨一服當於下部中出蟲如髮一合已來便瘥外臺秘要方治天行蠶病用吹咀水一斗煮取二升內猪肝十兩去膜細研著湯中和令相得臨時小溫若毒悉在腹內盡服之在下部者

三服藥中用一分竹筒內下部中服藥一時間當下
細蟲如髮大五六升小兒半之忌生葱一名桂枝湯

治時氣痢膿血下部生蠶瘡蟲方

出聖
惠方

黃連

三分去鬚微炒外
臺秘要方作三兩

蠟

一兩

烏梅肉

三兩
微炒

右為末化蠟和蜜為丸梧桐子大每服食前以粥飲
下三十九丸晚再服之外臺秘要加至四十九瘥忌猪
肉冷水一名黃連丸

治時氣下部蠶瘡方

出聖
惠方

用馬蹄燒為灰為末以猪肉脂和塗之一日可五六
遍即瘥

治時氣病下部蠶瘡痛不止

出聖
惠方

用濃煮桃枝皮取汁煎如調錫以通下部中若口瘡
含之瘥亦治熱病下部生瘡

治傷寒蠶病兼治蛔虫攻心臍如刺口吐清水

出千
金方

取生鷄子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調沫
出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下虫劇者

再服虫盡熱除病愈

治毒病下部生瘡者出肘後方

燒鹽以薰導之不透又以綿裹熨之

又方出肘後方

用生漆塗之綿導之

又方出肘後方

大丸艾灸下部

又方出肘後方

取蚓三升水五升得二升半盡服之

又方出肘後方

取水中苧菜搗綿裹導之日五易瘥

又方出肘後方

用攪皮槲皮令煮汁粘糖以導之又濃煮桃皮飲之良

猪膽苦酒湯出千金方治熱病有蜜上下攻移殺人

用猪膽一具苦酒半升和之大煎令沸三上三下藥

成放溫空心服飲三滿口虫死便愈

治傷寒熱病多睡變成溫蠶四肢煩疼不能食出千金方

用羊桃十觔切搗令熟暖湯三升掩浸之日正午時入中坐一炊久不過三度瘥

青箱散出千金方治熱病有蠶下部生瘡

青箱子一兩 扁竹二兩 藿蘆四兩 甘草一分 狼牙三分

右搗篩米飲和每服一合日三不知稍加之一方無甘草有橘皮二兩

雄黃允散出千金方治時氣病蠶下部生瘡

雄黃半兩 桃仁一兩 青箱子 黃連 苦參各半兩

右為末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸日三服

治溫病下部有瘡虫蝕人五臟出千金方

雄黃 阜茨各一分 麝香 硃砂各二分

右為末蜜和丸如梧桐子大幼得病酒服一九日二若下部有瘡日二

時氣大小便不通論

夫天行大小便不通此由脾胃有熱發汗大過則津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人腸有伏熱故小便不通

方

廣濟柴胡散

治天行熱氣惡寒頭疼壯熱大小便澀

柴胡

八分

茵陳

十分

黃芩

八分

土瓜根

十分

白蘚皮

八分

青木

香

十分

梔子仁

十分

大黃

二十分

芒硝

四分

芒硝

十二分

右搗為散平晨空肚以新汲水服五六錢少時當一

兩行微利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明晨更服

四錢熱歇停藥忌熱食猪肉油膩等

柴胡湯 治天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下飲

食

柴胡

七分

茵陳

七分

大黃

十二分

升麻

七分

梔子

四枚

芒

硝

四分

芍藥

七分

黃芩

十二分

右切以水四升先漬藥一時猛火煮取二升五合分

欽定四庫全書

普濟方

四

溫三服相去如人行六七里再喫一服以快利為度
第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食
近效主天行後兩脇脹滿

以炒鹽熨之如小便澁亦用鹽熨臍下如水腫以穀
枝汁服愈大效

滑石湯 治天行病腹脹滿大小便不通

滑石 十四分 葶藶 一合紙上炒 大黃 三分

右以水一大升煎取四合頓服

時氣大便不通論

夫時氣大便不通者由脾胃有熱發汗太過則津液竭
津液竭則胃中乾燥結熱在內則大小便不通也

方

羚羊角散 出聖惠方 治時氣熱毒在臟大腸不通宜服

羚羊角屑 一兩 柴胡 一兩 麥門冬 二兩 大腹皮 一兩

川大黃 一兩到 川升麻 一兩 甘草 半兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入元明

粉一錢攪令勻不計時候溫服

大黃散

出聖惠方

治時氣十日已上腹微滿而喘臍下疼痛

大便不通宜服

川芒硝

二兩

川大黃

二兩對碎微炒

羚羊角屑

一兩

枳實

一兩麩炒

微黃

桑根皮

一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服以利為度

柴胡散

出聖惠方

治時氣惡寒頭痛壯熱大便不通宜服

柴胡

去苗

茵陳

木通

土瓜根

白蘚皮

梔子

仁

各一兩

川大黃

三兩對碎微炒

川芒硝

二兩

右為散不計時候以溫水調服三錢少時當利一兩

行利煮葱頭稀粥飲之如熱未歇再服

大麻仁丸

出聖惠方

治時氣胃中煩熱大便不通宜服

大麻仁

二兩研

川大黃

二兩

郁李仁

一兩湯浸

槐寄仁

川

朴硝

枳殼

麩炒微黃去瓢

木通

各一兩

右為末入大麻仁等令勻煉蜜和丸如梧桐子大每

服不計時候以溫酒調下二十九

調氣丸

一名承氣丸 出聖惠方

治時氣十餘日不大便

川芒硝

二兩 西

枳實

一兩 西 炒微黃

川大黃

二兩 西 對

杏仁

二兩 湯浸去皮

尖雙仁麴炒 微黃研如膏

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下

三十九丸如未利再服

治時氣熱毒在胃大便不通

出聖惠方

川大黃

一兩 西 對 碎微黃

川芒硝

一兩 西

右細剉以水一大盞浸一宿明早煎五七沸綿濾取

汁不計時候溫服

時氣小便不通論

夫時氣小腸者心之腑也心與小腸為表裏心臟熱久而不除汗後津液虛少不能灌溉而熱毒之氣流注小腸故令不通也

方

赤茯苓散

出聖惠方

治時氣有時寒熱四肢沉重口不知味

胃中噦塞小便不通宜服

赤茯苓

一兩

前胡

三分去蘆頭

白蘇皮

一兩

蘧麥

一兩

子芩

半兩

梔子仁

半兩

滑石

二兩

川升麻

三分

木通

一兩

半兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候

溫服

貝齒散

出聖惠方

治時氣熱毒流注小便不通宜服

貝齒

四十枚

白蘇皮

一兩

猪苓

一兩去皮

川大黃

一兩剉碎微炒

蘧

麥

一兩

右為散每服不計時候以水一中盞半匙調下三錢良久再服以利為度

犀角散

出聖惠方

治時氣四五日寒熱頭痛心腹脹滿小便

不通

犀角屑

去苗

柴胡

去苗

赤芍藥

蘧麥

黃芩

知母

木通

剉各一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

滑石

二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以得通為度

柴胡散 出聖惠方 治時氣惡寒壯熱頭痛小便不通

柴胡 法 茵陳 川大黃 對 黃芩 木通 對 川升麻

梔子仁 川芒硝 茅根 對各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服以得通為度

治時氣壅毒心腹脹滿小便不通 出聖惠方

滑石 一兩 甜葶藶 一兩 隔紙 炒令紫色

右搗篩以水二大盞煎至一盞去滓不計時候溫服

以得通為度

療小腹滿不得小便方兼治天行

細末雄黃蜜和為丸棗核大內溺孔中令入中等半

寸以竹管注陰令痛搦之通



普濟方卷一百五十

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官助教臣李巖

騰錄監生臣徐如浩