


刺圖註傷寒活人指掌卷之四

●藥評各評新
增詞括

○諸承氣湯大柴胡湯傷寒忌用
元子藥附

大便鞭十餘日看證可下則用大柴胡湯下之以過經其
虛當下者用大柴胡則穩恐承氣湯太緊病人不禁又云凡大便
秘而妨悶恐尚有表證者亦須少下飲小承氣湯微解之切不可
過多令勿大洩也

傷寒論陽明病不大便六七日恐有燥屎欲知治法少與小承氣
湯腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此先鞭
後溏也切不可攻之必腹脹不能食也潮熱條云設當行大承
氣湯亦須先與小承氣湯不轉失氣者不可攻也



讖語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之飲小承氣湯一升若轉失氣者更飲一升若不轉失氣者勿更與也仲景無治法活人書用小柴胡湯明日又不便脉反微濇者裏虛也此為難治仲景無治法活人書用黃耆建中湯

傷寒有承氣之戒又問轉藥孰緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣湯又次之大柴胡湯又次之仲景云蕩滌熱積皆用湯液不得用丸子藥不可不知也調胃承氣湯有芒硝何故叔和云小承氣為上也愚意倘

息大凡湯中有芒硝者為緊無者次之

大柴胡又一證傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而利非大柴胡不可也此非是有陽明證而嘔又非霍亂吐利謂之太陽大柴胡證也故可下之

血證中別有桃仁承氣湯

血證有本條

○大小承氣湯詩

傷寒凡下要精專極熱心煩不惡寒脉下掌中頭汗出時潮讖語苦難便下焦轉失圍多燥脉滑承氣小為凡大滿大實被火病脉沉實喘腹疼連胃間宿穀并煩躁脇熱膿便血又鮮能食便澁時腹脹大承氣劑悉皆痊

○調胃承氣湯詩

太陽不解脉沉時振慄還生汗泄而倘脉陽微宜再汗陰微可下莫生疑蒸上發熱二三日陰脉微時欲下之讖語鞭便調脉順鬱煩滿痛便當施

○大柴胡湯詩

熱多寒少鬱微煩心下仍兼急嘔干假使過經渴微痞大柴胡下悉能寬

○桃仁承氣湯 祇當湯譌

太陽和熱結膀胱病者精神略似狂少腹結來誠痛急表罷桃仁承氣湯

和氣傳裏微沉脉發狂熱結在膀胱少腹鞭滿有瘀血可下宜投抵當湯

○小柴胡湯論

近時多行小柴胡湯不問陰陽表裏皆令服之此藥差寒不宜輕用雖不若大柴胡承氣之緊要之藥病不相投其為害一也

湯寒五六日嘔而發熱者小柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆得湯必蒸上而振發熱汗出而解

○小柴胡湯譌

少陽一證小柴胡藥性差寒仔細推勞復熱潮仍可覓傷寒和解效而殊

○大青龍湯

大青龍證脉似桂枝反無汗病似麻黃反煩躁是也脉弱有汗為桂枝証脉緊

不煩躁為麻黃證大青龍湯治病與麻黃湯證相似但病龍重而又加

煩躁者用大青龍湯也其中以中風并傷寒俱盛故青龍湯添麻

黃又合以桂枝湯藥味在內更加石膏所以為緊此治榮衛俱

病若證不審誤用大青龍湯則發汗多傷人以其有煩躁一証故何用大青龍也

大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷衛寒則榮
桂枝主傷衛麻黃主傷榮大青龍主榮衛俱傷也風傷衛者病在皮膚之間
也以衛行於外為陽主外皮膚之間衛氣之道路故也其病淺傷寒榮者寒
氣中於肌肉也以榮行脉中為陰主內肌肉之間榮氣之道路
故也其病深所以桂枝與麻黃所施各異戒勿誤用以有淺深
之別風寒之殊大醫當以宜審諦大青龍湯宜戒用仲景云脉
微弱汗出惡風者不可服青龍服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆
也宜服真武湯仲景特設此藥以救之

○大青龍湯評

風寒俱見大青龍榮衛皆傷乃可攻汗出惡風脉微弱投之
一七逆為凶

○白虎湯

證治論云白虎湯性涼惟夏至后可用謂如地土七八月猶熱設
有壯熱為病相度尚可用白虎湯服之自然汗解然白虎湯用
石膏故亦治傷寒不專於白虎湯或問孫兆曰杜士張翼言
夏月若果見麻黃桂枝證豈亦得不用而用白虎也兆曰此說
尤妙但臨時看證渴之民如虛弱人老人不可亦用白虎也蓋
白虎性涼耳若得之下利腹痛者可勿服改服小柴胡也

活人書云或問夏至後皆可行白虎湯耶答曰白虎湯治中暍并
汗後一解表藥耳非正傷寒藥也今之醫者見六月中病多云
中暍不辨熱病用藥大涼况夏日陰氣在內最難調治白虎湯
尤宜戒之

許曰證治論云白虎用石膏亦治傷寒不必專治喝也活人書云白虎湯治中暑并汗後一解表藥耳朱肱作活人書後序云夏月納陰在內不可食熱乃君子扶陰養陽之時也此間又云陰氣在內禁用涼藥已上所說多不同夫抵隨時審證當即用不可執一說也

○白虎湯詩

中喝汗之堪解表藥性寒涼恐不經老弱脉虛寧勿服故將

白虎號湯名

服桂枝湯吐者其后必吐農血出証治論服麻黃湯發煩月暈劇者必嘔出活人書

○麻黃桂枝湯

頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散而用桂枝者頭疼發熱無汗惡寒宜麻黃湯之類應解散而用麻黃者二者均為解

散正分輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗不得

服麻黃古人有汗者當解肌無汗者當發汗

許曰等是太陽尚有差別而况不分陰陽而用藥乎當汗而下即死當下而汗亦死古人所以云桂枝下咽陽盛則斃謂當下而汗也承氣入胃陰盛而亡謂當汗而下也陽盛者內熱內熱屬裏故當下也誤投桂枝是陽盛即斃也陰盛者惡寒惡寒屬表故可汗也誤投承氣是陰盛而亡也信乎麻黃桂枝大小承氣者死生之係也

○麻黃桂枝湯詩

傷寒無汗屬麻黃有汗桂枝可作湯設服麻黃轉煩躁目瞑劇者匆來防陽盛桂枝行即斃不然嘔逆吐紅漿桂証若逢

夏至後石膏加入桂枝旁

○桂枝石膏湯

傷寒三日外與諸湯不差脉熱仍數和氣猶在經絡未入藏府者桂枝石膏湯主之此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃可代麻黃可代麻黃青龍湯用○有汗脉緩為桂枝証無汗脉緊為麻黃証青龍証

○十棗湯

痞證條云脇下痛乾嘔短氣身涼不惡寒汗出無表證者十棗湯乾嘔證條云身涼汗出乾嘔脇痛不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

裏有水證條云身涼表證罷效而脇下痛者十棗湯
評大抵身涼乾嘔短氣脇痛者當行十棗湯也然雖是表證已罷方可用之表未解者不可行也藥性太猛切戒輕用

○十棗湯

頭痛心疼汗孔張嘔而下利痞非常惡寒短氣和連脇主治
濃煎十棗湯

○聖散子

論病證多變者無如傷寒或有傳者必待傳遍而後已或不傳者病止在一經又或有中濕而似之者或有疫氣而似之者如此之類極多不可以一槩舉治之也要必在察脉以觀病表裏辨證以審其汗下然後投之以藥疾乃可得而愈也若不能求之於此而以傳授之古方謂可以愈疾者恐或未必然譬法律之設以謂天

下有罪者皆不能逃於其間也且人之情偽千變萬化法律果能盡該載乎東坡居士在黃州日得巢君所傳秘方名為聖散子不問陰陽二證皆可服之使後人不能不致疑於其間今觀其序自謂此方用藥似乎不近人情至於救急其驗特異乃神物護靈不拘常制則是東坡自知其間用茱萸豆蔻良姜附子之類有陽証者不可服也又言不可與傷寒比者此言何謂耶豈其謂非傷寒然後可服此藥耶且木附豆蔻良姜皆是燥而去濕者恐黃州瀕江地多卑濕而黃之居人所感者豈非中濕而致然耶不尔則是年雨水浸淫而人得此疾所以服此藥而多愈也苟非此而服之果能不誤病者乎又言疫氣流行之時平旦以此藥煮一盃不問老幼貴賤皆令服之則疫氣不入其門東坡所以神此方者恐其用意在此而不在彼也且如疫氣之為病四時所感亦自不同當其未發之前籍此以驅除不祥之氣則有此理若病証已見則便有陰陽之分四時各有治法當隨其證而用之豈可專用此方哉何況令之愚醫不辨方脉惑於不問陰陽二證之說以其療諸經傷寒豈不謬哉夫此方在世猶杼軸之有經一成而不可變者也傷寒之於人猶杼軸之有緯往來之變其可窮乎苟有活人之心者不可不以此說而廣之

○聖散子詞

東坡聖散出瀕黃不問傷寒陰與陽古言醫者人司命潛心玩味活人方

○炮炙煎煮法酌準料例用藥遺事附

傷寒方內所載衡量皆依漢制與今之輕重淺深不同者蓋隨時
更變時更變也若古方大陷膏湯大黃六兩芒硝一升甘草二錢
水六升煮取二升分二服以今用之無乃大甚乎若以漢之五銖
錢秤較加以二倍頗與今數合后世以古之三兩為今之一兩則
彷彿也若桂枝湯用桂枝芍藥生姜各三兩即今之一兩甘草二
兩即今之六錢二字半水七升即今之二升三合半庶可適中如
大陷膏湯雖三之取一亦似不倫蓋歷年寢遠傳寫乖訛或分兩
少而水數多或水多而分兩少輕重不等器量頗殊却當視病淺
深察藥柔峻以意斟量不可偏執若此甚衆不能枚舉然秤有銖
秤有字秤銖秤銖秤以六銖為一分四分為一兩字秤以四字為
一錢十錢為一兩若升合者古方謂一升準今之一大白盞也一
合二合從此酌量之后之雜方謂水一盞者準今一中盞是乃酌
古準今以便修製云出指掌篇

○增補藥品

南陽書謂仲景証多而藥少使皆如仲景調理既正變異不生則
麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣此說甚至因採
外臺千金聖惠等方補而完之今除仲景正方外并於南陽等書
擇可用者兼而充之但雜方內藥性峻烈及不猶法度者亦不敢
取然南陽所載湯劑每服並抄五錢七恐劑小病大者不能的中
今以劑之小大稍加增損餘如群隊和平所投切當以効為期不
能較於毫忽也

麻黃

去根節湯泡去黃水焙乾秤用

枳實

水浸七次切碎炒

桂去麁皮不見火唯妊婦傷寒

半夏湯炮七次過則不損胎氣

桃杏仁者用湯浸去皮尖去雙仁

枇杷葉去毛刷

蝨蟲去起

茴香微炒

堇花以生赤色如无

蜀漆洗去腥乃

茯苓去皮

烏頭炮剉

凝水石即寒

代赭碎作元野

丁沉香並不見火

礬研枯過

其遂連珠者以

黃連去毛

防風去芦

桔梗去芦

犀角以勝屑如無

釜底煤研篩

牛菜即牛

茱萸湯炮

甘草炙

厚朴去皮姜汁

水蛭去子

瓜蒂炙黃

巴豆去心皮

牡蠣炙

龍膽即草

附子炮去皮

滑石搗

禹餘糧紫石英

龍骨研

雄黃研

乾姜炮

麻子炒去

椒去目及

羌活去芦

柴胡去苗

薰陸香嘜乳

梁上塵篩

通草

猴鼠矢即雄鼠矢

香鼓即鼓

英粉即粉

竈突墨研篩

羚羊角勝屑

前胡去芦

人參去芦

烏梅去核

麥門冬去心

大黃錦紋者以

赤石脂白石脂

石膏搗不

海藻先去

大礬皮去麁

石膏見錯

赤石脂白石脂

石膏見錯

赤石脂白石脂

石膏見錯

石膏見錯

石膏見錯

溺尿同即童
子小便也

芒硝 朴硝有并
頭者非并

膠飴 即飴也

阿膠

猪膽汁

雞子黃

麝 已上七味並湯熟香後
下再前三沸令勻服

猪膚 諸家所論不同
麝安常云去膜
或有有用猪皮者
兼本

如此論之即猪膊膏也
草中不載猪膚但云
歸猪湯解諸毒疑
也所以言膚者
肌膏之羨

延胡索 去淨

紫苑 去土

陳皮 去籠

青皮 去囊

細辛 去土

栝婁根 去籠

栝婁 去皮

秦皮 去籠

海藻 洗去鹹

蒼木 米泔浸
去黑皮

旋覆花 去枝

獨活

百合 水洗漬
去白沫

皂角 去皮子
酥炙

茅花

蘧麥

白薇

紫蘇

茵陳

牛膝 並去
梗

知母 肥者去
毛皮

天南星 炮

黃耆 炙

梔子

連軹 即連翹根如
元用連翹

白粉 即米
粉

姜蕤 似黃精而小異
所原多言其根

大青 用葉或
曰蕪垂

耳爛水 取水六七升置大盆內以胸湯之
上有水珠數千顆相逐取用之

潦水 潦乃水之有聲亦雨澤水
亦作勞又曰行

枳殼 即只實也每三
斤折一枚凡言

芍藥 味酸下利者多去之或用芍
藥先煮一兩沸次下餘藥

濕地黃 一斤折乾者
五兩不見火

動氣者去木加桂 腎惡燥故去木也
以桂能而奔豚也

熬 凡方言熬
者都用炒

苓用芍藥 小便不利者用茯苓
太陽病自汗而小便數者

小便數者去桂去茯苓

不可用桂枝 太陽病無汗而渴者不可與白虎湯
陽明病汗

多而渴者不可與五苓散

多而渴者不可與五苓散

○活人書括論升合分兩

張公度辨次仲景傷論云沈存中得漢之權量其量六斗六升當

今之一斗七升九合其重一兩當今之六銖愚今於紹興斗中二

升七合折古之一斗也大略是四分之一耳凡言一升若用二合

半則庶幾焉一兩用二錢半恐太少耳升合當用古之法每升二

分兩當用之法每兩十文活人書用三分之一謂如今之刀折古之三刃也之說大同而小異故兩有之

其間有用藥一劑而用水少者今當只以藥五錢水一盞半為率

作一服未效再作不可拘於古分兩也利湯欲生宜少水而多取

也補湯欲熟宜多水而取也

○煉蜜法

每白蜜一斤入新汲水四兩攪勻用炭火慢熬約消耗去六兩許

是蜜成煉若火力熬太過則焦人難丸火力不及則易燻最宜得

中凡以煉蜜作丸藥有量燥潤其性不同輕虛乾燥藥末每一

斤用蜜一斤堅石潤藥末每一斤用蜜半斤此為大約難以

定在乎臨搜作丸時加減得中為度

●藥方加減例

古人云傷寒有輕重湯劑不可一例用明當隨證加減謂如

桂枝加桂湯即本方中加桂若干減者即去桂若干餘倣此

桂枝湯加黃芩名陽旦湯○太陽桂枝大棗十八枚

赤芍藥

生姜一兩

甘草一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服取汗桂

枝湯唯春初可行春未及夏至已前加黃芩夏至後加知母一兩

石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者不用加減戒口小便數者及飲酒家不喜其者切不可行桂枝也

【一】桂枝甘草湯發汗過多心上下欲得按自冒

桂枝一字甘草六錢水一升煮取三合半去滓頓服

【二】桂枝葛根湯傷風項背強有

桂枝湯內加葛根一兩三錢一字半

【三】桂枝石膏湯熱病夏至後

桂枝湯內加石膏一兩三錢一字半

【四】雙鐘桂枝石膏湯後九白字方名並

桂枝半兩石膏二兩黃芩半兩

甘草半兩梔子四分升麻二分白藥子二分

乾葛三分右對如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分溫服食頃

再服若得汗即停後服也

【五】桂枝新加湯又各桂枝疼藥平夏生

桂枝湯內加人參一兩芍藥生薑各三錢

【六】桂枝附子湯風濕身疼漏風

桂枝湯加附子一枚

【七】桂枝大黃湯關膝沉實按

桂枝湯內加大黃一兩三錢一字半芍藥一兩減甘草

【八】桂枝人參湯太陽下早協熱利不

桂枝一字人參半兩甘草半兩白朮

人參

乾姜各一兩

水三升先煮四味取一升七合內桂更煮一升分三服

九 桂枝栝婁乾葛湯柔痙

葛根二錢

桂枝

芍藥各三錢

栝婁根

甘草各二錢

水二盞生姜七斤棗一枚煎至八分去滓服

十 桂枝芍藥湯即小建中湯 脉浮腹痛

桂枝湯加芍藥一兩

桂枝加芍藥生姜人參湯

桂枝湯中加芍藥半兩

生姜半兩

人參一兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

十一 桂枝二越婢一湯太陽發熱惡寒脉微弱

桂枝

芍藥

麻黃

甘草各三分

石膏三錢

生姜四錢

大棗四枚

水一升七合者麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫

分二服

十二 桂枝二麻黃一湯

服桂枝後形似瘡日再發得汗必解

桂枝

芍藥四錢

麻黃二錢

甘草三錢

杏仁十六箇

生薑四錢

大棗五個

水一升二合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取六合去

滓分二服

十三 桂枝麻黃各半湯太陽脉浮緩如瘧無汗身痒

桂枝五錢

芍藥

麻黃各三錢

字半

甘草

字

杏仁二十箇

生薑三錢

大棗四枚

水一升六合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煎至六合分

三服

十四桂枝加桂湯

奔豚衝心

桂枝湯內加桂六錢二字半

十五桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣攻逆湯

脈浮如火切之不安

桂枝

蜀漆各一兩

甘草六錢

牡蠣一兩

龍骨一兩三錢

生薑一兩

大棗十二枚

水四升先煮蜀漆減七合內諸藥煮取一升半去滓分三服

桂枝去芍藥加附子湯

附子半

大棗八個

桂枝一兩

甘草一兩

生薑一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

十六桂枝甘草龍骨牡蠣湯

火逆下因燒

桂枝三錢

甘草一兩

龍骨一兩

牡蠣各六錢

水三升六合煎至一升二合去滓分三服

十七桂枝加知母石膏升麻湯

熱病身至後用

桂枝湯內加知母石膏各四錢半升麻二錢

十八桂枝加厚朴杏子湯

太陽下之微喘者毒未解也

桂枝湯內加杏仁二十箇厚朴半兩一溫服覆取微汗

十九桂枝去桂加茯苓白朮湯

服桂枝或下發不辨皆滿小便不利

芍藥

茯苓

白朮各二錢

甘草一錢

水一盞半生姜三斤棗一枚煎至八分去滓服小便利則愈

二十麻黃湯太陽脉浮頭疼發熱惡寒身痛無汗而喘

麻黃一兩 桂枝六錢半 甘草三錢 杏仁五十

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服覆取

汗蓋麻黃湯性熱唯冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏至

之後服之必發斑黃須加知母半兩石膏一兩黃芩一分

二十一麻黃葛根湯太陽發熱無汗惡寒而喘室

麻黃 赤芍藥各三錢 乾葛半一錢 豉半合

水二盞葱白一莖煎至八分去滓服

二十二麻黃升麻湯太陽後脉沉遲尺脉不至咽嗑不利喘有血厥逆泄利不止者為難治

麻黃八錢 升麻 當歸各四錢 知母

黃芩 姜薤各二錢半 石膏 白朮

芍藥 天門冬 桂枝 茯苓

甘草 乾薑各二錢半

水三升三合先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升半分

三服次第令盡汗出愈

二十三麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃一兩三錢 杏仁五十 甘草六錢二

石膏二兩

水二升三合半先煮麻黃減六合去上沫內諸藥煮取八合分

二服

二十四麻黃知母石膏湯太陽無汗夏至後服

麻黃湯內加知母半兩石膏一兩

三十五 麻黃連軛赤小豆湯 傷寒於熱在裏身必發黃中濕身痛身目皆黃

麻黃 連軛 甘草 各六錢 生梓白皮

赤小豆 各一兩六錢 杏仁 四十個 大棗 十二枚

生薑 一兩

潦水三升三合半先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取一升分

三服半日盡

三十六 麻黃附子細辛湯 少陰發熱脈沉微汗之

麻黃 細辛 各六錢 附子 一個

水三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內諸藥取一升半三

服

麻黃甘草附子湯 少陰無表裏証

麻黃 二兩 甘草 一兩 附子 一個

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服相次

三兩服以身微汗為度

三十七 麻黃杏仁薏苡甘草湯 風濕相搏一身盡痛

麻黃 薏苡仁 各半兩 甘草 一錢 杏仁 十個

水三盞煎至一盞半去滓分二服避風微汗

三十八 越婢湯 風痺脚弱

石膏 一兩 白朮 十兩 附子 半個 麻黃 七錢

甘草 二錢

分三服每用水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分

二十九 茯苓白朮湯 温温

茯苓

乾薑

甘草

白朮

桂各一錢半

水二盞煎至八分去滓服

三十 葛根湯 太陽無汗惡風剛

葛根 一兩三錢

桂

芍藥

甘草 各六錢

生薑 各一兩

大棗 十一枚

水三升三合半先煮麻黃葛根減七合去上沫內諸藥煮取一

升四合分三服取微似汗

葛根龍膽湯 風温脉浮身重汗出

石膏 一兩

葛根 二兩

生薑

升麻

大青

龍膽草

桂枝

甘草

麻黃

芍藥 已上各半兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

三十一 葛根解毒湯 疫癘時感冒發熱而渴不惡寒

葛根 半兩

黃芩

芍藥 各二錢半

麻黃 三升

甘草

桂 各一錢半

水三盞半束二枚煎至二盞分二服如脉浮再服取汗

三十二 葛根葱白湯 已汗未汗頭痛

葛根

芍藥

知母 各三

芍

生薑 各六

葱白 一把

水三盞煎至一盞半分二服

三十三 葛根橘皮湯 溫毒發心 煩嘔逆

葛根

橘皮

杏仁

黃芩

麻黃

甘草 各一

三十四 葛根半夏湯 太陽上明合病 不下利但嘔者

葛根 二錢

半夏

麻黃 各一

甘草

桂枝

芍藥 各二

水二盞生薑五斤東子一枚煎至八分去滓服取微汗

三十五 葛根黃芩黃連湯 太陽中風誤下 之協熱利不止

黃芩

甘草 各二

葛根 一兩

黃連 三升

水三盞煎至一盞半去滓分二服

三十六 大青龍湯 傷寒元風傷風見寒 太陽无汗脈浮 緊煩躁可服之 脉弱無風汗出不可服

麻黃 二兩

桂枝

甘草 六錢

杏仁 四十

生薑 一兩

大棗 十二

石膏 二斤

水三升煮麻黃減七合去上沫內諸藥煎至一升去滓服取微

似汗汗出多者溫粉撲之一服得汗止後服

三十七 大青龍如黃芩湯 太陽無汗惡風 煩躁夏至後用

本方內加黃芩六錢二字半

三十八 青龍湯 太陽表未解心下有水氣 乾嘔發熱而欬或喘

麻黃

芍藥

細辛

乾姜

甘草

桂枝 各一

五味子

半夏 各八錢

水三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內諸藥者散一升去

滓溫服

小青龍去半夏加栝樓湯表不麻者有水氣

本方中去半夏加栝樓根三分

小青龍湯加堯花湯嘔微利熱多為表有水

本方中加堯花如彈子大

三九 小青龍去麻黃加杏子湯太陽汗後飲水多咳而喘

本方內去麻黃加杏子仁一兩

四十 小青龍去麻黃加茯苓湯太陽咳嗽表解心下有水小便不利

本方內去麻黃加茯苓一兩

四十一 小青龍去麻黃加附子湯水寒相搏咳前

本方內去麻黃加附子半兩

四十二 大柴胡湯內實大便難身熱不惡寒反惡熱

柴胡一兩六分二字半

黃芩

芍藥各一兩

半夏

大黃六分二字半

枳實四枚大者八片

生薑一兩六分二字半

大棗十個

水四升煎至二升去滓再煎三五沸分三服一方加大黃一倍

四十三 小柴胡湯傷寒四五日往來寒熱胸膈滿心煩喜嘔風濕身熱少陽發熱

柴胡一兩六分二字半

黃芩

人參

甘草

半夏八分二字

生薑一兩

大棗十二枚

水四升煎至二升去滓再煎至一升分三服

四十四 小柴胡加茯苓湯小便難潮熱腹滿

本方內加茯苓一兩

四十五 小柴胡去黃芩加芍藥湯下後陰弱生熱脈微惡寒

本方去黃芩加芍藥三兩

四六

小柴胡去黃芩加茯苓湯

嘔而發熱胃腸滿小便不利

本方去黃芩加茯苓一兩二錢一字半

四七

小柴胡去棗加牡蠣湯

水結

本方內去棗加牡蠣一兩三錢一字半

四八

小柴胡參朮生薑加五味子乾薑湯

少陽寒熱胃滿或泄

本方內去參朮生薑加五味子八錢一字乾薑六錢

四九

小柴胡去半夏加人參枳實湯

發熱而渴

本方內去半夏加人參半兩枳實一枚

五十

小柴胡加桂湯

身熱欲近衣身熱不渴

本方內去人參加桂一兩

五十一

小柴胡加五味子湯

溫病發熱而渴不惡寒嗽者

本方內加五味子半兩

五十二

小柴胡加乾薑牡蠣湯

痞而胃腸滿脹

本方內加乾薑半兩牡蠣六錢

五十三

柴胡桂枝湯

風溫汗後身熱病而心下妨悶動氣

柴胡一兩二錢

桂枝

黃芩

人參

芍藥各半兩

甘草

半夏各三錢一字

生薑半兩

水六盞棗六枚煎至三盞去滓分三服

五十四

柴胡桂薑湯

生來寒熱胃腸滿小便利嘔而不渴

柴胡二兩六錢

黃芩各一兩

乾薑

甘草

牡礪各六錢 桔婁根一兩三錢

水四升煮取二升去滓再煎取一升半分三服

五十五 柴胡龍骨牡礪湯

傷寒八九日下之胃滿邪驚小便不利譫語火邪驚狂亡渴煩燥卧起不安一身盡痛

柴胡一兩二錢 龍骨一兩

桂枝

鈆丹

人參

黃芩

茯苓

牡礪各半

半夏四錢

大黃六錢

生薑半兩

大棗六枚

水二升六合半煎至一升三合半內大黃更煮沸去滓温分服

五十六 敗毒散

疫屬四時運用傷風有汗夏至後用風温日腫頭痛惡風

羌活

獨活

前胡

柴胡

芎藭

枳殼

白茯苓

桔梗

人參已上各半兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞入生姜二斤煎至七分温服或沸

湯煎亦得治傷寒温疫風温風眩拘蹇風痰頭疼目眩四肢痛

憎寒壯熱項強睛痛及老人小兒皆可服或瘴煙之地或温疫

特行或人多風痰或處卑湿脚弱此藥不可闕也日二三服以

如為度

五十七 黃耆建中湯

傷寒身痛尺脉遲汗後身痛脉弱

黃耆

桂枝各一錢半

白芍藥三錢

甘草一錢

水五錢薑五斤束二枚煎至八分去滓入稠餳一大匙再煎服

舊有微澹或嘔者不用餳

五十八 小建中湯

即桂枝芍藥湯少陰惡寒手足

桂枝

甘草各一兩

芍藥二兩

大棗十二枚

錫

三合半舊微寒

生薑

六錢二分

水二升三合半者取一升去滓內錫微火令烊分三服

五十九

小續命湯

二座通用

甘草

半兩

麻黃

半兩

防風

一分

芍藥

白朮

人參

芎

附子

防已

黃芩

已上各一分

桂枝

半兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服桑瘞

自汗者去麻黃

六十

小續命加薑汁湯

脚氣寒中三陽

煎湯成去滓入生薑自然汁一匙再煎一沸

小續命去附子減桂

一半加芍藥一倍湯

謂如元用芍藥一分令加一倍足成半兩是也

熱證多者宜用此

六十一

小續命去附子減桂一半湯

本方去附子減桂一半

脚氣暑中三陽所患必熱

六十二

升麻葛根湯

無汗惡寒痠痛通用發斑小兒瘡疹

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

每服六錢水一盞半煎至八分去滓服寒多即熱服熱多即溫服

六十三

升麻六物湯

升麻

梔子仁

鉅半

大青

杏仁

黃芩

各一錢

水一盞半葱白三莖煎至八分去滓溫服

六十四

陽毒升麻湯

陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻 一分

犀角屑

射干

人參

甘草 各一分

水三盞煎至一盞半去滓分二服

六十五 玄參升麻湯發斑咽痛

升麻

玄參

甘草 各半兩

水三盞煎至一盞半去滓服

六十六 大承氣湯胃實譫語五六日不大便腹痛煩渴少陰口燥咽日晡發熱脉實

大黃

厚朴

枳實

芒硝 一合

水四升先煮二物取一升七合去滓內大黃煮取一升去滓內

芒硝更一二沸分二服得利止後服

雙鐘活人書譫語間中成外臺承氣湯无芒硝尤隱若病輕當于本方中除芒硝也

六十七 小承氣湯

六七日不大便小腹脹滿陽明無表証汗後不惡寒朝熱狂言而喘

大黃 一兩三錢

厚朴 六錢

枳實 六者六

水一升三合半煮取六合去滓分二服得利止後服

六十八 調胃承氣湯

太陽明不惡寒反惡熱大便祕譫語嘔

大黃 六錢二字

甘草 三字

芒硝 一合

水一升煮取三合半去滓內芒硝微煎溫服

六十九 桃仁承氣湯

外已解小腹急大便黑小便不利血訂也

桃仁 五十箇

桂枝

芒硝

甘草 各六錢

大黃 一兩三錢

水二升三合半煮取一升二合去滓內芒硝微煎分五服

七十 白虎湯

汗後脉洪大而渴虛煩中暈

知母 二兩 甘草 六錢二字半 石膏 五兩一字半 錢 粳米 二合

水三升三合半煮米熟去滓分三服

七十二 白虎加人參湯 又名化斑湯赤斑口燥煩渴中暈

白虎湯加人參六錢二字半

七十三 白虎加蒼朮湯 濕熱疫癘秋感熱

白虎湯內加蒼朮二兩增水作四服

七十四 黃芩湯 腸垢協熱利太陽少陽合病下利

黃芩 二兩 芍藥

甘草 六錢二字半

大東 十一

水三升三合半煮取一升去滓分三服嘔者加半夏八錢薑二兩增水作四服

七十五 黃芩芍藥 切後

黃芩湯內不用大東

七十六 黃芩半夏生薑湯 乾嘔而利

黃芩湯內加半夏八錢一字生薑半兩

七十七 黃連湯 腹痛大便秘育中有熱復背欲嘔

黃連 甘草

乾薑

桂枝 各一兩

人參 六腹三字半 半夏 八分一字 大東 十二枚

水三升三合半煮取二升去滓分五服日三服夜二服

七十八 黃連阿膠湯 少陰下利濃血

黃連 一兩三字半

黃芩 三錢二字半

芍藥 六錢二字半

阿膠 一兩 鷄子黃 二枚

水一升七合 煮三物取七合去滓內膠 盡小冷內鷄子黃

攪勻分三服

七十八 黃連鷄子湯 少陰煩躁不得卧

典黃連阿膠湯同

七十九 黃連橘皮湯 溫毒發斑下部生瘡

黃連 二錢 陳橘皮 杏仁

麻黃 葛根 各一錢半 厚朴 枳實 各一錢半 甘草 各一錢

水三盞煎至一盞半去滓分二服

八十 黃連龍骨湯 少陰脈沉腹痛咽痛舌燥体煩有熱

黃連 一兩 黃芩 芍藥 各一分 龍骨 半兩

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

八十一 黃連犀角湯 孤感 犀角 一兩如無非麻代之

黃連 半兩 烏梅 七個 木香 一分

水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

八十二 黃連解毒湯 大熱脉嘔語呻吟不得眠

黃連 一分 黃芩 芍藥 各半兩 梔子

水三盞半煎至一盞半去滓分二服

八十三 酒煮黃連丸 暑洋發熱而渴不患寒嗽者

黃連 四兩以無灰好酒浸面上過二寸重湯煮乾

為細末麩糊丸如梧桐子大每服五十九丸熟水下

黃連一物湯

右以黃連一物濃煮汁服

八十四 蜜漬黃蘗汁 赤精

以黃蘗去麁皮蜜漬一宿旋、噉汁或用蜜炙微焦碾

未用半錢搽口中亦佳

八十五 竹葉湯 陽明汗多而渴，而渴而渴，欲飲水，入即吐，差後渴。

石膏 二兩八錢一字 麥門冬 一兩 人參

半夏 四錢半字 竹葉 二兩

甘草 各三錢一字

水二升半者，取一升半，內梗米一合，再煮米熟，湯成去滓，入生姜自然汁三匙，再煮一沸，服神效。

八十六 竹葉石膏湯 與竹葉湯方証同

八十七 梔子仁湯 發狂煩躁，面赤咽痛，熱潮。

梔子仁 赤芍藥 大青

升麻 黃芩 石膏 知母 各一錢 杏仁 各二錢

柴胡 半一錢 甘草 半一錢 豉 一百枚

水三盞，前室一盞，半去滓，分二服。

八十八 梔子豉湯 吐下後，心懊憹，大下後，身熱不去，心中痛。

肥梔子 四枚 香豉 半兩

水二盞，先煮梔子至一盞，內豉同煮，室七分去滓。

八十九 梔子蘗皮湯 溫家發黃，傷寒發黃。

梔子 四枚 黃蘗皮 四錢 甘草 半二錢

水一盞，半前室七分去滓，服。

九十 梔子厚朴湯 太陽下後，腹脹，起不安。

梔子 十四枚 厚朴 一兩三錢 枳實 四枚

水一升者，取半升去滓，分二服，得吐止後服。

九十二 梔子升麻湯 至前謂之晚發可服

生地黄汗 一兩

柴胡 半兩 石膏 半兩

梔子 三箇

升麻 三錢

水四盞煎至二盞半去滓分三服

九十二 梔子乾薑湯 醫以丸藥下之身熱不去

梔子 十四枚 乾薑 六分

水二升二合煮取六合去滓分二服

九十三 梔子烏梅湯 傷寒差後不得眠

梔子 黃芩 甘草 各一錢 柴胡 二錢

烏梅 二箇

水一盞半生薑三片竹葉二七片豉五十粒煎至八分

九十四 枳殼梔子湯 勞復發熱

枳殼 一枚 肥梔子 三枚 豉 一兩

清漿水二盞半空者退八分內二藥煎取九分下豉煎去滓服

覆令汗出

九十五 枳殼梔子大黃湯 食復發熱

於前方內加大黃如博碁子大五六枚同煎服

九十六 茵陳湯 黃瘴頭汗出欲發黃

茵陳湯 半兩 大黃 三錢 肥梔子 三枚

水三升三合半先者茵陳減一半內二味煮取一升 去查分三服

便利出如皂角汁一宿腹減黃從小便出也

九十七 茵陳五苓散 疫癘秋感熱發黃瘧頭汗出欲發黃

茵陳蒿末 一兩
五苓散 半兩

和勻每服二錢食前米飲湯調服或濃煎茵陳湯調五苓散

九八 茵陳梔子黃連三物湯 大便自利而便

茵陳蒿 三錢
梔子
黃連 各二錢

水二盞煎至八分去滓服

九九 知母麻黃湯 差後昏沉

知母 三錢
麻黃
甘草
芍藥

水三盞煎至八分去滓服取微汗

一百 知母葛根湯 風濕身灼熱

知母 一錢半
乾葛 四錢
石膏 三錢
甘草

木香
升麻
黃芩
南星

人參
防風
杏仁
芍

芫活 各一錢
萎蕤 二錢半
麻黃 二錢

每服七錢水二盞煎至八分去滓服

一百一 大陷胃湯 大結

大黃 一兩
芒硝 八錢
甘遂末 一字

水二升先煮大黃至七合去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末分三服得利止後服此藥大峻不可輕用若不得已即用大陷胃湯也

一百二 小陷胃湯 小結

黃連 三錢
半夏 八錢
栝婁實 大

水二升先煮栝婁實取一升去滓內諸藥煮取七合分三服

百三 大陷胃丸 結胃項強如柔至伏下之則和

大黃 一兩六字 葶藶

芒硝

杏仁 各一各三字

右三味為細末內杏仁芒硝合研如脂丸如彈大一枚別搗其遂末一字白蜜半合水七合煮取三合半溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為効

百四 抵當湯 血結胃滯語痰血狂言小腹痛欬水不欲燕

水蛭

蝨蟲 各三个

桃仁 二十个

大黃 一兩

水三盞煎至一盞半去滓分二服

百五 抵當丸 當汗失汗熱毒深入吐血身黃喜忘發狂瘀血

水蛭 七个

蝨蟲 八个

桃仁 七个

大黃 一兩

為末分作四丸水一盞煮一丸取七分盞溫服當下血未下再服

服

百六 陽旦湯 即桂枝湯加黃芩一兩春未夏至前可服

百七 陰旦湯 身大熱欲近衣此內寒外熱

芍藥

甘草 各二錢

乾薑

黃芩 各三錢

桂枝 四錢

大棗 二枚

水三盞煎至一盞半去滓分二服取小汗

百八 四逆湯 太陰自利不渴陰証脉沉身痛

附子 一枚生去皮作八片

甘草 六錢二字半

乾薑 半兩

水一升煮取四合去滓分二服強人可大附子一枚加干姜半兩

兩

百九 四逆散加五味子乾薑湯 少陰四肢厥逆或泄利而救

甘草

枳殼

柴胡

芍藥

五味子

乾薑各半

為細末每服二錢米飲調下

百十茯苓四逆湯汗下後煩燥不得眠祇

茯苓

人參

附子

乾薑

甘草六分二字

水一升七合煮取一升去滓分三服

百十一當歸四逆加茱萸生薑湯下之厥逆

當歸

桂枝

芍藥

細辛

通草

甘草各六錢二字半

生薑

水六盞煎取三盞分三服

百十二四逆散少陰四逆或咳或或小便不利或腹

枳實

枳殼

柴胡

芍藥各半

為細末每服二錢米飲調下嗽加五味干姜悸者加桂腹痛加

附子泄痢虛者加濃煎薤白

百十三四逆加茯苓散少陰小便不利

四逆散加茯苓半兩

百十四甘草乾薑湯少陰小便色白病形悉具而渴吐血動氣下之反覺身雖有熱反欲陰

甘草一兩 乾薑半兩

水二盞煎取一盞分二服

百十五甘草附子湯風濕小便不利大便反快

甘草

白朮

附子

桂枝

水煎每服五錢得微汗解出汗身腫者加防風悸氣小便不利加茯苓悸氣即動氣也

百六炙草湯一名復脈湯

甘草錢一兩二字人參六分

麻子仁錢一兩二字麥門冬各一兩

水酒合五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三合水一升七

合煮取二升去滓內膠烊盡分三服

芍藥甘草湯自汗出小便數

芍藥錢各三甘草錢各三

水二盞煎至八分去滓服

百七芍藥附子甘草湯汗下後惡寒

芍藥錢各三附子錢各三甘草錢各三

水二盞煎至八分去滓服

百八陰毒甘草湯陰毒

甘草升麻當歸桂枝各一

雄黃蜀椒各一鱉甲三錢

水二盞煎至八分去滓服如人行五里更進一服溫覆取汗毒

當從汗出未汗再服

百九茯苓甘草湯自汗不渴水氣承心振寒而燥

茯苓桂枝各二甘草一錢生薑三錢

水二盞半煎至八分去滓服

百十小半夏茯苓湯水結

半夏四升赤茯苓三升

水二盞煎至八分去滓入生薑自然汁半盞再煎一二沸

真茯苓桂甘大棗湯 汗後下痢欲作奔豚

茯苓 二兩六錢 甘草 六錢 桂枝 一兩三錢

大棗 十五 甘爛水 說見製藥例

水三升三合先煮茯苓減六合內諸藥煮取一升去滓服三合

真茯苓桂甘白朮湯

茯苓 一兩三錢 桂枝 一兩 白朮

甘草 各六錢

水二升煮取一升去滓分三服

調中湯 疫疠夏感寒邪下血

大黃 三分 葛根 芍藥 黃芩

桔梗 茯苓 藁本 白朮

甘草 已上各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一中盞移時再服之

得快利汁熱便歇小兒減與服安常云久年腸風下血亦差

刻圖註傷寒活人指掌卷之四終