





傷科

秘

醫

有叙

陳

藏

昔先正有言不為良相則為良

醫夫醫一技耳何至取調燮贊

化之能相提而論豈非以凡技

皆局於器物而醫必通三才洞

醫藏



理道直接前賢不能言傳之妙  
始足參造化而寄生死取類顧  
不大歟古今惟姬公識此意故  
制禮經國列之天官家宰其爲  
有疾醫瘍醫雖稱之以中士下

士分內外然未有不明乎內而  
可擅長于外者沿襲既久疾醫  
徃々據其勝所居至重於卿相  
獲鼎亦若委輸瘍醫至夷于卜  
祝星數之徒僅懸藥計錢而信



人固輕視之乃其自視亦未嘗  
重間有卓識妙用見禮於豪有  
力家而視疾醫十不敵五何也  
蓋肉疾即小之感觸吾不以辨  
察而慮其或之重也非甚窶人

子靡不竭刀布之餘乞診求療  
而瘍即厚毒蔑不膚淺瘡癩視  
之非甚危迫及素封子不相延  
視瘍醫若守株者然盼々人之  
叩我而日不一二趨赴之勢殊



而輕重因之然而陰陽虛實之  
間毫釐疑似之辨稍失節度而  
吉凶禍福于是焉判奈何世之  
業瘍醫者不精研竅與甘為疾  
醫下哉吾郡嶽谿陳君工軒岐

業所著瘍科秘旨兼總百家抉  
微彙要與王太史外科證治準  
繩足相羽翼而精簡過之友人  
許疇魯氏得其原帙不欲秘枕  
中乃手為較閱叅定附以續聞



極詮綴之思窮鉛槧之力類若  
指掌爰付梓人是刻也行不惟  
濟物之仁足補造化亦使世知  
疾瘍二醫本無岐術毋第經覘  
其外哉叔魯奕世名家自給諫

侍御父子以風俗即經濟著海內  
尤博雅嗜古所藏秘笈甲吾邑  
矧魯承家學負用世才降心而  
究極此道又推以公之人人儻  
亦良相之餘用若先正所云者



乎輒曰孝標鄭君之請而叙之  
崇禎元年戊辰夏至日彭宗孟

撰



凡例

一是刻原本得之嶽谿公手授先論後方  
次第詮敘甚煇不敢更易但原本總論  
連篇累牘不便查閱今於總論中畫出  
脉論證治論及錄方次第俱各自提標  
度覽者不致茫如望洋  
一瘡瘍潰瘍各立方論而原本將二論混





入初起及惡候二條今照原本方目詮  
出腫潰諸方悉附本條下以便查考

一洗濯去腐二條原本分爲二目竊照洗  
濯生肌去死肉總不外潰後調攝事宜  
今悉敘入潰瘍條格上略爲標記以別  
之

一調攝諸方大要不出潰後證治而原本  
特爲一條然無害於例者今悉照原書  
以行

一原本有螞蟥一法諸名家悉點不用而  
丹谿醫論云螞蟥法止可施於外感小  
毒其所吮不過膚淺惡血若臟腑中毒  
豈此物所能驅逐且氣血旣傷於內而  
又竭之於外其論尤躡故茲刻特去此



湯和選粹  
不錄

一諸家敘論無如是集詳明參按尤確一字不敢刪削至於各證諸方浩繁難以去取今悉照原本詮次而於諸名家珍秘驗方及平生耳目睹記試驗者亦參入一二仍於方目下註一增字以自別於原書

一原本分類如頭面手足內外諸癰列敘參錯今刻照王金壇瘍醫準繩次序癰疽部分自頭至足纖毫不紊至其中摺采議論方目悉仍原書

一金壇王太史所輯瘍醫準繩今日目爲秘傳總之不脫諸大家論議而尤衷於薛新甫先生此書與之大同小異然大



史之書浩博而繁是書精要而確又出  
繆仲醇先生手裁立論不殊搜採各異  
覽者當自得之

一膏藥摻藥及丹散錠子原書具列二門  
而諸要方則散入各條中本條不存其  
目殊費搜討今於散布者悉具載方目  
於膏摻二條下明註方見某條以便查  
考間有所得秘傳如此天膏爭雄膏之  
類卽不揣治外科而經試奇驗者盡行  
採入仍註一附字於下

一醫有五難自古記之當世庸妄醫師不  
辨方脉涼燠雜投殺人非刃良可浩歎  
不佞少而善病長嗜方書耽淫旣久每  
欲授諸梓人而書冗費繁難於鳩聚吾



友鄭孝標陳仲脩兩家伯仲及中表錢  
伯虜孟先諸昆季力贊厥成且嘗倡捐  
貲數日之問飛蚨來集者五十餘緡爰  
市梨棗又適秣陵善書精刻偶集山中  
遂不揆愚昧手授付梓雖云志存及物  
未免仰涿監河恐貽乞物行惠之誚然  
古人耻獨爲君子儻是書成得流行於  
世俾窮簷僻壤不辦求醫者指顧探討  
不煩步武而痛苦立濟不猶愈問道於  
盲自擠危殆者哉則諸同志助成之福  
又豈在纂輯者之功之後哉是舉相與  
有成良不慮也

一家藏抄本岐黃秘書有方論彙要九十  
二卷廣嗣秘旨十卷雲上朱濟川先生



傳心錄十六卷皆枕中之秘諒不敢自  
珍但一時未及並行俟求鴻裁點定再  
議續成

一是役鳩工儲材費緡錢及百千五閱月  
而事告竣不佞雅抱推施之心豈敢果  
然其腹則明估寫刻楮料工值之費勒  
爲定價聊取其值以廣厥行不敢高懸  
國門之價以爲名高也

崇禎元年戊辰春東海許僖叔魯甫識



瘍科選粹總目

第一卷

總論第一

十二經絡圖說第二

發背有五第三

瘡疽發處吉凶第四

瘡瘍脉論第五

虛實論第六

內消內托第七

灼艾法第八



瘰癧灸法第九

豆豉餅灸法第十

淨土灸法第十一

桑枝灸法第十二

騎竹馬灸法第十三

葱熨法第十四

湯漬瘡腫法第十五

圍藥各有所宜論第十六

第二卷

癰疽用藥論第十七

初起湯藥方第十八

惡候主治論第十九

惡候療治方第二十

瘡疽鍼烙論第二十一

腫瘍第二十二

潰瘍第二十三

潰後調攝第二十四

第三卷

癰疽兼證第二十五

疔瘡第二十六



紅絲瘡第二十七

癩疽第二十八

久漏瘡第二十九

心癰第三十

肺癰第三十一

胃脘癰第三十二

腸癰第三十三

癰疽部分

頭瘍第三十四

髮際瘍第三十五

癩頭瘡第三十六

腦疽第三十七

面瘍第三十八

耳發第三十九

口瘍口疳第四十

咽喉腫痛第四十一

痰核第四十二

第四卷

頸項第四十三

瘰癧第四十四



肩疽第四十五

臂疽第四十六

手疽第四十七

胸疽第四十八

乳癰第四十九

乳巖第五十

脇疽第五十一

腹癰第五十二

發背第五十三

腰疽第五十四

便毒第五十五

陰瘡第五十六

腎

女人陰瘡第五十七

下疳第五十八

囊癰第五十九

懸癰第六十

第五卷

臀癰第六十一

痔瘡第六十二

痔漏第六十三



疹和毒米

股疽第六十四 附疽

多骨疽第六十五

鶴膝風第六十六

脛疽第六十七

廉瘡第六十八 附腎風瘡

足瘍第六十九

手足折裂第七十

破傷風第七十一

第六卷

厲風第七十二

驚掌風第七十三

楊梅瘡第七十四

楊梅結毒第七十五

疥瘡第七十六

諸癬第七十七

癩疹第七十八 附座熱瘡 癩子 痞癩

時毒第七十九 附天泡瘡 天行班瘡

諸瘡成漏第八十

血風瘡第八十一

第七卷



諸腫第八十二

石癰石疽第八十三

丹毒第八十四

赤白遊風第八十五

紫白癩風第八十六

附白駮 癩瘍風

烏白癩第八十七

惡瘡第八十八

人面瘡第八十九

翻花瘡第九十

驢涎馬汗瘡第九十一

流注第九十二

瘦瘤第九十三

疔子第九十四

附痣

汗斑第九十五

體氣第九十六

浸淫瘡第九十七

凍瘡第九十八

漆瘡第九十九

金瘡第一百

附箭瘡

骨鯁第一百一



湯和選料 雜目

湯火傷第一百二

杖瘡第一百三

諸毒咬害第一百四

風狗咬第一百五

雜獸咬第一百六

雜治第一百七

第八卷

跌撲傷損第一百八

薛氏外傷分證主治論第一百九

膏藥方第一百十

摻藥方第一百十一

湯和選料

雜目

紫雲石間

卷一

七



癩科選粹目錄

木 第一卷

總論第一

十二經絡圖說第二

發背有五第三

瘡疽發處吉凶第四

瘡瘍脉論第五

虛實第六

內消內托第七

灼艾法第八

癩科選粹

目錄

紫雲石間

卷一



瘡科  
疥蠹蟲灸法第九

豆豉餅灸法第十

淨土灸法第十一

桑枝灸法第十二

騎竹馬灸法第十三

葱熨法第十四

熨風散  
圖  
第  
二

湯漬瘡腫第十五

木香湯腫湯

升麻湯腫湯

漏蘆湯腫湯

猪蹄湯

湯腫湯

洗毒湯

浴毒湯

消毒湯

圍藥各有所宜第十六

抑陽散

陰陽散

抑陰散

忍冬藤

厭熱神白膏

牡蠣地黃膏

宣毒散

吳茱萸散

鹿角散

正鐵箍散

大鐵箍散

三消散

二合消毒散

麥飯石膏

拔毒散

金露散

水澄膏

神黃散

烏金散

南星膏

四虎散

通毒散

單方五條



第一卷目錄 終

瘍科選粹卷之一

金

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍 參校

總論第一

瘍家之證莫甚於癰疽先哲之究竟不為不詳也而習瘍醫者每忽之無不以為形質外見秘方可効殊不知陰陽虛實表裏寒熱臟腑經絡不能深造其奧鮮不蹈夫實實虛虛之禍然則瘍醫可易言哉

謹按癰疽之所由起也本之三因若六淫外浸氣血



受而致者屬外因也生氣通天論云榮氣不從逆於肉裏乃生癰腫陰陽應象論云地之溼氣感則傷人皮肉筋脉靈樞經云血脉榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客之則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化爲熱熱勝則腐肉肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消故漸至臟傷而死 若七情內鬱經絡壅結而致者屬內因也膏粱厚味醇酒炙煇房慾過多與夫素服丹石之藥而致者屬內外因也生氣通天論云膏粱之變足生大疔受如持

虛東垣曰膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆於肉裏乃生癰疽蓋言富貴之人不知樽節法酒肥羊雜以厚味其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走於空竅以行陽道反行陰道則溼氣大勝子能令母實火乃大旺熱溼旣盛必來尅腎若不慎房事損其真水則水乏而溼熱之化上行其瘡必出背上及腦此爲大疔之最重者 若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也溼熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物無所不受



也此蓋內經之旨先哲之議也在內經則以外因寒氣者變而爲熱在東垣則以內因溼氣者能令火旺癰疽之所由起也明矣然亦有爲運氣所致者其端非一

一曰火熱助心爲瘡瘍一曰寒邪傷心爲瘡瘍一曰燥邪傷肝爲瘡瘍一曰溼邪傷脾爲瘡瘍四者所謂天行時氣也其感有重輕故臟腑經絡所發者淺深各異若熱發於皮膚之間爲浮腫由小至大不過二三寸者名之曰癰六腑積熱騰出於肌肉之間其發暴速腫皮光軟侵展廣大如碗如

盆高腫而痛名之曰癰乃邪氣壅遏於經絡證屬於陽故其毒專攻於外雖發熱勢盛骨髓終不焦枯臟腑亦不傷損此爲易治惟難將息而愈遲若五臟積熱攻注於肌骨風毒猛暴初發如粟或如豆許與肉俱平或作赤色時作痒痛名之曰疽乃邪連五臟毒不外攻證屬於陰故身或不熱患處不腫甚則聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑而死若治之早而又合宜反易全復此癰之起於六腑疽之起於五臟之分別也疽雖屬諸陰若初起身體便熱患處腫大熱痛此爲發之於外雖形大



如盆百無一死若身體不熱止覺倦怠患處不熱  
數日漸大不腫不疼低陷壞爛此為發之於內雖  
遇盧扁十無一生 然外之所見內有所屬如發  
於喉舌者心之毒也發於皮毛者肺之毒也發於  
肌肉者脾之毒也發於骨髓者腎之毒也發於下  
者陰中之毒也發於上者陽中之毒也發於外者  
六腑之毒也發於內者五臟之毒也內曰壞外曰  
潰上曰從下曰逆上發得之速下發得之緩感於  
六腑則氣浮行於表感於五臟則血沉行於裏是  
以近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化  
成血蟲近膚者久不愈則傳氣成漏成蟲則多痒  
少痛或先痒後痛成漏則多痛少痒或不痒不痒  
內虛外實者多痛少癢血出則多死膿潰則多生  
甚至筋骨敗遺骨自脫出名曰多骨穿通皮膜十  
死八九皆不早治之故可不慎歟

毒之發部位見於腦者屬督脉與太陽經也見於背  
者中屬督脉餘皆足太陽經也見於鬢者屬手足  
少陽經也見於眉者屬手足太陽少陽經也見於  
頤兒於髭者俱屬手足陽明經也見於腮頰者屬  
手陽明經也見於腋者屬手太陽經也見於穿膈



者屬督衝任三脉也見於腿者表屬足三陽裏屬足三陰也外腎癱者屬足厥陰經也喉癱臍癱者俱屬任脉也乳癱者內屬陽明外屬少陽頭屬足厥陰經也腰癱者屬足太陽經也跨馬癱囊癱者俱屬足厥陰經也藥之所施必賴引用如太陽經用防風羌活陽明經白芷升麻少陽經單用柴胡太陰經白芍藥升麻少陰經止宜獨活厥陰經青皮柴胡皆佐之以桂庶藥力可以直攻患處也

若夫氣血多寡之異又不可不知訣云多血多氣經須記手經大腸足經胃多氣少血有六經三焦膽

腎心脾肺多血少氣心包絡膀胱小腸肝無異故丹溪立癱疽當分經絡論而云惟少陽厥陰之癱疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久不合必成死證若用驅毒利藥以伐陰分之血禍不旋踵若毒起於伏兔腓膕背五臟俞項上腦髭鬚頤八處皆足以傷生背上九處不可患癱其一入髮際爲玉枕又爲舌本其二頸項節其三第三椎爲崇骨其四第四椎爲玉藏其五肺俞其六脾肝俞其七腎俞其八後心對鳩尾其九鳩尾骨穴正面六處亦不可患癱其一喉骨爲垂膺其二胃



爲神舍其三心鳩尾其四兩乳穴其五臍中爲神  
闕共六臍下二寸爲腸屈間 此外若生於迎香  
瞳子膠之間者猶爲喫緊 生於兩邊髮際穴者  
如有核宜取核以去病根 生於腦心者四邊腫  
赤連耳項不急治膿水從頭中而出血逆痰 至  
於不治 生於頸後者瘡頭向上瘡尾向下形如  
蜂窠乃反證也焮腫者急宜托裏散防毒攻心仍  
宜加升麻赤芍藥桔梗若痰發或流入兩肩者不  
治 生腦後對口者名曰天疽其狀六而色紫黑  
不急治熱入淵腋前傷任脈內薰肝肺十餘日而  
死 生耳後一寸三分名曰發頤又名銳毒宜服  
降火化痰消腫托裏之藥不可鍼灸初起則宜隔  
蒜灸但艾炷宜小而少然考東垣之醫元好問腦  
疽艾炷大而壯數多亦未嘗拘也若至於勢成者  
外敷南星膏或陰陽散斂口用檳榔散儻熱毒上  
蒸連頤穿口必至穿喉而死 其他因形而異其  
名者曰燦發痲發石發岩發蜂窠發蓮子發椒眼  
發連珠發竟體發腦背發眉發腮頰發瓜瓢發腫  
高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋脉肉色  
不變者發於附骨欲求良法莫如灼艾或用騎竹



馬法此穴爲心脉所過之處故灸此則心火流通而毒散矣或隔蒜灸法或隔土餅灸法或豆豉餅灸法此灸在患處也痛必灸至不痛蓋灸而痛者毒在肌肉也先及好皮所以痛次及有毒之肉所以不痛也不痛必灸至痛蓋灸而不痛者毒在皮也先及有毒之皮所以不痛次及好肉所以痛也或灸足三里以發泄其毒外敷麥飯石膏或鐵漿醋調蚌殼灰或陰陽散或抑陰散或抑陽散須察瘡之寒熱分別而用內服神仙解毒丹仙方活命飲或內托散以免口舌生瘡

考劉涓子治癰疽法癰之初起也別無惡候初用溫藥平氣乃犀角連翹漏蘆甘草當歸肉桂之類次用排膿發穴乃棘鍼皂角刺甘草川芎乳香之類疽之初發也則補填臟腑令實勿使下陷蔓延外以艾灸引邪透出使有穴歸著而不亂發慎勿妄塗毒藥迷其腠理妄服涼藥虛其真氣惟疏滌風熱通其臟腑外用湯漬之法其勢旣成則當別以虛實善惡從逆深淺酌量用藥驗果是癰則陰滯於陽也驗果是疽則陽滯於陰也陰則熱治陽則冷治



東垣曰身重脉緩溼勝者除溼身熱脉大心燥時腫乍來乍去者清熱諸痛眩暈動搖脉弦者去風氣澁氣滯乾燥無津脉澁者瀉氣補血熱勝則脉浮寒脉緊者瀉寒

水消子曰癰疽瘡癤須順時節春夏爲正緣天氣溫和肌肉緩慢而煖故易治其有肉冷是患人氣虛所致但以溫藥調順氣血外用溫煖潰膿膏藥貼之穴通膿盡急用生肌長肉藥不宜緩至秋冬致成漏瘡也秋冬發者乃春夏時先有發蒸熱毒遇一陰生後再有伏毒至秋冬又因房慾食毒而發

初覺微小數日之間漸至臃大疼不可忍先調脾胃氣令實次服發穴排膿消毒去積之藥內托溫平不可用太熱品劑以致氣澁而不流暢榮衛反不通調外貼則用溫涼引膿外透其患漸安若用冷藥反逼毒氣入內矣

若陽中之陰則似熱非熱雖腫而不虛赤而不燥痛而無膿既浮復消外盛內腐陰中之陰則似冷非冷不腫而實赤微而躁有膿而痛外雖不盛內實煩悶乃毒氣深沈內攻臟腑後必頭面虛浮漸攻手面次攻兩足面乃毒氣散入四肢也大凶之



兆。至有陽變爲陰者涼劑之過也猶可以反故  
多生陰變爲陽者熱藥之驟也不復可回故多死  
先渴而後發或先發而後渴多至不救蓋癰疽將  
發未發之時火邪熾盛熱在上焦所以先渴癰疽  
既潰之後氣血兩虛虛火上炎所以後渴先渴者  
用參耆以補氣歸地以養血或忍冬丸黃耆六一  
湯若脉數發熱而渴用竹葉黃耆湯皆可也後渴  
者則宜加減八味丸東垣云病疽愈後渴宜加減  
八味丸絕妙緣癰疽多因虛而得疽安而渴者服  
此丸則渴止而安未渴者服此丸永不渴未疽而  
先渴者服此丸不惟渴止而疽亦不作丹溪則辯  
其宜補氣血何必澤瀉茯苓肉桂導水二公之論  
豈不矛盾但疽未發時固宜解熱敗毒涼血生津  
而疽因虛得者虛火致渴從治之法又東垣之確  
見臨時自當酌用

若疽至於不痛大痛皆稱難治或麻或痒皆爲難治  
瘍家有五善七惡之分然善不止於五惡不止於  
七如動息自寧一飲食知味一便利調勻三膿潰  
腫消水鮮不臭四神采精明語聲清亮體氣平和  
五皆爲善候煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小



便如淋一膿血既洩腫焮尤甚色敗氣臭痛不可  
 近二目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳人上視三  
 喘促氣短恍惚嗜臥肩背不便四肢沉重四服藥  
 而嘔食不知味強食不下唇鼻青赤肢面浮腫五  
 聲音嘶小未潰黑陷面青唇黑氣噎痞塞身冷自  
 汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言顛倒六瀉利嘔吐腎  
 脉最虛七皆為惡候要之善者乃五臟未傷惡  
 者則五臟虧損善候併至則吉無以加惡候併至  
 則凶已為極善候乍見一二便可回生惡證忽有  
 二三宜當深懼

然惡候之所至由於瘡疽臟腑氣血之虛實宜有以  
 分之凡腫起堅硬膿稠者疽瘡之實證腫平軟曼  
 膿稀者瘡疽之虛證如瀉利腸鳴飲食不入嘔吐  
 無時手足皆冷脉弱皮寒小便自利或小便時難  
 大便滑利聲音不足精神不爽者臟腑之虛也  
 大便硬小便澁飲食如故腹滿膨脹胸膈痞悶肢  
 節疼痛口苦咽乾煩燥多渴身熱脉大精神多塞  
 者臟腑之實也膿水清稀瘡口不合聚腫不赤  
 肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤  
 寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血



之實也。頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也。精滑不滯大便自利腰腳沉重睡臥不寧下虛也。肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者真氣虛也。腫焮尤甚痛不可近日久不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧邪氣之實也。然亦有膿水出多而致氣虛虧損或汗下失宜而致榮衛消鑠或寒涼尅伐氣血不足或過服竣厲胃氣受傷皆能反善爲惡。若潰而至於透內膿者死未潰而陷面青唇黑便污者死潰喉者死陰入腹者死入囊者死鬢深及寸者死在頤後一寸三分名銳毒亦不治待膿自出不導引者死毒未內攻而失鍼烙導引或於內攻後鍼烙者死熱痛正甚失於醫療致毒內攻者死膿成不導引而反敷藥者死故治者不可不早然當熟審標本緩急。若病急而元氣實先治其標病緩而元氣虛先治其本病急而元氣又虛必標本兼治若元氣未損者治之則易元氣虛弱者治之則難元氣虛甚者治之尤難未潰之時臟腑蓄毒一毫熱藥斷不可用已潰之後臟腑



既虧一毫冷藥亦不可用若至熱渴便秘脉沉而實兼之洪數有用大黃等藥以泄其毒者雖張潔古有裏者下之之句但人之稟賦作用不一有因房勞而虛有因憂怒而虛有因動勞而虛有因醉飽太過而虛乃至旬日半月大便秘實蓋氣不降也若便以爲實而行大黃者殺人甚速

東垣曰瘡疽及諸病面赤雖伏火熱鬱不得攻裏爲陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脉風證只用發表風藥便可通利大便便若仍乾燥秘澀猶宜潤之慎不可下也而初虞世誤云凡癰疽始作須以大黃等藥亟轉利之勿以困苦爲念與其潰爛而死不若利之而死況有生道哉此一偏之說也

薛立齋云漫腫微痛臟腑不實屬內外俱虛當用內托補之若患腫無頭肉色不變當助胃壯氣令其內消若疼痛不止炊腫不消當用人參黃耆散托裏排膿若飲食少思肌肉不生當用參耆托裏散以補養脾胃丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固次以行經活血藥佐之參以



經絡時令使毒氣外泄治之早者可以內消此內托之旨也 又曰腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如用大黃寧無孟浪之非 潰瘍內外皆虛宜以接補爲主如用香散未免虛虛之失蓋言不可膠泥於法也 必也真知其實而瀉利真知其虛而補益浮露而淺者則外消藏伏而深者則內托此不易之定論也

大黃香燥非盡不可用也東垣曰瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外法當托裏以溫劑反用寒藥則皮毛始受之邪入骨髓

矣受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑則骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣

潔古云瘡瘍之生也表裏不同或攻或發少有差舛變證殺人甚於傷寒鍼灸施治各隨其宜所用之藥又當明入五臟君臣是其法也 東垣復有疎通托裏和榮衛三法何謂疎通凡瘡瘍腫痛木悶煩熱便秘脉沉而實其邪在內故痛深宜用寒劑疎通臟腑以絕其源黃連內疎湯仙方活命飲苦參丸之類是也 何謂托裏凡焮腫作痛便利調



和脉浮而數其邪在表故痛淺邪氣極則內行宜用溫劑先托是以散其邪內托復煎散之類若焮痛發熱或拘急或頭痛俱屬在表宜荊防敗毒散人參敗毒散之類是也何謂和榮衛凡患者大小便如常飲食不減腹中和口知味則不在裏也不惡風寒止於熱躁脉不浮則不在表也表裏既和卽當於經絡中求之宜調和榮衛當歸黃耆湯托裏養榮湯白芷升麻之類是也如焮痛煩躁或咽乾作渴者宜降火黃連解毒湯是也煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之清涼飲金銀

花散是也惡瘡久不潰氣實兼寒邪也宜宣而補之十宣散是也焮痛發熱汗多大渴便秘譫語者結陽證也宜下之黃連內疎湯破棺丹是也不作膿或熱而不潰者虛也宜補之補中益氣湯十全大補湯八珍湯是也焮痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之活命飲是也腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之清心湯防風通聖散加黃連是也不作膿不潰及不斂者陽氣虛也宜補之托裏消毒散是也已上諸證猶須別稟受厚薄形志苦樂七情順逆而以意裁度若至潰後猶



宜補益元戎云榮衛充滿抑遏而爲癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅滯而爲癰者當補之以接虛怯之氣諸先哲之論皆治癰疽之大法也但用之之法貴乎得宜故精要有五實五虛舍時從證之論醫學綱目載王伯祿五月用薑附賈倉使父冬至後用清涼飲子加黃連壹兩伍錢盛暑而用辛溫嚴寒而用苦寒乃智者知變之權豈守常衆人之見可擬耶昧者不分癰與疽虛與實但執舊方一槩宜熱拔毒外以五香耗其氣內以大黃竭其血未有不至於危者也然患人喜於內消醫者務在迎合不察毒之可散與否用十宣散敗毒散流氣飲之類而致氣血耗散釀成他證者有之此又時醫之通弊也

至於膿熟而不潰者氣虛也急宜補之聖愈湯是也猶須行鍼烙之法否則毒氣內攻蝕腐愈深穿膜爛骨多至於歿 若已潰而瘀肉不腐者宜大補陽氣用參耆歸朮之類更用桑枝灸法膿清不斂者氣血俱虛宜八珍湯潰後食少不睡或發熱者虛也宜內補黃耆湯倦怠懶言食少不睡者虛也宜黃耆人參湯寒氣襲於瘡口不斂或陷下而不



斂宜用溫補脈大無力或微瀋而肌肉遲生者氣血俱虛也俱全大補湯膿血出多煩躁不眠者亡陽也急補之膿多或清者亦氣血虛也峻補之右關脈弱而肌肉遲生者宜健脾胃六君子湯若至潰久成痿常有膿水不絕其膿不臭肉無腐肉須先服大劑參耆歸朮或人參膏患處隔附子片或餅灸數次以肉平爲期可至全愈

大抵治癰疽之法始終必以調理脾胃爲主若脾胃不傷臟腑咸有所稟氣血凝結者得藥自散膿瘰已成者得藥自潰肌肉欲死者得藥自生肌肉已死者得藥自腐死肉已潰者得藥自斂若治專攻於瘡脾胃一虛變證蜂起其不至於危亾者幾希矣

又臟腑腸胃內瘡內疽隱而不見者非脈無以辯之凡診得人迎脈沉細乃氣逆胃口則知當發爲癰若至洪數膿已成也遲而帶緊膿雖未就已有瘀血宜急下之不爾則邪毒內攻腸胃腐爛卒不可救右寸滑數而實則爲肺癰必呼吸不利胸膈脹滿咳唾膿血若雖數而虛則爲肺痿關脈遇芤則爲腸癰其驗於外者中府乳上三肋隱隱痛者肺疽



巨闕一寸坎下隱隱痛者心疽箕門大腿內股隱隱痛者

肝疽章門上脇肋對臍一寸隱隱痛者脾疽京門脇肋下

隱隱痛者腎疽中脘臍上四寸隱隱痛者胃疽天樞臍平

旁三寸隱隱痛者大腸疽丹田臍下二寸隱隱痛者三焦

疽關元臍下三寸隱隱痛者小腸疽皮肉俱覺微腫苟

非知此鮮不至誤故集諸家方法逐條敘列庶因

證求法者有所宗而患者不至夭扎矣

十二經絡圖說第二

人身之有經絡猶地理之有界限也治病不知經絡猶捕賊不知向方況手足十二經絡有血氣多少

之分血多氣少者易治氣多血少者難痊氣多之

經宜行其氣血多之經宜破其血不可執也

丹溪云六陰經六陽經分布周身有多氣少血者有

多血少氣者有多氣多血者難以槩論若夫要害

處近虛處怯薄處前哲已論及之唯分經之言未

之曾聞何則諸經唯少陽厥陰經之瘍理宜預防

以其氣多血少也蓋其血本少肌肉難長瘡未易

合必致危篤又云少陽經多氣少血厥陰經同而

少陽有相火尤甚於厥陰乃不思本經少血遽用

驅毒之劑以伐其陰分之血禍不旋踵耳



綱目載一人平生多思質弱年近五十忽於右膊外側廉生一結核身微寒熱易怒脉之俱浮大弦數而瀆余曰此多慮傷血病在初秋理宜急補不聽而服十宣五香散其核稍高大似有膿矣於中起一紅線延過肩後斜走遶背脊入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脉如前而加弦乃急以人參膏入芎朮生薑汁飲之至用參參筋膿潰又與四物湯加參朮陳皮甘草半夏生薑百餘貼而安幸在秋令至春令卽不治矣

中年已後不可生癰纔覺腫痛可急參脉症但見虛弱便與滋補血氣血氣無虧終可保扶若用尋常驅拔舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌

一人左腿外廉生一毒紅腫如栗因大腑堅實服大黃辰砂生粉草麒麟竭而死又一人脇下生毒紅腫如桃服流氣飲十宣散而死一女人髀骨中痛年餘後忽太痛發熱方知是髀樞穴生附骨疽在外廉屬少陽之分服五香湯十宣散升散大甚陰血致竭喘汗以死故氣多血少之人必當詳其部分以用藥苟非精究豈不孟浪

劉宗厚曰凡外科之病不係膏梁丹毒火熱之變而



因虛勞鬱氣所致止宜滋補形氣調和經脈自可  
消去併汗之下之之法亦不可輕用其或不詳脈  
證經絡受病之異輕易下手先犯病禁故多失手  
火熱爲病亦有微甚所謂君火相火是也瘡瘍所發  
有癰疽癰癰輕重深淺之不同或止發於一經或  
兼二經止當求責一二經不可漫擾諸經若東垣  
處方是也矧有兼風兼溼兼痰兼氣兼血兼陰虛  
等證病本不同治宜責實前論雖未詳亦異於外  
科諸書止圖瘡樣而不分經絡者因附十二經圖  
如左

疽發乳上三肋間及手內股舉臂貼着鼻尖爲天府  
穴直至大指內側一帶皆手太陰肺經多氣少血  
疽發食指內側與大指食指岐骨間手腕上側及曲  
池肩端頸側鼻孔側一帶皆手陽明大腸經氣血  
俱多

疽發額角髮際及耳下目下口旁頤後結喉旁一寸  
五分肩前缺盆乳頭外臍旁三寸直至大腿外側  
跨骨縫中至膝髀乃伏兔穴小腿骨外側至腳腕  
以及足次指端一帶皆足陽明胃經氣血俱多  
疽發足大指及足內踝而上膝臏并大腿內股腹旁



乳旁一帶皆足太陰脾經多氣少血

疽發大臂下近腋處及肘內臑掌後通小指一帶皆手少陰心經多氣少血

疽發小指端外側及掌後外側肘內大骨至肩與耳下面頰到耳前珠旁一帶皆手太陽小腸經多血少氣

疽發眉頭環額至耳後及脊骨兩旁各去一寸五分又去三寸及下膝腕橫紋尖外臑至外踝足跟足外側到足小指外側小指端一帶俱足太陽膀胱經多血少氣

疽發腳掌心及內踝後與膝下附骨陰上橫骨去中一寸五分名中注穴又上一寸去中五分到步廊穴去胸中二寸至巨骨下一帶皆足少陰經多血少氣

疽發乳後一寸去腋下三寸名天池穴又臂下去曲腋二寸名天泉穴自臂內臑至橫紋陷中由掌後到掌中及中指一帶皆手厥陰心包絡經多血少氣


疽發無名指端及手背橫紋與腕後二寸兩筋間臂後三寸兩骨間肩下臂外臑并肩端耳下耳後尖



角陷中耳後上青脉耳郭中髮際下耳前起肉銳  
 髮下眉後陷中一帶皆手少陽三焦經多氣少血  
 疽發目外背耳珠前頭角耳上髮際及眉上透頭下  
 耳後離耳一寸五分至肩上第二肋第三肋并季  
 脇與碾子骨後宛脾外膝上至外踝到足小指次  
 指一帶俱足少陽膽經多氣少血  
 疽發足大指端內踝前一寸膝股內側與股上內側  
 及去臍六寸季脇到直乳二肋俱足厥陰肝經多  
 血少氣


手太陰肺經多氣少血

圖一





手陽明大腸經氣血俱多



圖二


足陽明胃經氣血俱多



圖三




足太陰脾經多氣少血



圖四


手少陰心經多氣少血



圖五




手太陽小腸經多血少氣



圖六


足太陽膀胱經多血少氣



圖七



足少陰腎經多血少氣



圖八

手厥陰心包絡經多血少氣




圖九

手少陰心經多血少氣



手少陽三焦經多氣少血



圖十

足少陽膽經多氣少血




圖十一



癩和遺精  
足厥陰肝經多血少氣

圖十二



以上經絡凡遇毒發須體認明白而後用藥無誤然患處肌肉有虛有實有發在皮肉有發近筋脉有相通內絡者苟不知分別蚤為區處則有必不可救之毒而耽閣至死與夫誤藥而危者相去過半矣若用剪割多至傷生不可不知慎也世人雖所重在發背而名狀部分吉凶自殊劉涓子發背有五之說及肩背患疽處悉錄之於首以助瘍家之知識云

發背有五第三

一曰陽毒先因風熱或患熱毒消渴或先患傷寒餘



毒蓄積於背脊脊之間不拘椎數但從兩夾脊起  
滿背熾熱赤紫或紅色如焰膿毒難成成後痛不  
除數日之間忽然平塌昧者誤爲腫消殊不知此  
是內攻肉陷不可復藥矣

二日陰毒乃氣冷而作初如黍米隱隱而痛直應前  
心頭目昏重寒熱如瘡五七日後始覺攻腫膿毒  
深沉遲緩未透急宜以補氣湯藥內托外以抽膿  
藥貼之

三日服金石燒煉藥毒初起如丹痧之狀縻縻漸開  
如湯火所傷面色如朱心膈煩躁多渴嗜冷其瘡  
難起起則驚人尤甚於陰陽二毒但根底分明須  
以解金石毒湯散急治其內方保無虞

四日酒食毒乃平時或飢或困飽食卽睡或多食酒  
肉冷熱粘滑肥鮮油膩之類積於臟腑兼之不慎  
幃幕恣意當風脾臟氣虛不能承受乃毒發於背  
不問椎數初起頭如小彈子後大如拳其堅如石  
痛連四肢加之拘急口苦舌乾腹急便澁十數日  
後頭面手足浮腫臟腑滑泄急痛如利是其候也  
初腫時急用收腫發穴潰膿湯藥內實臟腑外泄  
膿水治之遲緩潰腐愈甚傷骨爛筋復感外邪而



致內敗歿矣

五日冒山嵐瘴氣毒其人素歷嶂鄉觸冒嵐瘴蓄之  
臟腑久而不發至氣血衰弱及斲喪虧損之時而  
後發露初起腫色青黑形如靴皮附筋徹骨頑如  
木石引手加深方覺痛處至五七日毒氣浮淺腫  
高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘧頭動口歪  
又若有風手足厥逆睚黑睛小白多此因內有邪  
氣相搏急宜破清血三五升方有黃白膿出然其  
皮猶腫痛不止直至青白之色退盡方愈此宜急  
急追趕膿毒出外方爲無害否則未有不瀕於危  
者也

瘡疽發處吉凶第四

凡瘡起於十一椎脾俞之下十四椎之上爲腎俞腎  
俞下腰俞此兩處皆是至虛之處不拘癰疽須防  
毒氣內攻必用參耆歸朮之藥補內氣令實方可  
放破內氣實則不內攻且易得潰但預防成漏潰  
後猶宜竣補勿使淹纏最要者是節慾  
土龍疽起胃俞及腎俞大發寒熱十數日大汗展頸  
身熱如沸九日可刺若膿青黑者死血膿者不歿  
失而不刺其上下亦黑二十日歿



蜂疽起心俞及心包絡俞十日可刺其色赤黑膿清者不治二十日不穴死

特疽發肺俞及肝俞八日可刺其色紅赤肉起如椒子者死不穴二十日死

陰陽二氣疽廣濶滿背或大或小腫熱脹大十日可刺導引出膿不拘深淺大小俱發渴體倦十日外不見膿者死

筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有癰在肥腸中九十日死

疔癰發於肩及臑其狀赤黑急宜治之此令人汗出

至足不害五臟

山靈樞經

丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日腫大令人口禁寒戰十二日可刺不治二十日死

百脉疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止不能食此因大恐駭所致上氣咳嗽其發引耳十五日可刺而導引見血否則八十日必死

陳乾疽發兩肩及兩大臂連脾骨十四日痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死



右所敘皆肩背之疽刺及其時凶可回吉若不知醫  
治鮮不至於危殆矣至於發於噎中者名曰猛疽  
失治成膿膿不泄而塞咽頃刻可死 發於頸者  
名曰大疽其狀大而色赤黑不急治則熱氣下入  
淵腋前傷任脉內薰肝肺十餘日而死矣 發於  
腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎  
疎砭之仍塗以豕膏六日可愈若堅而不潰者則  
爲馬刀挾癭也 若在腋下及臂或兩手掌中身  
發寒熱名曰內疔疽噎乾飲多嘔吐煩心悄悄脉  
盛七八日可汗失汗者死 下至於肋發癰者名

曰發肋初起腫盛至十數日不攻穴卽腫大如梧  
如碗痛徹內腸左患應右右患應左宜急以鍼刺  
出膿血否則毒氣內攻而死者多矣 劉涓子謂  
發肋 兩肩肘頭名曰使熒疽九日可刺赤白相  
間膿多可治全無赤白者不治二十日不穴者死  
下部前陰兩處長橫摺內初起腫核結塊後四  
邊浮腫相併伏硬青黑名曰便毒宜先用和平裏  
藥三五日後用發穴散瘡口破宜用抽毒膏膿盡  
便用斂瘡口藥蓋此處無肉可壞不必長肉也  
發於陰股名曰赤施不急治六十日死在兩股之



內不治者十日死。發於腿髀及陰股名曰陰疽。始發腰強數飲不能多。七日發堅腫脹惡心煩噪者死。發於膝名曰疵疽。其狀大而肉色不變。寒熱而堅按之如石者死。用生商陸根擦之。効。發於股脛名曰股脛疽。不甚變色。內薄於骨。不急治三十日死。發於脛名曰兔囓。其狀如赤豆。至骨不急治則害人。發於足上下名曰四淫。其狀大初從小指發。急宜治之。異者不可消。不治百日死。發於足趺名曰陽疽。十日可刺。二十日不宄者。灰若赤白膿血不多。其瘡上痒及赤黑者死。此皆瘡瘍部分及名狀。險順之驗。必宜知之。真而後治之。効。又考之靈樞經曰：諸癰疽之發於節而相應者不可治也。應者內發透外也。發於陽者百日死。諸節發於陰者三十日死。諸節之此又人之所忽者。茲併錄之。

瘡瘍脉論第五

人之虛實冷熱與夫外感六氣諸證莫不見於六脉。故七表八裏九道之所以別也。而瘍家自視淺陋。情焉不辯陰陽。不察虛實。無分癰疽病與方偶合。



則生病與方相背則死噫癰疽固有形之病目可得而識也其真元之虛實治法之瀉補不脉何以知之嘗觀宋太醫齊德之論瘡腫胗候二十六脉其所關乎雜病者姑不摘敘至診浮數之脉理應發熱乃不發熱而反惡寒卽屬瘡疽之兆仲景曰脉數不時見則生惡瘡又曰肺脉俱數則生瘡洪大之脉瘡疽之進也結臍成者宜下之可安臍成已潰者徒藥之而鮮効

滑脉必實大相兼爲熱瘍已潰爲虛爲邪未退膿若未潰宜用內消膿若已潰止須托裏脉數者爲

熱洪而數爲膿結已潰則難安脉散爲氣不收

斂爲虛若膿潰而煩痛脉得洪滑麤散則難治因正氣虛而邪氣實也仲景曰肢體沉重肺脉大則斂浮散之謂也洪脉爲虛爲熱宜宣熱拔毒壯實者可下瘡腫已潰膿診得花脉則爲脉病相應若洪大而長出於本位長而兼緩得胃脉也百病皆愈脉浮爲虛爲風已潰者宜補牢爲邪盛爲欲膿弦爲痛爲欲膿弦洪相搏外緊內熱瘡疽欲發也

緊脉氣血沉瀯痛處卽發瘡疽瀯則氣瀯爲氣滯



潰後無妨 短則氣短為元虛諸證難瘳內經云

短則氣病以其無胃氣也 脉細則裏虛將欲變

證 脉微則氣虛勻舉自瘥 脉遲為血少為虛

潰後自痊 脉緩百病可愈 脉沉為邪伏已潰

為有餘毒 脉伏邪氣益深 脉虛則血虛宜托

裏和氣養血 脉軟則胃弱宜補虛排膿托裏

脉弱則血氣兩虛均宜內托 促則熱蓄於裏已

潰難治 結則陰盛而邪氣結已潰不宜促結二

者已號難治若至於代則氣血衰敗元氣大傷諸

病見之咸為不祥陰陽相搏謂之動或在陽或在

陰居處則虛蓋陽生於尺而動於寸陰生於寸而

動於尺不可不辯也嗟夫脉之有根本即人之有

元氣也病至於甚脉道乃乖雖細微之疾必見於

六脉之中矧癰疽冠諸瘡之首而可忽之乎故為

脉論

補論

脉沉實發熱煩燥外不焮腫赤痛其邪乃深伏在

裏宜先疎通

浮大以數焮腫在外當先托裏恐邪入內

脉不沉不浮內外證宜審其經當和榮衛

脉數身不熱為內有癰膿 脉數應發熱而反惡



寒者若有痛處卽此處發癰 若脉數不時見當  
生惡瘡

### 虛實第六

凡瘡疽潰膿後證候危惡當辯虛實有瘡之虛實有  
臟腑之虛實有血氣之虛實又有上實下虛真虛  
邪實之辨不可不知

瘡之實者腫起堅硬膿稠虛者硬漫膿稀 臟腑之  
虛者瀉利腸鳴飲食不樂嘔吐脉弱皮寒 實者  
痞滿煩躁身熱脉大 又如膿水清稀瘡口不合  
聚腫不赤肌寒自汗氣血之虛也實者反是 上

實者頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不利舌瘡煩渴  
下虛者精滑便利腰沉腳重不得睡 又肩項不  
便四肢沉重視不了了食不知味音嘶聲敗爲真  
氣虛 腫焮大痛積日不潰寒熱往來大便秘小  
便淋心煩恍惚爲邪氣實 又曰真氣奪則虛盛  
則實 又曰諸痛爲實癢爲虛 脉洪大數爲實  
細微軟爲虛虛則補之和氣托裏實則瀉之疎利  
導氣經云血實則決之氣虛則引之元戎云凡血  
氣壅盛榮衛充滿抑遏不行而爲癰者當泄之以  
奪盛熱之氣若人不思飲食精神衰弱榮衛短瀆



瘡科遺精 虛實  
寒搏而爲癰唯補之以接虛怯之氣此治虛實之  
大法也

凡瘡疽痛息和寧飲食知味脉證俱平唯在治本用  
王道和平之藥治之若脉實焮腫煩躁寒熱脉證  
俱實非猛烈之劑不能除 又有聚腫不潰潰而  
膿清不暢泄利嘔吐不食法當大補

薛新甫云病急而元氣實者先治其標病緩而元氣  
虛者先治其本或病急元氣又虛必專治本而兼  
治標大要腫高焮痛膿稠者元氣未損治之易漫  
腫痛微膿清者元氣虛弱治之難不腫不痛漫腫  
黯黑不潰者爲虛之甚治之尤難

主治之法若腫高焮痛者用仙方活命飲解之後用  
托裏消毒散 漫腫微痛者用托裏散不應加薑  
桂若膿出反痛者氣血虛也八珍湯 不作膿不  
潰腐陽氣虛也四君子加歸耆肉桂 不生肌不  
收斂脾氣虛也四君子加白芍藥木香兼惡寒者  
陽氣虛也十全大補湯加薑桂兼晡熱內熱陰血  
虛也四物加參朮兼嘔者胃氣虛也六君子加炮  
薑兼自汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子食  
少體倦脾虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽



脾肺氣虛也補中湯加麥冬五味欲嘔少食脾胃  
 虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理  
 中湯小腹痞滿足脛腫脾腎虛也十全大補湯加  
 桂附熱渴淋闕腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋  
 闕肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸

大凡怯弱之人不必論其腫潰唯先補其胃氣或疑  
 參耆滿中間用之又兼發散敗毒之味所補不償  
 所失又有泥於氣質素實或有痰不服補劑者殊  
 不知瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈虛  
 豈不宜補丹溪先生云但見腫痛參之脉證虛弱

急與滋補氣血可保終吉

又有舍時從證者如癰痛赤躁發熱飲冷便秘作渴  
 脉洪數而實是曰五實即在嚴冬必用苦寒之劑  
 瀉其陽以救其陰若脉細皮寒瀉利腸鳴飲食不  
 進嘔吐逆冷是曰五虛即在盛暑必用辛熱之劑  
 散其陰以回其陽內經曰用寒遠寒用熱遠熱有  
 假者反之雖違其時必從其證此之謂也

內消內托第七

方見腫瘍條

癰疽之證發無定處欲內消於初起之時唯在行氣  
 活血解毒消腫而已然當審深淺大小經絡處所



形骸虛實如發於腦背腰項髻膈者皆太陽經也  
宜黃連羌活背連脇處近少陽宜柴胡並用敗毒  
散仙方活命飲其形實脉實者宜漏蘆湯內疎黃  
連湯追毒丸等疎利之氣虛者參耆爲主血虛者  
芎歸爲主佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至  
病所 薛新甫云瘡瘍之證當察經之傳受病之  
表裏人之虛實而攻補之 假如瘡痛熱渴大便  
秘結者邪在內也疎利之 瘡焮作痛頭疼寒熱  
者邪在表也發散之 焮瘡痛甚者邪在經絡也  
和解之 微痛不作膿氣血虛也補托之 漫瘡

不痛不作膿及膿成不潰者氣血虛甚也峻補之  
色黯黯微腫痛或膿成不出或腐肉不潰者陽  
氣虛寒也溫補之若泥於未潰而槩用敗毒等藥  
重損脾胃不唯腫者不能成膿而潰者亦難收斂  
七惡蜂起多致大敗丹溪先生云瘡瘍內外皆壅  
宜以托裏表散爲主如用大黃寧無孟浪之非潰  
瘍內外皆虛宜以托裏補接爲主如用香散未免  
虛虛之失治者審之

癰疽已成而血氣虛邪氣盛或邪氣散漫不能突起  
亦難於潰膿或破包膿少及清稀或堅硬不軟又



或雖得膿而根腳紅潤或毒氣不出瘡口不合聚  
腫不赤結核無膿凡此皆氣血既虛兼以六淫之  
邪而變生諸證必用內托令毒熱出於肌表乃可  
奏功 凡內托以大補爲主活血祛邪之藥佐之  
或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風  
寒大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆  
爲要藥但要隨時加減如冬月并氣滯之人五香  
連翹湯虛弱之人去大黃素不宜寒藥者小五香  
湯形實脉實膿色稠不可用補者忍冬之類大膿  
出敗肉去紅腫消必用參耆歸朮大劑補之令氣  
血滋茂新肉易長薛新甫有隨證加減用藥例以  
托裏消毒爲主誠爲良法今採入各證中

灼艾法第八

陳良甫曰人年四十以上患發背等瘡宜安心早治  
此證如虎入室禦之不善必至傷人蓋言瘡發之  
初當慎擇良方美法或消其毒或殺其勢也李氏  
云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外泄  
譬如盜入人家當開戶逐之不然則入室爲害矣  
考外科精義所載有豆豉椒薑鹽葱相和搗爛捻  
作餅子灸法有流黃灸法有爭土作餅灸法有蟻



螻蟲灸法有乞火婆蟲灸法有赤皮蒜搗爛作餅  
灸法莫如大顆獨蒜灸之爲佳也緣蒜味溫辛有  
毒主散癰疽假火勢以行藥力外科精義言之詳  
矣若毒發有頭者以蒜切片三分厚貼頂上以艾  
在蒜上灸之每三壯一易其蒜痛者灸令不痛蓋  
灸而痛者毒在肌肉也先及好皮所以痛次及有  
毒之肉所以不痛不痛者灸令痛蓋灸而不痛者  
毒在皮也先及有毒之皮所以不痛次及好肉所  
以痛 若瘡毒漫腫無頭用溼紙貼腫處但一點  
先乾處卽是瘡頭若其頭大則以獨蒜淡豆豉

加乳香搗爛照瘡大小作餅艾灸之痛否照依前  
法未潰者則拔引鬱毒已潰者則補接陽氣大有  
回生之功誠非藥力可到且瘡不開大肉不敗壞  
瘡口易斂皆一灸之効也 灸後以次服藥庶幾  
可言十全東垣曰一日二日十灸十日四日  
六七活五日六日三四活過十數日不可灸精要  
中又引太學生史氏之母患在背脾微痒瘡粒如  
黍灼艾卽消隔宿復作用膏覆之暈開六寸許痛  
不能勝歸咎於艾適遇一僧至自云向曾病瘡甚  
危灸至八百餘壯方甦始知灸之未徹也遂用艾



如棗大灸瘡頭及四旁各數壯而痛止至三十餘壯赤暈悉退又易艾如梅杏大者灸四十餘壯方食粥安寢瘡突四寸小竅百餘許患肉俱壞而愈此可見瘡之不可不灸灸之不可不多若以艾火熱痛是懼稍効卽止所謂非徒無益而又害之也精要言頭項見瘡不可用此法以愚論之艾之小大可也何爲而不可用哉且如所患疔瘡毒盛者頃刻可危藥力不能速到非仗艾火何以得解其毒又考東垣治元好問腦疽以兩核大艾炷灸百壯由此觀之頭項之疽未嘗不可用艾雖艾大亦可也其灼艾之功非惟能解內發之毒也文治叅將燕河口外尖哨爲蛇所傷須臾兩目不見疼痛至甚擡入口內令人來稟製藥不及乃以隔蒜灸法治之數壯而痛止再數壯而目漸明三十餘壯而瘡口黃水長流五十餘壯目漸明而周身腫盡消艾蒜之功不亦奇歟併記之

瘰癧蟲灸法第九

凡疔癭惡瘡諸藥不効以瘰癧蟲剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七炷一易不過七枚無不効者考日華子云瘰癧蟲治胸下堅滿障翳癩膜并治風癩



桑柳樹內收者佳若糞土中收者可敷惡瘡是可  
見灸瘦瘡之當用糞土中蟻螬也乞火婆蟲  
灸法相同

豆豉餅灸法第十

江西豆豉為末唾津和作餅子大比瘡頭厚如三文  
錢置患處以艾於餅上灸之乾則頻易若係背瘡  
以漱口水調作餅子未成即消已成亦殺大勢又  
法以椒薑鹽葱相和豆豉

淨土灸法第十一

瘡疽已見取淨土水和捻作餅子照瘡頭大厚二分  
貼在瘡上以艾灸之一炷一易瘡如粟米灸四十  
九壯瘡如錢大日夜不住灸以愈為止

桑枝灸法第十二

發背不起或癩肉不潰乃陽氣虛弱也用桑枝燃火  
吹息稍近肉取其火氣灸患處片時日三五次以  
助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔陰瘡癰  
癰流注膿瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法  
未潰則解熱毒止痛消癰腫已潰則補氣散餘  
毒生肌肉其陽證瘡痛如負重石初起之時而用  
此法即出毒水內消日久用之雖潰亦淺且不受  
苦楚惟因其平易人遂渺之惜夫



騎竹馬灸法十三

隔蒜灸法既施於患處矣而病之所自又必直窮其源故復有騎竹馬之法以取其穴焉其法取患人男左女右之臂以肘尖着卓小臂直豎用直草一條自兩臂橫紋量起至中指肉盡處截斷卻以竹扛一條令患人裸身騎跨兩人拱手兩人擡起身不偃僂足不着地以前所量草自尾骶骨量至草盡處用墨筆點記此是取中不是灸穴復量患人中指中節亦男左女右上下俱以橫紋爲限截斷而自墨點處左右橫量盡處是穴左疽灸右右疽灸左或左右皆灸蓋癰疽乃心火留滯之毒此穴爲心脉所過之處故灸此則心火流通而毒散矣誠有起死回生之奇効又法自背脊骨第二陷中兩旁相去各一寸五分名熱腑穴各灸七壯及足三里穴能疎泄諸陽熱氣永無癰疽之苦故併附之

葱熨法第十四

凡瘡疽及流注結核鶴漆附骨等毒先已用灼艾等法而餘腫未消宜以葱白搗爛炒熱熨患處冷則再易其功最大若跌撲傷損亦照此法若以南



星草烏爲末拌入爛葱而熨猶有神効

熨風散 治風痛

羌活 防風 白芷 當歸 細辛

芫花 白芍藥 吳茱萸 官桂 各壹錢

右爲細末取赤皮葱連鬚搯兩搗爛同藥末和勻  
醞醋拌炒極熱綿布裹於患處熨之稍冷卽換

湯漬瘡腫法第十五

古人論瘡腫初生須用湯水淋射蓋氣血凝滯則爲  
癰腫得熱則腠理疎通經絡融暢誠至理也其法  
以藥濃煎瘡在四肢者則湯漬之在腰腹者則淋  
之下部者則浴漬之仍以淨布蘸水濕其患處水  
涼再換日用十餘次夜亦不息兼服內消之劑未  
有不驗者也

木香湯腫湯 瘡疽始發焮腫熱痛

木香 犀角 大黃 升麻 黃芩

黃連 射干 黃栢 白斂 甘草 炙

朴硝 紫檀 梔子仁 羚羊角 各壹兩

生地黄 伍兩

右吹咀和勻每用伍兩以水壹斗煎柒升入麝香  
壹錢淨綿蘸藥熱湯腫上一日兩三度冷卽再換



升麻湯腫湯

升麻

黃耆

防風

生地黃

川芎

細辛

各參錢

右用水五碗煎十餘沸稍熱淋濁內消如神

漏蘆湯腫湯

漏蘆

升麻

芒硝

梔子仁

黃芩

蒴藿

各參錢

右用水五碗煎十餘沸稍熱淋濁或以淨布蘸濕

効

猪蹄湯

升麻

白芍藥

甘草

蒴藿

各壹兩

右用水十五碗先煮猪蹄壹對候軟取出入前藥

煎十餘沸布蘸淋濁之

漏腫湯

白芍藥

丹參

黃芩

白斂

各貳錢

右用水三碗煎十餘沸布蘸頻濁之

洗毒湯

苦參

防風

甘草

露蜂房

右用水貳碗濃煎洗瘡腫

浴毒湯

小腸風陰瘡痒痛



湯和選料

木通 藁本 枳殼 貫衆 白芷

荆芥 甘松 薄荷 各參錢

右用水拾碗煎至捌碗入芒硝伍錢再煎壹貳沸

熱浴患處

消毒湯 諸瘡悉能內消

獨活 防風 細辛 藁本 川芎

枸杞子 荆芥 漏蘆 大黃 黃芩

官桂 苦參 葳靈仙 丹參 黃耆

當歸 白芍藥 白茯苓 無心草 黃連

黃栢 麻黃 葛根 蒴藋 菊花

杜仲 秦皮 萵草 甘草 甘松

露蜂房 零陵香 地骨皮 藿香 白芷

升麻 各捌分 蒼朮 壹錢貳分 朴硝 貳錢 菖蒲 參錢

右用水拾碗葱參莖槐柳枝各壹握煎拾餘沸去粗熱淋洗其効如神若欲洗浴增藥增水

圍藥各有所宜第十六

瘡疽有陰陽之分近世瘍科之寡昧者止憑所製圍

藥一二種或僅一種槩以用之若藥品屬熱而敷

於陽毒藥品屬寒而敷於陰毒豈非所謂如水益

深如火益熱歟丹溪曰敷貼之藥應酬輕小熱證



耳若不辯其陰陽之所由分妄敷寒涼之劑迷塞  
腠理凝滯氣血毒氣內攻歸之肝心反至危殆矣  
況氣脉得寒而不行瘀血得寒而不散瘀肉得寒  
而不潰新肉得寒而不生爲患不可勝言也

丹溪又云外施敷貼正與發表之意同大凡氣得熱  
則散冷則斂向見鄭經歷絲竹空穴湧出一角長  
短如鷄距稍堅他醫以大黃朴硝腦子冷藥菴之  
一夕豁開如醬蚘徑三寸後血自蚘中濺出高數  
尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發故也且瘡疽之  
發本乎臟腑不和自內達外者也乃不思抽薪止

沸而卻舍本從末雖陰陽寒熱適宜僅可斂其根  
脚而已要之證屬純陽外熱內疼者用涼藥敷貼  
宜抑陽散則熱毒自和瘀滯自消證屬半陰半陽  
者宜用陰陽散則氣血自和瘀滯自消證屬純陰  
外冷內疼者用熱藥敷貼宜抑陰散則脾胃自壯  
陽氣自回若其勢成氣猛必不可當頭敷遏如鄭  
經歷之禍兵法所謂避其銳氣者是也 如陰氣  
外逼皮膚宜用熱物熨之雖大熱而不覺者必須  
更翻熨透亦能消散其他如麥飯石膏宣毒散鐵  
箍散等類各有所宜併錄於集俟用者擇焉



抑陽散

治瘡屬純陽腫痛發熱

天花粉

兩

姜黃

白芷

赤芍藥

各壹兩

右為末茶湯調搽患處

陰陽散

治瘡屬半陰半陽

紫荊皮

炒伍兩

獨活

去節炒壹兩

赤芍藥

炒

石菖蒲

白芷

各貳兩

右為末葱酒調搽

抑陰散

治瘡瘍元氣虛寒焮腫不消或不潰斂或筋攣骨痛一切冷證

赤芍藥

炒

南星

煨

白芷

各貳兩

草烏

貳兩

肉桂

伍錢

右為末葱湯調塗熱酒亦可

忍冬藤

服忍冬酒後以忍冬藤一把搗爛入酒少許敷四圍

厭熱神白膏

治癰疽初起此藥雖多寒味而有南星草烏相佐亦可用者

大黃

白斂

黃栢

赤小豆

南星

草烏

黑蛤粉

各壹兩

右為末用芭蕉汁調塗如乾仍以汁潤之

牡礪地黃膏

治瘡疽屬純陽者宜此苦寒鹹寒之劑

大黃

壹兩為末

生地黃

水浸

牡礪

用鹽泥固之蝦赤出火毒研細貳兩

右研生地汁調二味塗患處如乾更用汁潤之

宣毒散

消瘡毒收赤暈行經散血

白礬

伍錢

小米

壹合

赤小豆

南星

草烏

各壹兩



露蜂房 參兩 炒焦

右為末以淡醋調敷四畔乾則頻用醋潤之

吳茱萸散 氣滯壅腫用此疎散

吳茱萸 炒為末

右用鷄子清調搽

鹿角散 癰疽初起用此四消

生鹿角尖

右用米醋在砂石器內濃磨塗患處四圍一二日

消

正鐵箍散

貝母 去心 伍兩 龍骨 貳錢

白芷

蒼耳草 燒灰各 貳兩

右為細末水調或香油調敷

大鐵箍散

防風 伍錢 大黃 紫荊皮 貝母 羌活

真地青 白芨 各壹兩 寒水石 赤小豆 白芷

黃栢 白斂 各貳兩 木斂子 猪卷皮 芙蓉 各肆兩

右為細末凉水調圍四畔如肉脆去白斂白芨加

生地黃地榆芭蕉油調敷熱甚者用三消散

三消散 敷極熱赤腫之瘡

南星 寒水石 山梔 炒黑 朴硝 焰硝



大黃 各等分

右為末生地黄汁或芙蓉葉汁調敷亦可

二合消毒散 治大毒初起可消毒成速潰已潰收斂  
每日換二三次

輕粉 研極細 黃栢 蜜炙 寒水石 煨各壹兩 文蛤 搥碎

洗淨炒黑 參兩陸錢

右各為末和勻半以蜂蜜半以新汲水調令不稀

不稠初起者當頭敷毒成與已潰者敷四圍一日

三易

麥飯石膏 治諸般惡瘡未成膿者自消已成膿者即潰其効如神

白麥飯石 炭火煨醋 鹿角 生取入炭火燒煙盡肆兩

右俱為極細末和勻用米醋調勻入砂器內慢火

煎熬以竹片不住手攪待成膏收貯未成者塗四

圍乾則以醋潤之若腐爛用布帛攤貼外科精義

所載有白斂貳兩

拔毒散 治熱毒丹腫遊走不定

寒水石 生用 石膏 生用各肆兩 黃栢 甘草 各壹兩

右為極細末用新汲水調掃或油調塗以紙護貼

金露散 治時氣熱毒

寒水石 生用壹兩伍錢 黃栢 壹兩 白芨 白斂

雄黃 各貳錢伍分



右為極細末無根水調敷

水澄膏 治熱毒腫痛大効

大黃

黃栢

鬱金

南星

白芨

朴硝

黃葵花

各壹兩

右為極細末用新汲水鍾半調藥貳錢候澄底去浮水敷腫赤處外護以紙如乾燥以唾津潤之其効如神皮膚白者不用

神黃散

治一切熱腫攻痲疼痛

黃栢

雄黃

另研各壹兩

黃丹

淘洗淨炒紫色貳兩

右為細末和勻以新汲水調如糊敷掃外以紙護

烏金散

治瘡疽腫硬無頭肉不變色者

香珠粉

肆兩

葱白

壹兩細切

右同炒黑色碾為細末醋調敷腫處一時一換以

消為度

南星膏

治毒發險處以此藥圍之可使移之不險處

五倍子

壹兩炒

南星

草烏

黃栢

白芨

各貳兩

右為末醋調如糊隨腫處漸漸圍逐至不險處

四虎散

治發背初生筋脉緊急不舒

附子

生去皮壹兩

天南星

泡

半夏

湯洗柒次

狼毒

各伍錢

右為細末熱酒調成膏塗腫處以帛掩定雖覺熱



如火燒無礙

逼毒散

治癰疽膿盡恐有餘毒用此圍之

黃藥子

白藥子

各壹兩

赤小豆

貳兩

雄黃

壹錢

右為末水調敷

一方癰疽發背初腫時以風化石灰貳兩細辛壹兩為末熱醋調敷腫處乾脫再敷三上腫消

一方癰疽發背乳癰初起即以苧根搗敷數易甚効

一方諸瘡腫不可忍以葵花根去黑皮搗如飴紙攤如膏貼患處立効

一方治發背取活鍋牛百個以新汲水一盞浸淨瓶

內自晚封閉到曉其水如涎調真蛤粉刷瘡上最効

一方斂瘡內消以黃明膠壹兩水一盞融化訖入黃丹壹兩再煮參五沸候冷以雞翎塗腫處自消

瘍科選粹卷之一

終



傷科選粹目錄

第二卷

用藥論第十七

托裏消毒散

薛加減法

護心散

阿膠飲子

牛膠飲

黃礬丸

千金化毒丸

國老膠

柞木飲子

萬金散

遠志酒

忍冬酒

槐花酒

保安湯

紫金錠

轉毒散

大黃湯

單壹味

神仙截法

黑虎丹

荆芥散

練子灰



拔毒仙丹瓜冬 破堅丹商六 忍冬酒灸法照火方

敷藥方敷治神方

初起湯藥十八

仙方活命飲 托裏散 瓜萋托裏散

清熱消毒飲 升陽益胃湯 黃連消毒散東垣

清涼飲 破棺丹 黃連解毒湯

內疎黃連湯 內托榮衛湯東垣 內托復煎散

人參敗毒散 清心湯 濟陰湯

冲和湯 回陽酒 漏蘆湯

化毒丹 內消丸 五利大黃湯

內消升麻湯 五香連翹飲 牡蠣大黃湯

和血通氣丸 內消散 六味車螯丸

止痛寶靈散 清心內固金粉散

神秘陷脉散 千金托裏散 川烏丸

二烏丸 神効托裏散 排膿十宣散

人參順氣散 茯苓開胃散 獨聖散香附

梅花飲子 綠雲散 寸金丹

乳香止痛散 金銀花散 白芷升麻湯

托裏溫經湯 柴胡黍粘子散

黃耆柴胡湯 散毒飲子 當歸黃耆湯



萬靈丸 乳香托裏散

惡候主治論第十九

惡候瘡治方第二十

托裏溫中湯 附子理中湯 薑附湯

參附湯 獨參湯 人參理中湯

竹葉黃耆湯 竹葉石膏湯 加減八味丸

參朮膏 連翹散 托裏健中湯

托裏益黃湯 托裏養榮湯 托裏越菊湯

回毒金銀花湯 忍冬丸

黃耆六一湯 五味子湯 犀角膏

鍼烙論第二十一

替鍼丸 青金錠子 透膿散

一粒丹牛旁子 獨腳虎蜀葵子 隔皮取膿法

瘡瘍第二十二

內疎黃連湯 內托復煎湯 當歸黃耆湯

加味當歸飲 蟾酥丸 奪命丹

內托羌活湯 托裏溫經湯 內托耆柴酒煎湯

內托黃耆酒煎湯 當歸拈痛湯

升麻和氣飲 十宣散 托毒散

托裏散 瀉心湯 清涼飲



內消升麻湯 宣毒散 五香連翹飲

中和湯 內托散 菜豆乳香 獨聖散 香附

忍冬酒 二見 蠟凡丸 再見 托裏消毒散

清熱消毒散 芫連消毒散 連翹飲

內消散 化毒內托散 秘方拔毒散

歸耆湯 榮衛返魂丹 回陽玉龍膏

潰瘍第二十三 淋洗 生肌 去腐肉

托裏溫中湯 加味十全湯 補中益氣湯

人參養榮湯 四君子湯 六君子湯

四物湯 八珍湯 十全大補湯

黃耆人參湯 托裏當歸湯 麥冬湯

托裏散 東垣加減法 人參內托散

黃耆散 當歸補血湯 加味逍遙散

梔子黃芩湯 豬蹄湯 神異膏

止痛拔毒膏 精要生肌散 平肌散

立應散 生肌散 木香檳榔散

寒瘡斂口方 聖効散 桃紅散 黃丹散

調攝第二十四 將護 禁忌

人參內補散 托裏黃耆湯 內托散

黃耆茯苓湯 人參黃耆湯 聖愈湯



止痛當歸湯 和氣飲

瘍科選粹卷之二

石

癰疽用藥論第十七

繡水陳文治 輯  
東吳繆希雍參校

瘡之始發也既灼艾矣或用騎竹馬法矣勢之微者亦可自消勢之重者不免腫發苟不因其陰陽虛實酌量用藥惟執古方之已効者槩施於人不能無實實虛虛之禍變證之所由生危殆因而立至可不慎諸大率主治之法若腫高焮痛者宜先服仙方活命飲後用托裏消毒散漫腫微腫者用托



裏散如不應則加薑桂他如黃礬丸阿膠飲子牛膠飲之類俱有消毒之功有益無損之劑也相兼用之自無不可

若夫隨證加減之法薛立齋以托裏消毒散立論所敘甚明雖有巧者豈能越其軌範哉茲於本方之後條述其法醫者因是而察所患之陰陽虛實復能以已意增損一二斯為上工矣

托裏消毒散 治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服此未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

人參

黃耆 鹽水拌炒 當歸 酒拌

白芍藥

炒

川芎

白朮 炒

白茯苓

各壹錢

金銀花

白芷

各柒分

甘草 炙

連翹

各伍分

薛立齋加減法

高腫焮痛熱毒也加黃連

漫腫微痛氣虛也加金銀花連翹加參朮

頭痛發熱邪在表也本方加川芎羌活

外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散

頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹加參耆

發熱飲冷便秘內熱也去參芪歸朮加大黃

發熱飲熱便秘內虛也去金連加參耆歸朮



發熱飲冷小便澇滯肝熱也去參耆加柴胡山梔  
一作膿膿不潰氣虛也去金連及白芷加參朮肉  
桂如不應暫用十全大補湯

腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫  
用仙方活命飲

膿出反痛氣血虛也去金連白芷三味加參耆歸  
地

肉赤而不斂血虛而有熱也去上三味加熟地牡  
丹皮

肉黯而不斂陽氣虛寒也去上三味加參耆白斂  
官桂

漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去上三味加人  
參白朮如不應加姜桂更不應急加附子

肉白而不斂陽氣虛也去上三味加參耆歸朮  
膿多而不斂氣血虛也去上三味加參耆歸朮熟

地如不應暫用十全大補湯  
飲食少思而不斂胃氣虛也去上三味加參耆如

不應暫用補中益氣湯  
飲食難化而不斂脾氣虛也去上三味加參朮如

不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸



膿少而帶赤血虛也去上三味加歸地參朮如不應暫用八珍湯加牡丹皮

忿怒晡熱而出血肝火血虛也去上三味加牡丹皮熟地炒黑山梔如不應暫用八珍湯送六味丸

面青血脹而出血肝氣虛而不能藏血也去上三味加山茱萸五味子如不應兼用六味丸

食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去上三味加參耆歸地兼鬱少寐加遠志酸棗仁茯神龍

罪肉如不應暫用歸脾湯  
欲吐作嘔或外搽內服寒涼或痛甚或感寒邪穢

氣而嘔胃氣虛也去上三味加藿香參朮  
飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄瀉脾氣虛寒也去三

味加炮薑木香  
手足逆冷脾血虛寒也去三味加炮薑木香附子

煎送四神丸  
飲冷作渴熱毒也加赤小豆知母如不應暫用竹

葉黃耆湯  
善食作渴胃火也加石膏山梔如不應暫用竹葉

石膏湯  
膿多作渴氣血虛也去三味加熟地黃五味子如



不應暫用十全大補湯加五味子麥門冬

口乾舌燥腎氣虛也去三味加熟地山茱萸山藥

如不應兼用六味丸又不應佐以補中益氣湯

自汗內熱口乾胃氣虛也去三味加參耆歸朮如

不應暫用六君子湯

盜汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟地麥門五

味如不應暫用當歸六黃湯

莖中痛而小便不利精內敗也去三味加山茱萸

山藥澤瀉如不應佐以六味丸

愈便則愈痛愈痛則愈便精復竭也去三味煎送

六味丸

食少體倦口乾飲熱小便黃短脾肺虛熱也去三

味加五味子山茱萸如不應暫用六味丸

勞役而小便黃元氣下陷也去三味加升麻

柴胡

午後小便黃短腎虛熱也去三味加升麻柴胡不

應煎送六味丸

口燥作渴小便頻數腎水虧也去三味加五味子

山茱萸山藥熟地不應兼用六味丸

四肢逆冷腎氣虛寒也去三味加桂附不應佐以

八味丸



食少體倦作渴胃氣虛也去三味加參耆白朮不  
應暫用補中益氣湯

體倦頭痛或眩暈中氣虛也去三味加柴胡升麻  
不應暫用補中益氣湯加漫荆子

日晡頭痛或眩暈陰血虛也去三味加熟地黃不  
應佐以六味丸

夢泄遺精頭眩頭痛或痰喘氣促腎虛不能納氣  
也去三味竝川芎佐以六味丸如不應是虛寒也

用八味丸面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫煩  
躁也去三味加黃耆當歸不應暫用當歸補湯

身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣脫發躁也去三  
味加肉桂附子不應暫用附子理中湯

多思不寐體痛盜汗脾血虛也去三味加茯神遠  
志酸棗圓眼肉不應暫用歸脾湯

寢寐而汗出腎氣虛也去三味加五味子煎送六  
味丸

飲食時出汗胃氣虛也去三味加參耆歸朮五味  
子不應暫用六君子湯

睡後覺飽出盜汗宿食也去三味加參朮半夏不  
應暫用六君子湯



胸滿多痰脾氣虛也去三味加桔梗半夏不應暫用六君子湯加桔梗枳殼

晡熱多痰脾血虛也去三味加歸地參朮不應暫用六君子湯加芎歸熟地

咳嗽唾痰腎虧津液泛上也去三味加山茱萸山藥熟地不應佐以六味丸

忿怒胸痞肝氣滯也加桔梗山梔不應暫用補中益氣湯加桔梗枳殼

倦怠胸痞中氣虛也去三味加參朮茯苓不應暫用八珍湯加柴胡

口苦寒熱往來肝火血虛也去三味加柴胡熟地

因怒寒熱往來肝火血虛也加柴胡黃芩不應暫用八珍湯加炒山梔炒酸棗仁酒炒黑龍膽草

體倦寒熱往來肝脾氣滯也去三味加參耆歸朮不應暫用補中益氣湯

內熱晡熱或寒熱往來陰血虛也去三味加芎歸牡丹皮柴胡不應暫用八珍湯加牡丹皮

畏寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參苓白朮升麻不應暫用補中益氣湯

脇痛痞滿或寒熱往來肝氣滯也去三味加青皮



木香不應屬氣血虛也更加芎歸參朮

婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語或夜間熱甚此邪在血分也去三味加生地牡丹皮柴胡不應暫用加味四物湯

誤服尅伐之劑或膿血大泄或因吐瀉或誤入房或勞損元氣或夢泄遺精或外邪感觸以致發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血目赤煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲投水身熱惡衣揚手擲足腰背反張鄭聲自汗此陽氣脫陷之假熱證也

畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聾目朦小便自遺瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮牙齒浮痛肢體麻痺或厥冷身痛或咬牙嚙唇此陽氣脫陷之真寒證也

以上假熱真寒勿論其脉勿論其證但有一二則去三味急加桂附補之庶有復生之理按加減六十二法皆托裏消毒之發揮也即此意而消息之則得瘍家之要矣行灼艾法後若護心散等二十一方皆有益無損之藥故繼托裏消毒散而錄之在隨宜取舍而已

護心散

李氏云凡患癰疽蚤進護心散數服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間別藥而服但此藥專解金石發疽之劑若發熱癩腫



飲冷而渴必宜用也若不喜飲冷而喜熱湯及非因丹毒而發疽者則又不宜用也

菜豆末

壹兩

明乳香

伍錢

右煎生甘草湯每服調壹錢食後細呷使常在膈

間

阿膠飲子

治一切癰疽癰毒

橘紅

伍錢

阿膠

同蛤粉炒如珠

粉草

各壹兩

右分三劑水煎服

牛膠飲

治癰疽服此使毒不內攻不傳惡證此有益無損之物法宜酒煮第恐氣味難嘗不若剉

碎為丸以酒送下是亦權變之法也

牛皮膠

明者肆兩

右用湯壹碗重湯煮化服加酒中飲之至醉不能

飲者加白湯亦可然不如酒力之銳也

黃礬丸

治癰疽初起未破內消已破自合如服金石藥毒所致者加礬末壹兩但須日服百粒方能禦毒不致內攻最

止疼痛不動臟腑

白礬

明亮者壹兩生研為末

黃蠟

黃色者伍錢

右以蠟熔開入白礬末乘熱為丸每服拾丸漸加

至貳拾丸熱水或溫酒送下有人遍身生瘡如蛇

頭服此即効

千金化毒丸

治癰疽因服金石所致物微而功大故以千金名之

白礬

明亮者佳



右壹味生研為末薄糊為丸每服叁錢以葱湯送下連進貳服其功最大

國老膏 治一切癰疽預服此膏消腫逐毒其功不能盡述最解丹毒元氣虛弱者戒之

用粉草不拘數以河水浸二日揉取汁砂器內煎

膏服壹貳匙好酒或白湯調下

柞木飲子 治一切癰疽未成自消已成自潰蓋荷葉蒂去惡血萱草解毒柞葉善祛逐地榆甘草節清血消毒但此

止可消輕小之恙也

乾柞葉 肆兩 萱草根 荷葉蒂 甘草節 地榆 各壹兩

右每服伍錢水煎分貳次早晚服

萬金散 治癰疽已潰未潰有消毒破血之功

括婁 壹個研細 沒藥 壹錢研末 大甘草節 貳錢

右貳味酒煎入沒藥末調服

遠志酒 治因憂怒氣滯癰疽此有解鬱消毒之功

用遠志去心米泔水洗淨叁錢酒煎服粗搗爛敷

患處

忍冬酒 治癰疽初發甚効

忍冬藤 生取伍兩 大甘草節 壹兩

右水煎減半入好酒壹碗再煎數沸去粗分叁服

壹晝夜用盡重者連服貳劑至大小便通利為度

槐花酒 癰疽初起飲此未成者可消已成者勢減功並灼艾不可忽焉



槐花伍兩炒微黃乘熱入酒貳鍾煎拾餘沸去粗

熱服未成者貳參服已成者參肆服

保安湯 治瘡疽托裏  
已成者速潰

括婁 新者壹個  
去皮火焙

沒藥 透明者貳  
錢研細末

金銀花

生薑 各伍  
錢

右用好酒伍大碗砂器內煎參茶鍾分參次服毒

微者壹服即効

紫金錠 凡癰疽惡瘡湯火傷蛇  
蟲犬獸所傷俱宜服此

五倍子 槌碎洗淨  
焙乾參兩

山茨菰 去皮淨  
末貳兩

麝香 參錢  
另研

千金子 去殼去油  
取霜壹兩

紅牙大戟 去蘆焙乾  
為末壹兩

右為末糯米煮濃飲為丸分為肆拾錠此藥能應

諸病各有神効若瘡疽用東流水磨塗并服須端

午日合一方有全蝎朱砂雄黃各壹兩名神仙追

毒丸

益府紫金錠

文蛤 參  
兩

茨姑 貳  
兩

大戟 壹  
兩

雄黃 捌  
錢

真麝 捌  
錢

續隨子 參  
兩

右為末糯米糊和勻印成錠

轉毒散 治一切癰疽利去毒根以免傳  
變之證元氣不虛方可用此

車螯 此係背光厚者以鹽泥  
固口煨赤取淨末壹兩

輕粉 伍  
分

甘草 捌  
分



右每服肆錢用括婁壹個杵細煎酒五更初調服下惡物為度未應再服功在五香連翹之上緩則用五香連翹湯急則用神仙截法

單煮大黃湯

此孫真人傳凡癰疽熱毒大便秘結此能宣熱扶毒

錦紋大黃

酒浸去皮

右以水煎服若元氣虛則不可用須慎之

神仙截法

治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

芝麻油壹觔銀石器內熬十數沸候冷再用酒貳碗入油五酒椀熱服急則一日用盡緩則二三日亦可按芝麻油能下三焦熱毒通大小腸滯氣若

瘡瘍初起毒蓄於內大便秘結者用之以疏通其

毒誠為良法元氣虛者非所宜也

黑虎丹

治金石發癰

黑鉛

壹觔

粉草

叁兩

右用酒壹斗入甘草於內將鉛鎔化投酒玖次去

鉛與甘草飲醉即愈

荆芥散

治背瘡毒深者用此攻裏

木鱉仁

當歸頭

甘草節

大黃

各壹錢

荆芥穗

貳錢

右為細末酒水各半煎成空心向東飲即下積以



粥湯補止

練子灰 治諸毒初起

川練子柴枚燒灰酒下次拾肆枚次貳拾壹枚如此三服雖成亦小

拔毒仙丹 治背發欲死

冬瓜壹個切去一頭合瘡上瓜爛切去仍復合之瓜未盡而瘡愈

破堅丹 治耳後石癰

商陸根杵爛頻擦

一外國傳來奇方凡惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急

攣牽陰入小腹不可忍一宿即殺人用茴香苗葉

搗汁壹升日用三四次其相即貼瘡上冬月根亦可用起死如神

補方五種

○忍冬花酒 即金銀花也 治一切癰疽發背疔瘡乳陰便

毒喉閉乳蛾等症不問已潰未潰用金銀花連莖葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾熱服甚者不過叁

伍服即愈如無鮮者用乾的壹貳兩水壹鍾煎半鍾冲上熱酒半鍾和服此二方其藥易得其功甚

大山鄉僻邑無醫之處尤宜知此法以備不虞



○治癰疽發背灸法

累用累驗凡人患癰疽發背已結未結赤熱腫痛先以溼紙覆其上其紙先乾處即是疽頭結處取大瓣蒜切如三錢厚安在頭上用大壯艾灸之三壯換壹蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛方住最要早覺早灸為上纔發壹貳日十灸十愈叁肆日十灸七愈五六日叁四愈過七日則不宜灸若有十數頭作壹處生者用蒜研成膏作餅納瘡頭上聚艾灸之亦能安也若背上初起未腫內有壹粒黃如粟米即用獨蒜切片如前法灸之次日去痂

膿自潰矣極効不可言

○治背疽照火方

麝香貳分

雄黃

硃砂

血竭

沒藥

各口壹錢

右五味為細末綿紙撚長尺許每用藥叁分真麻油潤灼離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭上出藥氣熏入瘡毒隨氣解散自不內侵臟腑初用叁條漸加至伍陸柒條瘡勢漸消又漸減之熏罷隨用敷藥

○敷藥方

車前草連根 五爪龍 稀蒼草 金銀花各等分



右共搗爛加多年陳米粉調如漿加飛鹽少許調敷瘡上畱一孔拔膿出若冬時用根若蓄下乾葉陳醋調敷其蓄草陰乾者佳不見日為妙 五爪龍一時採不出瘡勢甚急只用四味亦能奏功瘡初發時取草汁半盞黃酒和飲其瘡內消其毒自散 射干一名地扁竹處處有之其花似萱花而略小舖內有端午採者陰乾尤妙 廣陵李杜曰此方初用藥搥熏照以火引火毒氣外散後用敷藥追膿止痛毒從瘡孔出一照即起紅暈狀如蒸餅則陰瘡變為陽症無虞照法每日一次初用參根或四根次四五根再六七根止以重輕為多寡重者六七日腐肉化膿新肉如榴子漸生不必再照敷藥終始用之不可用膏藥用葱葉貼之 又日照時用猪蹄湯澄清洗敷藥如法重照待瘡愈肉滿始用生肌散護以太乙膏內服十宣散護心散忌寒涼之藥恐傷胃氣

○敷治發背妙方

將雄黃狗下頷連皮毛骨肉用炭火燒成灰瓦器

蓋之存性 骨另燒不然皮肉成灰無性 蠶豆 一名寒豆浙之湖州者良江北擇其

最小者用 白斂 壹兩 右二味量煨過狗骨多少各等



分爲細末老醋調勻用鵝翎敷上患處不必留頭  
此 卽痒未成膿者立消已成膿者亦鑽一小頭  
 隨出膿而愈已成膿甚者宜用醋調服仍用醋調  
 敷百治百効此病關係不細此方經驗獨竒近得  
 之嶺南李君不敢私秘特梓濟人毋視爲泛泛也  
 初起湯藥方第十八

凡癰疽初起陰陽寒熱虛實不同而或消或托或下  
 各方不一皆先哲已試之効故不敢遺惟用者能  
 酌量去取庶合經權之道大率治瘡疽初劑先以  
 仙方活命飲繼以托裏消毒散以免後來口舌生

瘡而其用寒用温毋容毫髮差也司命者審之

仙方活命飲

治一切瘡瘍未成膿者自消已成膿者卽潰且止痛消毒誠瘡家初起通用之神方故以仙方活命飲呼之

穿山甲

炒黃

白芷

防風

赤芍藥

甘草

當歸尾

天花粉

貝母

皂角刺

各壹錢

金銀花

陳皮

各叁錢

乳香

沒藥

各壹錢二味另研爲末

右拾壹味水酒各半煎成送乳沒二末不能飲者  
 水煎亦可

托裏散

治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托

人參

氣虛多用

黃耆

炒各貳錢

白朮

炒

陳皮

當歸



熟地黄 白茯苓 白芍藥 酒炒各壹錢伍分

右用水煎服

瓜婁托裏散

治癰疽未成即消既成則潰既潰則生肌若榮衛調和者殊有良驗若氣血虛

弱還宜前方其治打撲傷損者尤妙

黃瓜婁 壹個 忍冬草 乳香 各壹兩 蘇木 伍錢

沒藥 叁錢 甘草 貳錢

右酒煎分參服壹日用盡粗為細末酒糊為丸彈

子大當歸酒嚼下

清熱消毒飲

治癰疽發於陽腫痛發熱作渴

黃連 炒 山梔 炒 連翹 當歸 各壹錢 川芎

白芍藥 炒 生地黄 各壹錢伍分 甘草 炙壹錢 金銀花 貳錢

右水煎服

東垣升陽益胃湯

治一切惡瘡背發腦發內陽藥柒分陰藥叁分最是妙用初起貳叁

日者立消成膿者即潰

羌活 黃耆 炙甘草 藁本 各柒分 獨活

防風 黃栢 防風稍 人參 陳皮

當歸稍 蘇木 酒防已 黃連 各貳分伍釐

知母 黃芩 生地黄 生甘草 連翹

桔梗 各伍分 當歸 壹錢伍分 澤瀉 叁分伍釐

右水煎成滴酒數十點臨臥温服或加乳香沒藥



各壹錢

東垣黃連消毒散

治腦疽背疽腫焮疼痛或麻木膏梁之人尤宜用此

黃連

酒製

羌活

生地黃

酒洗

當歸身

酒洗

連翹

黃耆

各壹錢

澤瀉

柒分

黃芩

黃栢

獨活

防風

藁本

防已

酒洗

蘇木

陳皮

桔梗

壹錢

知母

酒炒肆分

人參

甘草

稍分各伍

右水煎成入酒少許服

清涼飲

治瘡瘍煩燥飲冷焮痛脈實大便秘結小便赤澁

大黃

炒

赤芍藥

當歸

甘草

各貳錢

右水煎服

破棺丹

治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語發狂

芒硝

甘草

各貳錢

大黃

貳兩伍錢半生半熟

右爲末煉蜜丸如彈子大每服壹丸童便酒化下

如不能飲白湯亦可

黃連解毒湯

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脈洪數或發狂言

黃芩

黃栢

炒

黃連

山梔

各壹錢伍分

右水煎熱服

內疎黃連湯

治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脈洪實

黃連

白芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

山梔

薄荷

桔梗

甘草

各壹錢



錢 連翹 大黃 各壹錢 伍分

右薑水煎須量人虛實而用

東垣內托榮衛湯

治風溼熱鬱於手足少陽而致血脈凝逆元氣消弱而色赤腫微黯時多忿怒瘡色赤黯腫硬奮然高起其脈洪緩而弦宜發汗以通榮衛則邪氣去矣

黃耆 紅花 連翹 蒼朮 柴胡

羌活 防風 當歸身 酒拌 甘草 炙 黃芩

人參 各壹錢 桂枝 柒分

右酒水煎服查醫學綱目黃耆桂枝各伍錢蒼朮

紅花各叁錢防風羌活黃耆當歸各壹錢伍分

內托復煎散

治瘡瘍焮腫在外其脈多浮若邪氣勝必侵於內宜用此托之

地骨皮 黃芩 白茯苓 白芍藥 炒 人參

黃耆 鹽水拌炒 白朮 炒 桂枝 甘草 炙 防風 酒炒

當歸 酒拌各壹兩 防風 貳錢

右先以蒼朮壹升水伍升煎至四升去蒼朮入前

藥再煎至貳升終日飲之

人參敗毒散

治瘡瘍焮痛寒熱拘急頭痛脈細有力

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡

桔梗 枳殼 白茯苓 川芎 甘草 各壹錢

右水煎服

清心湯

治瘡瘍腫痛發熱飲冷脈沉實睡語不寧



防風

川芎

當歸

白芍藥

薄荷

黃連

大黃炒

麻黃

連翹

芒硝各叁分

石膏

黃芩

桔梗各陸分

滑石叁錢

山梔

荆芥

白朮各陸分

甘草壹錢貳分

右薑水煎服

濟陰湯

治瘡屬陽 腫痛發熱

連翹

山梔炒

黃芩炒

黃連炒各壹錢

甘草壹錢

白芍藥壹錢伍分

金銀花叁錢

牡丹皮壹錢貳分

右水煎若大便秘量加大黃

冲和湯

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

陳皮貳錢

人參

黃耆

白朮

當歸

白芷各壹錢伍分

白茯苓

皂角刺

川芎

金銀花

甘草節各壹錢

右水酒各半煎另研乳香沒藥各壹錢為末調服

回陽酒

治脾胃虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不瘡痛不腐潰腹痛泄瀉嘔吐厥逆陽氣脫陷等證

乾薑炮

附子炮各貳錢

人參

白朮

黃耆各叁錢

當歸

甘草炙

陳皮各貳錢

柴胡

升麻各伍分

右酒水各半煎服如未應薑附倍之

漏蘆湯

治一切疥癩瘡毒初覺一二日如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒壯熱肢體疼痛恍惚亂坐

卧不寧大便秘濇小便黃赤者宜服此



朴硝

大黃

各壹錢

黃芩

去黑心

漏蘆

炙甘草

麻黃

去節

枳實

麩炒去穰

白芍藥

白斂

升麻

各伍分

右水煎服

化毒丹

諸般惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

乳香

沒藥

各伍錢另研

巴豆

四十九粒去皮心另研

草烏頭

醋浸炮製其醋候用

浮石

各壹兩燒赤醋淬七次其醋候用

右五味為細末和勻用醱醋調麵糊為丸如豌豆大每服伍柒丸食後冷酒送下忌熱飲利貳叁次或吐出惡物為効

內消丸

治瘡癰初生及癰癰結核熱毒鬱滯服之內消大有神効

青皮

陳皮

各貳兩

牽牛

搗兩取頭末貳兩

皂角

去粗皮搗碎

薄荷葉

各捌兩貳味共用水壹斗煮令極軟揉汁去相慢火熬膏

右青陳牽牛叁味和勻以膏為丸如棗豆大每服

叁拾丸食後荆芥湯送下

五利大黃湯

瘡疽初發年壯氣盛大小便秘宜服此藥

大黃根

黃芩

去腐

升麻

各壹錢貳分

芒硝

梔子

各壹錢

右水煎稍熱服

內消升麻湯

治瘡疽初發氣血虛者不宜用

大黃

升麻

枳實

炒去穰

黃芩

去腐

當歸



白芍藥各壹錢

炙甘草捌分

右水煎稍熱服

五香連翹湯

治諸瘡初覺一二日便厥逆咽喉塞發寒熱如不用五香各七味連翹湯

沉香

藿香葉

木香

丁香

麝香少許

連翹

射干

獨活

升麻

甘草炙

桑寄生

大黃各伍分

右水煎取利為効一方有黃耆木通

牡礪大黃湯

治疽初發

牡礪

木香

大黃

煨各壹錢伍分

右水煎春夏露一宿冬月於暖處一宿鷄鳴時服

得利勿服

和血通氣丸

治瘡疽初發

人參壹兩

麥門冬貳兩

大黃

黃芩

黃栢

各肆兩

牽牛

壹觔炒香取頭末肆兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服二三十九溫

湯送下

內消散

未成膿即消已成膿從大便出

皂角刺

柒個

桃仁

肆拾玖粒

穿山甲

炒

羚羊角

炒

乳香

大黃

各壹錢俱為末

金銀花

天花粉

厚朴

各壹錢

右用水一鍾煎金銀等五味至陸分調穿山甲等



肆味服

六味車螯散

治瘡瘍積毒於內大便秘結元氣充實者宜用

車螯

肆個黃泥固濟煨

燈心

參拾段

甘草

貳錢

瓜婁

壹個杵

右以車螯為細末酒浸參味至捌分入蜜壹匙臙

粉少許調車螯末貳錢空心服下惡血為驗

止痛靈寶散

治瘡瘍毒氣凝聚作痛

鬼繫腰

卽薜蘿又名絡石在陰溼竹籬石崖絡石而生者其藤柔細兩葉相對葉有三角取

藤葉壹兩洗淨晒乾

皂角刺

壹兩新瓦上炒黃

瓜婁

大者壹箇杵炒用仁

甘草節

伍分

明乳香

沒藥

各參錢另研

右每服壹兩水酒煎服

清心內固金粉散

治瘡瘍熱

辰砂

另研

白茯苓

人參

甘草

各參錢

菜豆

肆兩

雄黃

壹錢

朴硝

另研

荳蔻仁

各伍錢

腦子

麝香

另研各壹錢

右為末每服壹錢伍分蜜湯調下

神秘陷脉散

治瘡疽初起托裏消毒行氣破血連用五七服甚効

黃耆

人參

當歸

酒洗

赤芍藥

川芎

乳香

沒藥

各伍分

粉草

地骨皮

橘紅

五加皮

忍冬葉

各柒分

右水酒各半煎十味調服乳沒



千金托裏散 治背疽并諸惡瘡如在三日內兩利大便則消矣亦宜量虛實施之

羌活 藁本 黃耆 人參 甘草 灸

木猪苓 當歸身 連翹 黃芩 酒浸 大黃 酒浸

各壹錢 伍分 麥門冬 壹錢 酒防已 陳皮 蘇木

防風稍 當歸稍 生甘草 五味子 酒黃栢

防風 各貳分 伍釐 生地黃 酒黃連 桔梗 山梔 各伍分

右水煎稍熱服連用貳服相併煎

川烏丸 治發背 活經絡

當歸 蘇木 獨活 赤芍藥 羌活

大川烏 去皮 尖 穿山甲 蛤粉炒 五靈脂 去砂 微炒

木鱉子 去殼 沒藥 另研各壹兩

右為末酒糊為丸梧子大每服柒拾丸温酒下

二烏丸 治發背托裏定痛祛風涼血東垣曰脉弦者去風即此之意也

川芎 玄參 麻黃 去節 蔓荆子 地榆

旋覆花 荆芥穗 防風 天麻 白芷

白殭蠶 直者去絲 足翦炒用 牛旁子 甘菊花 各貳兩

羌活 薄荷葉 各叁兩 蟬蛻 洗去土 足伍錢 大川烏 去皮 尖炮

何首烏 不犯鐵器 粉草 灸各肆兩

右為末酒糊丸如梧子大每服陸拾丸温酒下

神効托裏散 治癰疽發背腸癰乃托裏消毒之良劑



黃耆鹽水 忍冬葉 當歸各伍錢 粉草貳錢

右酒煎服相敷患處

排膿內補十宣散

治瘡瘍未成速散已成速潰膿毒自去其効如神若陽氣虛弱風寒鬱滯而不能潰散此方允宜若熱毒壅結或氣血虛弱又當用托裏消毒散參耆托裏散

當歸酒浸 人參各捌分 防風 桔梗炒各壹錢 川芎

肉桂各叁分 黃耆鹽水拌炒壹錢 甘草 白芷各伍分

厚朴薑汁炒陸分

右水煎服或用為末好酒或木香湯送下丹溪曰

排膿內補十宣散若用之於些少癰疽與冬月儘

可助內托之功若於冬月瘡瘍用之亦可轉重就

輕移深為淺若潰瘍與夏月用之則桂朴之溫散

佐以防風白芷吾恐雖有參耆難為倚仗世人不

分癰疽冬夏而用此方若盲人騎瞎馬夜半臨深

淵也此先哲之戒不可不知若此之類又不止此

一方也宜觸類而悟之

人參順氣散

癰疽初發若脾肺腎氣盛壅遏宜服此疏泄

烏藥壹兩伍錢 白茯苓 真蘇子微炒 人參各壹兩 青皮

粉草各伍錢 白朮炒 白芷各壹兩

右為末每服參錢薑棗水煎去粗服

茯苓開胃散

胃氣鬱滯飲食不進宜用此



白茯苓壹兩粉草炙伍錢枳殼炒黃

右為末每服壹錢鹽湯調下

獨聖散瘡瘍因氣滯血凝香附能行氣通血宜服

香附子薑汁浸一宿焙乾研碎

右白湯調服貳錢行中有補之意

梅花飲子癰疽初發當防內攻此藥解消熱毒

括婁根 乾葛根 綿黃耆 川芎 烏梅

炙甘草 蘇木各貳錢伍分 忍冬藤壹兩

右水酒參大碗煎服

綠雲散治五毒發瘡於背腦或手足因於服金石者服此當有奇効

鳳尾草形如鳳尾葉背有金星者炙乾壹兩

右用酒壹碗煎五六沸入冷酒壹碗飲以醉為度

寸金丹尼背發癰疽附骨腫痛煩渴發熱四肢沉重身體壯熱雖至臨危口禁藥可下咽即能甦醒故其別名又曰返魂丹百生丸追命丹延壽丸來甦丸知命丸得道丸

粉霜 黃蠟各叁錢 南乳香 烏金石 輕粉

雄黃 狗寶 沒藥各壹錢 礪砂伍錢水煎乾方可用

蟾酥貳錢 狗膽壹個 鯉魚膽壹個 金頭蜈蚣柒條

酥炙 黃色 頭生孩兒乳壹合

右黃蠟乳汁熬成膏子各藥同為細末和膏為丸

大人如棗豆大小兒如芥子大用白丁香柒個研

身科選粹



爛以新汲水調送壹九重者叁丸衣覆取汗勿令

透風雖無頭瘡腫叁服立効服後宜用白粥

乳香止痛散 瘡疽腫痛不止

白芷分七 丁香壹分 炙甘草伍厘 陳皮各伍分 乳香伍

沒藥各叁分 栗殼壹錢五分 去

右水煎服

白芷升麻湯 治癰出於陽明經分大小便如故飲食如常乃邪在經絡之中凝滯所致此湯

却寒邪和經脉中氣血也

白芷分七 升麻分七 桔梗各伍分 甘草分七 黃芩生

當歸稍 生地各壹錢 中桂 紅花各少許 黃耆

酒黃芩 連翹各貳錢

右水酒各半煎服

托裏溫經湯 治癰疽脉浮緊按之洪緩赤腫痛甚發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下

寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫宜以苦辛之劑溫經散寒麻黃苦溫發之者也防風

辛溫散之者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經之邪故以為君血凝而不行則痛

以白芷歸身辛溫以破血散滯溼熱則腫蒼朮苦甘溫體輕浮力雄壯能泄皮膚腠理溼熱人

參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏也故以為佐使

麻黃去根 白芷 當歸各壹錢 升麻貳錢 甘草炙

白芍藥各七分 人參 蒼朮各伍分 防風

葛根各壹錢



右水煎先以麻黃煮去沫再下餘藥煎成溫服衣覆取汗所謂汗之則瘡已也

東垣柴胡黍粘子湯 治左腿外側足少陽之分附骨癱堅硬漫腫不辯肉色按至骨

大痛

連翹

肉桂

各壹錢

黃栢

甘草

炙各伍分

當歸稍

黃耆

各貳錢

柴胡

黍粘子

各壹錢伍分

右酒煎空心服服後即飯不使熱藥犯上焦也

黃耆柴胡湯

治大腿近膝股內足厥陰肝經分生附骨疽不辯肉色漫腫木硬痛勢甚大其

脈弦細按之洪緩畧有力

黃耆

貳錢

柴胡稍

壹錢

羌活

伍分

連翹

壹錢貳分

肉桂

土瓜根

黃栢

酒洗

生地

各叁分

當歸尾

柒錢伍分

右酒水各半煎熱服甚効

散毒飲子

癰疽初覺未成可消

黃耆

貳兩

炙甘草

天羅生

山藥

炒

鬼繫腰

伍錢石上者佳木上者不用

右為粗末每服叁錢水煎柒分入酒參栝再煎叁

沸去粗服

當歸黃耆湯

瘡瘍臟腑已行而痛不可忍

當歸

黃耆

生地黃

地骨皮

川芎

白芍藥



右水煎服若發熱加黃芩煩躁加山梔如嘔則是血氣侵胃倍加白朮

萬靈丸

凡瘡疽初覺一二日服此

朱砂

血竭

蓮蕊

各壹兩

麝香

貳分

右為細末酒糊為丸如黃米大每服柒丸溫酒送下不過叁服立効

乳香托裏散

一切瘡癰疼痛不可忍如少壯氣實者先疏利而後服此大効

御米殼

去隔蒂萼蜜炒叁兩

當歸

白芍藥

川芎

各伍錢

乳香

沒藥

各壹錢

右每服伍錢水煎去粗服痛未止再服

惡候主治論第十九

薛立齋曰瘡瘍之證有五善有七惡五善見三則瘡七惡見四則危蓋七惡之見乃臟腑虧損元氣虛弱或膿水出多或汗下失宜或寒涼尅伐或峻厲過傷以致榮衛銷鑠真氣虛耗邪氣反實故變證蜂起治宜隨證投劑

凡大渴發熱泄瀉淋閉者邪火內淫也宜竹葉黃耆湯氣血俱虛者八珍湯加黃耆麥門冬五味子山茱萸如不應佐以加減八味丸料煎服

膿血既瀉瘡痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛也



身和遺精  
三十一  
宜人參黃耆湯如不應佐十全大補湯加麥門冬  
五味子

目視不正黑暗緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰  
虛而目系急也宜六味丸料加炒山梔麥門冬五  
味子如不應用八珍湯加炒山梔麥門冬五味子  
喘粗氣短恍惚嗜臥者脾肺虛火也宜六君子湯加  
大棗生薑如不應用補中益氣湯加麥門冬五味  
子

心火刑剋肺金人參平肺散陰火傷肺六味丸料加  
五味子煎服

肩背不便四肢沉重者脾腎虧損也宜補中益氣湯  
加山茱萸乾山藥五味子如不應用十全大補湯  
加山茱萸乾山藥五味子

不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱也宜六  
君子湯加木香砂仁如不應急加附子

聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛也  
宜補中益氣湯加大棗生薑如不應用六君子湯  
加炮薑更不應急加附子或十全大補湯加附子  
炮薑

腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內淫之惡證也



湯和遺精  
先服托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑  
桂溫補此七惡之治法也

此外又有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不  
寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手  
撒身熱脈洪大按之如無或又身熱惡衣欲投於  
水其脈浮大按之微細衣厚仍寒此血氣虛極傳  
變之惡證也

若手足逆冷肚腹疼痛泄利腸鳴飲食不入吃逆嘔  
吐此陽氣虛寒氣所乘之惡證也

又考精要論嘔逆之證乃因初發時不曾服內托散  
而致伏熱在心亦有氣虛脾氣不正而嘔吐者丹  
溪斷其用內托散固有降火之理山藥丸補腎亦  
是嘉禾散則補力不及須分先後而治初發當作  
毒氣上攻潰後當作陰虛火逆年老宜用參耆  
白朮膏峻補佐使之藥隨時隨證加減河間則論  
瘡瘍嘔者溼氣浸於胃也宜倍加白朮是可見病  
之所見者雖同內之所因者各異惟在人之體察  
耳

至於有汗而不惡寒或無汗而惡寒口禁作冷腰背  
反張頸項強勁此血氣虛極變症之惡證也急用



參耆歸朮附子救之間有可生者

按五善七惡瘍科之所必談但臟腑無虧氣血充實則起居如常其善豈止於五若稟賦素薄或毒氣熾盛或誤藥受傷證變不一其惡豈止於七即所敘惡候之條可知矣然所謂五善見三則瘡者是證之未變也故易治七惡見四則危者是證之已變也故難治醫者但察其證之變而酌量治之斯得矣奚必以善惡候之數目拘之哉

惡候療治方第二十

瘡疽惡候不一療治亦異集驗諸方固先哲之常試

而證惡雜出貴當局之變通故湯名之下細書病因用者當緣異以求同勿泥法而昧意庶乎方倣之義矣

托裏溫中湯

瘡瘍膿潰元氣虛寒或過服剋伐以致胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏瀉神思昏

憤此寒變內陷緩則不治

附子

炮去皮臍

羌活

各肆錢

乾薑

炒參錢

炙甘草

貳錢

丁香

益智仁

沉香

木香

茴香

陳皮

各壹錢

右薑水煎

附子理中湯

瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉者

白茯苓

白芍藥

人參

附子

各參錢

白朮

肆錢



右水煎服

薑附湯

瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參

附子

炮去皮臍各伍錢

乾薑

炮

白朮

各貳錢伍分

右水煎服

參附湯

失血過多或膿痰大泄或汗下太甚以致真陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等證

急服此以救元氣緩則不救

人參

附子

炮去皮臍各伍錢

右加薑五片水煎服如不應倍之

獨參湯

一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫補氣陽生陰

長之理也

人參貳兩加棗十枚薑十片水煎徐徐服

人參理中湯

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或腦膈痞塞飲食不入

人參

白朮

乾薑

炙甘草

各等分

右薑棗水煎

竹葉黃耆湯

癰疽氣血虛胃火盛而發渴

淡竹葉

黃耆

麥門冬

當歸

川芎

炙甘草

黃芩

白芍藥

人參

半夏

石膏

煨各柒分伍厘

生地黄

貳錢

右水煎服

竹葉石膏湯

癰疽胃火盛腫痛作渴



淡竹葉

石膏

煨

桔梗

木通

薄荷

炙甘草

各壹兩

右水煎服

加減八味丸

命門火衰不能生上以致脾土虛寒而患流注鶴膝等證不能消潰收斂或飲

食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺者宜服此經云益火之源以消陰翳即此之謂也

熟地黃

生者自製捌兩

白茯苓

牡丹皮

澤瀉

各叁兩

肉桂

五味子

各壹兩

山茱萸肉

山藥

各肆兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服百丸鹽湯送下

一方五味子貳兩山茱萸牡丹皮山藥各壹兩茯苓

澤瀉桂心各伍錢生地貳兩酒蒸搗膏

參朮膏

中氣虛弱諸藥不應或用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此以補中氣諸證自退

人參

白朮

各以捌兩為則多用更好

右咬咀以新汲水五碗慢火煎熬至參碗以細布

絞取其汁又用水參碗入粗再煎減半亦以布絞

其汁又用水貳碗入粗再煎減半仍以布絞其汁

三汁併為一處慢火熬稠入白蜜叁兩再熬數沸

以白湯調半杯一日三四次

連翹散

治瘡疽疼痛煩渴大便澹泄虛熱不寧

連翹

山梔

甘草

防風

各捌分

右水煎服



托裏健中湯

元氣素弱或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等證

半夏

乾薑

炮各壹錢

甘草

炙伍分

黃耆

壹錢伍分

肉桂

叁分

人參

白朮

白茯苓

各貳錢

右薑棗水煎

托裏益黃湯

脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉

人參

白朮

陳皮

白茯苓

半夏

各壹錢

乾薑

炮

丁香

甘草

炙各伍分

右薑棗水煎

托裏養榮湯

治瘰癧流注及一切不足之證不作膿或不潰或潰後發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡卧不安寧盜汗不止

人參

黃耆

當歸

酒洗

白芍藥

川芎

白朮

各壹錢

五味子

麥門冬

生地黃

酒洗蒸半日

甘草

各伍分

右薑水煎服

托裏越鞠湯

因六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參

白朮

各貳錢

陳皮

半夏

各壹錢

山梔

川芎

香附

蒼朮

各柒分

甘草

炙伍分

右薑棗水煎服

回毒金銀花湯

治諸瘡痛而色變黑紫者

金銀花

連梗貳兩

黃耆

肆兩

甘草

炙壹兩



右用酒參碗重湯煮參個時辰去粗服

忍冬丸 大治渴證

忍冬草 根莖花葉俱可用

右一味用酒洗淨入瓶浸以好酒以糠火煨壹宿取出晒乾入甘草少許研為細末就以所浸酒打麵糊丸如梧子大每用五十九至百丸酒送下

黃耆六一湯 治渴補虛常服可免終身瘡疽之患

黃耆 陸兩一半生用一半鹽水潤蒸三次焙乾 粉草 壹兩一半生用一半炙黃

右為極細末晨午各用肆錢或湯或酒調下

五味子湯 治腎水竭口燥舌乾

五味子 生黃耆 麥門冬 人參 甘草 炙各壹錢

右水煎晝貳服夜伍服俱溫飲

犀角膏 治癰疽咽喉口舌生瘡

生犀角 琥珀 各壹錢 辰砂 茯神 人參

酸棗仁 各貳錢 冰片 貳分伍釐另研

右各另研為細末和勻煉蜜調成膏磁瓶收貯每服壹彈子大麥門冬煎湯化開壹日五服潰後不宜用

補止痛神効方

○止痛神功散 治諸毒已破後太疼不止日夜坐臥不安者



大黃

錢參

沒藥

錢伍

甘草節

錢肆

真菜豆粉

乳香

蘇木

錢各貳

右為極細末每服壹錢白湯送下

瘡疽鍼烙論第二十一

癰疽既成宜托裏以速其膿輕按即痛者膿之淺也重按方痛者膿之深也按之不起者膿未成也按之復起者膿已成也若膿已成而不潰非用鍼刺毒氣無從而解膿瘀無從而泄蘊毒內攻蝕其有膜腐爛愈深他日瘡口難斂虛弱之人即有不起者矣宜如前法熟視可否而治之

其瘡頭不拘多少必有一個最大者即是膿竅用熟鐵大鍼於麻油燈火上燒令熱透量瘡深淺及所生之處虛實插入壹寸或至貳寸若未有膿暫以紙撚絛入候次日取出膿色黃白即愈赤黑防出鮮血若在虛處及筋脉骨節處不得亂行鍼烙鍼烙之入猶須稍斜恐透膜也固忌稍遲亦忌太早若膿未成而誤鍼氣血既泄及至綿延必生他變膿深鍼淺內膿不出外血反洩瘡淺鍼深內膿雖出好肉受傷此用鍼之難者也

岐伯曰以小治小者功小以大治大者多害故其已



成膿血者其惟砭石鉞鋒之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉耳劉涓子曰鉞頭刺入隨鉞出膿者順也不隨鉞出膿以白紙撚絛入鉞孔引出膿毒當時腫退叁分如腫不退是一逆也腫不退疼不減但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖再用鉞破出其膿亦無所濟急宜用引膿托裏湯藥以助其勢力可也若膿不出痛不除又須以鉞橫直裂之則毒血夾膿而出如非椒眼蜂窩之類只宜直刺亦須酌量深淺毋傷內膜曾氏曰癰疽膿熟塗以替鉞丸瘡口

自開若鉞烙得其宜則生失其宜則死然瘡有皮厚者有非替鉞丸力量可破必須用鉞儻患者元氣虛弱宜先補托而後鉞則膿出而諸證自退

至於瘡之熾盛者其中肉色黑黯乃是死肉宜用托裏散壯其脾胃外用烏金膏塗於黯處則赤處漸高黯處漸低六七日之間則赤黯之界自有裂紋如刀畫之狀黯肉斯潰而用利刀剪割務使不傷好肉不見鮮血爲妙若雖裂紋而膿未流利及膿水雖出而仍痛者是未通透於內也以鉞於紋中引之若內潰而腫痛不減者乃有毒筋間隔以致



膿不能通尤宜用鍼引之若元氣素虛又誤服尅伐之劑而致患處不痛其肉將死急宜溫補脾胃以後純用補劑庶收斂爲易昧者乃妄用刀鍼則氣血愈傷肌肉愈難長矣

若至煩痛而脉洪滑粗散者是真氣虛而邪氣實證爲難治脉微濇遲緩者邪氣虛而真氣將復證爲易治至於疽已成膿則宜用烙以其皮厚也或有以烙法問於丹溪答曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴旣前無內托之藥先致力於內後又不烙以開竅脉膿何由出且膿本肉腐所成皆挾

毒熱之氣若久留肉腠間毒氣浸淫好肉亦化爲膿腐此所以烙法有功於潰腐也使根淺而皮薄者何必假此以賣弄由此觀之皮薄之瘡用替鍼丸亦可也皮稍厚而毒稍深者則宜用鍼皮厚毒深者非烙則不可瘍醫可不知所分別哉其鍼烙之日固不比鍼灸家之逐年屍神逐日人神之忌而靈樞經所載身形應九野天忌日之說是又不當忽之也故併錄之於左

開膿忌日

左足應立春忌戊寅己丑日



左脇應春分忌乙卯日

左手應立夏忌戊辰巳巳日

膺喉首頭應夏至忌丙午日

右手應立秋忌戊申巳未日

右脇應秋分忌辛酉日

右足應立冬忌戊戌巳亥日

腰尻下竅應冬至忌壬子日

六腑膈下五臟應中州大禁太乙所在之日及諸

戊巳

替鍼丸 治膿成不潰

白丁香

硃砂另研

沒藥另研

乳香各壹錢

糯米

肆拾粒用礦灰如拳大貯碗內量入井水待熱氣將息以米排灰中良久米如水晶狀取出候用

右各另為末和勻飯丸如菜豆大以壹粒粘瘡頭

上外以小膏粘住使不動移其膿自潰

青金錠子

治諸般惡瘡膿出不快及多年疔瘻愈而復發

麝香

龍腦各貳分伍厘

銅青

硃砂

粉霜

白丁香

輕粉各五分

右為細末麵糊為丸捻作錠子緝入瘡口中膿出快

透膿散

治諸般瘡毒無頭者

已出蛾大蠶繭壹個燒灰酒調服若多用壹個則



多生壹孔也

一粒丹 治癰疽無頭

牛旁子生吞壹粒則生壹頭加粒增頭不可不知

獨腳虎 治癰疽無頭

蜀葵花子用新汲水生吞壹粒須臾即破如要頭多服叁肆粒

隔皮取膿法

驢蹄 各壹 喬麥麵 兩 白鹽 伍錢 草烏 肆錢 去皮

右為末水調作餅慢火炙微黃色出火毒又研細醋調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫

自退

腫瘍第二十二

癰疽初發壅腫未見膿者其名有三曰癰曰癰曰疽  
癰初起浮赤無根脚微軟皮薄先出清水後破膿  
如不破用替鍼丸拔毒膏

初生紅腫突起無頭根濶三四寸發熱惡寒抽掣疼  
痛四五日後按之微軟其名曰癰然毒氣浮淺春  
夏防風敗毒散加葱薑秋冬去薑葱加木香半身  
已上加括婁身半已下加射干早治即散或用追  
毒丸返魂丹復元通氣散微利之膿成用替鍼丸



咬開

一等皮色不變但略微腫肌肉內痛夜尤甚發熱惡寒此熱毒極深其名為疽能傷筋脉骨髓初生一白粒如粟米覺痒亦痛其痛應心此疽之始兆也

大法腫高焮痛脉浮者邪在表也宜內托復煎散腫硬痛深脉沉者邪在內也宜下之如黃連內疎湯仙方活命飲苦參丸 外無焮腫內便調和邪在經絡也宜調和榮衛如托裏榮衛湯白芷升麻之類 焮痛燥煩咽乾作渴宜降火黃連解毒湯焮痛發熱拘急頭痛邪在表也宜散之如荆防

敗毒散人參敗毒散 煩躁飲冷焮痛脉數邪在

上也宜清之如清涼飲金銀花散 惡寒而不潰

者氣實兼寒邪也宜宣補之如十宣散 焮痛發

熱汗多便秘譫語者結陽證也宜下之黃連內

疎湯破棺丹 不作膿但熱不潰者虛也宜補中

益氣湯八物湯十全大補湯 腫痛不作膿者邪

氣凝結也宜解之仙方活命飲 不作膿或不潰

或不斂陽氣虛也宜補之如托裏消毒散

潔古云瘡瘍屬火須分內外若脉沉實當先疎其內以絕其原其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有



在內外之中者邪氣過於經絡故發癰疽經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰疽此因失托裏及失疎通又失和榮衛也

治瘡之法大要先明托裏疎通和榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也

何謂疎其內以絕其原其脉沉實發熱煩躁外無焮腫赤痛邪氣深入於內也故先疎通臟腑以絕其原宜內疎黃連湯

何謂托裏其脉浮數焮腫形證外顯恐邪氣極而內

攻故先托裏宜內托復煎散

何謂內外之中外無焮赤內臟宣通知其在經當和

榮衛故曰治其中宜當歸黃耆湯用此三法未必無變亦使邪氣峻減而易痊也 托裏用溫劑疎

通用涼劑設或反投助邪不淺輕則危重則殆

內疎黃連湯 主嘔啞心逆發熱脉沉實腫硬而皮色不變係毒深病遠急疎臟腑此藥主之

黃連 白芍藥 當歸 檳榔 木香

黃芩 梔子 荷薄 桔梗 甘草 各

兩 連翹 貳

右檳榔木香為末同餘藥每用壹兩水煎先用壹



貳服後次服每加大黃壹錢加至貳錢以利為度  
 此方主有熱證而大便秘澀者如無熱證止用復  
 煎散時時呷之如此則內外皆通榮衛調和經絡  
 自不致於遏絕也

內托復煎湯

主腫焮於外根盤不深形證在表脉浮而痛在皮內恐邪氣太盛至於侵內此

方主

地骨皮

黃耆

防風

各貳兩

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

甘草

當歸

防已

各壹兩

肉桂

伍錢

右剉片先將蒼朮壹觔用水五升煎至叁升去蒼

朮入前藥拾貳味再煎至叁肆盞絞取純汁作叁  
 肆服終日服之又煎蒼朮楂為湯去楂依前取拾  
 貳味再煎服此除溼毒散鬱熱令胃氣和平如未  
 已再作半料又煎服之又便秘煩熱間服黃連湯  
 如熱退微利卻服復煎散半料此使榮衛俱行邪  
 氣不能內侵也

當歸黃耆湯

主瘡瘍臟腑已行而大痛

當歸

黃耆

地黃

川芎

地骨皮

芍藥

各伍分

右水煎

發熱加黃芩

煩躁加梔子

嘔是溼



氣浸胃加白朮 右三方乃易水師弟治瘡之三  
法今特列於方首而以古今方臚列於後審脉治  
證存乎知者

發表 左脉洪緩而弦是客邪在血脉之上皮膚之  
間宜表發其汗通其榮衛邪氣自退托裏榮衛湯  
主之 丹溪云癰疽因積毒在臟腑非一朝夕之  
故今發於外宜以標本為治法當助氣壯胃使根  
本堅固而以行經活血為佐 參以經絡時令使  
毒氣外發此即仲景傷寒解表用麻黃桂枝之意  
治之早可以內消此內托之意也

托裏榮衛湯

見初起湯藥

加味當歸飲

諸瘡瘡瘍皆屬心火火鬱則發之

當歸

生地

升麻

各伍錢

防風

貳錢伍分

白芍藥

柴胡

川芎

羌活

黃耆

各貳錢

紅花

蘇木

甘草

各壹錢

何首烏

荆穗

各貳錢

右分參服薑水煎取汗使血氣通和

人參敗毒散

見初起湯藥

蟾酥丸

治疔瘡一切惡瘡

乳香

沒藥

各貳錢

輕粉

蟾酥

各壹錢

麝香

伍分

川烏

蓮花蕊

硃砂

各壹錢伍分



右為末酒糊為丸如菀豆大每服壹九重者貳丸

奪命丹 主諸般大腫毒

蟾酥

輕粉

各伍分

硃砂

叁錢

白礬

枯

寒水石

銅綠

各壹錢

蝸牛

叁拾壹個另研

乳香

沒藥

麝香

各壹錢

右為末將蝸牛另碾一處丸之如丸不就用好酒

糊為丸如菀豆大每用壹丸生葱叁肆根嚼爛吐

於手心包藥在內熱酒和葱送下行六七里汗為

効重者再服壹貳丸 右二方皆少陰經藥然皆

劫劑也用者當取輕重陰陽之分而擇取之

內托羗活湯

黃栢

酒洗

羗活

各貳錢

防風

藁本

連翹

當歸

各壹錢

肉桂

叁分

甘草

炙

蒼朮

陳皮

各伍分

分

黃耆

壹錢伍分

右作壹服酒貳大盞煎至壹盞空心熱服以被蓋

使藥行

托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡不得發越熱伏榮中聚成赤腫痛不可忍惡寒發熱肢

體相引 疼痛

麻黃

去根

白芷

當歸

各貳錢

防風

葛根

各叁錢

升麻

肆錢

白芍藥

甘草

各一錢伍分

人參

蒼朮

各壹錢

右剉每服壹兩水煎先煮麻黃沸去其沫入餘藥



煎壹盞温服臥煖處重衣蓋之得汗乃散

內托著柴酒煎湯

主治厥陰肝經在左足大腿近膝股內

黃耆貳錢

柴胡稍壹錢

羌活伍分

連翹壹錢貳分

肉桂叁分

天花粉壹錢

當歸尾捌分

生地壹分

黃栢叁分

右以水酒各半煎空心熱服壹服取効

內托黃耆酒煎湯

足少陽經及陽明在左腿外側

當歸尾

黃耆各貳錢

黃栢

甘草

連翹各伍分

肉桂

各壹錢

升麻柒分

柴胡

黍粘子

各壹錢伍分

右酒壹盞半煎至壹盞空心温服少頃以早饑壓之不令大熱上攻上中二焦

右方皆主發表不過壹貳服可以取効如癰疽發

太陽經必用防風羌活湯陽明經必用白芷升麻

少陽經必用柴胡太陰經必用芍藥升麻少陰經

必用獨活厥陰經必用青皮柴胡皆以肉桂佐之

身半以下者必用酒水多熟煎之空心服使藥下

行身半以上者酒水少帶生煎之臥時服使藥上

行脉細小無力於本經藥中加辛熱劑脉洪大有

力於本經藥中加苦寒劑隨證加減此治瘍之大

法也

辛涼解表

脉有力而數者春夏宜之其藥即前內托著柴酒煎二方擇用

湯料選粹

重傷

紫雲石間

卷二

四十七



當歸拈痛湯

治一切風溼熱毒浸淫瘡瘍下注溼毒  
或痛脉沉實數  
竝宜辛涼解表

升麻 本 人參 苦參 羌活 葛根

蒼朮 各貳錢 甘草 黃芩 茵陳 防風

當歸身 知母 猪苓 澤瀉 白朮 壹錢

每壹兩水煎服 按此方為足太陽陽明三

陰藥東垣立方以治腳氣溼熱之劑而世人治已

上諸瘡多效故竝收入於此

辛平解表藥 治不寒不熱半陰半陽者宜之

升麻和氣飲 主治瘡癰疥癬痒痛此方燥脾勝溼和

蒼朮 乾葛 桔梗 升麻 各壹兩 當歸

茯苓 白芷 各貳兩 乾薑 枳殼 各伍錢 甘草

陳皮 各壹兩 伍錢 白芍藥 柒錢 伍分

每服壹兩水煎服

辛溫解表 脉無力而緩秋冬宜之

十宣散 夏月潰瘍禁之

人參 當歸 黃耆 各貳兩 川芎 防風

厚朴 桔梗 肉桂 甘草 白芷 各壹兩

右為末每服貳錢加至陸錢熱酒調下日進數服

不用酒者以木香煎湯下此藥宜早服



辛熱解表

脉無力而遲瘡瘍犯陰證大寒時宜之

托毒散

治癰疽初起高腫發痛喘息氣粗

當歸

麻黃

甘草

肉桂

川芎

羌活

石膏

龍膽草

附子

壹枚去皮尖

每服貳錢薑參片煎

攻藥

即內托所謂攻其內以絕其原也

內疎黃連湯

見前

托裏散

一切惡瘡癰疽便毒始發脉洪弦實而數瘡甚者三服見効

大黃

牡蠣

瓜蒌根

皂角刺

朴硝

連翹

各叁錢

赤芍藥

黃芩

各貳錢

金銀花

當歸

各壹兩

右每服伍錢水酒煎

瀉心湯

主瘡瘍發燥煩渴脉實洪數者

大黃

肆兩

黃連

山梔

漏蘆

澤蘭

連翹

黃芩

蘇木

各貳兩

犀角

壹兩

右每服叁錢水煎

清涼飲

治瘡瘍煩燥飲冷熈痛脉實大便秘小便澀

大黃

赤芍藥

當歸

甘草

各叁錢

右水煎服

內消升麻湯

治血氣壯實患癰疔大小便不通

升麻

大黃

各貳兩

黃芩

壹兩伍錢

枳實

當歸



芍藥

甘草 各壹兩

右作數服水煎

宣毒散

主一切毒瘡如脉沉實便秘者毒在臟也此方神効壹貳服即絕其原如臟腑調和脉不實者審之

大黃

壹兩 白芷 伍錢

水跌為丸酒下

發表攻裏五香連翹飲

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆咽塞發寒熱

沉香

木香

麝香

丁香

各壹錢

乳香

貳錢

連翹

射干

升麻

桑寄生

獨活

甘草

各壹錢

大黃

壹兩伍錢

木通

貳錢

右水煎溫服丹溪云不問癰疽瘡癤虛熱冷熱先

與此藥不拘老幼虛實人多服最妙

半表半裏中和湯

主治半陰半陽似瀆非瀆似腫非腫此皆元氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮

各貳錢

黃耆

當歸

白朮

白芷

各壹錢伍分

川芎

茯苓

皂角刺

乳香

沒藥

金銀花

甘草節

右水酒各半煎

內托散

即護心散一日至三四日連進十數服

真桑豆粉

壹兩

明乳香

伍錢於石器內炒手指攪使乾急傾出扇冷研極細

右拌勻初服貳錢至參錢煎甘草湯調下時時細



呷令藥嘗在胸中若毒氣攻心時覺嘔逆者大宜以其性涼有降火之理也

獨聖散 經云氣宿澁於經絡與血俱瀆而不行壅結為癰疽此藥主治血滯氣凝

香附子 去毛淨以薑汁浸一宿焙乾細研之

右無時以白湯服貳錢從怒氣所積尤宜丹溪云獨聖散治氣鬱血滯而諸瘡愈後時時服之尤妙此藥宜於體實氣鬱之人

忍冬酒 初發宜服

忍冬藤 生用壹把以葉研爛入酒少許調勻敷四圍中畱一孔訖又以葉五兩搗碎聽用

甘草 生壹兩

右二味入砂礮內用水叁碗煮至壹碗用好酒壹大碗煎數沸去渣分叁次服一日夜進盡勢重者再煎壹劑此藥補血和氣虛怯畏寒人忌之

槐花酒

以槐花米炒黃用肆五兩入酒不拘多少煎之去渣熱服

蠟礬丸 此方能防毒氣攻內服至壹兩以上無不取効

白礬 壹兩 黃蠟 伍錢

右和丸如梧子大始服拾丸漸至伍拾丸温酒下瘡愈後亦宜服一方用明礬飛過研細以鷄子貳



個取清調礬末如糊以無灰陳酒調服之未成膿者即消已成膿者從大便中去神効

托裏消毒散 治胃氣虛弱不能潰散屬氣虛者四君子為主血虛者四物為主氣血兩虛者十全大補為主並忌寒涼尅削之劑

人參 白朮 黃耆 當歸 川芎

白芍藥 茯苓 各壹錢 金銀花 白芷 各柒分 甘草

連翹 各伍分

右水煎服

清熱消毒散 治陽證腫痛發熱

黃連 山梔 連翹 當歸 各壹錢 川芎

芍藥 生地 各壹錢伍分 金銀花 貳錢 甘草 壹錢

右水煎服

黃連消毒散 治癰疽焮腫發痛或麻木

黃連 羌活 黃芩 黃柏 生地

知母 獨活 防風 連翹 藁本

防已 當歸尾 桔梗 各五分 黃耆 蘇木

陳皮 澤瀉 人參 甘草 各叁分

右水煎服

連翹飲 治排膿止痛

連翹 防風 各叁錢 薺苳 白芍藥 黃芩



玄參

人參

白茯苓

桔梗

前胡

甘草

各壹錢

黃耆

肆錢

桑白皮

壹錢伍分

右水煎服

內消散

治腫瘍結硬疼痛

人參

衛麥

白斂

升麻

當歸

黃芩

防風

黃耆

沉香

甘草

赤小豆

右為細末每服貳錢酒下

化毒內托散

治百凡惡毒疔瘡此方化毒為惡水從小便中出神効

乳香

知母

白芨

貝母

半夏

穿山甲

金銀花

皂角刺

天花粉

各壹錢

右用無灰酒壹碗煎半碗去渣溫服將渣搗爛用

秋老芙蓉葉細末壹兩以蜜水潤塗患處一宿即

消

仙方活命飲

止痛內消見初起湯藥條

秘方拔毒散

消一切癰疽瘡毒其功不可盡述

瓜蒞子

捌錢

甘草

伍分

忍冬藤

貳錢

皂角刺

柒分

貝母

柒分

連翹

壹錢

乳香

沒藥

當歸

穿山甲

木鱉子

各壹錢

大黃

生熟各壹錢伍分

右用酒水各半煎此方止痛化膿之妙藥若有膿



或已潰者去大黃又有膿雖潰脉洪大數或沉實喜冷者火邪尚在須酌用之

歸耆湯 治癰疽無頭但腫痛

黃耆 當歸 瓜蒌 甘草 皂角刺

金銀花 各壹錢

右水壹盞半煎成人乳香加酒再煎服或加貝母

天花粉穿山甲三味尤妙

榮衛返魂丹 增 一名通順散

何首烏 當歸 木通 赤芍藥 白芷

土烏藥 懷香 枳殼 甘草

右等分水酒湯隨用相半亦可○按五香連翹等

湯調氣內補十宣散和血此方扶元氣滌邪穢兼

補氣血之劑

回陽玉龍膏 增 治元陽虛弱血脈不流風邪澁滯

於經絡如腫毒不起及脚氣冷痛婦人血風諸陰證均用熱酒調塗

草烏頭 參兩炒去風毒 南星 壹兩去風 軍薑 貳兩熱 肉桂 五錢熱血

白芷 壹兩散滯 赤芍藥 散滯

右二方有加減用法見治證瘡瘍條

潰瘍第二十三 淋洗 生肌 去死肉

凡癰疽膿熟自潰或鍼烙而潰毒氣已泄即稟賦素



厚者不免氣血亦虧宜早服排膿內補散貼神異膏日以猪蹄湯淋洗

凡膿出反痛者氣血虛也大劑參耆歸地芎藥朮苓補之外敷乳香定痛散若毒氣未盡慎勿以生肌收斂之藥敷必致復腫

肉赤不斂血虛有熱也肉黯不斂陽氣虛寒也肉死不潰脾氣虛弱也肉白不斂陽氣太虛膿多不斂氣血俱虛他如不思飲食胃氣虛也飲食不化脾氣虛也膿少色赤血虛也亦有爲穢氣所觸者乳香沒藥之類和解之風寒所逼者防風桂枝之類

溫散之審證施藥存乎知者

若瘡肉已腐膿水淋瀝瘡痛不已必有筋膈住致內膿不得出必用鍼挑引出之若畏痛延挨多致不起

若因寒邪凝滯氣血不能榮衛而致肉白膿少瘡口不合者用艾湯每日淋洗最要避風或以松香煙徐熏之

丹溪云諸經之瘡唯少陽厥陰之分氣多血少肌肉難長理宜預防若用驅毒利藥伐其陰血禍不旋踵



諸瘡毒膿出盡卽用聖効散鯽魚羊糞灰摻之此時正趨吉避凶之會若風入卽爲破傷風溼入卽爲破傷溼二者害人最急倉卒不知其因最難認治如因邪氣風溼攻搏致於瘡再合生膿宜仍用通和湯藥次第取効不可造次失手

凡癰疽旣破膿出肉腐宜貼拔毒膏內補氣血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯去桂氣滯加香附如毒熱大退氣血未復多加參耆歸地如膿雖潰而根腳赤暈反開展不收或大痛此毒氣未退也用金銀白芷散十宣散去厚朴桂倍參耆

當歸加忍冬藤連翹犀角瓜萸根消毒之藥夏秋加酒芩黃連黃栢羌活大都以補氣血藥爲主解毒藥佐之不宜補者忍冬丸

破後不潰瘡口堅硬者風也用蜈蚣散敷之蠹肉不腐者雄黃輕粉敷之

凡潰後肉不長氣血不護易着風寒時用耆艾湯熏洗生肌長肉藥敷之乳香膏長肉等膏貼之或肉雖長而色紫者餘毒也地榆活血散敷之追毒膏貼之卽紅活而口自收或瘡口大痒以細茶葱鹽煎湯熱洗凡瘡口易收而皮嫩薄者未可便去



拔毒乳香等膏藥

凡癰疽發背不論大小有疼無疼或熱或不熱但腫赤焮熱卽用緊急收赤腫藥圍定不令引開中間卽用聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥皂角刺之類破後急須托裏肉補參耆之類其有氣血陰陽虛實之證悉照薛立齋加減托裏消毒

方施治

脈緊而數者膿未成但數者膿已成手按大熱者已有膿不熱者無膿牢硬者未膿軟韌者已膿手足指稍及乳上宜令膿熟大潰方可開之

癰皮薄腫高疽皮厚腫堅初發竝宜灼艾唯癰成膿則宜鍼疽成膿則宜烙 凡癰疽潰熟膿透其勢盈欲溢宜用替鍼丸咬破不半日自潰

癰疽已成膿不得出痛不可忍者用巴豆壹枚去膜不去心油鹽豉拾肆粒含去皮令軟同研爛入真麝香少許捏作餅子或用少稀糊捏成餅子如鼠糞大用紙撚子送壹粒入瘡口少時大痛膿卽出烙法者因膿潰汪洋奈皮肉粗厚難穴不開一竅以出之使腐肉挾毒熱之氣久畱肉腠間將好肉亦化爲膿腐此烙法有益於潰瘍也若根淺皮薄者



何必假此以賣弄手段乎

凡烙法已見於前論大約用大熟鐵用麻油火燒紅正頭上烙之初入肉少橫插入不得正中恐傷膜如已破潰者竝不用

表發

潰後發熱頭痛脉緊而浮虛而兼表邪也補中湯加川芎白芷二劑再加服托裏藥

裏攻

潰瘡將斂遍身作痒脉浮用消風散再加服托裏藥凡癰疽煩燥發熱作渴脉數而實係熱毒內攻不論冬春俱用內疎黃連湯再用金銀花散加連翹山梔等藥

清熱用黃連解毒湯或托裏消毒散便秘脉實者清涼飲

凡膿潰之後脉澁遲緩者易愈以其有胃氣也脉細而沉時直者裏虛欲變證也洪滑粗散者難療以正氣虛邪氣實也若潰後發熱作渴膿出愈多皆為惡候亦真氣虛而邪氣實也

凡氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐易潰膿稠易斂怯弱之人多不起發不腐難潰膿清不斂若不審醫一槩尅伐虛虛之禍所不能免

證寒

托裏溫中湯

王寒變內陷膿清皮膚涼嘔食氣短見前惡候條



加味十全湯 治癰疽潰後補氣血進飲食潰瘍要劑

黃耆 地黃 當歸 川芎 人參

茯苓 芍藥 白朮 陳皮 各壹兩 粉草

五味子 桂心 各伍錢 烏藥 柒錢

每服壹兩生薑大棗煎服丹溪云此湯須看年之

老壯資稟壯弱症之緩急時令寒熱加減用之

補中益氣湯 治瘍潰之後元氣怯弱四脈怠倦口乾  
煩熱脈洪大無力或頭痛惡寒自汗氣

喘身熱  
心煩

黃耆 壹錢伍分 升麻 柴胡 陳皮 各叁分 甘草

人參 當歸 白朮 各壹錢

右薑參片棗參枚水煎服

人參養榮湯 證略如上多服不變他證

人參 陳皮 黃耆 桂心 當歸

白朮 甘草 各壹錢 遠志 去心伍分 白芍藥 壹錢伍分

熟地 五味子 茯苓 各捌分

右薑棗同煎

四君子湯 主脾胃虛弱痲痛不散潰不能斂以此補  
脾胃若食不化作嘔大便不實脾氣虛寒  
吐血者尤宜以氣能攝血也凡氣血俱虛之  
證於此方中加當歸若用四物沉陰之藥脾  
胃復傷諸證蜂起若命門火衰脾  
土虛寒者加服八味丸以補土母

人參 茯苓 白朮 甘草 各壹錢



右薑棗水煎服

六君子湯

主壯榮氣即前方加陳皮半夏

四物湯

主血虛發熱或潰後內熱煩躁者宜服此若脾虛不能生血者宜四君子湯加當歸酒炒白朮以補脾所謂血生於脾也

熟地

當歸

各參錢

川芎

壹錢伍分

白芍藥

貳錢

八珍湯

主調和榮衛滋養血氣順理陰陽退虛熱進飲食此氣血兩虛之總劑即四物四君子合加薑棗

十全大補湯

主潰瘍發熱惡寒作痛膿出不止或清或自汗盜汗潰不能斂氣血不足之人結瘡未成膿者本方加枳殼香附連翹服之自消即四物四君子加肉桂黃耆加薑棗煎

黃耆人參湯

治瘡瘍潰後食少不臥及有虛熱

黃耆

貳錢

人參

白朮

麥門冬

蒼朮

陳皮

升麻

五味子

當歸身

甘草

各壹錢

錢

黃柏

肆分

炒麩

伍分

托裏當歸湯

治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或脯熱

當歸

黃耆

人參

熟地

川芎

白芍藥

各壹錢

柴胡

甘草

各伍分

麥冬湯

治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬

黃耆

五味子

白茯苓

人參

官桂

當歸

遠志

芎藭

各壹兩

甘草

炙柒錢伍分



右每服伍錢加生薑大棗水煎服

托裏散

東垣隨證加減法氣血虛頭痛加五味子恍惚不寧加茯神人參虛而發熱加地黃瓜

萋根潮熱加柴胡地骨皮渴不止加知母赤小豆虛煩加枸杞天門冬自利加

厚朴膿多加當歸川芎痛甚加芍藥乳香肌肉遲生加白斂肉桂有風邪加羌

活細辛心悸加丹砂口目稠動加羌活細辛嘔逆加丁香藿香痰多加半夏陳

皮原方見初起湯藥條

痛作

膿潰後反作痛此虛證也宜補之托裏散倍參耆歸

地脉數虛作痛屬虛火宜滋陰托裏散加生地脉

數實而痛邪氣實也宜泄之脉實便秘而痛邪在

內也宜下之清涼飲脉澇而痛氣血虛寒也溫補

之定痛托裏散

人參內托散

治瘡瘍潰膿作痛

人參

黃耆

當歸

川芎

厚朴

防風

桔梗

白芷

官桂

紫草

木香

甘草

右各等分入糯米壹撮煎服

未潰之瘍宜憎寒壯熱若膿已潰之後如傷寒家表

證之得汗汗去而反大熱則為傷寒壞證矣凡患

癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴

縱有發熱燥擾之症不可他治宜益榮生津之劑



如脉浮惡寒發熱陽氣虛也宜補中益氣湯 脉

濇而熱血虛也宜補血四物人參養榮湯 午前

熱主於補氣 午後熱主於補血 脉浮數而發

熱邪在表宜散 脉沉數發熱邪在裏宜下

托裏消毒散

發熱加減見本方下方見前癰疽用藥條

發熱惡熱大渴不止或煩燥肌熱脉洪大按之無力

或鼻乾目痛係血虛發燥當歸補血湯主之

黃耆散

治癰潰後補虛去客熱

黃耆

石膏

各貳兩

知母

麥門冬

桂心

熟地

人參

白芍藥

白茯苓

升麻

各壹兩

甘草

伍錢

右每服用肆錢水煎日三四服

當歸補血湯

黃耆

壹兩

當歸

叁錢酒拌

右藥作壹服煎

加味逍遙散

治肝脾血虛內熱發熱遍身搔痒寒熱肢體作痛盜汗怔忡食少不眠

甘草

當歸

白芍藥

茯苓

白朮

柴胡

各壹錢

桂皮

山梔

各柒分

右水煎服

梔子黃芩湯

治潰瘍後因傷飲食發熱不住用以退熱



漏蘆  
連翹  
山梔  
黃芩  
防風

石韋 如無以桑皮代  
甘草  
生犀角  
人參

苦參  
茯苓 去皮各貳錢  
黃耆 壹兩

右每服肆錢水煎

惡寒

瘍瘡潰後惡寒用四君子加桂或炮薑倍黃耆大料

四劑若膿水尚多投八珍湯加桂數劑瘡口不合

用十全大補湯加炮附子伍分數劑仲景云脉虛

則血虛血虛乃生寒陽氣不足也瘡瘍脉虛宜托

裏養血

忌禁

潰後忌五香散蓋香燥藥多走泄經云熱傷脾熱傷

洗薰

雄黃解毒湯

治一切癰疽潰爛毒熱盛者先用此藥

雄黃 壹兩

白礬 肆兩

寒水石 煨壹兩

右用滾水肆伍碗乘熱入前藥壹兩洗之以太乙

膏或神異膏貼之

豬蹄湯

凡瘡有口即須用之洗濯

白芷

黃芩

當歸

羌活

露蜂房

赤芍藥

甘草

各等分

右以瘡之大小為料之輕重先將猪前蹄兩隻重



壹觔用白水參升煮爛將汁分作貳次澄去面油  
每次用藥壹兩投於汁中再用文武火煎數沸以  
舊帛蘸汁溫溫徐措瘡上死肉惡血隨手洗下  
以帛挹乾避風及人口氣洗方唯此最效用露蜂  
房者以毒驅毒也

神異膏 治癰疽壞爛及諸瘡毒

雄黃 伍錢 滑石 倍

右爲末先將瘡洗淨後摻此藥外用綿帛覆蓋  
破爛洗後俱用此貼之

肌生 夫肌肉乃皮胃之所主潰後收斂遲速全因血氣盛

衰但當大補脾胃不宜泛敷生肌之藥若毒膿未  
盡速用生肌反增潰爛壯盛人不免復潰怯弱氣  
虛人至於潰爛不斂可不慎歟

薛氏云諸瘡不生肌而色赤血熱也四物加山梔連  
翹白色者氣虛也四君子加當歸黃耆補熱內熱  
陰血虛也四物加參朮膿水清稀氣血虛也十全  
大補湯食少體倦脾虛也補中益氣湯煩熱作渴  
飲食倍常胃火也竹葉 黃耆 湯不應竹葉石膏湯熱  
渴小便數腎虛也加減八味丸料煎服 若敗肉  
已去新肉微赤四沿白膜此胃中生氣但用四君



子湯培補之

瘡瘍皆由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源為人身之本丹溪云治瘡瘍當助胃壯氣使根本堅固誠哉是言也

精要生肌散

蜜陀僧 白礬灰 乾臙脂 定粉各伍錢 滑石

寒水石 龍骨 烏賊魚骨各壹兩

右為極細末摻瘡口上

平肌散 治諸瘡久不斂 見後摻藥方

立應散

治諸瘡血出不止并久不生肌

花藥石 龍骨 黃丹 沒藥各伍錢

黃藥子柒錢伍分 寒水石煨壹兩伍錢

右為末一切金刀傷以藥敷之絹帛紮定止痛不作膿乾貼生肌定痛一方有白芨乳香輕粉

生肌散 治瘡口不合

木香貳錢 黃丹 枯礬各伍錢 輕粉貳錢

右為末用猪膽汁拌勻晒乾再研極細摻患處

薛氏云此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生患者往往用龍骨血竭之



類速求生肌不知餘毒未盡反增潰爛肌何由生  
然又當酌量氣血虛實於托裏諸湯藥求之至如  
背瘡杖瘡湯火瘡用神効當歸膏去腐生新止痛  
大効

口收

斂瘡口用木香檳榔散用之決不疼痛更以蠟油塗  
瘡上生肌斂肉甚速然只可用於膏梁熱瘡貧寒  
地人反忌之

木香檳榔散

木香

檳榔

黃連

各等分

右爲末新汲水調攤紙上貼之乾則更易

寒瘡斂口

當歸身

壹錢

青皮

貳分

木香

壹分

黃連

伍分

右爲末蠟油調塗瘡口

聖効散

治收斂瘡口

見摻藥方

桃紅散

治斂口定痛辟風邪

見後摻藥方

一方用大鯽魚一枚去腸胃入羯羊糞令滿烘極焦  
黑爲末摻瘡口卽收累用有効須候膿盡肌生時  
用之

精要論瘡瘍不斂肉白膿少爲瘡口冷滯乃氣病血  
枯不潮於瘡所致宜以艾葉入瓦器內燒熏仍以



艾煎濃湯於避風處淋洗及將艾葉清湯患處一日一次洗訖再燒松香煙緩緩熏之再用神異膏貼之勿近穢惡之氣及經行婦人 按熏洗之法亦可用但不求其本而歸過於冷滯恐亦未確大抵潰瘍宜洗若非補接之藥以實其內又恐淋洗祇一時之快而病體疲憊非此可還元氣不用參耆何時奏効

黃丹散

治斂瘡口

黃丹

煨去溼氣

枯礬

龍骨

寒水石

乳香

木香

黃連

黃芩

檳榔

膩粉

各參錢

腦子

少許

右為末隨瘡乾溼搽之乾用艾湯洗溼搽之然用藥不宜太早須膿血去盡臨好用此藥

凡癰疽肉色已黯不得去用巴豆去殼炒黑研成膏塗之死肉即腐若初起用以點患處其毒自消腐肉塗之立潰

但凡惡瘡頑毒元氣無虧久不收斂者內有毒根也以紙撚蘸此膏絛入瘡中無不神効

有等元氣虛弱或因藥力剋伐而致胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰者內服大補之劑外塗



此膏至四五日內赤黯之界定自開裂死肉漸漸潰脫仍用純陽之藥補接元氣則收斂亦易杖瘡肉死併可治之

一方死肉不去用白丁香霜梅爲末瘡深者紐之淺則乾摻於膏藥之上

一方於膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉只去惡肉又有加乳香沒藥亦妙

### 調攝第二十四

將護

禁忌

瘡疽生發治之宜早因循怠慢必致大潰若輕謁庸醫危殆立至尤宜戒之而病人尤戒恚怒悲憂信

任口腹恣意作勞唯宜恬靜寡思節慾耐煩斯爲不藥之醫也

慎風寒謹口腹適起居毋專坐專立多言多動藥餌

精潔湯粥適時斯爲攝生之大要

調補諸方參查潰瘍證治

東垣曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃榮氣而作今反補之自棄何異此言口腹不可不謹也

仲景治傷寒有汗吐下三法東垣治瘡瘍有疎通托裏和榮衛三法用之貴乎得宜耳 假如瘡瘍瘻

硬木悶煩熱秘便脉沉而實其邪在內當疎其內而下之 焮腫作痛而便利調和脉見浮洪邪在



表當先托裏而汗之元戎云榮衛充滿遏抑而爲  
癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅滯而爲  
癰者當補之以接虛怯之氣然而東垣云瘡瘍雖  
面赤伏熱不得攻裏裏虛則下利仲景云瘡家雖  
身疼體痛不可發汗汗之則發痙苟不詳審妄爲  
攻汗以致氣血虧損壯者多致難斂老者甚致不  
救

東垣云不得攻裏爲陽氣怫鬱邪氣在經理宜發表  
也故曰火鬱則發之雖大便數日不至亦只攻表  
發散陽氣少加潤燥以通之如見風脉風證只用

發表風藥大便自通若只乾燥尤貴潤之切不可  
下

丹溪云大黃治癰疽之要藥以其宣熱拔毒也然又  
言患癰疽者忌泄瀉者何盖用大黃因病體實而  
大腑秘結有積熱沉痼之積者發也止可破結導  
滯推移轉動而已豈可視爲常劑排日不廢之藥  
乎若瘡瘍始作腫在肌肉若非大滿大實之證自  
當用仲景發表之法借五香湯爲例散之於外何  
必峻下以奪其裏乎

大便秘實有因氣不降者寒熱有因氣血不和者貴



在詳審不宜便以爲實而攻下以爲外感而表散也

輕病戒用重劑如敗毒內托之劑當答病熱輕重邪蓄表裏而消息之苟率爾投治實實虛虛七惡蜂起矣

患瘡瘍治法膏粱與貧寒之人不同膏粱人禁戒厚味恐引宿火之熱故用芩梔苦參犀角佐參耆可解食毒之熱若寒月與虛人又不可執一也

排膿十宣散瀉氣燥血止可施於些小腫瘍耳虛人及暑月忌用詳見本方下

內托不可施於老弱蓋內托散一日至三日之內進數十劑防毒氣攻衝臟腑名護心散此專治服丹石之藥致病者非必用之劑若老年病深入恐不勝也

癰疽不熱不痛切忌用涼藥敷貼恐偏毒入內

內經云五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰又云形傷痛氣傷癰此則臟腑不和瘡發於外也明矣一切塗貼寒涼豈能調和臟腑宣通氣血耶設使瘡痛熱渴脉滑數而有力屬純陽證宜內用濟陰丹外用抑陽散則熱毒自解瘀滯自散若似瘡



不癰似痛不痛似潰不潰似赤不赤脉洪數而無力屬半陽半陰宜內用冲和湯外用陰陽散則氣血自和瘀滯自消若微癰微痛或色黯不痛或堅硬不潰脉洪大按之微細軟弱屬純陰證宜內服回陽湯外敷抑陰散則脾胃自健陽氣自回丹溪先生云敷貼小劑以應酬輕小熱證自可若不辨陰陽證之分妄敷寒涼之劑迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻肌肉反死况氣得寒不運血得寒不散瘀肉得寒不潰新肉得寒不生治者審之加味十全湯 見潰瘍條

人參內補散

王將養潰瘍

白芍藥

黃芩

白茯苓

粉草

各伍分

桂心

人參

各叁分

麥門冬

當歸

熟地

木香

各陸分

右黃芩瀉肺麥冬補中木香行氣加薑棗煎

八珍湯

見潰瘍條

托裏黃耆湯

治諸瘡潰後膿多內虛

白茯苓

人參

遠志

麥門冬

黃耆

當歸

各捌分

官桂

貳分

五味子

叁分

右水煎服

內托散

治癰疽潰後內虛氣虛初發亦可用



當歸

川芎

黃耆

厚朴

桔梗

防風

甘草

人參

白芷

白芍藥

各伍分

官桂參分

右為末溫酒服

黃耆茯苓湯

治潰後托裏除虛熱

五味子

官桂貳分

黃耆

白茯苓

麥門冬

川芎

各捌分

右薑棗煎日進三服

東垣加減托裏散

見潰瘍條

人參黃耆湯

治潰後不思飲食不臥發熱

黃耆

壹錢

黃栢

炒肆分

當歸身

升麻

各伍分

人參

麥門冬

陳皮

白朮

蒼朮

各伍分

右水煎服

托裏當歸湯

見潰瘍條

治潰後氣血俱虛瘡口不斂或晡熱內熱寒熱往來婦人經候不調小便數大便不實

人參內托散

見潰瘍條

治瘡瘍潰後作痛

聖愈湯

主脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不眠

熟地

酒蒸

生地

酒拌壹錢伍分

川芎

貳錢

人參

伍分

當歸

酒拌壹錢伍分

黃耆

鹽水炒壹錢

右水煎服

止痛當歸湯

治疽毒已潰疼痛



當歸 黃耆 人參 官桂 白芍藥

甘草 炙 生地 各捌分 右水煎每日進二服

和氣飲 治癰疽潰後氣虛脾臟滑泄四肢逆冷

良薑 炒 肉桂 乾薑 炮各伍錢 陳粟米 半升 甘草 炙

青皮 各壹兩 蒼朮 肆兩米醋炒黃

右為末每服壹錢入炒茴香末伍分相和溫酒下

一方用血餘蜂房蛇蛻各燒存性每味壹錢酒調下

治瘡口久不合

一方以柳皮白斂煎湯飲之治斂瘡口

瘍科選粹卷之二 終

湯和選米



