

景元刻本濟生拔粹

醫聖元戎藥目錄 濟生拔粹卷第十

金匱黃耆建中湯

大建中湯

易簡杏子湯嗽

大補十全散勞

易簡胃風湯瀉血

千里漿

荔芝湯

蜜酒

易老門冬飲子

治勞復麥門冬湯

海藏五飲湯

海藏大已寒丸

生地黄黃連湯血風

增損理中丸結育

易簡參蘇飲發熱

萬病紫苑丸

理中湯加減例

平胃散加減例

八物定志丸補

潔古天麻丸中風

大効牡丹皮散血虛

海藏大五補丸

清心丸 治熱

調胃白朮澤瀉散 水鼓

海藏當歸丸 三陰痛

喉閉不救方

二焦熱 三焦寒

蒸病五蒸湯

三陽頭痛

掌中金 乾血氣

黃耆膏子 同上

易簡芎歸湯 血多

千金種子法

醫聖元戎藥目錄 畢

火府丹 瀉丁

四物六合諸方

苦練丸 疝

拯濟換骨丹

發班諸藥附

活人敗毒散 溫疫

發黃茵陳蒿加減例

龍腦雞蘇丸 上焦熱

地骨皮枳殼散 骨蒸

三奇六神麴法

搐鼻香 子宮冷帶下

海藏編類醫壘元戎

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大法春宜吐夏宜汗秋宜下凡用發汗及吐下湯劑皆中病即

止

若少陽病脉微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯

若少陰病脉細沉數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯

若少陽病不可發汗宜小柴胡湯

若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已上

六證並宜小柴胡湯

若下利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類

若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯

虛宜附子湯

有熱人可黃耆人參建中湯

若少陰膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸

若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯

若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸

四逆湯

虛者宜附子湯

有熱人黃耆人參建中湯

本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脉浮而緊法當身疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發

汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯

若脉濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而

惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯

若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯

若浮而大浮爲氣實大爲血虛小便當赤而難胞中當虛今

反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯

若反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜

與小柴胡湯

若脉浮大應發汗宜柴胡桂枝湯

若脉浮而緊者不可下而反下之爲大逆宜桂枝麻黃各半湯

若脉數不可下宜柴胡桂枝湯

若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯

若脉濡弱浮數不可下宜小柴胡湯

若濡弱微瀼微則陽氣不足中風汗出而反躁煩瀼則無血

厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯

若結胸脉浮大不可下下之即死宜小陷胸湯

若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯

若太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不能不可下之下之爲逆宜桂枝麻黃湯

若太陽病有外證未解不可下下之爲逆宜桂枝麻黃湯

若病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之

因作痞 結胸則有陷胸湯九三 痞則有瀉心湯五

若太陽與陽明合病喘而膏滿不可下宜麻黃杏子甘草石

膏湯

若太陽與少陽合病心下硬頸項強而弦者不可下宜小柴

胡湯

若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯

太陰腹痛吐食自利腹痛下之必胃下結硬

厥陰病渴氣上衝心中熱飢不欲食食則吐虺下之則利
不止

若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹不能吐始得之
手足寒脈弦遲者此有中寒實不可下也宜溫中湯生姜
汁半夏湯

若無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法
若傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此亡血也
宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加入參湯

若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻
也謂下也宜用小柴胡湯

若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯
若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯

若色黃者小便不利也宜五苓散

若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生姜瀉心湯

半夏瀉心湯

攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結膏痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急虛勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

太陽證

桂枝一十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載于后

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生姜

切各參兩

芍藥

六兩

炙甘草

式兩

膠飴

乙升

大棗

十式个擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消

溫服一升日三若嘔者加生姜 若腹滿者去棗加茯苓兩

若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疝痛并四肢拘急痠痛甚者加遠志

半兩

若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加

附子七錢半

若心氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許

若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋臑脹臍下虛滿脊中

煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉
酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復
加黃耆一兩半

若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸
吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸
一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人丁壯

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥逆少腹挛急或腹滿弦急

不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾
精自出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能久立此補中益
氣 右以咀水五盞煎至二盞去滓分三服

桂心叁分 芍藥

黃耆各貳

甘草乙分

生姜伍分

當歸

人參各乙

附子半分

半夏貳分

棗貳枚

依上煎

易簡杏子湯 治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰

飲停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

減半

乾姜

減半

甘草

炙

官桂

減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚姜五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用米殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其効尤驗嘔逆惡心者不可用此

若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾姜五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆朮茯苓

芍地桂歸川

三五錢秤用

生薑棗水煎

婦人虛弱用

名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨瘠拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃

各等分

右為鹿末每服二大錢水一盞生薑二片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物即黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黄黃耆甘草等分足為十味名十補湯

若虛勞嗽加五味子

若有痰加半夏

若發熱加柴胡

若有汗加牡蠣

若虛寒加附子

若寒甚加乾姜皆依本方等分

若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡二兩服之

若氣短加人參

若小便不利加茯苓

若脉弦濇加川芎

若惡寒加官桂

若脉濇加當歸

若腹痛加白芍藥

若胃熱濕盛加白朮

潔古云防風為上使 黃連為中使 地榆為下使

若血瘀色紫者陳血也加熟地黃

若血鮮色紅者新血也加生地黃

若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮

若脉洪實痛甚者加酒浸大黃

千里鏡一名水葫蘆

木瓜 紫蘇葉 桂各半兩 烏梅肉 赤茯苓各壹兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大噉化一九嚙津

又方百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 甘草

麥門冬

又文等分為細末煉蜜丸嚙化

荔枝湯

烏梅肉

甘草

各三兩

煎

乙兩

白芷

半兩

白檀

叁分

右細末湯點

蜜酒

好蜜

三斤

水一椀

細麴

乙升

好乾酵

叁兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證

膏根湯二三方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦在

易老門冬飲子

治老弱虛人大渴

人參

枸杞

白茯苓

甘草

各叁分

五味子

半兩

麥門冬

去心伍分

右為鹿末生姜水煎

治勞復起死人麥門冬湯氣欲絕者用之有效

麥門冬乙甘草乙粳米半合

右門冬去心為細末水一盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半入藥五錢匕棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓大溫服不能服者綿滴口中 後人治小兒不能灌注者宜用此綿滴法

此方不用石膏以其二焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏若加人參天妙

海藏五飲湯

一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈

上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮

茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓

前胡 桂心 芍藥 甘草

右等分剉每兩分四服水一盞生姜十片同煎至七分取清
溫飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根葛花縮
砂仁

海藏已寒丸此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩膏中發躁而渴者或數日大便秘小便澀
赤服此丸上不躁大小便自利

肉桂 茯苓各伍 良姜 烏頭炮各附子

乾姜炮 芍藥 茴香炒各乙兩

右等分為細末糊為丸桐子大溫酒下空腹食前五七十九
八九十九亦得酒醋為糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循
衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖動不寧錯語失神脉弦

浮而虛內燥熱之極也氣虛鼻乾而不潤上下通燥此為難
治宜**生地黄黃連湯**主之

川芎

生地黄

當歸各七

赤芍藥

梔子

黃芩

黃連各三

防風乙兩

右為麈尾每服三錢水二盞煎至七分取清飲無時徐徐與
之若脉實者加大黃下之

大承氣湯氣藥也自外而之內者用之

生地黄黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病循衣

撮空證同 自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血

而之氣氣而復之血地黄黃連湯主之也一者俱不大便

增損理中丸

王朝奉云大小陷胷湯丸不愈者宜與之

人參

白朮

枳實

牡蠣各三兩

甘草

炒參三兩

乾姜炮壹兩半枳實炒貳拾肆个

黃芩去枯壹兩

右為細末煉蜜為丸如彈大湯一盞煎服不歇復與之不過

五六宵中豁然矣用藥神速未嘗見也

渴者加括蕞根 汗者加牡礪

少陽證大小柴胡湯加減在前附又柴胡五方在後保命集內

易簡參蘇飲治感冒發熱頭痛或因痰飲凝積發以為熱並宜

服之若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服微汗即愈大

治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食小兒室女尤宜服之

前胡 人參 紫蘇 乾葛 半夏

茯苓加參分 枳殼 陳皮 甘草 桔梗

木香各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎至六分去

元册
滓不以時候素有痰飲者俟熱退以二陳湯或六君子湯間
服若男子婦人虛勞發熱或吐衄下血過多致虛熱者用此
藥二兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱者不離柴胡前胡

若大渴者不離知母石膏五味子麥門冬

若大便泄者不離桂附白朮乾姜

若大便燥結者不離大黃黃芩

若經水適來適去斷者不離小柴胡

若安胎者不離人參阿膠白朮黃芩

若發汗者不離葱豉生姜麻黃旋覆

若頭痛者不離前胡石膏梔子

若傷暑頭痛者不離柴胡石膏甘草

若滿悶者不離枳實陳皮

若胎氣不安者不離黃芩麥門冬人參

若癰發黑者不離黃芩梔子升麻

萬病紫苑丸

療臍腹久患痲痺如椀大及諸黃病每地氣起時上氣衝心
遶臍絞痛一切虫咬十種水病十種蠱病反胃吐食嘔逆惡
心飲食不消天行時病婦人多年月露不通或腹如懷孕多
血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與
鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之
皆効

紫苑去苗土

吳茱萸湯洗柴

次焙乾

菖蒲

柴胡

去須

厚朴

姜製壹兩

桔梗

去芦

茯苓

去皮

皂莢

去皮子

桂枝

乾姜

炮

黃連

去須

蜀椒

去目及閉口

微炒去汗

巴豆

去皮膜

人參

去芦各半兩

川烏

炮去皮半

兩加參分

加羌活

獨活

防風

等分

右為細末入巴豆勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸加至五
七丸生姜湯送下食後臨卧初有孕者不宜服且引于后

痔漏腸風酒下

赤白痢訶子湯下

膿血痢米飲湯下

隋傷血悶四肢不收酒下

蛔虫咬心攢榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下

打撲傷損酒下

中毒葦灰甘草湯下

一切風升麻湯下

寸白虫攢榔湯下

霍乱乾姜湯下

咳嗽杏仁湯下

腰腎痛豆淋湯下

陰毒傷寒温酒下

吐逆生姜湯下

食飲氣塊麩湯下

時氣井花水下

脾風陳皮湯下

頭痛水下

心痛温酒下

大小便不通灯草湯下

因物所傷以本物湯下

吐水藜湯下

氣病乾姜湯下

小兒天風吊搐防風湯下防已亦可

小兒疳痢葱白湯下

小兒乳食傷白湯下

月信不通煎紅花酒下

婦人腹痛川芎湯下

懷孕半年後胎漏艾湯下

有子氣衝心酒下

產暈痛温酒下

血氣痛當歸酒下

產後心腹脹滿豆淋湯下

難產益志湯下

產後血痢當歸湯下

赤白帶下酒煎艾湯下

解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下

子死菜子湯下

又治小兒驚癇大人癩狂一切風及無孕婦人身上頑麻

狀如虫行四肢俱腫呻吟等疾

太陰證

陷首三方瀉心五方在後保命集內

理中湯加減例

若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即進

此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑干片同煎
若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯

若澹泄不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲水穀不化
者再加縮砂仁一兩共成八味

若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方中去白朮加熟附
名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後
膏痞欲絕心鬲高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩
名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括萎根一兩

若霍亂後轉筋者理中湯內加火燉石膏一兩

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮

恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓一兩

若渴欲飲水者添加木半兩

若苦寒者添加乾姜半兩

若腹滿者去白朮加附子一兩

若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄加川芎一兩

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方

若中附子毒者亦用本方或止用甘草乾姜等分煎服仍以

烏豆煎湯解之

平胃散 加減例

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半夏

若加乾姜為厚朴湯

若溫疫時氣一毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三

十粒煎三二服微汗出愈

若五勞七傷脚手心熱煩躁不安百節酸疼加柴胡

若痰嗽瘧疾加姜製半夏 若本藏氣痛加茴香

若水氣腫滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加黃耆

若酒傷加丁香 若飲冷傷食加高良姜

若滑脫泄瀉加肉苳蔻 若風痰四肢沉困加荆芥

若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛雍拘急加地骨皮

若腿膝濕痺加兔絲子 若白痢加吳茱萸

若赤痢加黃連 若頭風加藁本

若轉筋霍亂加楠木皮

若七邪六極耳鳴夢洩盜汗四肢沉重腿膝酸痿婦人宮藏

久冷月脉不調者加桂 若胃寒嘔吐多加生姜

一法加茯苓丁香各三兩共成六味

若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各二兩生姜煎服

若與五苓散相半為對金飲子

若與六一散相合為黃白散

若與錢氏異功散相合為調胃散

若欲進食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯

若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐利

若加藿香半夏為不換金正氣散

若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣痛者加苦練茴香

少陰證 真武四逆等湯在活人姜 附方七道在保命集內

八物定志丸 補益心神安定魂魄治痰去膏中邪熱理肺腎

人參壹兩半 菖蒲 遠志去心 茯苓去心 茯苓壹兩

朱砂壹分 白朮

麥門冬去心各半兩 牛黃貳分另細研

右為細末煉蜜丸桐子大米飲湯下二十九無時

若髓竭不足加 生地黃 當歸

若肺氣不足加 天門冬 麥門冬 五味子

若心氣不足加 上黨參 茯神 菖蒲

若脾氣不足加 白朮 白芍藥 益智

若肝氣不足加 天麻 川芎

若腎氣不足加 熟地黃 遠志 牡丹皮

若膽氣不足加 細辛 酸棗仁 地榆

若神昏不足加 朱砂 預知子 茯神

仲景八味丸

熟地黃補腎水真血 肉桂補腎水真火

牡丹皮補神忘不足

附子能行諸經而不止兼益火

白茯苓能伐腎邪濕滯

澤瀉去胸中留垢及遺溺

山茱萸治真滑不禁

乾山藥能治皮毛中燥酸澀

右八味皆君主之藥 若不依易老加減服之終不得効若

加五味子為腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰翳

壯水之主以制陽光錢氏地黄丸減桂附

潔古老人**天麻丸**治證見活法機要

天麻

陸兩酒浸三
日焙乾秤

除風痺

牛膝

陸兩酒浸三
日焙乾秤

強筋

玄參

陸兩

樞機管領

萆薢

陸兩另為末

壯骨

杜仲

茶兩對
炒去絲

使筋骨相著

當歸

壹拾兩
全用

和養血

羌活

壹拾兩或
拾伍兩

去骨節間風

生地黄

壹斤

益真血

附子

壹兩炮

行諸經不止

獨活伍兩 去腎間風邪

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五七十九丸病大至百丸
空心食前溫酒白湯下服藥忌壅塞失於通利故服半月稍
寬壅塞微以七宣丸輕踈之使藥再為用也

大効牡丹皮散

治血藏虛風及頭目不利可思飲食手足煩熱肢節拘急疼
痛背膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪悸或時旋運

牡丹皮 川芎 枳殼麩炒各壹兩 陳皮半兩炙

玄胡 甘草 羌活 半夏湯洗各半兩

木香叁分 呵子肉叁分 芍藥叁分 二稜半兩炮 乾姜半兩炮

當歸壹兩半 白朮叁分炒 桂半兩

右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服益血海

退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮
熱證至妙

海藏大五補丸 同三才丸例

天門冬 麥門冬 菖蒲 茯神 人參

益智 枸杞 地骨皮 遠志 熟地黃

右為末煉蜜為丸如桐子大空心酒下二十九 本方數服
以七宣丸泄之

清心丸 治熱

黃蘗 貳兩 生 天門冬 壹兩 黃連 半兩 龍腦 壹分 麥門冬 壹兩 去心

右為細末煉蜜丸桐子大每服十九臨卧門冬酒下薄荷湯
亦得

火府丹 丙丁俱瀉

黃芩 壹

黃連 壹

生地黃 貳

木通 叁

叁

右為細末煉蜜丸桐子大每服二三十丸溫水下臨卧

海藏調胃白朮澤瀉散 治痰病化為水氣傳變水鼓不能食

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔

右為末一法加白朮本藥各半治腹臍上腫如神

若心下痞著加枳實 若下盛者加牽牛

厥陰證

當歸四逆并加吳茱萸等湯見陰證略例

四物湯 益榮衛滋氣血月水不調臍腹痛等證並見局方

熟地黃

補血如臍下痛非此不能除乃通於腎經之藥也

川芎

治風地肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

和血如血刺痛非此不能除刺如刀刺乃通腎經之藥也

右為鹿末水煎

加減于后

若加地骨皮牡丹皮治婦人骨蒸

若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片又加葱

白黃者

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若婦人嘗服春倍川芎

脉弦頭痛

夏倍芍藥

脉洪

飧泄

秋倍地黃

脉沉瀉血虛

冬倍當歸

脉沉寒

而不食

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃

芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黃

若冬則

桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物湯加茂桂謂之腹痛六合
若風眩運加秦芫羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合

若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾姜附子謂之寒

六合

若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

若產後虛勞日久而脉浮疾宜柴胡四物湯

川芎 熟地黄 當歸 芍藥各二兩半加柴胡八分

人參 黃芩 甘草 半夏各一分同煎

若婦人筋骨肢節痛及頭痛脉弦增寒如瘡宜治風六合四

物湯四兩防風 羌活各壹兩

若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合

四物湯 四兩

木香

檳榔

各壹兩

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合

小腹痛者同

四物湯 四兩

玄胡

苦練

各乙兩碎炒焦

若氣充經脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合

四物湯 四兩

芍藥

壹兩

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澁也宜八物湯

四物湯 四兩

玄胡

苦練

碎炒

檳榔

木香

各壹兩

若經水過多別無餘證宜黃芩六合

四物湯 四兩

黃芩

白朮

各壹兩

若經水澀少宜四物內加葵花煎

又加紅花

血見愁

若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合

四物湯

四兩

厚朴

姜製乙兩

枳實

麩炒半兩

大熱本

煎

大熱本

煎

煎

若經水暴下加黃芩一兩

若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其

寒熱後以四物湯和之

若婦人血積者四物湯內加

廣茂

京三稜

桂

乾漆

各壹兩

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物湯

四物湯

四兩

黃耆

甘草

茯苓

白朮

各壹兩

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱

太陽經病宜表虛六合湯

四物湯 四兩

桂枝

地骨皮

各柒分

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯 四兩

麻黃

細辛

各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛宜

風濕六合湯太陽標病也

四物湯 四兩

防風

蒼朮

製各柒分

若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發癰如錦文宜升麻六合湯

四物湯 四兩

升麻

連翹

各柒分

若妊娠傷寒膏脇瀉痛而脉弦少陽也宜柴胡六合湯

四物湯 四兩

柴胡

黃芩

各柒分

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本病

也急下之宜大黃六合湯

四物湯 四兩

大黃 伍分

桃仁

拾个去皮尖麩炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯 四兩

人參

五味子

各伍分

若婦人妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴

六合湯

四物湯 四兩

厚朴

枳實

麩炒各伍分

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯 四兩

梔子

黃芩

各伍分

若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏合湯

四物湯 四兩

石膏

知母

各伍分

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯 四兩

茯苓

澤瀉

各伍分

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯 四兩 琥珀 茯苓 各伍分

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯 四兩 阿膠 艾 各伍分一方加甘草同上

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病

也宜附子六合湯

四物湯 四兩 附子 炮去皮 桂 各伍分

若赤白帶下宜香桂六合湯

四物湯 四兩 桂 香附子 各伍分

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

四物湯 生地黄 酒浸大黃

若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

若治燥結四物與調胃承氣湯各半為玉燭散

若流濕潤燥宜四物理中各半湯

若保胎氣令人有子四物與縮砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加 栝萎 麥門冬

若腹中刺痛惡物不下加當歸 芍藥

若血崩者加 生地黃 蒲黃 黃芩

若頭昏項強者加 柴胡 黃芩

若因熱生風者加 川芎 柴胡 防風

若藏秘澀者加 大黃 桃仁

若滑瀉者加 官桂 附子

若嘔者加 白朮 人參 生姜

若大渴者加 知母

石膏

若發寒熱者加乾生薑

牡丹皮

芍藥

柴胡

若水停心下微吐逆者加豬苓

茯苓

防已

若虛寒似傷寒者加

人參

柴胡

防風

若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之其効如神

若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物

一連湯

四物湯

內生用 地黃

黃連

胡黃連

真者

溫飲清

四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆

可作各半湯此易老用藥大略也

若虛煩不得睡加

竹葉

人參

若婦人血虛心腹疔痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

若諸痛有濕者四物與白朮相半加

天麻 茯苓 川山甲 酒煎

若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

四物各半 羌活 防風各參 草龍膽 防己各貳 水煎

海藏云婦人妊娠畜血

婦人妊娠或畜血 抵當桃仁勿妄施 要教子母俱無損

大黃四服對服之

海藏當歸丸 治三陰受邪心膈少三腹疴痛氣風等證

四物湯各半 防風 獨活 全蝎各半 續斷壹兩

苦練 玄胡各柒 木香 丁香各貳 茴香壹兩

右為細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五十九大効

苦練丸 治奔豚小腹痛神効

川苦練 茴香 附子壹兩炮 去皮臍

右三味酒二升煮盡為度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡半兩全竭十八个炒丁香十八个別為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十九空心痛甚加當歸煎酒下

治喉閉遂巡不救方

皂莢

去皮子生半兩為細末筋頭點少許在痛處更以醋糊調藥末厚塗項上須臾便破血出立差

逐濟搜骨丹

海云自汗者不宜服

歌曰

槐皮芎朮並

仙人防首蔓

十味各停勻

苦味香減半

龍麝即少許

朱砂作衣纏

麻黃膏煎丸

大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澀或痛入骨髓或痺襲皮膚或中急風涎潮不言精神昏塞行步艱難筋脉拘急左攤右瘓一切風疾並皆治之

槐莢子生 人參 桑白皮 蒼朮 川芎

何首烏 蔓荊子 威靈仙 防風各貳兩 五味子

香附子 苦參各壹兩 香白芷貳兩 麝香貳分另研

右一十四味為細末入香令勻又用麻黃十斤去根節用大
河水三石二斗熬至六斗濾過去滓再熬至二升半入銀石
器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩作十九朱
砂為衣每服一九先搗碎酒一盞自晨浸至晚食後臨卧撿
勻服之神清無睡是藥之驗須更隔五日服之如中風無汗
宜服若躄虛自汗服之是重亡津液也若風盛人於密室溫
卧取汗

二焦熱用藥大例 方在元戎

上焦

清神散

連翹防風湯

涼膈散

龍腦飲子

犀角地黃湯

中焦

小承氣湯

調胃承氣湯

洗心散

四順清涼飲

桃仁承氣湯

下焦

大承氣湯

五苓散

立効散

八正散

石韋散

四物湯

抵當湯丸

柴胡飲子

清涼飲子

三黃丸

氣分熱

白虎湯

血分熱

桃仁承氣湯

通治大熱

黃連解毒湯

二焦寒用藥大例

方在衛生

上焦

桂附丸

鐵刷湯

胡椒理中丸

中焦

二氣丹

附子理中丸

大建中湯

下焦

還少丹

八味丸

天真丹

桂枝加附子湯

氣分寒

桂枝加芍藥
人參新加湯

血分寒

巴戟丸

通治大寒

神珠丹

大已寒丸

四逆湯

右此內有寒熱之大略也若外有寒熱者當求別法

發癍諸藥

葛根橘皮湯癍在肌

治冬溫始發肌中癍爛欬而心悶但嘔清汁宜此

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草

右等分判每用五錢水煎

陽毒亦密湯 癰在面

治傷寒一二月或吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤
狂言見鬼下痢脉浮大數咽喉痛下膿血五可治七日難愈

升麻

五分

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

各五分
分半

右咬咀水二升煎取半飲一盞刻許再服温覆手足汗出解
否則重作

陽毒玄參升麻湯 癰在身

治汗下吐後毒不散表虛裏實熱發於外甚則煩燥讖語兼
治喉痺腫痛

玄參

升麻

甘草

各等分

右細剉水煎

陽毒梔子湯 少陽陽明合病

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

升麻

梔子仁

黃芩

芍藥

石膏

知母

甘草

杏仁

柴胡

右麤末五錢 生姜五片 豉百粒 水煎

消毒犀角飲子 治癰

牛蒡子

荊芥

防風

甘草

水煎服

陰毒升麻鱉甲湯 陰癰

大建中湯尤妙

升麻

當歸

甘草

蜀椒

鱉甲

雄黃

研

右為末 每服五錢 水煎

蒸病 治者宜隨各經虛實 內外淺深 用藥加減可也

古今錄驗五蒸湯

甘草壹兩 茯苓叁兩 人參叁兩 竹葉叁把 乾地黄

葛根各叁兩 知母 黄芩各壹兩 石膏五兩 粳米叁合

右十味咬咀以水九升煮取二升半分為三服亦可以先煮

小麥水乃煮藥 忌海藻菘菜蕪美大醋

實熱 黄芩 黄連 黄蘗 大黃

虛熱

氣也 烏梅 秦艽 柴胡

血也 青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

肺鼻乾 烏梅 天門冬 麥門冬 紫苑

皮舌白唾血 石膏 桑白皮

膚昏昧嗜睡 牡丹皮

氣 遍身氣熱喘促鼻乾
人參 黃芩 梔子

大腸 鼻右孔乾痛
大黃 芒硝

脉 唾白浪語脉終
溢脉緩急不調
生地黃 當歸

心 舌乾
黃連 生地黃

血 髮焦
地黃 當歸 桂心 童子小便

小腸 下唇焦
赤茯苓 木通 生地黃

脾 唇焦
芍藥 木朮 苦參

肉 食无味而嘔
煩躁不安
芍藥

胃 舌下痛
石膏 粳米 大黃 芒硝 葛根

肝 眼黑
川芎 當歸 前胡

筋 甲焦
川芎 當歸

膽 眼白失色
柴胡 括萎

三焦 乍熱乍寒

石膏

竹葉

腎 兩耳焦

生地黄

石膏

知母

寒水石

腦 頭眩悶熱

地黄

防風

羌活

髓 髓沸骨中熱

天門冬

當歸

地黄

骨 齒黑腰痛足逆交并食藏

鱉甲

地骨皮

牡丹皮 當歸

生地黄

肉 支細跌腫府藏俱熱

石膏

黃蘗

胞 小便赤黃

澤瀉

茯苓

生地黄

沉香 滑石

膀胱 左耳焦

澤瀉

茯苓

滑石

凡此諸蒸皆熱病後食肉油膩房酒犯之而成又蒸不除變
成疔病即死矣

葛根散 治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽乾乾痛

葛根劉七黃芩

大黃醋炒甘草

山梔子仁

朴硝各半兩

右為末水煎

活人敗毒散

大陽證

治傷風溫疫風溫風眩風痰卑溫

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

人參

茯苓

桔梗

甘草

川芎分兩隨病加減

右細末生姜水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜瘴煙之地溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚氣此藥不可闕一方少

加薄荷同煎

三陽頭痛

羌活

防風

荊芥

升麻

葛根

白芷

柴胡

川芎

芍藥

細辛

葱白連鬚 分兩旋加

若陰證頭痛只用溫中藥足矣乃理中姜附之類也

發黃兼諸雜證治法在前難知內附陰黃治法在後陰證略列內附

小便不利煩躁而渴 加茯苓猪苓滑石當歸官桂

煩躁喘嘔不渴 加陳皮白朮半夏生姜茯苓

四肢遍身冷者 加附子 甘草

因陳蒿湯加減

肢軀逆冷腰上自汗 加附子 乾姜 甘草

身冷汗不止者 加附子 乾姜

前藥未已脉尚伏 加吳茱萸附子乾姜木通當歸

韓氏立名為茵陳茯苓湯 茵陳橘皮湯 小茵陳湯

茵陳四逆湯 茵陳附子湯 茵陳茱萸湯 大抵只是

仲景陰證藥內加茵陳也用者要當識之

掌中金丸 治婦人乾血氣

川山甲炮 甘草 苦丁香 川椒 苦葶藶

白附子 草烏頭 豬牙皂角各二分 巴豆一分全用研

右通為細末生葱絞汁和丸彈子大每用一九新綿包定內

陰中一日即白二日即赤三日即血神効

龍腦鷄蘇丸 上焦熱

除煩解勞去肺熱欬衄心熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱
泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒壅熱消渴下而血滯五
淋血崩等疾

薄荷 一斤 麥門冬去心 甘草半 生乾地黄六兩各為末

黃耆 新蒲黃 阿膠炒 黃連 人參

木通

略二柴胡二兩到同木通沸湯半

柴胡升浸一日夜絞取汁

右為細末好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後將全藥末和丸如豌豆大每服二十九丸白湯下

虛勞煩熱梔子湯下

肺熱黃芩湯下

心熱悸動恍惚人參湯下

唾咯吐血四血去心麥門冬湯下

脾胃熱赤芍藥生甘草湯下

肝熱防風湯下

腎熱黃柏湯下

已上並食後臨卧

治五淋及婦人漏下車前子湯下

痰嗽者生姜湯下

莖中痛者蒲黃滑石末一錢調下

氣逆者橘皮湯下

室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人參湯下

黃耆骨子煎丸

治證同前

人參

白朮

各壹兩半

柴胡

黃芩

各壹兩

白芷

知母

各半兩

甘草

半兩

鱉甲

一個半

手大者酥炙

炙

右為細末黃耆膏子九桐子大每服三五十九百沸湯空

心右用黃耆半斤鹿末水二斗熬一斗去滓再熬令不住攪

成膏至半斤入白蜜一兩錫一兩再熬令蜜錫熟得膏十兩

放冷丸藥

地骨皮

治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

鱉甲

醋炙黃

右等分為末水一盞桃柳枝頭各七个姜二片烏梅一个每

服去滓臨卧

易簡言歸湯

治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後去血

崩中去血拔牙去血金瘡去血不止者牽頭欲倒悉能治之

芎藭

當歸各等分

右咬咀水煎熱服

若產後眩暈加芍藥

產後腹疼不可忍加官桂

酒小便合煎

姙娠子死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安

若虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉兩生姜十片水煎

若臨月服之則縮胎易產

若室女婦人心腹疔痛經脈不調水煎服

若姙娠胎氣不安產後諸疾酒煎服

若難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水與小便合

煎服

若難產用百草霜香白芷等分童子小便好醋各一合沸湯

浸服甚者再服已分免矣

若腸風藏毒每服加槐花末半錢三日取下血塊即愈

若吐血亦宜服此 若血氣上喘下腫空心煎艾湯調下

若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生姜自然

汁煎服 若產後頭痛加荊芥

若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢沸湯

點服 若有白帶者加芍藥半兩乾姜等分米飲調下

三奇六神麵法

白虎白麵一百斤 青龍青蒿自然汁三升

勾陳蒼耳汁二升 騰蛇野蓼子汁四升

玄武杏仁四升 去皮尖看麩乾濕用水

朱雀赤小豆三升 煮軟去湯研

右一處拌勻稍乾為妙用大盆罨一宿于伏內上寅日踏極

實為度甲寅戊寅庚寅乃三奇也卧鋪如麴法

千金種子法進火之時當至陰節間而止不尔則過一宮矣予

問故師曰深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺而不在深也非月經後皆不可用事惟經後一日男二日女三日男此之外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕皆不可交接所生男女痴聾瘖瘂四躄不完矣

播鼻香治子宮冷赤白帶下

牡礪煨

紫稍花

韶腦

母丁香

黃狗頭骨煨

蛇床子

破故布

挂心各等分

右為細末煉蜜丸如鷄頭大臨事用一粒

海藏編類醫壘元戎畢

海藏老人陰證略例藥目錄

濟生拔粹卷第十一

內傷三陰下例

檳榔丸

養黃丸

瓜蒂散

備急丸

金露丸

枳朮丸

內傷三陰可補例

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

通脈四逆湯

理中丸

理中湯

霹靂散

陰盛隔陽

陰毒甘草湯

附子散

正陽散

火熯散

肉桂散

天雄散

白朮散

正元散

退陰散

五勝散

韓祗和温中例

温中湯

橘皮湯

七物理中丸

厚朴丸

白朮湯

橘皮湯

一苓湯

灰包熨法

厚朴湯

神木湯

白朮湯

黃耆湯

調中丸

理中丸

陰陽二易治法

燒裊散

活人猴鼠糞湯

竹皮湯

青竹茹湯

當歸白朮湯

妙香丸

陰證發痲例

代灸塗臍膏

陰證發黃例

羊肉湯

陰證下血例

廻生神膏

急提益散

少陰欬逆

勻氣散

陰毒吃逆方

蜜導霹靂煎

海藏老人陰證略例藥目錄

濟生拔粹卷第十一

增補古今圖書集成醫部全錄

卷第十一

白濁

海藏陰證略例

素古內傷二陰例

人之生也由五穀之精氣所化五味之備故能生形若傷於味亦能損形飲食過節腸胃不勝氣不及化故傷焉如氣口一盛脉得六至則傷于厥陰乃傷之輕者檳榔丸主之氣口二盛脉得七至則傷于少陰乃傷之重者煮黃丸主之氣口三盛脉得八九至則傷于太陰乃傷之尤重者故填塞悶亂心曾大痛兀兀欲吐得吐則已上部有脉下部無脉宜吐之以瓜蒂散其高者因而越之下者引而竭之如傷之太甚仲景三物備急丸下之

檳榔丸治飲食過多心腹膨悶

檳榔貳錢半

木香貳錢半

枳實半兩炒

牽牛頭末半兩

陳皮去白半兩

右為細末醋糊為丸桐子大每服二十丸生薑湯下

養黃丸 治前證甚則兩脇虛脹

雄黃壹兩 研

巴豆半兩 去皮心膜 研如泥 入雄黃研勻

右二味入白麵二兩同和研勻滴水丸桐子大滾漿水煮十

二九熟漉入冷漿內令沉每一時用浸藥冷漿下一九日盡

十二九也如利不必盡劑否則再服又治脇下痠癖痛如神

瓜蒂散 治大實大滿氣上衝上部有脉下部無脉填塞悶亂宜

吐之

瓜蒂參錢 半 赤小豆貳錢 半

右為細末溫水少許調一錢匕以吐為度如傷之太重備急

丸下之此急劑也

備急丸

乾薑壹兩 生壹

大黃壹兩 生壹

巴豆半兩 去皮心膜 研如泥 攤上新瓦上去油取霜

右為細末煉蜜為丸桐子大溫水下二三九以利為度漸加

金露丸

治時疾內傷心下痞氣不降米穀不化

大黃 貳兩

枳實 半兩

桔梗 貳兩

牽牛 頭末貳錢半

右為細末薑糊為丸餅亦得如桐子大溫水下二三九

積米丸

治老弱虛弱食不消藏府受 仲景本湯易老改丸

枳實

米錢半 麩炒黃

白朮

壹兩

右為細末荷葉裹燒飯為丸或薑浸餅丸亦得如桐子大
每服二二十九米飲送下食後服

海藏內傷三陰例

潔古既有二陰可下之法亦必有二陰可補之法也予故舉此
內傷三陰可溫之劑若飲冷內傷雖先損胃未知色脈各在何
經若面青黑脈浮沉不一弦而弱者係在厥陰若面紅赤脈浮

沉不一細而微者傷在少陰若面黃潔脉浮沉不一緩而遲老傷在大陰也

傷在厥陰肝之經當歸四逆湯主之

當歸

桂

芍藥

細辛

通草

甘草

各陸錢 柒分

右剉如麻豆大每服秤三錢水一盞半棗二枚煎至七分去滓溫服如其人病有久寒者宜當歸四逆內加吳茱萸生薑湯主之

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸

壹兩

桂

芍藥

細辛

大棗

捌个

甘草

通草

各六錢 柒分

吳茱萸

拾个 溫洗用 湯每服用

生薑

貳兩半

右剉如麻豆大每服秤三錢水一盞半煮至八分去滓溫服
日三仲景法一劑分五服清酒煮

吳茱萸湯

吳茱萸

乙兩半湯洗三次

人參柒分

生姜壹兩

大棗三枚

右剉以水二大盞半煮至七分去滓分二服若急者陰毒甘草湯白朮散附子散正陽散肉桂散迴陽丹返陰丹至於陰盛隔陽霹靂散火焰散隨經部分選用之

傷在少陰腎之經也

通脈四逆湯

主之

炙甘草

貳兩

附子

乙兩生用

乾姜

貳兩炮

右剉每服秤三錢水乙盞半煮至七分去滓溫服未差若急更作一劑其脉續續有力者愈

如面赤者加連鬚葱白九寸同煎

如腹中痛者去葱白加芍藥二兩

如咽痛者去芍藥加桔梗一兩

如脉不出去桔梗加人參二兩

四逆湯 上三味是也

傷在太陰脾之經也**理中丸**主之

人參 乙兩腹痛倍之 甘草 炙 白朮 乾姜 各乙兩

右為細末煉蜜為丸如鷄子黃大以湯數合和丸研碎溫服

日二夜二腹中和熱益至三四丸煎熱粥飲投之微溫覆勿

揭衣丸不及湯大便結者宜丸大便軟者宜湯

理中湯 人參 式兩 乾姜 炮 甘草 炙 白朮 各三兩

右判每服秤二錢水一盞半煮至七分去滓溫服日二

如腹痛者加人參一兩 如寒者加乾姜一兩半

如渴欲飲水者加白朮一兩半

如臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

如吐者去朮加生薑三兩 如下多者還用朮

如悸者加茯苓二兩

如四肢拘急腹痛者或腹滿下利轉筋者去朮加附子一枚
生用仲景人參桂枝湯理中湯加桂治太陽未除下之成脇
熱痢心下痞

如寒證不能食者理中建中各半湯為一中湯以治之
表裏不解者理中湯加青皮陳皮名治中湯治曾膈病

吳茱萸湯證

食谷欲嘔屬陽明吳茱萸湯主之

少陰吐利手足厥逆煩燥欲死者吳茱萸湯主之

厥陰乾嘔吐涎沫頭痛極甚吳茱萸湯主之

四逆湯證

自利不渴者屬太陰以其藏寒故也宜四逆輩主之

太陰手足自溫脈浮者桂枝湯脈浮而遲表執裏寒下利清
谷者宜四逆湯主之

屬少陰飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手
足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲
乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯主之

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯主之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆
湯主之

下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫裏宜四逆湯

屬厥陰嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者雖治宜逆湯吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之

吐利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯

病發熱頭痛身體不疼痛當救裏宜四逆湯主之

通脈四逆湯證

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出通脈四逆湯

屬厥陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之

當歸四逆湯證

手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之

白通湯并加豬膽汁湯證

少陰病下利脉微者白通湯主之

少陰病下利脉微與白通湯利不止厥逆无脉乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脉出者死續續者生

真武湯證

太陽病發汗出不解其人仍發熱心下悸眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼
痛自下利者為有水氣其人或小便利或下利或嘔者真武
湯主之

小建中湯證

傷寒陽脉濇陰脉弦法常腹中急痛先與小建中湯服之

傷寒八九日風濕相搏身躄疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者桂枝附子湯主之

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

附子湯證

少陰病得之二日口中和其背惡寒者當灸附子湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

傷寒八九日若其人大便堅小便自利木附湯主之

薑附湯證

若下之後後發汗晝日煩燥不能眠夜而安靜不嘔不渴無

表證脈沉微身無大熱者薑附湯主之

自汗者木附湯無汗者薑附湯

茯苓四逆湯證

發汗若下病仍不解煩燥者茯苓四逆湯主之

理中丸證

霍亂頭痛發熱熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸主之

大病差後喜睡久不了皆中有寒當以丸藥溫之宜用理中丸

理中湯證

背痺心下痞留氣結胃滿脇下逆氣搶心理中湯主之

脾胃不和中寒上衝背脇逆滿心腹疔痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞隔寒不通飲食減少短氣羸瘦溫中逐水止汗去濕宜理中湯治之

腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴及傷寒時氣及裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷背痺心痛逆氣並宜理中湯主

之 若有寒者加附子

若身痺脇下妨悶者加枳實半兩 茯苓半兩

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯微汗之

若惡寒而倦時時自煩不欲厚衣者宜大柴胡湯下之

若得二三日常見少陰死陽證者亦須微發汗宜麻黃附子

甘草湯

若少陰證面赤者宜四逆加葱白主之

陰盛隔陽傷寒其人必燥熱不欲飲水者宜

靈震散

孫兆口訣

附子一枚燒灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼寒氣

然後熱氣上行而汗出乃愈

陰毒甘草湯

治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥

後六七日。上至十日。變成陰毒。身重背強。腹中絞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心下堅強。氣短不得息。嘔逆。唇青面黑。四肢厥冷。其脉沉細。陰毒二候。身如被杖。咽喉痛五六日。可治。至七日不可治也。

甘草 炙

升麻

當歸 各五錢

雄黃 式錢半

蜀椒 式錢半 去目

鱉甲

一兩半 酥炙

桂枝 五分

右以咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓服如人行五里進一服溫覆汗毒從汗出愈未愈再服

附子散 治陰毒傷寒唇青面黑身背強四肢冷

附子

七錢半 炮裂去皮臍

桂心 半兩

當歸 半兩 剉炒

半夏 式錢半 姜製

乾薑

式錢半 炮

白朮 半兩

右為細末每服二三錢水一中盞生薑半錢煎至六分去滓

不計時候執服衣覆取汗如人行十里未汗再服

正陽散 治陰毒傷寒面青張口氣出心下硬身不熱只額上有

汗煩渴不舌黑多睡四肢俱冷

附子一枚去皮臍 皂角一定酥炙去皮 乾薑式錢半 甘草式錢半 麝香一錢另研

右為細末每服一錢水一中盞煎至五分不計時和滓熱服

霹靂散 治陰隔陽煩燥不飲水

附子一枚炮熟取出用冷灰焙細研入真鴈茶二錢和勻

右為細末分作二服水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙於溫

或冷服之須臾躁止得睡汗出即差

火燭散 治傷寒惡候

舶上硫黃 附子去皮生用 新蟾茶 各一兩

右為細末先將好酒一升調藥分大心椀口中於火上攤蕩

令乾合於瓦上每一椀下燒熟艾一拳大以瓦搯起瓦令火
着直至煙盡冷即刮取却細研入磁合盛每服二錢酒一盞
共煎七分有火焰起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脉沉細或吐
或瀉五心煩燥胃中結硬或轉作伏陽在內湯水不下先喫
一服如吐却更進一服服後心中熱其病已差下至臍府中
表未解者渾身壯熱脉氣洪大宜用發表藥或表解者更不
發熱便得眠睡渾身有汗若少有痞結脉實方可下膈行臍
府藥漸用調和脾胃補治元氣之藥也

仲景傷寒脉浮自汗出小便數心煩微寒脚掌急與桂枝湯攻
表悞也得之便厥咽中乾躁煩吐逆作甘草乾薑湯與之以
復其陽

若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸

若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯 宜消息用之

肉桂散

治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷昏沉不識人

變為陰毒惡證

肉桂

叁分

赤芍藥

陳皮

前胡

當歸

各壹兩

附子

壹兩

白朮

叁錢

木香

叁錢

厚朴

叁錢

良薑

叁錢

人參

壹兩

吳茱萸

半兩

洗炒

右為鹿末每服五錢水一中盞棗二枚煎至六分去滓不拘

時候稍熱服

天雄散

治陰毒傷寒身重背強腹中疝痛咽喉不利毒氣攻心

心下堅強短氣嘔逆唇青面黑四肢厥逆其脉沉細而疾

天雄

壹兩

麻黃

半兩

當歸

去節

白朮

半兩

半夏

各半兩

洗

川椒

壹分

肉桂

壹兩

厚朴

壹兩

生薑

貳分

陳皮

壹錢

目炒

右為鹿末每服五錢水一盞入生薑半錢棗三枚煎至五分
去滓無時稍熱服如人行十里末汗再服

白朮散 治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷

川烏頭壹兩炮 桔梗壹兩 附子壹兩炮 白朮壹兩

細辛壹兩 乾薑半兩

右為細末每服一錢水一中盞煎至六分稍熱和滓服無時

始得陰毒候

陰毒本因腎氣虛寒因慾事或食生冷物而後傍風內既伏陰
外又 或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂
發 重眼睛疼身軀倦怠而甚熱四肢厥逆冷額上及
手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失三二日間或
可起行不甚覺重訖之則六脉沉細而疾尺部短小寸口或

無若服涼藥則渴轉甚燥轉急有此證者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰證不宜發汗如氣正脈大身熱而未差用藥發汗無妨

或寸口小而尺脈微大亦同積陰感於下則微陽消於上故其候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或喉不利或心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言瓜甲面色青黑六脈沉細而一息七至以來有此證者速宜於氣海關元二穴灸三二百壯以手足和暖為効仍服金液丹來復丹玉女散還陽散退陰散之類隨證用之沉困之候六脈附骨取之方有按之即無一息八至以上或不可數至此則藥餌難為功矣但於臍中灼艾半棗大二二百壯以來手足不和暖則以硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來漸減熱藥而和治之

正元散 治傷寒始覺吹凍着四肢頭目百節疼痛急煎此服如

人行五里再服或連二服汗出立差若患陰毒傷寒入退陰散

半錢同煎或寒冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃 陳皮 大黃 甘草 乾薑

肉桂 白芍藥 附子 半夏 吳茱萸各等分 皆可製

右麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一大錢水一盞生

薑五片棗一枚煎至七分熱呷出汗以被蓋覆汗出愈陰毒

不可用麻黃出汗

退陰散 治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重小小傷冷每

服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒證欬逆煎一服細細熱

呷之便止

川烏頭 乾薑 各等分

右為鹿末炒令轉色放冷搗為細末每服一盃水一盞盞一
捻煎至半盞去滓溫服

五勝散 治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦欬鼻塞不思

飲食兼治傷寒夾冷氣慢陰毒

甘草 五味子 石膏各乙 乾姜三兩 白朮乙兩半

右為細末每服一盃入鹽少許煎至七分通口服如冷相夾

入姜棗煎若治陰毒入艾葉少許同煎

脈浮而緊者陽證也沉而緊者陰證也

韓祗和溫中例

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至仲景方陳其條目後世膚
淺之學莫知其數立言者只言病在表可發汗病在裏可下或
云不可汗不可下即未嘗有溫中說仲景傷寒例尺寸俱沉細

太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也
辨太陰證云太陰證脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不
渴宜四逆湯又腹痛時痛桂枝加芍藥湯

辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉麻黃附子細辛湯又陰
病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆
湯又少陰病身軀疼痛手足寒骨節痛脈沉附子湯

辨厥陰證云厥陰病吐利手足逆冷煩躁欲死吳茱萸湯

今舉仲景論中數條最是三陰病之良法今世之用尚有未盡
證者愚嘗校自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不
及為則每至夏至巳前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細
數多是背隔滿悶或嘔逆或氣寒或腹鳴或腹痛與仲景三陰
病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥才見脈沉及

腎膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者即腎中便快其病勢重者半日許滿依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之得多對證藥不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或閉脈短及力小腎膈塞悶氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之

病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也或腎膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之

若立春以後至清明以前宜溫中湯主之清明以後芒種以前宜橘皮湯主之芒種以後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

丁皮_乙兩 乾姜_式分 白朮 陳皮 丁香_各分 厚朴_乙兩

右為細末每服二升水一盞葱白三寸荊芥五穗煎至七分去滓熱服未快手足尚逆嘔吐加船上丁皮二升乾姜二升

橘皮湯

陳皮_乙兩 藿香_三分 白朮 芎藭_各分 厚朴_乙兩製

右為末每服二升水一盞生姜一塊如棗大搥破同煎至七分去滓熱服如三服未快手足尚逆嘔吐不定加半夏半兩丁香桂枝半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸

白朮_五分 乾生薑_式分 人參_七分 桔梗_七分 葛根_七分半

藿香葉_五分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九水一盞煎至七分

和澤熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏兩乾姜半兩
病人手脈沉細無力雖三部脈力停亦是陰氣盛也更不須
候寸脈短治之或宵脇滿悶身體拘急疼痛手足逆冷連宜
溫中藥和之

若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之清明已後至芒種
已前宜白朮湯主之芒種已後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸半兩

丁皮枝杖

厚朴乙兩

製式細辛半

人參七分

甘草半兩

乾姜炮

半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一九水一盞煎至六分和澤
熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無力每服加葱白二寸同
煎服

白朮湯

白朮

半夏

當歸

厚朴製

乾姜

炮已上各半兩

丁香

七分

右為細末每服三升水乙盞生姜棗許大搥破同煎至七分去滓熱服三五服脈未有力寸脈尚小加細辛半兩每服加葱白三寸同煎服之

橘皮湯

橘皮

半兩

藿香

半兩

葛根

各二升

半夏

半兩

厚朴

製各半兩

右為末每服三升水一盞生姜如棗大同煎至七分去滓熱服三五服脈尚小手足逆冷加細辛半兩

病人膏膈滿悶時時嘔吐逆肢節疼兩脇下痛腹中鳴此是停飲宜

一苓湯

赤茯苓

二兩

木猪苓

二兩

白朮

各半兩

滑石

乙兩

通草

白芷

薏仁

各半兩

丁皮

七升

陳皮

五升

桂枝

半兩

右爲末每服三升水一盞煎至七分去滓熱服小便未快加
蘆薈七分半嘔未止加半夏兩浙浙惡寒甚每服加葱白
三寸

灰包熨法

病人服前藥膏膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦
有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦陰氣併入
下焦也雖是下焦積寒冷上焦陽盛更難投溫下焦藥也當用
灰包法炭灰或桑柴灰二三升許入好醋拌和乾濕得所銚內
炒令灰熱以帛包裹置臍下熨之頻換灰包令常熱以腹不滿
痛爲度或初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住灰包可
也如灰包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此
是陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解

病人三部脉沉寸脉小於關尺此為陰盛當溫中藥以消陰氣

宜厚补丸

陳皮

人參

白朮

藿香

當歸

細辛之類是也

神木湯亦同治

陰躁而渴不可悞用涼藥若熱藥冷服內

有伏陽則可若脉已虛按之全無力或病人素無食養只可

溫服

海藏所製神木白朮二湯

神木湯

治內飲冷外感寒邪無汗者

蒼朮

子兩製

防風

子兩

甘草

乙兩炒

右咬咀生姜水煎加葱白三寸

如治吹妳煎成調六一散三五子如神

如太陽證發熱惡寒脉浮而緊者加羌活

如太陽證脉浮緊中帶弦數者是有少陽也加柴胡

如太陽證脉浮緊中帶洪者是有陽明也加黃芩

已上三證約量每服加二錢匕不論三陽婦人服者加當歸

神木湯六氣加減例

太陽寒水司天加

桂枝

羌活

陽明燥金司天加

白芷

升麻

少陽相火司天加

黃芩

地黃

太陰濕土司天加

白朮

藁本

少陰君火司天加

細辛

獨活

厥陰風木司天加

川芎

防風

上神木湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於歲之主氣

與月建日時同前應見者皆當隨所見依上例而加減之

神木加藁本湯 每服內加二錢匕 以意消息

神木加木香湯 每服內加二錢匕 以意消息

白木湯 治內傷冷物外感風邪有汗者

白木 叁兩 防風 貳兩 甘草 壹兩炙

右咬咀每服秤三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓温

服無時一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

風温證面赤自汗嘿嘿不欲語但欲寐兩手脉浮而緩或微弱

此證不宜發汗若汗之令人筋惕肉瞤或謔言獨語或煩燥

不卧若下之直視失溲便若火之發狂似驚癇一逆尚引日

再逆促命期活人本方葳蕤湯以有麻黃故不敢用宜上白

木湯主之

若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若腰背強硬者加羌活

若舌乾發渴者加人參

若身灼熱甚者加知母

若躰重多汗者加黃耆

若內傷冷者不加

黃芩湯

治傷寒內感拘急三焦氣虛自汗及手足自汗或手背

偏多或肢躰振搖腰腿沉重面赤目紅但欲眠睡頭面壯熱兩
脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便或難或如常度或
口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲水或少欲飲水嘔噦間作或心
下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲哭或時太息或語言錯亂
失志世疑作謔言狂語者非也神不守室耳始得病寤寐之間
或恐或悸頭項不甚痛行步只如舊陰氣盛陽氣走也兩手脉
浮沉不一或左右往來無定便有沉瀦弱弦微五種陰脉形狀
舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脉也宜先緩而後急

緩宜用黃耆湯甚者加乾姜炮

人參 黃耆味甘 白茯苓 白朮 白芍藥各壹兩

甘草半兩 嘔吐者加藿香兩半 生薑兩半如無以乾者代之 陳皮半兩

右咬咀生薑水煎量證大小加減多少用之可也如大便結

者調中丸主之

調中丸 人參 白茯苓去皮 乾生薑 白朮 甘草各等分

右為細末煉蜜為丸每兩作十九或五九每服一二九水少

許煎服之 若病重急治者黃耆湯內每服加乾姜一錢大

便結者理中丸主之

理中丸 人參 白朮 甘草炙 乾薑炮恐熱以生薑代之

右等分煉蜜丸每兩作五九白湯化下水煎服亦得緩後治

急也若尤急者無汗宜附子乾姜甘草湯

若自汗者宜附子白术甘草湯量脉證可宜四逆湯真武湯
通脉四逆選而用之

論陰陽易分寒熱

陰陽各相易證仲景止用燒裊散言簡而意至有餘也故朱奉
議立陰陽易爲二條後人始知有寒熱之別也故執者有燒裊
散而又有竹皮湯寒者有蝦鼠糞湯又有當歸白术湯至於校
正方妙香丸條下治雜病陰陽易藥中有牛黄腦麝之類是知
治執證也豈可一途而取哉聖人立陰陽易條雖不盡者特舉
其宏綱而已

海云若陰陽易證果得陰脉當隨證用之

若脉在厥陰當歸四逆湯送下 燒裊散

若脉在少陰通脉四逆湯送下 燒裊散

若脉在太陰四順理中丸送下 燒棍散

所用之藥各隨其經而効為之速也

燒棍散

右取婦人中棍近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子棍襠燒灰用

活人猥鼠糞湯 療傷寒病後男子陰易

韭白根 乙把 猥鼠糞 十四枚

右二味以水五升煮取半升去滓再煎三沸温温盡服必有粘汗出為効未汗再服亦理諸般勞復鼠糞兩頭尖大者是也

竹皮湯 療交接勞復知腫腹中絞痛欲絕

竹皮青刮一升

右一味煮用水三升至一升絞去滓服愈

青竹茹湯 婦人病未平復因有所動致熱氣上衝背手足拘急

搗搗如中風狀宜此湯

芡菱根

無黃者乙兩

青竹茹

刮半斤淡竹是

右以水二升半煮取一升二合去滓分二三服

當歸白朮湯 治婦人未平腹因有所動小腹急痛腰膝痛四肢

不住舉動無熱發者

白朮

當歸

桂枝

附子生

甘草

芍藥

黃耆

人參

各式各半

生姜

半兩

右剉以水三升煮取一升半去滓通口服一盞食頃再服温

覆微汗差

如音丸

辰砂

研飛

龍腦

膩粉

研

麝香

研各七

牛黃

半兩

金鉞

九

巴豆

參百乙十五个

去皮心

膜炒熟研如泥去油

各半

右合研勻煉蜜出淨黃蠟六兩入白沙蜜七錢半同煉勻爲丸每兩作三十九米飲調下

海藏治驗

完顏小將軍病寒熱間作腕後有瘰三五點鼻中微血出兩手脉沉澹青膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問之因暑臥殿角傷風又渴飲冰酪水此外感者輕內傷者重外從內病俱爲陰也故先瘰衄後顯內陰寒熱間作脾亦有之非往來少陽之寒熱也與調中湯數服而愈

許氏病陽厥怒狂罵詈親踈或哭或歌六脉舉按無身表如冰石發即叫呼聲高索古昔云奪食則已非不與之食予用大承氣湯下之得藏府數升狂稍寧數日復發復下如此五七次計大便數斗疾緩身溫脉生良愈此易老奪食之法也

侯輔之病脉極沉細內寒外熱肩背膏脇痲出十數點語言狂
乱或曰發痲謔語非熱乎余曰非也陽爲陰逼上入于肺傳之
皮毛故痲出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手
按執須臾冷透如冰與姜附等藥數日約二十余兩後中大汗
而愈後因再發脉又沉遲三四日不大便余與理中丸三日內
約半斤其疾全愈侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰也
侯國華病傷寒四五日身微痲渴飲脰之沉弦欲絕厥陰脉也
溫藥數日不已又以姜附等藥微回脉生因渴私飲水一盃脉
復退但見頭不舉目不開門之則犯陰易若只與燒裊散則寒
而不濟矣遂煎吳茱萸湯一大服調燒裊散連進二服作大汗
兩晝夜而愈

弋唐臣嗜冷食遂成陰脉遲七八至一止後僅三至予亟與溫

劑數服四五日不解遂續晝二夜一七日脉生大汗而解

秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脉不浮文之與半
硫九二三服不止復與黃耆建中湯脉中極緊無表裏皆中大
執發渴引飲皆曰陽證欲飲之水余不與与姜附等藥緊脉反
沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸以百九接之二日中十
余服病人身熱煩燥不寧欲作汗也又以前九接之覆以厚衣
陽脉方出而作大汗翼日大小始通下瘀血一盆如豚肝然用
胃風湯加桂附二服血止其寒甚如此亦世之未嘗見也
秦二好服三生茶及冷物積而痼寒脉非浮非沉上下内外舉
按極有力堅而不柔觸指突出膚表往來不可以至數名縱橫
不可以巨細狀此陰證鼓繫脉也一身游行之火萃于胷中寒
氣逼之故搏大有力與真武四逆等藥佐以芍藥茵香酒糊丸

使不僭上每百丸晝夜相接八九服丸至半千作汗而愈亦世罕有也

姬提領因目疾服涼劑數日遂得陰病臍腹下大痛幾至於斃與薑附等劑雖稍蘇痛不已遂於本方內倍芍藥服之愈

李良佐子病太陽證尺寸脉俱浮數按之無力余見其內陰與神朮加乾薑湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目暗曰唯與大建中三四服外陽內收脉反沉小始見陰候又與已寒加芍藥茴香等丸五六服三日內約服丸六七百脉復生又用大建中接之大汗作而解

陰證發癍

陽證發癍有四有傷寒發癍有時氣發癍有熱病發癍有溫毒發癍班班如錦文或發之面部或發之背脊或發之四末色紅

赤者胃熱也紫黑爲胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病而發癍也當服玄參升麻白虎等藥

陰證發癍亦出脊背又出手足亦稀少而微紅若作熱疾投之涼藥大悞矣此無根失守之火聚於膏中上獨熏肺傳於皮膚而爲癍點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦文也調中溫胃加以茴香芍藥以大建中之類其火自下癍自退可謂治本而不治標也

唐生者病因飲酪水及食生物下利紫黑血十余行脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利腰臍間血一服愈索古云煩滿囊縮可灸陽陵泉在膝下一寸外廉是也陰病在內活人定以返陰丹當歸四逆湯及加吳茱萸生薑湯又以臍下一寸灸之及以臍下各四边一寸三处齊灸之極則二寸石

門急灸之仍與前藥予恐不任藥與灸者別立代灸法

代灸金臍膏

附子 馬藺子 蛇床子 木香 吳茱萸 肉桂

右六味各等分為細末可用白麵一匙藥末一匙或用各半匙生薑自然汁煨成膏攤紙上圓二寸許貼臍下關元氣海自晚至曉火力可代灸百壯腰痛亦用貼之

陰證發黃

方在前元戎拾遺內附

趙宗顏因下之太過生黃脉沉細遲無力次第用藥至茵陳附子湯大効

趙秀才因下之早黃病脉寸微尺弱身冷次第用藥至茵陳四逆湯大効

傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃一則寒

化太過水來犯土一則土氣不及水來凌之多變此疾一則茵
陳茯苓湯加當歸桂二則茵陳橘皮湯加薑朮半夏三則茵陳
附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳薑附湯六則茵陳桑葉更
湯方在前拾遺內

內感傷寒勞役形躰飲食失節中州變寒之病生黃非壞之而
得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也

若男黃小便自利當與虛勞小建中湯

若黃疸色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦小半夏湯
韓氏曰產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若
只用救逆効必遲矣與羊肉湯為効神速病人面色雖見陽是
客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽上焦陽氣下
降丹田知所歸宿矣氣有高下病有遠近證有中外治有輕重

各適其至所為病八九日汗下太過二脈沉細無力多蹇足卧
惡明與人聲皮有粒時戰如瘧宜羊肉湯主之

羊肉湯方

當歸

白芍藥

各壹兩

黑附子

肆錢炮裂去皮脂

龍骨

羊兩燒通赤

生姜

貳兩

牡礪

壹兩

桂枝

柒錢半

右為鹿末每一服二兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛
以水五升壹升今之壹大盞也熬至一半以來濾絞去滓分

三服飲之

海云陽證大汗下後亡陽于外亡血于內上而津脫下而
液脫津液兩亡宜以此湯補之矧陰證者豈可不溫補哉此
與傷寒太陽證振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况
之陰候宜得不補耶

陰證下血

胃中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下壅絕脈絡部分陰陽
不通用苦熱以定于中使辛熱以行于外升以甘溫降以辛潤
化嚴肅為春溫變凜冽為和氣汗而愈也然餘毒土宜猶有存
者周身陽和尚未泰然胃中微燥而思涼飲因食冷物忽服涼
劑陽氣復消陰餘再作脉退而小弦細而遲激而為衄血唾血
者有之心肺受邪也下而為便血溺血者有之腎汗受邪也三
焦出血色紫不鮮此重沓寒濕化毒凝泣水穀道路浸漬而成
若見血證不詳本源便用涼折變乃生矣

陽證溢出血 陰證下如脉肝

上而血者黃耆桂枝湯

白芍藥當歸湯

中而血者當歸建中湯

增損胃風湯

下而血者芍歸朮附湯

桂附六合湯

若二血證在行陽二十五度見黃耆四君子湯主之

若三血證在行陰二十五度見當歸四逆加吳茱萸主之

迴生神膏

治男女陰毒傷寒外按法

牡礪

煉粉

乾薑

炮裂各壹錢

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二外上得汗出愈
女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈外與乳男
女之根帶坎離之分也 陰證大小不通及諸雜病陰候大
小不通者並宜此外治法數日不通為急非急勿用

急提益散

雜病非陰候者

草烏頭不以多少生用

右為極細末用葱一枝肥者削去鬚頭圓上有葱汁濕蘸之
任穀道中

陰毒傷寒四肢逆者

吳茱萸不以多少

右為細末溫酒和勻生絹袋盛之執熨脚心令通暢愈若
以湯煎溫藥漆洗以接四肢亦可

少陰效逆

仲景有傷寒效逆上氣脈散者死謂其形損故也少陰渴逆者
失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內也為之惡候或兼以
舌謬語言不正而反昏胃與咽痛者少陰也速下之宜大承
氣湯

若陽極脈微將盡者不宜下宜瀉心湯養陰退陽而已如不
用瀉心湯涼膈去硝清肺亦可

若飲水過多心下痞而渴逆者五苓散主之別無惡候是也
夫效逆孫真人斷之為噦逆噦者乾嘔是已即非效逆也夫效
逆者多種或水漬於肺而心痞或連效不已而氣逆或喜笑

過多而氣噎或噤飲錯喉而氣餒或急食乾物而氣塞皆能
作欬逆之聲世呼謂之吃忒是也皆氣不得下爲火熱托之
而使上至咽喉中噎而止也人或以紙撚鼻因嚏而止或詐
寃盜物因恐而止或鼻聞食香調氣而止皆抑之駭之調之
而使氣下也千金以喘嗽欬逆上氣者爲病肺脉散者是心
火形於肺金也心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日死以
其形見乎損傷故也此說甚優

易老謂渴逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便
秘者大承氣湯下之便軟者瀉心湯主之也

陰證欬逆

且陽證欬逆者胃熱失下也陰氣先絕陽氣後亦將竭火獨炎
上逆出陰氣而爲欬逆

陰證者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已病
丁火又消所有遊行相火寒邪迫而萃集於脊中亦欲盡也
故令人發熱大渴引飲并去蓋覆病人獨覺熱他人按執之
身軀肌肉骨髓血脉皆寒此火即無根之火也故用丁香乾
薑之類熱藥溫胃其火自下效逆方止非若涼膈瀉心以治
陽證自上而下瀉退心火陰氣乃生陰證效逆從嘔噦而生
胃寒嘔噦不已渴逆繼之靈苑治陰證效逆

白氣散

川烏頭

大者叁个炮裂去皮脂

右爲細末每服二錢黑豆二十一粒沙糖鷄頭仁大水煎承
熱細細飲之

本事治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑

附子俱炮

肉桂

芍藥

炙甘草 半夏 吳茱萸 陳皮 大黃

右各等分爲細末每服一錢水一盞生姜三五片煎至七分

去濁滓取清執服

許學士以退陰與正元同煎以治陰證效逆

蜜窰煎

大鹽與蜜等分熬可捻如蜜窰煎上頭銳用寸許內穀道中

少許化開則通

海藏曰蜜導用鹽相合亦可如用草烏頭末相合亦可鹽則軟

取潤燥草烏末則化寒消結可隨證陰陽所宜用之

海藏云

傷寒效逆脉散死 仲景之言不虛偽

大抵源流失下生 效逆喉中陰不內

便而唯宜用瀉心

便硬尤宜大承氣

一藥神功作者誰

東垣潔古為良制

活人陰證諸藥不効并湯水不下身冷脉絕氣息短不知人用葱熨法莫若用醞醋拌麩炒熟注布袋中蒸熨比上法尤速一法用丁香草撥乾姜牡礪燒粉手心中以唾津調如泥以手掩其陰至煖汗出為度

一法治水瀕偏大上下不定疼痛不止牡礪不以多少鹽泥固濟炭三斤煨令火盡冷取二兩乾姜一兩炮為細末二味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

海藏陰證略例