

辰

臨證指南醫案

倪韞如



臨證指南醫案目

卷五

風

寒

風溫

溫熱

暑

濕

燥

疲



南京中医  
大学图书馆所有

癰癧瘡癰

痰飲



臨證指南醫案卷五

丁丑五月若溪漫士臨本

古吳葉

杜天士先生著

錫山鄒錦璇滋全較

邵

銘新甫

風

風傷

某一風傷衛寒熱頭痛脘悶

蘇梗一錢

淡豆豉一錢

杏仁三錢

不可升提  
桔梗一錢

厚朴半錢

連翹半錢

通草一錢

滑石二錢

某二風邪外襲肺衛。畏風發熱，咳嗽，脘悶。當用兩和表裏。

此方此平  
女有先民  
之風

淡豆豉一錢

蘇梗一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

風傷營衛誤治

風傷

體虛感風

沈

江五勞倦過月氣弱加外感頭痛惡風營衛一氣皆怯

虛人得感微寒熱參歸桂枝湯加廣皮

則閃爍筋掣而痛大凡先治表後治裡世間未有先投黃連清裏後用桂枝和表此非醫業當歸建中湯

經云風爲百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣如兼寒則風寒兼暑則曰暑風兼濕曰風濕兼燥曰風燥兼火曰風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人故曰百病之長也其餘五氣則不能互相全兼如寒不

所列諸案  
卽俗所謂  
傷風輕症  
也

能兼暑與火暑亦不兼寒濕不兼燥燥不兼寒火不  
兼寒由此觀之病之因乎風而起者自多也然風能  
兼寒寒不兼風何以辨之如隆冬嚴寒之時卽室  
重體之中人若裸體而臥必犯傷寒之病此本無風  
氣侵入乃但傷於寒而不兼風者也風能兼寒者五  
熱風暑風亦不兼寒  
風中本有寒氣蓋巽爲風風之性本寒卽巽卦之初  
爻屬陰是也因風能流動鼓盪其用屬陽是合乎巽  
之二爻三爻皆陽爻也如炎歎溽暑之時若使數人  
搊一人其人必致汗孔閉頭痛惡寒骨節疼等傷寒  
之病作矣斯時天地間固毫無一些寒氣實因所搊

之風風中却有寒氣故令人受之寒疾頓作此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風而或兼風溫風濕風燥風火等症更。有暑濕燥火四氣各自致傷而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者即屬傷寒亦有無汗脈緊骨節疼諸症。此柯氏之書所以能獨開仲景生面也。至仲景所著傷寒書本以寒爲主。因風能兼寒故以風陪說。互相發明。且學者看畫不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風各有現症。宜載內經尤當。

詳考華岫雲



醫譜指掌錄

卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

寒

更邪  
客肺

某二客邪外侵頭脹當用辛散

蘇梗

杏仁

桔梗

橘紅

連翹

某

寒熱頭痛眩悶

淡豆豉

嫩蘇梗

杏仁

桔梗

厚朴

枳殼

風寒

傷衛

某五

復受寒邪背寒頭痛鼻塞

桂枝

寒邪  
兼濕

某十

脈邪外襲衛痺發熱頭痛先散表



四言本草用法

卷五

杏仁

厚朴

淡豆豉

蘇梗

寒客  
太陽膀胱經氣逆

勞倦  
感寒

楊四

太陽脈行由背抵腰外來風寒先傷陽經。至霧自及上經氣逆而病發致嘔痰頭痛小溲數行病解膀胱氣通斯逆者轉順矣。當通太陽之裡用五苓散倘体

感病發再議

某八  
二勞傷陽氣形寒身熱頭暈院悶身痛

杏仁二錢

川桂枝八分

生薑一錢

厚朴一錢

膚皮一錢

茯苓皮三錢

傷寒症仲景立法於前諸賢註釋於後先生雖天資

图书馆版权所有

此卽俗名  
暑寒之症

陶爾受寒

之小疾不

人經絡之

病也何必

牛引傷寒

詩論及細

闕此編竟

大症發諸

一門卽此

數方爲傷

冬之法不

禁失夫夫

醫者之學

問今任明

傷寒之理

則萬病皆

通故仲景

穎敏若擬其治法恐亦不能出仲景範圍其所以異於庸醫者在乎能辨症耳不以冬溫春溫風溫暑熱濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症誤認爲傷寒其始溫熱暑濕諸症專辨邪之在衛在營或傷氣分或傷血分更專究三焦故能述前人溫邪忌汗濕家忌汗當用手經之方不必用足經之藥等明訓垂示後人此乃先生獨擅見長之處也若夫傷寒之書自成無已註解以後凡註疏者不啻數百家其尤著者如嘉言三書景岳書傷寒三註四註等篇近有柯韻伯來蘇集傷寒論翼方翼王晉二古方選註中所解一百十

之書只有二種傷寒論治傷寒之法也。金匱治雜症

之法也。而

金匱之方

則又半從

傷寒論中

亦別傷寒

乃病中之

第一症而

學醫者之

第一功夫

也。今此編

獨闢此一

門則平日

所習何書

所治何病

如此毫無

三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參究庶平臨症可無誤矣。華岫雲

傷寒一症內經云熱病者皆傷寒之類也。又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑。又曰冬傷於寒春必病溫其症有六經相傳伊病合病兩感直中難經又言傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同再加以六淫之邪有隨時互相兼感而發之病且其一切現症則又皆有頭痛發熱或有汗無汗或惡風惡寒不食

十年醫道  
大行豈無  
數千百大  
症經手乃  
竟無訛此  
數方以了  
局此非此  
老之過乃  
緝晝之人  
胞中注無  
定見耳

倦臥頑渴等。則又大略相同。故其症愈多。其理愈晦。  
母怪乎醫者臨症時。不能灼然分辨。即其所讀一書。  
前人亦竝無至當不易之論。將靈素難經之言。及  
切外感之症。逐一分析辨明。使人有所遵循。故于古  
年來欲求一鑒墳之上。察六淫之邪。毫不紊亂者。晉  
未見其人。幸賴有仲景之書。以六經分症。治以汗吐  
下和寒溫諸法。故古人云仲景之法。不但治傷寒。苟  
能悉明其理。卽治一切六氣之病。與諸雜症皆可融  
會貫通。無所不宜。此誠屬高論。固深知仲景者也。然  
余謂六淫之邪。頭緒甚繁。實理甚奧。卽彙集河間東

垣丹溪及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。  
若怙怙焉必欲但拘仲景之法而施治。此乃見聞  
廣。膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。傷寒之  
法。固屬無多。然其辨明冬溫春溫風溫溫熱。甚是良  
治。實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。

幸毋忽諸

華玉堂

# 風溫

風溫  
傷肺

僧二

近日風溫上受寸口脈獨大肺受熱灼聲出不揚先  
與辛涼清上當薄味調養旬日

牛蒡子

薄荷

象貝母

杏仁

冬桑葉

大沙參

南花粉

黑山梔皮

楊

脈左賁大頭目如蒙清竅不爽此風溫仍在上焦擬

升降法

乾荷葉

薄荷

象貝

蓮翹

鉤藤

生石膏末

桑白皮

桔梗



某風溫從上而入。風屬陽。溫化熱土。焦近肺。肺氣不得舒轉。周行氣阻。致身痛。脘悶不飢。宜微苦以清降。微辛以宣通。醫謂六經輒投差。防泄陽氣劫胃津。溫邪目注何遠忘之。

杏仁

香豉

鬱金

山梔

瓜蔞皮

蜜炒橘紅

鬱金

山梔

葉

葉 風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔頭脹。咳嗽發疹。心中懊憹。脘中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結壅。宿痰。痰飲。不欲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮

豆豉

杏仁

黃芩

瓜萎皮

枳實汗

郭

風溫入肺氣不肯降形寒內熱胸痞皆屬鬱之兼辛

涼佐以微苦手太陰主治

黑山梔

石膏

杏仁

瓜萎皮

鬱金

風溫化燥  
熱

秦六體質血虛風溫上受濁清不應氣分燥也議燒其上

杏仁

生甘草

薄荷

桑葉

杏仁

連翹

又照前方去連翹薄荷加陳裏皮鬱金梔皮

少陽  
風火

某風火上鬱耳後結核目眶痛



中医药大学图书馆版权

薄荷

牛蒡子

前胡

象貝

連翹

黑羶皮

赤芍

生甘草

風溫  
傷陰

某

風溫熱伏更劫其陰日輕夜重煩擾不寧

生地

麥冬

白芍

炙草



馬五  
風溫熱灼之後法液未復陽明脈絡不旺骨酸背楚  
以和補

生黃芪

鮮生地

北沙參

玉竹

麥冬

歸身

蜜丸

某

陰虛風溫氣從左升

桂枝湯加花粉杏仁

風爲天之陽氣溫乃化熱之邪。兩陽薰灼先傷上焦。  
種種變幻情狀。不外手三陰爲病。頭脹汙山。  
咳嗽必然並見。宜當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫。  
消散劫燥清津太陰無肅化之權。救逆則有脾性薦。  
根玉竹門冬之類也。苦寒沉降損傷胃口。陽明頓失。  
循序之司。救逆則有復脈建中之類。凡此症驟變。  
則爲痙厥。緩變則爲虛勞。則主治之方總以目藥爲  
要。或兼寒。或兼溫。在大通變可也。  
邵幼甫



南京中医  
大學圖書館  
版權所有

# 溫熱

溫邪  
入肺

某十三脈數暮熱。頭痛腰疼。口燥。此屬溫邪。

連翹

淡豆豉

淡黃芩

杏仁

桔梗

黑山梔

某溫邪化熱。肺痺喘急。消渴胸滿。便溺不爽。肺與大腸見症。

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝積勞傷陽衛疎。溫邪上受。內入乎肺。肺主周身之氣。



氣窒不化外寒似戰慄其溫邪內鬱必從熱化令氣短  
胸滿病邪在上大便瀉出稀水肺與大腸表裏相應  
由熱迫下泄耳用辛涼輕劑爲穩

杏仁

桔梗

香豉

橘紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

龜

袒裸吸入溫邪釀爲肺脰危症

蘆根

桃仁

苡仁

冬瓜子

施久患虛損原寢食安舒日服陰柔膩補不但減食不  
寐院中常悶渴欲飲涼此口鼻吸人溫邪先下於腫脰  
補則邪愈熾氣機阻塞弱質不敢開泄援引輕揚肅上  
近日無人能知此者

兼以威喜丸淡以和氣上雀得行可進養胃法

白炒參

茲仁

天花粉

桑葉

溫邪  
劫津

鬱金

兼服威喜丸

王溫邪發熱津傷口糜氣穢

捲心竹葉

嘉定花粉

知母

金石斛

連翹

宜再加氣分藥

某春溫身熱六日不解邪陷劫津舌絳骨節痛以甘寒

燒邪

竹葉心

知母

花粉

滑石

生甘草

梨皮



南京中医药大学图书馆版权所有

胃津  
熱傷

丁 口鼻吸入熱穢肺先受邪氣痺不主宜通其邪熱由中及於幕原布散營衛遂爲寒熱既爲邪踞自然耗竭不飢雖邪輕未爲深害留連不已熱蒸形消所謂病傷漸至於損而後已 桂枝白虎湯

又 氣分之熱稍平日久胃津消乏不飢不欲納食大忌香燥破氣之藥以景岳玉女煎多進可效忌食辛辣肥膩自安 竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮

楊 伏邪發熱煩渴知飢無寐乃胃津受傷所致擬進竹

葉石膏湯加花粉

葉 熱傷氣分用甘寒方 白虎湯加竹葉

某右脈未和熱多口渴若再劫胃汁怕有脫症不飢之  
事。腎清熱生津仍佐理痰俟邪減便可再商。

麥冬

人參

石膏

知母

粳米

竹葉

半夏

葉二仲景云陰氣先傷陽氣獨發不寒癰熱痰入消渴則

八

○是症古書不可不讀奇不見也

肉條例下不註方但曰以飲食消息之後腎謂甘寒生

津解煩熱是矣今脈數舌紫渴飲氣分熱邪未去漸次

轉人血分斯甘寒清氣熱中必佐存陰爲法中之法

宜用桔梗或他風寒之藥

生地

石膏

生甘草

知母

粳米

白芍

竹葉心



熱入心營

毛六

溫邪熱人營中心熱悶。脇肋痛。平素痰火與邪膠結。

致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

生地

麥冬

杏仁

鬱金汁

炒川貝

橘紅

馬少陰伏邪津液不騰。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解。  
血中伏熱莫使痰涸。

犀角

生地

丹皮

竹葉

元參

連翹

陳姬熱入膻中。夜煩無寐。心悸怔舌絳而乾。不嗜湯飲。乃營中之熱治在手經。

犀角

鮮生地

黑元參

連翹

石菖蒲

炒遠志

又 鮮生地

元參

天冬

竹葉

茯神

金箔

又 陽升風動治以鹹寒。

牛地

阿膠

天冬

川斛

伏神

麥冬

人參

張 營絡熱心震動。復脈湯玄薑桂參加白芍。

陸 六九年熱病八九日舌燥煩渴語語邪入心胞絡中深。

怕液涸神昏當滋清去邪兼進牛黃丸驅熱利竅。

胞  
入  
心  
熱  
邪



南京中医药大学图书馆所有

竹葉心

鮮生地

連翹心

元參

犀角

石菖蒲

胡

脈數舌赤耳聾胸悶素有痰火近日冬溫引動宿病

加以勞復小溲不利議治胞絡之熱

鮮生地五錢

竹葉心一錢

丹參一錢半

元參一錢半

石菖蒲根六錢

陳膽星六分

顧

溫邪悞表劫慄邪入胞絡內閉

至膏肓

王

吸入溫邪鼻通肺絡逆傳心胞絡中震動君主神明

欲迷瀰漫之邪攻之不解清竅自蒙絡內亦癱幼科不  
解投以豁痰降火理氣毫無一効惟平脈箇清邪中上

肺位最高，既入胞絡，氣血交阻，逐穢利竅，須藉芳香許用局方至寶丹。

施

溫邪如瘧陰氣先傷

苦辛再傷陽及胃內

風  
長  
橫  
腹

掣癲癇邪閉心胞絡中痰潮神昏乃熱氣蒸灼無形無質此消痰消食清火竟走腸胃與病情隔離釐釐更遠

與至寶丹三分分開水調服。若得神清再商治法。

觀

飲酒又能納穀，是內且

**風主平消燥當春盡夏初陽氣**

**此是則中  
風何以入  
溫熱門中**

色光亮而赤舌胎灰黃。其中必夾伏溫邪。所怕內閉神  
昏。治法以清絡宣竅。勿以攻風劫痰。扶助溫邪。平定廓

清冀其帶病久延而已

犀角 生地

元參

連翹心

鬱金 小青葉 竹葉心

石菖蒲

大黃

又目暝舌縮神昏如醉邪入心胞絡中心神爲蒙謂之內閉前案已經論及溫邪鬱蒸乃無形質而醫藥都是形質氣味正如隔靴搔癢近代喻嘉言議謂芳香逐穢宣竅頗爲合理絕症難挽天機用意瞞盡人工

至寶丹 四九匁四服涼開水調化

老年下虛春溫上受痰潮昏譖舌絳黃苔面赤微瘡

包 先清上焦

神皆  
閉竅  
熱邪

天竺黃 金銀花 竹葉心 連翹 竹瀝

張溫邪自裏而發喉腫口渴舌心灰帶上焦熱蒙最怕  
鬱閉昏痘苦寒直降攻其腸胃與溫邪上鬱無涉大

連翹 黑梔皮 牛蒡子 杏仁

馬勃 瓜蔓皮 夏枯草 金汁

銀花露

花粉 中醫

1661

張、週歲內未得穀味精華溫邪吸入上焦先受頭面頤  
領腫浮邪與氣血混處刀針破傷經絡溫邪內開熱壅  
蔓延三焦昏寐潮舌刺卷縮小溲點滴濁熱氣結  
銅在裏但臺連攀梔之屬藥性直降竟由胃達陽而熱  
氣如烟如霧原非形質可楊可掃故生黃產自牛腹原

從氣血而成混處氣血之邪藉此破其蘊結是得效之  
因由也夫溫熱時癘上行氣分而漸及於血分非如傷  
寒足六經順傳經絡者六抵熱氣鴟張必薦囊經絡內  
竅故昏躁皆裏竅之欲閉欲宣內閉須得芳香氣血以  
營必致瘧毒內攻謹陳大意參未議用紫雪丹三分微  
溫開水調服

補 温邪中自口鼻始而入肺爲咳喘繼傳膻中則嘔血  
乃心營肺衛受邪然邪在上焦壅遏阻氣必聚爲熱痰  
矣嘔渴是欲內閉情不以河間三焦立法或謂傷寒主  
六經或謂肺腫事泄氣血致熱無出路胸悶腹大危期

至速矣。卽有對病藥餌，氣湧沸騰，勢必湧壯無餘焉。望  
有濟。失溫熱，穢濁壅塞內竅，神識昏迷，脹悶欲絕者，須  
以芳香宣竅佐牛黃、金屑深入臟絡，以搜鉗用之邪。今  
危篤若此，百中圖一而已。紫雪丹。

陳 溫邪逆傳，膻中熱痰蔽阻，空竅所進寒涼，消導徒疏。  
腸胃毫無一效。痰乃熱毒津液所化，膻中刀空靈，之所  
是用藥之最難。至寶丹芳香，通其神明之竅，驅熱痰  
之結極。是但稱年受溫邪，最易陰虧津耗，必兼滯情以  
理，入伏溫邪爲正。

犀角

鮮生地

元參

連翹心

丹皮

石菖蒲

化服至寶丹

某 濕爲漸熱之氣迷霧鬲間。補機不發。三焦皆被邪侵。  
豈是小恙。視其舌伸縮如強痰涎粘著內閉之象已甚。  
宜通膻中。望其少甦。無暇清至陰之熱。

至寶丹四分 石菖蒲金銀花湯送下

王 十八夜熱早涼。熱退無汗。其熱從陰而來。故能食形瘦脈  
數。至盛兩月不解。治在血分。

生鼈甲

青蒿

細生地

知母

丹皮

淡竹葉

許

溫邪已入血分。舌赤苔黃。神呆潮熱。卽發班疹。亦是

熱陷  
血分



血中熱邪。悞汗消食。必變晉厥。

方

犀角 細生地 元參

丹皮

欒金 石菖蒲

厥陰人

張

舌絳裂綻。面色枯槁。全無津澤。形象異常。心中熱甚。

邪深竟人厥陰。正氣已經虛極。勉擬仲景復脈湯。令平。

邪少虛多治法。復脈去人參。生薑加甘蔗汁代水煎。

又 熾病悞投表散。消導正氣。受傷神昏舌強。勢如燎原。

前進復脈法。略有轉機。宜遵前方去桂加參以扶正氣。

爲主。復脈湯去桂加人參。甘蔗汁代水煎藥。

又 進甘藥。頗安。奈陰液已涸。舌強音繙撫之。乾板較諸。

已前齧肉喫血有間，小便欲解掣痛，猶是陰氣欲絕，欲寐昏沉午間煩躁，熱深入陰之徵，未能穩，許愈期也。

生白芍

炙甘草

阿膠

人參

生地

麥冬

炒麻仁

胸成結  
悞陷下

某

悞下熱陷於裏而成結，胸所以身不大熱，但短氣，腳滿煩躁，此皆邪熱內燔，擾亂神明，內閉之象，棘手重恙，倣仲景鳴心法，借參末議，再候明賸定裁。

川連

黃芩

半夏

炮淡乾薑

生薑

枳實

吳

傷胃

神氣口迷，不飢不食乃苦辛消導發散劫奪斷津所

津液

致。蓋溫邪手經爲病。今世多以足六經主治。故致用。

細生地

竹葉心

麥冬

元參心

連翹心

鬱金

玉龜

溫熱十三日。舌黃心中悶痛。初病手經不當用足經。亦屬食神。

方老人怕其液涸。甘寒醒胃卻熱。

鮑生地

竹葉心

麥冬

鬱金

川斛

菖蒲根

麥冬

鬱金

冬涼  
傷液

吳子近曰。天未寒兮。病虛氣不收藏所感之邪。謂冬涼參。益氣薄荷桔梗杏仁泄氣已屬背膠加補骨脂溫陽。腎臟尤不通之極。自述夜寐深更。熟寐有汗。釋年陰不。

充陽易泄論體質可卻病

桑葉

大沙參

玉竹

苡仁

生甘草

糯米湯煎藥

陳半  
陰氣  
冬溫入肺膠痰化熱。因未納穀之身不可重藥消火。

通利

炒麥冬

桑葉

大沙參

甜杏仁

地骨皮

氣血  
兩傷

某

脈數石大煩渴舌絳溫邪氣血兩傷與玉女煎。

生地

竹葉

石膏

知母

丹皮

甘草

陰虛  
感溫

陳二  
陰虛溫邪甘寒清上。



白沙參

甜杏仁

玉竹

冬桑葉

南花粉 生甘草

關

陰虛挾溫邪。寒熱不止。雖不宜發散消食。徒補亦屬

無益。擬進復脈湯法。

炙甘草

阿膠

生白芍

麥冬

炒生地

炒丹皮

青甘蔗汁煎

黃

體虛溫邪內伏。頭汗淋漓。心腹窒塞。上熱下冷。舌白

煩渴。春陽升舉爲病。猶是冬令少藏所致。色脈參視極

當謹慎。

阿膠

生地

麥冬

生牡蠣



生白芍

茯苓

分倦  
風溫  
燥液

張五

勞倦內傷溫邪外受。兩月不愈。心中溫。溫液液津液。

無以上供。夜臥喉乾燥。與復脈湯去薑桂參三服後可。

加參

汪勞倦更感溫邪。陽升頭痛寒熱戰慄。冷汗邪雖外達。陽氣亦泄。致神倦欲眠。舌赤黃。胎口不知味。當以育陰除熱爲主。辛散苦降非宜。

復脈湯去參童桂麻加青甘蔗漿

勞倦  
風溫  
胃陽  
兼盛

兼論

飲寒來微微齒痺此營衛上氣少衰恐延虛脫議固衛

陽翼寒熱得平。

黃芪

桂枝

白芍

炙甘草

病退  
胃不  
神

喉

熱病後不飢能食不寐此胃氣不和

牡蠣

南棗

香豉

黑山梔

半夏

枳實

廣皮

華五

日寫受寒暄不正之氣過暮原擾胃系寒熱已罷猶

不飢不飢占邊赤中心黃餘邪未清食入變酸乃邪熱  
不勝穀以溫膽和之半麌溫膽去甘草茯苓枳實加鬱

金黑山梔

臨證指南醫案

卷五

溫熱



北京中医药大学图书馆版权所有

熱毒  
壅結  
上焦

林氏腹滿已久非是累症近日而領腫脹牙關緊閉先有寒熱隨現是象診脈右搏數左小乃溫邪觸自口鼻上焦先受氣血與熱膠固致清竅不利倏有壅塞之變理當先治新邪况頭面咽喉結邪必辛涼輕劑以宣通若藥味重濁徒攻腸胃矣倣東垣普濟消毒意

連翹

牛蒡子

馬勃

射干

滑石

夏枯草

金銀花露

金汁

陰虛  
邪伏

膀胱

脈左數右緩弱陽根未固陰液漸涸舌赤微渴喘促自利溲數脯刻自熱神煩囁語夫溫邪久伏少陰古人立法全以育陰祛熱但今見症陰分固有伏邪真陽亦

不肯收納議倣劉河間燭藥輕投不爲上焦熱阻下焦  
根蒂自立冀其煩躁熱蒸漸緩

熟地炭

茯苓

淡薄暮

遠志炭

川石斛

五味子

飲子煎法

又晚診陰中伏邪晡時而升目赤羞明舌絳而渴與有  
陰清邪怯

生地炭

元參心

川石斛

炒麥冬

犀角

石菖蒲

又脈左數右軟舌乾苔白小溲淋瀝吸氣喘促煩汗督  
陰不承心神熱灼蒙閉議以三才湯滋水制熱三才加



茯神黃柏金箔 晚進周少川牛黃清心丸一服

又 昨黃昏後診脈較諸早上左手數疾頓減惟尺中垂而仍動嘔詰不已若有妄見因思腎熱乘心膻中微閉神明爲蒙自屬督亂隨進周少川牛黃丸一服俾迷漫無質之熱暫可泄降服後頗妄辰刻診脈濡小形質太衰舌邊色淡下利稀水夫救陰是要旨讀仲景少陰下利篇上下交征關闌欲撒必以堵塞陽明爲治以陽明司闔有開無闔下焦之陰仍從走泄矣議用桃花湯

人參

赤石脂

炮薑

白粳米

又 晚服照方加茯苓

又脈左沉數右小數。暮熱微汗時煩。辰刻神情虛邪仍

畱陰分議用情補。

人參

茯苓

川石斛

炙甘草

黑棗豆皮 糯稻根鬚

又 金匱麥門冬湯

細詳諸案  
俱是熱邪  
訛治入臟  
之癰症居  
多時邪溫  
熱之症絕  
少

寒酒 邪熱  
傷

程

一溫熱病已傷少陰之陰。少壯陰未易復者。恰當夏令八發泄。百益酒釀造有灰。辛熱劫陰泄氣。致形體頽然藥

難見效。每白飼雞距子生用。其湯飲用馬料豆湯。

冬傷於寒。春必病溫者。重在冬不藏精也。蓋煩勞多  
慾之人。陰精久耗。入春則裏氣大泄。木火內燃。強陽



無制燔燎之勢。真從裏發。始見必壯熱煩冤日乾舌燥之候矣。故主治以存津液爲第一。黃芩湯堅陰劫邪。卽此義也。再者在內之溫邪欲發在外之新邪。又加葱豉湯最爲捷徑。表分可以肅清。至於因循貽悞。豈止一端。或因氣燥津枯。或致陰傷。恢涸先生用挽回諸法。如人參白虎湯。黃連阿膠湯。玉女煎。復脈法。由明條例甚詳。餘則治痘厥以甘藥緩。肝腎閉用幽芳開竅。熬燉之溫膳。蓄血而論通瘀。井井有條法直。

周到邵新甫

# 暑

任翁暑地房熱。

暑傷  
氣分  
上焦  
閉鬱

某大凡暑興熱乃地中之氣吸受致病亦必傷人。氣結則上焦不行下脘不通不飢不欲食不大便皆有阻如天地不交遂若否卦之義然無形無質所以清之攻之不效。

杏仁

通草

象貝

栝蒌皮

白寇

鬱金竹

姚

奔走氣亂復飲燒酒酒氣辛熱有升無降肺氣膩鬱上下不通舌白消渴氣結自利及復滯滯自利不爽周

此非治暑  
之方

身膚膀皆痛汙大出不解無非暑濕熱氣外田肺受漫布三焦羣醫消導苦藥伯攻腸胃在上痞結仍然滲佐以微辛合平軒岐上病治上之方

西瓜翠衣

川白通草 大豆黃卷

此方無杏仁

射干

苡仁

范

伏暑阻其氣分煩渴咳嘔喘急二便不爽宜海上舊

杏仁

石膏

炒半夏

黑梔皮

厚朴

竹茹

又

痰多咳嘔是暑鬱在上醫家亂投沉降所以無效

右膏

杏仁

炒半夏

鬱金



南京  
大學  
中醫藥  
圖書館

香豉

黑山梔

王 舌白煩渴心中脹悶熱邪內迫氣分阻閉當治肺經  
倘逆傳膻中必致昏厥

杏仁

鬱金

滑石

黃芩

半夏

橘紅

枯梗皮

桔梗

陳四暑濕傷氣肺先受病諸氣皆痺當午後陽升煩喘更五  
加夫無形氣病醫以重藥推消多見不效

西瓜翠衣

活水蘆根

杏仁

苡仁

又 酒客中虛重鎮攻消清氣愈傷矣暑邪皆著氣分苟  
肺可清肅則其邪不攻自罷議仍以廓清爲法若雨露



從天下降炎駭白蘆掃無餘 威喜丸二錢十服

果一身熱頭脹腕悶咳嗽此暑邪外襲於肺衛當清小焦

絲瓜葉三錢

大杏仁三錢

香薷七分

通草一錢

飛滑石三錢

白蔻仁五分

陳脈左勁右濡頭痛腕悶麻痺欲厥舌白此暑邪內中

蒙閉清空成瘧之象平昔陰虛勿犯中下二焦

嫩竹葉

連翹

飛滑石

野鬱金汁

大杏仁

川貝母

龔脈寸大頭量腕中食不多下暑熱氣從上受治以苦四

辛寒方

竹葉

杏仁

鬱金

滑石

香豉

山梔

張四七三瘧之邪在陰未經向愈春季洞利不食想春雨外  
濕水穀內聚亦濕則濕多成五泄之謂瘡痍僅泄經隧  
濕邪而裏之濕邪未驅長夏吸受暑邪上蒙清空諸疾  
咳嗽且聾的係新邪非得與宿病同日而語

連翹

飛滑石

嫩竹葉

荷葉邊汁

桑葉

杏仁

象貝

黑山梔

程三六暑風必乘濕。濕必傷於氣分。斷瘡瘍發。卽濕邪內發  
之。微濕伏熱蘊。致氣壅塞。咽底膀胱中及至進穀無礙。二

便通調中下無病顯然

白通草

西瓜翠衣

活水蘆根

苡仁

吳連朝。熱必有暑氣內侵頭熱目暝吸短神迷此正虛邪痺清補雨難先與益元散三四錢用嫩竹葉心錢煎湯涼用三四小杯常用菉豆煎湯服。

龔六暑必挾濕一著皆傷氣分從鼻吸而受必先犯肺乃上焦病治法以辛涼微苦氣分上焦虛則愈惟平胃以陶書六經看病仍是與風寒先表後裏之藥致邪之在上漫延結錮四十餘日不解非初受六經不須再辨其謬經云病自上受者治其上援引經義以論治病非

邪僻也。宗河間法。

杏仁 栀子皮 半夏

薑汁

白蔻

石膏 知母

竹懸

秋露水煎

又 脈搏頗安。昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當

此無汗。肌腠氣窒。至膚間皮脫如皴。猶未能全泄其邪。

風疹再發。乃濕因戰慄爲解。一月以來。病魔而肌無膏

澤。瘦削枯槁。古謂瘦人之病。慮涸其陰。陰液不充。補之

以味。然腥羶濁味。徒助上焦熱痰。無益培陰。養液。况宿

滯未去。腸胃氣尚壅鈍。必淡薄調理。上氣清爽。痰熱不

至。復聚從來三時熱病。怕反覆於病後。之復當此。九仞

幸如意畱神爲主

元參心 細生地 銀花 知母 生甘草

川貝

丹皮

橘紅  
鹽水炒  
竹漚

此煎藥方。只用二劑可停。未大便時用地冬膏。便後可用二牙湯。

泡

伏暑至深秋而發。頭痛煩渴少寐。

薄荷

淡竹葉

杏仁

連翹

黃芩

石膏

赤芍

木通

張病幾一月。猶然耳聾神識不慧。嗽甚痰粘。呼吸喉間有音。此非傷寒。暴感。皆夏秋間暑濕熱氣內鬱。新涼引



動內伏之邪當以輕劑清解。二焦柰何。醫者不曉。伏氣爲病。但以發散消食寒涼清火爲事。致冒汗消亡。真陰盡燥。舌邊赤。齒板燥裂。血邪留營。中有內閉癥癥。厥逆之變。况右脈小數。左脈弱。固在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從來頭面都是清竅。既爲邪蒙精華。氣血不肯流行。諸竅矢司聰明矣。此輕清清解。斷然也。議清上焦氣血之壅爲先。不投重劑苦寒。正倣古入肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心 元參 犀角 鐘金 橘紅蜜水  
黑梔皮 川貝 鮮菖蒲根 加竹瀝  
炒

又 昨進清上焦法。諸症雖然。而神識猶未清爽。總由病久。陰液內耗。陽津外傷。聰明智慧之氣。俱被濁氣蒙蔽。所以子後午前。稍清他時。皆不清明。以陽盛時人身應之也。擬進局方。至寶丹。藉其芳香。足以護陽逐邪。庶無內閉外脫之虞。

至寶丹每服三分。燈心嫩竹葉湯送。

又 脈右緩大。左弱面垢色已減。痰嗽不爽。長由胃中津液爲辛散溫燥所傷。心營肺衛悉受熱焰蒸迫。致神呆喘急耳聾。清陽阻滯。九竅不利。首方宜解氣血。繼方芳查通竅。無形令其轉旋。三焦自有專司。豈與俗醫但睡。

邪滯攻擊而已。今已獲效，當與清養。胃陰肺氣體素豐，盛陽弱，不耐沉寒。然深秋冬交，天氣降，則上焦先受。誠觀霜露下垂，草木皆改容色，在氣交法平天地，毋采。

體質施治

枇杷葉

炒黃川貝

橘紅

茯苓

苡仁

暑風  
傷肺

玉

暑風熱氣入肺，上熱痰喘嗽

石膏

連翹

竹葉

杏仁

桑皮

苡仁

橘紅

生甘草

又肺氣壅遏，身熱喘咳少。葷莖、合草、慈大棗湯。



某 暑風外襲。肺衛氣阻。頭脹咳嗽。畏風微熱。防作肺癰。

絲瓜葉 大杏仁

香薷

桔梗

連翹 六一散

某

舌灰黃。頭痛咳嗽。左肢掣痛。此煩勞陽動。暑風乘虛。

裏入最慮風動中厥。

鮮荷葉

三錢

鮮蓮子

五錢

茯神

一錢

益元散

一錢

川貝母

半錢

橘紅

一錢

楊女 暑熱穢濁。阻塞肺部。氣痽腹滿。宜以輕可去實。

西瓜翠衣 白通草

活水蘆根

生苡仁

臨好加入石膏。未二錢。

周三暑風熱神呆

鮮荷葉

苦丁茶

滑石

木通

杏仁

厚朴

廣皮

郁六暑熱頭脹咳嗽痛

鮮荷葉

杏仁

射干

橘紅

桑皮

桔梗

木通

渭石

暑熱  
阻氣  
中痞  
不寐

胡 不飢不食不便此屬胃病乃暑熱傷氣所致味變酸  
濁熱痰聚脘苦辛自能泄降非無據也

半夏瀉心湯去甘草乾薑加杏仁枳實

王 身熱自汗腹痛大小便不利脈虛右大左小暑熱內



閉。擬和表裏法。

自汗不適用此

薄荷

枳實

黃芩

生白芍

竹葉心

黑山梔

通草

甘草

程四穢熱由清竅入直犯募原初頭痛肌脹令不飢渴悶二

以苦辛寒法

杏仁

半夏

厚朴

橘紅

竹藥

黃芩

滑石

橘紅

又脈虛舌赤消渴伏暑鬱氣過衛人營治在手厥陰

竹葉

犀角

生地

麥冬

元參

某六舌黃脫悶頭脹口渴溺短此吸受穢氣所致

飛滑石

三錢

白蔻仁

七分

杏仁

三錢

厚朴

一錢半

通草

一錢半

廣皮

一錢半

某二三穢暑吸入內結募原。膀悶腹痛便泄不爽。注宜芳香。

逐穢以疏中焦爲主。

藿香根

杏仁

厚朴

茯苓皮

半夏麵

廣皮

香附

麥芽

楊秋暑內燥煩渴。臺灣得冷飲脈右小弱者。暑傷氣分脈必芤虛也。此非結胸症。宜辛寒以徹裏邪。

石菖

知母

厚朴

杏仁

半夏

薑汁



南京中医药大学图书馆版权所有

沈二脈小色曰。氣分不足。兼之胃弱少食。聞穢濁要刮廓。  
陰柔之藥妨胃助濁。常以猪肚丸養胃。入夏令熱更傷  
氣。每食遠進生脈四君子湯一劑。恪守日服。附杜良等  
客暑之侵。生脈四君子湯。長服猪肚丸。  
下二春夏必吞酸肢痠麻木此體虛不耐陽氣升泄乃熱  
傷氣分爲病。宗東垣清暑益氣之議。

人參 黃芪 白朮 甘草  
五味 青皮 陳皮 澤瀉  
升麻 黃柏 歸身 神曲  
葛根

任二沖年真陰未長。逢長夏濕熱交迫。斯氣憊煩倦當靜。

坐涼爽過月涼颸至炎熱去乃御病之期與清暑益氣  
之屬 淸暑益氣法

徐十  
徐四 長夏濕熱分行肢起膿窠煩倦不嗜食此體質本怯  
而濕與熱邪皆傷氣分當以注夏同參用清暑益氣法。  
力用再垣然其氣雖亂無能不往法也

人參

白朮

廣皮

五味

麥冬

川連

黃柏

升麻

葛根

神麃

麥芽

穀芽

乾荷葉汁泛丸

麥冬

煩勞  
傷暑  
胃虛

施四 以煩勞傷陽交長夏發泄令加見症都是氣弱亦熱  
傷氣也煩渴有痰先治其胃蓋陽明經脈主乎東筋骨  
以流利機關耳。金匱麥門冬湯

以流利機關耳。

金匱麥門冬湯

吳 診脈肝膽獨大。尺中動數。先天素弱。水虧木少。滋榮當春深長。夏天地氣機泄越。身中煩倦食減。皆熱傷元氣所致。進以甘酸。充養胃陰。少俟秋肅大降。培植下焦。固納爲宜。

炒麥冬、木瓜

北沙參

生甘草

烏柏

暑入  
心營

程

暑久入營。夜寐不安。不飴微啜。陰虛體質。議理心用。

鮮生地

元參

川連

銀花

連翹

丹參

顧十  
三陰虛遺熱。小便淋瀝。近日冒暑。初起寒熱頭痛。汗出不解。肌肉麻木。手足牽強。神昏如寐。成瘡則輕。瘻厥則

重

犀角 元參

石菖蒲 滑石

小生地 連翹心 竹葉心

化生黃丸二服

某初病伏暑傷於氣分。微熱渴飲邪犯肺也。矣。治邪張逆走膻中。遂舌絳縮。小便忽閉。鼻燥裂血。口瘡耳聾。神呆。由氣勞之邪。熱漫延於血分矣。夫肺主衛。心主營。營衛二氣。晝夜行於經絡之間。與邪相遇。或涼或熱。今則入於絡津液被劫。必漸昏寐。所謂內閉外脫。

解生地

連翹

元參

犀角

石菖蒲

金銀花

暑風入營

汪

暑風久入營絲微熱忽涼議用王女煎。

王女煎去麥冬牛膝加丹皮竹葉。

暑病久延傷液

金

熱止津津汗出伏暑已解只因病魔自人平素積勞。

形色脈象虛衰深慮變病今飲食未進寤寐未寧議以

飲液補虛。

人參

茯神

麥冬

五味

炒白芍

塊辰砂一兩編裏同煎

又

熱久胃什被劫不飢不便亦病後常事耳古人論病

必究寢食今食未加餐難寐神識未清爲病傷元氣而

熱病必消燬真陰議用三才湯意。

暑熱  
深入

劫陰

顧

人參

天冬

生地

麥冬

五味子

右脈空大。左脈小。芤寒。熱麻痺。腰痛。冷汗。平素積勞。內虛。秋暑客邪。遂干臟陰。致神迷。心熱煩躁。劫陰似平。略爽。病不肯解。此非經絡間病。頗慮熱深劫陰而爲症。厥張司農集諸賢論暑病。謂入肝則麻痺。入腎爲消渴。此其明徵。議清陰分之邪。仍以養正輔之。

阿膠

小生地

麥冬

人參

小川連

烏梅肉

暑濕  
瀉漫

三焦

某暑濕熱氣觸入上焦孔竅。頭脹悶。不飢。腹痛惡心。延久不清。有瘧痢之憂。醫者不明三焦治法。混投發散。

消食宜乎無效。

杏仁

香豉

橘紅

黑芷梔

半夏

厚朴

滑石

黃芩

張

舌白罩灰黑胸脘痞悶潮熱嘔惡煩渴汙出自利伏

暑內發三焦珍受然清理上中爲要。

杏仁

滑石

黃芩

半夏

厚朴

橘紅

黃連

鬱金

通草

某二暑熱鬱遏頭脹脘痛口渴溺短當清三焦

絲瓜葉

飛滑石

淡竹葉

茯苓皮

厚朴

藿香

廣皮

通草

何暑濕皆客邪也原無質故初起頭脹胸滿但傷上焦氣分耳酒家少穀胃氣素薄一脈消導雜以辛散蒙蔽胃再傷殘在上濕熱延及中下遂協熱自利。焦邪蒸氣衝塞填胸躁亂白渴瓜菓下脘格拒相鬪此中宮大傷兄進熱飲略受其爲冒陽殘憊而邪結內踞可知矣考暑門時風煩躁清濁交亂者昔賢每以來復丹五六十粒轉運清濁爲先攻補難施之際望其效靈耳

來復丹

吳目黃脫悶咽中不爽嘔逆寒少熱多暑濕客氣之傷三焦不通非風寒之症

大竹葉 黃芩

杏仁 滑石

陳皮

厚朴 半夏

薑汁

又暑濕熱皆氣也並釀薑濁痰於胃遂口甜膩滯不飢  
議以宣氣理痰

川貝母 桔梗皮 杏仁 黑山梔 澤瀉

另用二賢散

昇

四

診脈弦午後惡寒似熱不飢渴濁短赤暑熱炎蒸外

龍肅衛遊行三焦致氣分壅瘧而然當用和法宜薄滋一  
味庶杜瘧患

杏仁

香薷

八通

飛滑石

茯苓

厚朴

白蔻仁

淡竹葉

又照前方去香薷加半夏

楊八暑熱必挾濕吸氣而受先傷於上故仲景傷寒先分六經河間溫熱須究三焦大凡暑熱傷氣濕著阻氣肺主一身周行之氣位高爲手太陰經據逆病症面赤足冷土膀胱塞其爲上焦受害顯著緣平素善飲胃內濕熬久伏辛溫燥烈不但肺病不合而胃中濕熱得燥熱鋼閉下利稀水卽協熱下利故黃連苦寒每進必利甚者苦寒以勝其辛熱藥味尙留於胃底也然與初受之肺邪無當此石膏辛寒辛先入肺知母爲味清涼爲肺

之再氣然不明肺邪徒曰生津焉。至理昔孫真人未  
診先問最不悞事。再據主家說及病起兩日從無汗泄  
經云暑當汗出勿止氣分壅塞日久熱侵入血中。客於  
帶血舌紅赤不甚渴飲上焦不解漫延中下此皆急清  
三焦是第一章旨故熱病之瘀熱留絡而爲遺毒注腑  
腸而爲洞利便爲束手無策再論濕乃重濁之邪。蓋爲  
蒸蒸之氣熱處濕中蒸溼之氣上迫清竅耳爲失曉不  
與少陽互讐同例青蒿減柴胡一等亦是少陽本藥且  
大病如大敵選藥若選將苟非慎重鮮克有濟議三焦

分清治從何簡法初三日

飛滑石

生石膏

寒水石

大杏仁

炒黃芩茹

川通草

掌白金汁

金銀花露

又暮診。診脈後。腹胸肌腠發燒癢。喘氣分湯熱。原有肺泄之機。早間所談。餘邪遺熱。必兼解毒。善爲此。下午進藥後。診脈較大於早晨。神識亦如前。但舌苔中心甚乾燥。身體捫之熱甚於早間。此陰分亦被熱氣蒸傷。瘦人慮其痰涸然。瘍咯不情。養陰藥無往而非。賦帶議得早。進清膈一劑而二焦熱減。之蓄冒用紫雪丹一二匙。藉其芳香宣竅逐穢。斯錮熱可解。濁痰不粘。雖此調理之方。清營分滋胃汁。始可嚥顧。其宿垢欲去。猶在旬日之。

外古人謂下不嫌退。非臆說也。

紫雪丹一錢六分

知母

竹葉心

連翹心

炒川貝

犀角

元參

金汁

銀花露

又

一劑後用

竹葉心

知母

蕤豆皮

元參

鮮生地

金銀花

又

一劑後去銀花蕤豆皮加入薑蓼冬

又

初十日刻診經月時邪脈形小數小爲病退數爲餘  
熱故皮腠微氣血有流行之義思食欲餐胃中有醒  
豁之機首佳兆也第舌赤而中心黃苔熱蒸既久胃津



陰液得傷致嚥物咽中若阻渴澀尿管猶痛咯痰濃厚宿垢未下若急遽攻奪恐真陰更涸矣此存陰爲本而清腑兼之故亂進食物便是助熱惟清淡之味與病不悖自來熱病最怕食復勞復舉世共聞非臆說也

細生地

元參心

知母

炒川貝

麥冬

地骨皮

銀花露

竹礎

又 脈症如昨仍議滋清陰分餘熱佐清上脘熱痰

照昨日方去地骨皮銀花露加鹽水炒橘紅

某 脉虛傷暑頭重脘悶跗癢

絲瓜葉

錢

大杏仁

三錢

六一散

三錢

茯苓皮

三錢

寒防已

一錢半

細辛陳

二錢

細木通

一錢

白蔻仁

五分

暑厥

果

申惡暑厥

蒼朮白虎湯加滑石

暑瘵

王

暑邪寒熱舌白不渴吐血此名暑瘵重症

西瓜翠衣

竹葉心

青荷葉汁

飛滑石

苡仁

杏仁

此症總有  
薦熱在內  
立此等方  
貽悞後人  
不少此者

暑別  
人厥  
陰

萬

暑邪不解陷入厥陰舌灰消渴心下板實嘔惡吐衄  
寒熱下利血水最危之症

川連

黃芩

乾薑

生白芍

川椒

烏梅

人參

根實

偶一爲之  
近人則一  
概用此法

矣

江 暑邪深入厥陰舌縮少腹堅滿聲音不出自利上下

格拒危期至速勉擬暑門酸苦泄熱輔正驅邪一法

黃連

淡乾薑

烏梅

生白芍

半夏

人參

枳實

暑症

其八十勞傷挾暑肺氣受戕咳血口乾先清暑藥

鮮荷葉

白扁豆

大炒參

灰神

西石

朱三伏中陰氣不生陽氣不潛其頭脹身痛是暑邪初

受暑濕熱必先傷氣分故舌白口渴身痛早晨清爽午

夜煩蒸狀如溫瘧体浴綻動血絡宿病得時邪而來仲

景云先治新病後理宿病是亦陰氣先傷陽氣獨發也

鮮生地

石膏

知母

元參

此說甚過

連翹

竹葉心

荷葉汁

膩補

杏仁

象貝母

磁金

桑葉

石膏

橘紅

苡仁

川蓮草

又 晚服枇杷葉膏 早六味加阿膠麥冬

又

阿膠

小生地

麥冬

桑葉

炒黑丹皮

徐二勞傷挾暑，咳血不飢。

鮮荷葉汁

沖大沙參

生苡仁

六一散

菉豆皮

杏仁

橘紅

白蔻仁

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在蒸溼熱道之中。若正氣設或有隙。則邪從口鼻吸入。氣分先阻。上焦清肅不行。輸化之機失於常度。水穀之精微亦蘊結而爲濕也。人身一小天地。內外相應。故暑病必挾濕者。卽此義耳。前人有因動、因靜之分。或傷或中之候。以及入心入肝爲瘧。爲痢。中痧霍亂。暴厥卒死。種種傳變之原。各有精義可繫。茲不重悉。想大江以南地卑氣薄。濕勝熱蒸。當此時候。更須防患於先。昔李笠

翁記中所謂使天只有三時而無夏則人之病也必稀此語最確蓋暑濕之傷驟者在當時爲患緩者於秋後爲伏氣之疾其候也脈色必滯口舌必膩或有微寒或單發熱熱時脘痞氣窒渴悶煩躁每至午後則甚入暮更劇熱至天明得汗則諸恙稍緩日日如是必要兩三候外日減一日方得全解倘如元氣不支或謂理非法不洽者甚多然是病比之傷寒其熱覺緩比之瘧疾寒熱又不分明其變幻與傷寒無二其愈期反覺纏綿若表之汗不易徹攻之便易溏瀉過清則肢冷嘔惡過燥則唇齒燥裂每遇秋來最多

是症求之古訓不載者多獨已任編名之曰秋時晚  
發感症似瘧總當以感症之法治之要知伏氣爲病  
四時皆有但不比風寒之邪一汗而解溫熱之氣投  
涼節安夫暑與濕爲重蒸粘膩之邪也最難驅愈若  
治不中欬暑熱從陽上薰而傷陰化燥濕邪從陰下  
沉而傷陽變濁以致神昏耳聾舌乾齶血脫瘡瘍惡  
洞泄肢冷棘手之候叢生竟至潰敗莫救矣叅先生  
用意宗劉河問三焦論立法認明暑濕二氣何者爲  
重再究之病實在營氣何分大凡六氣傷人因人而  
化陰虛者火旺邪歸營分爲多陽虛者濕勝邪傷氣

分爲多一則耐清一則耐溫。臟性之陰陽。從此可知也。於是。在上者以辛涼微苦。如竹葉連翹。杏仁薄荷之類。在中者以苦辛宣通。如半夏瀉心之類。在下者以溫行寒。性質重開下。如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之太意也。或有所夾。又須通鑑。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法。及天水散。意溫者從乎二陳湯。及正氣散。法理營分。知清補之宜。清者如犀角地黃。加入心之品。補者有三才復脈等方。又如濕熱沉混之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女法。開閉逐穢。與牛黃及至寶紫雪等劑。跌盧進夾附。及兩儀諸

法隨其變幻審其陰陽運用之妙存乎心也附驥華

詞高明教止

邵新甫

所列諸案皆平素伏暑之症爲多其卒然受暑之病惟小  
若卒受之症則當以香茹飲爲主不可不知也  
此老治暑邪能用輕清涼潤之品以和肺是其所長但是  
邪深入必有悶亂煩躁等症近於霍亂此則更有治法至  
於病重症危屬熱邪橫逆不但人參不可輕用而桂附乾  
薑服之無小立斂乃亦倣仲景傷寒壞症治法輕於一試  
當時不知有害與否而耳食之徒竟以爲必用之藥託々  
本於此老我見死者甚多傷心慘目不得不歸咎於作俑

之  
人  
也



# 濕

濕阻  
上焦  
肺不  
肅降

馮三舌白頭眼身痛肢疼胸悶不食湯阻當開氣分除濕  
一舌白頭眼身痛肢疼胸悶不食湯阻當開氣分除濕

飛滑石

杏仁

白蔻仁

炒半夏

白通草

王仁酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺  
不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣  
化也

半夏 厚朴  
杏仁 粥葉皮  
白蔻仁 飛滑  
白蔻仁 飛滑



吳王酒客濕勝變痰化火性不喜醋熱聚胃口犯肺氣逆  
吐食上中濕熱王以淡滲佐以苦溫

大杏仁 金石斛 飛滑石 紫厚朴  
孔 心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩 連翹 炒杏仁 白通草  
滑石 野赤豆皮

濕溫  
阻肺

某二濕溫阻於肺衛咽痛足跗痛痛當清七焦濕走氣自和。

利。

飛滑石

竹葉心

連翹

桔梗

射干

蘆根



周 痘起旬日，猶然頭脹漸至耳聾。正如內經病能篇所云：因於濕，首如裹。此呃或鼻竅皆邪混氣之象。況舌色帶白，咽喉欲閉，邪阻上竅空虛之所諒，非苦寒直入胃中可以治。病名濕溫，不能自解，卽有昏瘡之變。醫莫泛稱時氣而已。

連翹

牛蒡子

銀花

馬勃

射干

金汁

南京中藥公司圖

濕熱  
穢氣  
阻竅

李三時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道，遂致清肅不行，不飢不食，但溫乃化熱之漸，致機竅不爲靈動，與形質滯濁有別。此清剤開鬱必佐芳香以逐穢，爲注。

枯萎皮

桔梗

黑山梔

香豉

枳殼

鬱金

降香末

某吸受穢邪。募原先病。嘔逆。邪氣分布。營衛皆受。遂致

蒸頭脹身。痛經旬。神識昏迷。小水不通。上中下三焦火

病舌白渴不多飲。是氣分壅塞。當以芳香通神。淡竹葉宣

竅。俾穢濕濁氣。由此可以分消。

苡仁

茯苓皮

猪苓

通草

淡竹葉

牛黃丸一丸

大腹皮

穩

吳 濕邪中傷之後。脾胃不醒。不飢口渴。議清養胃津爲



鮮者頭草

知母

川斛

炒麥冬

濕溫  
邪入  
心胞

張姬

體壯有濕近長夏陰雨潮濕著於經絡身痛自利發

熱仲景云濕家大忌發散汗之則變癇厥脈來小弱而緩濕邪凝遏陽氣病名濕溫濕中熱氣橫冲心胞絡以致神昏四肢不緩亦手厥陰見症非與傷寒同性也

犀角

連翹心

元參

石菖蒲

金銀花

野赤豆皮

煎送至寶丹

濕熱  
內陷

察陽虛挾濕邪熱內陷所以神識如蒙議用瀉心法

人參

生乾薑

黃芩

川連

枳實

生白芍

脾陽

張一

此濕蘊氣中。足太陰之氣。不爲鼓動。運行試以痞結。

胸滿。仲景列於太陰篇中。概可推求其理矣。

半夏

醋炒

茯苓

川連

厚朴

通草湯前

周

濕傷脾陽。腹膨小溲不利。

茅术

厚朴

茯苓

澤瀉

猪苓

秦皮

又

五苓散

又二术膏

范

四肪仁冷自利未已。目黃稍退而神倦不語。濕邪內

伏足太陰之氣不運。經言脾竅在舌。邪滯竅必少靈。以致語言欲蹇。必當分利。佐辛香以默運坤陽。是太陰裏。

症之法

生於木錢

厚朴 五分

茯苓 三錢

草菓

木瓜 五分

惺鴉 五分

此等症多  
由風痰盤  
踞上焦所  
致概以清  
濕之法治  
之恐有未  
當

又 身體稍稍轉動語蹇神呆猶是氣機未爲靈轉色脈  
非是有餘而濕爲陰邪不徒偏寒偏熱已也

生於木

茯苓

苡仁

鬱金

炒達志

石菖蒲汁

又 脾胃不醒皆從前濕蒸之累氣升咳痰參藥緩進  
炒黃川貝 茯苓 茯苓 茯苓

地骨皮

淡竹葉

苡仁

鬱金

又 濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口數白滑仍不渴

飲開主鬱佐中運利腸間亦是宣通三焦也

生於木

五錢

苡仁 三錢

寒水石 一錢

半 橘梗 七分

猪苓 一錢

澤瀉 一錢

廣皮白 一錢

半

曹二

腸胃屬腑濕久生熱氣阻不爽仍以通爲法

生於木

川黃連

厚朴

淡生薑

廣皮白

酒煨大黃

水法丸服三錢

李四

脈小濶瘀多上湧食入脘阻大便不爽上秋至今夏

不愈自述飢飽失和曾病黃疸以濕傷氣痘主治

大杏仁

苡仁

半夏

薑汁

茯苓

補紅

鬱金

杏仁

前五酒濕鬱傷脫中食阻而痛治以辛苦寒。

小川連

半夏

薑汁

茯苓

香豉

枳實

庚九

舌白日黃口渴溺赤脈象呆鈍此屬濕鬱

縣茵陳三錢

生白朮一錢

寒水石三錢

飛滑石一錢

桂枝木錢

茯苓皮三錢

木猪苓三錢

澤瀉一錢

李

酒客中虛勞地潮濕長夏涉水外受之濕下起水穀  
不運中焦之濕內聚治法不以宣通經脈致濕阻氣分  
鬱而爲熱自脾胃不主運通水濕橫滯於脈腠之間二

便不爽濕熱濁氣交扭混亂。前輩治中滿必曰分消。此分字明明謂分解之義。但亂藥既多不能去病。耽誤脾胃。受傷於藥蔓延腿肢腫極且痛。病深路遠。藥必從喉入胃。然後四布。病所未得藥益。清陽先已受傷。此陽藥難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢。專以疏利腸來。取其不致流散諸經。亦一理也。小溫中丸八服。氣機升降自安。

某六陽微體質濕痰內聚。便溏脘悶。肌麻舌乾。清理濕邪。

金石斛

茯苓

半夏

廣反白

鈎藤

白蒺藜

張脈右緩著阻氣

厚朴 廣皮

煨草葉

炒神曲

藿香梗

炒杏肉

某不耐煩勞是本虛。脾便泄屬濕邪。先治濕後治火。

藿香梗

廣皮

茯苓

大腹皮

厚朴

穀芽

陸 濕滯如痞

山茵陳

草果仁

茯苓皮

大腹皮絨

厚朴

廣皮

猪苓

澤瀉

注：舌黃脫悶，痰濕內著氣機不宜。如久釀蒸必化熱氣。



即有身熱之累

杏仁

藿香

茯苓皮

石膏

厚朴

廣皮白

某

閑病源。

熱者暑也。

皆濕熱內停之象。當走濕清熱爲主。至於藥

酒蘊濕助熱。九當水戒。

生白术

赤小豆皮

暎茵陳

黃柏

茯苓

澤瀉

某。脈濡頭脹。胸身重著而痛。寒熱微嘔。此濕阻氣分。

厚朴

杏仁

白蔻仁

木通

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

某長夏外受暑濕與水穀之氣相併上焦不行下脫不  
通氣阻熱從濕下蒸逼不飢不食目黃舌白氣分結

厚朴

杏仁

廣皮

茯苓

半夏

薑汁

某脈緩身痛汁出熱解繼而復熱此水穀之氣不進濕  
復阻氣鬱而成病仍議宜通氣分熱自濕中而來遂進  
清熱不應

黃芩

滑石

茯苓皮

大腹皮

白蔻仁

通草

猪苓

方四形質頽然脈遲小濶不食不寐腹痛大便窒瘦平昔

嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰鳩聚爲痛

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 蔡曰

調入猪膽汁一枚

王五冷濕損陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致

桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫卜今年夏四月寒熱不飢是時令潮溼氣蒸內應脾胃

夫濕屬陰晦必傷陽氣。吞酸形寒乏陽運行。議鼓運轉

旋脾胃一法 茶薑木桂湯

某六地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易復畏寒筋骨

猶牽強無力以金匱茶薑木桂湯

陳五濁凝氣結有形酒內挾濕

一、

草薢

生香附汁

木香

草果

茯苓

廣皮白

江

脈緩。臍上痛。腹微膨。便稀。溺短不爽。此乃溫鬱脾胃之陽。致氣滯裏急。宗古人導濕分消用桂苓散方。

生茅术

宮桂

茯苓

厚朴

廣皮白

飛滑石

猪苓

澤瀉

炒查肉

林五  
二中年清陽日薄。忽然院中痞悶。乃清陽不自轉旋。酒

肉濕濁之氣。得以凝聚矣。過飲溏瀉。濕傷脾胃。胃陽微伸。景法以輕劑宣通其陽。若投破氣開降。最傷陽氣。有

附錄 卷三  
格拒之害 荸桂木甘湯

嚴三胸滿不飢。是陽不運行。嗜酒必挾濕凝阻其氣。久則三焦皆閉。用半硫丸二便已通。議治土焦之陽。

芩桂木甘湯

王六病人逃病中厚味無忌。腸胃滯雖下而留濕未解。濕重濁令氣下墜於肛。肛墜痛不已。胃不喜食。陽明失閑舌上有曰腐形色。議劫腸胃之濕。  
腹痛不宜

燥補之劑  
大腸有熱不得用

生夢朮

人參

厚朴

廣皮

炮薑灰

生炒黑附子

胡十二受濕惡瘡入瘡陽乏氣泄半年淹淹無力食少愛噫

難化此脾胃病法以運中陽爲要

茯苓

桂枝

生於朮

炙草

汪

夏令脾胃司氣兼以久雨泛濫地中濕氣上于食味

重濁少蓮所謂濕勝成五泄也古云寒傷形熱傷氣甚

種夏至天漸熱宜益氣分以充脾胃此夏三月必有康

健之理 補中益氣湯

某子穢濕邪吸受由募原分布三焦升降失司脘腹脹悶  
大便不爽當用正氣散去

藿香梗

厚朴

杏仁

廣皮白

濕邪  
濕邪  
三焦

茯苓皮

神麃

麥芽

縣茵陳

蔡仲景云。小便不利者爲無血也。小便利者血症滿也。  
此症是暑濕氣蒸三焦。瀰漫以致神昏。乃諸般阻塞之  
兆。至小腹硬濕。大便不下。全是濕鬱氣結。彼分醫猶然  
以滋味呆鈍。滯藥與氣分結邪。相反極矣。議用甘露飲  
法。

猪苓

浙茯苓

寒水石

晚蠶沙

早葵子

去皮

某。腕悶便溏。身痛。脈象模糊。此屬濕蘊三焦。

厚朴

廣皮

藿香梗

茯苓皮

大豆黃卷

木防已

川通草

苡仁

牛 向年積聚悞服燥熱諸藥頻與清奪推陳致新乃安

身處江南濕熱之鄉飲啖仍用山石濃羣之味畱然由

腸升膈三焦不清議攻無形之熱

清心涼膈去芒硝加葛蒲

酒濕  
胃癰  
傷陽  
蠶牛

韓一冷酒水濕傷中上嘔食下泄脂液陽氣傷極再加澤

腫作脹則危

人參

茯苓

熟附子

生於朮

生白芍

生薑

又 酒濕類聚例以分利診脈微陽氣已敗濕壅生熱至  
胃癰膿清熱則陽亡卽死丸芩運中祛濕佐附逆走氣



附錄一法

茯苓

熟附子

生白朮

左牡蠣

澤瀉

車前子

陽衰  
濕傷  
脾腎

龐四

濕久脾陽消乏。中年未育子。腎真亦憊。安腎丸。

此不得兼治。

鹿茸

胡蘆巴

附子

韭子

赤石脂

補骨脂

真茅丸

茯苓

菟絲子

大茴香

張五

陽傷瘦弱。有濕麻痺。痔血。

生白朮

附子

乾薑

茯苓

某八

舌自身痛。足跗浮腫。從太谿穴水流如注。此濕邪伏於足少陰。當用溫蒸陽氣爲主。

肝胃  
濕熱

楊

厥陰爲病必錯雜不一瘧病之後肝臟必虛發症

腸有痞腹中塊礪外堅脇下每當汨汨有聲惡虛就實

常有寒熱胃中不知飢而又嗜雜吞酸脈長而數顯然

厥陰陽明濕熱下滲前陰縮而爲濕熱症也讓用升

發陽明胃氣滲泄厥陰濕熱其症自愈

蒼朮

半夏

茯苓

橘紅

通草

當歸

柏子仁

炒粳米

川棟子

茴香

卽丸方

溫鬱  
肢節

補氏胸膈迷漫胃痛嘔食肢節屈曲處令痛經落後來時

痘

臨證指掌醫案

卷五

三

周身腰脊不舒脈弦沉痛即便瘡此濕鬱阻閉氣血不行用藥先須斷酒

生茅朮 炮黑川鳥 薑汁

厚朴

廣皮

薑機

茯苓

白芥子

大黃

中

普

1651

濕熱  
人經  
絡爲  
脾

徐溫瘧初愈驟進濁膩食物濕聚熱蒸蘊於經絡寒戰熱熾骨骱煩、疚舌起灰滯之形面目癰黃色顯然濕熱爲瘴仲景謂濕家忌投發汗者恐陽傷變病蓋濕邪重著汗之不却是苦味辛通爲要耳

防已

杏仁

滑石

醋炒半夏

連翹

山梔

苡仁

野赤豆皮

某<sup>四</sup>風暑濕渾雜氣不主宣咳嗽頭脹不飢右肢若廢法

當通陽驅邪

杏仁三錢

苡仁三錢

桂枝五分

生薑七分

厚朴一錢

半夏一錢

漢防已一錢

白蒺藜二錢

方案重複  
今閱者生  
厭編者  
意欲何爲

濕鬱經脈病

某汗多身痛自利小溲全無胸腹白疹此風濕陽於氣

分醫用血分涼藥希冀熱緩殊不知濕鬱在脈爲痛濕

家本有汗不解

苡仁

竹葉

白蔻仁

滑石

茯苓

川通草

濕爲重濁有質之邪若從外而受者皆由地中之氣

治濕不用燥熱之品皆以芳香淡滲之藥疏肺氣而和膀胱此爲良法惟

垢上之方未備則於

固本之法猶有缺耳

升騰從內而生者皆由脾陽之不運雖云霧露雨濕上先受之地中潮濕下先受之然霧露雨濕亦必由地氣上升而致若地氣不升則天氣不降皆成燥症矣何濕之有其傷人也或從上或從下或遍體皆受此論外感之濕邪著於肌軀者也此雖未必即入於臟腑治法原宜於表散但不可大汗耳更當察其兼症若兼風者微微散之兼寒者佐以溫藥兼熱者佐以清藥此言外受之濕也然水流濕火就燥有同氣相感之理如其人飲食不節脾家有濕脾主肌肉四肢則外感肌軀之濕亦漸次入於臟腑矣亦有外不

受濕而但濕從內生者必其人膏梁酒醴過度或嗜飲茶湯之多或食生冷瓜菓及甜膩之物。古去懲宜辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之清若其人色蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易於化熱若內生濕邪多因膏梁酒醴必患寒熱濕熱之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外感濕邪不易化熱若肉生之濕多因茶湯生冷大過必患寒濕之症人身若一小天地今觀先生治法若濕阻上焦者用開肺氣佐淡滻通膀胱是即啓上闢開支引導水熱下行之理也若脾陽不運濕滯中焦

者用木利薑半之屬以溫運之以芩澤腹皮燭石等  
滲泄之亦猶低窓濕處必得烈曰曬之或以剛燥  
土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以苦辛寒  
濕熱以苦辛溫治寒濕。槩以淡滲佐之或再加風藥  
甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無  
寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自  
無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃  
疸泄瀉淋閉痰飲等類俱於各門兼參之可也。華岫  
雲

燥

氣分熱

某

脈右數大議清氣分中燥熱

桑葉

杏仁

大沙參

香豉

黑梔皮

夏熱秋燥致傷都因陰分不足

冬桑葉

玉竹

生甘草

白沙參

生扁豆

地骨皮

麥冬

花粉

火鬱  
上焦

果

燥火上鬱齦脹咽痛當辛涼清上

薄荷梗

連翹殼

生甘草

黑梔皮

桔梗

菉豆皮

心陽過動傷液

王七老人舌腐肉消肌枯心事繁冗陽氣過動致玉液皆涸而爲燥冬月無妨夏月深處林壑心境凝然可以延年每早服牛乳一杯

胃陰虛

陳秋燥復傷宿恙再發末可補濬姑與甘藥養胃  
麥冬玉竹北沙參生甘草

茯神

糯稻根鬚

治肺下治腎

某上燥治氣下燥治血此爲定評今陽明胃腑之虛因

久病嘔逆投以辛耗破氣津液劫傷胃氣不主下行致腸中傳送失常經云六腑以通爲補半月小效全在一

通補工夫。豈徒理燥而已。議甘寒清補。冒陰

鮮生地

天冬

人參

甜梨肉

生白蜜

熱劫  
陰液

張

脈數虛舌紅口渴上齶乾涸腹熱不飢比津液被劫

陰不上承心下溫溫液液用炙甘草湯。

炙甘草

阿膠

生地

麥冬

人參

麻仁

生地

某氏心中煩熱正值經來面熱渴不已若清肺氣大謬用復脈法。

炙甘草

生地

阿膠

麥冬

棗仁

蔗漿



某陽津陰液重傷。餘熱淹留不解。臨晚潮熱舌色苦赭。頻飲救亢陽焚燎。究未能解渴。形脈俱虛。難投白虎議。以仲景復脈一法。爲邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰少。甦冀得胃關復振。因左關尺空數不藏。非久延所宜耳。

人參

生地

阿膠

麥冬

炙草

桂枝

生薑

大棗

燥爲乾濇不通之疾。內傷外感宜分。外感者由於天時風熱過勝。或因深秋偏亢之邪。始必傷人上焦氣分。其法以辛涼其潤肺胃爲先。喻氏清燥救肺湯及

先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也。內傷者乃人之本病。精血下奪而成。或因偏餌燥藥所致。病從下焦陰分先起。其法以純陰靜藥。柔養肝腎爲宜。大補地黃九味丸之類是也。要知是症。大忌者苦澀最害者。甘柔若氣分失治。則延及於血。下痢失治。則槁及乎土。喘咳痿厥。三消噫膈之萌。總由此致。大凡津液結而爲患者。必佐辛通之氣。味精血竭而爲患者。必藉血肉之滋填。在表佐風藥而成功。在腑以緩通爲要務。古之滋燥養營湯。潤腸丸。五仁湯。瓊玉膏。一炁丹。牛羊乳汁等法。各有耑司也。邵新甫

有因風而燥當兼治風案中未備



南京中國醫藥大學圖書館藏

# 疫

朱

癘邪  
入腑  
漸于  
心胞

疫癘邪從口鼻吸受分布三焦瀰漫神識不是風寒客邪亦非停滯裏症故發散清導即犯津之戒與傷寒六經大不相同今喉痛丹疹舌如硃神躁暮昏受穢邪逆走膻中當清血絡以防結閉然必大用解毒以驅其穢必九日外不致昏憤冀其邪去正復

犀角

連翹

生地

玄參

菖蒲

鬱金

銀花

金汁

姚

疫毒口糜丹疹喉嚨治在上焦。

犀角

鮮生地

玄參

連翹

石菖蒲

銀花

金汁

至寶丹

譚

口鼻吸入穢濁自肺系漸于心胞絡初病喉痛舌燥

最怕

竅閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯同

法。

玄參

連翹

鬱金

銀花

石菖蒲

競葉

射干

牛蒡

冲入真白金汁一杯

楊

吸入疫癟三焦皆受久則血分漸瘀愈結愈熱當以

鹹苦之藥仍是輕揚理上倣古大製小用之意。

玄參

西瓜翠衣

金銀花露

瑩白金汁

金氏人靜則神昏竊邪竟入膻王先生方甚妙愚意兼以

## 芳香宣竅逐穢 至寶丹

治時疫不  
外此等方  
若癘疫則  
一時傳染  
惡毒非用  
通靈金石  
之品虔製  
數種隨症  
施用不能  
奏效也

疫癘一症都從日鼻而入直行中道流布三焦非比  
傷寒六經可表可下夫疫爲穢濁之氣。人所以飲  
芳香採蘭草以襲芬芳之氣者重滌穢也。及其傳  
上行極而下下行極而上是以邪在上焦者爲嘔啞  
爲目暎若逆傳膻中者爲神昏舌絳爲喉痛丹疹今  
觀先生立方清解之中必佐芳香宣竅逐穢如犀角  
菖蒲銀花鬱金等類兼進至寶丹從表透裏以有靈  
之物內通心竅搜剔幽隱通者通鎮者鎮若邪入營

中三焦相溷熱愈結邪愈深者理宜鹹苦大製之法  
仍恐性速直走在下故用玄參金銀花露金汁瓜蔞  
皮輕揚理上所謂倣古法而不泥其法者也考是症  
惟張景岳喻嘉言吳又可論之最詳然宗張喻二氏  
恐有遺邪畱患若宗吳氏又恐邪去正傷惟在臨症  
權衡無盛無虛而遣人天殃方不愧爲司命矣

鄒茲九

# 癰瘍疹瘻

三焦  
伏熱

張

伏氣熱蘊三焦心凜熱發煩渴遍體赤癰夜躁不寐

兩脈數搏

羚羊角

犀角

連翹心

玄參

鮮生地

金銀花

花粉

石菖蒲

又寒熱必有形象攻觸及於胃脘之下口渴喜飲緩湯  
一癰已發現病不肯退此邪氣久伏厥陰之界矣

桂枝

川連

黃芩

花粉

牡蠣

枳實



南京中医药大学图书馆所有

濕溫

嚴 濕溫雜受身發班疹飲水渴不解夜煩不成寐病中

強食反助邪威議用涼膈疎斑方法

連翹

薄荷

杏仁

枳實汁

炒牛蒡

山梔

石膏

大黃

中醫

又

舌邊赤昏譖早輕夜重班疹隱約是溫濕

入血終

夫心主血邪干臍中漸至結閉爲昏瘡之危苦味沉寒

竟入中焦消導辛溫徒劫胃汁皆溫邪大禁議清疎血  
分輕劑以透斑更參入芳香遂穢以開內竅近代喻嘉

言申明戒律宜遵也

犀角

玄參

連翹

銀花

右鼻捕  
先煎至六分後和入雪白金丹一杯

服研入周少川牛黃丸一丸

江

溫邪發疹濕熱內蘊便閉不通先開上焦

杏仁

蘇子

桔梗反

紫苑

山梔

風溫

某

風溫發疹

薄荷

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桑皮

甘草

山梔

某

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

牛蒡子

桔梗

桑皮

甘草

山梔



南京中医药大学图书馆版权所有

熱邪  
人胞  
絡

費 暴瘡驟加伏熱更熾邪鬱則氣血壅遏癰瘍不肯外達。痰氣交阻神迷喘促慟入心胞絡中有內閉外脫憂熱往下迫自利粘膩不爽法當開其黏腺消毒解其膿中之壅必得神清方保無變。

連翹心

飛滑石

石菖蒲

炒金銀花

射干

通草

煎化牛黃丸一丸

濕熱  
鬱肺

朱十  
二  
瘡後痰多咳嗽氣急

蘆根

一兩

杏仁

半錢

桔梗

一錢

飛滑石

半錢

桑皮

八分

通草

一錢

病後  
陰傷

某 瘡後伏火未清內熱身痛

玉竹

白沙參

地骨皮

川斛

麥冬

生甘草

某 痘後熱不止陰傷

生白芍

炙甘草

生扁豆

川斛

穀芽

外寒  
內熱

草

涼風外襲伏熱內蒸秋金主令內應乎肺喘咳身熱

始而晝熱繼而暮熱自氣分漸及血分齦肉紫而肌疊

發疹辛寒清散爲是

薄荷

連翹

石膏

淡竹葉

杏仁

桑皮

苡仁



吳病在暴令而發肌表頭面不透是外蘊爲寒內伏爲熱肺病主衛衆氣分兩解爲是

麻黃

石膏

牛蒡子

杏仁

射干

桔梗

生甘草

陽明  
血熱

尹

環口燥裂而痛頭面身半以上發出癰疹赤紋乃陽

明血熱久蘊成毒瘻入偏熱頤有是症何謂醫人不識

犀角地黃湯

再加風藥九妙

溫邪

江

溫邪目利癰疹

黃芩

連翹

牛蒡子

桔梗

香鼓

薄荷

杏仁

橘紅

通草



此症乃血  
中有熱毒  
須於未發

爲妙

胃火  
鬱蒸

季二發癩熱腫獨現正面每遇九十月大發五六月漸愈

此發

七八年來如是因思夏令陽氣宣越營衛流行無間秋  
冬氣竄外侮氣血凝滯此濕熱慢無發泄方少陽本乎  
之鬱及陽明蘊蒸之濕故上焦尤甚怯以辛涼佐以  
苦寒俾陽分鬱熱得疏庶幾發作熱緩

夏枯草

鮮菊葉

苦丁茶

鮮荷葉邊

羚羊角

黑梔皮

鬱金

苡仁

風濕

唐四

五麻木忽高腫發癩必有風濕襲入皮膜乃軀殼病昔

人每以宜行通劑

此防齧瘋症

片薑黃

羚羊角

川桂枝

撫芎

半夏

白芥子

其九風塊癰癧。咳嗽腹痛。邪者表裏當用雙和。

牛蒡子 杏仁

連翹

桑枝

象兒母

煎藥送通聖丸

桔梗

癰者有觸目之色而無礙手之質。卽稠如錦紋。繖如蚊跡之象也。或佈於胸腹。或見於四肢。總以鮮紅起發者爲吉。色紫成片者爲重。色黑者爲凶。色青者爲不治。蓋有諸內而形諸外。可決其臟腑之安危。邪正之勝負也。殆傷寒。瘟疫諸症。失於宣解。邪蘊於胃腑。而走入營中。每有是患耳。考方書之。怡其法不一。大



医药大学图书馆版权所有

抵由失表而致煮。當求之汗失下而致者必取乎攻。  
火甚清之。毒甚化之。營氣不足者助其虛而和之。  
之。至於陰癆一說見象甚微。若必指定此。此之。此之。  
爲陰猶恐不能無誤。想前人此例無非。歸後人勿執。  
見症爲實熱之義也。吾故曰必參之脈。及兼證。  
妄症者。疹之通稱。有頭粒而如粟。象癆者。即瘡。屬。  
腫而易痒。須知出要周。勿宜徐緩。不外乎太陰陽。  
明之患。故繆氏耑以肺胃論治爲精也。若先生之法。  
本平四氣。隨其時令之勝。復酌以辛涼辛勝。及甘寒。  
苦寒鹹寒淡滲等法而治之。凡吾幼科諸友。於此尤。

医言未下且莫

名五

二五

嘗究心焉

邵新甫



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆版权所有

# 痰

汪八宿哮久矣不發心悸震動似乎懊憹之象此屬火  
治以宣通鬱逼勿徒呆補

半夏 川連 石菖蒲 蛤粉

茯苓 川鬱金 橘紅

竹沥薑汁法丸

劉 痰火鬱逼氣滯吸煙上熱助壅是酒肉皆不相宜古  
稱痰因氣滯熱鬱治當清熱理氣爲先

川連 半夏 白朮 枳實 厚朴

茯苓 淡薑湯泛丸



沈三  
痰火久嗽

海蛤丸

張姬  
痰火風眩量防仆跌

明天麻

炒半夏

茯苓

羚羊角

鈎藤

竹懸

陳姬  
老年痰火咳逆痰有穢氣

蘆根

苡仁

桃仁

夢藤

大棗

卽兼肺癆治法

又  
下虛不納濁泛嘔逆痰穢氣

熟地炭

紫衣胡桃肉

炒杞子

炒牛膝

川斛

茯神



南京中医药大学图书馆版权所有

某 痰火上兼微痰耳鳴頭暉 一陳加天麻鈎藤甘菊

羚羊葉皮

某 夏至節雨關脈弦長五火熾煩而肝陽胃陽尤甚怒抽掣爲肝病食辛香厚味卽病至胃病使然痰火根深非頃刻可掃除惟靜養勿恚忿薄味以清裏此病發之熱必緩由漸加功議藥乃近理怡法

羚羊角

犀角

川連

鬱金

山梔

北秦皮

牛黃

膽星

橘紅

生石膏

寒水石

金珀

方諸水

法丸

竹葉燈心湯送

木 媚 診脈右關弦滑痰多舌乾微強語言似蹇蓋因痰火

上蒙津液不得上承。高年頗慮風痺。宜清上宣通。乃進  
剛燥及膩滯之藥。

痰熱  
內閉  
神聚

半夏

金石斛

橘紅

黑山梔

茯苓

鬱金

生甘草

石菖蒲

竹懸

昏昏如寐。神懥如迷。痰熱內閉。熱非輕渺。

半夏

石菖蒲

桔梗

枳實

鬱金

橘紅

竹懸

某  
鬱疼

石菖蒲

枳實

半夏麪

鬱金

石菖蒲

明天麻

白蒺藜

橘紅

蒺苺

鈎藤



陶脈左弦堅搏疾多食不易運此鬱虛已甚肝侮脾胃  
有年最宜開懷不致延及膧膈

半夏

薑汁

茯苓

鬱金

橘紅

又

脈如前

聚氣未降 前方去杏仁加白芥子

全六濕熱內蒸痰火曰夥根木漸性陽泄爲汗陰滯遺濁

濕熱  
蒸痰

酒客喜於爽口食物。醫藥中滋膩補方決不適用也

豬肚九万

栗

久寓南土水穀之濕蒸熱聚痰脈沉弦日黃肢未易

有瘡疾皆濕熱盛致氣隧不得流暢法當苦辛寒清裏



通肌倣前輩痰因熱起清熱爲要

生茅术 黃柏 瓜蔞實 山楂 茶菔子

川連 半夏 厚朴 橘紅

病後厚味蒸痰

風化硝 瓜蔞仁霜 枳實

生茯苓 薑汁炒山梔 竹沥法丸

脈脹濕阻熱痰

半夏

茯苓

黑山梔

橘紅

製羹藜

遠志

降香

胃虛  
生痰

季脾胃主司肝胆火風易於貫膈犯中中土受木火之侮陽明脈衰瘓多經脈不利矣議清少陽鬱熱使中宮自安若畏虛滋膩上中愈置下焦愈虛陳去甘草相  
金角桑葉丹皮

又 脉左浮弦數瘓多脘中不爽煩則火升胸量靜坐神識安舒議少陽陽明同治

羚羊角

連翹

廣皮

半夏麴

黑山梔皮

香鼓

又 脈兩手已和惟煩動恍惚欲暈議用靜藥益陰和陽

人參

熟地

天冬

金箔



肝腎  
虛上

有痰

汪

痰火上盛腎氣少攝朝則通攝下焦暮服清肅上焦

方法

羚羊角

半夏

茯苓

橘紅

黑梔皮

鬱金

苦丁茶煎湯

法九暮服

熟地

淡蕊蓉

杞子

五味

茯苓

遠志

線膠

蜜丸早服

曹五色鮮明屬上有痰飲蓋上實則下虛半百年歲未得  
種玉診得脈左小不靜右部弦滑法當清肺胃之熱痰  
益腎肝之精血倣曼倩衛生方法

益腎肝之精血倣曼倩衛生方法

燕窩膠

甜梨膏

人參

黃芪

麥冬

山藥 茯苓 於术

黃節

黑餅

鹿尾膠 羊內腎 瘦蔻薯 故紙胡桃青鹽

胡桃青鹽

腎虛  
痰名

芍

向來痰多食少而參不服餌未合此真質爲陽不充

溫熱剛燥之劑上年冬季溫緩入春炎愈多體中微微

由乎藏聚未固春氣自地升舉之微法當攝腎固真

治痰之本方爲有益

熟地 茯苓 補骨脂 胡桃肉 杞子  
五味 午膝 遠志 車前 蜜丸

痰症之情狀變幻不一古人不究標本有著消痰之  
方立消痰之論者甚多後人遵其法而用之治之不

驗。逐有稱痰爲怪病者矣。不知痰乃病之標，病之木也。善治者治其所以生痰之源，則不消痰而痰自無矣。余詳考之，夫痰乃飲食所化，有因外感六氣邪，則肺胃升降之機失度，致飲食輪化不清者；有因多食肥腥茶酒面生者；有因木質脾胃者，有因多食甘膩肥腥茶酒面生者；有因鬱則氣火不舒而蒸變陽，虛濁濁而生者；有因上衰不能制水者；又有腎虛水泛爲痰者。此亦因上衰不能制水者，腎中陰濁上逆耳。非腎中真有痰水上泛也。更有陰虛勞症，龍相之火上炎，燼肺以致痰嗽者。此痰乃法液所化，必不濃厚。若欲消之，不惟無益，而從傷津液。

其發一切諸痰初起皆由濕而生雖有風火燥痰之  
名亦皆因氣而化非風火燥自能生痰也其主治之  
法惟痰與氣一時壅閉咽喉者不得不暫用散痰降  
氣之劑以開之餘皆當治其本故古人有見痰在治  
痰之論此誠千古之明訓蓋痰不飲食濕濁所化人  
豈能禁絕飲食若耑欲消之由於外邪者邪散則痰  
或可清如寒痰溫之熱痰清之濕痰燥之燥痰潤之  
風痰散之是也若涉本原者必旋消旋生有至死而  
痰仍未清者矣此乃不知治本之故其今觀本中治  
法有因鬱因火者必用開鬱清火爲君以消痰佐之

有因濕因熱者則用燥溼清熱略佐化痰之品若因  
用腎虛而生痰者則純乎鎮攝固補此真知治痰之  
本者矣若因寒因濕者更當於痰飲門兼參而治之  
華岫雲

所列方案皆治肺胃浮痰之藥若透經入絡盤踞臟腑及  
三焦隱處之老痰稍有峻厲製煉之方此等方不能奏效  
也

# 痰飲

於寒有動宿飲吐逆

某高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆吃嗽形如仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之

杏仁三錢

粗桂枝錢

淡乾薑一錢

桔梗二錢

炙甘草四分

中醫

南京中醫藥大學圖書館所有

周回有耳聾鳴响是水虧木少蒙寒、陽不潛亦屬下元之虛但今咳嗽喉下有痰音脇痛臥着氣衝乃衝陽升而痰飲泛脈浮當此驟冷恐有外寒引動內飲議開太陽以肅上

臣承

粗桂枝

乾薑

五味

同薑

白芍

炙草

當午時服

某二新涼外束。肺受寒冷氣。餒不降。宿飲上逆。而病發矣。  
法當暖護。養心宿病可卻。

淡生薑粉

半夏

蛤蜊粉

茯苓

桂枝木

苡仁煎湯

南京中醫藥大學圖書館版權所有

某十五背寒咳逆。此屬飲象。先當辛通飲邪。以降肺氣。

鮮枇杷葉

杏仁

茯苓

橘紅

生薑

半夏

飲上逆肺氣不降

某五脈右大弦。氣喘咳唾。澀不能着枕。喜飲湯水。遇寒

病發此屬飲邪招於肺衛。如見咳投以清潤愈投愈劇。

矣、夢魘子、山東大眾

徐氏、痰飲上吐、喘不得卧、乃溫邪阻蔽肺氣、氣不下降、壅不能着、乍議用宣通開氣分方法。

小青龍云細辛、麻黃加苡仁、白糖沙、石膏

奇

沈姬、冬溫陽不潛伏、伏飲上泛、仲景云脈沉屬飲、面色鮮

明、爲飲飲蒙咳甚、當治其飲、不當治咳、緣高年下焦根

蒂已虛、因溫煖氣泄、不主收藏、飲水上擾、乘肺、肺氣下降、一身之氣交阻、薰灼不休、絡血上沸、經云、不得臥、則喘甚、瘡塞乃肺氣之逆亂也、若以見病圖病、昧於色

診接氣必致由咳變勻。腹腫脹滿漸不可挽。明眼醫者勿得忽爲泛泛可也。茲就管見畧述大意。議闢太陽。以使飲濁下趨。仍無礙於冬溫。從仲景小青龍。越婢合。法杏仁。芍藥。苡。炒牛夏。桂枝木。石膏。白芍。炙草。方氏。冷暖失和。飲泛氣逆。爲浮腫喘咳。腹脹。臥則衝嗆。議用越婢方。

卷之三

芬蕪

貳

**炒牛蒡**

桂枝木

石膏

自序

篆草

石膏

杏仁

桂枝

炒半夏

芬芳

飛草

不用麻黃不成越婢

問胃

**施四勞**煩太甚。胃陽受傷。外衛單薄。性寒畏冷。食物少運。

痰飲內起氣阻濁凝胸背皆痛辛甘理陽已效當此長  
夏脾胃主令崇其生氣體旺病可全好

六君子加益智木香

黃三身居沿海氣障霧露客邪侵八情陽陽傷寒久嗽  
病人不知卻病護身猶然用力承辦裏結飲邪況痼不

卻病 茯苓桂枝湯

胡四脈沉而微微明陽氣不足沉乃寒水陰凝心痛怔忡  
漸及兩脇下墜由陽衰不主運行痰飲聚氣欲阻致痛  
之來其心震之謂亦如波撼岳陽之義議用外臺茯苓

飲合桂苓方

人參

茯苓

半夏

枳實

桂枝

薑汁

白二脈沉小弦爲陰濁飲邪稟質陽不充旺。胸中清氣不得舒展。曠達偶觸入寒冷。或悞進寒物飲邪。暴冷凝結。胸痞當平日食物忌用酒肉醒濁便清陽流行常服仲景苓桂术甘湯百劑若病來因治卽服大順散。

戴 痘去神已爽慧。但本脈帶弦平素有飲爲陽氣不足之體年紀漸多。防有風痺此酒肉宜少用。勞怒當深戒矣。議外臺茯苓飲方。

人參

茯苓

廣皮

枳實

半夏

金石斛

朱九煩勞大過陽傷痰飲日聚陽躋脈空寤不成寐衛陽失護毛髮自墜乃日就其衰奪矣初進通飲濁以甦陽接服外臺茯苓飲

吳氏脈弦背中冷左偏微痛食少欲嘔四肢牽強此飲邪內結議通陽氣

桂枝

茯苓

半夏

薑汁

炙草

大棗

某飲上泛有厥中之事

某眩暈惡心胸脘不爽脈右弦左弱面色紅亮此乃痰

炒半夏

製痰藜

橘紅

煨天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

尤

口中味淡是胃陽虛。

夫濁飲下降痛緩。尚有飲渴爲

患。若不急進溫通理陽。濁飲必致復聚。議大半夏湯法。

人參

半夏

茯苓

枳實

薑汁

脾  
陽  
不通

張二酒客穀少中虛常進疎散表藥。外衛之陽亦傷。其痰飲發時胸中痞塞。自述或飢遇冷病來。其爲陽氣受病何氣不必見痰搜逐。但護中焦脾胃。使陽氣健運不息。陰濁痰涎焉有竊踞之理。

生於术

川桂枝

茯苓

淡薑渣

苡仁

澤瀉

薑棗湯法丸

王三脈沉爲痰飲。是陽氣不足濁陰欲蔽。嘗以理脾爲先。  
俾中陽默運。卽仲景外飲治脾之意。

苓桂木甘加半夏陳皮水法丸

某三舌白。咳逆不渴。非飲象而何。宜宣溫藥和之。

杏仁

苡仁

半夏

乾薑

相桂枝

茯苓

厚朴

炙草

某食後脘中痞阻。按之濿漉有聲。手麻脇痛。心煩耳目昏眩。是氣不流行。痰飲內聚。中焦用桂苓九。竹瀝薑汁

法丸。



又 桂枝

人參

茯苓

半夏

廣皮

炙草

黃味過甘，膩中氣緩，不主運延，縣百天聚氣，結飲東垣。云病久髮，不焦毛不落，不食不飢，乃疾飲爲患，飲屬陰類，故不渴飲。仲景五飲互異，其要言不繁，當以溫藥和之，通陽方法，固無容疑。或大意外飲，宜治脾內飲，治腎是規矩準繩矣。議用芩桂木甘湯。

某形體似平壯，實陽氣外泄，畏風怯冷，脾陽消乏，不可健運水穀，悍氣蒸變痰飲，壅上實下，虛仲景開飲邪，當以溫藥和之，芩桂木甘得效。從外飲立方。

人參

淡附子

生於木

枳實

茯苓

澤瀉

荆憲薑汁法丸

脾腎  
陽虛

某

老人久嗽妨食議以外飲治脾

苓桂木甘湯

王

三脈沉

背寒

心悸如墜

形盛氣衰漸有痰飲內聚當溫

通補陽方復辟

斯飲濁自解

人參

淡附子

乾薑

茯苓

生於水

生白芍

大

馮

陽虛則形寒汗出痰飲痞聚都是陰濁成形乘陽氣

大

衰微致上半竊踞古人法則必通其陽以掃陰氣但宿

大

病無急攻方況平素憂鬱氣滯血滯久耗之體不敢純

剛防刲液耳。

人參

熟附子 淡乾薑 炒川椒 川桂枝

鳥梅肉

生白芍 另真武丸三兩

程。八。左脈沉靜。右脈微弦。四旬清陽日薄。脾臟鼓運漸遲。  
加以煩心。榮思水穀。惶氣蘊蒸。痰飲仲景謂外監當通。  
脾陽。况中年常有遺泄之患。按脈非龍相之動搏。議固  
下益腎。轉旋運脾二方。分早晚服。早服從還少聚精七  
寶。參用九方。

熟地 蔊蔞 柏杞 五陸 黃肉 茯神

山藥 莴絲 覆盆 魚膠 菖蒲 遠志

龍骨 青鹽 熟蜜同棗肉搗丸早服五七錢

茅木 於木 半夏 茯苓 廣皮 生益智

白蒺藜

鈎藤

薑棗湯泛丸晚服三錢開水下

徐

清陽未展濁陰欲踞久延必結瘀飲議用頭武丸二

錢五分人參一錢煎湯送胃陽得震濁當退遲矣十服

某

脈沉弦飲泛嗰咳乃下虛無以制上議早服腎氣丸

攝納下焦散失以治水泛之飲午服外臺茯苓飲轉旋

中焦使食不致釀痰茯苓飲去木

某

七高年久嗽脈象弦大寤不成寐乃陽氣微滯濁飲上

泛仲景云進溫藥和之

陽虛  
胃虛  
嘔逆

杏仁三錢

茯苓三錢

川桂枝一錢

生薑一錢

苡仁三錢

炙草四分

大棗二枝

頭二咳嗽數月嘔出涎沫建中不應已非營病損傷視其面色鮮明飲食仍進微飲邪主治

小半夏湯加桂枝杏仁薑汁

李氏勞傷陽氣內起痰飲臥着氣鈍飲阻其痰爲多痰出  
稍通熱緩且體常汙泄非風寒表邪不解並不熱渴亦  
非火炎爍金仲景云飲家而蓋當治矣不當治故

茯苓

桂枝木

苡仁

炙草

薑汁

陳脈濁小舌白不渴身動嘔瀉身如在舟車中此寒熱



北京中医药大学图书馆版权所有

攻胃致傷。逆氣痰飲互結。通補陽明爲正。白朮甘草守中。未能去濕。宜緩商。

人參汗

半夏

枳實汗

茯苓

竹懸

薑汁

馬三四  
肌肉豐盛。脈來沉緩。始發右季脇痛。渴飲不咽。泪目有聲。吐痰旋頭痛。此皆脾胃陽微寒。濕滯聚生。方難盛不必介懷。溫中佐其條達。運通爲宜。

茅丸

厚朴

半夏

茯苓

陳皮

淡薑渣

葫蘆巴

炙草

薑汁泛丸

馬四十  
甘緩頤安。辛泄不受。此陽分氣衰。將來飲邪日聚然。



北京大学图书馆版权所有

臥着多清氣失旋先用芩桂朮甘湯繼進外臺茯苓

飲

曹四中年陽氣日薄痰飲皆屬陰濁上干清道爲衝逆咳嗽仲景治法外飲治脾內飲治腎分肺甚明昔年曾用桂苓澤丸得效是治支飲治法數年真氣更衰古人謂飲邪當以溫藥和之須忌治嗽肺藥

先用小青龍去麻辛接服外臺茯苓飲

脾腎陽虛飲逆多區

程五昔肥今瘦爲飲仲景云脈沉而弦是爲飲家男子向老下元先虧氣不收攝則痰飲上泛飲與氣滯斯爲飲矣今醫見嗽輒以清肺降氣酒痰久而不效更與滋陰

明達之論  
不愧爲名  
家矣

不明痰飲。皆屬濁陰之化。滋則堆砌。助濁滯氣。試迷着枕欬瘈一端。知身體臥着。上氣不下。必下衝上逆。其飲伏於至陰之界。腎臟絡病無疑。形寒畏風。陽氣微弱。而藩籬疎識。仲景有要言不煩曰。飲邪必用溫藥。和之更分外飲治脾內飲治腎。不讀聖經焉知此理。

桂苓甘味湯    熟附都氣加胡桃

陳    痛久氣亂。陽微水穀不運。蘊釀聚濕。胃中之陽日薄。痰飲水濕。必傾囊上湧。而新進水穀之氣。與宿邪再聚復出。致永無痊期。仲景云。飲邪當以溫藥和之。又云不渴者。此爲飲邪未去故也。則知理陽通陽。誠有合於聖。

訓斷斷然矣。真武湯。

張四痰飲喘咳。肌肉麻痺。痞脹不堪納穀。冬寒日甚春暖。口減全是陽氣已衰。陰濁逆干犯上。肺藥治嗽無非辛泄滋潤。蓋辛散則耗陽。滋清助陰濁濁。阻在陽分氣不肅。爲夜不得卧。小青龍意主平由上以泄水寒。直從太陽之裏以通膀胱表中裏藥也。仲景謂飲邪當以溫藥和之。驅陰邪以復陽。一定成法。早賢氣去。萸換曰苟。

炒查炭水法丸。晚外臺芩芩飲薑棗湯法丸。

程六腎虛不納氣。五液變炎上泛。冬藏失職。此病爲甚。不可以肺咳消痰。常用八味丸。收納陰中之陽。暫時撤飲。

用仲景桂苓味甘湯

孫未交冬至一陽來復老人下虛不主固納飲從下授氣阻升降而爲喘嗽發散寒涼苦澆諸藥焉得中病仲景云飲家而咳當治飲不當治咳後腎每每以老人嗽從脾腎溫養定論是恪遵聖訓也

桂枝 茯苓 五味子 甘草湯代水加淡薑棗  
李 腸紅久病不必攻治今者氣衝喘嗽腕脇痞阻是飲  
獨上僭最宜究悉

川桂枝七分 茯苓三錢 乾薑一錢 五味子同薑合搗一錢  
杏仁半錢 白芍一錢 炙草五分 生左牡蠣三錢

腎陽虛飲逆喘

吳二壯年下元久虛收納氣泄每交秋冬受冷冷氣深入

伏飲夾氣上衝爲咳喘嘔吐疎肺降氣不效養病在經絡中也益精血少壯不旺難以搜逐病根不謂此絕慾一年小暑艾灸靜養一百二十天可愈附氣加車前

潘二九勞力喘甚肩背惡寒飲泛上逆皆係下元虛損莫以喘用瀉肺等藥薛氏八味丸

王秋深天氣收肅背寒喘咳飲濁上泛緣體中陽氣少振不耐風露所致最宜緩護背部進逼陽以治飲

茯苓

桂枝

半夏

薑汁

苡仁 多草

又 早腎氣丸 夜真武丸

陳 脐虛微春陽地升濁陰上于喘不得卧治在少陰

人參

淡熟附子 猪膽汁

此非急症不得用此以傷胃氣

又 照前方加淡乾薑一錢半

又

脈弦暮夜濁陰衝逆通陽得效議真武法以撤其飲

人參

淡附子

生白芍

茯苓

薑汁

又 真武泄濁脫通思食能寐。昨宵已有渴欲飲水之狀  
考金匱云渴者飲都欲去也當健補中陽以資納穀。

人參

生於木

淡附子

茯苓

澤瀉

此方非渴者所宜



又早服賢氣九四五錢晚用大半夏湯

人參 半夏

茯苓

薑汁

董脈弦右濡陽微惡寒飲濁上千咳吐涎沫且食減胃衰寒疝竊踞陰濁見症豈止一端。喻嘉言謂濁陰上加於天非離照當空氣霧焉得退避反以地黃五味陰藥附和其陰。陰霾冲逆肆虛飲邪滔天莫制議以仲景熟無此譏附配生薑法掃羣陰以驅飲邪雜陽氣以立基本况尊年尤宜急護真陽爲主。

人參

茯苓

熟附子

生薑

草藥

戴

十一月間診得陽微濁飲上千爲咳不能臥曾用小

青龍湯減去麻黃。細辛。服後已得着枕而臥。想更醫接。  
用不明治飲方法。交驚鬱陽氣發泄。病勢再熾。頃診脈。  
來濡弱無神。痰飲咳逆未已。諒非前法可效。宗仰景真。  
武陽法以熟附配生薑。通陽逐飲立法。

真武湯去白朮加入參

計不臥。噯喘。迄起白沫。都是腎病。議通太陽膀胱。

茯苓

川桂枝

一淡乾薑

五味子

白芍

炙草

督陽  
虛膀胱氣化不  
通降

顧飲邪泛溢。喘嗽。脅損頭垂。身動喘甚。食則脘脣癟悶。  
臥則喘咳不得息。肺主出氣。腎主納氣。二臟失司。出納

失職議用早進腎氣丸三錢以納少陰。晚用小青龍法。

滌飲以通太陽經腑。此皆聖人內飲治法與亂投。膩補

有間矣。

小青龍去麻辛甘芍加茯苓杏仁大棗

某形盛面亮脈沉弦此屬痰飲內聚暮夜驚喘不得

臥仲景謂飲家而咳當治其飲不當治咳。今胸滿腹脹

小水不利當開太陽以導飲逆。小青龍去麻辛合越婢

桂枝

半夏

乾薑

五味

杏仁

石膏

梔芩

白芍

某服三拗湯音出喘緩可見苦寒沉降之謬素多嘔逆  
下血中焦必虛而痰飲留伏顯然議治其飲。  
下血中焦必虛而痰飲留伏顯然議治其飲。

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓苡仁糖炒石膏

某太陽經氣不開小水不利下肢腫浮漸上青枕氣壅  
欲坐濁飲上干竟有坐臥不安之象醫者但以肺病刻  
治於理未合急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙濁飲  
痰氣自無逆冲之患矣

桂枝

杏仁

乾薑

五味

半夏

茯苓

芍藥

甘草

章 伏飲陰濁上干因春地氣主升而發嘔吐不飢自然  
脾胃受傷六君子宣補方法未嘗不妙今診得吸氣甚  
微小溲晨通暮癃足跗浮腫其腑中之氣開闊失司最



杏仁

白芥子 以半夏

茯苓

淡乾薑

橘紅

中虛  
濕熱

王

當年陽虛濁飲上泛喘急用真武湯丸而效因平素

嗜酒少穀中虛濕聚熱蘊蒸痰目黃齶皿未可爲實熱論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦滲理其濕熱以酒客忌甜故也

茯苓

白肉

人參二兩

苡仁四兩

枳實一兩

半夏二兩

廣皮二兩

金石斛八兩煮汁爲丸

中焦  
痰熱

汪

面色鮮明脘中漾漾欲嘔因鬱動熱氣蒸爲痰飲宜暫緩參术務清中焦熱痰

大英圖書館版權所有

杏仁

枳實汁

橘紅

瓜蔞皮

鬱金

半夏麪

桔梗

黑旋皮

痰飲  
瘧燥

張氏  
痰飲挾燥咳嗽中癢

杏仁

花粉

茯苓

橘紅

半夏麪

茯苓

氣火  
不降

陳氏  
痰飲挾氣火上踞脘痞脹不爽宜理氣熱

半夏

茯苓

瓜蔞皮

黑旋皮

橘紅

鬱金

茯苓

黑旋皮

某 脈弦右瀉舌亮舌白口乾不喜飲頭重岑岑然胸脘  
痺塞而痛得嚥氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚薑當此

痺塞而痛得嚥氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚薑當此



夏令地氣上升飲邪挾氣上阻清空。遂令前症之乘金  
匱云脈弦爲飲色鮮明者爲留飲。口乾不欲飲水者此  
爲飲邪未去故也。况漿汗出。豈是風寒。春夏溫邪辛  
渴發散爲大禁。自云身體空飄。年已六旬。又四辛散再  
泄其陽。不亦左乎。

半夏

薑汁

川連

吳萸

茯苓

枳實

竹瀝

吳萸

嘔喘  
伏飲

潘三

遠客路途風寒外受。熱氣內蒸。痰飲日聚於肺之外。

絡脈之中。凡遇風冷或曝烈日或勞碌形體心事不寧。

擾動絡中宿飲。飲逆氣塞喉底胸膈不思食。

擗動絡中宿飲。飲逆氣塞喉底胸膈不思食。

飲伏  
經終

物着枕嗆吐稠痰氣降自愈病名哮喘伏飲治之得宜除根不速到老年歲仍受其累耳小青龍湯去細辛

章六背寒知氣背痛喫心胃腸八腰食粥噫氣膀胱出黃沫飲邪伏濕乃陽傷發此溫經通絡爲要綱用人

參

川桂枝 生白术 炒黑濁潔 炮黑申鳥

厚朴

茯苓

胸次  
清陽

少旋  
支脈

結飲

葉十脈右弦舌黃不渴當心似阻背形壯今漸瘦咳久不

已臥着則咳痰出稍安此清陽少旋支脈結飲議通上

焦之陽

鮮薤白

瓜萎皮

半夏

茯苓

川桂枝

薑汁

楊

頭中冷痛。食入不消。筋脈中常似掣痛。此皆陽微。不  
主流行。痰飲日多。氣隧日結。致四末時冷。先以微通胸  
中之陽。

中之陽。

乾薑白

桂枝

半夏

茯苓

瓜萎皮

薑汁

又

微通其陽。已效。痰飲阻氣。用茯苓飲去廣皮加薑汁。  
程三支脈聚飲寒。月喘甚。初因寒濕而得。故食辛稍安。

結飲  
又脈

杏仁

半夏

厚朴

苡仁



茯苓

薑汁法丸

趙 支飲脇痛咳逆。

小青龍去麻辛

汪氏支脈結飲阻氣喘脹入脇則痛厥逆爲敗

茯苓

桂枝

半夏

杏仁

鬱金

糖炒石骨

黃 支脈結飲發必喘急病發用

桂枝

茯苓

五味

炙草

懸飲

烏

懸飲流入胃中令人酸痛湧鹽酸水當辛通其陽以

驅飲

桂枝木 半夏

茯苓

炒黑川椒

薑汁



年此必有  
瘀血頑痰  
積而不散  
病屬有形  
非僅氣血  
偶阻也當  
消去其根  
所引諸方  
皆不中病

又 照前方加淡附子

施 診脈右虛左小弦面色黃少華采左脇肋痛五六  
年未愈凡久恙必入絡。主血藥不宜剛。病屬有形事  
多。膩補錄仲景旋覆花湯加柏子仁歸鬚桃仁。

又 初服旋覆花湯未應另更醫謂是營虛用參歸熟地  
桂芍炙草服後大痛醫又轉乃用金鈴半夏桃仁通胡  
桃芩服之大吐大痛復延余治余再議方謂肝絡久病  
懸飲流入胃絡致痛不已議太陽陽明開闔方法。

人參

茯苓

炙草

桂枝

煨薑

南棗

臨詔指掌醫  
卷五  
服苦藥痛嘔可知胃虛以參苓闢陽明用草桂開太  
陽并辛香入絡用薑棗通營衛生薑恐伐肝故取煨  
以護元氣而微開飲氣也

又前方服之痛止議丸方

雖止必發

人參

半夏

川椒

茯苓

桂枝

煨薑南棗湯丸

某夏季陽氣大升痰多嗆咳甚至夜不得臥穀味皆變  
大便或溏或秘診脈右大而弦議以懸飲流入胃絡相  
開闔導飲法

人參

茯苓

桂枝

炙草



南京中医药大学图书馆

煨薑

南棗

又早診脈兩手皆弦右偏大兒痰氣上湧咳逆甚  
來小溲少下焦微腫議通太陽以撤飲邪

人參

茯苓

桂枝

炙草

五味

乾薑

又

脈弦畧數不渴不思飲此飲濁未去清陽不主運行

前方甘溫主乎開闔能令胃喜次法開太陽以撤飲邪

亦主陽通據目述心下胃口若物阻呆滯其濁鋼陽微  
大著其治咳噬陰適爲陰濁橫熾矣議用大半夏湯法

大半夏湯加炒黑川椒

以上治痰飲諸案深得古人治法最爲卓識然當時見此老治症竟有不用此等法而悞治者不知何故至于案中重複竟成逐日號簿此書每門無不如此編集之人真不校

仲之法者  
也惜哉

內經止有積飲之說本無痰飲之名兩漢以前謂之淡飲仲景始分痰飲因有痰飲懸飲溢飲支飲之義而立大小青龍半夏苓桂术甘賢氣等湯以及內飲外飲諸法可謂闡發前賢獨超千古與後人所立風痰濕瘀熱痰酒痰食痰之法迥異總之痰飲之作必由元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能輪布留於胸中水之清者悉變爲濁水積陰則爲飲飲凝陽則爲痰若果真元充足胃強脾健則飲食不失其度運行不停其機何痰飲之有故仲景云病痰飲者當以溫藥和之乃後人不知痰飲之義妄用滾

實有此等分外仲聖不過指以繼名耳

其論俱屬  
影響

痰丸茯苓丸消痰破氣。或滋填膩補等法。大傷脾胃。  
堆砌助濁其於仲景痰飲之法。豈不大相武讐乎。  
痰與飲雖爲同類。而實有陰陽之別。陽盛陰虛則水。  
氣凝而爲痰。陰盛陽虛則水氣溢而爲飲。故王晉子。  
先生取仲景之小半夏。茯苓及外臺飲。溫通脾胃。  
二經分痰飲立治法。而先生又取仲景之苓桂木甘。  
外臺茯苓飲。腎氣丸。真武湯分內飲外飲治法。而於。  
痰飲之症無遺蘊矣。愚歷考先生治痰飲之法。則又。  
有不止於此者。然而病變有不同。治法亦有異。如脾。  
腎陽虛。膀胱氣化不通者。取仲景之苓桂木甘湯。茯

苓飲腎氣真武等法以理陽通陽及固下益腎轉旋  
運脾爲主如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不順  
飲逆肺氣不降者以小青龍合越婢等法開太陽膀胱  
胱爲主如飲邪伏於經絡及中虛溼熱成炎者則用  
川烏蜀漆之溫經通絡外臺茯苓飲去甘草少佐苦  
辛清滲理濕之法其飲邪上冲膻中及懸飲流入胃  
中而爲病者又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等驅飲  
開濁辛通陽氣等法絲絲入籠一以貫之病情治法  
胸有成竹矣非深於得道者其孰能之鄒慈九