

	S252/4766
	1451
	二部/2

亥集

外科正宗

外科正宗卷十二

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

大人口破第一百二十三

口破有虛火實火之分。色淡。色紅之別。虛火者。色淡而

有白斑細點。甚者陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮傷

脾。多醒少睡。虛火妄動而發。宜四物湯加黃柏知母

丹皮肉桂。肉桂徐勒以為引導。從治法也。外以柳花散搽

之實火者色紅而滿口爛斑甚者腮舌俱腫脈貫口
乾此一膏梁厚味醇酒炙搏心火妄動而發宜涼膈
散外搗赴筵散吐涎則愈如口舌生瘡舌乾黃硬作
渴者加減八味丸以滋化源俱禁水漱

徐曰此症下外清火養陰亦當用紫雪碧雪等藥

塗之

柳花散

柳花散內君黃柏 青黛肉桂並研末
冰片還須加二分 用吹口破功難速

黃柏

淨末 一兩 青黛 三錢

肉桂

一錢 冰片 二分

各為細末其再研瓷罐黛貯每用少吹之

赴筵散

赴筵散內柏苓連
細辛等分和勻用

梔子乾薑各自研
吹搽口破即安然

黃連

黃柏

黃芩

梔子

乾薑

細辛

各等分

右為末吹患處。

口破應用方

四物湯

見癰
瘰癧門

涼膈散

見咽
喉門

加減八味丸

見潰
瘍門

唇風第一百二十四

唇風乃陽明胃火上攻其患下唇發癢作腫破裂流水。

不疼難愈宜銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈。

銅粉丸 銅粉丸中輕粉礬黃連膏子同冰片 銅青官粉麝香兼
泡洗屑風效不凡

銅青 錢五 官粉 錢三 明礬 錢一分 麝香 錢一分
五釐

冰片 一分 黃連 二兩切片 輕粉 一分
二釐煎稠膏 五分

右共為細末。黃連膏丸如芡實大。每用一丸放碗內。

湯泡紙蓋。候炆頓熱。用上面清水勤洗之自愈。

楣案屑風本在一百三十九。今移于此。

臭田螺第一百二十五

臭田螺乃足陽明胃經溼火攻注而成多生足指腳了。

白斑作爛。先癢後痛。破流臭水。好似螺壓甚者腳面

俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅三日三
枚後用珍珠散豬脊髓調搽膏蓋掀腫處用真君妙
貼散敷之其腫漸消勿即步履。

臭田螺應用方

蟾酥餅

見疔瘡門

珍珠散

見下疳門

真君妙貼散

見腫瘍門

牛程躩第一百二十六

牛程躩乃程途奔急熱腳下水見風以致氣滯血枯結
成頑硬皮肉榮衛不滋漸生疼痛腫高突起腳難行
走久則破裂膿水每日溫湯淨洗搽牛角散又有內

膿攻注皮頑難破者。以大線針鋒頭挑破。出膿乃寬。
硬皮敲破者。翦而去之。徐曰皮尚活不可翦奈何肉不生者。玉紅
膏長之。肉滿不生皮者。珍珠散搽上。生皮乃愈。

徐曰此係內毒。生足跟皮內。最難療治。

牛角散。

牛角散用牛角灰。本方加上水龍骨。

松香輕粉共研之。牛髓調和搽上宜。

牛角尖

燒灰

水龍骨

松香

輕粉

各等分

共爲末。牛骨髓調搽。虛弱者兼服十全大補湯。

徐曰此專治之方。水龍骨或謂卽船上舊油灰。

楣案牛角尖水龍骨牛骨髓徐圈。

牛程躑應用方

玉紅膏

見腫瘍門

珍珠散

見下疳門

蜚蠊蛀第一百二十七

蜚蠊蛀多生手指節中不紅不熱腫如蟬腹

此句徐斷

乃

手少陰痰氣凝滯而生初起不疼日久方痛痛久方

腐腫仍不消蟾酥餅膏貼漸作稀膿近者一載遠者

三年光症體弱者有之內兼補劑免變癆瘵之病

徐曰治手法與諸頑瘡同

蜚蠊蛀應用方

蟾酥餅 見疔瘡門

田螺泡第一百二十八

田螺泡多生手足忽如火燃。隨生紫白黃泡。此脾經風溼攻注。不久漸大。脹痛不安。宜線針挑破。泄去毒水。太乙膏蓋。挑破又生者。內服解毒瀉脾湯可愈。

解毒瀉脾湯 解毒瀉脾牛蒡子 防風蒼朮共山梔 石膏甘草黃芩等 木通燈草瀉心脾

防風 牛蒡子 山梔 石膏 黃芩

蒼朮 甘草 木通 各一錢

水二鍾。燈心二十根。煎八分。量病上下。食前後服之。

田螺泡應用方

太乙膏

見腫瘍門

蟾酥餅

見疥瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

皴痛第一百二十九

楣案皴原本作股誤字書
駁手足圻裂也今通作皴

皴痛多起於手足乃風寒鬱於皮毛致血不榮於肌表。

皮槁多痛似無皮之狀宜葱湯浸洗良久隨以潤肌

膏擦之勿見風冷就暖自愈又每年逢冬即發者須

三伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發。

凍風第一百三十

凍風者肌肉寒極氣血不行初起紫斑久則變黑腐爛

作膿者。以碧玉膏主之。生肌斂口。

碧玉膏

見結毒門

治凍風皮肉損爛膿血淋漓疼痛不止者

獨勝膏

獨勝膏方最散寒六月每逢三六日

凍風凍耳莫憂煎搽之冬凍不相干

治凍風凍跟凍耳每遇冬寒則發六月初六十六二

十六日用獨蒜搗膏口中曬熱

四字徐圈

在於遇冬所發

之處擦之。忌下湯水。一日共擦三次。可以不發。又每

常凍風。用茄根同葱煎湯浸洗。亦不重發。

相案此卽皴痛之甚者原本在膿窠瘡之後今姑

仍分爲二門。而移于此。

陰蝨第一百三十一

陰蝨又名八腳蟲。乃肝腎二經濁氣所成。生此不爲清

吉。銀杏散津調擦之內服六味地黃丸。每斤加蜜炒

黃柏一兩蘆薈五錢以清化源。愈後不發

徐曰髮內亦有。

銀杏無憂散

銀杏無憂散麝香杏仁狼毒兼蘆薈

水銀輕粉與雄黃七味研和調擦良

水銀

鉛製

杏仁

去皮搗膏

輕粉

雄黃

狼毒

蘆薈

各一錢

麝香

一分

除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再研勻先用土萐蒲煎湯洗之用針挑去蝨孔隨用津唾調擦使藥氣入內則不復生切忌牛犬鼈肉

徐日用百部湯洗妙。

桐案杏仁徐圈。

陰蝨應用方

六味地黃丸

見肺癰門

葡萄疫第一百三十二

葡萄疫其患多生於小兒感受四時不正之氣鬱於皮

膚不散結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在徧體頭
面。乃為臍症邪毒傳胃。牙根出血。久則虛人。初起宜
服羚羊散清熱涼血。久則胃脾湯滋益其內。又有牙
齩腐爛者。用人中白散。

羚羊角散

羚羊角散用防芩
甘草麥冬淡竹葉

牛蒡知母與元參
止血消斑功效靈

羚羊角

防風

麥冬

元參

知母

黃芩

牛蒡子

各入
分

甘草

二
分

水二茶鍾。淡竹葉十片煎六分。食遠服。

徐曰。此為主方。

楣案羚羊角牛蒡子徐圈。

胃脾湯

胃脾湯內甘草陳白木麥冬五味子

遠志沙參共茯神脈虛自汗可同春

白朮

茯神

陳皮

遠志

麥冬

沙參

各六分

五味子

甘草

各五分

水二茶鍾煎八分。食遠服。虛弱自汗者。去沙參。加入

參黃耆各五分。

徐曰。白朮一味不切。

蒲萄疫應用方

人中白散

見口疳門

咬傷第一百三十三

人咬爲患。良肉受傷。陽明胃經之脈。循頰車入齒縫。多火多熱。凡食經此。無不燔爛下咽。又飲食多燔之毒。無不侵襲。故傷人發腫。其痛異常。臭膿腐爛。痛徹連心。初咬時。一日內。眾撒熱。小便浸傷處。洗淨牙黃。瘀血。咬孔上。蟾酥餅貼之。膏蓋。後出微膿。漸愈。如咬時未經此法。致腫痛發。并疼甚者。亦與童便浸洗。泥乾。用粗紙撚蘸麻油。點火。用烟燄薰咬處。良久。方任以解牙毒。仍以蟾酥條插入孔內。膏蓋。候腫消時。換玉

經膏搽之長肉完口如有雜症相為者亦隨症而治

葱白甘草湯

葱白甘草湯二味每日洗之搽玉紅

能治咬傷疼臭穢消瘀散腫功非細

治咬傷掀腫疼痛膿血淋漓臭穢腐爛者用葱白二

兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨傷處瘀腐

膿血方用玉紅膏搽黑膏蓋漸愈

咬傷應用方

蟾酥餅條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

風犬傷第一百三十四

風犬朝夕露臥感非時不正之氣故心受之其舌外出

肝受之其目昏矇。脾受之其涎自流。肺受之其音不出。腎受之其尾下墮。五臟受毒乃成風犬。全稟陰陽肅殺之氣。故常無故傷人。初咬卽服救生散。令小便中行出血片。宜居靜室。忌諸口味發物。并忌見諸麻赤豆等物。及聞鑼聲。百日乃安。治之遲者。毒大而小。便難出。必攻臟腑。久而成形。腹脹攻急。人聲若犬。眼神露白。則不可治。有愈後犯前禁。復發者。仍死。

救生散

救生散用斑蝥七
杭粉一錢同作末

去頭翅足用其身
空心酒服效如神

治風犬咬傷。用生斑蝥七個。去頭翅足。杭粉一錢同。

研空心溫黃酒調服。一時許小便行出血片白脂。乃惡物也。如便疼煎甘草湯飲之自利如毒未盡。次早再一服。至小便清白方為毒盡。

徐曰。另有效方。

又古

治風犬咬。其人頂中必有紅髮一根。此句徐圈急須拔去。

以追風如聖散敷傷處。抽毒氣。內服救生散。

徐曰。宜更服木鼈子。可如髮數。

楣案如髮數。句未解。意者紅髮一根。服木鼈末一。

枚之數。如有二根。則服二枚。以次遞加。故曰如髮數。徐蓋語焉而未詳耳。

追風如聖散

追風如聖散吹風白莊細辛蒼朮等

川草烏芎藭薄荷同雄黃加上有奇功

治風犬咬傷。隨用敷之。其毒即可拔出。

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼朮

各一兩

雄黃四錢

共為末。溫酒調敷傷處。以紙蓋扎。早晚換二次。

惡蟲叮咬第一百三十五

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生。且如蜈蚣用鉗。蝎蜂用尾。

蛇以舌見之者勿觸其惡目不被螫苟有所傷各尋類而推治。

治蜈蚣咬方

用蟾酥餅磨濃塗傷處。粗紙撚蘸麻油點火用烟燄薰之。疼腫自消。或用雄雞糞搗水塗之。或用頭垢搽傷處。以撚燄薰之。俱效。

徐曰。人馬平安散外塗內服大妙。

人馬平安散 補

西牛黃 四分 冰片 六分

麝香 六分

蟾酥 一錢

火硝 三錢

滑石

四錢

石膏

二兩

大赤金箔

四十張

共研極細末。瓷瓶收藏。切勿洩氣。此方本治夏月受暑。頭目昏暈。或不省人事。或患痧腹痛。吹入鼻中。立時起死回生。如騾馬受熱暈倒。亦將此吹鼻即愈。

治蝎螫方

蝎有雌雄二種。雄者螫人。痛在一處。雌者痛牽徧體。用井底泥敷痛處。乾則易之。一時無泥。取新汲水。以青布隨痛處搭之。溫則再易。又方五月五日用黃蠟二兩溶化。將凝時投雄黃硃砂細末各三錢和勻。捏

成餅窩。仍用貓兒眼草白汁。端午時滴入窩內陰乾。
愈久愈佳。復捏成塊密收。臨用取一米許刺針尖上。
以燈燄化開。滴正螫之處。其疼卽止矣。

治蛇螫方

用雄黃末。

四字
徐圖

蘭葉搗汁。調敷腫上。內用半枝蓮搗

爛取汁一兩。熱酒四兩。和汁服之。蓋汗爲效。仍用渣

敷傷處亦妙。又方速用端午收採蒼耳草末五錢。水

煎一鍾。熱服。蓋汗卽安。如無端午收採者。便用常日

採取陰乾者。煎服一兩發汗亦效。

又治七寸蛇螫方

七寸蛇青色扁形。尖尾短足。紅口者毒輕。青口者毒

重。以舌螫人。其毒最惡。初螫時用雄黃末一錢。生礬

二錢。杓內溶化。將筋頭點藥傷處。此二句徐密點批曰乘熱點成泡尤

妙冷則易之。連點七次即愈。毒氣入裏者。解毒紫金

丹酒磨服一錢。蓋汗即愈。遲延毒走腫痛者。麻油燄

薰之亦瘥

治河豚毒方

河豚血毒中人。舌麻心悶。白茅根搗汁冷飲。子毒中

惡蟲可咬

人昏悶腹脹口噤難言非金汁不能解也。

百蟲入耳第一百三十六

百蟲入耳乃偶然悞入。如蠅蚊細蟲以麻油數點滴入竅中。蟲卽自死。取出如蜈蚣蜜蜂等大蟲。以肉炙香安耳邊。其蟲聞香自出。有蟲夜間暗入者。切勿驚慌響叫。逼蟲內攻。宜正坐點燈。光向耳竅。其蟲見光自出。對面有人見。其蟲不出。

誤吞針鐵骨哽咽喉第一百三十七

誤吞針刺。哽咽疼痛者。用亂麻筋一團。搥龍眼大。以線

牙繫留線頭在外湯溼魚吞下咽頃刻扯出其針頭
必刺入麻中同出如不中節再吞再扯以出爲度悞
吞銅物者多食葶薺化堅爲軟若吞鐵骨之物腸中
不能轉動覺墜者多食青菜豬脂自然送入大腸與
糞同出諸骨哽喉用玉簪花根入錢各隨所犯之肉
爲引煎湯服之轉出乃愈徐曰玉簪花湯須用竹管
放喉間漸漸灌入若犯牙
則牙必腐爛又諸骨哽於咽下不能外出者烏龍針推之
骨下則安其法以細鐵線燒軟對折雙頭用黃蠟作
丸如龍眼大裹鐵線頭上外用絲綿裹之推入咽內

其骨自然順下。不下再推。徐曰此法無用又方用玉簪花根

切片煎湯漱之徐徐吐出。其骨自軟。再用乾飯嚥之

自下

人面瘡第一百三十入

人面瘡古有生者。近世罕聞。其瘡全似人面。眼鼻俱全。多生膝上。亦有臂患者。方書皆云積冤所致。先須清心懺悔。改過自新。然後服十六味流氣飲。外用貝母爲末敷之。乃聚眉閉口。次用生肌斂口藥。亦可得愈矣。

人面瘰癧應用方

十六味流氣飲

見流注門

陰毒第一百三十九

陰毒乃純陰無陽。被天時寒冷肅殺之氣侵入肌膚沈於骨髓。致氣不能升。血不能行。疑滯經絡。疼痛切骨。初起不腫不熱。朝輕暮重。久則作腫。漸紅爛。斑黑。麤臭水淋漓。穢氣薰蒸腐爛。漸開。終久必死。一人年三十歲。冬月隔港與鄰婦私交。房事方畢。忽婦天回。州忙隔港赴水而走。熱身受寒。五日後小腹大臀陰痛。

不腫。日夜響叫。至一月後。穀道傍生一爛斑。黑麤倒陷。諸藥不效。至半月。大臀連黑腐爛。作臭乾麤無膿。又十日。大臙俱壞。黑敗而死。又一人年四十歲。夏月好飲火酒。至夜赤身露臥。手膊連背陰疼難忍。一月後。肩發爛斑一塊。周圍微硬。色如紅棗。日漸延開。半月後。手膊半背共成黑麤。臭穢不堪。一月不食而死。一人中年肥胖。亦冬夏好飲火酒。飲後隨喫涼水。方臥一日。頸項作疼。微腫。堅硬如石。三月外。項大如頭。石硬不熱。真陰毒也。余辭不治。請別醫治之。項同身。

大不食而死。又一人夜夢城隍拘見責打二十喊叫。其妻喚醒。隨後受刑。處掀腫作疼。青紫急脹。視之真棒毒也。用針刺破。流瘀血碗許。外肉腐爛作疼。調理兩月而安。此亦陰毒。故附記之。

失榮症第一百四十

失榮者。先得後失。始富終貧。亦有雖居富貴。其心或因六欲不遂。損傷中氣。鬱火所凝。隧痰失道。停結而成。其患多生肩以上。初起微腫。皮色不變。日久漸大。堅硬如石。推之不移。按之不動。半載一年。方生陰痛氣。

血漸衰形容瘦削破爛紫斑滲流血水或腫泛如蓮
穢氣薰蒸晝夜不歇半生疙痞愈久愈大越潰越堅
犯此俱為不治予立二方曾治數人雖不獲全愈而
不夭札速死誠緩命藥也

和榮散堅丸

和榮散堅歸地參
丹酸遠相併龍齒

茯神朮附貝南星
蘆薈硃砂與角沈

治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者

歸身

熟地

茯神

香附

人參

白朮

橘紅

各二兩

貝母

南星

酸棗仁

遠志

柏子仁

丹皮

各一兩

蘆薈

角沈

各入

錢

龍齒

一兩煨無龍齒或用鹿角尖二兩煨亦可 硃砂六錢為衣

右為細末。煉蜜丸。桐子大。每服八十九丸。食後用合歡樹根皮煎湯送下。患者若猛省自寬。澹薄甘命。亦有十中一二得愈者。否則難脫然也。

徐日不成方。

飛龍阿魏化堅膏

治失榮症。及瘦瘤乳岩瘰癧結毒。初起堅硬如石。皮色不紅。日久漸大。或疼或不疼。但未破者俱用此貼。用蟾酥丸藥末一料。和金頭蜈蚣五條炙黃去頭足。

研末同入熬就乾坤一氣膏二十四兩化開攪和重湯內頓化紅緞攤貼半月一換輕者漸消重者亦可不大常貼保後無虞。

中砒毒第一百四十一

砒乃陽精大毒之物服之令人臟腑乾涸皮膚紫黑氣血乖逆而死知覺早者大蘭根葉搗汁灌之輕則可解無蘭處以生菜豆同水研爛以水灌之多則見效如不解者以金汁灌之必甦甦後如顛不語者每日以菜豆水飲之毒盡則愈。

取全汗法

用大毛竹一連二節用刀刮去外青一半。用磚扎節中。沈入大糞池內。一年後取起。以長流水浸一日。取起。鑽開節孔。內蓄糞清。資罐收貯。凡遇有中砒毒。河豚毒。傷寒。陽毒。發狂。疔瘡。痧症。毒氣入裏。煩躁口乾。渴欲飲水。脈大有力者。並宜此藥。

落下頰拏法第一百四十二

楣案頰當作頰頰車下正中骨即下把殼

落下頰者。氣虛不能收束。關竅也。宜令平身正坐。醫者以兩手托住下頰。左右大指入口內。納槽牙上。端緊。

下頰用力往肩下捺開關竅。向腦後送上。卽投關竅。隨用絹條兜頰於頂上半時許去之。卽愈。

徐曰此症兼有風痰。

救自刎斷喉法第一百四十三

自刎者。乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕矣。初刎時氣未絕。身未冷。急用絲線縫合刀口。糝上桃花散。多糝爲要。急以綿紙四五層蓋刀口。藥上以女人舊布裹腳。將頭擡起。周圍纏繞五六轉。扎之。患者仰臥。以高枕枕在腦後。使項鬱而不直。刀口不開。冬夏造。

風衣被覆暖。待其氣從口鼻通出。以薑五片。人參二錢。川米一合。煎湯或稀粥。每日隨便食之。接補元氣。三日後。急手解去前藥。用桃花散糝刀口上。仍急纏扎。扎二日。急用濃葱湯軟絹蘸洗傷處。浥乾。用抵腳挑玉紅膏。放手心上。捺化。搽於傷口。再用舊棉花薄片蓋之。外用長黑膏貼裏。周圍交扎。不脫。膏之兩橫頭。再用黑膏長四寸。闊二寸。豎貼膏上。上下黏連好。肉庶不脫落。外再用絹條圍裏三轉。針線縫頭。冬月三日。夏月二日。每用葱湯洗浥。換藥。自然再不疼痛。

其肉漸從兩頭長合。內服八珍湯調理月餘。如大便結燥。用豬膽套法。不可用利藥。雙噪俱斷者百日。單斷者四十日。必收功完口。此法曾治強盜郭忠。阜隸沙萬家人顧興。俱雙噪齊斷。將危者。又單噪傷斷者十餘人。治之俱全活。

自列應用方

玉紅膏

見腫瘍門

桃花散

如聖金刀散

見金瘡門

八珍湯

見瀆瘍門

試知百病死生法第一百四十四

疾病非明醫不能決其凶吉。死生非神聖不能洞其機。關。予得呂祖一枝梅方。真仙傳也不敢私秘刊以傳。

世

呂祖一枝梅

呂祖傳授一枝梅
二殊雄麝共麝脂

巴豆靈脂草麻子
餅貼印堂識生死

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間用藥艾

實大一餅貼印堂之中。點官香一枝香盡去殊已後

一時許貼藥處有紅斑暈色。腫氣飛散謂之紅霞捧

日病雖危篤其人。不死。如貼藥處。一時後無腫無紅

皮肉照舊不變。

徐曰血肉已
死故如此

謂白雪漫野病雖輕淺

終歸冥路小兒急慢驚風一切老幼痢疾如貼之紅腫卽愈此方可預知生死也

硃砂

三錢

銀硃

一錢五分

五靈脂

三錢

麝香

三分

葶麻仁

五分

雄黃

巴豆仁

各五分
不去油

右各研細於端午日淨室中午時共研加油臘脂爲膏。瓷盒收藏。勿經婦女人手。臨時用豆大一圓捏餅貼印堂中。其效立見。用過餅送入河中。

造孽報病說第一百四十五

怪症出於無端事必因乎有據。感應篇曰。若開如是花。

必結如是果。一黃冊書手。每至甲首家。務要殺雞一
隻。先食頭尾。一歲二熟。下鄉殺雞。不計其數。一朝數
盡。口中生出如菌者。大小六枚。填塞滿口。湯水難下。
余視之。乃孽疾也。辭不可治。別請一醫。用刀割去。次
日又生如舊。延至六十日。肌膚盡削。存骨如柴而死。
一竿槍戶。傷殘生鳥。假如每日十命。一歲共計三千
六百。盡屬死於無辜。況其雛之不得生者多矣。彼生
于三人。俱至六七歲。徧身先發紅點。癢痛異常。數日
後點如鑽。攢腐爛流血。口稱百鳥相啄。令人趕打不

去至月外氣血瀝盡俱亡子。後勸解燒毀竿矢合族
持齋。六十二歲生一子。方得成立。一人五十餘歲家
眾養雞十餘隻。一朝眾雞齊叫。彼怒之。將眾雞兩腳
齊肘。安監上刳斷其雞。亂命飛跳。血盡俱死。一年後
足生脫疽。筋骨伶仃。流血不止。令妾將刀割去腳骨。
瀝盡氣血而亡。一富家置窩弓。兼養鷹犬五十。後方
生一子。二歲左右。頭角生孔。一處俱已露骨。視之。乃
孽病也。不敢言其不治。奉上藥方。修合用之。無效。請
眾醫治之。強投藥餌。延至三歲而歿。其人後遭橫事。

死於非命。一莊家以獵事爲藥。五十後徧身生塊。破後腐爛見骨。余知爲孽報。謂曰：先當杜養鷹犬。然後此病可治。彼從之。內服益氣養榮之藥。外用甘草當歸煎洗。仍搽玉紅膏。長肌完口。三月餘而愈。二年後復養鷹犬。又一年六月內患陰症而歿。次子十歲赴水死。已上數條。余所親見。皆慘戮生靈之報也。一訟師作中興訟。破眾家私。傷殘骨肉。不計其數。一日大腿腫痛。堅硬如石。疼痛異常。常欲以繩繫足。高懸梁上。其疼乃止。如放下。疼卽如故。予知孽報。辭不可治。

似此兩月一日午時親友四人相看忽聞腿內太響一聲其腫卽歸大臀腫如巴斗其腿卽消臀腫痛不著席將布兜懸挂其疼方可又兩月百苦而終又一年其妻徧身發腫如癩作癢非常破流脂水其時孟冬天氣常欲赤身裸露其癢稍止如著衣被其癢卽生如蟲攻刺予知孽報亦辭之後至隆冬赤身流水而死此異常之報也所謂逆天害理雖由已古往今來放過誰決無漏網

仙方活命飲今古不同論第一百四十六

古人朴實其七情干涉者少。而從風寒暑溼外感凝滯者多。故設仙方活命飲。攻散所滯之腫。服此得效者。十常八九。由病者五臟不虛耳。今人穿鑿太過。七情煩攪過甚。內臟無有不傷。每見曾服過此藥。其瘡必不起。發脾胃再無不損。夫瘡不起。發脾胃傷敗。病者豈可得生。故今之治法。不論首尾標本。先必固脾胃。次行托藥。病無不活。愚見如此。幸同道者察焉。

徐曰。此段直是亂道。對症用藥。無有不愈。豈有古今之別。

今之別

楣案著書者於腫瘍方首列神授衛生湯。而此乃
痛駁仙方。活命飲。余取二方較之。大略相同。衛生
湯。僅少陳皮。貝母。沒藥。而多羌活。沈香。紅花。連翹。
石決明。便秘者加大黃。是其方更猛於活命飲。乃
是今而非古。此與近人言方苞之文非望溪所及
何異。

拾遺症第一百四十七

拾遺者。因條款分門。未及細詳。故有失載。今補註于後。
以便觀覽。

鼻疔生於鼻內痛引腦門不能運氣脹塞鼻竅甚者唇
腮俱腫。

牙疔生於牙縫之中頂高突起痛連腮項破則流血
黑疔生於耳竅之內黑硬腐爛破流血水疼及腮顴。

以上諸症俱先針刺次行發汗仍照疔類調治。

喉癰生於咽外正中妨礙飲食紅腫熱痛必欲潰膿軟
而脹痛者針之內服補托之藥玉紅膏搽貼長肌完
口又有腐潰內通湯水隨孔出者曾治數人俱亦無
妨。

臈疽生在膊上。連肩通腫。長堅而硬。

兌疽生在當手動脈之處。腫痛寒熱。徹手膊。舉動不便。

鳳眉疽發在兩眉之間。形長皮赤。痛引腦戶。二目合縫。光腫發熱。

透腦疽發在額上髮際之間。多發寒熱。頭疼如斫。不可忍耐。先用萬靈丹發汗。解散風邪。久宜清托。

附陰疽生在內踝上三寸。初生小泡。漸至赤腫。破流血。水痛亦徹骨。不能步履。

咬骨疽。發在大腿內股不腫不紅。痛徹骨髓。初宜雷火針。針入。內服萬靈丹。酒調服效。

陰疽。生於右腿夾縫之下三寸。痛連陰子。小腹亦疼。

元疽。生於左腿夾縫之下三寸。漫腫連陰。疼及大腿。

淵疽。發在脇下。初起不紅。堅硬。久則破潰。有聲如嬰兒

啼狀。徐曰奇症膏蓋無聲。去膏仍有異哉。難治之症也。

楣案王君士雄歸視錄載潘氏子肋下腫潰竄孔甚巨。孔中作聲如嬰兒啜泣。吳江陳夢琴茂才希恕視之曰。此淵疽也。證屬大虛。固當補益。但疽孔

作聲。則內膜已破。氣從旁出矣。非護其膜。補亦徒施。以人參白朮白芨烏梅炭白蠟黃蠟象牙屑豬脊髓和爲丸。令日三服。以固氣。仍擣諸藥。益以生肌之品。製若糊餅。塞疽口。絲綿裏。青鉛罨其外。大膏藥蓋之。闊布纏縛其體。三日一易。復用生脈六味。加龍螭等品煎汁飲之。如是二十餘日。其聲漸除。三月餘而口斂。

又案外科心法亦言。聲如兒啼。爲內膜已透。可於陽陵穴灸二七壯。其聲卽止。將潰未潰。多服護膜。

散白蠟白芨各等分研末輕者用一錢微重用二錢重者用三錢或酒或米湯調下可免透膜。

玉枕疽生在腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項鼻塞氣粗此太陽膀胱溼熱凝滯而成。

以上諸症初起有表症者便宜解表有裏症者卽與通利潰後宜補托久則宜收斂此爲一定治法不可亂投藥餌以致危亡。

徐曰此篇當記。

綳縛背瘡法第一百四十八

九發背對口等大瘡已潰流膿時。冬夏宜絹帛四五層蓋在膏藥外。再用綿布見方八寸。蓋在絹外。四角用蛇皮細帶綴之。扎在前胸。紮實瘡肉。庶瘡中暖氣不泄。易於腐潰。洗瘡時預備二紮更換。務要瘡內暖氣烘烘。此法最善。故補載於此。

癰疽內肉不合法第一百四十九

癰疽對口大瘡內外腐肉已盡結痂時。內肉不黏連者。用軟綿帛七八層放瘡上。以絹扎緊。睡實數次。內外之內。自然黏連一片矣。有患口未完處。再搽玉紅膏。

其肉自平。

徐曰。東洞庭劉某夫人。患乳癰。醫者用刀向乳頭。上寸餘出毒。瘡口向上。膿反下注。乳囊皆腐。寒熱不食。將成乳勞。延余治之。至九十日而未見功。蓋病者柔弱。畏痛。既不敢於乳下。別出一頭。而膿水從上注下。頗難出盡。故有傳囊之患。忽生一法。用藥袋一箇。放乳頭之下。用帛束縛之。使膿不能下注。外以熱茶壺熨之。使藥氣乘熱入內。又服生肌托膿之丸。於是膿從上泛。厚而且多。七日而膿盡。

生肌又數日而全愈後以此法治他證無不神效。

此條從洄溪

醫案采入

煉元明粉法第一百五十

冬至後用潔淨朴硝十斤。水一斗五升。白蘿蔔五斤。打碎。同入鍋內。將硝煮化。候湯滾足。撈去蘿蔔。以綿紙二層鋪竹絲箕內。架在新缸上。將硝湯徐入箕內。隨瀘隨添。以湯瀘盡爲度。將缸移在天井。露三日。其硝結在缸內。傾去餘水。瀝乾爲止。將硝取下。再用砂鍋頓炭爐上。將硝一碗化開。煎滾。以銅匙鏟攪。將凝結

時鏟入小魚酢罐內上空寸許。餘硝陸續照上法煉畢。每一罐下用三釘品字樣插入地中留寸半在外。將罐浮頓釘頭上。用瓦片蓋口。周圍用段磚砌百眼。鑪圍繞離罐寸半許著炭火入鑪內四圍底火與火務要周匝。候罐硝紅爲度。次日取出硝來預用大綿紙攤在潔淨陰土上將硝碾細用絹篩篩在紙上約一錢厚再不許多。門窗俱關閉不令人見。三日後其硝自然復活。色白如粉輕虛成片。將鉢盛貯內用紙蓋再放亂紙寸許以收潮氣庶不凝結。此品最能降

火化痰。清利臟腑。怪症服之可蠲。狂躁用之卽愈。搜
除百病。安斂心神。不傷元氣。惟久病瀉痢者不宜。大
人每服三四錢。小兒五分至一錢。皆可。俱用白滾湯。
或葱湯空心化服。候行二三次。隨飲稀粥。自然精神
爽健。臟腑調和。津液頓生。百病如失。又煨過硝石六
兩。加硃砂三錢。青黛一錢。冰片一錢五分。共研細末。
照前篩紙上。再用紙蓋一層。四邊以界尺壓緊。勿令
走氣。候三日。外取起。密收。又名陽春紫雪。最治失心
忘志。顛癲健忘。小兒急慢驚風。大人異症。每服五分。

至一錢俱用淡竹葉燈心湯化服屢有奇效不可盡述。此乃神仙保命服食之品。每一斤加生熟甘草末二兩葱湯化服二三錢。令人容顏悅澤輕身耐老。

楯案元明粉乃推蕩腸胃之藥。經煉稍緩耳。以爲神仙服食之品。誤人不淺。

又案此下有取紅鉛法。徐用筆勾去。故不錄。

煉金頂砒法第一百五十一

用鉛一斤。小罐內炭火煨化。投白砒二兩於化烊鉛上。煉至烟盡爲度。取起冷定。打開金頂砒結在鉛面上。

取下聽用。

煉硝石法第一百五十二

用潔淨朴硝半斤。罐內炭火鎔化煎乾。煨紅住火冷定。取出。卽成硝石。罐收聽用。利實火不利虛火也。

取蟾酥法第一百五十三

蟾無大小俱有酥。用闊銅鑷鑷蟾眉稜高肉上微緊。拔出酥來。凝聚鑷裏。多則括下陰乾聽用。其取過之蟾。避風二日。仍送青草園中。自然不傷其生。如取之便見風下水。俱成破傷風。顛狂而死。

製附子法第一百五十四

大附子要一兩以外者不拘幾枚。以童便浸滄三寸。每日換便。夏浸三日。冬五日。再換童便。煮盡二香爲度。去皮臍。線穿陰乾。或口中曬硬。亦可收藏聽用。

昇白靈藥法第一百五十五

水銀二兩。用鉛一兩化開。投入水銀聽用。火硝二兩。綠礬二兩。明礬二兩。共研爲末。投入鍋內。化開炒乾。同水銀研細。入泥護陽城罐內。上用鐵蓋蓋之。兜以鐵梁。梁之兩端。用燒熟軟鐵線上下扎緊。用紫土鹽泥

如法固口。留出蓋面。烘令十分乾燥。架三釘上。砌百
眼爐圍之。先加底火二寸。點香一枝。中火點香一枝。
頂火點香一枝。預用小罐安滾湯在傍。以筆蘸湯。擦
擦蓋內。常溼勿乾。候三香已畢。去火。罐待次日取起。
開出藥來。如粉疑結。蓋底刮下。收藏聽用。凡瘡久不
收口。用此研細。糝上少許。其口易完。卽尋常收斂藥
中用之功亦甚捷。

徐曰。此藥除溼毒。不收口之瘡。餘俱有害。世人皆
以昇藥爲收口之聖藥。其害無窮。

製寒食麵法第一百五十六

用白麵一斤。外再以麵半筋調稠。捏成薄片二塊。將前麵包合於中。周圍捏緊合口。於清明正日蒸熟。挂透風處陰乾。將麵包藏。勿經女手。越久越效。

製披針喉針法第一百五十七

媚案披當從靈樞經作鉞大針也

披針古多用馬銜鐵爲之。性軟不鋒。利用之多。難入肉。今以鋼鐵選善。火候鐵工造之。長二寸。闊二分半圓。柄扁身。劍脊尖鋒。兩邊芒利。入肉深淺。得心應手。如大膿深。欲其口大。直針進而斜針出。劃開外肉。則口大。

天矣。喉針長六寸。細柄扁頭尖鋒刺喉膿血令出。

諸藥製法第一百五十八

前方諸藥未詳製法。今開列於後。不須製者不錄。

人參潤色明亮堅實
為上輕飽不堪
天門冬湯泡去心
麥門冬去心

生地黄酒蒸
熟地黄酒蒸
白朮米泔浸炒
蒼朮米泔浸炒

黃耆蜜水拌炒
甘草消毒生用
補托灸用
酸棗仁炒研

遠志湯泡去心微炒
五味子炒研
肉蓯蓉去鱗酒洗
牛膝酒洗

破故紙炒
當歸酒洗
白芍微炒
黃芩酒炒
白蒺藜去刺

元參去根
香附童便浸炒
柴胡去蘆
黃芩酒炒

黃連

解毒生用止
鹽薑汁拌炒

龍膽草

酒炒

知母

監某
拌炒

瓜蒌仁

去殼
去油

貝母

去心

陳皮

白去

桔梗

微炒

防風

去蘆

乾薑

炒黑

附子

童便
浸煮

半夏

薑汁
水煮

川烏

湯泡去
皮尖

草烏

湯泡去
皮尖

巴戟

湯泡去
心微焙

南星

服有為
末入牛

膽肉者

威靈仙

去根

仙茅

米泔浸
蒸去皮

三棱

湯泡

澤瀉

蒸

大黃

實人生用
虛人炙用

海藻

酒洗

昆布

酒洗
絲

牡丹皮

去梗

王不留行

炒研

牛蒡子

炒研

連翹

去梗
心研

金銀花

去梗
葉

牽牛

生用
炒用

地骨皮

去梗

肉桂

去粗
皮

茯苓

去粗
皮

枸杞子

去蒂

琥珀

布包
碎燉心

同研研
如麴細

山梔 研炒
焦

黃柏 鹽水
并炒

山茱萸 去
核

杜仲 鹽水拌
炒斷絲

桑皮 蜜水
并炒

辛夷 去
蒂

乳香 去油
為末

沒藥 去油
為末

枳殼 麸皮
炒

厚朴 薑汁
製炒

巴豆 去油
為霜

阜茨 去皮
子煨

五倍子 去
未炒

蓮肉 泡去
皮心

山查 去
核

桃仁 泡去
皮尖

杏仁 泡去
皮尖

芒硝 湯煮
提淨

石膏 煨研
末

雄黃 透紅
明亮

硫黃 去
腳

硃砂 淨明
潔口

硼砂 白色
透明

砒霜 白色
有生煨兩用

自然銅 醋煨
七次

黃丹 水飛
炒紫

龍骨 生用
煨用

牛黃 輕虛
色黃

麝香 去毛
皮

犀角 鎊
末

羚羊角 鎊
末

龍齒 煨存
性

蜂蜜 煉去
白沫

蟬蛻 去
七

斑蝥 用米炒去翅足 僵蠶 去絲微炒

全蝎 酒洗去毒

蜈蚣 炙去頭尾

蚯蚓 翻去腹土 田螺 去殼曬乾

牡蠣 煨研

石決明 煨

珍珠 豆腐內煮數滾布包搥碎同燈心研末

人中白 煨研

桐案各藥製法不一白當檢尋本草即如陳皮去

白留白各有攸宜豈得概言去白此不過為習外

科者簡便起見耳

逐日人神歌第一百五十九

初一十一二十一。大拇鼻柱手小指。秋二十二二十二。

外踝髮際外踝位。初三十三二十三。股內牙齒足股肝。

初四十四二十四腰間胃腕陽明手初五十五二十五
口舌徧身陽明足初六十六二十六手掌胸前又在腸
初七十七二十七內踝氣衝及在膝初八十八二十八
子腕股內併在陰初九十九二十九在尻在足膝脛後
初十二十三三十日腰背內踝足趺覓此爲太古相傳針
灸莫犯爲吉

十二時人神歌第一百六十

子踝丑腰寅在月卯五辰頭巳王終午胸未腹申在心
酉背戌頭丁股續


十干日針忌歌第一百六十一

甲不治頭乙耳喉。丙肩丁背與心求。戊己腹脾庚腰肺。
辛膝壬當腎脛收。癸日不宜針手足。十干不犯則無憂。

屍神歌圖第一百六十二

屍神所在有根由。坤內外踝聖人留。震宮牙端分明記。
巽位還居乳口頭。中宮肩骨連屍骨。面目還從乾上遊。
手膊兌宮難砭灸。艮宮腰項也須休。離宮膝脇針難下。
坎肘還連肚脚求。爲醫精曉屍神訣。萬病無干禁忌憂。

屍神圖



此圖一歲起坤。二歲起震。逐年順飛九宮。週而復始。行年到處。則所主症。切忌針灸。俱勿犯之。否則變生他病。

醫家五戒第一百六十三

一戒無論病家大小貧富有請便往。勿得遲延厭怠。藥金勿計校輕重。一例盡心施治。自然生意日增。不傷方寸。

三戒凡遇婦女及孀婦尼僧人等。必候侍者在傍。然後入房診視。倘侍者偶不在傍。更宜謹避嫌疑。真誠診視。歸對妻子。亦不可妄談閨闈。

二戒不得出脫病家珠珀珍貴等物。送家合藥。暗中調換。如果該用。令彼自製。庶無疑謗。

四戒。凡爲醫者。勿耽嗜好。恐志慮紛馳。勿晏起。勿無事
他出。致就診者守候無時。切脈必當用意。寫方務要
依經。不可胡亂杜撰。受人批駁。

五戒。凡娼妓及私夥家。請看亦當視如良家子女。勿存
他意見戲。以取不正之名。視畢便回。貧窘者藥金可
璧。病愈不可再往。

醫家十要第一百六十四

一要。先明儒理。然後習醫。或內或外。勤讀古書。手不釋
卷。一一參明。融化得之於心。應之於手。臨症時自無

差謬。

二要。選買藥品。必遵雷公炮製。或依方修合。或隨症加減。湯散取辨於臨時。丸丹預製於平日。膏藥愈久愈靈。線藥越陳越好。藥不吝珍。施必獲效。

三要。凡鄉井同道之士。不可傲慢輕侮。年尊者恭敬之。有學者師事之。名重而自高者。遜讓之。技精而未顯者。薦拔之。如此自無謗怨。

四要。治家須與治病同人。不惜元氣。斷喪太過。則百病生。醫不顧來源。靡費太過。則百用窘。能治家然後養

生有資。不致視病人爲奇貨。

五要。人受命於天。醫者受人謝儀。當知天道。順逆。順取者吉。逆取者凶。不論多寡。是謂順取。勒索厚資。是謂逆取。天卽因其順逆。爲報應。不可不儆。

六要。凡里中親友人情。如婚喪疾病慶賀。及饋送來往之禮。不可求奇好勝。每食只可一魚一菜。一則省費。二則惜祿。至病人之家。尤不可苛求飲食。

七要。貧窘之家。及遊食僧道。衙門差役人等。凡來看病。不可要他藥錢。只當奉送貧窘至極者。當量力資助。

不然有藥無食活命亦難。

八要。凡有所蓄。隨其多寡。便當置買產業。以爲根本。不可收買玩器。及不急物件。浪費錢財。醫本仁術。有餘則以施藥可也。

九要。凡店中所用醫藥器具。俱要精備齊整。不得臨時缺少。又古今前賢及近時名公新刊醫書。必尋究參閱。以進學問。

十要。凡奉官衙所請。必當速去。毋得怠緩。要誠意恭彼。告明病源。開具方藥。病愈之後。不得圖求匾禮。亦不

得請託人情。致生罪戾。

以上五戒十要。乃保身保家之法。當置座右。朝夕省覽。賢能子孫遵而行之。可以成家立業。若不聽信。必有飢寒不足之憂。悔何及矣。

楣案五戒十要著書者。蓋以垂爲家訓。故原本有與醫無涉者。余於全書俱順文刪改。不參己意。獨此稍爲增益。爲業醫者告焉。勒索厚資。尤外科包醫惡習。所望讀此而幡然改悔也。