

諺解胎產集要



要集產胎解諺

萬曆三十六年

內賜行大司成金功諺解胎產集

命除謝

右承旨臣朴

右承旨

冊第 581 號

聯名 20615

診解胎產集要目錄

求嗣

固本健陽丹

溫經湯一名調經

女金丹一名玉麟

戊戌酒

灸法

孕胎

十月胎形

胎數

胎毒

五子衍宗丸

調經種子湯

種子建中丸一名百

單方

神方驗胎散

艾醋湯

○辨男女法 無方

○轉女為男法

單方 六

○惡阻

人參橘皮湯 一名參橘散

白朮散

○禁忌 無方

○將理 無方

○通治

芎歸湯 一名佛手散

益母丸 一名陰丹

返魂丹

四物湯

○安胎

獨聖散

一名安胎散

膠艾湯

安胎飲

蔥白湯

蔥粥

治法

單方

○欲產候無方

○保產

十產候

霹靂丹

如神散

一名神驗散

催生如

催生丹

紫蘇飲

一名縮胎飲
一名達生散

知聖膏

治法

襌法

○半產

芩朮湯

安胎丸

單方

○察色驗胎生死

無方

○下死胎

香桂散

治法

單方

○下胞衣

治法

襌法

產前諸證

○子癰

羚羊角湯

愈風散

荆一
湯名歸

○子煩

竹葉湯

竹瀝湯

單方一

○子腫

鯉魚湯

全生白朮散

單方一

○子淋

澤瀉湯

熨法

手法

○子痢

雞黃散

鴨子煎

單方

○子瘡

腥脾飲子

露薑飲

○子嗽

紫苑茸湯

百合散

單方

○子懸

葱白湯

○感寒

芎蘇散

葱白湯

○不語

治法一

○兒在腹中哭

單方二

○腹中鍾鳴

單方一

產後諸證

○兒枕痛

失笑散

黑龍丹

單方一

○血暈

花藥石散

治法二

熏法一

吹法一

○血崩

單方一

○衄血

犀角地黄湯

襍法一

○喘急

奪命散

小參蘇飲

○咳逆

治法一

單方一

不語

孤鳳散

七珍散

○發熱

柴胡四物湯

涼血地黃湯

治法一

單方一

○乳懸

治法一

○陰脫

單方二

○過月不產

八物湯

○下乳汁

立效方

猪蹄粥

治法

單方

○臨產預備藥物

無方

○貼產圖法

安產方位圖

借地呪

避日遊胎殺

避十三神

○附初生小兒救急

治法

十二

諺解胎產集要目錄終

諺解胎產集要

조식비여난는종요모호방법은

御醫 臣 許浚奉 教撰

○求嗣

조식구호야나호방법

醫學入門曰男子精冷婦人血衰皆不成胎

의호입문의골오디스나히정기츠니과겨지
그소호니는다티괴몬되느니라

脉經曰男子脉微弱而澁爲無子精氣清冷也

陽丹五子
符宗丸

목경의골오디스나히목이미약호고습호면지

기닝호디니고본건양단과오조연종화이맛등

호니라

求嗣

朱彥脩曰求子之法莫先調經凡婦人無子

必或先或後或多或少或紫或黑或淡或凝而不調

如此則必不成孕

宜溫經湯調經種子建中丸

주언쉬골오디즈식구호여나흐법은몬져경

도화흙만호니업스니물잇겨짐이즈식업스

는그경휘혹몬져오며혹후에오며혹하며호

그며혹검블그며호거으며혹담호며혹얼의

고른디아닌니이러면반드시티괴되디몬호

니니온경탕과도경종옥탕과녀금단과빅즈건

등환이맛당호니라

固本健陽丹

求嗣

熟地黄

山茱萸

酒蒸各三兩

巴戟

二兩

兔絲子

酒煮

續斷

酒浸

遠志

薑製

蛇床子

炒各一兩半

白茯苓

山藥

薑蒸

牛膝

酒浸

杜冲

炒

當歸

酒洗

肉苁蓉

酒浸

五味子

益智仁

薑水炒

鹿茸

酥炙各一兩

加枸杞子

三兩

人參

二兩

右搗爲末蜜丸梧子大每取九十九丸空心鹽湯

溫酒吞下臨卧再服男子服

萬病回春

高本健陽丹은속디화산슈유술부터여니

냥파극두냥토스즈술의달히니속판술의

니원저강즙에붓그니사상소붓그니각

뵝복신산약술적적비니우술술의

求嗣

붓고니당귀술의시스니육송용술의디
미주익디인소곰물에붓고니녹용소유볼라구
으니각훈양의구괴석냥인숨두냥가입홍야
디허고르밍기라솔에므라오동즈기티비빅
미아훈환식아적괴소곰물이나드스술의나
세고누을제쏘머그되스나히머그라

五子衍宗丸

枸杞子

兩九

兔絲子

兩七

覆盆子

兩五

車前子

兩三

五味子

兩一

右搗爲末蜜丸梧子大空心取九十九溫酒吞下

臨卧取五十丸鹽湯吞下男子服

廣嗣要語

求嗣

오지연종환은구기즈아흡양토스즈닐굽양복
분즈단냥차전즈석냥오미즈훈냥디허기르밍
기라술에미라오동즈기티비비여공심에아훈
환을드스술의슴세고누을제신환을소곰물에
슴셔머그되스나히머그라

溫經湯

一名調經散

治經水不調及子宮冷不受胎或

經半產後再不受孕

麥門冬

五兩

吳茱萸

三兩

半夏

二兩

人參

當歸

白芍藥

牡丹皮

阿膠珠

肉桂

川芎

甘草

各三兩

右剉每服五錢生薑五片空心水煎服

求嗣

온경타양근민후문도경산이니경후도
며밋즈궁이닝후여슈티몬후며혹디
다시슈티몬후니를고티니니뵈문동단양
오슈유석냥반하두냥반인슴당귀뵈샤약모
피아교주육계천궁감초각두냥이를싸후라
다솻돈식싱강다솻덤녀허달혀공심에머그
調經種玉湯

熟地黄

香附子

錢各六

當歸

洗酒

吳茱萸

炒

川芎

錢各四

白芍藥

白茯苓

陳皮

玄胡索

牡丹皮

錢各三

肉桂

乾薑

炮

熟艾

錢二

求嗣

右判分作四貼每服生薑三片同煎空心溫服臨
卧時留渣再煎服待經行之日服起一日一貼藥

盡經止交合必孕

古命醫藍

도경종옥탕은 숙디 황향부주 각여 슷돈당귀슬
의식고오슈유초항고천궁각너돈백사약백복
녕딘피현호삭모란피각서돈육계건강구
부빈박각두돈이를싸항라네복애분항야
의싱강세념터허달혀공심에먹고즈의듯사
누을제쏘달혀머그라겨집이울
항복식머거약다먹고울경곳거

면일덩이티항나리

求嗣

女金丹

當歸兩二

白芍藥

川芎

赤芍

藁本

人參

白薇

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

白茯苓

玄胡索

沒藥各一兩

甘草五錢

右除石脂沒藥外餘藥剉酒浸三日焙乾搗

足十五兩又香附米一斤水醋浸三日略炒為

足十五兩合和蜜丸彈子大每取一丸雞未鳴時

先以溫茶或薄荷湯漱口乃細嚼以溫酒或白湯

送下乾物壓之服至四十日即效真女中金丹也

丹溪附錄○廣嗣要語一
名曰玉鑰啓榮丸婦人服

求嗣

녀금단인당귀두냥빅샤약천궁적석지고본인
숨빅미모란피계심빅지빅톨빅복녕현호삭몰
약각훈냥감초다솟돈이롤적석지파몰약박셔
약을싸하라술의사홀동갓다가나여블에몰로
여디허기르열단냥밍글고쑤향부주밍기니
근을초애를빠돈가사홀마니나여잠산벗
허기르열단냥밍기라두글를섯거술에
즈기티비비여미훈환을들러아니우려셔문
나박하달히블로양지흥고츠츠십고
나더은물뢰나숨세고모른벗시버나
은환머그면호험인니진짓

토약이라

百子建中丸

一名百子附歸丸

香附子

酢去毛酒水和淹一宿焙乾搗末十二兩

阿膠珠

陳艾

醋煮乾

當歸

酒洗

川芎

白芍藥

熟地黃

各二兩

求嗣

右搗爲末足十二兩取大陳石榴一枚連皮拍

東流水三升熬銀石器去滓打麵糊和丸梧子大

每取百丸空心醋湯吞下婦人服

廣嗣要語

빅즈건동환은호일호문빅즈부귀환이라향부

즈를디허터럭업시호고술의물빠호르쌈동가

따가나여블에몬뢰여디허기르영근나양밍르고

求嗣

북근 아교 과무근 박초의 달혀 물로이니 당귀술의
시스니 천궁 백사약속 디황각 두냥이 룰싸하라
디허기르 열두냥 밍글고 큰니근 석뉴흔나흔겍
질조 차디허동으로 흐르는물서되 브어 달혀 거
지하 고밀기르 네허플수어 무라 오동조기티
비여 일백 환식공심에 초뵤물에 숨셔 나리
戊戌酒治婦人久冷無子冬至後取黃雄犬一口
皮腸水煮極爛去滓取汁糯米三斗蒸熟和汁
勻入白麴末三兩釀酒經二七日取清溫飲

盃 活人
心方

무술쥬는 부인의 오래 낳하 여 저식 업스 니 들고

求嗣

티니니동지후에누른수캐훈나흘자바감
속업시흥고물브어기장농난게달혀즈의업시
흥고太밭서말을닉게벼그물에섯고기르누룩
석냥드려비저두닐웨디나거든드리위셔훈다
두잔식더여머그라

有子方免絲子末和雀卵丸服宜男子久服之又

首烏九蒸九暴蜜丸男女並服

草本

즈식잇게훈방문토스즈를기르밍기라새알의
므라환지어스나히머그라또하슈오를아홉번
떼아홉번물뢰여술에작환흥여스나히겨집이
다머그라

孕胎

次法男子無子者多灸臍中有效世初方

뜨는법은은스나히즈식업스니빛복을만히뜨면

효험이크니라

○孕胎 아기빈증후라

醫學正傳曰凡欲求嗣先調經脉經脉既調宜以
事副之蓋婦人月經方絕金水纔生此時子宮正
乃受精結胎之候過此期則不受孕矣

의혹정년의글오디를읽지식을구홀딘대본
경목을도화홀거시니경목이도화홀거든이
로써도오미맛당호니부인의경회그치고구슈
고날제이빠예조궁이정하여러사니

孕胎

을바다티돌져기니이빠곳디나면비고도디
하느니라금슈는새피근나금빛근단말이라

醫學入門曰孕胎一月精血凝如一露珠謂之胚二
月變赤色如桃花瓣子謂之暉三月如清鼻涕雌雄
二器先就成男女形影謂之胎四月形象具五月
髮生六月口目成七月遊其魂能動左手八月遊
魄能動右手九月百節畢具三轉身十月臟腑齊
月數滿足母子分解其有延月而生者富貴而壽有
月不足者貧賤而夭

의호입문의글오디즈식빈호들애정혈이얼의
여호이스름미즈니기트니닐온비오두돌애변호

야복송와곳니빙기타니닐온운이오식돌애물근
고기타야암수두그르시몬져도야스나히겨집
얼골이아니니닐운티오넉돌애얼골이긋고다
숫돌애터럭이돈고여숫돌애입과눈이일고닐
굽돌애넉시노라원손을움즈기고여덥돌애
시노라을흔손을움즈기고아흙돌애빅절사
가자몸을세번두루혀고얼골애장뵈나통하
돌쉬족하야태면어미과조식이분하야
돌이므너나니노부귀하고당슈하고
나니는빙천하고얼죽느니라

○胎脉 ینگ팅하되이라

胎脉

素問曰婦人足少陰脉動甚者始子也

足少陰王永本作
手少陰全本為正

소문에 곧 오디겨집의 쪽쇼음막이 심히 쓰
는즈식빈목이라의 호강독애 곧 오디전원귀보
문의 쪽쇼음이라 호고왕빙본문니 슈쇼음이
호여스니 전본이 올롱니라

又曰陰搏陽別謂之有子

註曰陰尺中也陽寸口
脉搏擊與寸口殊別陽

氣挺然則為
妊之兆也

또 곧 오디음막이다이저양막과 다르면닐온즈
식빈목이라주에 곧 오디음은척동이오양은존
귀나척막이다이저촌구막애서달라양귀분명

驗胎

히내드르면즈식빈망되라

脉經曰孕脉滑而疾丹溪曰孕脉洪數

목경의골오디즈식빈목은다활하고색르다호
고단계골오디즈식빈목은고고조느니라

○驗胎 티그힘찰능느법이라

王好古曰凡婦人二三月經不行疑有孕却疑
宜神方驗胎散

왕호고골오디물윗겨집이두서늘월경아니
야즈식빈가도의심호며혈괴응테호가
호거돈신방힘티산쓰미맛방호니라

神方驗胎散胎

雀腦川芎

兩

大當歸

驗胎

右細末分二貼艾湯一盞調下數時頃覺腹
頻動卽有胎也無胎則不動如不効再煎艾湯
調下必神効

신방험티산은새머리기근천궁흐냥은당귀
극돈이롤세말흐야두복애는화담게달힌박
훈찬의플어머기라두어빼스이에빛소기조
움즈기면티괴인논자기오티괴업스면움즈
디아닌느니라호험업거든다시홍화달힌물에
플어머기면반드시알리라

驗胎法川芎細末一錢濃艾湯調下腹內漸動是有

胎方靈苑

辨男女

티그험찰흔번은천궁그르흐돈을딘흐뵙물에
플어머기라비소기움즈기면잉티그라

艾醋湯好醋煮艾葉服半盞腹中大痛是孕不痛爲

無孕 古
醫鑑

애조탕은도흐초의뵙님달혀반잔만머기라
그장아프면티오아니아프면티아니라

○辨男女法 스나히간나히분변흐법이라

脉經曰婦人有孕令人摸之如覆盃者則男也如
頸參差起者女也

목경의글오디겨집이잉티흐엇거든사름호

문지라잔어픈듯흐니는스나히오플고르기

辨男女

티머흐러내와드니는겨집이라

又曰遣姪婦面南行還復呼之左回首是男右回首是女

또글오뒤즈식빈겨집을남다히로가라호고도
로브르면왼턱크로머리도느니는스나히오
흐턱크로머리도느니는간나히라

又曰看姪婦上圍時夫從後急呼之左回首者是男
右回首者是女

또글오뒤즈식빈겨집이뒤산니들적을보와남
진이뒤흐로서셀리브르면왼턱크로머리도느
니는스나히오을흐턱크로도느니는간나히라

又曰孕婦尺脉左偏大爲男右偏大爲女

또 골오디즈식빈겨집의척목이왼녁키일편도
이크면스나히오올흔녁키일편도이크면간나
히라

古今醫鑑曰婦人有孕左乳房有核是男右乳房有
核是女

고금의감의골오디겨집이즈식비여셔왼저
몽은이이시면스나히오올흔저제몽은이이
면간나히라

○轉女爲男法

得效方曰懷孕三月名曰始胎血脉不流

是時男女未定故服藥方術轉令生男

득효방의골오디즈식빈석등을일흠을
니혈뫼이흐르디아니흐야일골을상하야변
니이저그남네덩티논흐여시모로약과방술
로두루혀스나히되게흐느니라

婦人大全曰始覺有孕以斧置孕婦臥席下勿令
若不信以斧懸抱卵雞窠下則一窠盡是雄雛

부인대전의골오디티그인느졸아라도치를
기마니겨집놓느자리미티녀코알외디말라만
일민디아니커든노치를알안느둘의등주리아
래드라두면흐자리다수되느니라

惡阻

又曰石雄黃

帶一兩絳囊盛

弓弩弦

腰一枚縛

萱草花之佩

雄雞長尾

拔三莖置卧席下勿令知

夫頭髮手足介甲

鋪席下

소골오디석옹향호낭을블큰니미치녀허윈녁
허리에치오고또활시울흐나홀허리에가마두
고또원츄리쇼졸太和또수둔기긴당복세나출
싸야자리아래몰로여녀허투고또남진너머
털과손톱발톱블자리아래녀흐라

○惡阻

惡音入聲

조식구지셔느병의일흠이라

張仲景曰婦人不能食無寒熱名姪娠於法六十日
當有此證設有醫治逆者却一月加吐下則絕之

絶者絶其醫治候其自安也

惡阻

양양경이 곧 오디겨집이 밥은 먹그되한열한병
업스니 온음음을 주식서니 디니법의여순날이
면이증인니니하다가의약으로고터도역하니
노음은만이더옥토커나즈치거든그치터의약
말고절로도호물기들우라

易簡方曰孕婦素有痰飲則飲與血搏頭目昏眩
食輒吐喜啖酸醎肢體倦怠多卧少起甚者或作寒
熱心中憤悶嘔吐痰水名曰惡阻

이간방의곧오디겨집이본디담음뜻이
시면담이혈기와서로디터머리며눈이아득하
야어즐코음식을은득토하고신것췌거슬즐겨

惡阻

먹고스지과일신이곳바늬기만코늬기작고심
흐니호츠허치우락더우락하며음이어즐러워
담담하며담과물을구토하니일음을악기죄라
하니니라

和劑曰妊婦惡食但以所思之物任意與喫必愈
화제예글오디즈식빈겨집이음식슬허허거
오직제싱각하니는거슬머기면반드서돈나니

人參橘皮湯

橘散一名參

治惡阻

人參 橘皮

白朮

麥門冬

各一

厚朴 白茯苓

各五錢

甘草

三錢

右剉五錢入生薑五片青竹茹一彈子大水煎服

惡阻

聖惠方

인삼을 골피탕은 이 일홈은 삼골산이니 악조변고
티니니인삼골피빅틀뭇문동각향후박빅복
녕각다숯돈감초서돈이롤싸하라다숯돈애
강다숯덤과뚝여흐돈녀허달혀머기라

白朮湯治惡阻吐清水十餘日粥藥不入

白朮

兩一

人參

錢五

丁香

半二

錢

甘草

錢

右剉一兩入生薑五片水煎服

婦人
大錢

빅틀산은 악조변으로 물근물을 열흘이나 토하

고죽도약도 못먹니니롤고티니니빅틀향인

삼다숯돈향두돈반감초향돈이롤싸하라향

禁忌

양의싱강다스덤녀허달허머기라

○禁忌 ㅈ식빈겨집이금괴흘법이라

醫學八門曰受孕之後大忌男女交合

의호입문의골오디ㅈ식빈후에남진겨집이흐
디자기를크게금괴하라

婦人大全曰受孕之後切宜避忌胎殺所遊隣家
修亦忌之經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打

者色青黯繫縛者相拘攣不可不慎

胎殺見
下產圖

부인대전의골오디ㅈ식빈후에떡살인노고돌

기장피호고이웃지비성조호기호소라저호화

경의골오디갈출범호면얼얼이반노시해허

禁忌

고흥질범하느니는곰기막혀나고니범하
치검프르고미즐리기범하면조리혀나니
삼가미가타아니하나라

又曰勿食馬肉驢肉犬肉兔肉羊肝雀肉鰾肉雞卵
鴨卵無鱗魚螃蟹薑芽葱蒜薏苡麥芽苜蓿菜桃仁
薑胡椒

또글오디물고기나귀고기개고기뚝기고기아
의간새고기자라고기닭기알을희알비늘업손
물고기게싱강엄파마늘의이보리가룸비름도
인건강호쵸이브티를머가디말라

○將理 상해몸관스훈법이라

將理

婦人大全曰衣毋太溫○食毋過飽○飲毋大醉○
勿妄服湯藥○勿妄用鍼灸○勿舉重登高涉險○
勿多睡卧○須時時行步○臨月不可洗頭

부인대전의 곧 오디주식빈겨집이 옷도너무덥
게말며밤도너무비브르게말며술도기장취
말며탕약을간대로먹디말며침구를간대로
며므게운것들며노픈뒤오르며힘흔디건너
를말며오래누어자기말며모로미시시로건너
고나홀들애머리곰디말라

○通治 산전산후통응야코티노약이라

芎歸湯益母丸返魂丹四物湯通治產前後諸疾

通治

通治

궁귀탕과 익모환과 반혼단과 스물탕은 산전산
후모든 병을 다 고티느니라

芎歸湯

一名佛手散

通治產前產後及橫生逆產血暈血

崩死胎不下臨月服則縮胎易產產後服則惡血
自下川芎四錢當歸六錢作貼煎服或等分煎

亦可

婦人大全

궁귀탕은 일흠은 불슈산이니 산전산후며 및 호
산역산이며 혈은 혈붕이며 주근티아니나느니
를 다 고티느니 님산애머그면티조라수이나고
산후에머그면피수이나느니 천궁녀돈당귀여
숫돈을싸하라호복밍고라달혀머그라또등분

通治

호야도도호니라

益母丸

一名濟陰丹

通治胎前產後一切諸病能行血養

血安胎順氣又治難產橫逆益母草端午日或六

月六日不犯鐵採取陰乾搗為末蜜丸彈子大每

一丸米飲或白湯嚼下空心或丸如梧子每取

丸如上法服

種杏仙方

익모환은호일흙은제음단이니산전산후에

드병을다고티고쏘피를히호며쳐내며티

안케호며귀은늘순케호고쏘기르남며상고

나논어려운산스를고티니니암노배아슬단은

날이나혹뉴월복일에나서범타고야음

通治

간호야디허기르땡기라솔에드라탄조기티비
비여호환식미음이나더운글에나시버호삼에
슴세라혹오동조기티비비여일뵙환식웃법기
티머그라

返魂丹治法同上又催生神效益母草如上法採
洗去土搗取汁銀石器熬成膏每取一二匙米

或白湯化下

醫學入門

반혼단은다스리노법이우과근고쏘조식수이
나케호미신타호니의모초롤웃법기티키야시
서디허즙나여석덩의고와길거든호술두술셔
미음에나온슈에나플어머그라

四物湯通治產前產後諸疾

熟地黃

白芍藥

川芎

當歸各等分

右判五錢水煎服劑和

스물탕은산전신후모든병을다고티느니속디
황백사약천궁당귀이를등분하야싸하라다
돈식달혀머기라

○安胎 티기동하거든편안케홀법이라

婦人大全曰胎動不安由衝任虛弱或舉重勞傷或
墮落傷損或驚動太甚或犯房勞皆令漏血墮胎宜獨

聖散膠艾湯安胎飲

부인대전의글오디티기동하야편티올하야

安胎

漏

의충목임목이 허약하거나 혹 무거운 것을 드려
로상하거나 혹 쓰는 드러상거나 혹 놀라 물기장심
히거나 혹 방스를 범하면 다 하야곰 피 흐르고
티디나니 독성산교애탕안티음이 맛당하니라
醫學入門曰心腹痛而下血者爲胎動不痛者爲

의호입문의골오디가슴비알꼭여피나니
티동이오아니아프고피만나니니티루라하
니니라

又曰犯房下血者眞漏胎也

八物湯加阿膠艾
葉枚之方見下

또골오디방스애범하야피나니니진짓누티

安胎

니 팔물탕에 아교에 엮가 하야 구하라

獨聖散

一名安胎散

治胎動欲墮縮砂不以多少熨斗內

炒去皮爲末每二錢熱酒調下不飲酒米飲下覺

腹內極熱胎已安神效

醫學正傳

독성산은은일흙은안티산이니티동하야디고
저하니를고티노니축사를다리우리에붓가
리땡키라두돈을더운슬의플어머기고슬몬
거든미음에머기라비소기더우면티괴편안하
니니신희하니라

膠艾湯治胎漏胎動

熟地黄

白芍藥

各二兩

當歸

艾葉

各半

安胎

阿膠

川芎

甘草

各一兩

右剉五錢酒水各半煎空心服

和劑

교애탕은 티루며 티동을 고티느니 숙디황백샤

약각두냥당귀애엽각훈양반아교천궁감초각

훈양이롤싸하라다숯돈을술과물반식하야

혀공심에머그라

安胎飲治胎不安

熟地黄

當歸

白芍藥

白朮

各一錢

人參

川芎

陳皮

各五分

紫蘇葉

縮砂

研

條芩

各五分

甘草

三分

右剉作一貼生薑三片水煎服

正傳

安胎

안태음인태기불안호니롤고티니니숙디황당
귀벽샤약빅톨각호돈인승천궁딘피각다스폰
즈소엽축사도황음감초각서폰이를싸호라호
복밍그라싱강세덤과달혀머기라

蔥白湯治胎動腰痛欲墮蔥白二握濃煮汁頓服即

安若胎死即下神效

王海藏方

총빅탕은티동호야허리아파디고저호니롤
티니니파힌민두줌을딘게달혀호식머그면즉
시편안호고만일티주거시면즉제나니신묘
호니라

蔥粥治同上糯米作粥入蔥白三莖再煮蔥熟食

佳醫學

총죽은고티기우과기트니태발죽에파힘민세
녀허다시글혀패니거든머기면도호니라

古方安胎一月用烏雌雞三月用赤雄雞十月用猪
腰子餘月用鯉魚煮汁煎藥神效醫學

넛방문의티그편개호기를첫돌이어든거문
돌쓰고석돌이어든블근수돌쓰고열돌애랑도
티공푹쓰고녀나돌애랑닝어로버달힌물에약
달혀머기면신평호니라

孕婦爲夫所困胎動氣欲絕竹瀝飲一升立愈

草本

조식빈겨집이남진의게보차여티동호야괴설

候

欲產候

코져흐거든득녁흐되를머기면즉시돈느니라

○欲產候 아거나코져흐느증후라

脉經曰娠婦脉離經設腹痛引腰脊爲欲產也

註曰呼

六至曰離經

목경의골오디임부의니경막이나고흐다가
알키허리과등을등기면나코져흐증후라주
골오디흐번실제막이여섯번식동흐면닐은
경이라

又曰尺脉轉急如切繩轉珠者即產也

또골오디척막이더옥급흐야노홀디문호
구슬구으리느듯호면즉제난느니라

欲產候

婦人大全曰產婦直待胎氣陷下兒通腹以膠連
極眼中生火穀道挺迸此是欲產之候方服藥
用力

부인대전의골오디주식빈겨집이덕히티고배
디여느려아기음문에다드로물기들위허리
거위기장아프고눈에불이나고미티블어나
이느나코저흐빠니보야흐로약먹고거치고음
아힘쓰라

○保產 히산을아보케흐는법이라

得效方曰臨產不可喧闐且進粥飯令人扶策徐行
若不得則僦物而立待產候將至然後方坐草

保產

득효방의골오디아가나키비릇거든젓피디말
고쥬기나밥이나머기고사름으로븐드러날회
여드니고몬근거든아모거시나지혀셔셔비알
키죓고나흔빼니른후에야거저그안즐씨니라
朱彥脩曰孕婦不肯舒伸行動只恐痛曲身側臥
子在腹中不能轉動以致橫生逆產甚則子死腹
慎之

쥬언슈골오디즈식빈겨집이몸을펴드니기를
즐겨아니코오직아프물춤노라몸을구프려겨
트로누어사모로즈식이복동에이셔능히도디
몬호야배곰기르나며갓고로나몰닐위고심호

保產

면조식이복통에서죽느니삼가라

婦人大全曰孕婦八月腹痛或作或止或痛不甚非正產之候或腹雖痛而腰不甚痛非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺逆者非正產之候水漿未破血未出者非正產之候漿血雖出而腹痛非正產之候不可坐草

부인대전의글오디조식빈겨집이돌차셔비알
키혹알음며혹그치며혹심히알프디아니면바
르나홀빼아니오비비록알파도혈이심히아니
알프면바르나홀빼아니오티기노피이셔빼디
여느리디아니면바르나홀빼아니오함만이를

十產候

어나디아니면바르나훈배아니오미리와디를
이아니났고피몬나시면바르나훈배아니오를
과피다도비아프디아니면바르나훈배아니
거저괴오르디말라

○十產候 열가지히산하는증후라

正産謂月數旣滿忽然腹痛胎孕陷下漿血淋流
力則其兒遂生

바르나니니는돌쉬차쳐은득비알프고티구
디여니리고을과피흐르거든힘쓰면저식이즉
제나니라

坐産謂臨産疲倦久坐兒抵坐路不能下生當

十產候

處懸掛手巾令產婦攀引令產兒生

안자셔난느니느니등우비르서기바오래안자
리즈식이날길헤다드라도나디몬흐느니라
이노핀디슈건을미여들고산부로흐여곰더
자바등고고발을구피면즈식이나느니라

臥產謂產母臥定背平着席體不偃曲則兒不矢

道自然易產

누어셔나흐문닐온산뒤편바누어등을펴듯
다히고몸을굽게아니흐면즈식이날길흘일티
아니흐야즈연히수이난느니라

橫產謂先露手令產母仰臥收生者徐徐先推兒下

十產候

十產候

體令直上通手以中指摩其肩推上而正之漸引
手攀其耳令兒頭正門路順方服膏歸湯三退散
益母丸返魂丹坐草用力

회산은닐온아괴소니물져나미니산모로히야
곰젓바누이고나히는사름이날회여몬져아
아래롤미러바르티알고손놀녀허가온대사
으로아괴엇게를미러바르게호고점점손으
아괴귀를자바둥귀야바르게호고길히숨커
보야호로호귀탕삼퇴산의모환반호단약호
먹고거저고안자힘쓰라

逆産謂先露足令産母仰卧不得分毫用力驚極收

十產候

生者徐徐推其足就一邊直上良久漸漸推
就一邊令其順下待兒身轉順門路正方
湯三退散益母丸返魂丹等藥坐草用力○又法
用細鍼刺兒足心深一二分三四刺之以鹽塗其
上輕輕送入兒得痛驚轉一縮即順生下橫產
用此法○又法以鹽塗兒手足心急搔之併鹽
母腹上自然順生

역산은닐온발이몬져나미니산모를젓바누이
고쥌고매도힘쓰며놀라디말게호고나히는사
름이날회여아그발을미러호겨트로바르티완
고오라게든점점아긔머리물미러호겨트로순

十產候

하느려와아그몸이도라길히바르거든보야호
로궁귀탕삼퇴산익모환반혼단기토약을먹고
거저기안자힘쓰라○또호법의기느침으로아
그밧바당을흔흔두흔들게서너곧주고소공을
브르고서운서운머러들이라아기알파놀라도
라호번주리혀면즉제순히나느니횡산니도
법을쓰라○또호법의소공을아귀손바당발
당의브르고셀리뿌츠며극고또소공을엄의비
예뿌츠면즈연순히나느니라

偏產謂兒頭偏拄一傍只露額角不得出令產母仰
臥收生者輕輕推兒近上以手正其頭正仰產母

十產候

方服藥用力

편산은 날온 아귀 머리 쇠여 힘겨 틈다 하니 마안
내 완고 나디 몬호니 산모를 히여 곱젓바누이
고 나히느사름이 구만구만 아기를 미려티 완고
손으로 그머리를 바르 산문을 향케 호고 보야
로 약 먹고 힘쓰라

破産謂兒轉之時臍帶攀掛兒肩不能脫故雖露頂
而不得出令產母仰臥以生者輕輕推兒近上徐
徐通手以中指按兒兩肩理脫臍帶候兒正順方
服藥用力

애산은 날온 아귀 들제 빗복주레 아귀 잇게 곱여

十產候

벗디몬호모로비록덩바기내와다도나디몬호
느니내힐사룸이그만기만아기를우호로밀고
날회여손놀녀허가온대가락으로아기두엇게
를놀러빗복주를벗기고아기바르순케야약먹
고힘쓰라

盤腸產謂臨產時子腸先出兒即隨產治法用如

膏貼產母頂上又以磨刀水溫潤子腸飲磁石煎
湯一盞則自收○又法井水醋和相半喫產母面
或背上三次必收盡神妙

반당산은닐온아기나흐는체창죄몬져나고조식
이민바다나느니고틸범의어성고들배범의당

十產候

바기에브리고소칼근치기미를로드시향야창
즈를적시고지남석달힌을훈잔을머그면절로
드느니라○또훈법은정화슈과초과기터바엄
의느치나등의나썩으면세번늑반드시다드느
니신묘하니라

熱産謂盛暑解産宜居深幽靜室日色遠處開啓
戶多貯清水照冰

열산은닐은기장더운제아기나커든맛당히김
고안정코햇빛먼디잇고창지개를열고물근를
을만히깃고어름브위두고보라

凍産謂嚴冬解産宜蜜閉房戶内外生火常令溫暖

十產候

仍厚覆下體常使溫和

동산은닐은온음동애아기나흔제맛당히방문을
즈오기단고안밭그블뛰여미양덥게하고하리
아래를두터이더퍼미양은화케하라

醫學正傳曰臨產胞漿既破過時不產便當服催生

藥爲要緊夫胞漿者胞內養兒之水也胞既拆破

隨水而下則易生若兒無力轉頭遲慢水血先下

路乾澁故難產宜用催生藥

宜猪脂香油清蜜宜便意
白瘻子滑石榆白皮之

의호정던의골오디아기나흔제머리와딘글이

나되빠계도록아나나기든은득최싱구구다

종요로니머리와딘글은안세안해아기제르

十產候

이니 피뵈디여든 아그그물 조나나 습
와만일 아기 힘이 업서 머리 두루기 등신게
물과 피몬져나고 조식그길히물오모로나키어
렵느니 최성약쓰미맛당흐니라 약은도티기
참기름솔동조쇼변파힌민아혹배활석느릅
모검칠리돌히라

婦人大全曰水血多下子路乾澁此時如舟坐灘須
用益血固血之藥自然易產

宜催生如聖
散佛手散

부인대전의골오딘들과피만히나아기길히
르면이제마치비여흐레결인듯흐니모로미혈
을더으고혈을구틸약을별거시니조연히수이

十產候

나리라 초생 여성산과 불슈산이 맛당하니라

醫學入門曰臨產忽然氣痿目翻口噤面黑唇青口

中沫出則子母俱殞急用霹靂丹救之如神散亦可

의호입분의골오디즈식비르서셔홀연히귀은

이서라디고눈을되혀고입을다물고느치검고

입시우리프르고입에거품나면즈식과엄이

죽느니셀리벽낙단을배구완하라여신산이소

가하니라

霹靂丹

蛇蛻一條

蠶退二錢

男子頭髮

路上左脚草鞋並燒存性

乳香五分

十產候

黑鉛二錢以水銀七分半同入銚內火上熔攪勻結成砂子

右爲末以獾猪心血和丸梧子大金銀箔七片爲衣每二丸倒流水化下

백년단은 온비야미형을 흐나 누에난비김질두
돈스나히머리터럭길헤디연논원발초혜썩리
다검게스라각호돈식유향다솟푸연두돈을스
은닐굽돈반과도판늑노겨저어몰애되거돈이
를기라수도티넘통피에므라오동즈기티비비
여금박은박닐굽편으로의니피미두환식갓고
로흐르는물에플어머기라

如神散一名神驗散治難產極驗臨產時令人取路傍草

十產候

鞋一隻取鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服得左足者
生男右足者生女覆者兒死側者有驚自然理也

方得効

여신산은호일흙은신험산이니난산의기장신
험호니비르서실제사롬호야길헤딘초혜호작
글어더오라호야그티얼근권노홀스라호돈
드스솔의플어머그면즉시난니원발애치는
아들나코올호발애치는들나코업더디니는아
기주것고구러디니는놀라시니조연호니라

催生如聖散

一名黑神散

治難產百草霜白芷等分爲末

每二錢以童便米醋相半調服即產

十產候

湯煎水調服尤妙婦人 大全

최싱여성산은일명은흑신산이니난산을고티
니손미티검의영과빅짓기리기티흥여두돈
식동조쇼변과초의플어머기면즉시난나니라
쏘궁귀탕의플어머그면더도흥니라

催生竹治難產神效

臘月兔腦髓一枚

乳香末二錢

母丁香末一錢

麝香末二分

右和丸櫻桃大陰乾封貯每一丸溫水研服即產

隨男左女右手握出是驗方 易

최싱단은난산애신흡하니섯돌푹기머리글슈

十產候

흐나유향기리두돈반모덩향기리호돈샤향기
리두돈반호던미라잉도기티환지어더운물에
기라머그면즉시난느니스나히노윈소내주고
간나히노을호손내주여나느니이효힘이라

芎歸湯通治十產艱難每取一貼加益母草三錢煎

服神效方見通治

궁귀탕은열가지산스어려우니들고리느니호
복의익모초서돈가호야머그면신희호니라

益母丸返魂丹並治橫逆難產臨月服之易產無病

方見通治

익모환과반호단은다횡산역산난산을고티고

十產候

나흔들애머그면수이나코병업느니라

三退散 一名催生散 治橫逆難產

蛇退 全者一條 蟬退 十四枚 男子頭髮雞子大 煨存性

右爲末分作二服溫酒調服即產 丹溪方

삼퇴산은흥일흥은최싱산이니횡산역산난산
을다고티느니비아미형을오니흔나미아미형
을열네낫스나히머리터럭뒤기알마치롤다스
라기르밍그라두복애느화드스슬의플어머기
면즉제난느니라

紫蘇飲 一名縮胎飲 治臨產驚惶氣結難產

紫蘇葉 兩 人參 大腹皮 川芎

十產候

陳皮

白芍藥

當歸

各五錢

甘草

半錢

右剉分作四貼每貼入生薑四片葱白三莖水煎

服

本方

丹溪加枳殼縮砂各五錢名達生散臨月

服之滑胎易產

조소음은홍일홍은축티음이니조식비르서서
놀라고두려기운이미쳐난산하니물고터니
조소엽홍양인숨대복피천궁딘피백샤약당귀
각다소돈감초두돈반이롤싸하라네복의분홍
야미홍복의싱강네렴파흰민돌녀하달혀머기
라홍방문의기각축사각다소논가입홍면인홍
을달싱산이니돌차거른머그면

十產候

治難產方香油清蜜各一盞融化調滑石末一兩服
之外以油蜜摩母腹上即產又曰油蜜童便最治

難產 丹溪方

난산고 티노방 문참기름 청밀 각 한자 을노겨활
석고리, 흥냥, 뜰어, 먹고, 밧고, 로기, 름, 쏘, 얼, 얼, 의, 비
예, 뿌, 츠, 면, 즉, 제, 난, 나, 니, 라, 쏘, 곧, 오, 디, 기, 름, 곧, 동, 기
쇼, 변, 이, 난, 산, 을, 잘, 고, 티, 나, 니, 라

如聖膏治難產危急巴豆十六箇去殼葶麻子四十
九箇去殼麝香二錢同搗如泥攤帛上貼臍中少

頃解產即洗去 醫學入門

여, 성, 고, 노, 난, 산, 위, 급, 하, 니, 룰, 고, 티, 나, 니, 과, 두, 열, 여

法
襁法

스과비마즈마은아흙한다검질벗기고샤향두
돈흔뒤씨허김슈건의볼라빛복의브티면저근
덧흐야난니즉제시서브리라

○襁法 방지흐야수이나케흐느법이라

臨産先脫産婦尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易

産勿令知_{方得効}

림산커든몬저산부의상해니브는오슬벗겨드역
머리과어고예셔누면수이난니니모로게흐라

臨産取赤馬皮鋪之令産母坐其上易産_{本草}

즈식비르서셔블근돌가죽을셀고산뵈그우희
안즈면수이난니라

襍法

難産取鼯鼠皮毛

即飛生也

或海馬或石燕子産婦兩手

各把一枚立驗

草本

산시어렵거든는는드라미갑질이 나혹히매나
석연지나산뽕두손내흐나식취면즉시난는네

○半産

即落胎也

열들안해디나흐증이라

得效方曰正産如栗熟子落兩無所損半産則比如
採斫新栗其傷必多宜十倍調治

득효방의글오디정산은마치밤니거벼러디듯
흐여돌히다손해흐디업거니와반산은견후견
댄선밤을버혀내듯흐야그양호미반드시하
니열볼이나도리호미맛당흐니라

半産

醫學入門曰婦人受孕遇三五七陽月必墮宜服安胎丸以清其熱若氣血不足則預服八物湯以防墮

落八物湯方見過月不產

의호입문의골오뒤겨집이즈식비여석돌다솟
돌닐굽돌양울곳만나면반드시디느니맛당히
안티환을머거그열을성냥케하라다가지혈
이브족호거든팔을탕을머거티디를방차하라
又曰半產多在三五七月內至其期必復墮若覺有
胎須於兩箇月半後服清熱之藥三四貼以防三月
之墮至四箇月半後再服八九貼以防五月之墮至
六箇月半後再服五六貼以防七月之墮過此則無

半產

虞矣

宜茶湯

쏘골오디낙티호기석들다
숯들닐굽돌안해만
히인느니그배예니르면반
드서쏘디느니만일
티그이슈물아라든모로미
두돌반후에열고틸
약서너복을머거배곰석돌
재디물방차호고녁
돌반후에니르거든쏘여
좁아흙복을머거다숯
돌래디물방차호고여숯
돌반후에니르거든쏘
다옛복을머거칠월의디
물방차호야이돌디내
면근심이업스리라금
를탕이맛당호니라

芩朮湯乃安胎之聖藥也
胎動急則一日三服緩則

三日一服

條黃芩

兩一

白朮

錢五

右剉五錢水煎服

醫學入門

금톨타은티기편안케흐는성약이니티기동키
금기든흐르세번먹고우연커든사흘애흐번머
그라기논황금흐냥빅톨다솓돈이를싸흐라다
솓돈식달혀머기라

半產

半產

安胎丸即芩朮湯材爲末粥丸梧子大白湯吞下五
十丸

안티환은금톨탕지로기르밍기라죽물에작환
흐야더운물에순환식삼세라

一方孕至三箇月必墮不肯服藥用老母雞煮湯入

紅殼小黃米煮粥食之甚妙萬病回春

음방문의 즈식 비여 석돌 마니 반드 시디 우되 안
을 막디 아니 커늘 늘근 암늬 슬은 물에 것 불근 기
장 밭로 죽수 어머 기니 티편 안코 기 장도 흥니라
○察色驗胎生死 산부의 늬비 출슬 퍼 티기 주
그며 사로 물 힘찰 호미라

婦人大全曰胎動不安甚者當以母形色察之母面
赤舌青者母活子死面青舌赤者母死子活唇舌俱
青口中沫出者母子俱死

부인 대전의 글 오티 티기 동 흥야 기 장 불 안 흥 거
든 맛 당이 엄의 얼 글 빗 태로 슬 퍼 알 거 시 니 엄의

察色驗
胎生死

나치붉고혜프르면엄이살고즈식이죽고엄이
나치프르고혜블그면엄이죽고즈식이살고
나치입혜다프르고입에거품나면엄이과즈식이다
죽나니라

脉經曰孕婦腹痛胎不動欲知生死以手摸之冷者
爲死溫者爲生

목경의골오디잉. 뷔비알코. 티움즈기. 디아니커
든사라시며. 주거시. 를알고. 저홀딘. 대소노로. 비
를은. 지면. 태니. 는. 주것고. 디. 운이. 는. 사. 랫. 나. 니. 라
萬病回春曰產母舌黑者子已死矣佛手散救之
만병회춘에產母舌黑者子已死矣佛手散救之

方見
通治

下死胎

디니 불슈산을 배구완하

○下死胎 主근티를나케하느법이라

佛手散治孕婦傷胎心腹痛惡露不下口噤欲絕用

此探之若不損則痛止子母俱安若胎死則立便

逐下神效 方見通治

불슈산은잉뵈티괴상하야가슴비알고모딘피

아니나고입을다물고괴절코저하느니롤고티느

니이약을쓰리티괴옷샹티아네시면어미과조

식이다편안하고티괴곳주거시면즉제췌차내

느니신효하느니라

香桂散下死胎

桂心三錢

麝香半錢

右爲末作一貼溫酒調服即下得効方

향게산은주근티를노리티느니계심서돈샤향
반돈그르밍기라흐복을지어드스술의플어머
기면즉제난느니라

下死胎

一方子死腹中或半出不下或着脊不出母氣欲絕

猪脂

白蜜各一升

醇酒二升

右煎取二升分二服即下不飲酒則代童便婦人大全

흐방문의즈식이복등에셔주거반만걸여나디

아니며혹등의브터아니나음이괴절코져하거

든도티기름과도흐술각흐되도흐술두되이를

달혀 두되 되거든 들... 화마그...

라술몬머거든동조쇼변을쓰라

一方胎死腹中或有兩胎一生一死服此則死者出生者安

鱗介

升一

大甘草

五錢半生半炒

阿膠

二兩半生半炒

右剉以東流水七盞於東向藥竈用葦薪火煎至

三盞去滓入阿膠令融化分三次頓服神效

醫方類聚

훈방은의주식이복등에주거시며혹상티이서

훈나훈살고훈나훈주것거든이를머그면주그

니는나고사니는편안하니게발톱훈되큰감

초다솟돈반을싱하고반을붓고아교두냥반을

下死胎

싱싱고반을붓가이를싸하라동넉크로흐르는
물닐굽되로동넉향흐브어그골로달혀서되되
거든즈의업시호고아교녀허죽거든세혜는화
머그면신호하니라

一方黃牯牛熱糞取塗母腹上死胎即下

醫學
正傳

호방문의누른수쇠똥더우니를엄의비에브르
면주근티죽제나니라

如聖膏塗母右脚心死胎即下

方見
保產

여성고를엄의을호발바당의브티면주근티죽
제나니라

○下胞衣 안색나게호니법이라

下胞衣

婦人大全曰胞衣不下稍久則惡血流入胞中故胎
脹衝心必死急以小物緊緊繫臍帶垂重然後切斷只
要產母心懷安泰勉進粥飯自然痿縮而下累試皆
驗

부인대전의글오디포의몬나잠산오라면모든
피안새에흘러드루모로피양기흐야가슴애다
티면반드시죽니니셀리쇼고만거슬얼거빛복
줄기에구디미여드리온후에긋고오직산외모
음을편안히먹고죽과밤을힘써머그면자연조
라나니니만히디내니다효험잇더라

醫學正傳曰切不可令人妄用手法採取或因此而

下胞衣

殂或損溺胞致終身之害慎之

의혹정년의골오디샤룸으로후야망냥도이손

을버더드머내미그장가티아니흐니일로죽으

며혹오좀새로힐위종신로록해되느니삼가라

花藥石散治胞衣不下最妙童便調下一錢即下

方見產後

화예석산은포의아니나느디기장도흐니동조

쇼변의흐돈을플어머그면즉시나느니라

三退散治胞衣不下服之立出

方見保產

삼퇴산은포의아니나거든머그면즉시나느니

如聖膏塗母右腳心胞衣即下

方見赤產

여성그를어미의을하발바당의느면포의조

下胞衣

나느니라

一方猪脂清蜜香油各半升火上熔化分二服胞衣便下極驗或多服猪脂亦下

產書

한방문의근오디도티기름솔참기름각반되식
한야블에노겨들혜는화머그면포의즉제나느
나기장신험한나라후도티기름만만히머거도
나느니라

一方取三姓家雞卵三枚三姓家水各一匙三姓家

鹽各一撮合和頓服仍探喉中令嘔胞衣即下

俗方

한방문의세가지성집의가늬기알세어고세성
집의가물한술씩어고세성집의가소물한자봄

產前諸證

子癇

식어더흐디플어먹고손으로입에녀허욕욕
면포의즉시나나니라

穰法取產母視覆井口勿令知胞衣即下

草本

방지흐는입은산무의등의를기마니가져다가
우클우희두프면포의즉시나나니라

○產前諸證 아기아나나흐전의모든병증이라

○子癇 不食빈겨집의간증이라

婦人大全曰孕婦項強口噤手足攣搐痰盛昏迷

曰子癇

宜羚羊角湯愈風散

부인대전의곧오디不食빈겨집이목이근세호

입을다들고손발을수리할후고남이성호야호

미하느니라
은조간이니
양유
이

당호니라

羚羊角湯治子癇

羚羊角

鎊一

獨活

酸棗仁

五加皮

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯苓

杏仁

鎊五

木香

甘草

鎊二

子癇

右剉作一貼生薑三片水煎服

녕양각타은조간을고티니니녕양각슬허호돈

독활산조인오가피각여독분의이별방풍당귀

천궁복신흡인각다솟분목향감초각두분반이

를싸호라호복지어청강세럼니허달허어기라

愈風散治子癇一名歸

荊芥穗炒

當歸各等分

右爲末每取二錢豆淋酒調下

유평산은은의일흙은귀형탕이니조간고티니니
덩가이삭을잠산붓고당귀과기티하야기르밍
기라거른콩붓가드문술의두돈식플어먹이라
○子煩 子식빈겨집의번열은중이라

子煩

婦人大全曰孕婦心煩躁悶謂之子煩宜竹葉湯

부인대전의글오디조식빈겨집이모음이번열
은여답답은면닐은조번증이니독염탕과독
탕이맛당하니라

竹葉湯治子煩

白茯苓錢二

麥門冬

黃芩

錢各半

防風

錢一

右剉作一服青竹葉七片同煎服

萬病回春

득엽탕은 두 번 고티니, 니빅복녕두돈막운동화
금각호돈반방풍호돈이를싸하라호복망기라
프른댄님닐곱녀허달혀머기라

竹瀝湯治子煩赤茯苓一兩剉水一升煎取七合和

竹瀝三合溫服

草本

득녁탕은 두 번 고티니, 니적복녕호냥싸하라를
호되로달혀칠흡되거든득녁서흡빠머기라

一方治子煩竹瀝細細飲之

草本

子腫

호바은문의득녁을작작머그라

○子腫 子식빈겨집이븐느증이라

婦人大全曰孕婦至五六月遍身浮腫腹脹喘急謂

之子腫若不治必損其胎 宜鯉魚湯全
生白木散

부인대전의글오디子식빈겨집어다엇돌애니
르러온몸이붓고비브르고천급하면닐운주종
이니아니고티면반드시낙티호느니넣어탕과
전싱빅톨산이맛당호느니라

鯉魚湯治子腫

白朮

赤茯苓 各二錢

白芍藥

當歸 各半錢

橘紅 五分

子腫

右剉作一貼先取鯉魚一箇水煮取清汁一盞去魚入藥薑七片煎至一盞空心溫服以水盡爲

度醫學正傳

寧어탕은 저종고티니, 니뵈톨적복녕각두돈뵈
샤약당귀각흐돈반골홍다소핀이를싸흐라흐
복밍골고몬져닝어흐나흐를에달혀흐되가웃
되거든닝어내고약과싱강닐곱덤녀허달혀흐
되되거든공심에머고되브은기노도록머그라
全生白朮散治子腫

白朮

兩一

生薑皮

大腹皮

桑白皮

陳皮

茯苓皮

各五錢

子淋

右爲末每二錢空心米飲調下

전싱빅톨산은조종고티는니빅톨하냐싱강피

대복피상빅피딘피복병피각다솟돈이로기라

링기라두돈식미음에플어공심에머그라

一方治兩脚微浮桑白皮赤小豆水煎服

호방문의두다리잠산붓거든상빅피과블근곳

과달혀머기라

○子淋 조식빈겨집의님질이라

醫學入門曰孕婦胎氣壅塞小便淋澀謂之子淋

湯 若胎滿壓下胞系轉戾小便不通謂之轉胞此

證尤急宜用參朮飲探吐且用手法

子淋

의호인마의제어...
구더쁜든나니를닐은조림이니퇴사당이
하고만일티그그두하야나려와놀러오줌
기트러디여아조누디몬하나니를닐은...
이증이그장급하니숨톨음을써토하고소손나
로하는법을써고티라

澤瀉散治子淋

澤瀉

桑白皮

枳殼

檳榔

木通

赤茯苓

各一錢

右剉薑五片煎服

醫學正傳

퇴사산은조림고티나니퇴사상백피각비오낭

子淋

목통적복녕각훈돈이를싸하라싱강다솟덤네
허달혀공심에머그라

參朮飲治轉胞四物湯加入參白朮半夏陳皮各一

錢甘草五分右剉煎取先飲後探吐每日爲之歷

試皆驗 方丹溪

슴틀음은던포고티느니스물탕의인슴뵈들반
하딘피각훈돈감초반돈이를싸하라달혀먹고
민바다손녀허돌위토키를날마다하라디내니
다도터라

治轉胞方葱白切和鹽炒熱熨臍下立通 醫學入門

던포고티느방음은파인민싸하라수곰식거빛

子淋

복아래를올글흐면즉시통하느니라

治轉胞手法令產婆香油塗手自產門入托起其胎

則溺出如注

醫學綱目

던포증고티는손법은조식나히는겨집으로손
애기름볼라음문으로드러그티를미러니르혀
면오즘이붓드시나느니라

又法治轉胞將孕婦倒豎起胎不墮則溺自出矣

醫學入門

또법에던포고티기를잉부를하야곰갓고로세
드시하야티아니누르면쇼변이절로나느니라
○子痢 조식빈겨집이니질증이라

得效方曰孕婦下痢赤白謂之子痢

宜雞苗散
鴨子煎

子痢

득효방의 글 오디잉 뷔 뷔 큰 것 희 것 누 누니 돌리르
온 지리니 계 황 산 과 암 즈 전 이 맛 당 흥 니 라

雞黃散治子痢烏雞卵一箇去清留黃入黃丹一錢

攪勻厚紙糊口益泥固濟火煨爲末每二錢米飲

調下一服愈者是男二服愈者是女

本方

계 황 산 은 지 리 고 티 누 니 오 계 알 흥 나 흥 흥 흥 즈 의
업 시 노 큰 즈 의 만 두 고 황 단 흥 돈 녀 허 쪼 고 두 터
운 쇼 히 로 입 마 고 버 리 고 즈 흥 볼 라 블 에 스 라 기
르 밍 기 라 미 두 돈 식 미 음 에 플 어 머 기 면 흥 복 애
도 흥 면 스 나 히 오 두 복 애 도 흥 면 간 나 히 라

鴨子煎治子痢生薑年少者一兩年者者二兩

子痢

然汁鴨子一箇修之汁內攪勻同煎至八分入

黃三錢再煎五七沸空心服方本事

압즈전은은즈리고티느니싱강을저므니랑호냐
호고늘그니랑두냥을디허즙내고올히알호나
흘빠려강즙에녀허저어달혀팔분이되거든포
황서돈녀허다시다옛소송글혀공심에머기면
즉시돈느니라

臨產痢梔子燒灰細末空心米飲調一匙服本草

나홀돌애니질호거든지지를검게스라기르밧
기라공심에미음에호슬식플어머기라

○子瘡 즈식빈겨집의학질이라

子瘧

醫學入門曰孕婦寒熱往來謂之子瘧宜醒脾飲

의호인문의근오디잉부한열이왕니호니를

닐온주학이니성비음주노강음이도호니라

腥脾飲子治子瘧

厚朴 草豆蔻研各五錢 乾薑分三 甘草分一

右剉薑五片棗二枚同煎空心服醫學入門

성비음주주학고티니니후박초두구기니박

다스돈건강서핀감초호핀이돌싸호라싱강다

숫덤대초두났녀허달허공심에머기라

露薑飲治子瘧生薑四兩和皮搗取汁露一宿發日

早晨空心攪冷服種杏仙方

子嗽

노강음은 두 학고티니 니싱강넉냥을 범질트초차
디허즙내여호르,쌘아슬마쳐알호르날새개공심
에저어타니를머기라

○子嗽 子식빈겨집의기춤증이라

醫學正傳曰孕婦咳嗽不止謂之子嗽 宜紫苑茸湯百合

의호경년의의골오디잉뷔기춤을닐은조쉬니조
완용탕과빈합산이맛당호니라

紫苑茸湯治子嗽

紫苑茸 天門冬 各一錢半 桔梗 桑白皮

杏仁 甘草 各一錢

右剉作一貼入竹茹一塊煎服 醫學正傳

주완용탕은 주수고티니, 니주완용텐문동각호
돈반길경상빅피HING인감초각호돈이롤싸호라
호복밍기라독여호딩이티허달혀머기라
百合散治子嗽

百合

紫苑茸

貝母

白芍藥

前胡

赤茯苓

桔梗

各一錢

甘草

五分

右剉作一服薑五片煎服

方得効

빅합산은 주수고티니, 니빅합주완용패모빅샤

약전호적복녕길경각호돈감초다솟핀이롤싸

호라호복밍기라싱강다솟념녀허달혀머기라

一方治丁嗽貝母麩炒黃爲末砂糖拌和如櫻桃大

舍化燕之神效得効方

하바。문의。주수고티。디패모를기。올과누르게。붓
가기르。밍기。라사당。글리섯거。잉도마。곰비。비여
머구。머노겨。슴세。면기。장도。하니라

○子懸 잉부티。기가。슴애。오르니。를。주。현。이라
本事方曰。孕婦。胎氣。逆上。心胃。脹滿。疼痛。謂之子懸

宜紫蘇飲
葱白湯

본스。방의。글。오디。잉。부티。기가。슴애。올라。탕。만。하
고아。프니。를。닐。은。주。현。이。니。주。소。음。과。총。빅。탕。이
맛。당。하。니라

子懸

紫蘇飲治子懸萬見保產

感寒

조소음은조현고티니라

葱白湯治子懸葱白二十莖銀石器煮取汁頓服之

大漏人全

총빅탕은조현고티니니골근파힘민스름홀은

그르스나석탕의나달혀홀신머그라

○感寒 조식빈겨집이감한증이라

濟生方曰孕婦感冒風寒頭痛煩熱

宜用芎藭散葱白湯

제싱방의큰오디잉부풍한을감모호야머리알

코번열호거든궁소산과총빅탕을바라

芎藭散治感冒

川芎

紫蘇葉

白芍藥

感寒

麥門冬 陳皮

乾薑 芍藥 附子

右剉作一貼生薑五片葱白三莖同煎服附錄

궁소산은감모고티니니천궁조소엽뵈샤약뵈

툄뵈뵈문동딘피간갈각호돈감초다솟뵈이뵈

호라호복밍기라싱강다솟툄과파힌민세녀히

달혀머기라

葱白湯治感寒葱白一握生薑二兩右剉銀石器煎

服取汗活人書

총뵈탕은감한고티니니파힌민호중싱강두냥

싸호라은기나섹뵈의나달혀먹고셔뵈내라

○不語 不食빈겨집이말몬호고호기라

不語

素問曰人有重身九月而瘖此為何病歧伯曰胞之絡脉絕也胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言無治也當十月復註曰分婉則復舊勿藥可

소문의 글 오디사름의 몸이 쓰이셔 아홉달애 말
몬흐니 이므슴 병고기 벽이 글 오디포의 열린 벽
이그 처딘디니 포의 벽 낙이 신장의 미 엇고 쇼음
벽이 신장의 빼여 현미 티미 여시니 말롤 몬흐
니고 틸 법업스니 열돌애 나흐면 네와구 트리라
醫學入門曰孕婦不能言用四物湯加大黃芒硝各
一錢水煎去滓入蜜少許沉冷時時呷服則自能言
의호입문의 글 오디인 뷔말 몬흐거든스들 탕의

兒在腹
中哭

대황망소과호돈녀허말혀거지호아
빠치와시사로마시면조연히말호리라

○兒在腹中哭 아기엄의비소개셔울거
티는방법이라

醫學正傳曰兒在腹中哭者母之臍帶上疙瘡乃兒
口中含者因母登高取物脫出兒口以此作聲令母
曲腰向地拾物令兒復含口中聲即止

의호정년의글오뒤아기빗소개셔울기
빗복졸기우희머호러운거슬아기입에머구먼
는거시니엄의노픈뒤근안노라홀제아기입에
버서나모로이리소리호니엄이로히야허리

를구퍼다훈향하야아모거시나주으면그거시
도로입에드러소리긋나니라

一方兒在腹中哭多年空屋下鼠穴中土一塊令孕

婦噙之聲即止或爲末酒調服亦止 婦人 大金

훈방문의아기비소개셔울거든오래빈집안해

쥐곰긋훈헌덩이를잉뷔시비숨세면소리즉시

근나니또긋나니잉긋라술의플어머거도근나니라

又方黃連濃煎汁母呷之聲即止 得効 方

또방문의황련을딘게달혀엄이마시면소리즉

시근나니라

○腹中鐘鳴 不食빈겨집의비에셔쇠뿔소리

腹中鍾鳴

기티우느증이라

婦人大全曰孕婦腹中作鍾鳴取鼠穴土如上法用之

부인대전의글오디잉뵈비소개셔쇠뵈우드ㅎ
게든주곰기흙을웃법기티쓰면근느니라

○産後諸證 ㅈ식나흔후의모든증이라

○兒枕痛 ㅈ식나흔후에훗비알키라

婦人大全曰胎側有成形塊爲兒枕子欲生時枕破故其敗血不下則小腹痛不可忍乃血痕也

丸黑龍丹
花蓋石散

宜失咲
散紫金

부인대전의글오디티겨티얼굴지은혈괴이시

兒枕痛

면일홍을 아그벼개라흐니 주식날저그거
시뻘디모로그모던피나디아니면비알키를겨
니디몬흐니이근닐온혈가증이라실쇼산조
금환홍농단화에석산쓰미맛당흐니라

失咲散治兒枕痛五靈脂蒲黃等分爲末每二錢和

醋熬爲膏入水一盞煎至七分熱服立效

本草

실쇼산은호비알키고티니오령지포황을고
티호야그르밍그라두돈식초의플어달혀꺼
든들흐되브어반남죽되게흐여머그면즉시호
험나느니라

紫金丸治兒枕痛欲死百藥不效以失咲散末和醋

兒枕痛

熬膏作丸櫻桃大每二丸童便溫酒各半調服婦人
 寸金換은호비를죽게알하빅가지약이호힘업
 스니를고티느니실쇼산근늘초의미라달혀볼
 거든잉도마곰환지어두환식더운술과동조쇼
 변반잔식합호야플어머기라

黑龍丹治產後兒枕不散惡露不下痛極垂死者

五靈脂

當歸

川芎

良薑

熟地黃

各二錢

右剉細入雞子殼內鹽泥固濟火煨通紅候冷取

出入

百草霜

一兩

硫黃

乳香

各二錢

花藥石

煨

兒枕痛

琥珀各一錢

右研極細醋麵糊和丸彈子大每一丸炭火燒赤以薑汁童便溫酒中細研服之口噤者斡開口灌

三四丸即活

醫學正傳

흑몽단은 산후에 혈기 풀어 디디 아니코 모딘 피 아니나 비알 키극 하야 죽게 되니 룰고 티니니오 령지 당귀 천궁 양강 속디 화각 두돈이 를즐게 싸 하라 둠귀 알 겁질에 녀허 즈음 볼라 블에 솔와오 로 블 거든 시겨 나 여셔 빅 초상 훈양 석뉴 황유 향 각 두돈 화예 석블에 솔오니 과 호박 각 훈돈 녀허 기장기 놀게 기라 초의 순프레 무라 탄조기 티비

兒枕痛

비여호환을숫물에북게슬와강즙과동조쇼변
과더운술의기장이라머기라입다으니어은비
리하고서너환브어머기면즉제사느니라

花藥石散治産後兒枕痛欲死急以童便調一錢服

之取下惡血如猪肝或化爲黃水而出神效

方見血暈

화에석산은산후에호비알하죽고저호니틀고
티느니셀리동조쇼변의호돈을플어머겨모딘
피도티간고트니를내면호플어디여누든물되
여나느니신호호니라

芎歸湯加三稜蓬朮玄胡索桃仁紅花煎服治兒枕

痛甚效

方見通治

血暈

공귀탕의삼능뽕을투려호삭도인홍화가입호야
달혀머그면호비알룬되그장도호니라

一方治兒枕痛百藥不效螬蟬一箇爛搗溫酒調服

立止生男用尖臍生女用團臍

草本

호방문의호비알하일뵈약호여도호험업스디
고티느니산게호나홀느로니씨허드슨술의플
어머기면즉제근느니아들나햇거든수게쓰고
썰나햇거든암게를쓰라

○血暈 不食나호호후에어즐호중이라

婦人大全曰產後血暈不省有二若下血多而暈者

補血

醋 芎 歸 湯

之若下血少而暈者當破血散花 蓋 石 散 黑 龍 丹

血暈

부인대전의 글오디산후에어즐하야인스물초
리디몬하기두가지인스니만일피만하나어즐
커든혈을보하미맛당하니궁귀탕쓰고숫블에
초시터마티라만일피자기나얼즐커든혈을파
호미맛당하니화예석산과흑농단을쓰라

花藥石散治血暈不省花藥石四兩硫黃一兩爲末
入罐內鹽泥固濟晒乾安罇上炭火煨半日候冷

取出研極細每一錢熱童便調下

得効方

화예석산은혈운으로어즐하야인스물초리니
니를고티스니화예석낙양석뉴황하냥기리밍
기라도간의테허담고즈홀볼라물뢰여벽우희

血暈

안치고 숫블로 반날을 술와 식거든 내여기장세

말하야 미흔돈을 더운동조쇼변의플어머기라

黑龍丹治産後血暈垂死者灌藥得下即甦神驗

方見

兒枕痛

흑룡단은 산후에 혈은증으로 죽게되니 물고티

니니약을브어삼셔느리오면즉시세느니효험

이괴특하나라

芎歸湯治血暈用此煎水入荊芥穗炒末二錢調服

即效

方見
通治

공귀탕은 혈은고티느니이약달힌물에형개슈

붓가밍근기르두돈을플어머그면즉제효험인

血暈

나니라

治血暈方紅花一兩酒煎服又荊芥穗爲末二錢童

便一盞調服又好醋熱煎稍稍含之又以醋喫產

婦面常置醋近前使聞其氣產書

혈은고티는방문은홍화홍냥은술의달혀머기

고쏘형개슈를벗가기르밍기라두돈을동조쇼

변의플어머기고또도흔초를더여작작마시고

그초를산부의나치썰고미양초를아피두고그

내를마티라

又方生雞卵三枚吞之未醒童便一升飲之又醒

竹瀝服五合日三即醒產書

血暈

또방문의 놀똥기 알세 흘숨기고 세 디논 흥거든
동조 소변 흥되 룰마 시고 또 몬 세 거 든 독 녁 닷 흥
식 흥 르 세 번 머 그 면 즉 시 세 느 니 라

熏法 乾漆燒烟熏鼻即醒 又炭火沃醋當面熏之亦

醒產
醒書

김쓰여 세 게 흥 느 법 머 른 오 촌 블 에 스 라 니 룰 고
해쓰이 면 세 고 쓰 슷 블 에 초 룰 세 터 느 치 쓰 이 면
쓰 세 느 니 라

吹法 半夏末或皂莢末吹鼻中即醒

草本

고 해 부 느 법 반 하 글 리 나 조 혀 블 르 리 나 고 해 불 면
즉 시 세 느 니 라

血崩

○血崩 不止 宜 大劑 芎歸湯 加 芍藥 煎

得效 方曰 產後 血崩 不止 宜 大劑 芎歸湯 加 芍藥 煎 服者 小腹 滿痛 是 肝臟 已壞 爲難治

득 效 방 의 곧 오디 산 후 에 피 만 히 나 아 니 굶 거 든
공 귀 탕 을 등 히 지 어 뱉 사 약 가 입 응 야 달 혀 머 기
라 만 일 빛 기 슬 이 탕 만 응 여 아 프 면 이 는 간 장 히
여 단 디 니 고 티 기 어 려 우 니 라

雲岐子曰 產後 血崩 宜 四物湯 加 生乾地黃 蒲黃 炒

阿膠 珠地榆 艾葉 白芷 煎服

方見通治

은 기 지 곧 오디 산 후 에 피 굶 디 아 니 커 든 스 물 탕
의 성 간 디 황 폰 황 붓 기 니 아 교 붓 그 니 디 유 박 님

衄血

뱃지를가임홍야달허머기라

一方木耳及一斤或半斤者燒存性爲末入麝香末

一錢枳殼末二錢和勻每取一錢烏梅湯調下崩

血即止

丹溪方

홍방문의남기도든버섯므거위홍근이나홍반
근의미타니를검게스라기름링기라샤향기르
홍돈기각기르주돈녀허섯거미홍돈식오미달
힌믈의플어머그면피즉제근느니라

○衄血 산후에고해피나눈증이라

婦人大全曰産後氣血散亂入於諸經不得還元故
曰鼻黑色起及變鼻衄名曰胃絶肺敗宜用犀角地

衄血

黃湯救之

부인대전의골오더산후에기혈이흐터디여모
드혈뭍에드러미티도라오디몬호모로임이며
고해거문비치니라고또변호야고해피나
니일홍을글온위긋고폐호여딘증이니셔각다
황탕을배구완호미맛당호니라

犀角地黃湯

生地黃錢三

白芍藥錢二

牡丹皮

犀角鎊各一錢

右剉煎服醫學入門

셔각디황탕은싱디황서돈빅샤약두돈모란피
셔각슬호니각호돈이를싸호라달혀머기라

攘法急取緋線一條併產母頂心髮兩條緊繫手中

指節衄即止 婦人 大全

방지흐른법은 셤리블근실흐니 음과옴의덩바기
예머리털돌흔가져다가손가온뎃가락口 뒤를
구디미면피즉시근니라

○喘急 산후에천만호고괴급호증이라

婦人大全曰産後喘極危多死盖因榮血暴竭衛氣
無主獨聚肺中故令喘急此名孤陽絕陰為難治 用

大劑芎藭湯奪
命散小麥蘇飲

부인대전의골오뒤산후에천증이 기양위티호
여주그리하니이느피갈진호매기음이주호미

喘急

업서외로아폐통애모도매호여곰찬
이일흙을외로은양괴과그쳐딘음괴니고티기
어려우니똥케지은궁귀탕라탈명산과쇼숨소
음이맛당호니라

芎歸湯治產後喘急

方見通治

궁귀탕은산후천증고티니라

奪命散治產後喘急沒藥血竭等分爲末每二錢以

童便好酒各半盞調和煎數沸服之神驗

丹溪附錄

탈명산은산후천증을고티니라몰약혈갈다

티호야그리밍그라미두돈식동조쇼변과도호

술각반잔식합호야플어두어쇼숨달혀머기면

신호호니라

小參蘇飲治產後喘急人參一兩為末蘇木二兩坐
水二椀先煮蘇木至一椀去滓調人參末一錢服
之雲岐子

쇼삼소음은산후천증고티느니인삼호낭고르
밍골고다목두냥싸호라물두되로다목달혀호
되되거든거지호고인삼고르호돈플어머기라
○咳逆 산후에피기호는증이라

婦人大全曰治產後咳逆不止欲死肉桂五錢剉生
薑汁三合同煎服二合仍以手灸火摩背上令熱
時塗藥汁汁盡為妙

咳逆

咳逆

부인대전의골오딘산후에피기긋디아터죽고
져흐니, 니돌고티디민온계피다솟돈싸흐라성
강즙서흡과달혀셔드흡식머기고손을블뵈여
산모의등을덥게비비고약즙블디거업도록비
르,면도흐니라

一方治産後咳逆壁鏡窠三五箇水煎熱呷即止 婦人

흐바^음문의산후피기고티디납거믹집세히나다

스시나물에달혀더우니를마시면즉시근느니

○不語 산후에말몬흐는증이라

婦人大全曰産後閉目不語 宜孤鳳散

부인대전의골오딘산후에는김고말몬흐는증

不語

에고몽산과칠딘산이맛당하니라

孤鳳散治産後不語白礬細末一錢熱水調服方産寶

고몽산은산후에말몬하느니라고티느니빅번
고르하돈을더운물에풀어머기라

七珍散治産後不語

人參

石菖蒲

生乾地黄

川芎

各二錢

辰砂

防風

細辛

各一錢

右爲末每一錢薄荷湯調下方産寶

産寶

칠딘산은산후말몬하느니라고티느니인삼석

창포싱간디황천궁각두돈쥬사향풍세신각하

돈세말하야하돈식박하달힌물에풀어머기라

發熱

○發熱 산후에 열나 증이다

婦人大全曰産後血虛熱入血室以致發熱煩燥晝

輕夜重譫語如見鬼或寒熱往來真用柴胡四物湯涼血地黃湯

부인대전의큰오의산후에피만히나열이혈실

에드러열이발호물닐위여번열흐여답답하고

나지경고밤외홍고고뵈임십기를긋것본드

서호며혹더우락채우락호미왕닌호느니식호

소문항과양혈디황탕쓰미맛당호니라

柴胡四物湯

柴胡 生地黃 各二錢 川芎 當歸

赤芍藥 半夏 各六分 人參 黃芩

發熱

甘草 各四分

右剉作一服入生薑三片水煎不拘時溫服

식호사물탕은 산후발열을 고티느니 쇼식호탕

과 한호티 합한약기라 식호싱디 황각두돈

천궁 당귀 적사약 한하각 여섯돈 인삼 황금 삼초

과 너픈 를 사 라 한복 밍기라 싱강 세 텀너히

달해 아모 빼에 나머지라

涼血地黃湯治產後發熱

生地黃 錢二

赤芍藥

當歸

川芎

錢一

右剉作一貼水煎服 方袖珍

냥혈디 황탕은 산후발열고티느니 싱디 황금두돈

發熱

적사약당귀천궁각호돈이돌싸호라호복밍기
라달혀머기라

治産後熱渴方眞蒲黃二錢井花水調服又生藕汁

生地黃汁各五合調服

本草

산후에열하고말호증고티는방문진짓포황두
돈을정화슈예늘어머기라또넌넌습과싱디황
즙각달음식떠머기라

又方用經水時服一盞最妙

俗方

또향문의열경슈를호잔식머기미도호니라

○乳懸 산후에저지싸디여기논증이라

得效方曰産後忽兩乳伸長細小如腸下過小腹痛

乳懸

不可忍危亡須臾名曰乳懸急服大劑芎歸湯日三

又今麤剉燒火當面熏之令常吸烟氣若未全愈用

如聖膏貼頂上

芎歸湯方見通浴如聖膏方見保產

특효방의령오디산후에문득드러져지피디여기

라기높고자가창조그트야비아래넘고알포물

이디몬흐야하닌스이에죽니일흠을길온

유현증이라하니둥게지은궁귀탕을허극세

복식먹고또굽게싸하라블에스라니치다혀너

를쏘여미양니세물마시라하다가다도티몬호

거든여성고롤딩바기에브티라

○陰脫

산후에음문이나고드리아니호노증

陰脫

朱彥脩曰產後陰門脫出不入乃努力太過所致宜

用八物湯

加防風升麻黃芪

煎服外以荊芥藿香樗白皮煎

湯熏洗

過八物湯方見

쥬연슈글오티산후에음문이싸디여나고도디

아니문힘너무뿐타시니팔물탕의방풍승마황

기가입후야달혀먹고밧그로형개박향더빅피

달힌물로김쁘이고씻기라

一方治產後陰脫香油五斤煎熱盛盆坐其中食頃

以皂角末吹鼻作嚏即收

丹溪方

흐방문의산부의음탈증고티디침기름닷근을

달혀동히에담고그가온대안자사가밤머글덧

過月不產

만하거든 조혈근을 산부의 고애부러지치음
면즉시 건느니라

又方五倍子煎湯和白礬末先熏後洗方丹後

또 오비즈 달힌글에 백번 뜰어 쓰이고 싶기라

如聖膏貼產母頂上即收方見保產

여성고를 산부의 덩바기에 브티면즉시 건느니

○過月不產 열흘디나 더나티몬하느중이라

醫學正傳曰孕婦氣血不足或漏胎失血則胎雖不

隨多致逾月不產曾見有十二三月或十七八月或

二十四五箇月而產者宜用八物湯峻補之

의혹정면의 글오딘양뒤기혈이브쪽하거나혹

過月不產

누티로피옷내면비록낙티아나도열나니모지
나티아니리하느니일즉보니열두시돌이며홍
열닐곱여덟돌이며혹스물넉돌다섯돌애나호
리인느니맛당이팔물탕을써크게보호라

羅謙甫曰孕婦過月不產四物湯加香附子桃仁枳

殼縮砂紫蘇葉煎服即生

方見通治

나검외골오디잉부열돌너무되히산몬호거든
스물탕의항부주도인기각축사주소엽가임호
야달혀머기면즉시난느니라

八物湯

熟地黃

白芍藥

當歸

川芎

人參

白朮

白茯苓

甘草 各一錢

右作一服水煎服 醫學正傳

팔물탕은 속디 황백 삭약 당귀 천궁 인삼 박통 비
복령 감초 각 한돈씩 호복 명기라 달혀 머기라

○下乳汁 히산 후에 젖업거든 나게 하느법

三因方曰乳汁不行有二若氣血壅閉不行則用通
草漏蘆土瓜以通之氣血枯涸不行則用猪蹄魚

以補之○母酒亦好 俗方

삼인방의 골오 뒤 젖아 나나 기 두가지 인나니 그
혈이 응식 하야 나디 아니커든 통초 누로 토과 들
버나게 하고 기혈이 몰라 여위여 나디 아니커든

下乳汁

下乳汁

도티발과붕어를버보호라모쥬또호리라

호效方下乳汁萬篋子糯米各一合細研水一椀攪

勻入甘草末一錢煎頻呷妙

雲岐子

넙호방은유즙을나게호니부루배과태별각

호호음을니로니이라를호사발브어저어감초

리호돈테허달혀스로마시면나니라

猪蹄粥治乳無汁猪蹄四隻治如食法水二斗煮取

汁一斗去蹄入土介根通草漏蘆各三兩剉煮取

六升去滓入葱豉及少米煮作稀粥食之

草本

데데쥬은젓업스니를고티니도티발네호먹

드시달화를두말브어호말되게달혀발업시호

下乳汁

고토과 불휘과 통초과 누로각 석냥식싸하라
되되게 달혀 거지하고 파과 장과 조밭티허달혀
죽수어셔머기라

下乳汁方麥門冬末二錢酒磨犀角汁一盞調服又

赤小豆煮汁服又鯽魚羹食之

草本

젓나게하느방문은뉘문동그르두돈을술의셔
각근물흐잔의플어머기라 또복근꽃솔달혀머
기라 또붕어를깅하야머기라

又方治乳無汁野豬脂每取一匙和溫酒一盞服日

三乳即下且多可供五兒臘脂佳

草本

또방문의젓업스니를고티느니뵈도티기

下乳汁

臨產預備藥物

호술식더운술호자니플어호드세번
저지즉제나고하가히다숫악기물머기
들기르미더호호니라

一方產前乳汁自出謂之乳泣生子多不育

호방은의산전의저지나면저식을해몬기르니
니라

○臨產預備藥物 나호들애미리장만호여들

약들호니라

- 芎歸湯 ○ 四物湯 ○ 紫蘇飲 ○ 如神散 ○ 催生丹 ○
- 霹靂丹 ○ 三退散 ○ 益母丸 ○ 返魂丹 ○ 如聖膏 ○
- 催生如聖散 ○ 花藥石散 ○ 香桂散 ○ 失咲散 ○ 黑

龍丹○奪命散○犀角地黄湯○涼血地黄湯○海
馬○石燕子○魴鼠○猪脂○香油○清蜜○竹瀝
○好醋○雞卵○清酒○陳艾葉○益母草○生葱
○生薑○紅花○荊芥○蒲黃○單麻子○生地黃
○滑石○麝香○朱砂○皂莢

궁귀탕스물탕스소음여신산최싱단벽넉단삼
퇴산익모환반혼단여성고최싱여성산화예석
산향계산실쇼산흑농단탈명신셔각디황탕냥
혈디황탕히마석연스뉴셔테지향유청밀독넉
도호초독리귀알물근술뿌익모초파싱강홍화형
개포황피마스싱디황활석샤향쥬사조협

○貼產圖法 산도브틸법이라

婦人大全曰孕婦入產月便以朱砂筆寫產圖一本
書某月某方空貼在產婦房內北壁上如正月在丙
壬可於壬位安產婦床帳丙位藏胎衣若值閏月看
節氣分用

부인대전의 글 오디잉부나 흘돌애 들거 든 문득
쥬사 무틴부도로 산도훈당쓰고 아모돌이 면아
모방쉬공ㅎ다 써셔산뵈의 방안북넉브롬우희
브티라ㅎ다가 정월의 병디 파임디 예잇거 든 임
디예랑산부의 자리 보고 병디예랑티의 를갈미
미가ㅎ니 윤돌까만나 든 절기 를보와는 화쓰라

又曰凡逐月安產藏胎衣並向月德月空方位所有
十三神殺並宜避忌若月盡則換寫次月圖八月初
一日貼如上法十三神
殺見下

쏘글오디를윗자리보며티의간스ㅎ기를다월
턱월공방위를향ㅎ야ㅎ고십삼신살인논디랑
다피ㅎ야말라ㅎ다가그돌이그물거든쏘베근
돌산도를맛고아써웃법기티브티라

又曰凡產訖棄波汚穢不淨之水並隨藏胎衣方不
拘遠近棄埋之


쏘글오디를윗히산못고더러운므스롤다티비
값노방수를조차원근을혜디말고브티라

凡治産室擇吉日先貼産圖定方位又以朱書借地
呪貼於産圖之下房內厚鋪草蓐於月空方位下鋪
馬皮上鋪草蓐一葉讀借地呪三遍

産書

를잇산실을비설호도호날글호야몬져산도
브터방위들덩호고쏘쥬사로차디축문써산도
아래브티고방안해거적둔거이설고월공방위
아래물가족설고그우희거적호나설고그제야
차디축문을세번닐그라

安產方位圖



○安產藏胎衣吉方

아기나흔자리보여치외값기은은수라

月遊胎
殺所在

十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨礙無所畏

忌諸神擁護百邪逐去急急如律令勅和劑

○月遊胎殺所在
 正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

正月 在房 二月 在窓 三月 在門 四月 在竈 五月 在身 六月 在床

七月 在確 八月 在廁 九月 在門 十月 在房 十一月 在戸 十二月 在床

未申日 在離 戌亥日 在房 寅卯辰酉日 在堂 巳午日 在門

정월의는 방과 상의 잇고 이월의는 창 의 잇고 삼월의는 문과 등당의 잇고 소월의는 브어긔 잇고 오월의는 몸과 상의 잇고 뉴월의는 상과 곡식녀

호디 잇고 칠월의는 방하과 매예 잇고 팔월의는

뒷간의잇고구월의는문의잇고시월의는방의
 잇고동지절애는화로예잇고섯절애는평상의
 잇고주륙날은충당의잇고인묘진유날은브어
 기잇고스오날은문의잇고미신날은올해잇고
 술히날은방이잇고그날

藏 安 遷 震 招 軒 咸 豐 豕 豕 豕 豕 豕 豕
 藏 安 遷 震 招 軒 咸 豐 豕 豕 豕 豕 豕 豕

安

亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥
 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥 亥

產

正月

壬 丙 艮 寅 寅 卯 辰 辰 辰 辰 午 申 酉 戌
 壬 丙 艮 寅 寅 卯 辰 辰 辰 辰 午 申 酉 戌

截

二月

坤 庚 甲 乾 亥 卯 子 丑 未 巳 酉 巳 戌 亥
 坤 庚 甲 乾 亥 卯 子 丑 未 巳 酉 巳 戌 亥

衣

三月

丙 壬 坤 申 辰 酉 戌 戌 午 子 寅 亥 子
 丙 壬 坤 申 辰 酉 戌 戌 午 子 寅 亥 子

十

四月

甲 庚 巽 巳 巳 午 未 丑 未 酉 亥 子 丑
 甲 庚 巽 巳 巳 午 未 丑 未 酉 亥 子 丑

三 神 吉 凶 方 位

五月 丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅

六月 庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

七月 丙壬坤申申酉子戌戌戌子寅卯辰

八月 庚庚甲巽巳酉酉午戌丑亥卯亥辰巳

九月 丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月 庚子乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月 巽壬丙坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月 庚甲巽巳丑午未丑卯酉亥申酉

初生小兒救急

○附初生小兒救急 근난아히급응병구완응법
을브턴나니라

小兒初生氣欲絕不能啼必是難產或冒寒所致急
以綿絮抱置懷中勿斷臍帶且將胞衣置爐火中
燒之仍作大紙撚蘸油點火於臍帶下熏之令火
氣入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣迴啼哭如
常然後方可斷臍方三因

아기근나디며기운이긋고져하고우디몬응문
반드시어려이구러나거나츄기운을쏘이거나
흔디니셜리소음의빠푸메품고아직빛복긋디
말고안새를가져다가화룻블에뵈며큰쇼히심

지땀이라기름디거블브터뵈복줄기에쓰여드
스귀운이비에들게하고쑤초를더여뵈복주를
후어치시기면이윅하야귀운이도로혀여상히
운후제야뵈복그츠라

小兒初生面青身冷口噤乃胎寒也急救之

白彊蠶

木香

肉桂

陳皮

檳榔

甘草

灸各五分

右剉水煎取汁以綿蘸入口中

醫學八門

아기곤나며느치프르고몸太和입다물면이노

티뿡어치운증이니썰리구호디뵈강좁목향계

피딘피빙낭감초구으니각다쑤핀식싸하라

初生小兒救急

혀그물을뚫소음의적서아귀입에흘러드리자

小兒初生有即死者急看兒口中懸雍前脰上

如石榴子以指摘破出血以帛拭去髮灰糝之若

血入口中即死

醫學入門

아기근나며즉제주그리인니셀리아귀입간
목젖아피하늘우흘보면무픈거시석뉴베기트
니잇게든손톱브로지버벼혀피나게든보드라
온명디로스서업시호고머리털스론글를써허
브르라고피흘러입에들면죽느니라

小兒初生忽患撮口不飲乳名曰馬牙不急治則百
無一生急看兒齒齦上有小泡子如粟米狀便以

鍼挑出血用墨磨薄荷汁斷產母髮少許裹手指
蘸墨汁遍口內擦之勿飲乳一時許

醫學入門〇俗呼此泡爲

齒糞以針瓜破之點生蜜便差

아기 곧 나셔든 득 입이 조리혀 저즐몬센느니 일
흙을 꿀 온 마아 병이니 고티 디아니 면 일 백애 혼
나 토 살 리 업느니 라 셸 리 아 기 닷 의 음 우 흘 보 면
쇼 고 매 부 뜬 거 시 조 벌 낫기 트 니 인느니 즉 제 침
그 트 로 뵈 와 업 시 흥 야 피 나 거 든 박 하 줍 에 먹기
라 나 흥 엄 의 머 리 털 조 곰 버 혀 손 기 락 기 감 고 그
먹 줍 을 디 거 도 닷 던 디 며 입 안 해 다 브 로 고 흥 시
적 만 져 머 기 디 말 라 이 제 사 례 은 이 병 을 느니 똥 이

初生小兒救急

라하고 침으리나 손톱으로나 글거삼스하고싱
솔브르니즉시도터라

小兒初生穀道無孔不得大便急用金王簪尖看其
的處刺穿之以蘇合元納孔中或以油絁撚絀住
不令再合

醫學
入門

아기근나셔미트꿈기업서똥을누디몬호거든
셀리금빈혜나옥빈혀긋티나가셔바르구무이
실디를보와뵈어덥고그꿈기소합원을비비여
너커나옥쵸히심지들기름무터고자두어다시
아오디아니케하라

小兒初生不飲乳不小便大蔥白一寸四破之以乳

汁煎銀石器中灌入兒口效得効方

아기 곧 나서 젖도 아니 먹고 오줌도 못 누거든 큰
판민힌 디를 네해 빼 터은 그나 딜그르세 나 젖보
어 달혀 아그 입에 흘려 드리면 즉시 돈나니라

小兒初生嘔吐不飲乳乃穢惡入口所致黃連枳殼
赤茯苓等分爲末蜜丸梧子大乳汁調一丸灌入
口中又木瓜生薑煎湯灌入兒口中醫學入門

아기 곧 나며 옥 옥 토 흥야 젖 먹디 못 흥문 더러운
거슬 심신 타 시니 황년기 각적 복녕을 기티기
밍기라 술에 므라 오동즈기 티비비여 사재 흥환
식플어 입에 흘려 드리라 소독과 싱강 흥환

初生小兒救急

입에 흘려 드리면 살 나니라

小兒初生大小便不通腹脹氣欲絕急令婦人以溫
水漱口了吸啞兒前後心并臍下_三足心去七處
每一處凡啞三五次漱口更啞取紅赤爲度須臾
自通不爾則必死_{方三因}

아기 곧 나셔 오줌 놓몬 누어 비탕만 하여 기절코
져 하거든 셤리다 튼겨 집으로 하야 더운물로 양
지 하고 아귀 압뒤 가슴 등 과 비씩 아래 과 두 손 바
당 두 발 바 당 닐 굽고 돌 색 로 뒤 하고 돌 너 덧 번 식
셤고 하곤 색 라 든 양 치 하 고 고 터 색 라 그 터 히 불
그물 하 하 야 셤 면 이 숙 하 야 절 로 통 하 나 니 그리

아니면 반드시 죽느니라

又方葱汁乳汁各半調勻沫兒口中與乳吮下即通

萬病
回春

또 흥방문의 파 흰민들죽내 고젓과 각 반식 섞겨
이 귀에 스서 드리고 젓주어 쉼리면 즉시 통하
느니라

小兒初生小便不通急用生地龍數條蜜少許同研
勻敷兒陰莖上仍用蠶退燒灰入朱砂龍腦麝香
各少許以麥門冬燈心煎湯調灌口中即通醫學
入門
아기 곧 나며 오줌 못 누거든 쉼리면 산디 놓두 낫고
술쇼고 매 하여 흐뎁기라 아귀 음경의 비록 고든

初生小兒救急

누에난알검질을블에솔고쥬사과농노사한각
쇼곰녀허그르밍그라믹문동과등심달힌물
플어입에쳐머기면즉시통하느니라

小兒初生大便不通先以硬葱尖插入肛內如不下
宜用朱砂南星炮巴豆霜各等分爲末糊丸黍米
大薄荷湯化下二丸即通田氏

아기곤나며똥물누거든문져구든파엄으로향
문의고자드리라그려도물누거든쥬사과턴남
성구으니과파두그르물다기티흐야밀프레미
라기장밭그티비비여두환식박하달힌물에플
어입에쳐드리면즉시통하느니라

小兒初生撮口不飲乳赤足蜈蚣一條去頭足灸焦
研爲粉每五分以猪乳汁二合和勻分二次灌入
口中又牛黃一字爲末調竹瀝灌入口中得効
아기곤나며입이조라져즐센디몬호거든발블
근지네흐나홀머리발업시호고블에쪼여논거
든그장그놀게그라미다솟핀을도티젓두흙의
플어두번의입에쳐드리라쏘우황두핀반을그
라뚝턱의미라입에쳐드리면돈나니라

小兒初生口內白屑滿舌上不能吮乳謂之鵝口爲
以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或井華水拭淨如不脫
用雄黃三錢鵬砂二錢甘草一錢龍腦一字爲末

初生小兒救急

蜜水調塗口舌上或乾糝之方 湯氏

아기 곧 나며 입안 해힌 거시 혀 예기 독하야 쳐 줄
생디 몬흐느니 를 닐은 아 구 병 이 니 셤 리 머 리 러
릭 을 손 기 락 의 가 마 박 하 줍 이 어 나 흑 정 화 슈 를
디 거 죄 스 스 라 하 다 가 버 서 디 디 아 니 커 든 석 응
황 서 돈 봉 사 두 돈 감 초 흐 돈 봉 노 두 둔 반 기 르 밍
기 라 솔 들 에 미 라 입 안 해 브 르 거 나 흑 모 르 은 꿀 를
세 허 브 르 라

又方鼠婦蟲取汁塗之又白楊樹枝燒取瀝塗之神

效 醫學正傳

또 흐 방 문 의 주 며 느 리 를 즙 내 여 브 르 라 또 사 스

나못가지지를불에구어진나거든비르면괴특이
돈느니라

小兒初生徧身無皮但是紅肉以白早米粉撲之候

生皮乃止

醫門

아기곤나온몸애겹질이업고다문블근솔만잇
거든흰올벼밭곧롤미양새허볼라가치나곤거
든그치라

小兒初生徧身如魚泡如水晶碎則水流以密陀僧

爲末糝之因服蘇合圓

醫門

아기곤나셔온몸이고기입거품기트며슈정구
슬기트야헤여디면물이나거든밀타스고로물새

初生小兒救急

허브고소합원늘머그면도하니라

小兒初生發丹毒赤腫遊走若入腹入腎則必死各
曰赤遊乃胎毒所致宜用蜚鉞法砂鉞法出惡血
內以涼血地黃湯加大黃酒炒犀角生甘草木通
連翹薄荷煎服外以井中苔或取芭蕉汁鱗鱒汁
或溝渠中小鰕爛搗塗刷又伏龍肝末或赤小豆
末和雞子清塗之又地龍糞二分焰硝一分和研
新汲水調敷又大黃焰硝等分研末新汲水調敷

小兒諸方

아기곤나며단독이도다블거브은거시퍼디여
뉴주하느니만일비에틀거나음낭의틀면반디

시죽니니일흙을글온적위니이노티독의닐은
배라맛당이검어리썰리노법과사침주는법을
벼모딘피를내고안후로랑냥혈디황탕을벼대
황술의무터붓기니과셔각슬흐니과싱감초목
통년효박하가입후야달혀젓엄이를식후마다
머기고아귀게도작작혀입에치고밧그로랑우
를가온대잇세어나혹파초즙이나혹곰병의죽
이나혹넷물에호근사요를죽디혀저로벼리고
쏘솟미티를근후이나혹블근꽃치나기르밍기
라들피알힌저이에다라벼리고쏘디붕의
돈염소후돈을기라기르

初生小
兒救急

대항과염소를기타
지대로부터서으로비
이라

蟻鍼法取水蛭付赤腫處吮出惡血以皮皺肉白爲
度若腫處多則隨腫處更用新者吮之不吮則以

竹筒盛蛭綴之即吮

草本

검어리셀리는법은산검어리를자바다가블거
브어모든우희브터모딘피를센라나여가조기
주리혀고슬히히거든말라만일브은고디만커
든다른새검어리를셀리라센디아니커든대롱
에를조차티혀브티면즉시센나니라

砂鍼法用明磁器碎之取尖鋒者劈竹筋頭挾定以

線縛之將磁尖向赤腫上輕輕以物敲之多出惡

血爲妙看腫處遍敲之方俗

사침법은말간즈기롤어더막아그티셔롯고늘
라니를글히야대져머리를쁘리고사기베여슬
로구디미고붉고브은우희다히고아모거스로
나기만기만두드려그티바켜모딘피만히나미
도흐니모든디를보아다주라

小兒初生鼻塞不通乳不下皂莢草烏爲末葱涎調

成膏貼顙上又天南星爲末薑汁調貼顙上方得妙

아기곤나며고히마켜통티몬흐야져즐슴세디

몬흐거든조협과초오두를기릿밍기라맛남속

아기 곧 여놀라니 나쁜 터 놓에 서 놀란다 내 주
사 석응황 각 두 편 반 샴 향은 품을 기르 밍기라도
터져 제 마라 아귀 이 베 스스 면 즉 시 돈 나 니라

諺解胎產集要

終

조석익이 난노종요외훈방은

萬曆三十六年正月

日內醫院開刊

監校 通訓大夫 行內醫院 直學

