Carte géologique des sols de la commune de Vielle-Aure



Légende la la carte géologique de la commune de Vielle-Aure

E, Eboulis actuels ou récents, cσnes d'éboulis et d'avalanches - 2

CGx-y, Colluvions remaniant des moraines - 6

Fjy-z, Cσnes de déjections tardi et postglaciaires - 8

Fz, Alluvions fluviatiles actuelles et subactuelles - 13

Fy, Alluvions du stade du retrait glaciaire - 14

Acm, Arcs et cordons morainiques du Tardiglaciaire et du Postglaciaire - 23

Gzc, Moraines du Postglaciaire récent - 26

Gzb, Moraines du Postglaciaire ancien - 28

Gza, Moraines du Tardiglaciaire - 30

Gy, Moraines du stade de retrait et de disjonction - 31

Gx, Moraines du stade d'extension glaciaire maximum - 33

h3-4, Namuro-Westphalien : Grès et pélites du Culm - 168

h3a-b, Namurien : Pélites vertes et noires, grès - 171

h2-3, Viséen - Namurien : Formation de Cambasque, calcaires sombres à laminites, schistes sombres - 172

h1L-2, Tournaisien - Viséen : Jaspes et ampélites à nodules phosphatés, calcaires micritiques clairs, pyroclastites, calcaires sombres à laminites, shales calcareux versicolores - 174

d6-h1a, Frasnien - Famennien - Tournaisien inférieur : Calcaires gris, calcaires amygdalaires "griottes" (Unité de Chinipro) - 176

d5-6a, Dévonien moyen-supérieur : Calcaires rubanés, calcaires manganésifères, calcaires limoniteux à goniatites - 183

d3-6, Dévonien inférieur à supérieur basal : Calcaires lités à silex, calcaires massifs, pélites calcareuses et calcaires versicolores (Unité de Chinipro et Unité méridionale) - 193

γ4N, Massif du Néouvielle : Granodiorite sombre à biotite et amphibole - 264

γ3N, Massif du Néouvielle : Granites clairs calco-alcalins à biotite et amphibole rare - 265

hydro, Etangs, lacs, rivières - 999