


醫門秘旨

内閣文庫
漢書類
二二六五五
函架册號類

内閣文庫	
番號	漢 12655
册數	6 (5)
函號	301 38





醫聖

門

秘旨目錄

卷之十一

小兒科

形氣論

青金散

地龍丸

辰沙江子丸

察色驗病法

六筋治病法

痘疹科

察色歌

抱龍丸

黃龍湯

戩脾丸

察色驗生死

治症腳法

論小兒瘡疽之由
痘疹之由

延生第一方


神妙定命散

不二丸

辨論

推拿掌法圖

看病之法



論瘡疽所忌 論瘡疽輕重 論瘡疽五不治

論痘疹之候 論瘡疽初起疑似未真不宜服藥

論瘡疽有疎密顏躁用藥法 痘疹看顏色法

瘡疽分虛實 痘不可汗下 論表裡治法

預防湯 平解湯 加減升麻湯

犀角鼠粘湯 古方辰砂散 葛根解毒湯

川芎紫草湯 升麻紫草湯 活血當歸湯

草茸地黃湯 陳皮枳實湯 黃芪白朮湯

厚朴枳榔湯 甘草地榆湯 復生引經散

卸續 驗方

卷之十二

外科

五善七惡辨 諸毒形証逆順說

不治症 水銀膏 飛龍奪命丹

螞蟥丸 神應散 希蒼膏

七味桐油丸 殺虫法風酒 和血生肌散

黑神散 丹豆散 三虫散

治瘍五毒方 散血愈瘡方 鉄箍散

奇蓮解毒飲 地骨通聖膏 治凍瘡方

瀝清膏

癰疽

脉法

隔皮取膿膏

内托千金散

神仙活命飲

祛毒無比酒神方

治楊梅癰及梅瘡方

乳香護心散

槐花酒

四宝丸

神功散

内消散

腸乳二癰

脉法

蒲公英散

散血消癰散

癰瘡

黃蠟膏

治癰散

藥葉方

台玉膏

乳香膏

隔紙膏

桐油膏

一葉金

瀝油方

既濟膏

痔漏

槐角丸

止血方

洗痔方

黑丸子

止痛丸

番痔藥

十神膏

白姜散

疥瘡

皮硝沐浴湯

愈疥方

搜風飲

栝硫膏

癩瘡

辯

生肌散

木香膏

洗藥方

和氣飲

搜風散

金銀湯

潰堅錠子

膏藥方

又方

醫門秘旨卷之

小兒科

形氣論

夫人之有生也稟天地之氤氲假父母之精血交感
 凝結以為胞胎也軋道成男坤道成女始自襁褓以
 至髫髻迨其成童與夫壯年豈易然哉故一月之孕
 有白露之稱二月之胎有朶花之譬及其三月則生
 右腎為男陔色陔也先生左腎為女阳包阴也其次
 腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以佳其勝已者腎屬
 水故五脏由是為阴其次心生小腸小腸生大腸大

腸生胆胆生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者小腸屬火六腑由是為次其次三焦生八脉八脉生十二經十二經生十五絡十五絡生一百八十系絡絲絡生一百八十纏絡纏絡生三方四千孫絡孫絡生三百六十五大穴大穴生八万四千毛竅則耳目口鼻四肢百骸之身皆備矣所謂四月形相全五月筋骨成六月毛髮生正謂此也至七月則遊其視而能動左手八月遊其魄而能動右手九月三轉身十月滿足母子分解其中有延月生者必生貴子不足日月生者必生貧薄之人誕生之後有變蒸之熱

長其精神壯其骨髓生其意智三十二日一變蒸生腎氣為六十四日二變蒸生膀胱之氣為腎與膀胱屬水其數一也九十六日三變蒸生心氣為一百二十八日四變蒸生小腸之氣為心與小腸屬火其數二也一百六十日五變蒸生肝氣為一百九十二日六變蒸生胆氣為肝與胆屬木其數三也二百二十四日七變蒸生肺氣為二百五十六日八變蒸生大腸之氣為肺與大腸屬金其數四也二百八十八日九變蒸生脾氣為三百二十日十變蒸生胃氣為脾與胃屬土其數五也變蒸已畢一其歲為齒生髮長

神智有異於前也故曰齒乃骨之餘也髮乃血之餘也爪乃筋之餘也神乃氣之餘也吁人身之難得也如此或方其幼也尤如水面之泡草頭之氣氣血未定易寒易熱腸胃綿脆易飢易飽為母者調攝不得其宜必不能免乎吐瀉驚疳之病矣及其長也嗜欲既開不能修養是以六氣迭侵於其外七情交戰於其中百憂累其心万事勞其形一蠲之氣安能無病焉小兒之瘡疹大人之傷寒尤當慎欬

察色歌

紫熱紅傷寒青驚白色疳黑時因重惡黃色因脾端

聚

又黑文多瀆氣不和色青驚積聚霍亂瀉如何青黑慢驚發入掌內牙多三關忽通度此症必沉疴又曰小兒脈大多風熱沉細原曰乳食結弦長多是隔氣風弦數驚風四肢掣浮洪胃中似火燒沉緊腹中痛不歇虛濡有氣更兼風驚脈乳多痢大血前大後小童脈順前小後大必氣噎四至疼來苦煩滿沉小腹中痛切切滑主露濕冷所傷弦長客忤分明說五至夜甚浮大六至晝甚浮夜別息數平和八九至此是前人真妙訣

延生第一方

小兒初生之時臍帶脫落後取置新瓦上用炭四圍煨烟尽放上地上瓦蓋蓋之存性研末預將辰砂透明者為極細末水飛過臍帶約有五分重砂二分五厘生地當歸身煎濃汁一二規壳調和前二味搽兒臍上間乳母乳頭上一日至晚藥下尽次日大便遺下穢污濁垢之物終身求无瘡疹及諸疾患生一子得一子極妙法也

青金散

治小兒急慢驚風吐瀉

礞石煨過

青黛

各五分

辰砂二分

右為細末每服五七分涼茶送下

抱龍丸

治小兒風痰昏搐多驚屢驗

天竺黃

辰砂

雄黃各四分

香附三分

南星

薑汁浸二日

右末煮甘草糊為丸如芡實大三歲一丸薄荷

湯下南星為末用臍八日填入牛胆中臥乾百

日後听用

神妙定命散

治臍風撮口唇青口出白沫

赤脚蜈蚣半條

炙干

川烏頭尖

三个

麝香

少許

另研

右將射末二分和勻二藥每服半字食銀花薄

荷湯下

地龍丸

治小兒急驚風

用蚯蚓一条石子街石頭一個將蚯蚓用竹刀切
斷二節動者用後將硃砂為末澆上搗爛以蜜調
水服之

黃龍湯下 治小兒急慢驚風

用防風通腎散去滑石石膏芒硝加全蝎茯神遠
志羚羊角白朮水煎服

又方 硃砂 雄黃 等分為末

用蚯蚓一条滾过前未刮下為丸听用

不二丸 治急慢驚風轉筋肚疼吐瀉熱麻

天仙子不拘多少洗淨乾碾為細末蜜和一處搗

作餅每一個重五分金箔為衣臨用將枣一枚去
核將藥放枣肉內用紙包水溫放在火內煨熟枣
香取藥出碾末將枣泡湯調服一看小兒面上如
吃酒者樣可治如白者不治

辰砂江子丸 治急驚風有驗

辰砂一分 南星三分 巴豆一个 共為末米糊丸如

芥菜子大每服三五七丸或十丸薄荷湯下

啟脾丸 能消食止吐瀉除疳消脹安肚疼常服益

胃生肌健脾

人參去芦 白朮 茯苓去皮 山藥去皮 蓮肉 各乙月去心

甘草

山查

核去

陳皮

白去

澤瀉

各五

分

去毛

右為末煉蜜為丸空心米湯送下四十九

辯論

余論小兒有五等之分百日之內名曰赤子一週二
歲名曰嬰兒三四歲名曰孩兒五六歲至七八九歲
名曰小兒十歲至十五歲名曰幼童若遇所傷名曰
驚風疾也至十六歲出幼而無驚風或稟元氣不足
尚有驚風之患其幼童小兒有痰可以診脈而用藥
治之惟嬰兒赤子不能言語榮衛未均難以診脈名
為啞科以男左女右第一指節紋三關赤脈為主一

曰寅關二曰卯關三曰辰關假如寅關起尺脈不過
於卯關者其病易治若連過於卯關者雖然難治病
重尚可知卯辰三關通過其病難治或三關侵過而
無疾者或三關無赤脈而驚風者何以別之但看而
上氣色方可知也而乃諸伏之首五臟形色現於面
也且直視覩物而不轉睛者面慘黃而洒淅惡熱乃
慢病之驚最惡症也宜速救之十全一二而帶紅色
兩顴骨亦精神恍惚發熱如火迺心之病也面慘白
眼珠光而無神大便時瀉洒淅寒熱乃肺之病也眼
鼻眶青暗憂七不藥作寒作熱乃肝之病也面帶黎

黑精神倦怠要睡不睡時或咬牙身温煩躁乃腎之病也。養嬰兒者必須看觀眉心青黑者驚藏於內也。上眼胞侵過白氣紋者二三月而止。泪堂青氣侵過鼻梁者一月死。上下眼胞赤脉乱紋侵過鼻梁及兩顴骨者或黑氣如梨斑暈過兩目者亡之必矣。雖然如此亦有可救。宜審視明白。嬰兒忽大叫一声倒地。彊直者或不省人事。角弓反張者。此即痰火甚助其驚也。是謂之急驚。發搐。縱有湯丸無以進之。即用拿搐之法。十可合於八九。且夫人骨骼以实肌膚完密。經絡備矣。若或急病以針補瀉之法。開其閔竅之血。

救若声不响赴队君

声輕者氣弱也。重濁者痛也。風也。高叫者熱將狂也。声急者神驚。声塞者痰。声戰寒。声噎者氣不順。喘者氣促。噴嚏者受風。呵欠者倦怠。队队相襍也。又主風耳。聾者脉主癢。兩耳色青黑。橫過髮際。主臍下痛。腎。兩耳紫微赤。主肝氣吹耳。聾。兩耳前後黃。主驚入腎。黑色咬齒。從毛。透耳者死。耳瘡者腎經熱。鼻門黑色。旋毛者主小便不通。鼻孔乾燥。氣粗者主鼻血積。血鼻青者主傷乳。印堂青。主夜啼。胎中受驚。人中青。主食乳不化。鼻準頭紅直上。主熱發斑。或夜啼。鼻燥者死。氣透口。鼻者死。鼻下赤。或生疮瘍。疔熱症。

推 拿 掌 法 圖



六筋治病法

以男左女右手分三坎三坎外呼內應五臟六腑却病拿指之

第一筋赤色浮陽屬火以應心與小腸主霍亂外通赤龍反則燥熱却向手中界推之則陽火散也

第二筋青色乃陽屬木以應肝胆主溫和通兩口熱乃赤溢生眵多淚却在坎位指之目自明矣

第三總筋屬土五行以應脾胃主溫暖外通四大腋門反而生腸鳴霍亂吐瀉痢疾之症却則中界指之則肢舒暢也

第四赤淡黃筋居中分界屬土無備以應三焦主半
寒半熱外通四大板門周流反側壅塞之症却向中
宮指之下元氣通除其閉塞之患耳
第五白筋乃隄屬金以應肺與大腸外通鼻竅主微
涼反側胞膈脹滿昏沉生痰氣卻在中界指之妙
第六黑筋乃重濁屬水以應腎與膀胱外通兩耳主
冷氣久而生旭旭羸昏迷却在邊位指之是也
用手指小兒中指第一節名曰二龍戲珠外止吐內
止瀉用口咬小兒大指頭第一節名曰天龍入虎口
用手撚小指頭名曰蒼龍擺尾

推上三關為執為補除寒退下六腑為涼為泄除執一
即是曰大股門

陽池穴在手大指側腕一陷中止瀉往下推之

腕骨穴在手指側下起高骨節中往下推之止瀉

大陵穴在內橫紋陷中止吐瀉

夾白穴在手內股陷中治小兒急驚

手三里穴在曲池穴下三寸起肉處治急慢驚風

已上拿指之法左轉為補右轉為瀉各九陽六陰男

女皆同

治症腳法

委中穴在足膝後橫紋陷中
承山穴在足股小肚尖揉之

僕參穴在脚後根治小兒急驚就死手脚掣跳之症
用口咬名曰猛虎吞食左轉為補右轉為瀉就揉之
湧泉穴在足掌中治小兒吐瀉慢驚揉之

大敦穴在足大指頭去爪甲一分小兒鷹爪驚揉之
翻溪穴在足趺陷中小兒內吊驚往後仰指揉之

看病之法

先看是何經先將主病穴指之次各指通夏秋用青
蒿生姜油粉春冬用葫荽葱油粉張熱遍身擦之五

七通愈

中膝穴在三里下三寸大筋內冲骨外臚小兒急驚
於此指之就揉凡指要九九數左轉為補右轉為瀉
女人反指就揉

內關穴在掌後橫紋上一寸五分治小腹痛一切
驚風

嬰兒月內無盆驚肚急青筋笑不啼指下工夫按穴
用管教時刻得安寧玉堂乳根中腕洋鳩尾承關左
右指之靈或灯火爆之

落脬失顧受風驚面青口撮笑无声中腕一穴當先

指關門左右指方寧

先看牙齦上下或有白泡用溫水浸系綿包指頭重擦或破有血出用金頭蜈蚣燒存性為末擦之額門夾車承漿中腕關門指而揉之灯心爆之

小兒月內口禁驚原因胎裡受傷情水分下腕合一穴額門四穴効如神口角反弓兒欲飲管教喜色滿門庭

夜夜兒啼不止声爹如無計好憂心不知產內傷和氣却在門傍貼紙文肚上青筋頻火爆伏龍肝末搽之寧以水粉弄皮為末擦太陽眉心用灯火伏

龍肝為末將香油調塗心口即安

小兒得患急風驚一驚就死怕杀人玉堂乳根鳩尾穴承關左右額門全

天龍入虎口猛虎吞食法治之內關中界各穴指揉灯心爆之

痘疹科

論小兒瘡痘之由一名百歲瘡

小兒疹痘皆因母胎養之時不曾忌口或食煎炒或食毒物是以五脏六腑血氣皮肉筋骨一身之間俱有穢毒小兒在胞胎之中漸染此毒遇傷寒時氣而

發為水洩膿血之瘡名曰五穢洩毒所謂五穢者一曰五臟六腑二曰皮膜筋肉三曰血氣骨髓此瘡瘡者三穢液毒之所成也

論小兒癩疹之由 俗名麻子

小兒斑疹之症是肺胃之所發也肺脾二經自身蘊積邪毒或因時氣或因風寒客邪搏擊發於皮膚其狀斑駁如蚊蚤所咬或如麵片遍体有之凡發紅斑十生一死黑斑九死一生

論瘡毒所忌

小兒如未出痘疹發熱之時不分是痘否切忌行房

論瘡痘有輕重

瘡痘輕分作幾出大小不等頭面胸少肥滿光澤根窩紅活所謂大小不等二日三日始出如粟米如黍米如大豆此不必服藥疹痘重毒一次齊出稠密如蚕種紫黑灰白口渴身溫腹脹頭溫足冷寒戰咬牙驚悸氣促

瘡痘五不治

一痒搨寒戰不治二紫黑喘渴不寧三灰白項陷腹脹四頭溫足冷飲水五咬牙氣促寒泄

論小兒瘡痘之候

或曰瘡痘之出有因傷寒而得有因時氣傳染而得
或竄眼驚扯之症或口苦咽乾肚腹疼痛或煩躁狂
恣或自汗下痢或發熱不發熱臉赤唇紅頭疼身熱
喘嗽痰涎噴嚏呵欠乍寒乍熱症候多端未易辨也
須以耳冷翫足冷驗之又不可若耳後紅脈赤縷為真
又曰身熱尻骨鼻尖俱冷呵欠喘嗽面赤眼澁鼻鳴
方是出痘之候以予言之竄眼驚搐口苦咽乾肚腹
疼痛發熱頭疼煩躁狂恣昏睡喘嗽噴嚏呵欠唇臉
俱紅尻骨鼻尖手足時冷鼻鳴氣急眼瀦生眵庶可
為候餘皆傷風傷寒等症泛而不切將信將疑若妄

投湯藥豈不誤耶余意頭額胸前最可驗之何也其
瘡痘起自心主於胃而發於肺經曰諸瘡痛痒皆屬
心火火炎上至頭額又胸前去心火不遠如是瘡痘
必先於此二處紅點發出正所謂向陽花木易為春
之驗歟

論瘡痘初起疑侶未真不宜服藥

或曰小兒身熱是否瘡痘便宜發散以升麻葛根服
之予意若是疹痘二三日就見明白輕者不必服藥
重者須要斟酌豈可不察是否便服發散之藥况葛
根傷風傷寒則可若是痘瘡非所宜也

瘡痘有疎密煩躁

小兒疹痘初出時看面前胸額疎稀者易治稠密者急宜解毒如紫草烏犀黃芩連翹鼠粘子之類或用古方黃連解毒湯亦可或犀角地黄湯但牡丹皮一味非疹痘之藥宜去此服之仍以淡蜜水調滑石末以羽潤之濕者常去其濕用防風荆芥鼠粘之類也

疹痘看顏色

豆灰白不發者作寒看紅凸奔綻者作熱看其要在解毒和氣活血溫中安表而已寒者溫之熱者減之減不可多蓋痘非熱則不能發也宜以溫和之劑扶

而佐之其灰白者亦作血氣不足看沃以人參白朮當歸川芎紫草之類使其發出而紅活也色黑與中陷而外起者是為血氣虛甚毒發不透須以紫草鼠粘子人參白朮酒洗當歸蜜炙黃芪陳皮厚朴之類補氣益血調胃解毒黑陷甚者子和方燒人屎蜜水調服灰白陷伏者亦可如漿好而色淡者屬血少用紫草川烏當歸熟地香白芷之類如將好而色紫者屬血熱則用生地生犀黃芩黃連之類又有色全白將靨時如豆壳者乃因飲水食冷過多結靨不齊俗呼倒靨一名側靨須服實表之劑如黃芪川芎當歸

括萎根白芷之類皆能長肉藥也蓋肉滿則腐自落
不勞力也

瘡痘分虛實

痒者為虛痛者為實灰白者為表虛紅綻者為表實
吐瀉少食者為裡虛不吐瀉能飲食者為裡實虛者
益之實者損之損其有餘益其不足虛者再損其變
莫療實者再益不足潰爛而唯結痂則是結瘡而全
眼疾務使損益得中為善矣

論痘不可汗下

痘發於表如妄汗之重令開泄榮衛一氣風邪乘間

他症作矣不可汗下也瘡痘根於裡起於心主於胃
胃氣若實百体隨暢如妄下之胃氣一虛血氣衰少
瘡痘不發其痘黑陷青紫者百祥丸下之又云下後
身熱氣煖欲飲水者可治穀不消或寒戰者少時便
定時睡瘡復發透如未見時以硃砂一錢為末預以
蜜水調服多者可減少者可無如熱毒熾盛則加山
豆根黃連犀角一以使之發出入以使之毒解如眼
有赤脉赤色赤腫生眵加黃芩黃連倍加密蒙花蟬
退之類如眼角青寒與血氣虛少色白不發則加人
參川芎當歸木通蜜炙黃芪火煨白芍倍加露蜂房

之類切不可用姜附辛熱肉桂等藥如異攻散之類是也如冷瀉則加厚朴陳皮白朮史君子砂仁之類如裡急後重則加枳殼枳榔之類如驚搐反目手足風牽乃是熱極制金不能平木而風生矣宜加黃連黃芩以瀉南方之火黃栢知母以補北方之水如宿食不消則加枳實厚朴砂仁之類如大便不通則加杏仁青皮枳仁之類如小便不通則加木通白芍車前梔子黃連之類如小便白濁則加史君子韭子桑螵蛸之類以上諸藥寒不至寒熱不至熱能服此消息隨病加減手足眼目之餘毒皆保其必無矣豈有

不能保其生者哉

論表裡治法

或曰痧痘已出未愈之間其痧不先澤不起發根窩不紅者謂之表虛急以十二味異功散救之蓋欲急治其表也不知表者根於裡之所發也大凡裡實則表實裡虛則表虛相因而相胥者矣要之看法雖有表裡之分而治法則當自裡及表蓋裡可以該表而表豈能該裡哉如能治其裡則表在其中矣合內外而一道也若曰專治其表豈不誤哉其所謂表裡者何也夫痧痘主於脾而發於肺脾主肌肉肺主皮毛

脾與肺者裡之謂也肌肉皮毛者表之謂也所以看
法雖有表裡之分而治法則在於裡其可以攻二之
耶况異攻散有毒桂大辛之朱以表治之吾恐潰爛
而不可收拾至若他症變作輕則殘疾重則損命可
不慎哉或又曰異攻散表裡俱虛者亦可治夫表既
不可治又豈能治其裡哉以愚論之若表若裡俱不
可用也人又曰有屬寒而不發者若非異攻等散丁
香木香附子姜桂之熱藥將何以發之耶况丁香木
香瘡家所忌姜桂附子大辛有毒若服此瘡雖發而
必有餘毒如前所云所謂餘毒者何毒也姜桂附子

之毒也既服毒藥豈可嫁禍於瘡痘之毒哉不若用
溫和之為君若是不發其中有用灸者則灸之黃芪
甘草之類也用煨者則煨之白芍藥肉豆蔻之類也
用炒者則炒之鼠粘子白木枳壳枳實之類也用酒
制者則酒制之如川當歸之類也更能調飲食適溫
煖避風寒則自然起發肥滿紅活光澤而屬矣尚何
慮其不發也哉

預防湯

治小兒疹痘未出之時服之預防患難

山豆根

鼠粘子 研

苦參

各乙分

黃連

炒下

升麻 一各 生犀 一各 密蒙花 八分 紅花子 十粒 研破
右咀用水隨意煎服如痘重者亦可減輕

平解湯 疹痘并疹皆治

升麻 一各 蟬退 七分 紫草茸 各分 露蜂房 一各一分
枳實 九分 黃芪 七分 荆芥穗 八分 蜜蒙花 一各
鼠粘子 一各 乙分炒研 苦參 一各 乙分

用水二鍾黑豆五十粒煎八分半飢時服咀內
用枳實者疹痘主於脾使之理脾胃長肌肉如
毒氣壅盛使之得以疏通而映去之用黃芪者
疹痘發於肺使之理肺氣補皮毛三焦不得虛

弱排膿止痛皆安表和中之藥也

加減升麻湯

治小兒疹未出發熱心煩坐卧不寧神效

甘草 五分 升麻 一各 白芍 一各 紫草茸 一各
生犀 七分 連翹 一各 木通 七分 鼠粘子 一各 研
蟬退 八分 厚朴 一分 苦參 一分 露蜂房 一各
用水二鍾煎八分飢時服

犀角鼠粘湯

治疹痘奇凸毒氣火盛心中煩悶乃和解疹毒
之藥疹痘密者疹子甚宜服之

枳實一分連翹一分犀角一分露蜂房一分

秦艽一分升麻一分蟬退一分紫草一分

梔子一分黃連一分苦參一分山豆根一分

黃芩一分鼠粘子一分研煎服

古方辰砂散 辰砂一分為末蜜水調服

辰砂乃辰州所出之砂故名辰砂其次宜州階州皆可用也信州砂亦有墻壁光芒破之作砒氣服之杀人不可用也痘多者可少服少者可無

葛根解毒湯

被世恐疮不發牢熱異攻散良姜官桂附子等熱

藥而發之往後疮毒藥毒一併大發如火熾甚不可收救或至眼目双瞎或至爛落牙齒或至爛穿兩頰或至胸腹腫毒或至手足發癩疮毒不消而藥毒不散竟致殞滅父痛母傷號天泣地医者歸之天亡嘍發瘡毒而或至死者天也用毒藥以杀人者人也人杀之豈可歸之天亡哉余嘗曰庸医杀人子孫微矣故製此方不惟解服藥大熱之毒其疮痘如有心煩未透者使其發出已透者亦能減輕俾毒藥除而瘡痘愈兩全無害遭毒者監之犀角一分葛根二分黃連一分山豆根一分

黃芩各二分 梔子各一分 甘草各半 露蜂房一分

荆芥七分 連翹各二分 紫草茸各二分 鼠粘子一分一分

水鍾半煎八分食遠服

川芎紫草湯

治疹痘灰白色不紅不發項陷不是屬寒則是

氣血俱虛此藥極能除寒又能補虛屬寒屬虛

皆可服之使其發出而紅活也四肢不發再加

滑石各二分 龍骨乙分 火煨過研用

川芎各二分 當歸各三分 苦參各二分 紫草茸各半

蜂房各三分 蟬退八分 厚朴各一分 鼠粘子二分 炒研

白芍一分 白朮一分 升麻一分 括萎根一分

木通一分 黃芩一分 白芷一分 枳壳一分 去穢口

用水二鍾煎八分半飢時服如色黑中陷而倒

屬者血氣俱虛毒發不透服此亦宜

升麻紫草湯

治屬黑陷夫黑者譬之如火活則為火而為紅

死則為炭而為黑蓋因疹痘太盛血氣不勝熱

炭不透以致不充滿頂陷不紅活而黑焦則是

黑者火之死也故其狀也如煨炆之木也若謂

土不勝水變黑歸腎則誤矣然此黑陷乃不活

之痘也嘗考之本草經有云麻黃疹痘屬黑之藥取汁乘熱服之避風同其疹復出故又以麻黃為君而以紫草等為臣為佐為使大率解疹毒補氣血扶脾胃之劑也

蝉退八分 升麻一分 川芎一分 紫草茸各半

人參七分 陳皮一分 白木一分 鼠粘子各半

厚朴各一分 蜂房各半 黃芪各八分 黑大豆十五粒

麻黃去口 當歸酒洗 水鍾半煎八分將飢時服

活血當歸湯 治痘血少將好而色淡者

苦參 丹參 天麻 白芍藥各一分

白芷 丹皮 人參去芦 五灵脂各一分

川芎 地黃酒洗 當歸酒洗 紫草茸各二分

用水鍾半煎八分臨飢時服

草茸地黃湯

治疹痘有全白色將靨時如豆壳結靨不存者

白朮 厚朴姜汁 槐皮 熟地黃各一分

當歸酒洗 川芎 苦參 括萎根各二分

白芷 黃芪炒 蝉退去翅 鼠粘子炒各一分

細辛 甘草各五分 紫草一分二下

用水鍾半煎八分食遠服使之血紅活肉肥滿

陳皮枳實湯

治痘疹宿食不消服此神効

陳皮二分 升麻八分 鼠粘子一分 乙卜 烏藥

枳實 青皮各去 紫草茸 砂仁

神麴炒 草菓去殼 厚朴姜製 桔梗各二分

水鍾半煎八分臨卧服

黃芪白朮湯

治疹痘水瀉如神

紫草 白朮炒 蜂房 白芍藥煨

烏藥 豆蔻 阿膠蛤粉炒 史君子各一分

陳皮 苦參 厚朴去粗皮 鼠粘子各一分

澤泄八分 砂仁 黃芪各一分三分

用水鍾半煎八分將飢時服

厚朴枳榔湯

治瘡痘紅痢神効

厚朴去粗皮 白芍煨 枳實麩炒 白朮東牆陳土炒

陳皮 蒼朮米泔水浸 枳榔雞心者佳 鼠粘子炒

各一錢同前煎服

甘草地榆湯

地榆 砂仁 枳榔雞心者佳 鼠粘子炒

厚朴姜汁炒黃連炒

枳壳麸炒紫草茸

黃芩炒白芍煨

括萎仁 山豆根各一分

甘草五分烏梅半個

用水一鍾半煎八分半飢時服此劑因紅白多寡未定而製但下主藥須看痢之顏色如紅多白少以黃連為君或加二分或三分看紅白色而加之如白多紅少以厚朴為君加法如前看白色分而加之若紅白相等依此方而平之萬無一失也

復生散

畧覺相似先服經驗

復生散一服俾多者可稀匕者可無

次服

升麻葛根湯一服以疎其膚肉傷起者斟用內加

消導藥

但見紅点便不可發散解表之藥即服

補氣益榮湯 自製屢驗奇効

人參去芦三分 當歸身酒洗一分 甘草二分

白朮一分 紫草去芦一分 鼠粘子八分

陳皮八分

用水一鍾煎四分無時服

如灰白頂陷倍加人參 瘡黑氣粗氣湧氣促肺

熱者忌服

如不紅澤光潤者倍加歸身 血實紅甚者不宜

多服

如痒手^抓者倍加牛傍子

如外回濕痘松花粉細七攪之即乾結痂

如渴用麥門止渴飲

止渴飲

麥門冬 去心 君人參 去芦 立

治小兒已出未出痘疹仙方

硃砂好明淨者四五以細川歸去頭芦 升麻

川芎不泊者甘草各六兩切為咀片取東流水七

大碗入新砂鍋將前藥煎至三碗去渣用一小

竹橫鍋弦上懸砂袋離鍋底指許傾前藥水浸

袋即止陸續添煮水盡為度開袋取砂仍淨擦

鍋底隔紙焙乾研為細末磁器盛貯封固听用

引經散 用好糯米半升淘淨令乾鹽泥包裹入

炭火內煨煉通紅取起冷定剖開揀出黃色存

性者研羅為細末謹密收藏臨嘗取用

右藥合時須淨室焚香齋戒沐浴勿令雞犬婦
女聞見每小兒一歲用復生引經散各一分蜜
一茶匙米湯半盃好酒三匙入淨器調勻徐徐
喂服凡小兒總覺發熱服則不出出則必輕若
見痘苗及取早者咸服有効萬無一失也是方
出自異人得齋居士獲之屢驗欲廣其傳遂書
貼南臨穎郵壁間適武昌卒人吳君見而錄之
歸即修合家用并施諸親隣神効果然誠保命
之良方也因而重梓宣交得之授予亦試有驗
不敢私昧故記此以博施之願嬰孩同壽域耳

郵續

筠亭張子曰痘瘡之症原於胎毒所致或遇天時而
發或三觸之而致皆從於足太陰膀胱壬水之經
傳出五臟六腑大抵毒輕者則少毒重者則多輕
則燒熱三日徐七而出其燒即退重則壹起而發
或燒一日二日或燒不退先放標之時紅點或從
手足或地閣其痘定稀所出之所亦不必大拘心
上無者為最次以手足心眉必無者為佳臍當中
並湧泉穴出者多凶乃是足少陰腎經也如斯出
美也因內傷起者惡心腹痛作瀉有此類症亦不

為害外感起者潮熱不退謔言妄語亦無事耳若甚者咬牙弄舌聲蒼犯此數事亦不為凶耶先驚搐而放標者十得十全又等或燒一日或往來潮熱或不燒出一二粒大痘此名樣豆遇一二日或四五日復燒而出此乃大不必驚疑又一等先出一黑痘諸豆隱於皮膚之間不出必用磁峯打破黑豆出血水盡諸痘自出其症有輕變重卜變輕必要臨症斟酌不可執一耳治法用升麻葛根湯川疎其慮次繼之以補氣補血之藥以培其源隨症加減調之百發百中矣

右咬咀用水煎湯徐服之其渴即止神効

患者之家宜當禁忌先須於

患痘房門外燒皂角并粗糠烟於室內先燒紅棗烟隨用銅錢燒紅將好酒乳香於其上常細燒之不可缺也改穢惡止豆痛發豆毒必能乾水結痂妙不可言也

醫門秘旨卷之十二

外科

五善七惡辯

五善者動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也形彩清明語聲清朗四善也体氣和平五善也七惡者声如燥頻時嗽腹滿渴甚泄痢無度小便如淋一惡也膿血大泄而掀腫尤甚膿血敗臭痛不可忍二惡也喘粗氣短惚、嗜卧三惡也目視不正黑暗緊小白睛青腫背上青色四惡也肩項不便四肢沉重五

惡也飲食不下服藥嘔吐食不知味六惡也
聲嘶色脫唇鼻赤黑面白四肢浮腫七惡也

諸毒形症逆順

眼白睛黑一逆也不能下食納藥而嘔食不知味
二逆也傷痛渴甚三逆也轉項中不便四肢沉重
四逆也聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫五逆
也煩痛時咳腹痛渴甚瀉泄無度小便如淋六逆
也膿血大泄焮痛尤甚膿大臭不可近七逆也喘
粗氣短恍惚嗜臥八逆也沫潰先黑陷下面青唇
黑便汚九逆也其氣噫痞塞咳嗽身冷自汗瞪目

耳聾恍惚驚恐語言錯亂皆是惡症十逆也若動
息自寧飲食如味一順也便利調勻二順也神采
精光語言清白三順也膿出腫消色鮮不臭四順
也體氣和平五順也五順見三則吉也逆見四則
危也俱至則惡之劇也

不治症

發背脊俞空處肝俞上透膜者死未潰內陷而青
黑唇黑便汚者死潰純膿內外相通者死入腹
者不治入囊者死髭深及數寸者不治數謂深一
寸有餘胸上諸阳所聚穴入腦出者在頤後一寸

三分毒入唇者死

水銀膏 治一切瘡疥

大楓子肉二升 水銀用茶研末一升 樟腦 礬生熟各二升半

先將楓肉為膏次入餘藥和勻臈猪油同入絹布囊內任意用

飛龍奪命丹

治疔瘡發背癰疽吹乳疔名腫毒惡瘡

蟾酥乾者酒化 雄黃 乳沒剉 蜈蚣一條酒浸炙黃色去頭足

銅碌各二升 胆凡一升 寒水石一升 血竭各半 輕粉

射香各五分 蝸牛連壳二十一个 硃砂二升為衣以硃砂上各研為末

先將蝸牛研如泥和藥丸如黍豆大如丸不就

用好酒杵五千下每服二三丸先用葱白三寸

令病者嚼爛吐之男左女右手心裏藥用无灰

酒三四杯温服於避風處卧以衣蓋之約人行

五七里許用燒酒數盃催助藥力發熱大汗為

度其疾立愈大重不過三服瘡无頭者服之有

頭不病者服之知痛已成形者服之即愈危急

者服之无失屢驗

螞蟥丸 治諸瘡毒粉瘡痰核三五年者半料即

消不問惡瘡新起者亦當服此護心凡一切毒

皆可常服末破者即潰已破者即合

明礬生用一分為末黃蠟七分四川者佳色白者是也

右以蠟溶化出火毒候九分冷將礬末入內和

勻丸如梧子大每服十五丸加至二十九丸米湯

或滾白湯隨毒上下服之

神應散 治脚指了温爛

枯礬六分黃丹五分為末乾摻患處經夕自愈

希蒼膏 治諸瘡毒初起

用希蒼草連根搗爛入酒出汗渣敷患處愈昔一

人中牛肉毒害疥瘡將危將此灌下即活

七味柚油丸 治疥瘡極効

大楓子去壳杏仁去皮尖各十九粒水銀 花椒 輕粉

朝腦 枯凡各一分

共為末香油搗勻一處為丸彈子大任用

殺虫祛風膏 治諸癬與驚掌風

樟腦二分水銀三分黑鉛一分三分大風子去壳

杏仁各十枚川椒五枚淨炒 先化鉛次入水銀取起

入藥同為末香油調搽余治驚掌風先用嫩槐

皮同蘄艾煎湯燻洗方搽仍以火灸入內効

和血生肌散

治金刃所傷最効及湯火杖瘡跌打傷破

大黃當歸 瓦焙焦各乙刀 杏仁去皮尖五糸

共研末搽患處莫若以醋調塗忍一刻之痛其

愈尤速或水調塗亦必以酒醋潤瘡四圍則良

黑神散 治諸毒乳癰敷之神効

乳沒血竭各乙刀 五倍子炒半生半熟乙刀

四味為末醋調敷患處未成即消已成即潰

丹豆散 治耳疔腎囊風痒抓破出水神効

黃丹炒紫色 豆粉各乙刀 枯凡五糸

為末同入鍋炒紫取出搽二三次即安

三虫散 治梅毒并瘡毒初起者神効

大黃五糸 蜈蚣乙糸 姜蚕炒三糸 全蝎全不制用乙糸五分

為末每服三錢鷄未鳴時用淡温蜜水送下量

人虛實增减服一次即安

治瘍五毒方

石胆 丹砂 雄黃 礬石 磁石 黃堊即黃流离瓦器也

實石胆等五味石於其中燒之三日三夜其烟

上灼以雞翎掃取之以注瘡惡肉破骨尽出

散血愈傷方 治湯火金瘡傷

黃葵花不拘多少用香油浸半月听用如值患處

將鵝翎蘸油搽上即安

鐵箍散 治諸般瘡毒癰腫杖瘡等症

用芙蓉花及葉晒乾以好醋調敷貼患處如杖瘡

赤腫用雞蛋清調敷冷水加皂角少許亦妙

奇蓮解毒飲 治土虺蛇傷及一切諸蛇所傷

用半邊蓮酒搗取汁飲之將渣敷患處取汗愈

地骨通聖膏 治天疱瘡

用防風通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調敷

治凍瘡方

用茄根濃煎湯并以雀兒腦髓塗之

瀝清膏 治手足破裂

瀝清 二日 黃蠟 一日 同熬攪勻瓦碓盛貯先以

熱湯洗令拭乾將於慢火上畧灸搽傳

癰疽

脈經云癰疽浮數患寒發熱若有痛處癰疽所發也
脈數發熱而疼不數不熱不痛是為疔瘡發癰之脈
弦洪相搏細沉而滑肺肝俱數
隔皮取膿膏

白鹽 半及 草烏 四斤 馱蹄 切細 蕎麥麵 各乙及

為末調作餅子慢火炙黃色出火毒用醋調成

膏白紙攤貼患處水從毛孔出其腫自退

內托千金散

治腦背瘰癧乳癰便毒等惡瘡

人參

八分去

當歸

一分酒

黃芪

一分

川芎

六分

甘草

三分

瓜蒌

七分

白芷

官桂

三分

桔梗

五分去

防風

七分半

金銀

水二鍾煎一鍾入酒半鍾溫服痛甚者倍加當

歸芍藥或乳香二錢日進三服二服之後瘡口

之內有黑水血出者或遍身汗出皆藥之功如

疝勢猛惡酒稱藥乙兩水乙大椀煎服未成膿

者自散已成膿者不用針砭自透此藥屢驗

神仙活命飲

治一切腫毒未發者一服即安

天花粉

一分五分

皂角刺

醋炒一分五分

甘草節

金銀花

一分五分

廣陳皮

白一分去

乳香

川當歸

一分

沒藥

制一分

赤芍藥

防風

去芦六分

貝母

去心一分

川山甲

八分炒

右咬咀用水鍾半煎八分不俱時服

祛毒死比酒

治楊梅瘡毒

川牛膝

酒洗去芦

威靈仙

白癬皮

白疾梨

五加皮 倉耳子各四 蟾退二兩 天丁四 又
金銀花 土茯苓 五斤

又細藥

射香 一分 銀珠 一糸 大黃 一糸 共為細末

用黑鉛一兩 箏包懸入內 同煮生白酒二十斤 未
下水 白酒二十斤 同前藥入壺 煮上用糯米七粒
於箏封頭上 米熟取出 任用

治楊梅癬及梅瘡方

土茯苓 四 防風 去 苦參 黃連 炒 白癬皮

金銀花 薏苡仁 當歸 酒 洗 姜 五片 葱 一根 水 煎 服

猪牙龜板湯 治輕粉楊梅每神効

防風 去 芦 龜板 酥 炙 木通 去 皮

木瓜 荆芥 穗 川牛膝 去 芦

當歸 尾 酒 洗 薏苡仁 青藤

牙皂 各 等 分 土茯苓 每 劑 二 双

右咀水二鐘 煎一鐘 甚者二十服 可以除根

腦癩千搥膏

黃蠟 一 双 草麻肉 三 糸 松香 五 糸

雄黃 一 糸

生搥成膏 用布攤貼患處 其初難粘 粘則不落 直

待患愈髮生則膏藥自落不拘遠年近日只用一枚其効如神

治諸毒已破未破者神効

川牛膝去芦五斤赤芍藥五斤

右以咀水一鍾酒一鍾煎一鍾一服即効

治發背神方

黃犬下爪連皮肉骨煨成灰 芎豆十粒

右為末用醋調搽患處總發週圍開大孔塗搽破者滿搽二日一遍次日又換見効如神

治癬及頑瘡方

黃栢一斤

苦參三斤

五倍子一斤

灸

雄黃一斤

枯礬一斤二分

朝腦八分

蛇床子一斤

輕粉一斤

靈蓋粉一斤五分
折謂粉者

燒灰存性也

用雄猪胆調搽患處効

治火疮方

用生蜜調蛋清共撓成膏以鷲羽掃患處効

又方

用烏桕樹土內根不拘多少去粗皮骨煨焦為末溫則乾搥乾則真香油調搽患處

治秃瘡肥瘡方

用白酒香油各一盞將肥皂內釀一兩入內煎
數沸取出搗爛復入油內再熬取起入土內埋
三日出火毒搽患處一二遍即好

治火丹之患并諸毒初起

用石灰不拘多少入清水內攪勻潤將清者半杯
入真香油半杯攪成膏搽上一二次即好

乳香護心散

治瘡疽發背疔瘡預防毒氣攻心

乳香一刃 硃砂一糸 萊豆粉四刃

共為末每服二糸濃煎甘草湯下

槐花酒

治發背

凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚四肢麻
木竟有紅暈在背即取槐花子一大抄揀淨杓
內炒茶褐色用好酒一椀澄過逼去渣乘熱吃
酒一汗即愈如若不退再揀一抄如前炒煮服
之自効縱成膿者亦无不愈

四宝丸 治諸腫毒并疔瘡等症

麝香五分 蟾酥 冰片 硃砂 為衣各一分

右末乳食丸 如黃米大每服三五丸

惡瘡腫者涼水下 小便不通鼠糞湯下

吹乳用堯銓湯下 傷寒葱湯下乳瘡水下

神功散 治發背瘡疽一切疔毒瘰癧等瘡已未

成患者皆有奇効難以備述

川烏 火炮以裂為度 黃栢 去粗皮炙各等分

右為末用小兒或大人唾津調成膏如唾少嗽

口水亦可發背瘡疽等瘡初起者敷於患處

頭候藥乾用淘米水時常潤溫每日換藥敷一

次如瘡已成重患潰爛者先煎槐枝艾葉湯損

溫洗淨用絹帛拭去膿血以香油潤患處仍用

綿紙照患處剪成圓錢番頭貼之後將藥塗於

紙上如乾依前水調日換一次所其自然流膿

不可手擠敷藥之後病人竟瘡任痛取熱即愈

內消散

凡患瘡疽發背对口惡疔乳花百種無名魚頭

疔瘡此藥能令能消去毒化為黑水從小便出

萬不失一是方不可秘藏猶不可輕視宜宜之

乳香制

白芨

知母

忌鐵

川山甲

炙

貝母

去心

半夏

湯泡

皂角

金銀花

天花粉各一分

右咬咀用無灰酒一椀煎至半椀去渣熱服將渣搗爛加過秋芙蓉葉末乙兩同和新波井水

敷於瘡上乾亦水潤過一宿自消不必用第二

服忌食發物

腸乳二癰

脉經云腸癰難知脉滑可推教而不熱腸癰何疑遲

緊未膿下以平之洪教膿成不下為宜

乳癰乃熱氣所吹遂生結核於初起時便就忍痛揉令消軟啞令汁透自可消散失此不治必成癰癤治法踈厥臥之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚浊之血以甘草之節消腫導毒以菰蔞子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀淨花當歸或湯或散加減任意消毒自然湏以好酒佐之若加艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針刀必致危殆以困若得於月不得於日皆因憂愁鬱悶昕夕積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大棊子不痛不痒數十年後方為瘡陷名曰乳岩如棋子瘡形嵌凹似岩穴也不可

知矣若於胎生之際消釋病根使心清神安然後施
之治法亦有可安之理

蒲公散 治一切吹乳乳癰

蒲公英 乙大撮 金銀 各半 柴胡 八分 青皮 一分 去穢

水鍾半酒半鍾煎服取汁即安

又方 用柑子樹葉不拘多少入臈糟些須同搗敷

患處取汗即効

散血消癰散 治吹乳神効

白芷 貝母 等分為末好酒調服無乳用囁芦煎

湯服即安

黃蠟膏 治一切臙瘡毒

防風 荆芥 苦參 木鱉子

花椒 川芎 當歸 金銀花

黃連 黃栢 白芷 各七分

右為咀片入油熬褐色入後細藥瀝去前渣

乳香 沒藥 各一分 血竭 七分 海蝶蛸

輕粉 各八分 龍骨 兒茶 各五分 共為細末

將前十一味外加血餘二分半 出過雞子白皮

二個同香油三兩煎去渣後將油下鍋入黃蠟

一刃五分同熬滴水成珠取出火半冷入細末

臙瘡散

和勻听用再入桐油一两尤妙

乳香

沒藥

各制

龍骨

煨

密陀僧 各乙刃

輕粉

熊胆

硼砂

水龍骨 各五刃

黃丹

血竭

硃砂

赤石脂 各乙刃

白凡 八刃

冰片

射香 各一刃

海螵蛸 二刃

右為末先將患處洗淨方搽

若葉方

治頑臙久不收口

輕粉

黃丹 各二刃

若葉

凍青葉不拘多少

用好米醋一碗入葉葉煮滾十數沸先洗淨瘡

又搽藥

口先用凍青葉貼後用若葉貼一日換二次

枯凡

皂角 焙

銅碌 焙

黃丹水飛過 各二刃

兒茶 煨

鹽 焙三分

共為細末亦治楊梅更効

白玉膏

治遠年近日風臙

用生豆腐成片敷上其腐黑去之再敷不黑即好

乳沒膏

治臙瘡及扶瘡

血竭

輕粉 各一刃

乳沒

樟腦 各五刃 為末

將黃蠟 七刃 化開成膏入末拌勻油紙推貼効

合時忌婦人雞犬見

五灵隔紙膏 治臙瘡

五灵脂 乳没 桑葉 等分搗末 朝腦少許

驚甲 醋炙研末 鄉間人家 百草霜冬天少許 右末將桐油或香油調

用油單紙夾藥在內用針刺眼貼患處

輕粉桐油膏 治遠年近日臙瘡

黃蠟 五斤 血竭 輕粉 各一斤為末 桐油 四升

先將油化蠟以末投入一沸為度用油紙推貼

一葉金 治血風及臙瘡

用茶筭上箬葉將酸糟糟一七取出先以艾鹽椒
茶湯洗淨後以箬葉貼上用布包住先痒後疼効

瀝油方 用綿花子二升除在外鋪頭蓋底

黃連 蒼朮 細辛 皂角 明瓦 皂凡 鹽

花椒 芝麻 升 草麻子 十味為末在綿子中間

燒瀝油

製綿花子油法 大綿花子 灰藥藥 綿花子 油 水

既濟膏 治年久不愈癩瘡

臙瘡脾腎二脏之病也用多年石灰為末雞蛋黄

調成丸泥封作團毖乾火煨透冷取出研末桐油

調作夾紙膏貼上三日一換冷茶洗去臭氣不過

三換結痂即愈紙換瘡處以針穿小孔使藥透過

痔漏

槐角丸

治腸風下血及痔漏通用

槐角炒

生苜

忌鉄

黃連

炒去鬚

条芩

各一分

歸身無灰酒洗

黃芪

枳壳

麸炒

秦芫

防風去芦

連翹

去心

地榆

去稍

升麻

各二分

川芎

阿膠

蛤粉炒

白芷

各五分

為末

煉蜜丸

如梧子大每服五七十九空心米飲送

下滾白湯亦可

愈痔止血方

治痔漏出血不止便紅者亦驗

地榆

連翹

去仁

生地

酒洗

黃栢

去粗皮炒

厚朴

梔子各一分炒

白茯苓

去皮

赤芍

川芎

蒼朮各五分

防風八分去芦

甘草

三分

薄荷

荆芥

各七分

用水一鍾半煎八分空心服

洗痔方

馬齒莧

風茄子

如無風茄加瓦松尤妙

將藥入沙鍋內熬十數沸去渣燻洗

又方

洗諸痔神効

馬齒莧一把

五倍子

六分

瓦松

一把

明凡

少許

同前煎洗

黑丸子

治久痔下血不止

黑百草霜

木饅頭血不敗棕灰

烏梅

栢枝葉

油頭髮

各五升 俱燒灰

桂心

白芷各五升

右俱研末酒糊為丸每服三十九空心米飲下

水鉛止痛丸

治痔腫痛不可忍

黑鉛二升

化開入水銀二升

研末入冰片一分徐

搽上即消

番痔藥

用草烏為末津液調敷肛門內其痔即番出屢驗

十神膏爛藥

治痔漏七癭五瘡等症爛去敗肉

荊芥

蓼子

白竹

棘柴

杉柴

喬麥楷

芝麻楷

菜豆楷

楓柴

各燒灰存性

爐底

石灰各二升

用稻筲一隻將紙鋪筲內藥灰放紙上煎滾水

淋之取汁仍安鍋內將石灰炒黃色調前藥汁

成膏放於磁磬內臨用之時用竹刀調塗患處

不拘痔漏瘰癧瘰癧俱以爛下敗肉去盡後用

洗藥

白凡

鷄冠花

五倍子

等分煉炒

右三味為末每用煎湯洗之去前藥却用後製

生肌散

龍骨

赤石脂

海螵蛸

各五升

乳香

白芨

血竭

枯凡

少許

蜜陀僧用黃煮過木香有熱甚者不用

右為末搽瘡口上待肉生滿為妙

敷四圍好肉藥 大黃 草烏 甘草

黃丹 白芷 海蝶蛸 等分為末

用蜜調塗瘡四圍方用前膏

白姜散 治痔堅硬雖落此敷藥催之自落

白姜 百草霜各二斤 川烏一斤

右為末調敷患處妙

疥瘡

皮硝沐浴湯 皮硝半斤清水一桶煎洗三四次愈

祛虫愈疹方

硫黃九斤 枯凡七斤 人言一斤 焰硝三斤

右為末香油調搽

祛熱搜風飲 治疥及膿疱瘡

柴胡臣去 生地臣酒 甘草使蜜 連翹臣去 片苓臣

荆芥臣 苦參君 薄荷佐 獨活佐 黃柏臣

枳壳佐 防風臣 黃連臣 金銀花君

用水一鍾半煎八分食遠熱服

換硫膏 治疥膿疱血風瘡

硫黃九斤 換柳五斤 人言一斤 共為細末

用香油二兩將雞蛋黃入油熬黃色去蛋不用却
以前藥調搽

治疥方

枯凡四分 輕粉 水銀 大風子肉各一分
杏仁五个 相油九分

先將大楓杏仁肉搗爛入香油調搽

瘰癧

丹溪云必起於少阳一經不守禁忌延及阳明大抵
氣鬱也疾曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分
虛實實者宜治虛者可慮以其屬胆經主決斷有火

宜氣多血少婦人見此若月經不調作寒熱變生稍
久轉為漸熱危矣自非斷慾節飲食去痰神仙不治
清惡和氣飲 治瘰癧等症

桔梗大分 羌活六分 赤芍七分 烏藥七分 香附七分
紫蘇四分 厚朴四分 枳殼四分 白芷五分 茯苓五分
防風八分 柴胡八分 甘草二分 半夏一分 青皮一分
用水鍾半姜三片枣一枚煎八分不拘時服

潰堅錠子 此錠不拘瘰癧結核瘰癧痔漏皆治

用好白砒錢半黃丹炒紫五分枯凡少許研末糯
米糊為丸搓成錠子如麻線狀長五六分許每用

此入漏孔內或水磨化搽之預將瘤核針一孔仍
用猪棕以系綿纏之清油蘸濕入孔中透令有空
竅却納錠藥在內外以紙貼之如此一日一換半
月方落後用生肌藥敷之即生肌收口而愈如粉
瘤血瘡前枯凡加作三分其瘡即乾裂而落
生肌散 用五倍子燒存性一多好杭粉炒錢半為
末先將清茶洗患處却以此藥搽之不可大厚厚
則氣不洩恐壅膿血此壘三日則生肌滿肉矣

祛痰搜風丹 治療癰

南星姜汁浸 半夏 各二升 川烏 草烏 各乙升

右四味煎水淋後汁藥汁方 桑柴灰半升
硃砂一多 芦灰半升 硬炭灰 栗柴灰 芝麻灰各
半升共為一處用前藥水淋汁入鍋內煎乾听用
点在瘡上二三次後用竹針刺孔用潰堅錠子藥
線插之孔內如瘡大用二條後服丸藥丸藥方
海粉 海帶 海石 各二升 海螵蛸
赤芍 升麻 白芷 川山甲
大黃 煨 龍腦 防風 去芦 金銀花 各乙升
連翹 當歸 各三升 甘草 一升 錫丹 五多 共為末
用酒打糊為丸如梧子大每服六七十丸食後

膏藥方

酒下 一人以夏枯草煎湯代茶一年瘰癧愈

白芷 防風去芦 苦參 黃芩炒 青藤 金銀花

羌活 殭蚕 黃柏炒 甘草 獨活 川山甲

赤芍 婦尾等分 蜈蚣二條 將香油一斤浸七日入

鍋同煎黑色去渣後下細藥 黃丹水粉各四

兩為末細下之收油為膏下後藥 孩兒茶

龍骨煨 血竭 輕粉半分 冰片一分 入膏內攪勻听用

木香膏 治老鼠栗子瘡

沉香 乳香 黃香 丁香 廣木香 青木香

黃蠟 黃丹 銀硃 降真 草麻子 定風草

硃砂少許余等分 共為末將桐油黃蠟松香同入確

內熬膏取出涼水濕丸如指頭大先用針刺去

痰血米泔水洗淨上藥若老鼠鼠疔姑瘡黃丹必

許粟子瘡宜用多

金銀湯 治療瘰癧已成者自破未成者自散

皂角 當歸 苦參 生地酒洗 川山甲 金艮花

防風去芦 白芷 大黃 赤芍各三 瓜蒌仁 鬱金各二

升麻各 殭蚕 桔梗 連翹各八分

用水鍾半姜三片葱一莖煎八分熱服

又方 荆芥 當歸 防風去芦 白芷各六分 黃芪七分

貝母具心 苦參 連翹仁去 漏芦 昆布 金銀花

海藻 海黛各五分 乳香 甘草各三分 乾薑 川山甲

桔梗各五分 木通去皮 片苓各八分

用酒水各一鍾煎一鍾熟服 忌生冷炙博之物

洗方 防風去芦 白芷 苦參 甘草 蒼耳草

荆芥 艾葉 羌活 獨活 皂角 荷葉蒂

歸尾 蜂房 赤芍 防已 金銀花等分

用水濃熬洗患處已破者尤妙

醫門秘旨目錄十三

卷之十三

雜方 霞天膏 救自縊法

救凍死法 孫真人救落水法 又法

玉樞丹 固本丸 大極丸

四壽丹 斑龍宴 斑龍鮫

不老丹 張三峯膏藥 杖瘡膏

人參造化糕 女真丹 金櫻煎

松梅丸 四和湯 蘇梅丸

神効藥酒方 烏鬚方 臟連丸

卷之十四

危病十方

追虫打積丸

蝨斯丸

烏鬚固齒散

延齡益壽丹

鎖陽丹

化骨散

烏鬚方

三子養親湯

灸雞爪風法

少陽丹

神仙奪命丹

剪紅丸

搜風順氣丸

取牙方

長春不老湯

治骨鯁方

青黛雄黃丸

斑猫散

彭祖小接命序并藥方

鉄刷末

烏鬚黑髮丹

汗斑方

膏藥方

散熱祛毒方

愈癬杀虫方

養脾膏

枇杷散

治肝班方

治牛諸症方

乳沒枯礬散

宝珍萬灸膏

冰梅丸

千金百補丹

遇仙散

烏金散

鉛汞膏

香粉散

烏鬚方

四聖散

春傳雀橋方

治風痰方

治走氣方

治禿瘡方

變酸酒成好方

治馬諸症

百益丹

烏雞丸

内府秘傳方

治狐臭方

治風犬傷方

廣嗣丸

如神百点膏

龍骨丸

玉餅子

飲食所忌附解毒條

散被區班痕方

神農煮針法
龍虎丹

草解分清飲 敷藥

太平丸

消化丸

香雄丸

長春不老湯

治臭虫方

治鷺掌風方

祛痰氣方

返魂漿方

治咽喉方

救荒濟生方

治大人小兒腹内有虫方

二仙散

蝨斯種子丸

補精益腎丸

靈蓋散

解酒散

玉容散

卷之十五

煨煉門

秋石賦

阳煉秋石

阴煉秋石

阳煉紫河車

阴煉紫河車

秋煉蜂蜜

秋煉蜂蜜

煉阳起石

煉蒙石

煉芦甘石

煉鍾乳粉

煉玄明粉

制造門

制半夏法

制香附法

制當歸法

藥性制中有製法歌

造神麩法

造鹿角膠霜

造紫霞杯法

造珠砂杯法

造玉露霜法

造百藥煎法

造聖蠟蚘法

炮炙門并炮炙制諸藥法

藥性拾遺

芦甘石

孩兒茶

三七草

千年矮

灵山柴

一枝箭

牛荆條

半边蓮

箭頭草

翻白草

醫門秘旨後跋

醫門秘旨

雜方

霞天膏

此方即倒倉古法傳自西域異人指余
投煎劑治疾遂推廣之

用二陳湯加防風荆芥薄荷等分熬汁煮膏膏成
隨飲食拌服之服尽自有功矣

黃牯牛一具選純黃无病者洗淨取四腿項脊去
筋膜將肉切成塊子大如栗稱三十斤或四五十
斤放靜室以大銅鍋或鉄鍋用二陳防風荆芥薄
荷熬水煮之不時撓動另以一新鍋煮沸水旋加

常使水滲肉至五六寸掠去浮沫只煮至肉爛如
泥淨去渣却將肉汁以粗布漉入銅鍋仍用一色
桑柴文武火熬候不住手撓不加熟水只以汁漸
加如稀湯滴水不散色如琥珀其膏成矣此即
火候
最要用心大段每肉十二斤可爛膏一斤為度磁
否則壞矣
器盛之是名霞天膏用調藥劑初少漸多沸熱自
然溶化和丸劑則每三分挽白麵一分煮成糊或
用煉蜜寒天久收若生蠶重湯煮過熱天冷水應
之可番三日

救自縊法

凡自縊高懸者徐七抱住解繩不可解斷其下安
被卧之用一人脚踏兩肩手挽其髮常令強急勿
使緩縱一人以手挽兜胞上數摩動之一人摩將
背脛屈伸之若以強直但漸屈之并按其腹如此
一時頃雖得氣後口出呼吸眼開仍引按不住須
更以小桂湯及粥清灌令俟間漸七能嚥乃止再
令兩人用竹管吹其耳此法最好死不活者自旦
至暮雖冷亦可救自暮至旦臥氣盛救至難耳

救凍死法

四肢直口噤只有微氣者用大釜灰煖以囊盛慰

心上冷即換之自開氣出然後以粥清稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死

孫真人救溺水法

急解去死人用艾灸臍中即活

又法

凡溺水者救上岸即將牛一頭以溺水之人壯橫於牛背兩邊用人扶策徐々牽行倒出腹中之水如醒以酥合香丸之類或老姜擦牙若無牛用二人於長板凳上臥將溺人如前法以肚相抵身上水出即愈

玉樞丹

一名紫金錠

一名万病解毒丹

療諸瘡利關竅通治百病神効不可具述凡屋家出入不可无此藥

山茨菰

俗名金灯籠葉似韭花但灯籠色白上有黑點結子三稜二月開花三月結子四月

初苗枯即空地得之迨則腐爛在尋矣每有獨老鴉蒜相類但蒜无毛茨菰上有毛色畧宜分力去毛皮千金子一名續隨子去壳研

麝香

一名紫大戟洗淨焙乾用綿大戟江南有土大

一名紫大戟洗淨焙乾用綿大戟江南有土大戟紅而堅實切不可誤用綿大戟江南有土大戟戰紅而堅實切不可誤用綿大戟江南有土大戟者可用共為末和勻用糯米糊於石臼中搥千下每料分作四十錠每服半錠病重者全服一

錠量病輕重各依後開湯服合宜端午七夕重
陽如欲急用取辰日或天德月德日亦可勿令
婦人孝服人雞犬等類相見要靜室焚香脩製
否則不効

一凡中蠱毒狐狸鼠芥惡菌河魷毒死牛馬猪肉
毒山嵐瘴氣諸藥毒飲食草木禽獸一切諸毒
俱用薄荷湯下或水磨亦可

一癰疽發背無名疔毒刈口天蛇頭一切惡瘡及
諸風瘡疹赤腫諸瘡未破苛病俱以淡酒磨服
仍用凉水調塗瘡上日復各數次良久竟愈漸

消已潰出膿血者不可服

一呶呶二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈壅滯邪毒
未發及四皆瘟疫用薄荷磨凉水

一瀉泄肚痛霍亂絞腸沙用薄荷磨湯服赤痢冷
水磨下白痢姜湯下

一急中顛邪鬼氣狂亂喝叫奔走無灰酒磨下自
縊落水死鬼迷驚死未經隔宿心頭溫者并用
冷水磨灌良久即甦

一蛇犬蜈蚣一應惡虫所傷冷水磨塗患處另用
淡酒磨服

一心氣痛淡酒或姜湯磨下瘡疾不問新久臨發
時東流水煎菘柳枝湯磨下
一小兒急慢驚風五疳五痢癰疹瘡瘡并用蜜水
薄荷小葉同磨下牙緊急磨塗一錠分作三服
如小分作二服量大小與之
一諸痔空心冷水磨服并敷患處溫則為末搽上
乾則用水敷搽
諸牙疼酒磨及含藥少許吞下如湯火傷東流
水磨塗傷處打撲傷損炒松節無灰酒下
一年深日近頭疼太陽痛入酒共薄荷研爛敷太

阳穴上

一失心羊兒猪顛風并中風中氣口眼喎邪掣顛
夜多睡涎言語蹇澁或口禁牙關緊急筋脉
縮骨節風腫手足疼痛行止艰难手足偏枯風
氣疼痛并用酒磨下
一嶺南兩廣毒虫最多若從宜於此繞竟意思不
快即服一錠或吐或瀉随手便瘥如牛馬六畜
中毒亦以此藥救之
一婦人腹內硬塊多日不消又月經過期不至腹
內作痛熱酒服之如有孕忌不可服

一婦人苦頭風作運吐痰酒磨下効婦人隔氣及
一男子轉食服之并愈
一男子便毒堅硬又患痔未成膿者苦痛大小便
俱難各進一錠後去二次痛即止不日而消
一男子患發背頭如粟米硬如負石內服外塗後
去三四次每去肛門如火炙不日而瘳
一三人剥死牛即日徧身患紫泡不計其數已而
懼潰各灌一錠吐泄而甦
一小兒昏憤六日不醒諸藥不効用空灌服此藥
即時甦醒

一女子被邪所交腹作痞服之隨下惡物其邪仍
至又服半錠每夜更燒二三錠使藥氣盈屋遂
不再來

一家患死勞兄弟五人已死三人有方士令服此
藥遂各進一錠隨下惡物如膿狀一下死虫如
蛾形俱獲生其人遂以此藥廣濟屍症無不効
一人患痢純血垂死用凉水磨一錠服之即愈
一女子久患癆瘵為虫所噬磨一錠服之一時吐
下小虫千餘條後只服蘇合香丸半月遂如常
凡一切禱病及瘡疽等毒未成膿者其効已成

膿者亦能禘大勢考其藥品雖不言補今羸瘦
之人服之効誠濟在衛生之室也然以價計之
用銀不過三錢製藥四十錠可救四十人有力
之家當合以漁人古方照依修製果有神驗濟
世衛身實不可無他製雄黃等味者為効差耳
余先君慙仙翁得傳於異人每料加硃砂三錢
雄黃三錢合皆切忌婦女雞犬相見每搗一下念
太乙救苦天尊一遍如是千搗口念千通用之
屢有奇驗

固本丸

凡服此丸者只說無福無禍不知其妙全在製
法熟地黄天門冬性緩味藜多滯泥干所經生
地黄麥門冬性疾味輕每不候於所佐人參主
元氣任引而後入三焦予感異人之授受願表
而出之

熟地黄天門冬生薑汁浸二日酒浸一日

生地黄麥門冬米泔水浸二日酒浸一日

搗搗如泥將杏仁湯化開溶漉淨渣又磨盡如
澄小粉之法摘去上面水取藥粉晒或重湯煮
乾研細末等分加入參末煉蜜丸如常法服之

太極丸

人之五脏配天之五行一有不和是以為疾藥有五味各主五脏可便調和故曰太極

胡荽仁

屬木主潤血養血屬陽惡燥故油以

黃栢無知母故紙無胡荽充水母之無鰕也去

破故紙

屬火主收斂神明能使心色之治脫用新

瓦炒香為末砂仁屬土主醒脾開胃引諸藥燥

氣天地以土為冲氣也去壳先將五名用好椒

知母

屬金主清肺又用五名不炒者共為末二刀

黃栢

屬水主滋腎水苦以堅精去皮毛忌鐵器鹽

右末和勻煉蜜丸如梧子大每夜白湯或茶酒送下五七十九服至三年効不可言苟久服之終能成地行仙矣

四壽丹

此四味藥性溫和俱在間有壽之物松脂茯苓者松樹千百年之精華也栢子仁者栢樹一年一發之秀而凝結成實者也菊花者開於霜雪之際承萬物既歛而自開之兌氣也人能終身服之自然醞釀臟腑薰蒸四肢堅固筋骨不比一切補藥若附子茯苓之藥燥熱助陽只遂淫

慾殊不知腎經怕燥日久水被火煎自取損命
此方茯苓補清水道健脾利痰栢子仁清心火
利濁氣補心養神松脂滋精不漏其香能行血
利氣又厚腸胃菊花清肝血明目能助胃氣之
上升能降心火之妄動又能助筋強骨補胞祛
風妙難尽述

白茯苓

去皮筋
淨五刀

栢子仁

五刀淨
針取

甘菊花
生

潤中小朵黃
花洗淨五刀
文火煮三沸
十七次定為
末取淨極細
者二十五兩
松脂用無灰酒一椀
并水二椀
共二
右四味各研共足三十兩水火煉蜜丸如梧桐

子大每服五七十九空心并睡時鹽湯或酒送
下乾醃內押之

班龍宴

班龍者鹿也氣稟純陽活血補血非金石草木
之比乃仙家服食丹法二十四品子賦孱病瘵
賴此載告欲起於人柰何術多天禁訣待口傳
知音者依此饒養廣延方士未必無相值也
馴牝鹿一隻每日以好人參五刀六刀煎水吃
藥渣拌米豆麥同各色土產藥材饒養以時勿
犯襍水草百日之外筋露可用矣

宴法夜前減食次早鹿後二足用布索懸起前二足用有力者挹定有角用木囊頭拘之握其兩耳使頭不掉側先用三稜鉄針刺開天地交次用銀筒如一頭斜銳入穴主者坐定啞其血十數口飲藥酒數杯復啞復飲醉為度鼻中流出者亦可和酒飲畢即避風行升降工夫坐卧至醒是為一宴也用生肌藥敷鹿冗又養又宴漸隨人意一年可宴十二度一鹿可用五七年不拘男女老壯能用之終身無疾而亦有壽矣
人參去芦白木土炒茯苓去皮當歸酒洗芍藥煨

地黄酒洗川芎甘草各二分沉香木香各五分

右十味預煮無灰酒一罇窹久用時少加椒姜葱仍乾內取之牛羊內尤妙

斑龍蛟

養小牝鹿數隻亦如斑龍宴法但不取血不群牝鹿養至三五年漸加硫黃入料久則毛脫血白置於高大圈欄內別以牝鹿在外誘之欲交不得必高躍長鳴日夜守定待其身顫不堪必至洩精是為蛟也急用銀磁器接收香遠十舍鍊藥入服食丹藥有火候銖兩口訣仙家所禁

竹帛不傳謾此類言未必無相值者
不老丹 四製何首烏

本草云何首烏味苦微溫無毒久服益氣血悅
顏色身體輕健鬚髮及黑齒落更生助臥益臥
生精添液補髓填津固濟丹田令人有子反老
還童延年益壽大有神功

又云五十年者如芥大号山奴服之一年髮
清黑一百年者如椀大号山哥服之一年顏色
紅光一百五十年者如盤大号山伯服之一年
齒落重生二百年者如斗大号山翁服之一年

顏如童子形狀走如奔馬三百年者如栲栳大
服之一年延壽結隙地仙矣

取法五月五日或二月八日採取新鮮赤白雌雄
二種數十斤勿犯鐵器以竹刀刮去皮切片米
泔浸一宿蒸熟晒乾臼中搗為末稱四斤以人
乳九蒸九晒分作四分听用
一斤入銘盆內用桑椹取汁二斤陸續拌勻日
晒夜露取日精月華之意以汁浸為度
一斤入鉛盆內取旱蓮草自然汁二斤同煎拌
勻晒露法

一斤入鉛盆內取生地汁二斤照前拌晒露
一斤入鉛盆內以當歸煮酒二斤亦如前晒露
右製畢和合一處研細以配後末

配合藥品

人參半斤 黃精一斤 秋石半斤用乳汁拌勻入鉛盆內日晒夜露
粉草二斤 白茯苓去皮半斤為末入鉛盆內乳拌勻日晒夜露以乾為度
黃栢半斤 鹿角霜半斤 枸杞子半斤 血餘灰一兩
生地半斤 熟地黃半斤 用酒浸洗
右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服八九十
丸空心吞下

張三峯高藥方

治五勞七傷左癱右瘓半身不遂寒濕脚氣癱
疽發背癰癤疔瘡瘋癩疥癩無名腫毒膿血等
症迂精白濁赤白帶下胎氣不定月信不通蠱
脹腰疼轉食痞塊醉後嘔吐諸毒虫犬咬害跌
打損傷傷寒發狂赤白痢疾偏墜疝氣并治

諸瘡裸症不難醫

此藥無非用莫疑

萬病方敷皆立効

分明活法任伊為

白芷各半兩 歸沒各三錢 五片川山甲
雙加木鱉全 巴豆一百二粒 八兩末黃丹

草麻加入去 医痞似神仙 赤白芍藥根
生熟地黄新 當歸并白芷 四季莫錯尋
加上五灵脂 萬病必須寧 乳香加在內
地府又敷歸 丹末要飛過

粗藥

白芷 兩頭尖 歸尾各二各半 木鱉子 二十个
赤芍 生地黃 熟地各五各 槐柳條各廿節
川山甲 五片 酥炙香油一斤 桃仁七十个
巴豆 草麻子各一百二十粒
俱成片入油內浸春五夏三秋七冬十日足取

出入鍋內用文武火熬將槐柳各一枝一頓撈
煎至巴豆黑色以油滴水內不散取起濾去渣
再入鍋煎方可陸續下黃丹煎至漠起撈之不
起烟然後全下細藥撈勻收入磁器內用水浸
一宿去火毒照貼法攤用

細藥

乳香 焙乾 沒藥 焙乾各二各 白芷 五灵脂
歸尾各二各半 共為細末入膏膏藥內撈勻
詩 熬時務要用心机 平称刀鍋槐柳枝
曰 順撈丹油渣濾去 成珠為度少人知

一五勞七傷貼膏肓二穴肺腧一穴陶道一穴甬
泉三里曲池各二穴中腕一穴烘一百餘手
一半身不遂寒濕脚氣左癱右瘓俱貼患處烘一
百餘手

一癰疽發背瘰癧疔瘡起處者烘雙手一上一下
務要內熱以散為度若見膿血不用烘手便貼
一咳嗽吐膿血貼肺腧二穴烘八十手如不止貼
膏肓三里曲池烘一百五十手
一男子迂精白濁下元虛損加木鱉子一個貼臍
烘八十手

一女人赤白帶下胎氣不定月經不通加木鱉子
一個貼臍烘八十手

一腰疼并各處痛加木鱉子一個貼痛處烘手以
內熱為度

一痞塊先用麵圈痞內加皮硝一兩用紙蓋頭將
餅斗餅紙務要內熱去硝麵然後貼膏藥加木
鱉子一個烘一百五十手為度輕痞不用硝麵
餅烘手內熱止

一偏墜貼痛處犬蛇咬傷貼上便好出膿亦好俱
不烘手

一蠱脹貼心上臍下加木鱉子一個烘一百手
一晏風醉後嘔吐貼肺腧及心口下三寸烘一百手
一轉食貼肺腧及心口下二寸烘六十手
一過傷生冷貼心口下用双手共烘八十手
一瘡疾貼起處烘手出汗
一打折傷損貼痛處加木鱉子一個不烘手
一傷寒發狂貼心膻中用二兩烘八十手
一傷暑及赤白痢貼臍中用三兩烘八十手
一冬三月傷寒及赤白痢疾貼臍中用三兩烘一
百手出汗為妙

詩

內外諸醫識症真

全憑診脈問原因

曰

將來神藥攤敷貼

立地從交病患輕

肺腧二穴在第三椎骨節下間佻而取之

膏肓二穴在第四椎微少五椎上二分微弓以脊

骨中橫紋開兩傍各三寸半离髀一指許上角

膜擦下角四筋

三關重按中指浚處是穴治百病

肺腧穴心口下三寸兩傍各二寸是穴

曲池穴手節大紅紋盡處是穴

三里穴在足膝下三寸滔者是穴

中脘穴上平鳩尾下平臍中折是也

詩 此方妙用最通仙 除是貧人學道傳

曰 萬病無憂皆應驗 舍歸地府又敷還

杖瘡膏

黃栢 黃芩 黃連 梔子各 歸尾 松香

血余 乳沒各二各 黃蠟三各 赤芍 八分

右為細末用淨捷猪油四兩熬化入前末藥撈

勻离火方入乳沒推貼

人參造化糕 能補氣血養脾胃服水土

人參去芦 茯苓去皮各 四刀 白朮土炒

山藥 芡實 蓮肉去皮心各 三刀 共為末

用粳米一斗磨粉將前藥和勻又加糖或蜜蒸

糕火焙之

女真丹

冬青子本草中謂之女真子去梗葉酒浸一宿

粗布袋擦去皮晒乾為末待有旱蓮草出多取

數担搗汗熬濃和前末如梧桐子大丸少則煉

蜜加添每夜用酒送下百日見効初服後便能

使老者無夜起之勞旬日便覺膂力加倍久能

變白髮為黑其功甚大莫可尽述

金櫻煎

經霜後以竹夾子摘取於木白中轉杵却刺勿損之劈為兩片去其子以水掬洗過爛搗入鍋內以水煎不絕火納水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餈每服取一匙用煖酒一盞調服
又云即棠梨止久泄取其溫且瀘壺之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則失却本性今取半黃時採為佳十一月十二月採佳本草云療脾泄止下痢利小便瀘精氣久服令人耐寒輕身方術多用

松梅丸

肥腸健體之驗

益壽延年之功

松脂一斤煉熟

烏梅淨內六刀

地黄一刃酒蒸懷慶者佳

如後法製煉丸如梧桐子大每服五十九丸空心淡白湯下此藥最能加飲食致身肥健小便清大便潤及精神不倦余考諸本草松脂味苦甘溫無毒安五臟除熱去胃中伏火咽乾消渴久服輕身不老延年聰耳明目固齒潤肺辟邪氣去歷節風厲風酸痛不可忍仙家多煉服可以辟穀之須得明淨者十餘斤先以長流水用鍋淋葉菜天什煮按三次再淋桑灰汁仍煮七八

次扯拔又用好酒煮二次完則以長流水煮過
一次扯拔白味不苦瀟為度陟乾入石臼內木
杵搗取淨末依方配合再搗一日作丸酒晒乾
熟地黄味甘無毒填骨髓補五臟不足及男女
勞傷通血脉益氣力利耳目一名地髓久服輕
身不老黑髮增壽服此味須忌三白禁鉄器取
沉水者佳晒乾稱用以酒洗浸柳甑砂鍋蒸半
日入臼搗用烏梅內味酸平無毒能下氣除熱
安心神療肢體生津液利經脉去痞消痰治骨
蒸羸瘦解煩毒久服令人不思睡故東垣有言

凡酸味最補元氣謂其有收斂之義耳取潤澤
肥大者三五斤以無灰溫酒洗浸甑內蒸熟去
核取肉搗和前二味成丸任意服

四和湯

四兩白鹽四刀姜	五斤好蜜二茴香
半斤杏仁麥麩炒	四刀甘草蜜炙黃
枸杞四兩核棗四	苳麻一升最為良
能和血脉增延壽	此藥神仙第一方

蘇梅丸

烏梅肉四刀 蘇葉末二刀 乾葛末一刀二刀

白檀香二刀薄荷末一刀青塩煨三刀用白沙
糖一斤研細入前藥末和勻用米飲和成丸外
四兩白檀為衣每服三四丸白湯送下
神効藥酒方

治諸風及跌打損傷住氣一切病症

牛膝去芦木瓜 白芷 厚朴 川芎 黃芩
陳皮去白 官桂 白芍 煨 杜仲 酥油炒 紫荊藤
防風去芦 人參 桔梗 獨活 各去芦 荊芥
半夏湯泡 甘草各二刀 青藤 蒼朮 五加皮
羌活上下各四刀 姜蚕 前胡 天麻 各三刀五分

乾姜煨

菊花各二刀

烏藥

石南藤各五刀

當歸 酒洗四刀

右用絹袋盛之無灰好酒卅五

斤加黑豆一合謹封坐釜中煮百沸為度埋土
中一七每服量虛實飲每日一次中風癱瘓半
身不遂手足頑痺麻木渾身損痛頭風等疾並
皆治之一醉則効速加燒酒一斤渣可再煮家
傳屢驗之方也

烏髮方


用水蛭二条放瓷碗中餓一七將水蛭洗淨用
白烏骨雞一隻取血用好京墨血內磨濃將水

臟連丸

蛭入血內蛭飽用針刺蛭血搽髮鬚白髮二分自然血汁透入鬚髮一年茂黑不退日不硬

用猪大臟極厚者三四寸宣黃連四刃為極細末入臍內用線扎定兩頭放入飯甑內蒸一炷香臍熟為度取出杵為泥加山藥末一兩木香末三錢如乾難丸加米糊丸如梧桐子大每服六七十丸空心用側柏葉煎湯送下專治大便秘下血脾瀉腸風痔漏神効亦治痢疾

醫門秘旨卷之十三終



岩城緒方遵程寫

