

傷寒溫疫彙編

五卷

3165



還園藏書

傷寒瘟疫條辯卷五

醫方目錄

吳茱萸湯

當歸四逆湯

桂枝新加湯

桂枝去芍藥

加味溫膽湯

疎表湯

人參固本湯

小建中湯

乾薑附子湯

黃連阿膠湯

救逆湯

竹葉石膏湯

桂枝附子湯

當歸六黃湯

附加吳茱萸湯

蜀漆龍骨牡蠣湯


天雨流

附黃耆建中湯

附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

附人參竹葉湯

附去桂加木湯



黃耆湯

柴胡桂枝乾薑湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

大陷胸湯

附大陷胸丸

小陷胸湯

小半夏加茯苓湯

附小半夏湯

生薑湯

枳實理中丸

海蛤散

枳殼桔梗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

杜枝人參湯

旋覆花代赭石湯

桂枝加芍藥湯附桂枝加黃連湯

黃連湯

柴胡加桂枝湯

柴胡養榮湯

附柴胡清燥湯

五福飲

附七福飲

四君子湯

附香砂六君子湯

四物湯

附八珍湯十全大補湯

二陳湯

犀角大青湯

大建中湯

麻黃芍藥人參湯

四逆湯散

桂苓甘朮湯

甘草桔梗湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

麻黃杏仁甘草石膏湯葛根黃連黃芩湯

芳流雨天

五味子湯 丹

蘇陳九寶湯

十棗湯 附控延

茯苓甘草湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾薑湯

丁香柿蒂散

滌痰湯

理中安虵散

天雨流芳
烏梅丸

麻黃升麻湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝去桂加

茯苓白朮

五苓散

六一散

桂枝甘草湯

桂枝加附桂湯

附陽旦陰旦湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

附芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

生地黄連湯

茯苓四逆湯

附六味回陽飲

導赤散

導赤瀉心各半湯

知母麻黃湯

黃連犀角湯

雄黃銳丸

百合地黃湯

三甲散

桂枝加附子紅花湯

黑龍丹

麻仁丸

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

大營煎

五苓散

芳流雨天

猪苓湯

解毒承氣湯

附陷胸温承氣湯

桂枝加厚樸杏仁湯

龍子栢皮湯

麻黃連名赤小豆湯

金沸草散

地榆散

桃花湯

桂枝加桂湯

麻黃附子甘草湯

白通加人尿猪膽汁湯

去人尿猪膽汁即白通湯

桂枝二越婢一湯

九正散

太平圓酒

升麻龍甲湯

玉樞丹

撥正散

芳流雨天

半夏散及湯

猪膚湯

芳香飲 温辨

滾痰丸

白散

正方一百
附方二十七



〃〃〃

當歸導滯湯

三合湯

文蛤散

加味茵陳蒿湯



半夏...

...

...

...

白...


...

區

圖

...

...



...

...


...

...

...

...

...



吳茱萸湯。厥陰頭痛。嘔而吐沫。少陰犯真寒。吐利

手足厥。煩燥欲死。及寒邪入陽明。食穀欲嘔者。

並此方主之。

吳茱萸

揀淨薑錢三 大棗枚三 人參錢一

水煎溫服。


厥陰肝也。寒邪內格。故嘔而吐沫。厥陰與督脉會於

巔。故頭痛。少陰腎也。腎藏中寒。則上格乎陽。而為嘔

吐。經云。腎主二便。腎寒則大便不禁。而為利。下手足


得陽氣而溫。內有真寒。故令手足厥冷。煩燥者。陰盛

格陽。故令陽煩。陰燥。其證多危。故曰欲死。吳茱萸辛



熱而氣厚專司開豁胸中逆氣。經曰氣為陽。氣厚為陽中之陽。故能走下焦而溫厥陰。少陰也。臣以生薑散其寒也。佐以參朮補中虛也。

小建中湯

三四日心悸而煩。及少陰惡寒。腹

中急痛。

此方主之。如黃者。蜜炙三錢名黃者建中湯。

白芍酒炒四錢

桂炙甘草炙二錢 生薑二錢大棗二枚 飴糖三錢

水煎去渣。入飴糖熔化服。

醫方考曰小建中湯宜用肉桂。枝則味薄。故用之以

解肌。桂則味厚。故用之以建中也。愚按開後人補中益氣無窮之法門。

此方是也。

續論曰桂枝湯中白芍桂枝等分用白芍佐桂枝以

治衛氣小建中湯中白芍四錢桂枝二錢用桂枝佐

白芍以治榮氣加飴糖以緩其脾故名之曰建中

則其功用大有不同耳

當歸四逆湯。手足厥寒。四陽邪陷內。脉細欲絕。陰盛

此方主之。

當歸 白芍 桂枝 各二錢 細辛 通草 甘草 各

錢四 大棗 二枚 水煎溫服 加吳茱萸 二錢 生薑 二錢

酒煎名當歸四逆加吳茱萸生薑湯治前證內

有久寒者。

手足厥寒。脉細欲絕。似平陰證之極。蓋緣陽邪傳入。

厥陰榮分。以本圖不能作熱。故厥而脉細欲絕也。此

為陰。陰是指厥陰經也。鬱陽邪天雨流芳故用桂枝細辛以解表。白芍

甘草以瀉熱。當歸以和厥陰之榮血。通草以通太陽

之本府。使陽邪得從外解。非治陰寒四逆之藥也。

故藥宜歸芍以濟陰。不宜薑附以劫其陰也。是證也。

自表入裏。雖曰傳至厥陰。始終只是陽證。與陰寒直

中三陰不同故不用四逆湯而用桂枝湯加當歸細辛通草耳。明者自知之。

按昔人云人有陰血屬於陽分不能勝辛熱者更宜此湯主之。殊不^可此^也。惟有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證則是陰血大虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛爲

大雨流芳

少陰中表藥。隨^枝湯以解肌。加當歸以和榮血。至於通草甘淡微寒。能^通丙^丁。能通水道。爲虛寒者禁用。此湯治法本是和榮血以緩脉。使陽邪得從肌表而散。或從膀胱而泄也。若循其名以治陰虧寒中之

四逆則謬甚矣。觀於傷寒論曰：若其人素有久寒者，宜當歸四逆湯，加茱萸生薑主之。正如四逆散本以散傳經之熱邪，腹中痛者方加附子，則當歸四逆湯非治陰寒四逆藥也。明矣。更有一等固守王道之醫，辯證不明，遇有厥逆，大雨流芳脈細之證，不敢用四逆湯，但日用當歸四逆湯，極爲穩當。不知此湯乃桂枝湯加當歸，細辛，通草耳。細辛隨桂枝湯止能解表，通草又爲疏通，最有力之藥。當歸一味果足以治陰寒四逆耶？藥不對證，果可謂之穩當耶？甚矣其不明於製方。

之理而以舛錯誤病也。予前所云用方貴明其所以然者正謂此也。

乾薑附子湯。少陰誤下復發汗。晝日煩燥夜而安

靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。此方

主之。又陰盛格陽。目赤面赤。煩渴引飲。脈來七

入。至按之則散。為無根之脈。以此方加人參主

之。

乾薑 二錢 附子 三錢

水煎溫服。或云冷服。

此即四逆減去甘草為回陽重劑。若加增藥

味反牽制其雄早之力。必致迂緩無功矣。乾薑者以潤燥散煩。和表裏之誤傷。附子熱以溫中固表。調陰陽於既濟。陽回即可用平補之藥。益陽既安。堵即宜休養其陰。切勿通用用辛熱轉生他患也。審之慎之。

桂枝新加湯。汗後身痛。脉沉遲者。此方主之。以桂

枝湯解汗後之風邪。加參芍益不足之血脉。亦

兩解表裏安內攘外之一法。曰新加者。因發汗

新虛明非桂枝湯中之舊法也。

桂枝三錢 白芍四錢 甘草二錢 人參一錢 生薑三錢 大棗二枚

水煎温服

黃連阿膠湯

少陰病二三日以上。心中煩不得卧。

此方主之。

少陰本欲寐。今反煩不得寐者。以風邪客於裏。裏熱甚而不和也。此扶陰

散熱之良方也。

黃連。散熱之良方也。並邪火內攻迫血下行者。

用以治痢。亦取扶陰。

散熱之義。

黃連

清膈消

厚腸

膠。祛風養腎。

黃芩

疏風泄熱。

白芍

利脾制水。

各二錢

生雞子黃

逐風鎮

水煎成去渣入阿膠烱

盡少冷入雞子黃攪勻服。

桂枝

同陽定驚

去白芍

恐其損陽

加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。

太陽傷寒脉浮。此風寒也。醫以火迫劫之亡陽。此

汗不驚狂。神乃陽之靈。起卧不安者。煩燥不寧。

止也。驚狂。陽衰則亂。此皆停飲。上逆凌心也。飲去則心神定矣。此方主之。

桂枝三錢蜀漆三錢龍骨四錢牡蠣粉五錢甘草炙二錢生

薑三錢大棗二枚水煎天雨流芳蜀漆三沸。取其次入羣藥煎

服。去蜀漆名桂枝甘草龍骨牡蠣湯。治火逆

下之復煩燥者。

按桂枝解風邪以固表養心甘草和中氣以益陽瀉

火牡蠣鹹走腎而寧心龍骨瀝收神而安心生薑利

氣和胃。大棗通經健脾。蜀漆辛以逐停飲。飲去則心
安。故驚狂不安者。乃水凌心。火也。此仲景不傳之秘
也。

竹葉石膏湯

陽明汗多而渴。衄血。渴欲飲水。水入

即吐。及傷寒瘥後。虛羸少氣。氣逆欲吐。並此方

主之。

竹葉 二錢 石膏 四錢 麥冬 二錢 半夏 二錢 人參 一錢 甘草 炙

生薑 二錢 粳米 二錢 水煎溫服。本方去石膏半

夏薑米。加柴胡黃芩。名人參竹葉湯。治汗下後

煩熱口渴。虛羸少氣之證。

竹葉石膏之辛寒。以止喘促。散餘熱。參草粳麥之甘平。以益肺胃。生津液。生薑半夏之辛溫。以豁痰飲。去

嘔逆。此虛羸執湯之良方也。

加味溫膽湯。治汗下後不解。嘔而痞悶。或虛煩不

眠。肉瞤筋惕者。

人參 甘草 炙 茯苓 遠志 去 酸棗仁 炒 熟地

枳實 炒 陳皮 半夏 薑汁 炒 五味子 生薑 錢

水煎溫服。

疏表湯。一治四時感冒風寒。鼻塞聲重。或涕不已。

發熱惡寒。頭痛身痛者。

淡豆豉錢三羌活錢三防風錢三桔梗各錢半前胡各錢半黃芩各錢半

蘇葉各錢一細辛各錢八分甘草各錢五分生薑各錢一

葱白二莖水煎溫服。微汗。口渴。加花粉。麥冬。各錢一

滿悶加枳殼錢半熱甚加知母錢一

桂枝附子湯。傷寒亡入口。即傳裏之時也。風濕相搏。搏聚

痺也。身體煩痛。風勝則煩。不能自轉側。濕主不嘔。

邪在不渴。裏無脈浮虛而瀉。浮虛為風。瀉為濕也。此方主

之。浮虛而瀦。知風濕但在經也。與桂枝以解表風。加附子以散寒濕。若其人大

便難小便自利者。去桂枝加白朮湯主之。去桂

惡其走表而不和裏。加芍藥其益土而燥濕也。

桂枝

錢三

附子

錢二

甘草

錢半

生薑

錢三

大棗

枚二

水煎溫服。

去桂枝加白朮

錢三

人參固本湯。

治溫病虛極熱極。循衣撮空。不下必

死者。下後神思稍甦。續得肢體振寒。怔忡驚悸。

如人將捕之狀。四肢厥逆。眩暈鬱冒。項背強直。

此大虛之兆。將危之候也。此方救之。

人參二錢 熟地三錢 生地二錢 當歸二錢 白芍一錢五分 天冬去

麥冬去心 五味 陳皮 知母 甘草各一錢

水煎。溫冷服之。服後虛回。止後服。蓋溫病乃火

邪燥證。人參固為補元氣之神丹。但恐偏於益。

陽恣意投之。有助火固邪之弊。不可不知也。

按溫病乃天地雜氣之一也。有邪不除。淹纏日久。必

至虛羸。庸工望之。不問虛實。久暫可。輒用人參。殊

不知無邪不病。邪去而正氣自通。何慮虛之不復也。

今妄投補劑。邪氣益固。正氣益鬱。轉鬱轉熱。轉熱轉

瘦轉瘦轉補轉補鬱循環不已。乃至骨立而斃。猶
言服參幾許。補之不及。奈何。余於乾隆甲戌乙亥丙
子二年中。眼見親友患溫病。服參受害者。不可枚舉。
病家止誤一人。家終身不悟。不知殺人無算。特書
之以為濫用人參之戒。非禁之使不用也。果如前證
虛危之極。非人參烏能回元氣於無何有之鄉哉。

當歸六黃湯。治陰虛盜汗。又方用蓮子七枚黑棗七枚

浮麥七錢馬料豆七錢水煎治同。

當歸二錢熟地二錢生地二錢黃連一錢黃芩一錢黃柏一錢

黃耆生二防風錢一麻黃根錢一浮麥錢一水煎溫服

黃耆湯。治陽虛自汗。

黃耆錢一五味子錢一當歸錢一白朮土炒甘草各一

水煎溫服。汗多不止。加麻黃根錢一防風錢一或

加麻黃根錢一牡蠣天南流芳粉錢一浮麥錢一

經疏曰。凡服固表藥而汗不止者。當用酸棗仁炒黑三錢

白芍、生地、麥冬、五味子元肉各二錢。竹葉二十片煎服多

効。以汗為心液故也。

柴胡桂枝乾薑湯。傷寒五六日。已發汗而復下之。

胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。三陽

脈起於頭，陽邪甚於上，往來寒熱，心煩者，表未

陰精衰於下，故汗出也。

解也。此方主之。

柴胡

四錢

花柳

黃芩

桂枝

牡蠣粉

各一錢

乾薑

甘草

炙各一錢

水煎

初服

微煩後服汗出愈

按柴胡除少陽之寒熱。桂枝解太陽之餘邪。花粉徹

陽明之胃熱。乾薑去胸脇之煩滿。甘草調汗下之誤

傷此少陽。陽明兩解之治法也。

厚樸生薑半夏甘草人參湯。陽明病中寒不能食。

小便不利手足澹然汗出者此欲作痼瘕大便

必初硬後溏此胃中虛冷水穀不別故也痼瘕

者寒氣結而為積也此方主之並治汗解後腹

脹滿此蓋脾胃為津液之主汗多則津

液不足氣虛不能敷布諸氣壅滯停飲而為脹

滿與此湯和脾胃而降氣也大便初硬後瘕

因成痼瘕泄痼泄即溏泄久而不止則曰痼瘕也亦通

厚樸薑炒生薑薑汁炒半夏薑汁炒甘草二錢人參一錢

水煎溫服

脹非苦不泄。氣非溫不行。飲非辛不散。胃非甘不和。虛非補不復。五味之功用大矣。
大陷胸湯。

大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分水煎大黃五六沸去

渣。再入芒硝煎天雨流芳二沸調甘遂末服。

加葶藶子杏仁去皮炒黑與大黃芒硝四味等分爲

未鍊蜜丸如彈子大取一丸入甘遂末三五分

蜜三匙水煎並渣服之。此名

大陷胸丸。結胸者項亦強。如柔痙狀。下之則和。

矣。此方主之。

小半夏加茯苓湯。

心下滿。頭汗出。水結胸。或心悸。

目眩。此方主之。

去茯苓。即小半夏生薑湯。

半夏

薑炒五錢

生薑五錢

水煎溫服。健脾滲濕。火因水下。

則痞渴消。而悸眩止。

小陷胸湯。

小陷胸病正在心下。按之則痛。脉浮滑。

者。此方主之。

邪氣深入。尚在半表。半裏。為熱。為痰。為飲。病有淺深。方有大小。除熱。

下痰。

黃連

薑汁微炒一錢五分

半夏

薑炒三錢

枳實

搗爛一個

水煎溫服。

黃連苦以瀉熱。用代大黃。半夏辛以逐痰。用代甘遂。
栝蒌潤以行滯。用代芒硝。小比大陷胸湯之峻厲也。
枳實理中丸。

枳實

炒麩

栝蒌

牡蠣

粉

白朮

土炒

甘草

各一兩

乾薑

炒八錢

人參

黃連

天雨流方

黃芩

各三錢

為末煉蜜丸如

雞子黃大以熱湯化服一丸。覺腹中熱則胸中

豁然矣。末熱則再服。

海蛤散。治血結胸。揉而痛不可撫近者。

海蛤粉

滑石

甘草

各等分

芒硝

減半元明粉更妙

爲末用蜜水八雞子清調服一錢。

桔梗枳殼湯。治痞氣胸膈不痛。噯氣吐酸。或欬者。

桔梗

枳殼

麩各二錢

水煎溫服。

此二味苦下氣而散痞滿寒消熱而除咳飲也。

大黃黃連瀉心湯

天雨流芳

下痞。按之濡。按之不其脉關

上浮者。

關浮虛熱

此方主之。

大黃

二錢

黃連

一錢

黃芩

一錢

搗碎麻沸湯漬之。去渣

服。

活人書曰。湯液論有黃芩。今無者。恐傳寫之訛也。

李時珍曰仲景治心下痞。按之濡者。用大黃黃連瀉心湯。此亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。病發於陰而下之太早。則作痞滿。乃寒傷榮血。邪氣乘虛結於上焦。胃之上院。在於下。故曰瀉心。

附子瀉心湯。心下痞而復惡寒汗出者。此方主之。

附子 炮大黃 二錢
黃連 黃芩 各一錢

附子一味另煎取汁。大黃芩連三味以麻沸湯

漬之。去渣入附子汁溫服。

心下痞。故用三黃以瀉痞。惡寒汗出。故用附子以回

陽無三黃則不能瀉痞熱。無附子恐三黃益損其陽氣。熱有三黃。寒有附子。寒熱互用。斯為有制之兵矣。仲景誠醫家之善將者也。俗醫用寒則不敢用熱。用熱則不敢用寒。何異於膠柱鼓瑟乎。

續論曰。瀉心湯諸方皆治汗下後表解裏未和之證。

其半夏。生薑。甘草。瀉心湯是治痰飲濕熱結聚之

痞。方中用半夏。生薑。以滌痰飲。黃連。黃芩。以除濕熱。

人參。甘草。以助胃氣。乾薑。炮黑。以滲水濕。若但用苦

寒。治熱。則格拒不入。必得辛熱為之嚮導。是以半夏

乾薑在所必需。如痞極硬滿。暫去人參。氣壅上升。勿

用生薑。此一方出入。而有^{用也}。其大黃黃連與附。

子二瀉心湯。乃治陰陽偏勝之痞。一以大黃芩連滌

胸中。素有之濕^瀉。一加附子。兼溫經中。驟脫之虛寒。

也。三黃用沸湯漬服者。取寒藥之性。不經火而力峻

也。附子煮汁者。取性熱行經。以復其陽耳。仲景寒熱


並用。補瀉兼施。立方^{之妙無}出乎此。以三黃滌胸中。

之邪熱。以附子散凝結之陰寒。一舉而寒熱交聚之。

邪盡解。詎知後人目覩其方。而心眩也。

按半夏生薑甘草三瀉心湯。人尤易曉。其大黃黃連
與附子二瀉心湯。具有妙用。不可不透悟也。夫大黃
黃連瀉心湯。孰不以爲治心下之痞熱也。竊詳傷寒
論曰。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心
湯主之。成氏註曰。心下痞。按之痛。關脈沉者。實熱也。
按之濡。關脈浮者。虛熱也。故大黃芩連不用煎煮。而
但以麻沸湯漬服者。取其味薄而瀉心下之虛熱。不
欲其味厚而傷中氣也。附子瀉心湯。人亦知爲寒熱
之互用也。竊詳傷寒論曰。心下痞。復惡寒。汗出者。附

天雨流芳



子瀉心湯主之。成氏註曰：心下痞者，虛熱內伏也。惡寒汗出者，陽氣外虛也。與大黃黃連瀉心湯以導痞，痞熱加附子以回陽氣。夫痞熱固須導除，而陽虛更爲可慮。附子者，煮汁回陽之重劑也。三黃沸瀆者，導熱之輕劑也。續論謂取寒藥之性，不經火而力峻，豈其然乎？今人以大黃熟煎則無力，實續論之說誤之也。內經曰：味屬陰，味厚屬陰。由之陰熱煎，味厚安得無力？須辨之。

半夏瀉心湯。柴胡證具而誤下之，但心下滿而不

痛此為痞。此方主之。

半夏薑製四錢 人參錢一 乾薑炮 甘草炙 黃芩各二錢 黃連

錢一 大棗二枚 水煎溫服 少陽誤下變證有三等

治法。嘔而熱柴胡證猶在者。復與小柴胡湯。

必蒸蒸振汗而解。若心下滿而硬痛。此為結胸。

柴胡陷胸湯。大陷胸湯。量輕重用之。但滿而不

痛。此為痞。宜此湯。

否而不泰為痞。瀉心者必以苦。故用黃連黃芩散痞。

者必以辛。故用半夏乾薑。交陰陽通上下者必和其

中故用人參甘草大棗也。諸瀉心湯寒熱並用妙不可傳。

生薑瀉心湯。傷寒汗解之後。火邪胃中不和。正氣未復。

心下痞硬。虛不運乾噎。為水所食。臭。脾虛不

脇下有水氣。飲致痞乾噎。渴則噎。食臭。運則臭。

濡。此方主治。瀉。此方主治。

生薑 半夏 三薑製各黃芩 甘草 炙各二錢 乾薑 炮

人參 黃連 各錢一 大棗 二枚 水煎溫服。

甘草瀉心湯。傷寒中風反誤下之。下利日數十行。

穀不化。腹中雷鳴。心下痞硬。而滿。嘔煩不安。醫見心下痞硬。復誤下之。其證益甚。此非結熱。但以胃中虛客氣上逆。故使滿硬。此方主之。

甘草 炙半斤 錢製各 乾薑 炮 錢各二 黃連 錢一

大棗 二枚 水煎溫服

桂枝人參湯 即桂枝湯也 太陽病表未除而下之早。

熱邪乘虛入裏 表裏 利不止。心下痞硬。表裏

不解者。此方主之。

桂枝 炙 各 乾薑 二 白朮 二 土炒 人參 一
錢 錢 錢 錢 錢 錢

水煎温服。

此湯以表未除。故用桂枝以解之。以裏證虛。故以理中。以和之。蓋取兩解表裏之義也。

旋覆花代赭石湯

傷寒汗吐下解後。胃氣弱也。心下痞

硬。停膈噫氣未除者。

天雨流芳也。氣逆也。

此方主之。

噫音 周

揚俊用治噎膈反胃氣逆不降者累效。

旋覆花

三錢

代赭石

半斤

薑製六錢

人參

一錢

甘草

炙二錢

棗

三枚

水五盅煎取二盅。去渣再煎取一

服。濃煎則不助飲。

旋覆之鹹以軟堅。赭石之重以振逆。薑夏之辛以散
痞。參草大棗之甘以補脾。此輔正匡邪。蠲飲下氣之
良方也。

桂枝加芍藥湯。本太陽病反下之。因腹滿時痛者。

此方主之。

桂枝 錢三
芍藥 錢三
甘草 錢二
生薑 錢三
大棗 錢二

水煎溫服。如大黃湯治

前證大實痛者。

黃連湯。胸中有熱欲嘔吐。胃中有寒腹疼痛。此方

天雨流芳

主之

黃連

三錢

半夏

四錢

桂枝

乾薑

炒

甘草

炙各二錢

人參

一錢

大棗

二枚

水煎溫服或冷服

日三夜二

治開格氣不能

上下者與

附

八味丸

相問服之

即腎氣丸

此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪熱使

陰陽不交陰不得升而獨滯於下為下寒腹脹痛陽

不得降而獨鬱於上為上熱欲嘔吐故用黃連之苦

以瀉上熱而降陽薑桂半夏之辛以散中寒而升陰

參草大棗之甘以緩中急而益胃寒熱並用猶奇正

之相倚耳。此分理陰陽。和解上下之正治也。或丹田有熱。胸中有寒者。仲景亦用此湯治之。藏結之證。更宜以此湯調其陰陽。

柴胡桂枝湯。圖寒六七日。發熱微惡寒。支節煩痛。

微嘔。心下支結。此外證未除。不可攻裏。以此方

和解之。圖並發汗後。亡陽譫語。以此方和其榮。

衛以通津液。後自愈。

柴胡四錢桂枝

黃芩

白芍

半夏

薑製

甘草

炙各二錢

人參一錢生薑二錢

大棗二枚

水煎溫服。

此太陽少陰各病治方也。

樂胡養榮湯 治温病陰枯血燥邪熱不退。

柴胡 三錢 黃芩 二錢 陳皮 一錢 甘草 一錢 當歸 二錢 白芍 一錢五分

生地 三錢 知母 二錢 花粉 二錢 蟬蛻 全十個 白殭蠶 酒炒 三錢 大

棗 二枚 水煎服。去當歸白芍生地名柴胡清。

燥湯數下後餘熱未盡邪與衛搏故熱不能頓

除宜此湯和解之。

五福飲 凡五藏氣血虧損者此方能兼治之足稱

王道之最。

人參 補心隨 熟地 補腎三錢 當歸 補肝二錢 白朮 宜用。

補肺 法炒二錢 浸甘草 補脾蜜 炙一錢

水煎溫服。或加生薑。

凡治氣血兩虛等證。以此為主。或宜散者。加升

柴荆防。宜溫者。加薑桂。附子宜清者。加梔子青

蒿地骨。皮之類。左右逢原。無不可也。

七福飲。即五福飲。加酸棗仁。炒研。遠志。甘草湯浸去

治氣血兩虛。而心脾為甚者。

四君子湯。一方去人參。加蜜炙。黃耆亦名。黃耆湯。

白朮二錢。炒。白茯苓二錢。人參。甘草。炙各一錢。水煎溫

服。加半夏一錢。薑炒。陳皮一錢。木香三分。砂仁一錢。名

香砂六君子湯。補脾養胃之要藥也。

四物湯。

當歸

酒蒸熟地

三錢白芍

酒炒一錢五分

川芎

一錢

水煎溫

服合四君湯。

名八珍湯。再加黃耆肉桂。名十

全大補湯。補氣養血之要藥也。

二陳湯。

半夏

薑汁製二錢

陳皮

一錢白茯苓

半一錢

甘草

一錢

生薑

水煎溫服。

順氣化痰之總方也。

犀角大青湯。

治斑出心煩大熱錯語呻吟不眠。或

咽喉不利者。

犀角鎊

二錢為末或磨汁對湯服

大青

或以青黛代之

元參

各三錢

升麻

黃連

黃芩

葛根

梔子

各錢

甘草

五分

水煎

去渣入犀角汁童便冷服

一方加白殭蠶酒炒

三錢蟬蛻

全十個更妙

天雨流芳大便秘加大黃

大建中湯

中氣不足手足厥冷小腹攣急或腹滿

不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤

四肢酸痛嘔吐下利及無根失守之火出於眦

表而為斑點並此方治之

人參 甘草炙各五分 黃耆炙 當歸 白芍酒炒 桂心 各

錢 附子炮 半夏薑汁製 各一錢 二錢 五釐 水煎溫服

按此乃汗吐下後中氣虛乏則餘邪無所歸附隱隱

見於肌表其色淡紅而不甚顯為辯也參耆所以補

中夏草所以調中此皆脾胃藥也復有歸芍之和血

則外溢之斑流而不滯又有桂附之溫中則失守之

火引而歸元此中營之幟一端而失位之師各就其

列也是方也以參耆桂附而治斑猶兵法之變者也

語云治病如殺賊孫臏滅竈滅龐涓虞詡增竈平朝

歌臨幾應敵豈有一定之法哉。

麻黃芍藥人參湯。李東垣曰子治一寒土病脾胃

弱與補劑愈繼居曠室卧熱炕咳而吐血子

謂此久虛弱外有寒形內有火熱上氣不足陽

氣外虛當補表之天雨流芳陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠

室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱

火邪不得舒伸血出於口因思符景治傷寒

脉浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血

却與麻黃湯立愈與此甚同因處此方

本方去麻黃桂枝名麥冬飲子。

麻黃去外寒白芍安大陰甘草炙補三焦元氣而去外寒黃耆生各一錢

實表益衛桂枝補表當歸和血養血人參益元氣麥冬

蒸去心各三五分保肺清心五勞勞子十五粒蜜蒸撻碎核

水二盅半。先煎麻黃去沫八羣藥同煎一盅去

渣乘熱臨卧一服愈觀此方足為萬世模範也。

蓋取仲景麻黃湯與補劑麥冬飲子各半服之。

但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也。

四逆散 少陰病四逆陽邪傳入少陰或咳少陰脈絡肺或

悸少陰脈絡心或小便不利。少陰脈絡膀胱或腹中痛。少陰脈八

小或瀉利下重者。此方加減主之。

柴胡 白芍 枳實炙 甘草炙 為末白飲調

下三錢。日三服咳者加五味子乾薑並主下利與肺

大腸相表裏上咳天雨流芳悸者加桂枝小便不利者加

白茯苓腹中痛者加熟附子泄利下重者先以

水煎薤白取汁二鍾入此散一兩煎服。

此陽邪傳至少陰裏有結熱則陽氣不能交接於四肢故逆而不溫柴胡所以升內陷之陽邪。枳實所以

彼內滯之結熱。白芍收失位之陰。甘草和不調之氣。是證也。雖曰陽邪在裏。慎不可下。蓋傷寒以陽為主。四逆有陰進之象。若復用苦寒之藥下之。則陽亦虧矣。是在所忌。傷寒論曰。諸四逆不可下。此之謂也。然此原為冬月正傷寒言之。若溫病四逆。不在此例。按此散本為邪熱自陽經傳入陰經而發厥。傷寒論曰。腹中痛者加附子。瀉滌中又加溫補。人未有不致疑者。竊詳四逆散腹痛加附子。與附子瀉心湯義同。蓋傷寒以陽為主。熱證固當用瀉滌之法。而熱證但

兼虛寒。又不可不急作救療。如附子瀉心湯。心下痛滿。白宜。大黃黃連瀉。心湯以導除其熱。若惡寒汗出。則加附子以回陽。又^何可緩也。故四逆散。邪熱傳至陰經而四逆。自^胡枳實以清解其熱。若兼虛寒。遇邪而腹痛。則加附子^之溫經益陽。又^何可緩也。寒熱各行其性。此^傳景製方之妙。况傷寒始病熱中。未傳寒中者。極多。四逆^雖屬陽證。已有陰進之象。兼以腹痛。則其加附子也。不亦宜乎。若溫病陽邪亢閉。隔陰於外。以致四逆非急下之。不為功。若執治傷寒之

天雨流芳

長...

三

法則誤人矣。

桂苓甘木湯。

傷寒若吐若下後。心下逆滿。氣上衝

胸。起則頭眩。脉沉緊。發汗則動經。身爲振振搖

者。此飲中醫經外邪之證也。此方主之。

白茯苓四錢 桂枝三錢 白朮天雨流芳 甘草炙 各二錢 水煎溫服。

按人身經脉。賴津液以滋養。吐下津液一傷。更汗津

液再傷。坐令經脉失養。身爲振搖。此湯滌飲散邪。補

中益氣。則津液四布。而經脉得以滋榮矣。至久而成

寒。較此更甚。仲景於此湯。豈非早已用力乎。

甘草桔梗湯。主治少陰病。二三日咽痛。此陰陽通

用之藥也。若風痰挾邪。上壅咽痛。半夏散及湯。

若咽中傷生瘡。不能言聲不出者。苦酒湯。若下

利咽痛。胸膈心煩者。猪膚湯。三湯補後

甘草三錢桔梗三錢水煎溫服。

此二味。一借土氣以還水。一借金母以瀉水。而

少陰之邪自散矣。

黃芩加半夏生薑湯。太陽少陰合病。下利而嘔。及

膽府發咳。嘔苦水。如膽汁。胃氣逆則嘔苦。膽液溢則口苦。此方

寒溫條辨卷五

主之。

黃芩三錢 白芍

半夏

甘草炙各二錢 生薑二錢 大棗二枚

水煎溫服。

乾薑黃連黃芩

參湯

傷寒論曰傷寒本自寒格下

醫復吐下之。寒格天雨流芳更逆。吐下若食入即吐。此方

主之。

乾薑 人參

黃連 黃芩

原文各三兩

水六升煎三升去渣分溫連服。

按傷寒論並無寒下之病。亦並無寒下之文。玩下文

寒。格更逆吐。下。句。可知上。文本。自寒下。句之下。字。當
是格字。文義始屬。註家皆釋胃寒下利。不但文義不
屬。亦與苓連之藥不合。當改之。成氏曰仲景之意。以

本自寒下。醫復吐下之。治之為逆。故用乾薑以溫裏。

人參以補正氣。苓連反佐以通寒格。與四逆湯。白通

湯。加人尿猪膽。義同。原文四味各三兩。恐傳寫之

訛也。此成氏之遵經註解也。姑存以俟高明。

麻黃杏。仁甘草石膏湯。太陽病汗後喘。表邪未解

也。此方主之。

麻黃四錢杏仁去皮甘草炙各二錢石膏八錢

水煎麻黃去沫次入羣藥煎服。

按太陽寒邪。雖從汗解。然肺邪未盡。所以喘仍不止。

故用麻黃發時。杏仁在下肺氣。甘草緩肺急。石膏清

肺熱。即以治足太陽之藥。通治手太陰也。倘誤行桂

枝湯。以致壅塞肺氣。而吐癰膿。則桔梗杏仁煎可用。

也。太陽傷寒誤下。作喘亦用此方。

葛根黃連黃芩湯。太陽病誤下。利遂不止。脈促者。

表未解也。脈數而止。日促。用葛根者。專主陽明之表。喘而汗出者。此

方主之。

葛根

錢四黃連

錢三黃芩

甘草

炙各二錢

水煎温服。

喘而汗出者。因喘而汗出也。即裏熱氣逆所致。與此

湯以葛根散表。以本連清裏熱。則喘息汗停而利

亦止矣。

五味子湯。治喘而脉伏。及寒熱而厥昏瞶無脉者。

五味子

十五粒

棗

去心

陳皮

各二人參

杏仁

去皮

尖各一錢

生薑

錢三大棗

劈二枚

水煎温服。

蘇陳九寶湯。治暴感風寒。脉浮無汗而喘。並老幼

素有喘急。遇寒暄不節。發則連綿不已。咳嗽哮

吼。夜不能卧者。

桑白皮蜜炙 大腹皮淨製 陳皮 蘇葉 薄荷 麻黃

杏仁泡去尖 桂枝去粗皮 甘草生 烏梅一錢 生薑二錢


水煎温服。

十棗湯。太陽中風。有頭痛發下利。大便小便。嘔逆。

水飲停蓄於內。表解者不可攻之。先用桂枝解其入漿。

漿汗出。邪從汗出。發熱有時。此邪熱。頭痛。胃氣。

和者。一。心下痞硬滿。引脇下痛。留飲在膈。溢於。



天雨流芳

者。乾嘔短氣。伏飲上逆射於肺汗出不惡寒者。

二表解。此表解裏未和也。此方主之。此表邪已散而種種裏證

未平。彰明較著。如此然後用此湯以逐飲攻水也。

按雖有發熱頭暈。心下痞硬滿。引脇痛。乾嘔短氣。諸

證。乃內邪所結之本證。裏未和也。不得以表證名之。

傷寒中亦有有表證無表邪者。何況溫病。

甘遂麵包煨 紫大戟出洪山者 芫花醋炒 三味等分

為末聽用。大棗十枚 水二盞煎取湯一盞調

上三味藥。未強人一錢。弱人五分。溫服。如未下。

明日加五分再調服利後糜粥自養。

按下利嘔逆句之下字當是下字。豈有上

嘔下利而用十棗湯峻劑攻之之理乎。惟大便不利。

痞硬滿痛。始屬飲病。小便不利嘔逆短氣始屬飲病。

乃可峻攻。發作有時句之作字。當是熱字。始與太陽

陽邪。熱飲相合者無熱汗出。乃少陰陰邪寒飲。真武

湯證也。皆當改之。此湯與大陷胸湯相倣。傷寒種種

下法。咸為胃實而設。今證在胸脇而不在胃。則蕩滌

腸胃之藥。無所取矣。故用芫花之辛以逐飲。甘遂大

戟之苦以泄水。並賴大棗之甘以運脾而助諸藥。祛
水飲於膈脇之間。乃下劑中之變法也。愚按開後人
濕熱生痰無
窮之法門。
此方是也。

去芫花。加白芥子。等分爲末。薑汁煮棗肉爲丸。

名控涎丹。

李時珍曰。涎涎爲物。隨氣升降。無處不到。入心

則迷成癲癘。入肺則寒竅爲咳喘。背冷。入肝則

脇痛乾嘔。寒熱往來。入經絡則麻痺疼痛。入筋

骨則牽引隱痛。入皮肉則癩癧腫。陳無擇並

以控涎丹主之。殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本。水也。濕也。得火與氣。則結為痰。甘遂能泄經絡水濕。大戟能泄藏府水濕。白芥子能散皮裏膜外痰飲。天兩流芳薑大棗利氣通經。健運脾上以固本。惟善用者。乃能收奇功也。

茯苓甘草湯。

水氣乘心振寒厥而心下悸者。

火畏水故

心下動也

先治其水。却治其厥。及太陽傷寒。表虛汗

出而不渴者。並此方主之。此乃利水解表而兼和中之藥也。如太陽傷寒。汗出而渴者。又宜五

苓散。

白茯苓

三錢

桂枝

三錢

甘草

炙錢

生薑

三錢

水煎溫服。

橘皮竹茹湯。

治傷寒胃虛有熱呃逆。

或因吐利之故。

煎治。

久病虛熱。

吐利後。

胃虛嘔呃不止。

橘皮

二錢

竹茹

二錢

人參

炙各

甘草

一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎溫服。

方有半夏。

夏赤茯苓麥冬枇杷葉。

胃火上衝肝膽之火助之。

肺金之氣不得下降故呃

逆嘔噦竹茹麥冬枇杷葉皆能清金和胃肺金清則

肝木亦平矣二陳降痰逆赤苓降心火生薑嘔家聖

藥。久病虛羸。故以參草大棗扶其胃氣。而諸證自退也。一方用硫黃乳香等分酒煎嗅之。不論虛實寒熱皆效。

汪詛菴曰。此證有因胃熱失下者。有因火鬱者。有因

血瘀者。有因氣滯者。天雨流芳有因痰阻者。皆屬實。有因下後

胃虛者。有因中氣不足者。有因下元虛損。陰火上衝

者。皆屬虛。寒熱虛實。要在臨證活法耳。不可造次。

呢在中焦。穀氣不通。其聲短小。得食則發。呢在下焦。

真氣不足。其聲長大。不食亦然。此為辯也。

橘皮乾薑湯。治胃寒呃逆。脉微細者。

橘皮 乾薑

肉桂

去粗

通草

甘草

炙各一錢 人參 七分

水煎温服。

丁香柿蒂散。治久病呃逆。因下寒者。

古方以此湯治呃逆。雖病

本於寒然亦有火也。

丁香

柿蒂

錢二

人參

錢一

生薑

錢三

水煎温服。

一方去人參。加竹茹。橘紅。

一方去人參。合二

陳湯。加良薑。俱治同。

此足陽明少陰藥也。丁香泄肺温胃而暖腎。生薑去

痰開鬱而散寒。柿蒂苦瀋降氣。人多補助真元。使得展布也。

滌痰湯。治膈間痰閉呃逆者。

栝蒌搗爛五錢 膽星 半夏各二錢 橘紅一錢 茯苓 枳

實麩炒黃芩 黃連 石膏天雨流芳 竹茹各一錢 甘草炙 五

分 生薑三錢 水煎溫服如痰閉呃甚者用白礬一兩

水二盅煎一盅 蜜三匙 少煎溫服即吐如不

吐飲熱水一小盞未有不吐者吐後呃即止。

理中安虢散。治胃寒虢厥。

人參錢一白朮炒茯苓 乾薑炒各一川椒粒十四烏

梅三枚搥碎 水煎溫服

烏梅丸 虻厥者當吐虻今病者靜而復時煩非此為

藏寒時靜時煩非此 藏寒時靜時煩非此 暫時安虻上入膈故煩須臾即止

得食而嘔又煩者天雨流 當自吐虻此方主之

按此為藏厥句之此字應是非字若此 字便是藏厥與辯虻厥之義不屬當故之

烏梅三十枚黃連六兩乾薑一兩附子炮桂枝 細辛

黃柏鹽水人參各六錢當歸 川椒炒去汗各四錢為末

醋浸烏梅去核飯上熏熟合藥末加鍊蜜杵丸

每服二錢白飲送下

程郊倩曰名曰安就實是安胃故仲景云並主久痢。

痢本濕熱得苦則堅得酸則斂故亦通治若陽厥吐

蚘入口即斃又論溫病乎

麻黃升麻湯傷寒六七日大下後邪傳厥手足厥

逆陽氣寸脈沉遲遲為尺脈不至尺伏誤咽喉

不利吐膿血肝脈循喉○又注肺金泄利不止

者為難治陰氣欲脫而此方主之散表寒清

解之變方也

麻黃去節三錢 升麻一錢五分 當歸一錢五分 石膏二錢 知母一錢 黃

芩一錢 菱一錢 蕤一錢 白朮五分 茯苓五分 白芍五分 天冬五分 桂枝

乾薑五分 甘草五分

水煎麻黃湯去土沫再入羣藥煎服連進二三

劑覆取汗出則邪氣散而咽清利止矣

赤石脂禹餘糧湯論曰自利不止下脫此利在下

焦此方主之

赤石脂 禹餘糧各一兩 水煎溫服如服後利仍

不止當利其小便與猪苓湯是乃膀胱不滲一

利小水而利自止矣

傷寒論曰。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。以理中湯與之。利益甚。蓋理中者。理中焦也。赤石脂禹餘糧湯。主之。長沙製方。審於上下。如此。取效。自易易耳。薛氏曰。天雨流芳。人以命門火衰而下利。令服桂附五味吳茱萸肉蔻故紙之類。不信。服補中益氣湯而斃。此正利在下焦。補中焦而致敗也。噫。後人之千方萬論。孰有不出長沙者哉。

桂枝去芍藥加茯苓白朮湯

太陽風寒服桂枝湯

治

風而寒。而或下之。表未除而。仍頭項強痛。表邪未去。固在。誤攻裏。而。

翕翕發熱。風寒勝。無汗。寒勝。心下滿微痛。邪以。則熱。則乾。則寒。則虛。

入裏挾涎。小便不利。有。水不行。此方主之。按去桂。飲作滿痛。小便利者。下行。應是去。

芍藥若去。桂加苓朮。並無辛甘走榮衛之藥。何以。治仍頭項強發熱心下。滿痛之表證。乎當改之。

桂枝 白茯苓

白朮

錢少各

甘草

錢炙二

生薑

錢三

大棗 白芍

枚二

長流水煎連服。裏氣實。小水利。外邪解矣。

玉泉散

治陽明內熱煩渴。頭痛牙痛。二便閉結。斑

疹發黃。熱痰喘嗽等證。

生石膏六兩 粉甘草一兩 為末新汲水或熱湯或人。

參湯調下三錢加朱砂三錢亦妙。

六一散 治溫病及中暑身熱煩渴小便不利者

桂府滑石研碎 粉甘草為末 合研勻每服。

三錢新汲水或冷飲調下三錢加朱砂三錢取其

清心加青黛三錢取其涼肝加薄荷三錢取其

散肺也

直格曰此散是寒涼解散鬱熱設病不解多服無損。

但有益耳又曰傷寒當汗則不可下當下則不可汗

且如誤服此散則汗自不出而裏熱亦自有効亦有
裏熱便得宣通而愈者或邪在半表半裏可和解而
不可汗下者若服此散多愈即不愈亦減 按河間
云六一散有益無損大抵是溫病耳其鬱熱自內而
達於外故宜寒涼蕩滌其熱至於正傷寒還須參之
脉證不可輕投

桂枝甘草湯

太陽病發汗過多

汗為心液又手自

胃心

動惕不寧心下悸欲得按者

心虛故此方

主之並治太陽病小便自利飲水多必心下悸

如小便少者必苦裏急裏急者膀胱不行水故。

也宜五苓散。

桂枝 錢三 甘草 炙一分 錢一 甘爛水 煎溫服

桂枝加附桂湯 太陽傷寒寸口脈浮而大。右手關

為寸只主候。浮則為風大為陰虛風則生微熱

五藏之氣。虛則兩脛攣其證自汗出小便數心煩微惡寒

脚攣急此方主之。

桂枝 錢三 白芍 錢三 甘草 炙二 附子 生 肉桂 去粗各生

薑 錢三 大棗 枚二 水煎溫服覆取微汗。

喻嘉言曰。仲景之圓機活法。卽陽旦。陰旦。二湯。已妙不可言。陽旦者。天曰清明。春夏溫煖之稱也。陰旦者。風雨晦冥。秋冬寒涼之稱也。桂枝湯加黃芩。名曰陽旦。加肉桂。名曰陰旦。後人不識此義耳。卽如此證。傷寒論一曰。與桂枝湯。此誤也。又曰。證象陽旦。按法治之。而增劇。卽是誤用桂枝湯。加黃芩之法也。所以病人得之便厥。蓋寒邪在裏。用桂枝湯。以治其表。則陽愈虛。加黃芩。以助其陰。則陰愈無制。故仲景卽行陰旦湯之法。以救其失。觀增桂令汗出一語。豈不昭昭。

耶。恐陰日不足。更加附子以溫經。卽咽中乾。陽明內
 結。譫語煩亂。渾不為意。且重飲甘草乾薑湯。以俟夜
 半。陽回足熱。後果如其言。豈非先有所試乎。惟陽日
 湯入口。而便厥。幾卽以桂附乾薑薑尾。其後固知厥
 必不久。所以可斷云。夜半雨足當熱。况咽乾譫語。則
 津液亦為辛熱所耗。故少與承氣以和胃。而止其譫。
 多則為下。而非和矣。若不知此。證之不可汗。而重發
 之。復加燒鍼。則陽之虛者。必至於亡。陰之無制者。必
 至於犯上。四逆湯以回其陽。而恐不足。况可兼陰以

意且重飲
 天雨流芳
 卽以桂附乾薑薑尾

為治乎。蓋傷寒以陽為主。陰進則陽虧矣。若溫病陽邪亢閉。陰先受傷。治法又當滋陰以瀉陽也。豈可與傷寒並論哉。

甘草乾薑湯。陰病小便色白。吐逆而渴。動氣下

之反劇。身雖有熱。反欲踰卧。此方主之。

甘草 炙四錢 乾薑 炮三錢 水煎溫服。

此即四逆湯。去附子也。辛甘合用。專復胸中之陽氣。

其夾食夾飲。面赤足厥。發熱喘咳。腹痛便滑。內外合

邪。難於發散。或寒冷傷胃。不便參朮者。並宜服之。真

胃虛挾寒之聖藥也。

芍藥甘草湯。婦人傷寒。汗解表除熱入血室。經水

過多。無實滿者。與雜病木尅脾土。陰陽血氣不

和而痛。並此方主之。

芍藥

酒炒 四錢 甘草 或炙 二錢

水煎溫服。

虞天民曰。芍藥不惟治血虛。大能行氣。腹痛者。榮氣

不和。逆於肉裏。得芍藥之酸苦。行其榮氣。又以甘草

之甘緩。和其逆氣。此不治之治。正所以深治之也。

本方加炮附子。

一錢五分名芍藥甘草附子湯。治發汗病

不解。反惡寒者。虛故也。白芍斂陰於內。附子復陽於

外。甘草和其陰陽。而諸病自解矣。發汗後不惡寒。但

惡熱者。實也。與調胃承氣湯和之。按發汗病不解。句

汗病不解。則當惡寒。何謂反。惟

病解惡寒。始當請虛當解之。茯苓桂枝甘草大棗湯。太陽病發汗過多。臍下悸

者。欲發奇臍。此方主之。汗多心液耗散。腎乘心

於臍

白茯苓六錢 桂枝三錢 甘草炙一分 大棗三枚

甘爛水煎溫服。

茯苓淡滲伐腎以散水蓄甘草益氣和中以補陽虛
桂枝走陰降腎禦寒奔豚之疾未至大棗益脾助土制奔
豚之上衝

生地黄連湯治男婦血風證此去血過多因而燥

涸循衣撮空錯語失神脉弦浮而虛者加人參

錢一更妙之意也

生地黄酒浸當歸酒蒸芍藥酒炒川芎各一分黃連酒炒梔子

薑汁炒黃芩酒炒各一分防風酒潤二分水煎溫服

豚實加大黃酒浸

陶氏曰。大承氣湯。氣藥也。自外而之內者用之。生地黃連湯。血藥也。自內而之外者用之。氣血合病。循衣抹牀。證同。自氣之血而復之氣者。大承氣湯主之。自血之氣。氣復之血者。生地黃連湯主之。二者俱不大便。此是承氣湯對子。又與三黃石膏湯相表裏。皆三焦包絡虛火之病也。病既危急。只得以此降血中之伏火耳。○綱目曰。四物湯與桂枝麻黃葛根柴胡青龍白虎涼膈承氣理中四逆吳茱萸附子等湯皆可作各半湯服之。此易老用藥大略也。

茯苓四逆湯。汗下後。煩燥不得眠。此方主之。

白茯苓

錢三

人參

乾薑

附子

生

甘草

炙各一錢

水煎溫服。

去黃芩。各四味。回陽飲。治元陽虛脫。再加熟地當歸名六味回陽飲。治陰

陽虛脫。



按煩出於心。用茯苓以養心。燥發於腎。用乾薑以潤

腎。固表生津。用人參以益虛。溫裏散寒。用附子以回

陽。和中緩急。用甘草以安胃也。

導赤散。

生地黃

木通

各三錢

淡竹葉

甘草梢

各二錢

水煎温服

導赤瀉心各半湯。

治越經證。脉浮沉俱有力者。

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

梔子

薑汁炒黑

知母

鹽酒拌炒

犀角滂

磨汁入

人參

麥冬

茯苓

去神

甘草

生

各錢

滑石

錢二

燈心

三分

生薑

錢二

大棗

二枚

水煎

温服。

知母麻黃湯。

治傷寒

汗出不徹

後證。

前論中已辯明。

知母

錢二

黃芩

酒洗

麻黃

去節

桂枝

白芍

甘草

炙各錢一

水煎温服。

詳證

加酒炒

黃連

錢一

尤妙。

黃連犀角湯。

狐惑病。咽乾聲啞。此方主之。

黃連酒炒犀角二錢滂二錢磨八錢烏梅三枚木香三分磨汁

水煎黃連烏梅去渣。犀角汁木香汁和服。

雄黃銳丸。治狐惑蟲蝕藏。

雄黃 黃連 苦參 桃仁 青箱子 各等分

為末。以艾汁丸如棗核樣。棉裹入穀道中。

百合地黄湯。治百合病。不經汗吐下。病形如初者。

百合七個劈破。以泉水洗去沫。另用泉水五盞煎

取一盞。生地黃二兩洗淨。用泉水五盞煎取一盞

二汁合一處分二服。大便下惡物如漆。中病即止。

不中再作服。

三甲散。

主客交渾病。

詳論

鼈甲

酥炙

龜甲

酥炙

並用

各一錢

無

二味

穿山甲

土炒

黃

五分

白僵蠶

用二錢

蟬蛻

全五分

牡蠣粉

五分

當歸

五分

白芍

酒炒七分

甘草

五分

麻黃

用三分

其渣

與諸藥同煎

水煎去渣。

和服。

若素有老瘧。

或瘧

瘧者。加何首烏。

懷牛膝。

胃弱欲作瀉。

宜九

蒸九曬。

若素有鬱痰者。

加川貝母。

去心。

若

素有老痰者。加栝婁

搗爛二錢

嘔則勿用。

若咽乾

作癢者加知母五分天花粉五分若素有內傷瘀

血者倍麻俗謂土也無乾物用桃仁泥一錢乾漆炒烟

盡研五分代之服後痛減七八漸進調理法可也。

桂枝加附子紅湯治婦女傷寒表虛自汗身涼。

四肢拘急經水適斷脈沉而遲者

桂枝二錢白芍二錢甘草炙一錢附子炮八分紅花七分生薑

二錢水煎溫服。

黑龍丹。一治瘀血沁入心脾。經病百出。危急惡疾。諸

藥不效者。並治難產胞衣不下。及一切瘀血不

行之證。

全當歸 生地黃

川芎

五靈脂

去砂 良薑 各兩

右五味為粗末。入砂罐內。紙筋鹽泥封固。炭火

煨紅。候冷取出。研為細末。再入後五味。

百草霜

鄉外人家者佳

乳香

花蕊石

火煨醋淬七次

生硫黃

琥珀

另研各二錢

右五味各為細末。同前五味合研

勻。用米醋煮麵糊為丸。如彈子大。每服一丸。以

炭火煨藥丸通紅。投生薑自然汁中淬之。或豆

淋酒。或童便化下。

準繩曰金華君產七日不食始言頭痛痛已心痛又
作既而目睛又痛更作更甚如刺如割相去無瞬息
間每頭痛作欲取大石壓之良久漸定心痛作則以
十指抓壁血流濁掌稍定目睛痛又作則以兩手指
刺之如是十日不已衆醫無計偶進黑龍丹半丸痛
苦稍間中夜再服半丸寢如平時至晨下一行約二
升許如蝗子狀三疾減大半已刻又下如前則頓愈
矣。

麻仁丸。跌陽脉。在足跌浮而濇。浮爲陽盛。濇爲陰虛。浮則胃

氣強。陽盛多熱。瀉則小便難或數。陰虛則便難。或不禁則頻。

矣。浮瀉相搏。相合大便則難。熱傷津液之故。其脾為約。

胃強則脾弱。不能為胃行其津液。此方主之。以潤大便。反若為胃所約束者。

火麻仁去皮杏泡去皮大黃薑汁炒厚樸各一兩枳實炒

白芍各五錢為末。鋪蜜丸。白飲下二錢。連服漸加。

以和為度。

枳實 梔子 豉 湯。病差勞復者。因勞煩熱。此方主之。若有

宿食加大黃。本方去豉加厚樸。三名。梔子厚

樸 湯加神麩。六錢。治食復效。腹脹疼。量加大黃。

枳實炒麩 梔子

生各 豆豉五錢

清漿水二盞入枳實

先煎後入豆豉煎服微汗愈
勞熱以汗解

牡蠣澤瀉散。大病差後從腰以下有水氣者。此方

主之。腰以下屬陰物。腰以上屬陽。腰以下屬陰。水則危矣。

牡蠣粉煑堅 澤瀉利水 葶藶子炒研通水 蜀漆散

行海藻瀉腎 商陸根疏通 栝藋根各等分 微

上以利 水道為末 白薇調下 二錢日三進小便利漸

愈不可過。

金匱曰。腰以下腫。當利小便。此定法矣。乃大病後脾

土。告困。不能攝水。以致水氣泛溢。用此散峻攻。何反
不顧其虛耶。抑知正因水勢未犯。半身以上。急驅其
水。所全甚大。設用輕劑。則陰水必襲入陽界。驅之無
及。可見活人之難。迂疎輩必不能動中機。宜庸工遇
大病後。悉行溫補脾土。自以為善。孰知其為鹵莽滅
裂哉。

大營煎 治男子真陰精血虧損。及婦人經遲血少。

或腰膝筋骨疼痛。或虛寒心腹疼痛者。

熟地 三五錢 當歸 二錢 三 枸杞 二錢 杜仲 鹽炒 二錢 牛膝 半錢 肉

桂錢一甘草錢二

水煎溫服。

如寒滯在經氣血

不能流通。筋骨疼痛之甚。必加製附子一二錢

方妙。中氣虛寒嘔惡者。加乾薑炒一錢營虛

於上。而為驚悸怔忡不眠多汗者。加酸棗仁炒

茯神各二錢。帶濁腹痛者。加故紙鹽炒一錢氣

虛有痛者。加香附米錢二以行之。陽衰氣虛者。

加人參錢二以補之。

五苓散。太陽膀胱本熱。小便不利發熱口渴。脈浮

者。此方主之。脈浮為表證。仍在。便秘熱渴。為府證已急。用此兩解表裏。

澤瀉二錢五分猪苓 茯苓 白朮土炒各一錢半桂枝一錢

水煎温服。合小柴胡湯名柴苓湯。

汪詛菴曰猪苓湯瀉熱勝故用滑石五苓散瀉濕勝

故用桂朮但傷毒太陽宜五苓陽明宜猪苓

傷寒論曰太陽病發汗後若脉浮小便不利微熱消

渴者五苓散主之又曰多飲暖水汗出愈成氏註曰

桂枝之辛甘以和肌家脉浮者表未解也微熱消渴

者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏乃

兩解之藥也今之知用桂枝者少矣殊不知兼治表

邪必用桂枝。專用利水。則宜肉桂。以肉桂辛熱。能引諸藥直達熱邪畜結之處。散澤瀉味鹹。所以瀉腎止渴也。二苓味淡。所以滲水滌飲也。白朮味甘。所以補脾逐濕也。兼以黃連有化氣之功。內經曰。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。濁陰既出。下竅則清。陽自出。上竅不熱。隨溺而洩。發熱口渴之證。不治自愈。

天雨流芳

解毒承氣湯。溫病三焦太熱。痞滿燥實。譫語狂亂。不識人。熱結傍流。循衣抹床。舌捲囊縮。及瓜瓢

死瘡溫上為癰膿下血如豚肝等證。厥逆脉沉

伏者此方主之。加栝萸一個半夏二錢名陷胸承氣治胸滿兼有上證者。

白殭蠶酒炒三錢 蟬蛻全十 黃連一錢 黃芩一錢 黃柏一錢 梔

子一錢 枳實一錢 厚樸五錢 薑汁炒 大黃五錢 芒硝三錢

另八 甚至痞滿燥實天雨流芳 結非常。大黃加至雨餘芒硝加至五七錢始動者。又當知之。

按此乃溫病要藥也。然非厥逆脉伏大熱大實及熱

結傍流舌捲囊縮循衣抹床等證見之真而守之定

不可輕投予用此方救壞證危證大證而愈者甚眾

虛極加人參二錢五分。如無參用熟地黃一兩歸身

寒溫條辨 卷五

七錢。山藥五錢煎湯入前藥煎服。亦累有奇驗。內經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐之以苦。此方是也。加人參取陽生陰長。所謂無陽則陰無以生。加熟地等取血旺氣亦不陷。所謂無陰則陽無以化。其理一也。

猪苓湯。陽明病發熱。消欲飲水。小便不利。少陰病。

下利。咳而喘。渴。心煩不眠。並此方主之。通治濕熱黃疸。

口渴 便赤。

猪苓 滲下焦 茯苓 引肺氣 澤瀉 鹹以助滑石 滑以

蓄水

而右降 腎行水 利竅

通淋 阿膠 滋腎水 乾 各三錢

水煎上四味去渣。人阿膠烱化溫服。

桂枝加厚樸杏仁湯。太陽病下之微喘者表未解

也。此方主之。

桂枝 錢三 白芍 錢三 甘草 錢二 厚樸 錢二 杏仁 錢一 石膏 錢三 大


棗 二個 水煎溫服。

此太陽中風誤下作喘之治法也。其太陽傷寒誤下

作喘用麻黃杏仁甘草石膏湯乃天造地設雨不易

之良方。凡下後利不止而加上氣喘急者乃上爭下

奪之象。但驟病之人中氣足供上下之用邪盡而喘



芳流雨天

利自止。若中氣素餒。加以上下交征。立盡之數矣。此證不云下利。但云微喘。表不解。則是表邪。因誤下。上逆與虛證不同。故仍用桂枝湯。以解表。加厚樸杏仁以利氣。亦徹裏也。

梔子柏皮湯

傷寒身熱。流芳。濕熱鬱肌表。

發黃者。此方主之。

梔子 三錢 黃柏 三錢

甘草 三錢 茵陳 三錢

水煎溫服。按此方

三錢無著。應是茵陳蒿。必傳寫之訛也。當吃之。

麻黃連軹赤小豆湯

傷寒瘧熱在裏。身必發黃。此

方主之。

按瘧熱在裏之裏字。應是表字。若裏字。豈熱在裏。而藥反治其表哉。當故之。

麻黃錢三連軛錢三赤小豆錢五生梓白皮錢五杏仁錢一

甘草錢多一生薑錢二大棗錢二連軛乃連翹根也。

水煎麻黃去沫入羣藥煎服。

金沸草散。治風寒咳嗽多痰頭目昏痛身熱

鼻塞聲重。風熱上壅故生痰作嗽荆芥解肌散

草發散緩細辛溫經茯苓利濕赤則入血分而瀉丙丁也。

金沸草去蒂荆芥二錢前胡一錢半夏二錢赤茯苓一錢

半細辛二錢甘草分生薑錢二大棗二枚水煎溫服。

局方無細辛茯苓有麻黃赤芍熱加柴胡痞

悶加桔梗頭痛加川芎。

準繩曰。人止知此散治風寒咳嗽。及加杏仁五味子。

治諸咳嗽皆效。獨未知用之。治舌腫牙痛。幸未有人

舌腫滿塞。粥藥圖入。危甚。煎此散乘熱以紙籠熏之。

遂愈。况服之乎。三因亦云。天雨流若婦人舌腫牙痛。口頰皆

腫。以此散大劑煎湯。熏漱而愈。

地榆散。治傷寒溫病熱毒不解。日晡壯熱。腹痛便

利。膿血甚。如爛瓜肉。屋漏水者。

地榆錢二當歸錢四白芍錢四黃芩 黃連 梔子炒

犀角滂磨汁各二錢薤白四錢水煎去渣入犀汁冷服。

桃花湯 少陰病二三日至四五日腹痛小便不利。

下利不止。便膿血者及少陰下利。便膿血腹不

痛者。並此湯主之。

赤石脂兩煨二乾薑二錢粳米五錢水煎米熟去渣。

再調赤石脂末二錢溫服。

桂枝加桂湯。即陰旦湯。主氣陽中風。燒鍼令出其汗。鍼處

被寒核起而赤者必發奔豚。氣從少腹上衝心

者。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯。更加桂。

本方去桂。加黃芩。今卽陽旦湯。

桂枝 二錢 白芍 二錢

桂枝 四錢 去粗

甘草 一錢

生薑 二錢

大棗 二錢

水煎溫服。

喻氏曰。奔豚者。腎邪也。腎邪一動。勢必自少腹上逆。而衝心。狀若豕突。以此方。多位屬猪。故也。腎邪惟桂能伐之。所以加桂一倍於桂枝湯中。外解風邪。內泄陰氣也。嘗卽此例。推之。凡傷寒發表。誤入寒藥。服後反加壯熱。膚起赤塊。畏寒腹痛。氣逆而喘。或出汗時。覆益未周。被風寒復侵。紅腫喘逆。其證同者。用此方。

喻氏曰。奔豚者。腎邪也。腎邪一動。勢必自少腹上逆。

而衝心。狀若豕突。以此方。多位屬猪。故也。腎邪惟桂

能伐之。所以加桂一倍於桂枝湯中。外解風邪。內泄

陰氣也。嘗卽此例。推之。凡傷寒發表。誤入寒藥。服後

反加壯熱。膚起赤塊。畏寒腹痛。氣逆而喘。或出汗時。

覆益未周。被風寒復侵。紅腫喘逆。其證同者。用此方。

夏驗。一婦病風寒外感。服表藥後。忽面若裝赤。散髮
叫喘。雙手上揚。予知其少腹作奔豚也。服此方頃之
卽定。

麻黃附子甘草湯。少陰病得之二三日。但欲寐無

裏證者。此方主之。

大雨流芳

麻黃二錢 附子錢 甘草錢

水煎麻黃去沫。再入

二味煎服。微發汗則愈。

此少陰病無裏證者。知表邪未盡。併陰也。故以附子
溫少陰之藏寒。甘草和表裏之陰陽。麻黃發未盡之

傳邪而病斯痊矣。不然大汗淋漓則陽氣愈虛而陰

邪愈盛。故戒之曰：微發汗。

白通加人尿猪膽汁湯。少陰病下利。藏寒不禁則

下故也。脉微也。陽虛與白通湯利不止。用方切當

厥冷無脉。至脉微而乾嘔煩者。不能入也。此方

主之。反佐也。服湯後脉暴出者死。陽欲燼而忽

微續者生。續氣漸有而生。去人尿膽汁。名白通湯。

葱白二莖 乾薑三錢 附子三枚 人尿一杯 猪膽汁三茶匙

水煎去渣。入人尿膽汁。和勻温服。如無膽汁亦

可用。

葱白通陽接陰。有升發之能。乾薑健脾暖胃。有化穀
之長。附子溫中散寒。有回陽之善。人尿膽汁性寒而
續真陰。引薑附為肝腎之向導。起死回生之方。造
化神工之妙也。

桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒。熱多寒少。風

寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發

汗。此方主之。

風多用桂枝二以解之。寒少用越婢一以發之。

桂枝 白芍

甘草

麻黃

各二錢 石膏三錢
五分 三分

天雨流芳

生薑四分大棗二枚水煎麻黃去沫入羣藥煎服。

即此一方知仲景酌量脉證毫釐不差因風多寒少

故用桂枝二以解之越婢一以發之也後世醫家邪

得窺其萬一

入正散治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急

滿者

木通 車前子 炒麥 梔子 大黃 滑石

扁蓄 甘草稍 燈心 水煎溫服一方有木香

通麥燈心降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子

瀉三焦鬱火。大黃滑石。又瀉火和水之捷藥。扁蓄利便通淋。草稍入葶止痛。雖治下焦而不專於治下。必三焦通利。水乃下行也。

太平圓酒。



病愈後元神未復。腰脚無力。渾身酸

軟者。此方主之。

芳流雨天

糯米酒糟



炒黃色為

主溫中消食。除冷氣殺

腥去。草菜毒。調藏府和血行氣。止痛。

紅麴

陳久者佳。炒黃黑。為末。二兩四錢。

主健脾消食。養陰滋血。

六神麴

陳久者佳。炒黃黑。為末。四兩八錢。

主健脾養胃。化穀消食。

小麥麩

陳麥麩佳。去淨麩筋。曬乾。炒黑色為末。四兩八錢。

主天行溫毒熱。

極發狂發斑疹大渴者。又主調中養氣。健人生

力。助五藏。除煩悶。利小腸。麥乃養心之穀。屬火

而麩則濕。與胸膈之熱。蓋取同氣相求。

亦從治之意也。天雨流

白蠟

白者黃酒炒。黃褐色為末。八錢。

全蟬蛻去上為。二味前

已註明。加枳殼木通。治食滯飽悶。服散亦妙。

右六味合研勻。水丸。每服一兩。以冷黃酒三兩。調蜜

一兩送下。隔五日。如法再服。如是三次。開胃進食。健

人生方。只十餘日。仍如無病一般。因名其方。為太平
圓酒。

升麻鼈甲湯。

升麻

甘

各一兩

鼈甲

酥炙

當歸

蜀椒

炒去汗各五錢

雄黃

研二分

水

六盞

煎二盞。分二次連服之。老

小再服

即愈

玉樞丹

一名紫金錠

專治暴中雜氣病。昏暈欲倒。如霍亂

吐瀉。攪腸沙。青筋脹。心腹痛脹。諸般危證。並一

切山嵐瘴氣。水土不服。解諸毒。療諸瘡。利關節。

通百病奇效不可殫述。

山茨茹。洪山出者。洗去毛皮焙。文蛤。一名五倍子。製紅。

芽大戟。去淨骨。一兩五錢。干金子。一名續隨子。用鮮朱砂。

有神氣者。研末三錢。黃。研。紅。大塊者。麝。者。研末三錢。

右七味稱準。合研。於細石臼內。漸加糯米濃。

飲調和。燥。得宜。杵干餘。以光潤為度。每錠重。

一錢。每服一錠。病重者連服二錠。取通利後。以。

溫粥補之。

治一切飲食藥毒。蠱毒。及喫自死牛馬猪羊等肉。

菌中毒。並山嵐瘴氣。烟霧惡毒等證。昏亂猝倒。或生異形之狀。悉用凉水磨服。

一治陰陽二毒。瘟疫痧脹。或狂言亂語。或胸腹腫痛。並喉痺咽腫。用薄荷湯待冷磨服。

一治癰疽發背。對口天泡。無名腫毒。蛙節紅絲等疔。

諸惡等瘡。諸癩癧疹。久疔紅腫。及楊梅結毒。俱用

無灰酒磨服。外用薄荷水磨塗。日夜數次。覺癢即消。

潰爛者。亦可少減。

一治男婦急病。癡邪奔走。叫號失心。狂亂羊兒猪癩。

等風俱用石菖蒲煎湯磨服。

一治心胃痛及諸般氣痛及諸般血痛並赤白痢泄

瀉急痛霍亂絞腸等類俱用薑湯磨服。

一治中氣中風痰口眼歪邪牙關緊急語言蹇澀。

筋脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱難等證用

酒磨頓熱服。

一治風犬毒蛇澗溪毒蟲傷人及注偏身毒氣入裏。

命在旦夕俱用酒磨服外以水磨塗之再服葱湯

汗出愈。

一治年深日久頭脹頭痛偏正頭風及溫病後毒氣
攻注腦門作脹者俱用葱酒磨服仍磨塗太陽穴
上

一治小兒急驚風五疳五疔黃疸俱用薄荷湯磨加
蜜調服

一治小兒遺毒下百日內皮塌肉爛穀道眼腫損
者涼水磨服並磨塗

撥正散。專治雜氣為病陰陽毒痧脹及一切無名
惡證並食厥痰厥氣厥皆驗。

葦撥 雄黃精為火硝各二錢 冰片 麝各五釐

右為細末。男左女右。以筒吹入鼻中。即甦。

半夏散及湯。

半夏 桂枝 甘草各一分 為末。白飲調服一錢。

五分。日三如不能服散。以水二盅。煮五六沸。入

散一兩。再煮四五沸。冷徐嚥之。

苦酒湯。

半夏為末 苦酒 以雞子一箇。去黃。入半夏苦酒

於殼內置鐵環中。安火上。令三沸。去渣。少少嚥。

下不瘥再作三劑服之。

猪膚湯。

猪毛不附皮薄黑肉下以水四碗煮取二碗去渣。

入白蜜二兩熬香和相得温分三服。

當歸導滯湯。

當歸一兩 白芍二兩 萊菔子四錢 車前子炒 枳殼麩 檳榔

甘草炙各一錢 水煎蜜酒服。看後加紅痢加桃仁。

此方之奇妙全在當歸白芍蓋泄瀉最忌當歸之

滑而痢疾最喜其滑也白芍味酸入肝以和木使

天雨流芳

木不侵脾土。枳殼。檳榔。消逐濕熱之邪。車前分利其水濕。而又不耗真陰。氣。萊菔。辛辣除熱去濕。又能上下通達。消食利氣。使氣行於血分之中。助歸芍以生新血。而蕩滌其瘀血也。加甘草蜂蜜以和中。則又無過烈之患。奏功之神奇。實有妙理耳。

熱加黃連。錢二。黃芩。錢二。日夜無度。或裏急後重之甚

者。再加大黃。木香。海病後痢疾。加白殭。蠶。蟬。蛻。

芳香飲。溫病多頭痛身痛心痛脇痛嘔吐黃痰。口

流濁水。涎如紅汁。腹如圓箕。手足搖擗。身發斑

疹頭腫舌爛咽喉痺塞等證此雖怪怪奇奇不可名狀皆因肺胃火毒不宣鬱而成之耳治法急宜大清大瀉之但有氣血損傷之人遽用大寒大苦則恐火轉閉塞而不達是害之也此方主之其名芳香者以芳流香古人元旦汲清泉以飲芳香之藥重滌穢也

元參 兩一

白茯苓

錢五 石膏 錢五

蟬蛻

全十 二箇

白僵蠶

須炒 三錢

荆芥

錢三

天花粉

錢三

神麩

錢炒

苦參

錢三

黃芩

錢二

陳皮

錢一 甘草

錢一

水煎去渣入

蜜酒冷服

三合湯。加減生化。小柴胡。小清涼。三方而一之。

治產後温病。大熱神昏。四肢厥逆。譫語。或不語等

證。若發狂燥結。量加大黃。芒硝。內經曰。熱淫於內。

治以鹹寒。佐以苦。又曰。有病則病當之。是也。

當歸酒洗八錢。川芎三錢。桃仁炒。不去皮尖。紅花一錢。益母

草去老梗五錢。乾柴胡四錢。黃芩三錢。梔子三錢。粉丹皮三錢。白

殭蠶酒炒三錢。蟬蛻全。金銀花三錢。澤蘭葉三錢。生甘草

錢一。水煎去渣。入蜜酒童便和勻服。

滾痰丸。老痰積飲。怪病百出。此方主之。準編備言之。

川大黃八兩

黃芩酒洗

青礞石火硝煨如

沉香八兩

五錢

為末木丸薑湯送下量虛實服

準繩加自藥

礞石性慄悍能攻陳積伏匿之痰為君大黃蕩滲執實

以開下行之路臣黃芩涼心肺以平僭上之火為

佐沉香能升降諸氣以道諸藥為使也

文蛤散

文蛤

鹹寒走腎專於行水一兩

為末沸湯調服二錢

白散

桔梗

開胸下川貝母

寬鬱利芭豆

散寒遂結炒黑去油為霜一錢

二味爲末。八芑豆霜再研勻。白飲和服。強人五
六分。弱人減半。在上吐。在下利。不利進熱粥一
杯。過利不止。進冷粥一杯。

加味茵陳蒿湯 通治黃疸

茵陳 梔子 大黃 山藥 二錢 甘草 白朮

積芩 茯苓 木通 黃芩 黃柏 生薑 各一錢

水煎溫服。

方

跋

世嘗謂傷寒家如戴復菴，偏於溫補；劉河間，偏於寒瀉。是殆循跡以求，而未深嘗其味者。蓋復菴以傷寒汗下失宜，寒涼太過，始為熱中，未傳寒中，誠得治傷寒壞病之要訣，而非偏於溫補也。河間以傷寒為雜病，濕病為大病，製雙解、涼膈、三黃石膏表裏兩解，誠得治溫病鬱熱之要訣，而非偏於寒瀉也。各擅其勝，易地則皆然矣。不得要領而動相非議，又何怪人異其旨。家異其學耶。余才淺學疎，未入閫奧，惟是博

考先哲議論零星輻輳。詳辨溫病脈證。與傷寒大異。病分常氣。雜氣。治分氣分。血分。與夫陰陽寒熱表裏。虛實條分。縷晰而理歸一貫。其論證處方。於先哲之隱深者。明顯之。謂庸者。有沈和之。以就淺近。非故點金成鐵也。將使因證檢書。而求治方者。寒溫補瀉。各適其宜。不至多岐。則幸甚。戊子春。栗山璿書。

家口

芳流雨天

