

醫方類聚卷之一百四十二

泄瀉門二

十形三療

六二 殮泄

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月
不愈諸醫以為脾受大寒故併與聖散子荳
蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知
藥之非反責明之不思口戴人至而笑曰春
傷於風夏必殮泄殮泄者米穀不化而直過



下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中
中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能
尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣
流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脉皆浮
數爲病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以
火二盆暗置床之下不令病人見火恐增其
熱給之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其
戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火
一半須臾汗止泄亦止

泄瀉

古鄆一講僧病泄瀉數年丁香荳蔻乾薑附
子棺桂烏梅等燥藥燔鍼燒臍炳腕無有闕
者一日發昏不省檀那贈帟者盈戴人診
兩手脉沉而有力脉訣云下利微小者生脉
洪浮大者無瘥以苾蒞散涌之出寒痰數升
又以無憂散泄其虛中之積及燥糞僅盈斗
次以白朮調中湯五苓散益元散調理數日
僧已起矣非術精識明誰敢負荷如此

洞泄

一講僧顯德明初聞家遭兵革心氣不足又爲寇賊所驚得臟腑不調後入京不伏水土又得心氣以至危篤前後三年八仙丸鹿茸丸燒肝散皆服之不効乃求藥于戴人戴人曰此洞泄也以謀慮久不決而成肝主謀慮甚則乘脾久思則脾濕下流乃上涌痰涎益未後有血數點肝藏血故也又以舟車丸瀉川散下數行仍使澡浴出汗自今日勝壹日

常以胃風湯白朮散調養之一月而強實復故矣

又李德卿妻因產後病泄一年余四肢瘦乏諸醫皆斷爲死證當時戴人在朱葛寺以舟載而乞治焉戴人曰兩手脉皆微小乃痢病之生脉况洞泄屬肝經肝木尅土而成此疾亦是腸澼澼者腸中有積水也先以舟車丸四五十粒又以無憂散三四錢下四五行寺中人皆駭之病羸如此尙可過耶衆人雖疑

然亦未敢請且更看之復以導飲丸又過之渴則調以五苓散向晚使人伺之已起而緝床前後約三四十行以胃風湯調之半月而能行一月而安健由此闔寺皆服德卿之昆仲咸大異之

又劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步欹傾面色鰲黑舉世治痢之藥皆用之無効適戴人治潯陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說雖不已疑然畏其攻齊夜焚香禱

神曰某以病久不瘥欲求治于戴人戴人以謂宜下之欲不從戴人名醫也欲從之形羸如此恐不佳藥母已老矣無人侍養來日不得已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十余行珠不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減戴人以爲去之未盡當以再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦齊越之往問其家彼云已下林中收索去也忽一日入城面

色極佳語言壯健但怪其跛足而立問何故如此德源曰足上患一廊戴人曰此裏邪去而散於外病痊之後凡病皆如是也

暑泄

殷輔之父年六十余暑月病泄瀉日五六斗行自建碓鎮來請戴人于陳州其父喜飲冰家人輩爭止之戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少飲比及用藥先令凍歸以菜豆雞卵十余枚同煮卵熟取出令豆

軟下陳粳米作稀粥攪令寒食雞卵以下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷痢然後製抑火流濕之藥調順而方愈

瀉利惡寒

東門一男子病瀉利不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則下注如傾諸醫例斷為寒證乾姜枳桂丁香荳蔻之屬枯礬竜骨皆服之矣何鍼不燔何艾不注遷延將二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑余不以爲寒然

其所以寒者水也以茶調散涌寒水五七升
無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也
次以五苓散淡齊滲泄利之道又以甘露散
止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓
玄口言之矣奈無人用之哉
醫方大成

泄瀉

泄瀉之證經中所謂飧泄澹泄洞泄濡泄溢
泄水穀注下是也大腸爲五穀傳送之官脾

胃虛弱飲食過度或爲風寒暑濕之氣所中
皆能令人泄瀉如傷於風其脉必浮下必帶
血當以胃風湯等驅散之如寒氣所傷脉必
沉細腹肚切痛下必青黑當以附子理中湯
治中湯等溫暖之若傷於暑則脉沉微煩渴
引飲其下如水當以五苓散來復丹以分利
之或夾食則又當以胃苓湯下蘇感圓若濕
氣所中其脉沉緩腰脚冷痺小便自利不渴
其下黃黑色當以滲濕湯藿香正氣散調之

因停食而泄者下必臭類抱壤雞子或噫氣作酸先服感應圓推其食積而後理脾氣體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當以四柱散薏附圓若脾腎氣虛清晨泄下二次二神四神圓主之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷下鑿之大法如此若脚氣泄瀉各以類求滑泄一證最忌五虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食不

入者是也若得麩粥入胃泄瀉止則可治也
 永類鈴方

雜病泄瀉 殮世 澹泄 洞泄 濡泄 溢泄 水谷注下

經云春傷風夏殮泄風者木也木克土土脾也脾中風邪故為殮泄其証多生於夏皆飲冷眠涼所致或即以脾胃虛冷治之用脾藥謂可壯脾補虛滯腸而不溫散風邪邪得補愈盛為痢為脹為泄若果脾胃虛冷其來有漸未應暴下亦不應長幼患狀相似豈有一

且盡是脾虛之人治法寒則溫之風則散之
 熱則清之溫則分利之先理中焦分利水谷
 然後斷下惟飲食停滿直須稍利不可止澁
 蘊而成痢若滑泄尤忌五虛脉細皮寒前後
 泄利飲食不入

脉 病證

治

浮

風泄 下必帶清血

藿香正氣散 本事麴
 窮元 百一選大藿香
 散陳米飲搗湯下風

沉細

寒泄

腹痛下必切
 清黑泄
 後腹脹
 身痛先
 溫其裏
 或老人
 脾敗自
 利手足
 冷耳鳴
 小便滑

冷乘虛下血胃風湯

加減理中湯四桂散豆

寇散豆附元大已寒
 元姜合元火輪元木
 附湯 濟生禹餘糧
 元豆附元訶黎勒元
 百一選厚腸元補
 脾元大藿香散六御
 院椒艾元

沉虛

暑泄 煩渴引飲其下如小水少

濟生加減五苓散黃連

香薷散香連元六和

湯濕熱相承戊巳元

來復丹分利水谷

簡易九寶飲子

局方加味五苓散滲濕

湯胃苓湯十味正氣

散胃風湯有熟柴苓

湯 本事麴窮元

沉緩

濕泄 身體痛小便不利下黃黑如豆汁

局方加味五苓散滲濕

湯 本事麴窮元

氣口緊

飲食 積結泄必臭如穢雞子噫氣作酸

仁齋實腸散朮附湯

平胃散感應圓紅元子

勝紅元 濟生黑元

子如意元脾積元

澹寮四神元 局方金

鎖正元丹 濟生棗

肉元 本事二神元

加木香五味子散木

沉細

脾腎 氣虛清晨泄下三次

諸下痢

朮附湯生料附子理中湯

脉微小
愈洪大
實未愈

轉筋
入腹痛

挾暑正氣和香薷散姜

葱煎或加賓蘇散木

瓜煎通見霍亂門

飲酒

過度脾經受濕

平胃散理中湯酒蒸木

香薷連元

麻疹

毒入胃或涼藥過多

生料四君子湯入肉豆

寇木香

食魚鱉

黃橘皮帶白濃煎服

笋箇菜菓

姜醋調射香末 薑汁

豆豉湯下三稜元

玉機微義 泄瀉門 此門宜與滯下看

瀉痢生死脉法

內經云脉細皮寒少氣泄利前後飲食不入

是謂五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經云洩注脉緩時小結者生浮大數者死

又洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者

生緊急者死

脉訣云下利微小即為生脉大浮洪無差日
仲景治利大法 東垣治利大法 按此
並見諸痢門

瀉分寒熱

病機機要云藏府瀉利其證多種大抵從風
濕熱論是知寒少熱多寒則不能久也故曰
暴瀉非陽久瀉非陰大便完穀下有寒有熱
熱者脉疾身多動者聲響亮暴注下迫此陽
也寒者脉沉而細身不動作日晴不了了飲

食不下鼻準氣息者姜附湯主之若身重四肢

肢不舉木附湯主之

按此以瀉之久暴分陰陽亦如傷寒之病

有始為寒而終則傳變而為熱也然亦必以

景脉證參訂焉

原病或曰瀉自為寒青黃紅赤黑皆以為熱

也太抵瀉利小便清而不澀為寒亦瀉者為

熱又完穀不化而色不變此利虛穢澀澈清

冷小便澀而不澀身涼不渴脉遲細而微者

寒也穀雖不化而色變非白煩渴小便赤澀者熱證也凡穀消化無間色及他證便爲熱也寒泄而穀消化者未之有也或火性急速傳化失常穀雖不化而食泄者亦有之矣仲景云邪熱不殺穀然熱得濕則殄泄也

論瀉利有濕有熱有風有寒然亦必以機要云有太陰經受濕而爲水泄虛滯身重微滿不知穀味久則防變而爲膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈若先利而後滑謂之微

邪故易痊此皆脾土受濕之所爲也

有厥陰經下利不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此難治宜麻黃湯小續命汗之此有表邪縮於內當瀉表邪而愈有暴下無聲身冷自汗小便自利大便不禁氣難布息脉微嘔吐急以重藥温之漿水散是也

論暴注屬火以暴注水厥效驗則來子和云夫暴注瀉水不已內經曰注下也注

下水利也暴速甚者屬火宜用冰調桂苓汁
露飲五苓益元散或以長流水煎放冷服涼
膈通聖亦能治之慎不可驟用鶯粟殼乾姜
豆蔻之類縱瀉止亦轉生他疾止可分陰陽
利水道而已

按已上論所辨寒熱風濕火等証所以明
六淫之邪皆能為瀉為注者亦當各隨所
淫之邪分而治之可也
論胃氣下降為殮泄

機要云夫脾胃同濕土之化主腐熟水穀胃
氣和平飲食入胃精氣則輸於脾土歸於肺
行於百脉而成榮衛若飲食一傷起居不時
損其胃氣則上升精華之氣反下降是為殮
泄久則太陰傳少陰而為腸澼

論春傷於風夏必殮泄
機要云春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜
密則是行秋今金能制木風內藏夏至則火
盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則殮泄

脉泄穀不化重則下利膿血稠粘良方云經云春傷於風夏必殮泄蓋風喜傷肝春時木旺不受邪反移氣剋於脾土脾既受剋不能運化因成積滯夏秋之間再感暑溫風冷之氣發動而成利也

其論殮泄屬風宜汗之論又下利是心氣不和云殮泄不止完穀不出發汗可也桂枝麻黃湯主之此證以風為根蓋風隨汗出也按殮泄証機要謂胃氣下流及春行秋令

良方謂春木旺移氣剋脾土論雖殊要之皆因風木傳變而脾土受邪爾子和謂風隨汗解此論固是然亦須隨其傳變而治不可執此一法也

瀉分三因

一因嚴氏云泄瀉一證經中所謂洞泄殮泄溇泄溢泄濡泄米穀注下是也所因有內外不內外差殊耳經云春傷於風夏必殮泄又云濕勝則濡泄寒甚則為泄暑熱盛之亦為

泄至於七情感動藏氣不平亦致溇泄其如
飲食不節過食生冷而成泄瀉者乃胃脾有
傷也但停滯泄瀉一證直須積滯已消然後
用以斷下藥今人往往便固止之多成痢疾
者矣治法先理中焦次分利水穀治中不効
然後斷下

按此三因所分甚詳但外所淫者既六而
立方止有其二內之七情爲證而又不詳
及於治法

治瀉利用吐下汗三法

子和云一僧藏府不調三年不効此洞泄也
以謀慮不決而成肝主謀慮甚則乘脾脾濕
不流乃上涌痰半盆又以舟車丸瀦川散下
數行仍使澡浴出汗自余日勝一日常以胃
風湯白朮散調養之

按子和爲治大率多用此三法洞泄一證
縱其果有積滯鬱結之甚元氣壯實者亦
不宜驟用此三法况有續滯雖甚而元氣

尤虛者哉設使果當用此三法者亦當如仲景察證以辨其吐汗下者有不可之殊况仲景治利又有合下合瀉之法焉此得非孟浪乎

丹谿論局方用熱藥瀉藥治利之誤

按此

見諸痢門

謹按泄瀉一證古方率以為腸胃虛寒與風冷乘之為論故多行瀉熱之劑彼瀉利者豈無積滯豈無熱證乎今觀病機機要

所論有屬寒屬風濕屬火之證此因於外而傷者也又云厥陰經動并胃氣下降為瀉利三因所言七情感動藏氣不平亦致溏泄此則因於內而傷者也外則當調六氣內則當平五藏况又有飲食所傷腸胃停滯所致者治法各不同也然更有因胃氣下流而泄者在法則當升舉因風而成殮泄者則當解散因痰積於上焦以致大腸之不固而泄者又當去上焦之痰而不

治其瀉因脾胃氣虛而泄者又當補中益氣使胃氣升騰而泄自止蓋各求其本而治可也

海上仙方

水瀉

會開水瀉將何治焦炒車前子最良細末一錢調米飲只消七劑應時康

大全本草

孫尚藥治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十

行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十九丸溫米飲鹽湯下

續十全方治暴瀉痲面草霜末米飲調下二

錢

治瀉歐陽文忠公嘗得暴瀉國醫不能愈夫

人云市人有此藥五文一貼甚效公曰吾

輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以
國醫藥雜進之豈服而愈後公知之君賣
藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車
前子一味為末米飲下二錢七云此藥利
水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自
止矣

孟詵云白蒿葉乾為末夏日暴水痢以米飲
和一匙空腹服之

食療云春初採艾為餅子入生薑煎服止

瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷
氣取熟艾麴裹作餛飩可大如彈子許

續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋
調麴裹之置灰火中煨令黃焦和麴碾末
更以炒子欖子末壹兩相和又焦炒陳廩
三米為末每用二錢七煎作飲調前二物三
錢七且暮各一便差

日華子云瀉痢飯飲調青蒿末五錢七
續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩

搗末以飯丸每日空心午飯前各用陳米
飲下二十九增至四十九久服去三尺益
神駐顏

三因方

虛寒泄瀉治法

桂香丸治藏府虛為風濕寒所搏冷滑注下
不禁老人虛人危篤累效

附子炮去皮肉苁蓉炮白茯苓各兩桂心

白姜炮木香炮各半兩丁香壹分

右為末糊丸如梧子大米湯下五十九空
腹服

香朴丸治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣
閉不進飲食

厚朴五兩姜汁製炒白朮三兩茴香炒陳皮各三兩

子炮去核赤石脂各一兩半

右為末麩糊丸如梧子大空腹米湯下五
十九常服暖腸胃

建脾丸治虛勞羸瘦身重胃冷飲食不消洩

瀉不止或作滯下久變五色穢臭

鍾乳粉 赤石脂煨各壹兩 枯礬 乾薑炮

菴蓉酒浸 石斛酒浸 五味子 大桂心 水澤瀉

桑上寄生 遠志去心炒 人參 栝子仁

當歸 酸石榴皮 龍骨煨 天雄炮去皮臍壯

蠣粉 白頭翁大壹兩 甘草炙各壹兩

右為末蜜丸梧子大米湯下三十九空腹

服

芫薺分氣飲治藏府虛寒泄瀉瘦極及婦人

產後洞洩危篤者

藿香葉 草薺薺仁 青皮各四兩 甘草炙

丁香各半兩 肉荳蔻炮十斤 烏梅五十斤

右剉散每服四分水二盞糯米一撮煎七

分去滓空腹服

羊肉扶羸丸治脾胃不和不進飲食臟腑虛

滑老人虛人尤宜服之

精羊肉壹斤半 微斷血脉 白姜炮壹兩 川椒

去目炒 肉荳蔻煨各壹兩 木香壹兩 附子炮去皮臍 神

麴炒半兩

右為末煮粟米飲為丸如梧子大食前米

湯下五十丸

川椒丸治臟虛泄瀉無度

黃連炒烏梅肉 當歸 川椒炒出桂心

乾姜炮各等分

右為末糊丸梧子大每服三五十九米湯

空腹服

實熱泄瀉治法

小承氣湯治下利譫語者有燥屎故也方見傷寒

門夫泄瀉却用大黃者乃通因通明也非

大實熱勿輕用之

冷熱泄瀉治法

博濟香姜散治久患脾泄瀉聖濟總錄名薑連散

生薑四兩黃連壹兩

右皆剉如豆大一處慢火炒令姜焦赤去

姜碾黃連為細末每服二分總錄經驗良方

蘇合易簡空腹臍茶清調下總錄經驗良方

二三服仙方易簡方或服蠟攀圓亦效見癰疽門

飲調治白痢亦効○是齋醫方治瀉瀉本

出博濟方人少知之宣黃連一兩散子塊切淨洗去泥

土清水生薑四兩散子塊切右於鍋銚內

浸片時同炒薑赤黃色為度去薑不用將黃連碾

羅為細末每服二錢膈茶同調下不拘時

候若欲速効一料只作兩服嘗有人患此

兩月一劑而愈得効方晨泄又名瀼泄生

薑四兩切黃連二兩右壹處淹一宿慢火

炒薑紫色去薑不用將黃連末每服二錢

用臘茶清調一劑而愈又用米飲酒調治

白痢尤妙若欲速効一料只作二服

建脾散治五泄或青白五色雜下休作無時

烏頭淨法皮厚朴去皮甘草炙葛根切

分二六

在為末每服二錢水壹盞姜三片煎七分

熱服

止瀉如神丸

川烏頭四兩米泔浸軟去皮切作片半頁

湯湯七蒼朮各半斤米泔浸淨

右為末姜汁糊為丸梧子大空腹米湯下

五六十九

戊巳丸治脾胃受濕泄利不止及米谷不化

小兒疳痢並宜服之

黃連湯洗白芍藥各等分

右三味同炒為細末米糊丸如梧子大每

服三五十九米湯空腹下小兒量與之○

嚴氏濟生方治脾胃不足濕熱乘之泄瀉

不止米穀不化腸鳴腹痛直指方治冷黃熱不調泄瀉

連去鬚吳茱萸直指方妙得効白芍藥各等分

右為細末米糊為丸如梧子大每服五

十圓直指方醫方大成三十圓空心用米飲

送下承驗方袖珍方與大成同

補脾散治脾泄不止食積不消癥瘕塊結大

腸滑泄臟毒下利腹痛腸鳴

麥蘖兩神麴炒二兩茴香炒草果逐介用

類聚百卷

三十三

熟厚朴製 乾姜 炮陳皮各一兩 木香生半廿

草炙半兩

右為末脾泄瀉訶子湯入搥調下二錢脾虛腸鳴氣不和瀉不止炒姜酒調下常服
搥湯點空心食前服

助道方

治冷泄腹中疼

乾薑良姜桂草撥大治腹疼諸冷泄便是局方已寒圓何憂前患不能脫

大治男子婦人腹肚冷疼泄瀉不已者於

局方贖已寒元一貼依法服餌果見應効

是齋醫方

肉附元治腹瀉不止

肉苳菘一兩二錢 附子壹箇重七錢

右二味並為細末打糊為元如梧桐子大

候乾每服五六十元米湯吞下不拘時候

立効江州高瑞朝方

椒附湯治驟腹疼注下或滑腸類併多有冷沫

川椒去目乾薑生用附子去皮臍生用

右三味等分為麤末每服三錢水二盞煎

至八分溫服不拘時候

欽賜元治久瀉姜侍郎方

木香 丁香 附子炮去臍 縮砂仁 呵子

皮 鶯粟殼炒去穰頂 川薑炮 沒石子貝口州

厚朴薑製 白龍骨 肉荳蔻麩裏 赤石脂煨

禹餘糧醋淬七遍已上各一兩

右為細末麵糊為元如梧桐子大每服七

十元米飲下空心食前服

厚腸元

白竜骨炮 附子炮片 厚朴薑製 訶子

肉荳蔻麩裏 陳皮非人謂之寒水

右等分為末酒糊為元桐子大每服五十

元米飲下醫方大成集成南北經驗方類鈔方同

治吐瀉韓御帶施此藥極驗

類聚

三十五

白龍骨 白礬 白石膏 白礬

右四味等分爲細末滴水爲元如梧桐子
大入甘鍋火煨通紅爲度每服五元至十
元米飲湯下石膏是軟者北人謂之寒水
石故刊煨

沒石子元治臟氣虛弱大腸滑洩次數頻併
日漸羸瘠者進飲食或久患赤白痢脾瀉等
疾並皆治之

白木三錢 白茯苓三錢 沒石子三錢 丁香二錢

二錢不 赤石脂二錢 白薑二錢 肉荳

芫二錢 訶子二錢

右和勻用湯泡蒸餅爲元小梧桐子大每
服三四十元米飲吞下粥食前一日三四

服棗肉元亦得

治水瀉徐元敏察院方

南木香 縮砂仁 白木 丁香

同右判如麻豆大每服三四次錢水一盞半

煎至七分食前通口服輕者三四服甚者

類聚

三十六

五六服虛冷人加附子半兩三四服其汁
固腸元治臟腑滑泄晝夜無度雞水一匙
吳茱萸揀淨黃連去鬚鶯粟殼去穢
右三味等分醋糊元如梧桐子大每服三
十元米飲下空心食前服得効方同

斷下元治暴瀉孫盈仲方

神麴旨兩微炒吳茱萸綠色者揀淨壹兩泡洗七遍

右二味為細末以酸米醋為元如梧桐子
大每服五十元至一百元空心食前米飲

湯下

加訶子四柱散得効方名加治臟腑虛怯本味四柱散

氣衰弱脾胃不快不進飲食時加洩利晝夜

不息

人參壹兩白茯苓壹兩附子壹兩炮木香

半兩紙包煨過訶子半兩濕紙包炮取皮用

右為細末得効方每服二錢棗葉筒生薑

二片煎至六分服

荳蔻散治滑洩神効因荳蔻真熟半兩錢五分和干

陳粟米

壹兩〇得効方

肉苳蔻

半兩麩裏煨

五味子

兩半赤石脂

研半兩

右同為細末每服二錢

得効方

粟米湯飲

調下日進三服

大斷下圓史仲華云渠乃伯史防禦得此効

方光堯御府所處

附子

貳兩炮

細辛

壹兩半

乾薑

三兩炮

良薑

三兩炮

肉苳蔻

貳兩

白龍骨

三兩

赤石脂

三兩

牡礪

貳兩火煨

秤酸石榴皮

醋煮乾為度焙乾三兩

右為細末糊為圓如梧桐子大每服三十

元白湯下楊氏方加訶子

貳兩桔了白礬貳兩

治瀉久不効者老人尤宜服右用大附子一

箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁圓如

梧桐子大噉焙乾每服三十圓米飲湯下

不乾恐麻人

治瀉唐仲舉

人參

夫

茯苓

小

肉苳蔻

麩包煨

阿子肉

等木

香

減半

右爲細末糊圓如梧桐子大每服三五十
圓米飲湯下小兒如黍米大量大小加減
服之

補脾圓治滑泄

白朮 赤石脂

肉苳蔻

麩包

川厚朴

粗

皮姜汁 川白姜

炮各壹兩

葶撥

炒

神麩

炒

麥蘖

炒附子

炮去皮臍各半兩

右爲細末醋糊爲圓如梧桐子大早晚

服

方作且曉

食前各五十圓陳

醫方大成集珍方永類鈞方無

陳米飲下

又方其効勝前吳茱萸不以多少揀淨用大
獾猪臟壹兩條以茱萸實滿扎定兩頭熟
炭火煮令極爛研細圓如梧桐子大早晚
食前各以米飲吞下五十圓

葶撥元治滑泄甚妙

葶撥 川薑

炮

丁香

不見火

附子

炮去皮臍

吳茱

黃 得効良薑

胡椒

已上各壹兩

山茱萸

得効方

核草 葶蔻

去皮已上各半兩

右為細末棗肉圓如梧桐子大食前陳米
 飲下五十圓日進三服廬州知錄周汝功
 嘉禾人乃尊守求嘉時勿苦滑泄服此藥
 果有效其方董發運闕有序多不復錄上
 二方亦周糾所傳也

治泄瀉臟腑不固只一二服取效老人小兒
 尤宜服便血或痢皆可用白石脂真者炭
 火煨通紅取出放冷研細米飲調下二三
 錢

治殮泄洞利不止

白茯苓壹兩南木香半兩紙裏炮

右二味為細末煎紫蘇木瓜湯調下二錢

七吳內翰母夫人服之大有功效

茱萸斷下圓治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉半兩炒縮砂仁一分青附子炮去皮壹分赤石脂

兩肉荳蔻壹分吳茱萸二兩炒川薑兩半

右為細末麵糊為圓如梧桐子大每服五

七十圓米飲下食前得効趙從簡通判甲

辰年丁母憂食素之久苦瀉不止日七八
 行首尾幾年每服它藥不過一二月復作
 得此方而愈後數年間遇瀉服之又効
 治臟腑張醫升之傳鷹爪黃連不以多少礮
 為細末川煨熟去皮大蒜圓如梧桐子大
 每服三十圓或五十圓米飲送下

養婆湯治脾胃虛損臟腑泄瀉不進飲食大

有神効韓倅子髦方

川烏

炮去皮臍

梓朴

去粗皮薑汁製

乾姜

炮各等分

甘草

炙

之

木

瓜

霜

食

藥

丸

散

膏

右為粗末每服四大錢水壹盞半生薑五

片棗二枚煎至八分食空服看病證緊慢

增減藥味

神授固治臟腑葛樞密傳

南木香

二錢

肉荳蔻

壹兩

麩

裏煨

小兒

即

右二味為細末煮棗為圓如梧桐子大每

服三五十圓米飲下不以時候

滁州趙使君云其女年甫周歲忽苦臟腑每

所下如雞子黃者半盆許數日之間幾至
 百往漸作驚風證有一士大夫教以鍾乳
 粉二錢以棗肉和搜令取意食之不然以
 濃煎棗湯調鍾乳服亦可以兒小只用壹
 錢已平復矣傳方者云它日或作少瘡瘍
 不足慮兒于清老年三歲過鎮江時病久
 瀉危甚用此法服至半兩遂安亦不生瘡
 止吐瀉字文尚書傳此方甚妙

乾木瓜半兩 霍香葉半兩 良薑半兩

右為麤末分作二服每服用水二大盞煎
 至壹盞空心食前服併滓再煎壹服

暑瀉

治伏暑暴瀉兼去暑毒趙從簡親服立効

枇杷葉去毛三錢 生薑三錢 鶯粟殼去穢帶三錢

右三味細剉用小二大盞蜜壹合酒半合
 粟米百餘粒同煎至壹盞以下溫服壹服
 即愈

穀神散治夏月暴瀉

楮實

青者蒸膏次

甘草

青兩

陳倉米

壹升

薑

壹兩

右為細末飯飲調下

治夏秋間暑瀉不止右以理中湯下駐車圓

治赤痢章教授方煎四物湯下駐車圓病甚

者駐車圓一貼只作壹服

棗附圓治臟寒滑泄不思飲食華宮使傳用

正坐大附子壹箇煎棗半斤同於銀石器

中慢火煮上留水兩指水乾旋添湯煮兩

三時取出切作半箇再煮候至晚棗爛壞

將附子溫水洗剝皮去臍切作薄片焙乾

擣為細末別煮棗為圓如梧桐子大每服

三四十圓米飲空心服患滑泄垂死者皆

獲康愈

玉連圓治脾積下痢蠱痢同

木香

半兩

訶子

半兩

黃連

一斤

炒

右為細末研粳米飲糊為圓如梧桐子大

每服一伯元米飲下空心食前日進二服

真人養臟湯治一切痢同

丁香 木香 肉荳蔻 麩裏煨 去麩 當歸 洗去蘆

白茯苓 去黑皮 鶯粟殼 去頂尖 帶炙 人參 去蘆 各壹兩 二錢半

揀草 壹兩 烏梅肉 一錢 酸石榴皮 陳皮

夫赤芍藥 黃連 去鬚 白芍藥 厚朴 去蘆皮

汁製 乾薑 炮裂 阿膠 蛤粉炒 地榆 訶子 炮去核各

半七錢 右壹十九味碾為麩末每服五錢水壹盞

半煎至八分去滓通口服食前兩服滓再

作一服

治瀉不止神妙木香煮散同

木香 壹兩 甘草 半兩 萊菔 二兩 去枝梗 鶯粟殼 四兩

片頂帶 右件散咀每服三錢水壹盞半煎至一盞

去滓稍溫服食前

直指方

泄瀉證治

理中湯治腸胃虛弱滲漉有聲泄瀉頻併

人參 白朮 乾薑 甘草 炒各一兩 加伏苓 川厚朴 三兩 製各

右剉細每服三錢空心煎服

調中散治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉 縮砂 蓬朮 炮乾薑 炮肉桂

茴香 炒草果 各半 麥牙 炒益智仁 橘紅

各三 蒼朮 炒神麩 炒甜梗 各壹兩 甘草 炙三錢

右末每服三錢薑棗并少塩煎服

肉蔻散治脾虛腸鳴泄瀉不食

大肉豆蔻 壹枚剉小窰子入乳香二小塊 在內以麩裏煨麩熟為度去麩

右末每一錢米飲調下

治要除濕湯治風邪泄瀉加辣桂寒邪泄瀉

加乾薑良薑通用加木香 方見霍亂門

香薷剉散 方見諸 治傷暑泄瀉更增伏苓

平胃散治傷濕泄瀉

橘紅 厚朴 製各三 蒼朮 炒五 甘草 炙壹兩

右剉細每服三錢薑棗煎服

又法以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎

暑瀉濕瀉諸證皆驗

黃連阿膠圓治暑瀉熱瀉方見咳用五苓散

送下方見水腫門

又洞泄方車前子末米飲下經驗秘方同

藥皮湯治協熱泄瀉亦治血痢更治小兒

藥皮三兩黃芩二兩黃連壹兩

右判每斤四錢水大蒸煎七分入阿膠末

半錢再煎少頃溫服得効方同

薑附湯治冷證泄瀉方見諸寒門木附湯方見諸濕門

通用

大已寒圓治虛冷腸鳴滑泄○澹寮方治久

寒積冷臟腑虛弱心腹疼痛脇肋脹滿泄瀉

腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨

勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脈短四肢怠墜

良薑澹寮方乾薑炮各六兩肉桂澹寮方革擦

各四兩

右末麵糊圓桐子大每五十圓得効方三圓空心

米飲下醫方大成集成南北經驗方同

真人養臟湯治冷熱不調泄瀉裏急後重

鶯粟殼

去筋萆蜜炙一兩八錢

木香

各八錢

白芍藥

訶子肉

六錢

人參

白朮

當歸

各三錢

炙肉桂

各四錢

右麤末每服二錢薑棗煎食前服先用縮

砂煎湯下感應圓

方見脹滿門

俟其積消然後

服此○得効方治大人小兒腸胃虛弱冷

熱不調臟腑受寒下痢泄瀉或便膿血有

如魚腦裏急後重臍腹疔痛日夜無度胸

膈痞悶脇肋脹滿全不思食及治脫肛墜

下酒毒便血諸藥不効者並皆治之鶯粟

殼

大葶蓋三兩六錢

人參

當歸

去尾各六錢

皮

訶子

木香

白芍藥

肉薑薤

裏

煨白朮

白芍藥

甘草

右剉散

每服二大錢水一錢半煎至八分去渣食

前瀝服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立

愈忌酒麵生冷魚腥油膩如臟腑滑泄夜

起久不瘥者可加炮附子三片煎服此的

有神効或有積用縮砂煎湯下感應圓二
七粒俟其積消然後服此

雞舌香散治殮食生冷久為冷積

良薑二兩淨桂木香淨益智仁炒天會烏

藥各壹兩甘草炙半兩

右末每二錢入少揅沸湯點吞感應圓

三稜散酒食傷積用此

京三稜炮蓬莪朮炮益智仁淨甘草炙青

皮去白各一兩白伏苓四兩

右末每二錢少揅煎吞感應圓治傷食泄

瀉俟酸臭出盡即服固腸散止之

固腸散治冷瀉腸滑及下痢頻併外

鶯菜殼去筋萼壹兩陳米炒壹兩乾薑炮甘草

炙各二錢肉豆蔻生二錢木香壹錢

右末每二錢薑棗煎食前服小

實腸散治泄瀉不止

川厚朴製一兩肉豆蔻壹兩訶子炮縮砂橘

紅蒼朮炒伏苓各壹兩木香半兩甘草炒四錢

右麓末每三錢薑棗煎服手足冷加炒乾

薑醫方大成集成袖珍方永煥鈐方同

安腎圓方見水腫門治腎泄腹痛無定處似痢非

痢骨痛面鰲腰脚時冷用和劑七氣湯送下

方見諸氣門

震靈丹治腎泄證候同前

禹餘糧火煨醋淬不計遍下頭代赭石如

修赤石脂紫石英并碎以上各四兩入

泥固濟候乾用硬炭一十斤煨通和火的

乳香別研沒藥

五靈脂並去砂石朱砂一

研

右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾

每服三圓用炒故紙入棗煎湯調鍾乳粉

少許空心送下小兒腎泄白膿褐汁面黯

齒脫猥人怯寒震靈丹末人些鍾乳粉以

棗煎炒故紙取熱汁調下

木香散治脾腎俱虛泄瀉

肉荳蔻麩裏紙煨故紙炒白朮各半白伏苓兩

木香 甘草 各壹分○得效方各二錢

右判細每三錢食前薑棗得効方生薑三片紅棗二枚

煎溫服

二神圓治脾腎俱虛泄瀉不食

破故紙 四兩 肉豆蔻 二兩

右末川肥棗蒸爛取肉研膏夾和杵圓桐

子大每服四十圓清米湯下若飯食後常

一泄服此頓愈○得効方右為末川肥棗

四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛去薑

取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵圓

如梧子大每服三十圓 醫方大成集成南

丞類鈴方壽域神方 塩湯下立効弱甚加

茯苓二兩木香一兩玉機微義肉豆蔻九

治腎泄久不愈脉沉細無力者効破故紙

炒 肉豆蔻 製裏煨 右為末棗肉為力桐子

大飲湯下空心本事方破故紙 四兩 肉豆蔻

二名二神丸治脾腎虛弱 其說正兩

當歸厚朴湯治肝經受寒面色青慘厥而泄

利

當歸炒厚朴製各官桂三兩良薑五兩

右錢散每三錢食前服

朱氏集驗方

泄瀉

治諸色瀉痢方

蜀醫本

夏月臟氣不和而渴宜

以香薷湯調胃苓散若有裏急後重宜

進胃風湯加枳殼仍以麴炒去穰若有

積滯宜進蘇感丸若水瀉宜進酒蒸黃

二連丸

車前散治水瀉

車前子炒

右每服二錢壽域神方衛生易簡熱米飲

下空心○得效方治暴瀉不止小便不通

車前子右為末每服二錢米飲調根葉亦

可立效

固腸丸治泄瀉

三山曾大鑿水

末酸漿

附子炮去皮白茯苓一兩乾薑炮半大黃連

去鬚木香切片各半兩

右水二碗煮干曬為末麵糊元每服百粒

米飲下

棗肉丸治泄瀉兼治腎洩腎泄五更溲泄是也

破故紙四兩木香壹兩肉豆蔻二兩

右細末燈心煮淮棗去皮核和丸如梧子

大每服三十丸人參薑湯下食稍空或

午前塩酒塩湯吞下

二宜丸治泄瀉五苓散與理中丸同煎服或

以五苓散下理中丸亦好二方並載梁氏總要方

香茸丸治日久冷瀉香茸

乳香三錢鹿茸半兩酒肉豆蔻壹兩

在內麩錢安乳香每筒作兩片

右為細末陳米飯丸每服五十丸空心米

飲下

豆附散專治脾弱泄瀉不出

大肉豆蔻三箇麩錢附子八錢

右件咬咀分作三服水一盞半薑五片煎

入分去滓溫空心服

治大便虛滑不禁方平胃散水煎不著薑棗

入大理中丸同煎化服便住

肚蒜丸治水洩 丁必卿云渠每遇五更必

水洩一次百藥無効服此遂安獮猪肚半

枚淨洗去脂膜入大蒜在內以肚干滿為

度自晨至晚以肚蒜糜爛為度杵成膏子

入平胃散同杵丸如梧桐子大每服三五

十煎湯或米飲空心下

得效方同

猪肚丸治臟寒洩瀉先用厚朴附子二味姜

棗煎早晨服此猪肚丸

川烏炮附子炮各二兩乾薑炮白朮炒厚朴各

兩良薑炒肉豆蔻煨革撥 禹餘糧火服醋淬

縮砂仁 丁香 桂心各壹兩

右為細末用獮猪肚壹隻淨洗以川椒壹

兩去目茴香壹兩大麩二兩入猪肚內用

線縫定酒醋煮爛取出川椒茴香大麩焙

乾為末均和前藥以猪肚子杵和得所為

丸如梧桐大每服五六十九空
心米飲下
得効
方同

嚴氏濟生方

泄瀉

加味五苓湯治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注
下或煩或渴或小便不利

赤茯苓去澤瀉木猪苓去肉桂
不見火

方去白木各壹兩車前子半

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大生薑成壹盞

五片煎至八分去滓溫服不拘時候或進

不來復丹亦可醫方集成南北經驗方

火輪圖治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

四乾薑炮附子炮肉豆蔻麩裏煨○澹寮

右等分爲細末米糊作粽爲圓如枳椇

子大每服五十圓空米飲送下醫方大

南北經驗方同四澹寮平

白木附子湯治腸胃虛濕腸鳴泄瀉或多自

汗白木

白朮 二兩 附子 炮 茯苓 去皮

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑七片棗

子壹枚煎至七分去滓溫服不拘時候

四柱散治元臟氣虛真陽耗散兩耳常鳴臍

腹冷痛頭旋目暈四肢急倦小便滑數泄瀉

不止 方類 附子 炮 人參 木香

白茯苓 去皮 附子 炮 人參 木香

白茯苓 去皮 附子 炮 人參 木香

白茯苓 去皮 附子 炮 人參 木香

○醫方大成

右為細末 大成 每服三錢水壹盞半

大成每服四錢水壹盞 生薑五片

片棗入鹽少許煎至七分食前溫服滑泄

不止加肉豆蔻訶子煎名曰六柱散

南此經驗方袖珍方與大成同

禹餘糧圓治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石 煨 赤石脂 煨 龜骨 煨

訶子 煨 乾薑 炮 肉豆蔻 煨 附子 炮

子柳大皮

右等分爲細末醋糊爲圓如梧桐子大每

服七十圓米飲送下食前醫方大成集

珍方永類

加味治中湯治脾胃不足飲食不節過食生

冷腸鳴腹痛泄瀉注下

乾薑炮白木得効方澹青皮去陳皮去

砂仁各壹人參去甘草炙

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑五片棗

子寺枚煎至七分去滓溫服不拘時候或

兼進感應圖永類

修月魯般經後錄

舟車神祐丸治泄水濕婦人胎前產後加琥

珀宣通氣血治中滿腹脹喘嗽淋瀝水氣壅

腫留飲癖積久新瘧痢風熱燥鬱肢體麻痺

走疰疼痛婦人經病帶下等病氣血壅滯不

得宣通並皆治之治與神佑丸同

甘遂 芫花醋拌 大戟各半 黑牽牛頭末

大黃二兩一青皮去穢陳皮去穢檳榔各半木

香二錢

右為細末和勻滴水為丸如小豆大每服

五丸女服加五丸至快利為度止後服並

得效方亦用黃藥枳殼枳殼

得效方亦用黃藥枳殼枳殼

泄瀉

風證香薷香蘇散治傷風自汗殮泄每服四

錢生薑木瓜煎服方見傷寒門

不換金正氣散體虛傷風冷瀉加官桂烏梅

方見傷寒門

胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄

瀉注下膈中虛滿大腸受濕下如豆羹汁或

下瘀血日夜無度並宜服

人參去白茯苓去芎藭去桂心不見當歸

嚴氏濟生方白芍藥去白木炒甘草炙

右等分剉散每服四錢水壹盃半入粟米

百餘粒煎至七分去滓空腹稍熱服胃氣

弱者不宜多服

火炊圓治風氣行於腸胃泄瀉火炊草壹味
為末醋糊圓每服三十圓空心服

寒證理中湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒

泄瀉青黑兼治傷寒挾寒而利臍下冷名鶩

溘證効

人參 白朮 乾薑 甘草 加茯苓

厚朴 薑製各二兩

右剉散每服三錢水一盃煎空心服

加味治中湯 方見嚴氏濟生方

暑證香薷散治傷暑煩渴引飲所下如水 方見諸暑門

胃苓湯治傷暑煩渴引飲所下如水

五苓散 方見諸暑門 平胃散 方見脾胃門

右二錢合和紫蘇烏梅煎湯下未効加木

香縮砂白朮丁香煎服來復丹亦可 方見

門或感寒濕水泄平胃散 ○醫方大成治

感暑夾食泄瀉煩渴用平胃散五苓散二

藥相半打和水煎入搵少許若是末藥以

湯調之亦可醫方集成袖珍方類鈔方同玉機微義治

夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散平胃散右合和姜棗煎空心服

通苓散分利水穀解煩熱止泄瀉

猪苓去皮白朮去蘆澤瀉去毛赤茯苓去皮車前子

木通 茵陳 瞿麥 右剉散每服四錢水一盃半燈心麥門冬

煎服

六和湯治暑瀉小便赤澀方見諸暑門

水浸丹治感暑口乾煩渴頻瀉方見霍亂門

濕證藿香正氣散治腰脚冷痺小便自利肢

體重着所下黃黑方見傷寒門

胃苓湯治傷濕瀉每服二錢蘇葉三皮食塩

少許調熱服方見嚴氏

白朮附子湯方見嚴氏麩芎圓治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭 神麩 白朮 附子各等分

右為末糊圓如梧子大每服五十圓米飲

七情加味藿香正氣散治飲食中憂怒傷脾

腹內膨滿泄瀉頻併或作晨泄加丁香縮

砂良薑南木香各半錢生薑三片紅棗二

枚煎効

木香散治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄

米穀不化飲食無味肌肉瘦痺心多嗔恚婦

人產後虛冷下泄及一切水瀉冷痢

木香 破故紙各一兩 良薑 砂仁 厚朴

薑製各三分 赤芍藥 陳皮聖濟總錄去白焙 肉桂總錄

去麤 白朮各半兩 胡椒 茱萸各壹分○總錄湯洗三五

遍 肉豆蔻四箇○總錄去殼 檳榔壹箇○總錄

右為末每服三大錢用不經水猪肝四兩

批薄重重糝藥漿水一碗入醋總錄半合 茶脚

少許入甌蓋覆煮熟入鹽總錄壹錢 葱白三箇

生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食

之初微瀉不妨此是逐下冷氣少時自住

經年冷痢滑泄只是壹服渴則飲粥湯忌
 冷油膩如不能食冷則漿水煖食之若只
 用漿水煮猪肝為圓如梧子大每服五十
 元用粥飲下亦効若暴瀉只壹服
 熱證黃連香薷散治熱瀉溏利大便熱煩燥
 小便赤喜飲冷香薷散每壹兩加宣連五
 錢剉碎合和燈心二十莖車前草二根同
 煎方見諸暑門
 五苓散治法湯引同上方見諸暑門

黃連阿膠圓每服五十元米飲下空腹服方見

咳嗽門

升麻葛根湯小柴胡湯治傷寒身熱目疼煩

渴泄瀉二藥和合用生薑陳米烏梅煎服

立効方並見傷寒門

藥皮湯方見直指方

調胃承氣湯治大實熱不利讖言此有燥屎

也夫泄瀉反用大黃者乃因所利而利之此

治熱瀉也非大實勿妄輕用之方見傷寒門

冷證去麻黃五積散炒過名和氣飲治脾胃
 宿冷腹內切痛或外感風寒內傷生冷泄
 瀉黃白色不止或肝經受寒面色青慘厥
 而泄利生薑三片菹梅壹箇紅棗二枚同
 煎大効方見傷寒門
 豆附圓治丈夫失婦人腸胃虛弱內受風冷水
 穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸
 藥不効者此藥主之

肉豆蔻炮四兩 木香二兩不見火 白茯苓四兩
○澹寮方無

○澹寮方去皮 乾薑炮四兩 ○澹寮 附子
醫方大成焙 炮去皮臍○澹寮方大成二兩
寮方大成四兩 肉桂去麤皮 丁香一兩不見火
 右為末薑汁糊為圓如梧子大每服五十
 圓加至一伯圓薑湯吞下粥飲亦可醫方集成
南止經驗方抽珍方 空心食前服
永類鈴方與大成同
 薑附湯治下泄如水或青或白臍腹痛手足
 冷脉細欲絕漸漸短氣由陽氣暴絕為陰所
 迫則注下不止陽復則生不復則死又不止
 灸氣海百壯傷寒虛證鶩澹亦效方見傷寒門

大已寒圓 方見直 加味四柱散 方見是

加味三建湯治洞泄不止

大川烏 蘇附 天雄 三味並炮鹽 木香

肉豆蔻 裂 訶子 去核各

右剉散每服三錢生薑十片紅棗二枚搗

梅一箇陳米一撮同煎空腹熱服未効仍

服來復丹

來復丹治同上 方見癩

茱萸斷下圓 方見是

猪臟圓治臟寒泄瀉不進飲食氣體倦怠

吳茱萸 淨去枝梗不以

右用猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸

入臟內兩頭扎定慢火煮令極爛用甌蒸

熟尤好將二味於臼內杵下令極細圓

如梧子大每服五十圓米飲下

猪肚圓 方見朱氏

椒艾圓治臟腑虛寒泄痢不止

烏梅 去核二兩半 揉成無滓艾 壹兩 川椒

妙去 乾薑 赤石脂 炮製各

右除烏梅外同為末將蒸過烏梅肉研勻

更入熟炭肉蜜少許和圓如梧子大每服

二十圓米飲下

菜萸湯治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸 取淨不以多少

右用白水煮去滓入塩少許通口服蓋菜

萸能煖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖

熱不能分解清濁也

大理中圓治大便虛滑不禁每一圓用平胃散一貼煎化服便止加塩梅同煎尤妙

人參 白朮 乾薑 甘草 各等分

右為末煉蜜圓如指頭大

六君子湯治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食

腸鳴泄瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮 肉豆蔻

濕紙裏煨熟剉碎以厚紙盛壓去油 訶子 煨去核各等分

右剉散每服三錢生薑三片細棗二枚煎

服或為末熟煑湯調服亦可

養氣丹治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十

圓空心米飲吞下多服收功

方見痢門

冷熱不調參連圓治腸胃虛弱冷熱不調泄

痢腸鳴日夜無度

艾葉用糯米糊拌勻焙乾薑炮取末二兩

取細末秤二兩半升半慢火宣連壹兩半判如麻豆大用吳

熬成膏揀去菜訶子煨去核木香壹兩半別用黃

莫不用未將木香薄水壹升慢火煮人參去蘆白朮

盡水去黃連不用切焙乾

烏梅去核焙乾百草霜別研白茯苓去皮酸石榴

皮炒當歸洗焙各兩半地榆已上各壹兩赤石脂壹兩

三龍骨一分火煨阿膠二兩鷲粟殼二兩

右為末將前項艾膏和為圓如梧子大每

服五十圓陳米飲下

戊巳圓方見三

腎泄安腎圓治腎洩腹痛無定處似痢非痢

骨痛面鰲腰脚時冷用七氣湯送下安腎

圓方見諸虛門七氣湯方見心腹痛門

震靈丹治同前每服三十圓炒破故紙棗子

前湯調鍾乳粉少許空心送下小兒腎泄

白膿褐汁面黧齒脫俚人怯寒震靈丹末

入些鍾乳粉以棗煎炒破故紙取熱汁調

下效方見痢冷門

金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺

精一切虛冷之證並皆治之方見痢冷門

脾泄炙肝散治久患不愈

白朮 白芷 白芍藥 桔梗

右等分爲米炙搗肝醃服

和氣散即除麻黃五積散治久虛脾泄大効

方見傷寒門

朴附圓治脾圓虛弱久患脾泄冷瀉不止及

翻胃惡心臟腑滑泄

厚朴去麤皮薑汁製壹兩 絲附子炮去皮臍淨壹兩 神麴炒

錢乾薑炮三兩

右爲末酒煮麵糊圓如梧子大每服三十

圓空心食前米飲或鹽湯下

脾腎泄木香散方並見直指方

積證香蘇散治食傷脾胃噫生熱氣及所泄

穢氣殊甚或腹緊塊痛水煎吞盧氏感應

圓每服三七粒立效久患豆積泄瀉不止

方見傷寒及積聚門

縮砂香附湯治傷食成積下瀉與平胃散合

和每服二錢紫蘇葉食塩煎湯調常服有

效方見諸氣及脾胃門

酒泄虛者香茸圓治飲酒多遂成酒泄骨立

不能食但再飲一二杯泄作幾年矣

嫩鹿茸草火燎去毛酥炙黃肉豆蔻火燥生麝香研白

右爲末白陳米飯爲圓如梧子大每服五

十圓空腹米飲下熱者酒蒸黃連圓方見諸痛門

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥

芽神麴各五錢爲末空腹米飲調二錢立

愈

晨泄又名瀼泄香薑散方見三因方

五味子散治五更天明溏泄一次名腎虛泄感陰氣而然

五味子

揀去梗

吳茱萸

半兩○醫方大成集成經驗良方永

類鈐方玉機微義細粒綠色者

右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲

調下

袖珍方同

食前空心服或加破故紙炒香

肉豆蔻煨裂為末蒜膏為圓如梧子大每

服三十圓米飲下大効○壽域神方治白

瀉不止用五味子二兩吳茱萸五錢同炒

香熟為末每服三錢陳粟米飲湯空心臨

卧調服七日痊愈

衛生易簡方同

滑泄大斷下圓治下痢滑數肌肉消瘦飲食

不入脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由

脾胃虛耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主

以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛

此為難治略能食者生

附子

炮

肉豆蔻

牡蠣

細辛

薑

薑

炮

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴

皮醋煮乾為度焙白礬枯訶子大核各

右為末糊圓如梧子大每服三十圓粟米

湯下此藥治痢疾

荳蔻飲方見是藥方治痢疾

乳豆圓治滑泄不止諸藥無効入胃胃燥

肉豆蔻生為末治痢疾

右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥

末為圓如梧子大每服五十圓澹寮方空

腹飯飲下此藥治痢疾

華撥圓方並見是固腸圓齋醫方

暴瀉硫黃散治所下如破水

生硫黃 白滑石

右為末溫水調下立止

車前散方見朱氏

針頭圓治夏月水瀉不止

大巴豆一粒

右以針刺定燈上燒存性不可過研細用

蠟如小豆大蘸些油燈上炙令鎔圓巴豆

灰作膏圓倒流水吞服食前壹服効

神麩圓治暴瀉不止

神麩二兩 柴萸半兩湯泡七次

右為末川醋糊圓如梧子大每服四十圓

食前米飲下

肚蒜圓方見朱氏集驗方

粟殼圓治暴瀉

肉豆蔻炮 粟殼去赤臉蒂萼淨炙

右為末醋糊圓如梧子大空腹米湯下三

十圓

單方鍾乳粉一味棗肉為圓治久瀉極甚棗

湯下小兒亦可服

通治真人養臟湯方見直指方

香連圓治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄

瀉煩渴米穀不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脇肋

脹滿或下痢膿血裏急后重夜起頻併可思

飲食或小便不利肢體怠惰漸即瘦弱並宜

服之

黃連去蘆鬚二十兩用吳茱萸壹斤木香四兩

八錢不見火

右為末醋糊圓如梧子大每服二十圓飯

飲吞下空腹食前日進三服

人參散治瀉後煩渴方見嘔

澹寮方

泄瀉

方書之瀉痢與經中之洞泄飡泄溇泄溢泄

濡泄水穀注下等其實一也惟是受病不同

與夫人之稟賦異耳所謂寒甚為泄春傷於

風夏必飧泄腸虛則泄即其病源也凡治泄

瀉須先理中焦理中湯圓等是也其次分利

水穀五苓散等是也治中分利而後未安却

與斷下之劑即用禹餘糧赤石脂等圓散也

王機真論云五虛者死脉細皮寒少氣前後

不禁飲食不入其證固惡然而藥粥入胃泄

瀉止亦能生也又金匱云六腑氣絕於外者

手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者不利不

禁手足不仁又曰脉沉細為下重脉大為未
 止脉訣則又曰下利微小却為生脉大浮洪
 無差日斯皆前哲不相矛盾之至論學者自
 當詳審焉
 理中圓之理用高棅醫心方論謂開胃
 小入參 乾薑 煨 白朮 炒各 甘草 炙
 右為細末煉蜜為圓彈子大每服壹圓生
 薑湯嚼下一方加炮熟附子壹兩如前製
 服治中寒嘔泄等證名附子理中圓或圓

如梧子大亦可

加味四柱散治元臟虛弱真陽耗散兩耳常
 鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢急倦小便滑數
 大便泄瀉

人參 茯苓 去 白朮 炒 木香 不 附子 炮去

右細末每服三錢小壹盞半生姜五片入
 盞少許煎至七分食前溫服滑瀉不建加

肉豆蔻 呵子煎

附童圓治男子婦人臟寒滑泄或云小兒吐

瀉亦効

附子

炮去皮臍

伏龍肝

少用

肉豆蔻

生用

右為細末研飯為圓空心飯飲吞下每服

三五寸粒

訶犁勒圓治男子婦人臟腑滑泄

大訶子

煨去核

附子

炮去皮臍

肉豆蔻

赤石脂

龍骨

煨不白

木香

乾薑

烏頭

炮

右為末粟米粥研爛為圓空心粟米飲下

二三十圓

四神圓治脾泄腎泄

肉豆蔻

生二兩

破故止

炒四兩

木香

不火半兩

茴香

炒壹兩

右為末生薑煮棗肉為圓一方只用的二

味謂之二神圓亦主脾腎泄又一方用破

故紙肉豆蔻神麩麥蘖如前作圓治脾腎

虛食不化頻次登瀉等證亦名四神圓○

醫方大成右為末生姜煮棗肉為圓如枯

桐子鹽湯下一方去木香茴香人神曲麥

藥如前作圓醫方集成南北經驗方

有人久患泄瀉以暖藥補脾及分利水穀日

種治之不愈醫論之心脉獨弱以益心補

脾藥服之遂愈蓋心火也脾土也火生土

脾之旺賴火之燥心氣不足則火不燥脾

土受濕故令泄瀉今益心補脾而又能去

濕豈有不効哉又有一種泄瀉作冷作積

作心氣不足治之及服硫黃附子皆不効

因服火炊圓而愈腸胃有風冷故也胃風

湯兼服暖藥亦佳又有一種脾泄瀉服泰

山老李炙肝散而愈乃白芷白朮白芍藥

桔梗四味也醫餘

有人每晨早起須大瀉一行或時腹痛或不

痛空心服熱藥亦無効後有智者察之令

於晚食前更進熱藥遂安自此常服竟無

恙蓋暖藥雖平且空心服餌至晚藥力已

過一夜陰氣何以敵之於晚間再進熱藥

則一夜暖藥在腹遂可以勝陰氣凡治冷

疾皆如此醫餘

暑月破腹一曰傷暑二曰傷冷物食及瓜菓
飲水之類三曰夏季心火旺心經熱則小
便不利兼之腸胃之水穀不分傷暑而瀉
者心躁頭痛作渴宜服香薷飲烏金散傷
冷物而瀉者腹痛水瀉穀食不化宜服暖
藥如附子及理中圓二氣丹正元丹紫蘇
圓之類水穀不分者宜服大順散五苓散
二藥專分清濁暑月多此疾故人多用之

凡瀉不可急以熱藥止之恐成痢醫餘
治水瀉徐元敏察院方

南木香入縮砂仁白木各壹兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半煎至

七分食前服虛冷人加附子半兩

又方治臟腑瀉利肉荳蔻剉作甕子入通明

乳香復以末塞之川麴少許裹豆蔻煨焦

黃為度二物皆碾末以茶末對烹之大全集

有人日逐飲酒遂成酒利骨立不食但飲酒

壹兩蓋利作幾年矣因服香茸圓一貼遂
止蓋麝香能治酒毒川茶木性熱之藥
虞雍公并甫紹興間赴召得泄痢夢至一處
人類神仙居壁間有韻語藥方詞曰暑毒在
脾濕氣連脚不瀉則痢不痢則瘧獨煉雄
黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別法治
療醫家大錯夢回卽錄之蓋治暑泄方也
如方服之遂愈醫說
病水泄青白或黃白或米穀不化腸鳴腹痛

者此傷冷也爲洞泄寒中又爲霍亂吐瀉
其脉細弱而緊宜理中圓平胃散調中湯
以溫補之盛則金液丹朝真丹主之或藥
入則吐山者內陰盛也川湯者當以冷服
用圓者以地漿服熱因寒用之法也
病水洩下深黃及有完穀小便赤腹脇似脹
滿而痢痛煩躁悶亂渴而喜飲者此傷熱
也爲挾熱下利其脉洪大而數宜駐車圓
參連散藥皮湯以和之甚則三黃圓調胃

承氣湯挾熱下血者藥皮湯主之
 病洩瀉色黃而有沫腸鳴腹脇脹滿時微作
 痛者為冷熱不調其脉沉緊而小數也服
 熱藥則轉甚戊己圓杏連圓主之下部注
 悶裏急後重者必欲變膿血利之則愈
 病暴泄注下或青白或黃白米穀或化或不
 化腹脇或脹或不脹或痛或不痛但意生
 熱氣全不思食因與溫補諸藥而後轉有
 異證者有所傷也此為殄泄其脉外虛而

內實關脉沉且緊也消積圓不二圓以化
 之甚則用備急圓不二圓用砒不可多服

又春傷於風夏必殄泄又風氣行於腸胃則
 暴泄下利其脉浮緩而虛也並宜服羌活
 安中湯胃風湯荆黃湯訶梨散
 病赤白下痢或膿多血少或膿少血多皆為
 有積或先挾熱泄瀉更服溫藥因變成血
 下利關脉沉緊按之有力而小疾也並宜
 先與消化積滯才微利過即以香連圓駐

車圍戊巳圓便愈積滯用消積潤不二圓

感應圖淹延惡利川朱粉丹主之集驗方

衛生寶鑑

濡泄

內經云濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳為濡泄夫脾為五臟之至陰其性惡寒濕合寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下為之濡泄法常除濕

利小便也對金飲子注之

平胃散五錢五苓散二錢草薢麩裏煨

右相合作四服水壹觥半薑三片棗二箇

煎一觥去粗溫服食前上都七月間史丞相有此疾三服而愈

飧泄

內經云清氣在下則生飧泄又日久風入胃中則為腸風飧泄夫脾胃土也其氣沖和以化為事今清氣下降而不升則風邪久而干

胃是木賊土也故冲和之氣不能化而令物
完出謂之殮泄或飲食太過腸胃所傷亦致
米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之
而消克之也以
加減木香散主之

木香炒良薑炒升麻去人參檳榔各二錢半

神麩炒二肉荃煨吳茱萸泡縮砂仁二錢

薑炮陳皮各半錢右十一味為粗末每服四錢水一椀半煎

至一椀去粗溫服食前宜加白朮

聖濟總錄

水瀉

內經謂諸厥固泄皆屬於下暴注下迫皆屬
於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱
水穀不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故
令人腹脹下痢有如注水之狀謂之注泄世
名水瀉
治水瀉不止木香散方

青木香 黃連去須炒 訶梨勒皮微炒 龍

骨半兩 厚朴去蘆皮生薑汁炙令紫剉三分

右五味搗羅為散每服三錢匕空心以粥

飲調下日午再服以差為度小兒以意加

減服之

治一切水瀉及冷痢厚朴散方

厚朴去蘆皮生薑汁炙令紫剉一兩 乾薑半生半炮 陳橘

皮湯浸三分 白朮一兩 甘草半生半炙半兩

右五味搗羅為散每服三錢匕空心米飲

調下如霍亂吐瀉新汲水調下日晚再服

治水瀉腸鳴臍腹撮痛代赭丸方

代赭煨赤 乾薑炮 龍骨各一兩 附子炮裂去皮臍三分

右四味搗羅為末研軟飯和丸如梧桐子

大每服三十丸空心米飲下日午再服

治水瀉無度腸鳴腹痛肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼為末一兩 生薑汁二兩 白麩二兩

右三味將薑汁和麩作餅子裏豆蔻末煨

命黃熟研為細散每服二錢匕空心米飲

調下日午再服

治水瀉不止礪砂丸方

礪砂研石硫黃研各壹分鉛丹研半兩巴豆去皮心出

油盡壹寸四枚

右四味先將巴豆霜研細入諸藥同研細

用糯米飯為丸如小豆大水瀉新汲水下

壹丸赤白痢煎乾薑甘草湯放冷下一丸

吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一丸白痢煎

乾薑湯放冷下壹丸不拘時候

治暴注水瀉日夜無度蚪門散方

橡蚪子去刺訶梨勒煨去核黃連去須

右三味等分搗羅為散每服壹錢七米飲

調下食前立效

治水瀉不止木香丸方

木香青錢草烏頭去皮肉豆蔻者知散胡

粉半兩巴豆大者七枚去皮心膜出油盡研

治五味搗羅為細末合研勻糯米軟飯和

丸如黍米大每服三丸小兒壹丸並用冷

萊菔湯下

大... 三... 小... 壹... 煎... 下

治水瀉不止黑神丸方

合... 煎... 下

巴豆

青... 膜... 不出油 杏仁 壹... 枚... 去... 雙... 鎔... 墨... 錢

右三味同研極細以糯米粥和丸如秋米

大每服壹丸冷水下立止甚者再服壹丸

治水瀉不止立効丸方

鈔丹

炒... 半... 錢 草烏頭 壹... 枚... 炮... 裂... 去... 臍... 皮 巴豆 三... 粒... 去... 皮... 心... 膜

出油

盡研

右三味先擣烏頭爲末與二味同研極勻

以麵糊和丸如菘豆大每服壹丸煎陳粟米甘草烏梅湯放溫冷下

治水瀉杏仁丸方

杏仁

湯... 浸... 去... 雙... 人... 皮... 尖... 七... 粒 砒霜末 大鎔墨 巴豆

霜 各... 錢

右四味同研棗肉和丸如粟米大臨卧新

汲水下壹丸

治水瀉白痢小腹痛玉霜丸方

砒霜

研... 細... 如... 兩... 黃... 蠟... 兩

右二味以瓷碗盛重湯煮鎔開以東南柳枝二七莖各長七寸纏細如筋每用兩莖攪藥又轉一頭攪候兩頭並黑黃色乃已又取兩莖依前攪七次了將出藥趁輭作條子收遇病旋於火上烘輭丸如梧桐子大小兒綠豆大空心新汲水下壹丸

治水瀉腸鳴針頭丸方

巴豆壹枚去皮膜 杏仁一枚去皮尖二味皆針割火上燎令存性
右二味同細研約三百轉入大豆末一字

再研壹百轉麪糊和丸如針頭大每服壹丸新汲水下

治水瀉并赤白痢如聖丸方

烏頭端正大者炮裂去皮臍 菘豆
右二味等分搗羅為末新水和丸如菘豆大以丹砂為衣每服五丸白痢煎乾薑湯下赤痢煎甘草湯下赤白痢煎乾薑甘草湯下水瀉用新汲水下小兒一兩丸不計時候

治水瀉方右用青州乾棗十枚去核入莢若

子填滿以麻纏却用炭火燒令烟盡研令

細每服壹錢半匕煎陳粟米稀粥飲調下

治水瀉滑腸氣虛久冷如聖丸方

乾薑炮高良薑炮胡椒去目并閉蜀椒口炒出汗

右四味等分搗羅為末醋煮麵糊和丸如

梧桐子大每服三十丸早晨空心食前粥

飲下

治水瀉不止傷冷虛極黃蠟丸方

硫黃壹兩

右壹味研細先鎔黃臘入硫黃末打勻丸

如梧桐子大每服五丸新汲水下

治水瀉訶梨勒丸方右取訶梨勒不拘多少

以麵裹灰火內炮令赤黃剝去麵取訶梨

勒皮搗羅為末軟飯和丸如梧桐子大每

服二十丸米飲下空腹食前山薑米酒

治暴水瀉不止厚朴散方

厚朴去蘆皮生薑汁炙剉訶梨勒皮各壹兩甘草炙黃

連去須微炒肉豆蔻去殼白朮炒乾薑炮赤茯苓

各三分

右八味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調

下以...

治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不止木香

羌方...

木香炮白朮火煨肉豆蔻人丁香各半乾

薑炮訶梨勒皮取龍骨各一兩黃連去須

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每日空心米飲下三十九日晚再服

治水瀉蕪荑丸方

蕪荑炒黃連去須炒吳茱萸湯洗焙乾乾薑

炮枳殼去穢麩炒半兩縮沙蜜二兩

右六味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐

子大每服二十九溫米飲下

治水瀉腸滑不禁訶梨勒丸方

訶梨勒二兩以麩裏煨去核取皮并麩為末乾薑炮龍骨

赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末以稀麵糊丸如梧桐子
大每服空心以米飲下二十九

治水瀉吐噦徧身疼痛訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核 鹿茸酥炙去毛 桑根白皮剉 地榆

赤石脂 天雄炮裂去臍 龍骨各壹兩 白芷

黃連去須 桂去皮 厚朴去蘆皮塗 白茅根

當歸切焙各壹兩 黃芩去黑心 乾薑炮裂各半兩 肉豆

蔻去殼四枚

右一十六味擣羅為末爛飯為丸如梧桐

子大每服三十九溫米飲下

治水瀉腹痛日夜不止正氣散方

縮沙蜜去皮炒 附子炮裂去皮臍 赤石脂 肉豆

蔻去殼 龍骨 石榴皮焙 甘草炙 人參 地

榆 白朮 吳茱萸湯浸焙乾炒 乾薑炮各

右一十二味擣羅為散每服三錢匕煮粳

米飲調下不拘時以止為度

治水瀉米穀不化晝夜不止白堊丸方

白堊壹兩火煨過 乾薑炮壹兩 楮葉二兩生

右三味搗研為末麪糊和丸如菉豆大空

心米飲下二十九

又方取黃荆葉不限多少陰乾搗羅為散每

服以米飲調下三錢匕

又方取羊蹄根曬乾刮去皮搗羅為散每服

以米飲調下三錢匕

又方取熟艾半斤慢火炒令熟布裏坐之冷

再炒坐

干濡寫

內經曰濕勝則濡寫甲乙經曰寒客下焦傳為濡寫夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕令寒濕之氣內客於脾則不能埤助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡寫

治腸胃受濕濡寫不止肉豆蔻散方

肉豆蔻

去殼

黃連

去須

訶梨勒

炮去核

各三分

白朮

乾薑

炮

赤茯苓

去黑皮

厚朴

去麩皮生薑汁炙膏

右八味持羅為散每服二錢七空心食前
米飲調下日三

治脾胃傷濕瀉寫不止豆蔻散方

肉豆蔻去殼炮 厚朴去麤皮生薑汁炙

右三味持羅為散每服二錢七米飲或湯

調下食前溫服

治腸胃寒濕瀉寫腹內疴刺疼痛當歸散方

飲調服日再

治腸胃受濕瀉寫無度腹痛飲食不化白豆

藜湯方
白豆蔻皮去 訶梨勒炮去核 陳橘皮湯浸去白焙炒
薑炮各厚朴汁炙三分

右五味羅搗篩每服五錢七切薤白三寸

水壹盞半煎至七分去滓空心溫服日再

治濡瀉暴下不止枳殼湯方

枳殼去穢麩炒三分 黃連去須炒 厚朴去麤皮生薑汁炙各

甘草炙 阿膠炙各

水壹盞半煎

治濡瀉暴下不止枳殼湯方

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓空心温服日再

治腸胃寒濕濡寫不止及冷痢色白食不消

化附子湯方

附子炮裂去甘草炙阿膠炙燥各黃連去

皮臍兩炒兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞半

煎至壹盞去滓空心温服日再

治脾胃受濕濡寫不止建脾白朮丸方

白朮三分乾薑三分厚朴去麤皮生薑人參

右四味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下日再

治寒濕濡寫久不差附子丸方

附子炮裂去甘草炙

右二味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空心生薑湯下日再

治傷濕濡寫不定厚朴湯方

厚朴炙

厚朴去蘆皮生薑漬連壹兩

右二味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半

棗二枚擘破煎至壹盞去滓空心溫服日

再如腹痛加當歸三分

治濡瀉不止或冷痢無度附子左方

附子炮裂去皮臍高良薑各壹兩甘草炙到壹分

右三味擣羅為末陳米煮糊丸如梧桐子

大每服二十九米飲下不拘時服

治濡瀉裏急後重數走園檇根散方

檇根皮剉壹兩枳殼去穢麩炒半兩甘草炙到壹分

右三味擣羅為散每服二錢匕粥飲調下

治食前壹服止

治胃虛泄瀉老人冷瀉建脾湯

烏頭炮裂去皮臍叁分厚朴去蘆皮生薑汁炙甘草炙到壹分

薑炮各壹分

右四味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞生

薑二片煎至七分去滓熱服併二服止

飧泄

內經曰清氣在下則生飧泄又日久風為飧
泄夫脾胃上也其氣沖和以化為事今清濁
交錯風邪之氣得以干胃故沖氣不能化而
食物完出夕食謂之飧以食之難化者尤在
於夕故食不化而泄出則謂之飧泄此俗所
謂水穀痢也

治風冷入中飧泄不止脉虛而細日夜數行
口乾腹痛白朮湯方

白朮 厚朴 去麤皮生當歸 切 龍骨 各壹兩

熟艾 兩 炒半

右五味麤搗篩每服四錢匕水壹盞入生

薑兩片同煎至七分去滓空心日晚溫服

治腸胃受風飧泄無度或下黃水腹脇痛悶

地榆湯方

地榆 厚朴 大鹽皮生當歸 切 焙 各三分 艾葉

炒 吳茱萸 湯浸焙 高良薑 各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水壹盞半煎

至八分去滓空心日午溫服

治腸胃風冷殮泄注下腹痛不止乾薑丸方

乾薑炮厚朴去蘆皮生薑汁炙當歸切焙各三分阿膠

炙龍骨各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心棗湯下日午再服

治殮泄米穀完出茯苓湯方黃水與細麻

赤茯苓去黑皮厚朴去蘆皮生薑汁炙黃連去須炒各壹兩

乾薑炮半兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以水壹盞半

煎至八分去滓空心日午溫服

治殮泄水穀不化及諸色痢茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒黃連去須炒等分

右二味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半

煎至八分去滓空心溫服未止再服

治殮泄色白食不消化乾薑丸方

乾薑炮黃連去須炒各壹兩

右二味搗羅為末先以酒壹升微火煎候

可丸即丸如梧桐子大空心米飲下三十

九日午再服

治殮泄氣痢腹脹滿不下食

葦撥半兩肉豆蔻半兩去殼半兩乾薑半兩訶梨

勒半兩白朮三分甘草半兩木香

半生兩炒兩右七味擣羅為散每服二錢匕空心米飲

調下日晚再服

治脾胃氣虛殮泄不止飲食不消雷鳴腹內

疴痛桂心丸方

桂去蘆皮赤茯苓各三分黃連去須

炒一兩麥蘖炒陳麴炒石斛去根乾薑炮當歸

切人參附子炮裂去皮臍蜀椒目并閉汗龍

骨各半兩右壹十三味擣羅為末鍊蜜丸如梧子

大每服三十九空心煖酒下午服米

飲亦得

治泄痢無問老少地榆湯方

地榆剉甘草炙酸石榴皮各三分阿膠炙

各兩

治泄痢無問老少地榆湯方

地榆剉甘草炙酸石榴皮各三分阿膠炙

各兩

治泄痢無問老少地榆湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙三分白石脂研半兩三分赤芍藥三分

龍骨半兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至膏盡去滓空心日午溫服

治腸胃受風久為殮泄下痢嘔逆腹內疝痛

高良薑湯方

高良薑 木香 赤茯苓去黑皮檳榔剉入

參各三分肉豆蔻去殼吳茱萸湯浸焙陳橘皮湯

炒去白縮沙蜜去皮各訶薑炮壹分

右壹十味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半

煎至八分去滓不拘時日三服

治殮泄水穀不分溫脾止腹痛進食豆蔻散

方

草豆蔻去皮乾薑 甘草 高良薑 陳橘

皮湯浸去白

右五味等分剉碎都作一處用胡餅劑裹

糖灰內炮令黃熟取出藥去麤擣羅為散

每服二錢匕陳米飲調下食前服

治泄痢無度訶梨勒散方

訶梨勒 母丁香 各五枚 肉豆蔻 麩裏燒 壹枚 甘草

草 壹錢

右四味搗羅為散米飲調下半錢匕食前

服

治腸胃冷氣殄泄不止木香散方

木香 阿膠 炮炙 訶梨勒 炮炙 黃連 去須炒 各半斤

乾薑 炮炙 吳茱萸 湯浸 龍骨 各壹分

右七味搗羅為散每服三錢匕空心米飲

調下日晚再服

治脾胃氣虛腹脹殄泄困劣服煖藥即嘔逆

食飲不下薑米散方

陳米 壹升用生薑二斤取汁浸 肉豆蔻 三枚

去殼豆蔻 十枚煨 陳橘皮 去白 甘草 炙燒

鹽 各壹兩 研

右六味搗研為散每服二錢匕沸湯點服

不拘時候

洞泄寒中

內經謂長夏善病洞泄寒中洞泄謂食已卽泄乃殄泄之甚者此因春傷於風邪氣留連至夏發爲殄泄至長夏發爲洞泄蓋當春之時陽氣在表爲風邪所中入客于經未至府藏風者陽氣也東方木也木能勝土脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽必陰病在脾胃故爲殄泄陰生於午至未而盛是爲長夏之時脾土當王脾爲陰中之至陰則陰氣盛陰盛生內寒故令人府

藏內洞而泄是爲洞泄寒中之病

治洞泄寒中注下冰穀或痢赤白食入卽出

食物不消附子丸方

附子炮裂去皮臍烏梅肉炒乾各壹兩乾薑炮壹兩半

連去須炒右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服十五丸空心米飲下日晚再服

治洞泄冷痢熟艾湯方

熟艾炒附子炮裂去皮臍甘草炙乾薑炮赤石

脂各半

黃連去須

阿膠三分

炙令燥

右七味判如麻豆每服五錢匕水豈蒸半

煎至八分去滓空心食前温服再服

治洞泄不拘冷熱注下不止如神散亦平大

附子

炮裂去皮臍

白朮

椎碎用漿水煮半日焙乾各壹兩

乾薑

炮甘草

炙判各半兩

右四味搗羅為散每服壹錢匕空心温米

飲調下如熱瀉新水調下亦白

治寒中洞泄不止及年高久瀉建脾湯方

烏頭

炮裂去皮臍三分

厚朴

去麩皮生薑汁炙

山茱萸

炙乾

薑炮各一分

右四味判如麻豆每服三錢匕水豈蒸生

薑三片煎至七分去滓連併熱服

治大腸積冷洞泄不止天仙子丸方

天仙子

炮乾薑

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒

皮各壹兩

右四味先為羅末用醋拌勻壹宿炒令黃

色再為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大

每服二十九食前米飲下

治洞泄不止兼治霍亂附子湯方

附子壹枚重七錢者炮裂去皮臍

右壹味細剉分二服每服以水壹盞搗半

錢匕煎至六分去滓溫服

治洞泄寒中注下不禁不思飲食紅豆散方

紅豆揀附子大者炮裂去皮臍乾薑炮硫黃細研

兩

右四味搗研為散和勻每服壹錢匕空心

溫粥飲調下再服當愈

治洞泄不止豆蔻湯方

肉豆蔻七枚烏頭壹兩白朮各一兩

右三味用油四兩先煎後二味候白朮黃

色烏頭外裂裏黃取出烏頭去皮臍入肉

豆蔻三味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞

煎至七分去滓空心食前稍熱服

治脾胃虛寒洞泄不止四肢逆冷心腹疴痛

溫中丸方

肉豆蔻人

硫黃

研

乾薑

生

附子

炮裂去皮臍

龍骨

各五兩

碎

水

煎

令

小

右五味為細末用麴糊和丸如梧桐子大

每服三十丸食前艾湯下三錢

治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴肉豆蔻丸

方六三和川椒四兩水煎餘二和神白木

肉豆蔻

五枚

木香

分

蠟梢

炒

陳橘皮

白

附子

炮裂

乾薑

炮

胡椒

各半

右七味搗羅為末麴糊和丸如豌豆大每

服十五丸食前米飲下

治脾胃虛冷洞泄不止厚朴乾薑丸方

厚朴

去蘆皮生薑

乾薑

炮

附子

炮裂去

白朮

各壹兩

訶梨勒皮

三分

右五味為細末醋煮麴糊丸如梧桐子大

每服二十九至三十九空心食前熱米飲

下日三

治脾胃久寒大腸虛滑洞泄豆蔻附子散方

肉豆蔻

人

附子

去皮臍

縮沙

去

各

木香半斤

右四味搗羅為細散每服一錢匕食前米

飲調下

治脾冷洞泄丁香散方丁香一分

丁香一分厚朴一分法去麤皮生薑肉豆蔻一分

炮檳榔壹枚

右四味為細散每服二錢匕熱粥飲調下

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止火輪散方

附子炮裂去皮肉豆蔻去殼半兩乾薑壹

分

右三味為細散每服二錢匕陳粟米飲調

下

治洞泄大腸切痛腸鳴食不化木香訶梨勒

丸方

木香半斤訶梨勒煨去核白木壹兩桂

去麤皮蕪荑炒各壹兩附子炮裂去皮厚朴去麤

薑汁炙焦各二兩高良薑壹兩肉豆蔻去殼各甘草

多到乾薑炮壹半兩

右壹十壹味搗羅為末用陳麴末煮糊為

丸如梧桐子大每服三十丸煨生薑鹽湯

下

治因傷水飲後變成暴泄白芷黃連湯方

白芷壹兩黃連去須兩地榆壹兩當歸剉焙壹兩

附子炮裂去皮木香壹兩赤石脂壹兩黃芩

去黑心芎藭訶梨勒皮兩煨壹肉豆蔻

去殼煨白朮青桂去麤皮山刺梨米炒

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水壹

盞半入生薑五片煎至八分去滓空心溫

服日三

治大腸洞泄水穀入即注下烏梅丸方

烏梅肉炒四兩附子炮裂去皮乾薑炮二兩

連去須炒肉豆蔻去殼木香各三

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十九米飲下

治洞泄水穀注下黃連阿膠湯方

黃連大阿膠炙烏梅肉炒各山梔子十三

枚黃蘗

去蠶皮 剉壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服空心食前日二

治五泄痢訶梨勒丸方

訶梨勒

半生半煨 並去核

肉豆蔻

去殼

木香

各三分 乾

薑炮甘草

炙剉各半兩

右五味搗羅為末煮醋糊和丸如梧桐子

大每服二十九至三十九米飲下

治洞泄寒中水穀不化黃連當歸湯方

黃連去須當歸

切焙甘草

炙剉各二兩

酸石榴皮

剉炒

四兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服空心食前

鶩溲

脾氣衰則鶩溲蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若脾胃氣虛弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則藏寒糟粕不化故大便色黑狀如鶩溲也又大腸有寒亦曰鶩溲

治卵氣不足鴛鴦膏黑柴萸丸方

吳茱萸湯浸炒 乾薑炮 赤石脂陳麴炒 當歸炒

厚朴去麋皮生薑汁炙 厚朴炙

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空心食前米飲下日三

治大使青黑狀如鴛鴦膏骨散方

龍骨去須炒 黃連各一兩 白礬熬令枯 阿膠炙乾

薑炮 白石脂研 常歸切 胡粉炒 赤石脂研

牡蠣煨各三分 甘草炙 附子炮裂去皮

右壹十二味搗研為散每服三錢匕食前米飲調下日再

治大便滑泄色如鴛鴦膏龍骨黃連湯方

龍骨碎壹兩 黃連去須炒 當歸切 乾薑炮 甘草炙

草炙 各半兩

右五味羅搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓食前溫服日再

治鴛鴦所下瘀黑木香丸方

木香 烏頭生去皮 當歸切焙各三分 烏梅肉乾

兩
右四味搗羅為末用粟米壹合醋壹升半
慢火煎稠和丸如梧桐子大每服寸丸至
十五丸食前米飲下日三

治大便秘澀滑利不止附子散方

附子炮裂去皮乾薑炮龍骨各壹兩

右三味搗羅為散每服三錢匕食前煎烏

梅湯調下日再

治腸胃久寒大便秘澀華撥丸方

華撥炮裂去皮附子炮裂去皮乾薑炮厚朴去蘆皮

炙肉豆蔻各壹兩龍骨各壹兩訶梨勒皮縮

沙人各半兩

右八味搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大
每服二十九食前米飲下日再

醫方大成

泄瀉

和劑方六和湯治心脾不調氣不升降霍亂
嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澀永類錄方方見

諸暑

縮砂仁炮七 杏仁去皮 甘草

赤茯苓去皮 藿香葉去土 白扁豆 木瓜

厚朴姜製各 香薷厚朴四兩

右咬咀每服四錢水壹盞姜三片棗壹枚

煎服不拘時醫方集成南北經

和劑方理中湯治臟腑停寒泄瀉不止醫方

南北經驗方袖珍方同方見諸寒門

和劑方來復丹治伏暑泄瀉醫方集成南北

承類鈐方

百一選方大藿香散治一切脾胃虛寒嘔吐

霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取効

藿香葉 木香 青皮大白 神麴炒 人參

去肉豆蔻麩 良姜炒 大麥蘖炒 訶子煨去

白茯苓 甘草炒 厚朴姜 陳皮去白各

方各 白乾薑煨半

右為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔

酸苦水川木壹盞煨生姜半塊搥一捻煎

服水瀉滑泄腸風臟毒陳米飲入塩煎調
 下赤白痢甘草黑豆湯下脾胃虛冷宿滯
 酒食痰氣作暈入塩少許嚼姜棗湯熱服
 胃氣吃噫牛姜自然汁一呷入塩點服此
 藥大能消食順氣利膈開胃醫方集成南
 北徑驗方永

類鈔

和劑方藿香正氣散治感濕泄瀉醫方集成
 南北經驗

方補珍方同
方見傷寒門

和劑方肉豆蔻散治脾胃虛弱腹脇脹滿水

谷不消臟腑滑泄

蒼朮米泔浸切八兩 乾姜炮 白豆蔻麩厚朴去皮

甘草南北經驗方二兩 陳皮去白各四兩 茴香炒 肉桂

去川烏炮去皮臍○經驗方 訶子皮各二兩

右為末每服二錢水壹盞姜三片棗壹枚

煎八分溫服醫方集成同

和劑方金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數
 盜汗遺精一切虛冷之證並治之

五倍子 茯苓各八兩 竜骨煨別 朱砂別研

兩紫巴戟六兩補骨脂酒浸炒肉苁蓉

洗壹斤葫蘆巴壹斤

右為末入研藥令勻酒糊圓如梧桐子每

服三十圓空心溫酒鹽湯任下醫方集成

方袖珍方永類鈔

御藥院方椒艾圓治臟腑虛寒泄瀉不已醫方

集成南北經驗方袖珍方同方見諸痢門

濟生方豆附圓治臟腑虛寒泄瀉不止氣體

羸困不進飲食

肉豆蔻麵煨附子炮良姜炒訶子麵煨乾姜炮

赤石脂煨陽起石煨竜骨生用白礬枯各二兩白

茯苓去皮桂心不見火細辛洗各壹兩

右為末酒煮麵糊圓如梧桐子每服七十

圓空心米飲下醫方集成南北經驗方袖珍方同

濟生方訶黎勒圓治大腸虛冷泄瀉不止脇

腹引痛飲食不化

訶黎勒麩煨附子炮肉豆蔻麩煨木香不見火吳

茱萸去梗炒龍骨生用白茯苓去皮草撥各半

右爲末姜煮糊圓如梧桐子每服七十圓

空心米飲下醫方集成南北經驗方

簡易方蔡醫傳九寶飲子分利水穀止泄瀉

鶯粟殼蜜炙青皮陳皮木通各一兩赤

茯苓去皮車前子略炒黃芪微炒厚朴姜製粉草各二錢

錢半右咬咀每服三錢水盞盞煎七分溫服醫方

集成袖珍方南北經驗方

同方

濟生方

檳榔散治腸胃受濕大便秘澀

檳榔不拘多少

右爲末每服二錢用蜜湯點服不拘時珍

同方

醫方類聚卷之一百四十二