

醫方類聚卷之八十七

諸氣門 二

聖惠方

治上氣喘急諸方

夫肺者通行藏腑之氣以榮華於經絡也若



肺虛不足為邪所乘則氣道不利諸藏之氣

上衝胃中壅滯不通故令上氣喘急也

治上氣喘急不得睡卧宜服杏仁散方

杏仁

一兩湯浸去皮尖

甘草

半兩炙

紫蘇

子一兩麻黃一兩天門冬一兩陳橘皮一兩
三分湯浸三五味子三
去白三煎三

右件藥搗篩為散每服三錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計
時候溫服

治上氣厥逆喘急呼吸欲絕宜服此方

麻黃四兩甘草二兩射干一兩

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞
入生薑半分棗五枚煎至三分去滓不

計時候溫服

治上氣喘急不止馬兜零散方

馬兜零一兩人參一兩貝母一兩煨一兩甘草一兩

微赤一兩杏仁一兩雙一兩湯浸一兩皮尖一兩甜葶藶一兩

令一兩紙炒一兩麻黃一兩根節一兩五味子一兩葳靈仙一兩

桑根白皮一兩欵冬花一兩陳橘皮一兩湯浸一兩去白一兩

瓢皂莢一兩黑皮塗酥一兩

右件藥搗篩為散每服五錢用淡漿水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣喘促潤肺通胃膈紫蘇散方

紫蘇葉一兩人參一兩盧頭一兩陳橘皮一兩

甘草一兩桑根白皮一兩五味子一兩

赤茯苓一兩大腹子一兩

右件藥搗篩為散勿服五錢以水一大盞入棗三枚生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣喘急發即坐卧不安方

紫蘇子三兩桔梗二兩桂心二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣喘急胃中滿悶咽喉不利杏仁散方

杏仁三分湯浸去皮尖三分桂心三分厚朴三分

皮塗生薑汁一分人參半兩陳橘皮半兩

炙甘草半兩麻黃三分赤茯苓半兩

麻黃半兩前一分半夏七分滑石一分

右件藥搗篩為散每服用鯉魚肉五兩生

薑半兩切碎先以水二大盞煮至壹盞去滓下散五錢煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣喘促時有欬嗽宜服此方

麻黃二兩去根節 百合一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

又方甘草一兩炙 桂心一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

又方芥子二兩 百合二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以新汲水下七丸

治久上氣諸方

夫肺主於氣通於呼吸而氣之行循環表裏

時候溫服

治久上氣心膈不利喫食全微欬嗽不止宜服赤茯苓散方

赤茯苓一兩桂心半兩紫蘇莖葉三分陳橘皮三分

湯浸去杏仁三分湯浸去皮尖訶梨勒皮

白甄焙雙人麩炒微黃厚朴三分生薑一分

三枳殼半兩麩炒細辛半兩厚朴三分生薑一分

汁炙令郁李人去皮微炒人參三分去頭紫

苑參分洗半夏半兩湯洗甘草半兩炙赤判

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

人生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治久上氣心腹虛冷胃滿不食時復嘔沫胡椒丸方

胡椒一兩葶芩一兩乾薑三分炮白朮一兩桂心

參訶梨勒皮一分人參一分去頭款冬花半兩紫

苑一兩洗甘草壹兩赤茯苓兩橘陳皮

膏兩湯浸去白甄焙

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服以薑橘湯下三十九日
三四服

治久上氣痰唾氣壅喘悶旋復花九方

旋復花一兩皂莢一兩去黑皮塗酥炙微黃川大黃一兩

半剉碎杏仁一兩雙人兩麩炒微黃枳殼一兩

微炒去瓢微黃

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食後以溫漿水下二十

丸

治久上氣時唾痰涎不得眠卧方

長大皂莢一挺去黑皮塗酥炙微黃

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食後煮棗粥飲下五丸

治久上氣不差方

大棗五十枚煮鼓一百二十粒杏仁一百二十粒

皮尖川椒二百粒汗搗羅爲末

右件藥都搗熟爲丸如蓮子大不計時候

以繇裏一丸含嚥津

治久上氣不止累療不差方

豬脰

三具切

棗

五十枚切

甜葶藶

壹兩隔紙炒令紫色

右件藥都以酒五升浸三五日每服煖一

小盞日三服

治卒上氣諸方

夫肺主於氣若肺氣虛實不調或暴為風邪所乘則腑藏不利經絡否澁氣不宣和則卒上氣也又因有所怒則卒逆氣上衝其則變嘔血為氣血俱傷也

治卒上氣喘急氣奔欲絕麻黃散方

麻黃

二兩去根節

甘草

一兩炙

桂心

壹兩

馬兜零

一杏仁

壹兩湯浸去皮尖

細辛

壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治卒上氣奔喘五味子散方

五味子

壹兩去根節

甘草

一兩炙

細辛

一貝母

壹兩煨

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治卒上氣胃中不利痰逆青橘皮散方

青橘皮一兩湯浸 甘草半兩炙 訶梨勒皮
一兩白粉焙 紫蘇莖葉二兩 杷杷葉半兩拭去
兩炙微黃 右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治卒上氣心胃壅悶頭痛細辛散方

細辛半兩 甘草半兩炙 五味子一兩 人參一兩
頭桂心三分 夏一兩湯洗 麻黃二兩去 杏
人一兩湯浸去皮尖 前胡三分去
雙人 麩炒微黃 右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計
時候溫服

治卒上氣喘急方

杏人一兩浸湯去皮尖 人參二兩去 陳橘
雙人 麩炒微黃

皮二兩湯浸甘草壹兩炙淡竹枝梢二七

一握

右件藥擣篩為散分為十服每服以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治卒上氣喘急腹痛方

乾薑一兩炮五味子一兩木香一兩

右件藥擣細羅為散不計時候以煖酒調下二錢

又方燈心半兩木通半兩陳橘皮半兩湯浸

右件藥細剉以水二大盞煎至一大盞去滓下牛酥一分時時溫服一合

治上氣胃滿諸方

夫上氣胃滿者由肺藏氣實上膈壅滯榮衛否澁氣不宜通也肺為華蓋居於膈上主通行於諸藏之氣若為邪所乘則肺壅脹氣逆不順故令上氣胃滿也

治上氣肺壅脹胃中滿悶喘急不利宜服大

腹皮散方

大腹皮剉一兩 紫蘇子一兩 微炒 前胡一兩 去蘆頭 訶

梨勒皮一兩 牛 五味子一兩 赤茯苓一兩 檳榔半兩

甘草半兩 炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣肺實熱胃滿煩悶呼吸氣促喉咽不利宜服桔梗散方

桔梗半兩 去蘆頭 射干一兩 麥門冬壹兩 去心 青橘皮

三分 湯浸 杏仁一兩 湯浸 去尖 麻黃一兩

去根 赤茯苓三分 前胡二分 去蘆頭 木通三分 大

腹皮三分 剉 甘草半兩 炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣肺壅胃滿喘息不利青橘皮散方

青橘皮一兩 湯浸 去白 剉 半夏七兩 湯洗 去滑 紫蘇子

青兩 五味子壹分 杏仁壹分 湯浸去尖 檳榔兩 枳殼兩 麩炒微黃 甘草兩 赤兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣心胃滿塞不下食桑根白皮散方

桑根白皮壹兩 大腹皮壹兩 陳橘皮壹兩 湯浸去白 甘草三分 炙微赤 桂心三分 赤茯苓兩 木通兩 紫蘇子兩 微炒

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣胃心滿塞不下食宜服半夏散方

半夏兩 湯洗前胡 一兩去 紫蘇子兩 微炒 陳橘皮兩 湯浸桂心 兩甘草 微赤到 赤茯苓兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計

時候温服

治上氣胃滿咽喉噎塞心神煩悶大小便不利宜服大黃丸方

川大黃一兩判碎微炒海藻一兩先洗去鹹味川朴消一兩昆

布一兩洗苦瓠子一兩甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

木通一兩桃人一兩湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服以生薑湯下三十九日

三服

治上氣胃中滿悶大便不利宜服檳榔丸方

檳榔壹兩川大黃一兩判碎微炒枳殼一兩選妙甜

葶藶一兩隔紙炒令紫色郁李人一兩湯浸去皮尖

到杏人一兩湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服以生薑湯下三十九日

三四服

治上氣不得睡卧諸方

夫藏腑之氣皆上注於肺肺主於氣也若陰

類聚 卷之二十七

十四

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣喘促不得睡卧宜服五味子散方

五味子三分 陳橘皮三分 湯去白 瓢焙 紫苑壹兩洗去青土

貝母二分煨 杏仁一兩湯浸去皮尖 麻黃

根節去 麥門冬叁分 甘草半兩炙 赤茯苓

柴胡三分去苗

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治上氣睡卧不得攀物而坐唾血不能食飲

宜服紫蘇子散方

紫蘇子壹兩洗 桑根白皮一兩 半夏叁分湯洗上

紫苑壹兩洗 人參叁分 蘆頭大 甘草半兩炙 細辛

麻黃一兩 五味子叁分 乾薑半兩炮

射干半 天門冬三分 桂心半 款冬花

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣喘急不得睡臥腹脇有積氣宜服此方

杏仁半兩湯浸去皮尖 赤茯苓一兩 木香一兩

鼈甲一兩塗醋炙 右件藥搗篩為散每服五錢以水壹中盞

入生薑半分燈心壹黍煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣不得睡卧短氣方

陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙 人參一兩去蘆頭 五味子一兩

紫蘇莖葉一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入棗三枚生薑半分煎至五分去滓溫服日三四服

治上氣喘急睡臥不得欬嗽涎唾不止方

麻黃一兩去根節 杏仁一兩湯浸去皮尖 赤茯苓一兩

芩一兩 陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙 甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

桑根白皮剝一兩 紫蘇莖葉一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水壹大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治上氣智滿晝夜不得眠卧困篤鍾乳丸方

鍾乳粉二兩 葶藶一兩 炮裂剝 欵冬花半兩 細辛半兩

桑根白皮剝一兩 半夏半兩 湯洗貝母三分

黃附子三分 裂炮 芎藭半兩 紫苑一兩 洗川

椒三分 去目及閉 杏人一兩 湯浸去皮尖

右件藥擣羅為末鍊蜜和搗三二百杵凡

如梧桐子人不計時候以粥飲下三十九

治上氣喉中作小雞聲諸方

夫肺主於氣若臧腑不和肺氣虛弱風冷之

氣所乘則腎滿肺脹則肺管不利不和則

氣道壅滯壅滯則喘息不調故令喉中作水

雞聲也

治上氣喉中作水雞聲宜服麻黃散方

麻黃一兩 去根節 紫苑一兩 洗去土 射干一兩 欵冬花

類聚

十一

一細辛分參五味子分參半夏半兩湯洗

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服
日三四服

治上氣肺壅喘息不利咽喉作水雞聲宜服

款冬花散方

款冬花分參杏仁一兩湯浸去皮尖紫苑分參
洗去木通一兩桔梗一兩馬兜零
茯苓分三

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治上氣不得喘息喉中作水雞聲方

桂心半兩赤茯苓兩半夏壹兩湯洗細辛兩半
麻黃二兩去根節五味子一兩

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大
盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治上氣喘急喉中作水雞聲無問年月遠近方

肥皂莢五挺酥二兩

右件皂莢刮去黑皮旋旋塗酥以慢火炙令酥盡候焦黃去子擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於食後以粥飲下七丸

又方臘月猪尾燒為灰

右件藥細研每服以溫水調下二錢日三四服

治上氣嘔吐諸方

夫肺主於氣肺為邪所乘則上氣此為膈內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺與膈內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣逆故令嘔吐也

治上氣心胃痰壅喘促嘔吐訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩半夏三分洗赤茯苓一兩陳

橘皮壹兩湯浸甘草半兩炙人參三分去

前胡壹兩去杏仁一兩半湯浸去皮白朮

檳榔兩一紫蘇葦葉兩一

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計
時候溫服

治上氣嘔吐不能下食半夏散方

半夏七分湯洗白朮半人參一兩去蘆頭桂心
半甘草半陳橘皮半厚朴二
兩去麤皮塗生薑
汁炙令香熟
右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服
日三四服

治上氣嘔吐胃脇滿悶不思飲食心神虛煩

宜服赤茯苓散方

赤茯苓兩一陳橘皮三分湯洗訶梨勒皮二分

麥門冬半兩去心白朮一兩甘草一分炙半夏半兩

湯洗七杏人一兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治上氣嘔吐心胃滿悶痰滯不能飲食枇杷葉散方

枇杷葉一兩拭去毛炙檳榔一兩赤茯苓一兩高良

薑半兩陳橘皮一兩湯浸焙前胡一兩蘆頭一兩

細辛三分甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣嘔吐不能下食橘皮散方

陳橘皮二兩湯浸去白瓢焙紫蘇子一兩人參一兩

頭赤茯苓一兩柴胡一兩杏仁一兩雙人參一兩

炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治上氣胃中煩熱痰壅吐逆不能下食宜服人參散方

人參 二兩 去蘆頭 麥門冬 一兩 去心 陳橘皮 一兩 湯浸去白

蘆黃者 一兩 剉 紫蘇莖葉 一兩 赤茯苓 壹兩 枇杷

葉 壹兩 剉 訶梨勒皮 壹兩 甘草 半兩 炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治上氣胃中不和嘔吐不能下食虛弱無力

宜服白朮丸方

白朮 兩 五味子 一兩 陳橘皮 半兩 湯浸 人參

壹兩 去蘆頭 桂心 一兩 白茯苓 兩 沉香 兩 厚朴 二兩

紫蘇子 壹兩 微炒 草薹 壹兩 去皮

枳實 半兩 麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以生薑湯下三十

丸

治上氣腹脹滿諸方

夫上氣腹脹滿者由藏腑虛弱陰陽不調陽氣外虛陰氣內積風冷之氣在於腹臧伏留

不散攻於脾肺脾肺既虛為邪所乘則經絡
壅澁氣道不通故令上氣腹脹滿也

治上氣腹脹滿上膈壅滯宜服大腹皮散方

大腹皮 壹兩 甜葶藶 壹兩 桑根白皮 壹兩

桔梗 壹兩 赤茯苓 壹兩 桂心 兩 枳殼 兩

一兩對炒 杏仁 一兩湯浸去皮尖 微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候溫服

治上氣腹脹滿不下食宜服赤茯苓散方

赤茯苓 壹兩 杏仁 一兩湯浸去皮尖 人參 三分

去蘆 陳橘皮 三分湯浸 紫蘇莖葉 三分 桂心 三分

白朮 三分 檳榔 壹兩 枇杷葉 壹兩 枳殼 壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治上氣腹脹滿坐臥不得少思飲食前胡散

方

類聚 卷之七

三十三

前胡 壹兩去蘆頭 枳殼 壹兩去殼炒 人參 壹兩去蘆頭

陳橘皮 一兩湯浸 檳榔 壹兩 紫蘇莖葉 一兩 甜

葶藶 半兩隔紙炒 甘草 半兩炙

右件藥搗篩為散每服五錢以小壹大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服

日三四服

治上氣腹滿煩悶不欲飲食木香散方

木香 三分 人參 三分 蘆頭 三分 去半夏 半兩湯洗 赤茯苓 三分

苓 三分 甘草 半兩炙 檳榔 三分 桑根白皮 半兩

陳橘皮 三分湯浸 桂心 半兩 枳實 半兩 麩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服

日三四服

治上氣腹脹滿不能下食宜服半夏散方

半夏 半兩湯洗 赤茯苓 一兩 陳橘皮 三分湯

煎人參 三分 去前胡 三分 去紫蘇莖葉 一兩

木通 半兩 木香 半兩 白朮 三分 檳榔 三分

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

類聚 卷之七

二十七

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣腹脹滿宜服此方

枳實一兩麩炒黃桂心一兩檳榔一兩

右件藥擣細羅為散每服以生薑湯調下

二錢日三四服

治上氣腹脹滿不下食方

桑根白皮三兩吳茱萸一兩易浸白朮二

右件藥擣節為散每服三錢以酒壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓溫溫頻服之

治上氣欬逆諸方

夫上氣欬逆者由肺藏虛弱感於風寒而成欬逆也欬則氣聚於肺則令肺脹心胃煩悶是為欬逆也此皆邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆行於咽喉之間邪氣動作則氣逆不順奔上膈故謂之上氣欬逆也

治上氣欬逆支滿喘嗽氣結胃中心煩不利宜服芫花散方

類聚八十七

三十五

芫花半兩醋拌炒令乾 桂心三分 乾薑半兩炮 陳橘皮三分湯浸 細辛半兩 前胡三分去蘆頭 赤茯苓一分 訶梨勒皮一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服

治上氣欬逆喉中不利人參散方

人參壹兩去蘆頭 陳橘皮三分湯浸 紫菀一兩洗去 苗赤茯苓一分 款冬花一分 射干一分 細辛一分 杏

人二分湯浸去皮尖 菖蒲一分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣欬逆胃滿多唾宜服川椒丸方

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗 人參一兩去蘆頭 款冬花一分 赤茯苓一分 乾薑半兩炮裂 桂心一分 紫菀一分 洗去附子半兩炮裂 五味子一分 白朮半兩 土苗一分 人參一分 雙料一分 微黃 菖蒲一分 細辛一分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗五七百杵凡
如梧桐子大每服以溫生薑湯下三十丸
日三四服

治上氣欬逆心胃煩悶小便不利宜服麥門
冬丸方

麥門冬一兩半 昆布五分洗 乾薑半兩炮
細辛半兩 川椒半兩去目及閉 海蛤一兩 桂
心兩半
右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫生薑湯下三
十九丸

治上氣欬逆腹中堅痞往來寒熱令人羸瘦
不能飲食或時下利腹中疼痛桂心丸方

桂心一兩 川椒三分 甘草一分
當歸半斤 附子一枚
右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三百杵丸

如梧桐子大不計時候以生薑橘皮湯下
三十丸

治上氣欬逆多唾食少宜服乾薑丸方

乾薑牛兩炮裂剉 桂心半兩 柑子皮三分湯浸細

辛半兩 甘草半兩炙微赤剉 欬冬花三分 紫蔻三分洗去苗土

附子三分炮裂去皮臍

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下

三十九

治上氣喘急身面浮腫諸方

夫肺主於氣候於身之皮毛而氣之行循環

藏腑流通經絡若為風邪所乘則膚腠閉塞

勞衛壅澁津液相并不得泄越故令上氣而

身面浮腫也

治上氣喘急胃中滿悶身面浮腫宜服葶藶

散方

甜葶藶三分隔紙炒令紫色 枳殼三分麩炒微黃去瓢 赤茯苓

一桑根白皮一兩剉 漢防已半兩 陳陳皮二分湯浸

去白半兩炙 瓢焙甘草微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹大盞

本草綱目卷之二十七
三十八

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治上氣發即不得眠臥心腹脹滿喘急不能食身面浮腫宜服紫菀散方

紫菀去苗土麻黃根節貝母參分煨大

腹皮剉杏仁雙分湯浸去皮尖赤茯苓

桑根白皮剉猪苓一兩去檳榔一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治上氣喘急或多心腹氣滯身面浮腫喫食

減少宜服陳橘皮丸方

陳橘皮一兩湯浸猪苓二兩去紫菀一兩洗

苗桂心一兩郁李人一兩湯浸桑根白皮二兩

剉人參一兩去麻黃根節甘草半兩炙

杏人雙一兩湯浸去皮尖甜葶藶一兩隔紙

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫粥飲下三十

本草綱目卷之二十七
三十九

九

治上氣喘急肺熱欬嗽不得坐臥身面浮腫

不下飲食宜服猪苓散方

猪苓一兩去黑皮 漢防已三分 百合一兩 紫菀壹兩洗去

苗杏人一兩湯浸去皮尖 赤茯苓一兩 天門

冬壹兩半 枳殼一兩麩炒 桑根白皮壹兩

郁李人壹兩湯浸去皮微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方甜葶藶壹兩兩紙 陳橘皮三分湯浸赤

茯苓一兩 桑根白皮一兩 杏仁一兩湯浸去

黃炒微 牽牛子一兩微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

治上氣喘急身而浮腫不得眠臥積年不差

方

皂莢二兩刮去黑皮塗 桑根白皮一兩 陳

橘皮壹兩湯浸 杏仁一兩半湯浸去皮尖

如漢防已壹兩甜葶藶二兩隔紙炒令紫色別搗如泥

右件藥搗羅為末研入杏仁葶藶鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以粥下三十丸

治上氣喘急徧身浮腫宜服此方

甜葶藶一升隔紙炒令紫色

右件藥搗令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三五日後每服抄壹匙用粥飲調下日三四服

治七氣諸方

夫七氣者為寒氣熱氣恚氣怒氣憂氣喜氣愁氣凡此七氣積聚堅牢人如杯盤在心下腹中疼痛欲死不能飲食時來時去每發極甚如有禍祟此皆七氣所生也寒氣則嘔吐惡心熱氣則恍惚眩亂怒氣則上膈熱痛不可忍熱上搶心短氣欲死不得氣息恚氣則積在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂氣則不可劇作臥不安席愁氣則喜

忘不安故名七氣也治憂悲寒熱喜怒及飲食阻隔內傷五藏氣攻上不能還下心中悸動不安宜服人參散方

人參一兩去蘆頭 赤芍藥壹兩 木香壹兩 桂心壹兩 吳

茱萸半兩湯浸七 前胡壹兩去蘆頭 白朮壹兩 訶

梨勒皮一兩半夏七 湯洗壹兩 甘草壹兩 微赤剉青

橘皮一兩湯浸 熟乾壹兩 乾黃壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前稍

熱服

治七氣藏腑虛冷心胃氣上勞乏不能飲食

宜服半夏散方

半夏壹兩湯洗 人參壹兩 去壹兩 白朮壹兩 桂心

厚朴二兩去麤皮塗生 陳橘皮三分湯

附子一兩炮裂 沉香壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓每於食前稍

熱服

治七氣心腹積聚結塊如杯嘔吐寒熱胃心中短氣不能下食宜服木香散方

木香一兩桂心壹兩人參一兩細辛半兩訶梨

勒皮半兩乾薑半兩白朮半兩甘草一分炙

附子半兩炮裂壹兩鼈甲壹兩黃連半兩醋炙吳茱

萸半兩湯炒青橘皮去白兩湯京三稜

分三檳榔兩赤茯苓分厚朴生薑汁炙令香

熟當歸分三藁香子兩

右件藥搗麝羅為散每服五錢以水壹中

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓毋

於食前稍熱服

治寒熱恚怒喜憂愁等七氣積聚不散在於

心腹結塊如杯胃中氣隔吐逆不能下食腹

脇疼痛喜忘不安呼吸短氣四肢不舉宜服

烏頭丸方

川烏頭一兩半炮裂去皮臍桃人三分易浸去皮尖

桂心一分參前胡去蘆頭去人參一兩去芎藭分

防葵一分甘遂微黃兩煨菖蒲分川大黃壹兩牛剉

頭

三

碎微 柴菀 三分洗 赤茯苓 三分 乾薑 三分 吳茱萸 三分
 石膏 三分 細研 半夏 三分 湯洗 吳茱萸 三分
 湯浸 川椒 三分 目及開 細辛 三分 桔
 梗 三分 蘆頭

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸
 如梧桐子大每於食前以溫酒下五丸漸
 加至十九常以通利為度

治七氣積聚堅牢心腹脹痛宜服大黃丸方
 川大黃 二兩 川椒 半兩 目及開人參

三分大 半夏 七分 湯洗 桔梗 三分 葛蒲
 柴胡 六分 赤茯苓 三分 芎藭 三分 桂心 三分 桃
 人參 二分 湯浸 木香 三分 吳茱萸 三分 湯浸
 乾薑 七分 炮 乾薑 七分 裂剉 細辛 三分

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸
 如梧桐子大每於食前以溫酒下十九漸
 加至二十九為度

治短氣諸方
 夫平人無寒熱短氣不足以息者蓋由體實

實則氣盛盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則氣不足亦令短氣則其人氣微常如少氣故呼吸不利診其脉尺寸俱微血氣不足其人短氣寸口脉沉胃中短氣脉前小後大則胃滿短氣脉洪大者亦短氣也

治肺實胃中短氣上膈壅滯不思飲食宜服

五味子散方

五味子一兩木香半兩訶梨勒皮一兩甘草半兩
赤前胡一兩去蘆頭陳橘皮一兩湯浸桂心三分

半夏七分湯洗

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓溫服

日三四服

治氣虛胃膈中寒熱短氣不足紫蘇散方

紫蘇葦葉二兩五味子一分甘草三分炙前胡一分
一兩去蘆頭陳橘皮三分湯浸桂心一分

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服

類聚卷之七

三十五

日三服

治肺氣實上焦煩熱短氣胃滿呼吸不利宜服木通丸方

木通一兩 杏仁一兩 雙一兩 麩一兩 炒微黃 紫蘇莖

葉壹兩 柴胡壹兩 陳橘皮壹兩 白瓢壹兩 五味子壹兩

兩壹

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹中蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治肺熱短氣呼吸不利麥門冬散方

麥門冬一兩半 半夏三分 湯先 人參一兩

蘆甘草壹分 炙微赤 前胡壹兩 去蘆頭 五味子壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治肺虛寒自中否塞短氣不足少思飲食宜

服白朮丸方

白朮壹兩 參壹兩 去蘆頭 陳橘皮壹兩 湯浸 枳

梗參分 去蘆頭 杏仁壹兩 湯浸 去皮 細辛參分

類聚卷之七

三十五

貝母

三分煨

乾薑

半兩炮

半夏

半兩湯洗

甘草

一分炙

桂心

三分

訶梨勒皮

兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十

丸

治卒短氣方

紫蘇莖葉

二兩

青橘皮

半兩湯浸

右件藥細剉以水二大盞入棗七枚煎至

一大盞去滓不計時候分溫二服

治逆氣諸方

夫怒則氣逆甚則嘔血又有因食而氣逆上

者凡人有逆氣不得臥而息無巢氏病源作有音聲

者有起居如故而息有音聲者有能行而喘

者有不能行而喘者有不能臥臥而喘者皆

有所起其不得臥而息有音聲者是陽明之

逆足三陽者下行今逆而上行故息有音聲

陽明者胃之脉也胃者六腑之海其氣亦下

行陽明氣逆不順故不得臥夫胃氣不和則

臥不安此之謂也起居如故而息有音聲者此肺之絡逆絡脉之氣不得隨經上下故留經而不行此絡脉之疾也人起居如故而息有音聲不得臥卧則喘者是水氣之客於肺夫水者循津液而流腎者水藏主津液津液不順故臥而喘也診其巢源有跌陽二字脉太過則令人逆氣背痛温温然寸口脉伏胃中有逆氣關上脉細其人逆氣腹中痛滿也治藏腑虛寒逆氣上攻胃脘痞塞吐逆腹脇

脹滿氣不得息四肢不利宜服訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩木香半兩陳橘皮壹兩湯浸

榔半兩附子半兩炮裂草薺薺參分白朮半兩

當歸半兩甘草半兩湯洗乾薑薑半兩炮枳實實參分

炒黃芩半七夏兩湯洗人參參參分去赤茯苓苓

分桂心厚朴薑汁炙香熟生

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水壹中

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓稍

熱服之日三四服

治氣實胃中逆滿否塞不能食呼吸短氣宜

服檳榔散方

檳榔壹兩半夏一兩湯洗七青橘皮半兩湯浸去白

前胡一兩去蘆頭附子半兩炮製去皮細辛半兩赤茯苓

苓一兩桂心一兩紫蘇莖葉一兩川大黃一兩碎微炒

甘草半兩炙微赤

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治逆氣心腹滿急嘔吐不下食腹脇疼痛皆

因藏腑久冷或憂恚結聚所成疾宜服枳實

散方

枳實一兩炒微黃半夏一兩湯洗七桂心一兩青橘

皮叁分湯浸去白木香叁分訶梨勒皮一兩常歸叁分

人參叁分去蘆頭白朮叁分甘草半兩炙微赤

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治氣上奔胃中逆滿喘息短氣不得安臥腹
中冷氣腸鳴相逐宜服半夏散方

半夏二兩湯洗吳茱萸半兩湯浸七桂心七

壹人參一兩去白朮一兩當歸一兩厚朴一兩

籬皮塗生薑枳實半兩微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

人生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治逆氣胃中痞塞呼吸短氣腹內虛寒食即

嘔逆羸瘦不足宜服訶梨勒丸方

訶梨勒皮一兩沉香壹兩附子壹兩炮裂桂心

一五味子一兩白朮一兩草薢壹兩人參壹兩

去蘆當歸壹兩枳殼千兩麩炒乾薑半兩炮

厚朴壹兩生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以溫酒下三十丸

治逆氣胃中否滿不能喘息臧腑虛寒心腑

堅痞痰飲留滯宿食不消桔梗散方

桔梗壹兩去蘆頭胡椒叁分葦芩叁分青橘皮半兩湯浸

去白半兩去目及開川烏頭半兩炮裂去皮

臍人參叁分去蘆頭乾薑半兩炮裂桂心叁分細辛

叁厚朴一兩去麤皮塗生枳殼半兩炮裂

分叁分厚朴壹兩去麤皮塗生枳殼半兩炮裂

附子叁分炮裂前胡叁分甜葶藶叁分

妙令叁分白朮叁分防葵叁分檳榔一兩川大黃壹兩

微半兩甘草微赤吳茱萸叁分湯浸乾微炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下三十九日三

服

治因食熱及飲冷水上氣諸方

治因食熱及飲冷水上氣 不下食陳橘皮

散方

陳橘皮三分湯浸去白瓢焙澤瀉半兩赤茯苓半兩人參

叁分去蘆頭白朮叁分半夏半兩湯洗桂心叁分杏

人叁分雙叁分湯浸去皮尖細辛叁分乾薑半兩炮

右件藥擣篩為散每服五錢以水壹大盞

入棗三枚生薑半分煎至五分去滓稍熱

頻服

治走馬奔喘便飲冷水因得上氣發熱宜服此方

竹葉五十片 陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙

右件藥以水一大盞煮取六分去滓分爲

二服溫溫相次服之

治因食熱及飲冷水過多上氣胃滿方

吳茱萸三分湯浸上 澤瀉一分 白朮三分 赤茯苓壹分

苓參分 木香兩 青橘皮三分湯浸去白瓤焙 川大黃兩

剉碎
微炒

右件藥擣羅爲末鍊蜜和擣三五百杵凡

如梧桐子大每服以溫牛薑湯下三十九

日三四服

治因食熱飽及飲冷水過多上攻肺藏喘急不已宜服此方

巴豆一分去皮研 乾薑壹兩炮 川大黃兩

剉碎
微炒

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以溫水下十九得吐利愈

和劑局方

一切氣

蘇合香圓療傳屍骨蒸殭瘵肺痿疰忤鬼氣
卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利
瘀血月閉疰癖丁腫驚癩鬼忤中人小兒吐
乳大人狐狸等疾易簡方簡○得効方治氣
中雖不見方書所載然暴喜傷陽暴怒傷陰
憂愁不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎

壅牙關緊急若作中風用藥非惟不相當多
能死人昔有一婦人因憂戚中忽然氣厥牙
際涎潮里醫作中風用藥以大通利藥下之
大泄數行壹夕而卒可不戒之如遇此證急
化蘇合香圓四五粒灌之使醒然後隨其調
理無不痊愈醫方大成專能順氣化痰并治
傳屍骨蒸諸項勞瘵卒暴心痛鬼魅瘴瘧赤
白下痢小兒驚搐等証並宜服之

蘇合香油

入安息香膏內

薰陸香

別童腦

研各兩○袖

珍方各 青木香 白朮 白檀香 丁香

二兩 簡易方 朱砂 研水 沉香 香附子 炒去毛 烏

犀屑 蕈撥 安息香 別為末用無灰 麝香

研○易簡 訶黎勒 煨取皮各二兩○得効

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白

蜜和劑每服旋圓梧桐子大早朝取井花

水瀰冷任意化服四圓老人小兒服一圓

溫酒化服亦得並空心服 易簡方每服一

化開乘熱呷服能飲者以熱酒少許調之

簡易方每一圓雞頭子大沸湯化下大成

圓如梧桐子空心用溫水化下四圓酒服

亦可醫方集成南北經驗方袖珍方永類

鈞方與用蠟紙裏壹圓如彈子大緋絹袋

大成同 盛當心帶之一切邪神不敢近去龍腦名

麝香蘇合香圓治一切冷氣胃膈噎塞腸

中虛鳴宿飲不消餘証並同○簡易方又

云卒中昏不知人 霍亂不透心腹撮痛

鬼疰客忤 癩癩驚怖 擗撲傷損 氣

暈欲絕比是倉卒之患悉皆治之 如口

噤不能開者抉開口灌之如灌不下插鼻

卽甦

易簡方云知灌不下則用三生飲中治法搐鼻令甦然後進藥

此藥

隨身不可暫闕辟諸惡氣并禦山嵐瘴氣

無以踰此若弟喪問病尤不可無市肆所

贖多川腦子當於火上辟

易簡方作燔

去能飲

酒以酒調服若川心過度夜睡不穩人

參湯化服

易簡方云臨臥以酒調服

其功不在妙香散

寧志膏之下倉卒求人參不得只白湯亦

佳此藥安血氣却外邪凡病自內作不

曉其名者服此往往得効兼治氣疰氣厥

氣逆氣不和吐利榮衛阻隔尤有神効應

諸證暴亡之疾用之最捷

易簡方云最捷若有神助傷

寒日久形證危惡但心頭尚煖藥下卽漸

甦省大瀉氣欲脫目視天地皆轉神思

已不理諸藥不効服此兩彈圓許神氣卽

輕爽瀉亦自止妙不可言有人嘔血甚久

遂奄奄而絕羸敗之甚手足盡冷鼻息欲

絕計無從出惟研蘇合香圓灌之凡盡半

兩卽甦

安息香圓治一切氣冷心腹疼痛胃膈噎塞
脇肋膨脹心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫
氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胃膈
刺痛時吐清水可思飲食並皆治之

安息香 酒半盞化去砂 船上茴香 微炒 華澄

茄 蓬莪茂 荆三稜 一本 硃砂 用好酒

去石入 檳榔 炮香附子 去毛 芍藥 各半 白

茯苓 肉豆蔻 一本 縮砂仁 益智子 去

五味子 微炒 白豆蔻 去皮 川芎 乾薑 炮去 舶

上丁香皮 巴戟 去心 川當歸 湯洗切片

兩 高良薑 丁香 沉香 木香 乳香

研 胡椒 各壹 肉桂 去蘆皮 訶子 四兩炮取

阿魏 一分細研白麵少許搜

右除安息香硃砂外並一處杵羅為細末

用蜜三十兩入安息香硃砂於蜜中煉熟

中劑右件藥杵一二千下為圓如雞頭肉大

每服一圓細嚼溫酒下濃煎生薑湯下亦

得食前服

丁沉圓治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛
 胃膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃
 中冷逆嘔吐不止及翻胃膈氣宿食留飲心
 痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之
 肉荳蔻仁 丁香 木香 白荳蔻仁
 沉香 甘草 炙青橘皮 剉微 檳榔 各五
剉微炒 訶黎勒 煨取 人參 去 茯苓 各一
四十兩 肉桂 去 乾薑 炮各二 麝香 壹兩 別研
 右爲細末入麝香令勻煉蜜和圓如酸棗

大每服一圓細嚼炒生薑搥湯下温酒亦
 得空心食前服

人沉香圓治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎
 塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澀不思飲食
 及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘急臍腹絞痛
 手足逆冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐
 利疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

沉香 檀香 肉桂 去 薑黃 去 乾薑 炮
去 鹿 二十 甘草 燼 天台烏藥 甘松 洗 白芷
兩

各二斤半 白苧蔻仁十兩〇一作半兩 香附子熅五斤〇壹本去毛

右為末煉蜜搜和每一兩作二十圓每服

一圓嚼破炒生薑搯湯下元氣發動炒茴

香熱酒下空心服

紫蘇子圓治壹切氣逆胃膈噎悶心腹刺痛
脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷
冷咳嗽痰滿或上氣奔急不得安臥

紫蘇子淨陳皮去白各二兩人參去蘆頭高良薑

炒肉桂去麤皮各壹兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓細

嚼溫酒下米飲亦得不拘時或作小圓服

亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熱

欲成霍亂者含化壹圓細細嚙汁服盡應

時立愈常有此藥永不患疾神妙

調中沉香湯簡易方名調中順氣除邪養正

治心腹暴痛胃膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心

飲食少味肢體多倦常服進飲食和臟腑悅

肌膚調顏色

白豆蔻仁 木香各壹兩 沉香二兩 麝香半錢

易方別研 生龍腦一錢 甘草炙黃一分

右為細末入研藥勻每服半錢用沸湯點

服或入生薑壹片簡易方姜汁 搥少許亦得酒

食後服之大妙○簡易方又云十便治腹

脹膨亨鼓之有聲喘息不便由上下不升

降氣痞無歸三焦渾亂用厚朴四兩製 枳實

三兩炒 桂心壹兩 粗散每服五錢水二盞煎至

壹盞去滓溫服名調中湯十使治產後

瀉利亦名調中湯

勻氣散簡易方直指方瀆 治氣滯不勻胃膈

虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔

吐惡心此藥常服調順脾胃進美飲食

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二兩 藿香

葉瀆春方淨 甘草瀆各五斤 縮砂仁二斤

半

右為細末每服壹錢入搥壹字沸湯點服

袖珍方與 不拘時直指方云或用 瀆察

方又云如卒中昏不知人急煎紫蘇天麻湯調下一二服間以蘇合香圓然後斟酌虛實進三生三建等藥古人治風先治氣氣順則風除設是氣中川之尤為切當按粹方治氣痞痛脹噎嘔吐等證丁香壹兩藿香兩甘草四兩木香白豆蔻仁兩縮砂仁兩檀香兩右為極細末入塩少許沸湯點服無時

烏沉湯治一切氣除一切冷調中補五臟益

精壯陽暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癱瘓疼痛風水毒腫冷風麻痺又主中惡心腹痛蠱毒挂忤鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣攻衝背脊俛仰不利及婦人血氣攻擊心腹刺痛並宜服之

天台烏一百兩人參去蘆頭三兩沉香五十兩甘草

燼四兩半

右為末每服半錢生薑三片塩少許沸湯點空心服○簡易方沉香二兩天台烏藥

五甘草 二錢壹 人參 壹錢 右細末每服二
兩 字盤 錢入薑汁少許搥湯點空心服

五膈寬中散治憂恚寒熱動氣傷神致陰陽不和腑臟牛病結於胃膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胃中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噎輒醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胃脇逆滿噎寒不通噎聞食臭四曰寒膈心腹脹滿欬嗽氣逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛不能食肥五日

熱膈五心中熱口中爛生瘡四肢煩重唇口乾燥身體或熱腰背疼痛胃痺引背不能多食及一切氣疾並皆治之

白豆蔻 湯浸 青皮 湯浸 陳皮 湯浸 縮砂仁 湯浸
丁香 各四 香附子 去毛壹斤 木香 壹斤
甘草 炙五 厚朴 去毛壹斤 薑 壹斤 鹽 少許
右為末每服貳錢薑貳片鹽少許簡易方
許少沸湯點服不計時○直指方治七氣
留滯飲食不下穀脹氣脹通用白豆蔻仁

丁香木香縮砂仁甘草炙青皮陳皮各二
川厚朴薑汁炙香附淨各四兩右麤末每三錢薑
三片鹽一點煎服

隔氣散治五積膈氣三焦痞塞胃膈滿悶背
脊引痛心膈膨脹脇肋刺痛飲食不下噎塞
不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩
悶常服順氣寬中消痞癖積聚散驚憂恚氣
京三稜炮蓬莪茂炮檳榔陳皮去白益智
仁炒枳殼炒肉桂去麤皮乾薑炮厚朴

生薑製炒木香甘草燼青橘皮去白肉豆蔻各
兩

右為細末每服二錢水壹錢薑二片棗半
箇煎七分熱服如不及煎入塩少許沸湯
點服亦得不拘時

三和散治五臟不調三焦不和簡易方此下有胃膈虛痞

四心腹痞悶脇肋真脹風氣壅滯肢節煩疼

頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難雖
年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲

食及脚氣上攻胃腹滿悶大便不通○醫方

大成治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃

燥澁醫方集成南北經方袖

檳榔麩裏煨熟去麩○直指方甘草炙木

香十錢方陳皮去芎藭得效方鈴方參兩白

木各參分○大腹皮炙焦羌活去蘆頭○

活人書紫蘇莖葉用宣州木瓜薄切沉香

各一兩

右為麤末每服二大錢水一盞煎至六分

去滓溫服不計時候得効方云四磨湯亦可兼服方見大小便

門○直指方右麤末每二錢煎服加赤茯苓

苓可以利氣水

七氣湯治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣志氣

喜氣憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞

痛不能飲食時發時止發即欲死此藥上之

○三因方治藏腑神氣不守正位為喜怒憂

思悲恐驚忤鬱不行遂眾涎飲結積堅牢有

如坯塊心腹絞痛不能飲食時發時止發則

欲死

半夏湯洗七次切作人參頭去蘆肉桂去麩

三因方海寮方桂炙各一兩○直指

心正桂方桂甘草方半兩簡易方已

撮要四味各兩御醫

右為麤末入半夏令勻每服三錢水一大

錢生薑三片直指方薑五片棗一枚簡易

五前至七分去滓稍熱服食前御藥院方

集或補珍方○三因方右剉散每服四錢

永類鈴方同水蒸半薑七片棗壹枚煎七分去滓食前

服澹寮簡易方又云一方治胃痺心痛微

背背痛徹心嘔吐厥逆冷汗自出用半夏

湯洗桂心不粗末每三錢水二盞姜七片

七次棗五個煎取壹盞熟服名通氣湯 一方

治喜怒不節憂思并兼多生悲恐或時震

驚致臟氣不平增寒發熱心服兩脇衝脹

上塞咽喉狀如梅核或似破絮咯不出噤

不下皆七氣所為也用半夏湯洗七白茯苓

苓四兩厚朴姜製紫蘇二兩剉散每四錢水蒸

半姜七片煎七分去滓食前服名大七氣湯亦名四七湯大抵氣結則生痰痰盛則氣愈結故治氣必先治痰如七氣湯初無治氣藥只以半夏為主行以官桂潤以人參和以甘草痰去而肺經清焦膈寬快氣自平矣玉機微義治七情之氣鬱結于中心腹絞痛人參甘草各一錢肉桂各一錢半夏一錢右咬咀水煎服

益智散治傷寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄利手足厥冷及一切冷氣奔衝心脇臍腹脹滿絞痛

益智二兩乾薑炮半兩青皮去白一兩烏頭炮去皮臍
四兩右件為散每服三錢水二盞入塩一捻生薑五片棗二箇擘破同煎八分去滓溫服食前

積氣圓治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不散胃脇支滿食即氣噎心

腹膨脹氣急刺痛宿食不和心腹引痛噎氣
吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癰塊疼痛臟腑不
調飲食不進往來寒熱漸覺羸瘦以致著床
而黃肌熱精神困頓

朱砂

研飛二錢半

肉桂

去麤皮二兩

巴豆

一百箇去皮心膜出

油取霜

桃仁

去皮尖麤研

乾漆

炒令焦木

香 鱉甲

醋浸天

大黃

麩裏煨去麩切焙

附子

炮去皮

京三稜

煨熟研碎

硃砂

研二

五升以硃砂大黃麝香別研二
同用慢火熬成膏

右為細末入研藥勻以醋膏為圓如梧桐
子大每服貳圓炒生薑湯溫下木香湯亦
得食後臨卧服更量虛實加減忌生硬冷
物

丁香圓治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫
氣吞酸脇肋刺痛胃膈痞悶或翻胃惡心食
飲不下氣上衝胃痞噎不通及食癥酒癖血
痕氣塊時發刺痛全不思飲食並皆治之如
常服消飲食行滯氣

丁香 木香

猪牙皂角

去炙 焦黑 肉桂 去

皮 乾薑 炮

京墨

燒醋淬 各一兩

青皮

去白 附子 炮

京三稜 炮

蓬莪茂

濕紙裹 紙乾去 煨令

碎炒令 煙盡 各

黑牽牛 炮

川大黃 末

乾漆

碎炒令 煙盡 各

二巴豆 霜

一錢半 先用醋煎

兩沸下

大黃熬膏

硃砂 二兩

別研

右為末同醋膏和圓如棗豆大每服壹兩

開茶酒任下如要取化癥瘕癖塊生薑湯

下七圓並食後服

增註和劑並食 後臨臥服之

小丁香圓消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡

心霍亂嘔吐治心腹脹悶脇肋刺痛胃膈痞

滿噎塞不通常服順脾胃進飲食

肉豆蔻

仁參 十箇

丁香

參 兩

木香 半 五靈脂 二十

兩 巴豆

去皮出油 二

百壹十箇

右為細末入巴豆令勻麵糊和令得所圓

如黍米大每服五元至七元溫生薑湯下

橘皮湯亦得食後服如霍亂吐逆煎桃葉

湯放冷下小兒吐逆不定參歲兒服三元

五歲已下服四元用生薑桃葉湯下

三稜煎圓順氣寬中消積滯化痰飲治中脘
氣痞心腹堅脹脇下緊硬胃中痞塞喘滿短
氣噫氣不通嘔吐痰逆飲食不下大便不調
或泄或秘

京三稜 生細判半斤擣羅為末以青橘皮

去杏仁 湯浸去皮炒令黃○一本 蘿蔔

子微乾漆 炒各神麩研炒○得麥蘗炒各

方○得効 硃砂 研飛一兩○得効

右為末以三稜膏搜和圓如梧桐子大每

服十五圓至二十圓 王氏藥驗方每服

米飲下食後服 直指○得効方又云加阿

魏五錢重名阿魏圓又名起粗三稜園薑

湯下

青木香圓寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈
噎塞腹脇脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰
逆不思飲食

黑牽牛 二伯四十兩炒香 木香 二十 補骨

脂炒 葦澄茄 檳榔酸粟米飯裏濕紙包
飯各四 十兩 灰火中煨令焦

右為細末入牽牛末令勻漸入清水和令
得所圓如菜豆大每服貳十圓簡易方五
大成集或南北經驗方 茶湯熱水任下
珍方永類鈐方參十元
食後服每酒食後可服五圓或七圓小兒
一歲服壹圓懷妊婦人不可服

九痛圓治九種心痛一蟲心痛二疰心痛三
風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷

心痛入熱心痛九去來心痛此藥悉主之又
治連年積冷流注心胃痛並療冷衝上氣落
馬墮車瘀血等疾

附子炮去皮 巴豆去皮心膜炒乾 狼毒炙
人參去 乾薑吳茱萸湯浸七次

右為細末鍊蜜和圓如梧桐子大每服空
心溫酒下一圓卒中惡心腹脹痛口不能
言者服二圓立瘥

生氣湯治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋

脹滿刺痛噫醋吞酸痰逆嘔吐骨膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣○御醫撮要療氣滯不勻胃虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

丁香 檀香 各壹兩半 舶上丁香皮 壹兩 乾薑 炮

甘草 炙剉 胡椒 二錢 搥 二兩半炒 ○撮要

點即旋入

右七味同搗碎用慢火燃令香熟乘熱入

磁器內蓋覆候冷碾羅作細末密盛貯勿令泄氣味每服半錢至壹錢沸湯點服不

計時候 撮要每服半錢沸湯點服食前

如聖餅子治男子婦人氣厥上氣下虛痰飲

風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡

心目瞑耳聾

川烏頭 炮去尖 天南星 洗 乾薑 各壹兩 甘草 炙

川芎 各二兩 天麻 防風 去蘆 半夏 生用各

右為細末湯浸蒸餅和圓如雞頭大捻作

餅子曝乾每服五餅同煎茶三五穗細嚼
茶酒任下熟水亦得不拘時常服清頭目
消風化痰暖胃

四柱散治丈夫元臟氣虛真陽耗散兩耳常
鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦小便滑數
泄瀉不止

人參 附子 炮去木香 濕紙包煨 茯苓 各壹

右為細末每服二錢水一大盞生薑二片
棗子一箇鹽少許煎七分空心食前服片

臟氣虛弱者宜服之

俞山人降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛
下虛膈壅痰實喘滿咽乾不利煩渴引飲頭
目昏眩腰脚無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕
脚氣

紫蘇子 微炒。簡易方前胡 去蘆。簡易

厚朴 去麤皮姜汁 半夏 麴 州半夏湯洗七

次姜汁 甘草 炙 橘皮 白 五加皮 塗炙 當歸

洗去 桂心 不見火。簡易方去 黃耆 各一

兩人參去蘆附子炮去皮尖桔梗炒去蘆羌活

乾薑炮各半兩

右為麤末每服三錢簡易方壹水蒸半紫

蘇三葉生薑三片棗子壹枚同煎七分去

滓食後服直指方同○簡易方云葉氏治肺滿

氣浮不能升降時時喘促兼治風冷痰嗽

川紫蘇子紙銚微炒前胡去蘆頭厚朴姜汁甘草

陳皮去白當歸淨洗半夏曲桂心不黃耆生

五加皮姜汁浸炙人參去蘆北桔梗去蘆羌

活各壹分沉香壹錢半阿膠半兩黃剉散每

服二錢水壹盞入蘇三葉姜三片棗壹枚

煎六分去滓食後服名加減降氣湯

撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛疝癖氣

塊冷氣攻刺及脾胃停寒胃滿膨脹腹痛腸

鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣痛婦人血氣刺等

疾

茴香炒香○南北陳皮去白青皮去白川芎

丁香皮炒大成蓬莪朮炮甘草

妙各一兩○經縮砂仁去麤皮肉桂白皮

驗方二錢半○經生薑四兩切作片子用塩

胡椒二錢半阿魏二錢半醋浸一宿以麵同為糊

右為末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓

一斤用朱砂七錢為衣丈夫氣痛炒薑盞

湯下一粒至二粒大成三粒婦人血氣醋湯

下類方集成袖珍方永常服壹粒爛嚼茶

酒任下

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胃膈痞

寒心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎

口中無味嗜臥減食又治胃痺留飲噎得効方醫

方大成集成南北經驗方袖珍醋開酸永類

方玉機微義衛生易簡方作意醋開酸永類

吞酸脇下支結常覺妨悶及中寒咳逆脾濕

洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣

人毒氣上衝心腸得効方堅滿肢體浮腫尤

宜服常服開胃消痰散壅思食

香附子二十五斤炒去須○得効方一沉

香壹斤二兩微義四兩易簡方三兩沉四錢六分不見微義四錢易簡方半

兩縮砂仁三斤○得効方去殼十二兩甘草

七斤半燼○得効方三兩微

義一兩二錢易簡方二兩右為細末每服壹錢諸方二錢入塩少許沸湯

點服凌旦霧露空心服之去邪惡氣使無

瘴疾○是齋醫方沉香七錢甘草二兩香

附子六兩縮砂仁二兩右件搗羅為細末塩

湯點服直指方治陰陽交滯心腹脹滿留

飲停酸積冷諸證沉香一兩縮砂仁二兩甘

草二兩香附壹斤右末每服壹錢點沸沸

點下

小烏沈湯調中快氣治心腹刺痛

烏藥壹兩去心○醫香附子沙益內浙去

兩○大成十兩甘草一分○大

三十兩成炒壹兩右為細末每服壹錢大成集成承塩少許

或不著塩沸湯點不拘時○王氏集驗方

治男子婦人氣刺疼痛中脘虛痞不思飲

食嘔逆惡心婦人血氣尤宜常服有益香

附子炒去毛烏藥壹兩甘草壹兩右為細末

每服貳錢匕。鹽湯溫酒任意調服。小腸疝氣疼痛，加小茴香一兩。此藥加牡丹皮、赤芍藥，治婦人經閉極效。

丁沉煎圓，辟霧露寒邪，散膈腕凝滯，調順三焦，和養榮衛，治心胃痞悶，噫氣吞酸，嘔逆痰涎，津液不收，兩脇刺痛，腹中堅滿。○苦無味，可思飲食。

白豆蔻仁九兩 丁香二兩 沉香三兩 丁香皮
壹木香半錢

右為細末，別用甘草煎膏為圓，每一兩分作二百五十圓，每服一粒，含化空心食前常服，養榮衛，散滯氣。

感應圓治虛中積冷氣弱，有傷停積，胃腕不能傳化，或因氣傷冷，因饑飽食飲酒過多，心下堅滿，兩脇脹痛，心腹大疼，霍亂吐瀉，大便頻併，後重遲澁，久痢赤白膿血相雜，米穀不消，愈而復發，又治中酒嘔吐痰逆，惡心喜睡，頭旋，胷痞悶，四肢倦怠，不欲飲食，又治妊

娠傷冷新產有傷若久有積寒喫熱藥不効者並悉治之又治久病形羸在苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或祕或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊愈此藥溫無毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積聚消逐溫冷療飲食所傷快三焦滯氣旋圓如菉豆大每服三五粒量虛實加減溫水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛

弱累有傷滯糞白鮮臭下痢水穀每服五粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項疾證連綿月日用熱藥及取轉並不効者不拘老幼虔心服餌立有神効○御藥院方治久積滯氣胃膈痞悶噫氣吞酸嘔逆惡心脇肋脹滿心腹痞痛水穀不消便利膿血疝癖氣塊發作有時內傷脾胃停飲不散飲食無味並皆治之永類鈴方治男女小兒停積宿食冷物不能剋化有傷脾胃或泄瀉臭如抱壤雞子

或下痢膿血並宜服此通利

新揀丁香一兩南木香去蘆頭二兩半

半肉豆蔻去麤皮用滑皮巴豆七十箇去

細出盡川乾薑姜製兩杏仁揀肥者去雙仁

油如粉浸一宿去尖湯極爛如膏百草霜用村庄家罈底

皮別研極爛如膏百草霜上刮者細研秤

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘

四味擣為細末與前三味同拌研令細川

好蠟置和先將蠟六兩鎔化作汁以重絲

濾去滓更以好酒一升於銀石器內者蠟

鎔袞數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取

蠟秤用凡春夏修合用清油壹兩於銚內

熬令末院方散香熟次下酒煮蠟四兩同

化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬

修合用清油壹兩鈞方同煎煮熱作

汁和置藥末成劑分作小錠子以油單紙

裹之旋圓服餌院方每服旋丸如菘豆大

辦虛實加減服之每九食後溫水此高

殿前家方也。○易簡方云：每用銚半兩，入巴豆二十枚，去殼不去油，爛研成膏，一處搜和令勻，再圓如棗，豆大，每服一十圓，薑湯嚥下。本方巴豆去油，取霜，蓋取其穩。當然未必能療疾，若通醫用之，必不去油。蓋此藥自是驅逐腸胃間飲積之劑，非稍假毒性安能有蕩條之功。如局方感應圓，令人見飲食不化，中脘痞滿，率多服之以爲寬中快鬲。此大不然，寬快之樂自常用。

消化之劑如枳殼、縮砂、豆蔻、橘皮、麥蘖、三稜、蓬朮之類是也。與轉利飲積之藥不同。令人往往見巴豆不去油，多不敢服。况內顧有慊者，尤不肯用。然而巴豆治揮霍垂死之病，藥至疾愈，其効如神。真衛生伐病之妙劑。參朮雖號爲良善，却能爲害。每見尊貴之人服藥，只求平穩，而於有暝眩之功者，不敢輒服。醫雖知其常用亦深慮其相信之不篤，稍有變證，或恐歸咎於已。姑

以參朮等藥迎合其意儻有不虞亦得以藉口而不知養病喪身莫不由此且巴豆之性佐以溫暖之劑止能去苑莖不動臟氣有飲則行無飲不利若病人體雖不甚壯實既有飲氣積氣之患與夫邪氣入腹大便必祕若非挨動病何由去猶豫不決則病勢攻擾愈見羸乏莫若於病始萌之時氣體尚壯對證用之宿痼既除旋加調理自獲十全 若心腹疴痛不可忍者當

服此藥以大便通利爲効或未甚通更宜倍加圓數雖多服無害以利爲期若利後大腑不調或泄瀉不止或愈見絞痛當以家菖蒲煎湯解之却於咬咀方中選藥調理自能平復或者見服藥之後痛或愈甚既已流利痛或未除便謂前藥之訛殊不知乃陰陽擾亂臟氣未平耳徐當自定若遽更醫却承前藥之力尋卽獲愈遂收功於後而歸咎於前如此者衆不可不知

治心腹痛甚而大便秘者至於厥逆或面青口噤或六脉沉伏者痛使之然非虛脫也當先以蘇合香圓灌下次投此利之其効甚速 治惡心嘔吐全不納食而大便秘者多由飲停胃脘膈節不通宜以此藥微微利動却於二陳湯方中求之 治赤白痢臍腹痛者多由腸胃間積滯所致先以此藥微利次方斷下可於斷下湯方中求之 兼治男子疝瘕疝氣膀胱奔豚

腎氣脚氣攻刺亦用此藥微微疏利却服降氣湯之類 酒積食積痰飲爲患婦人血氣並宜服之凡服此藥作效者不宜遽人當以來復丹半硫元之類間以湯劑調理使大便不致再秘則諸苦悉除矣 婦人有妊忽覺心腹撮痛嘔吐惡心百藥不効者此爲滯證宜以薑湯下六七十圓滯去卽安人多以巴豆爲疑殊不知病證與藥相投夫亦何害

小理中圓治三脫氣弱中焦積寒脾虛不磨
飲食遲化與物頻傷胃膈滿悶脇肋疴刺嘔
吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴必腹疼痛噎塞
膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻 煨 京三稜 煨乘熱碎 乾薑 炮 青皮 增註和劑

去穢 陳皮 淨洗 肉桂 去麤皮 牽牛 炒香 良薑

各二兩 蓬莪茂 煨乘熱碎 縮砂仁 紅豆 各一斤 阿

魏 參兩醋化作沙

右為末用水煮麵糊為圓如梧桐子大每

服三十粒牛薑橘皮湯下溫湯亦得不拘
時此藥無利性不損氣脾胃偏虛寒者最
宜服之

大七香圓治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏
不思飲食心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉痢氣
刺氣疰中酒吐酒冷疰翻胃霍亂吐瀉並皆
治療

丁香 皮三百參十兩 縮砂仁 甘草 炒

陳皮 洗簡易方去白 肉桂 易方去麤皮 簡藿香葉

各二百五十兩。烏藥六十兩。香附子百九
簡易方各二兩半。烏藥四十兩。香附子百九
十二。甘松揀六十四兩。○麥蘗炒一百兩
兩。甘松簡易方去土。○麥蘗簡易方
各一

兩

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一粒搥
酒搥湯嚼下婦人脾血氣如經月小不調
並用炒薑酒嚼下醋湯亦得大有神効忌
生冷肥膩之物。○簡易方又云用丁香皮
香附子炒去毛。甘草炒各六兩。莪術根。縮砂仁各
兩。甘松四兩。益智仁炒三兩。為末水浸蒸餅為

圓如棗豆大每三十圓姜湯熟水任下能
溫中快膈化積和氣名小七香圓御藥院
方治脾胃不和三焦痞滯氣不宜通腹脇
脹滿胃膈噎寒食飲遲化氣刺氣疝中酒
吐酒常服消穀進食丁香皮三兩。縮砂仁
甘草炙。陳皮去白。肉桂去麤皮。藿香各二兩。香附
子炒壹兩八錢。甘松去土六錢。烏藥六錢。大麥蘗
炒壹兩。右為細末煉蜜和丸每兩作八丸每
服壹丸不拘時候細嚼溫酒或鹽湯生姜

湯下或作小丸如梧桐子大每服四五十丸亦得服

小七香圓能溫中快膈化積化氣治中酒吐酒嘔逆噯酸氣膈食噎飲食不下冷涎翻胃腹脹脾疼遠年茶酒食積眼臉俱黃赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣小兒疳氣疾

丁香皮

香附子

炒去毛

甘草

炒各一百

蓬

莪朮

煨乘熱碎

縮砂仁

各二兩

甘松

炒八兩

益智仁

炒六兩

十兩

右爲末水浸蒸餅爲圓如菜豆大每服二十圓溫酒薑湯熟水任下或氣脹滿磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭眩惡心胃膈滿悶先嚼二十圓後吞二十圓生薑紫蘇湯下此藥性溫平不動臟腑
連翹圓治男子婦人脾胃不和氣滯積聚心腹脹滿乾嘔醋心飲食不下胃膈噎塞脇肋疼痛酒積面黃四肢虛腫行步不能但是脾胃諸疾並宜服之

荆三稜炮二伯四肉豆蔻五兩十檳榔八兩

連翹增註和洗陳皮洗各二伯蓬莪朮炮肉

桂去蘆皮青皮洗各一百好墨十一百六牽

牛子二百二十兩右為末麵糊為圓如梧桐子大每服三十

圓生薑湯下久患赤白痢及大腸風秘脾

毒瀉血黃連煎湯下婦人諸疾薑醋湯下

不拘時孕婦莫服

酒癥圓治飲酒過度頭旋惡心嘔吐不止及

酒積停於胃間過飲即吐久而成癖

巴豆十五箇不去皮膜不出油雄黃棟如六箇皂角子

六十箇皂角蠍梢十五

右三味同研細入白麩五兩半滴水印如

豌豆大候稍乾入麩內炒香將一粒放水

中如藥粒浮於水上即去麩不用每服二

粒溫酒下食後服尋常傷酒每服一粒茶

酒任下

煨薑圓治本臟虛飲食不化或成痞癖或發

煨薑圓治本臟虛飲食不化或成痞癖或發

心痛冷積水脾結聚疼痛一切冷氣等疾

附子 礪砂 木香 生薑

右用大附子五十箇各重半兩者去皮臍以尖刀子剝去心子約容礪砂半錢實之却以附子末和麩作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同為細末以水為圓如鷄頭大復以生薑壹塊擘作兩片以藥在內濕紙裹令煨候薑熟白湯嚼下空心服

紅圓子治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶面黃腹胃四肢無力酒積不食乾嘔不止背胛漣心胃及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老少並宜服之○永類鈴方壯脾胃消宿食去膨脹

荆三稜 水浸 青皮 蓬莪茂 陳皮 各五

乾薑 炮 胡椒 各三斤○王氏集驗方用良薑

右為細末用醋麵糊為圓如梧桐子大擘

紅為衣每服三十粒鈐方二食後薑湯下

小兒臨時加減與服○集驗方又云加胡

椒名胡椒紅九子加阿魏名阿魏紅九子

小兒量大小加減九數 煨礬紅法青礬

不拘多少先以壹介銷銀鍋用皂莢擺銀

鍋周遭內青礬內上又以皂莢蓋覆炭火

內煨以青礬通紅為度易簡方蓬莪朮荆

三稜橘紅青皮各五胡椒乾薑各三阿魏

兩礬紅為衣又一石為細末米醋煮糊為

壹家不用此

圓如梧桐子大每服五六十圓薑湯吞下

治大人小兒脾胃等患極有神効但荆三

稜蓬莪朮本能破癥消癖其性猛烈人不

以此為常服之劑然今之所用者以出產

之處隔絕二藥不得其真乃以紅蒲根之

類代之性雖相近而功力不同以之治病

不能傷耗真氣應老人虛人小兒妊婦皆

可服之無疑但修合之際務在臻志用好

米醋煮陳米粉為圓仍去阿魏礬紅最宜

常服飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈
大病之後穀食難化及治中脘停酸並用
姜湯燕下 脾寒瘡疾生薑橘皮湯下
心腹脹滿紫蘇橘皮湯下 脾痛作楚菖
蒲湯下 酒疸穀疸遍身皆黃大麥煎湯
下 兩脇引乳作痛沉香湯下 酒積食
積面黃腹脹時或乾嘔煨姜湯下 婦人
脾血作痛及血癥氣瘕并經血不調或過
時不來或發爲寒熱者並用醋湯下 產

後狀如癲狂者此乃敗血上攻迷亂心神
所致常用此藥熱醋湯下其効甚速 男
子婦人有癲癩之患者未必皆由心經蓄
熱亦有因脾氣不舒遂致痰飲上迷心竅
乃成斯疾若服涼劑過多則愈見昏亂辰
砂衣此藥用橘皮湯燕下名小鎮心元
妊婦惡阻嘔吐不納食百藥不療惟此最
妙仍佐以二鍊湯五膈寬中散服之但人
疑紅圓子不利胎氣未必信服當易名用

之特有奇功然恐妊婦服此之後偶爾傷動必致歸咎故不敢極言其妙耳

蘇子降氣湯治男女虛陽上攻氣不升降上

盛下虛膈壅痰多醫方大成集成南北經驗方袖珍方同方見咳嗽門

承類鈔方此下云咽喉不利欬嗽虛煩引飲

治久年肺氣至效頭目昏眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疔刺冷

熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢體浮腫有妨

飲食

川當歸去蘆○一甘草燻厚朴去蘆皮○

制前胡去蘆各二兩○一本陳皮去白肉佳

去蘆皮各二兩○壹本紫蘇子半夏

兩鈔方已上二味各三兩麩各五兩○壹本已上

二兩半鈔方云壹本作二兩右為細末每服貳大錢水一錢半入生薑

二片棗子壹箇蘇五葉同煎至八分去滓

熱服不拘時候常服清神順氣和五臟行

滯氣進飲食去濕氣○鈔方右咬咀母三

錢水壹盞姜三片棗乙介煎服無時千金

翼名紫蘇湯虛冷人加桂乙兩與芪二兩

此古方也一方壯實人去肉桂加沉香

分心氣飲治男子婦人一切氣不和多因憂

愁思慮怒氣傷神簡易方得効方澹或臨食

憂感簡易方得効方或事不隨意使鬱抑之

氣簡易方得効方留滯不散停於胃膈

之間不能流暢致心胃痞悶脇肋虛脹噎塞

不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦

怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦

或大腸虛秘或因病之後胃膈虛痞不思飲

食並皆治之袖珍方同簡易方得効方澹寮

化滯氣進美飲食此方獨清而疎快常服大効

木香不見火丁香皮一本壹兩澹寮方炮一

人參十斤厚朴去麤皮大腹子炮大腹皮炙

澹寮桑白皮炒草果仁炒桔梗去蘆麥門

冬子去心白木各半兩香附子炒去毛紫蘇

夫梗二味永類各乙兩藿香去土三味各一

兩半兩陳皮去白各壹兩乙兩澹寮甘草

兩

右吹咀每服二錢醫方大成集成南止經

三水一盞生薑三片燈心十莖棗子一箇

擘破去核煎至七分去滓溫服不拘時玉

微義右吹咀每三錢入姜棗煎又方見後

祕傳降氣湯治男子婦人上熱醫方大成下虛

之疾凡飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損

腎元水土得効方作火交攻陰陽關隔遂使氣不

升降上熱大成則頭目昏眩痰實嘔逆胃膈

不快咽喉乾燥飲食無味下弱大成則腰脚

無力大成此下有大便秘澁裏急後重臍

腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以

溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久

痢不差宜先服此藥却以所主藥治之無不

效者得効方云氣壅耳

五加皮酒浸半日骨碎補去毛地骨皮炒

壹本及增註和劑大成壹兩桔梗炒訶

子炮取半夏生為未生薑自然汁為餅再

炒肉炒草果去皮膜淨洗炒黃各半枳殼湯洗

楚柴胡人蘆洗陳皮夫白炒甘草炙各桑白二兩

右為羅散和勻再就蒸壹伏時直指

效方和勻以椀盛就取甌上每服二錢紫

蘇三葉薑錢三片水壹盞同煎至七分食

後通口服大成常服調順榮衛通利三焦

開鬲化痰利五藏痰嗽加半夏麴方類

夏煎心肺虛大成加人參茯苓得効方每

煎上脘熱加北黃芩得効方煎下部大段

虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑

婦人血虛加當歸得効方煎直指方同集

方油珍方承類鈴方與大成同

木香分氣圓治一切氣逆心胃滿悶腹脇虛

脹飲食不消乾嘔逆吐胃鬲痞滿上氣咳嗽

冷痰氣不升降並宜服之

木香簡易方甘松洗去泥香附子十六兩

方炒甘草炙六蓬莪朮煨八

去毛簡易方末水糊為圓簡易方棗大豆經驗

方袖珍方如梧桐每服二十粒煎生薑橘

子每服三十元皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜常服寬

中順氣進食又方見後

鐵刷湯治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛

及治中酒惡心一切瘧痢氣疾腸風下血臟

毒滑腸泄瀉

蒼朮八兩良薑六兩茴香炒二甘草炙八

生兩

右為細末每服二錢生薑三片塩一捻水

膏蒸煎至七分温服或用熱酒調下亦得

如脾寒用酒壹蒸煎臨發時連進三服兼

治四方之人不伏水上小兒臟寒脫肛並

用薑三片棗子壹枚煎服如冒暑伏熱擦

生薑冷水調下若行路早起棗子壹箇去

核包藥少許同生薑三片嚼下能辟四時

非節疫癘砂瘴等疾

煎散治男子婦人一切冷氣攻衝胃脇及

前後心連背脊疼痛轉項拘急或脾胃虛冷

不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸氣疝內外腎疼又治婦人血氣刺痛血積血痕繞臍撮痛並治之

草果仁去皮煨 茯苓去皮 甘草燻 縮砂仁去殼 麥牙炒 陳皮去白 羌活去蘆 厚朴去皮 肉豆蔻 煨川芎洗 蒼朮米泔浸 枳殼去穰炒 華澄茄 良薑油炒 檳榔 茴香炒各二兩 右件碾為細末每服二錢水壹盞半入塩

膏字同前至八分空心食前服之又方見後 ○

醫方成右咬咀每服三錢水壹盞入塩

少許煎至七分空心服醫方集成南北經驗方袖珍方水類

鈔方同玉機微義右咬咀每服四五錢入塩此小煎

神仙沉麝圓出蘇沉 治一切氣痛不可忍者

木香研 沉香研 麝香研 血竭研 辰砂研沒

藥各二兩 甘草兩

右為末熬甘草為膏搜和每服壹圓用薑塩湯嚼下血氣醋湯下松滋令萬君擬寶

此藥婦人產後血痛氣痛不可忍者只宜
圓立効萬君神祕之每有人病止指與牛
圓往往亦瘥神効不可盡述

白沉香散治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿
噎醋吞酸胃膈噎塞飲食減少常服降氣和

脾胃

川白薑炒半夏麴炒白茯苓附子炮熟

訶子肉煨白朮煨沉香三人參蘆薈山藥

木香各一兩丁香半兩甘草炙六錢

右為細末每服二大錢水壹中盞生薑三
片棗三枚木瓜壹片煎至七分食前服

鷄舌香散治男子女人陰陽不和藏腑虛弱
中脘氣滯宿寒留飲停積不消胃膈脹滿心
脾引痛攻刺腹脇有妨飲食又治中酒吐酒
停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸

天台烏去木○王氏集驗去麤皮肉桂去麤皮香

附子炒去毛赤芍藥去麤皮高良薑去麤皮油炒各四兩

○一本及集類方各一甘草炙半兩○承

右爲細末每服二錢入塩少許沸湯點服
 不拘時候醫方大成集成南北經驗方補珍方同
 薑合圓治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留
 滯不化結聚成形心腹膨脹刺痛成陣上連
 胃脇或脾胃久虛內傷冷物泄瀉注下腹痛
 腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治
 脾腕停痰嘔吐吞酸痞塞不通可思飲食身
 體沉重面色萎黃或久患心脾疼痛服之永
 除根本小兒有傷積服之神効此藥不損臟

腑

肉豆蔻炮 白朮焙 厚朴去麤皮薑汁刷炙 陳皮去
 青皮去白各二兩 附子炮去皮臍二兩半 人參
 丁香不見火 木香不見火 乾薑三兩炮
 右爲細末入硃砂八錢重同薑汁打麪糊
 爲圓每兩作二十圓每壹圓用薑一本及增註和
劑老 薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥
 在內用濕紙裏慢火煨一頓飯久取出去
 紙和薑細嚼白湯下孕婦不得服小兒一

粒分作四服

順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胃膈痞
悶脇肋脹滿及酒食所傷噫氣吞酸心脾刺
痛大便不調而黃肌瘦可思飲食兼療婦人
血氣刺痛及一切冷氣○直指方治冷證腫
脹泄瀉

高良薑去蘆炒 乾薑炮 茴香炒 陳皮去白縮砂

仁去蘆皮 肉桂○直指方 桔梗炒 厚朴

薑汁炙 丁香皮 蒼木浸 甘草燼

右等分爲細末每服二錢醫方大成集成

珍方永類 水壹錢生薑三片棗二枚同煎

八分稍熱服不拘時入鹽少許沸湯點服

常服寬中順氣和胃進食直指方右末每

食前

快氣湯治一切氣心腹脹滿胃膈噎塞噫氣

吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁去皮殼 甘草四兩 香附子炒去毛

兩

右為末每服壹錢塩湯煎下常服快氣美
食温養脾胃一本及增註和劑或判為粗末入生薑同煎名小降氣湯
集香圓治一切氣疾胃脘痛悶脇肋脹滿心
腹疼痛噫氣吞酸嘔吐惡心可思飲食或因
酒過傷脾胃不和並皆治

白豆蔻仁 縮砂仁 香附子 炒去毛

註和劑四木香 不見火 薑黃 各四兩 麝香 別研

兩八錢 甘草 壹十六兩二兩入藥丁香 不見火

兩一十四兩 右為細末入麝香拌勻用甘草膏搜和為

圓如梧桐子大每服壹二圓細嚼嚥津不
拘時常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積

滯去癥塊

異香散治腎玉機微義氣不和腹脇膨脹痞悶

疝寒喘滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣

痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷

沉積常服調五藏三焦和胃進食

蓬莪茂 煨 益智仁 炮 京三稜 煨

甘草 燼各六兩 石蓮肉 一兩 青橘皮

去陳橘紅各三兩○大成南北經厚朴二
白驗方微義各二兩去白

去皮葛製
右為細末每服壹錢一本及直指方水壹

蒸生薑三片棗壹枚檢壹捻煎至七分通

口服大成醫方集成經驗不計時搗湯點

或鹽酒調皆可服微義右為末每服

肉豆蔻圓治氣瀉療脾胃氣虛弱飲食減少

肉豆蔻用縮砂仁各一木香龍骨訶

黎勒三分赤石脂白礬丁香各

右為末粟米飲和圓梧子大每服十圓本一

二十米飲下不拘時

三稜散治酒食所傷胃膈不快腹脇脹滿嘔

吐酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不

思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞

常覺妨悶並宜服之

蓬莪茂煨京三稜煨青皮去益智仁各二

白茯苓四兩甘草兩

右為末每服二錢水壹大盞棗壹枚擘破

類聚卷之七
塩少許同煎至半蒸溫服不拘時常服寬
胃利膈消酒食和胃

如神圓治一切冷氣熱氣消癖氣和脾胃補
下元

荆三稜醋浸炮搥附子炮去皮臍甘草炙羌活天

南星炮半夏湯洗七次薑製○一本及增註和劑湯浸二七遍薑汁炒

令乾薑炮白芷

右等分爲末醋煮麵糊圓梧子大每空心
生薑搥湯下二十圓至三十圓患瀉二宜

湯下三十圓小兒赤痢甘草橘皮湯下三

圓至五圓量歲數加減服白痢乾薑湯

丁香脾積圓治丈夫婦人小兒諸般食傷積

聚胃膈脹滿心腹膨脹噫氣吞酸宿食不化

脾疼翻胃婦人血氣刺痛

蓬莪朮參皂莢參挺火燒存性○丁香二

木香各半兩○人京三稜二青皮洗兩高

良薑已上河用米醋壹升於甕餅內煮乾

焙乾○大巴豆去殼各半兩○王氏集驗

香木香各半兩
半兩以上殼良薑半兩以上同用米醋
於甕瓶內煮乾莖末參稜良姜乘熱切碎
同焙乾青皮洗青兩皂莢三大挺火燒留
性

右入百草霜三匙同為末麵糊圓如麻仁

大集驗方每服五圓七圓至十五二十圓

止集驗方主蠱毒送下隨病加減湯使尤
好見以此方於南北廣濟廣惠兩局修
合設施其效如神大成

每服十圓至二十圓止食傷隨物下脚積

氣陳皮湯下口吐酸水薑湯下簡易方大

下翻胃大成作藿香甘草湯丈夫小腸氣

炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔

逆菖蒲湯小兒疳氣史君子湯下更量虛

實加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶

清下利三五行後以白粥補之醫方集成南北經驗

方袖珍方永類孕婦不可服

分心氣飲治證與前分心氣飲同

大腹皮管見大全良方洗赤芍藥簡易方得效木

通方去節木香半夏湯洗桑白皮微赤茯

苓肉桂去方桂心良甘草炙陳橘皮去穢青

橘皮去白羌活各一兩○良紫蘇去麤硬

右為麤末每服三錢水壹盞生薑三片棗

二枚煨心五葦簡易方得效方十葦煎至七

分去滓溫服不拘時候常服消化滯氣升

降陰陽調順三焦和脾進食○袖珍方右

咬咀每服一兩半姜棗子燈心二十葦木

二盞煎至一盞去粗通口服之簡易方云

治氣之藥率多溫熱此方獨清而踈快常

合以濟人隨施輒驗觀其用藥自可見矣

和劑方治男子婦人脾胃不和胃膈痞塞

腹脇疼痛氣促喘滿心下膨脹飲食不思

嘔吐不止用五味子去梗桔梗炒茯苓去皮甘

草炙陳皮淨洗桑白皮炒草果仁煨大腹皮

各三兩紫蘇棟嫩枝葉為粗末拌和每服四

錢水壹大盞姜三片塩少許煎至七分去

滓空心服名分氣紫蘇飲葉氏經驗方

治氣留滯四肢腫滿腹急中滿胃脇膨急

虛氣上衝小便臭濁神思不爽用木香亦

茯苓宣兩木猪苓去皮澤瀉半夏湯洗七次
 宿枳殼去瓢紫蘇子炒檳榔炒各為粗末
 每服三錢水壹盞半燈心五寸長二十莖
 煎至八分去滓入麝香少許和藥食前服
 名木香分氣湯得效方云氣秘每服加枳
 殼去穰栗殼蘿蔔子皂角子各半錢咳嗽
 不利加人參壹錢五味子七粒桔梗壹錢
 氣滯腰疼加木瓜二片枳殼壹錢半水氣
 面目浮腫加車前子麥門冬去心甜葶藶

干木瓜澤瀉猪苓去皮每料各壹兩又名
 小流氣飲

木香分氣圓治證與前木香分氣圓同

丁香皮 蓬莪茂煨本 水香 甘草 香

附子炒去毛 縮砂仁各四兩 檀香南北

廿松洗 川薑黃 藿香葉 各壹

石十味熬乾 不見火擣羅為末稀糊為圓

如梧桐子大每服二十圓至三十圓生薑

橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜服之

常服寬中順氣進飲食

醫方大成類方同

化氣湯治一切氣逆胃膈噎悶

醫方大成類方同

膨滿又治心脾

大成有卒字

疼痛嘔吐酸水大夫

小腸氣婦人脾血氣

沉香

胡椒各一兩

縮砂

去殼桂心皮

木香

各二兩

陳皮

去麩炒

乾薑

炮

甘草

炙

茴香

炒青

皮

去白麩炒

蓬茂

煨丁皮

各四兩

右為細末每服二錢薑蘇搗湯調下

大成無薑

漁寮方每服叁錢薑湯調下

婦人淡醋湯下

醫方集驗

方袖珍方類

蘇子降氣湯

一本及增註和

治中皖不快腹

心脹滿陰陽壅滯氣不升降胃膈噎塞喘促

短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥減

食宿寒留飲停積不消脇下支結常覺妨悶

車治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲

食

半夏

洗七次

蘇子

淨炒各二兩半

梗四

甘草

炙二兩

一本及增註

肉桂

去

不皮前胡去蘆厚朴用薑汁製○一本陳皮
見火去白各壹兩○一當歸壹兩半○一本
本及增註叁兩半及增註去蘆三
兩

右為咬咀每服貳錢至三錢水壹大盞生
薑三片煎至七分去滓溫服不拘時常服
消痰飲散滯氣王氏集進飲食直指○得
效方又云體虛痰喘加人參壹錢北五味
子七粒塩梅壹箇杏仁七粒去皮尖紅棗
二枚煎虛煩加知母人參每料各壹兩集

驗方云東野大德丁酉在龍興治憲司書
吏張敬先妻產後月餘咳嗽吐血上氣喘
急不得睡臥省鑿吳君衡作嗽治不效余
診之脉沉而瀦語敬先曰此不可以嗽治
當與君衡議治君衡曰公不作嗽治願聞
其證余曰脉沉瀦者血露未盡凝滯不下
行則上衝心肺故氣逆而喘嗽君衡曰願
聞治法余曰蘇子降氣湯減陳皮加生地
黃赤芍藥治之君衡曰善遂修治與服至

晚敬先曰血已下行氣喘亦定矣自此調治數日向安又治本處西華門染坊呂婦病寒熱往來嘔逆惡心遍身疼痛泄瀉不止壹月餘日粥藥不入淹淹垂死胗得脉沉而弦知其體虛胃弱寒邪乘之遂用二陳湯壹服嘔逆止而飲食思再以蘇子降氣湯數服前證俱退胃氣安和進加飲食數日而愈所謂鑿者意也不可執方療病者此之謂歟又本府橋步門外楊副使母

病僅一月餘名鑿聶三奇者治焉壹日求治於余余胗之脉沉而細病者沉困不能言語粥藥不下但存喘息而已余曰脉細者體虛也沉者胃有痰也遂用茯苓半夏湯加生薑汁壹合同服病者自覺心膈寬快索求前藥遂再投壹服次以蘇子降氣湯吞養正丹治之數劑而差 二陳湯治驗方見咳嗽門大德十年丙午余任吉州鑿官提領時有瑞州劉萬戶居吉州患中風偏

廢命撫州李提領修合御藥院方換骨丹服餌膏日病者小便不通小腹疼脹上氣喘急自汗請余診得脉息沉伏愚謂關格不通痰涎上壅氣逆而不下遂用二陳湯倍赤茯苓二人服至晚小便下至半掬而喘定汗止萬戶喜而曰此藥何神驗如是然亦公之理明也

五皮散治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫滿心

腹膨脹上氣促急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下注來去不定舉動促乏

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮

茯苓皮

各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服不拘時候切忌生冷油膩堅硬等物

四君子湯治榮衛氣虛藏腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆

人參去蘆 茯苓去皮 甘草炙 白朮各等分

右為末每服二錢水壹盞煎七分通口服不拘時搥少許白湯點服常服溫和脾胃進益飲食辟寒邪瘴霧氣

煎散治證與前煎散同

青皮去白 蒼朮去皮 良薑各十二兩 ○一本及增註和劑抄

肉桂去麤皮 ○一本及增註 丁香皮 各二兩 縮砂皮 茵

香炒 橘紅一十兩 甘草炒 六山藥片

右為末每二服水一盞半鹽一字煎八分

空心食前服

人參丁香散治大人小兒嘔吐不已粥飲湯

藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛

弱冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯亂

停痰留飲不能運化胃隔痞滿嘔逆惡心腹

脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸不思

飲食漸至羸瘦及療女人妊娠阻病心中煩

憤頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安

四肢困弱不自勝持多卧少起又治久病羸

弱脾胃虛極中滿嘔逆全不入食並宜服之
 白芍藥斤半當歸去蘆丁香 蓬朮 桂肉去麤
 皮人參去蘆丁香各二兩乾薑炮甘草炒茯苓
 去香附子炒白朮 山藥各四兩
 右為末每服五錢水壹盞生薑三片煎七分
 分空心食前溫服小兒二歲可服半錢水
 五分蒸生薑一片煎四分已下溫服更宜
 量歲數加減與之常服和脾胃進飲食
 盧氏異方感應圓與和劑方大不同但用修

製須如法分兩最要勻停止是煖化不可偏
 勝此藥積滯不動藏腑其功用妙處在用蠟
 之多切不可減常服建脾進食永無寒熱瀉
 痢之疾蓋消磨積滯以漸自然無疾遇酒食
 醉飽尤宜多服神效不可具述

肉豆蔻麩裏木香濕紙裏乾薑炮片子薑黃
 百草霜篩丁香懷檳榔 青皮易洗去草
 澄茄各一兩乳香三錢杏仁七十枚去皮尖
 去真蠟黃兩十巴豆百粒去皮研透再易紙
 油重裏搥

油成白
霜爲妙

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外餘並爲
細末却同前四味拌和研勻先將上項黃
蠟十兩於銀石器內鎔化作汁用重絲濾
去滓以無灰好酒一升於銀石器內煮蠟
鎔數袞取起候冷其蠟自浮於酒上去酒
不用春夏修合用清麻油壹兩秋冬用油
壹兩半於大銀器內熬令香熟次下酒煮
蠟同化作汁乘熱拌和前項藥末十分均

勻了候稍凝分作劑子用罐子盛之半小
後方可服如服旋圓如蘿蔔子大任意服
之二三十圓加至五十圓無礙此藥以蠟
多雖難圓然圓子愈細其功愈博臨睡須
常服之若欲治病不拘時候

木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦
安和五藏治諸氣痞滯不通胃膈膨脹口苦
咽乾嘔吐少食肩背腹脇走疰刺痛及喘急
痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤

澁簡易方作澁又治憂思大過怔忡鬱積脚氣

風濕一本作熱聚結腫痛喘滿脹急

陳皮去白二斤甘草燼厚朴去麤皮薑

方大成去紫蘇莖 青皮去白香附子炒各

壹斤○簡易方木通八兩去節○簡易大

腹皮澁寮方洗永丁皮不見檳榔 肉桂

去麤皮不見火草果仁 蓬朮切藿香枝

梗木香去麤皮不見火各六兩○乾木瓜

澁寮方人參去白朮澁寮方炒麥門冬心

石菖蒲簡易方得效赤茯苓去白芷各四

直指方半夏二兩湯洗七次切片焙乾○

各膏兩方半兩直指方一兩鈐○

右為籩末每四錢水壹盞半生薑三片棗

子二枚煎七分去滓熱服醫方集成南北

同直指方右到散每服三如傷寒頭痛纒

覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽

汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦人血

氣癥瘕入艾醋煎並不拘時候澁寮方云

不快服 ○經驗秘方半夏二錢厚朴青皮
 之尤効
 香附子紫蘇甘草 各壹兩 人參赤茯苓白
 術木瓜石菖蒲白芷麥門冬 各四錢 陳皮 三兩
 二木香蓬莪朮檳榔肉桂藿香木通大腹
 皮丁香皮草果仁 各六錢 加減藥味于后
 平服加川椒沉香磨膏 上膈壅熱加大
 黃 眼目昏澁加菊花當歸 肚痛加乳
 香 小便赤澀加車前子 大便不通加
 枳殼大黃

二十四味流氣飲方與木香流氣飲方同但

無石菖蒲藿香有沉香枳殼大黃 沉香六兩枳殼

去穢麩炒四兩大黃麩裏煨去麩切二兩出集驗方○袖珍方同

麝香蘇合香圓方與前蘇合香圓同 增註和劑只去

子醫

木香檳榔圓踈導三焦寬利胃膈破痰逐飲

快氣消食通潤大腸

郁李仁 去皮 皂角 去皮酥炙○得効方醫方

珍方永類鈴 半夏麩 各二兩○用枳殼麩方去白酥炙

青橘皮去白杏仁去皮尖木香不見火檳榔各

右為細末別用皂角四兩用漿水一椀搓

揉熬膏更入熟蜜少許圓梧桐子大每服

五十圓食後溫生薑湯下御藥院方同

五香散升降諸氣宣利三焦踈導壅滯發散

邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛

結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣

急

大香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

右為麤末每服三錢水一盞醫方大成集成南北

經方袖珍方煎八分去滓食後溫服

人參木香湯順氣寬中治胃膈痞塞心腹刺

痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶

一切氣疾並皆治之

青橘皮不去白木香不見火麥蘖去土薑黃

各五斤蓬莪朮刷洗甘草剉鹽炒各十斤

右為末每服一錢沸湯點服不拘時候

