

外臺

祕要方卷第十三

骨蒸傳屍鬼辟

朝散大夫守光祿卿直祕閣判

登聞檢院上護軍臣林億等

虛勞骨蒸方七首

骨蒸方一十七首

灸骨蒸法圖四首

疝氣骨蒸方三首

虛損慘頓作骨蒸方四首

瘦病方五首

傳死方四首

伏連方五首

飛尸方三首

遁尸方三首

五尸方十一首



尸症方四首

五症方四首

江南方十九症方二首

江南三十六症方三首

症病相染易方三首

鬼症方二首

鬼症心腹痛方一首

鬼症羸瘦方二首

鬼氣方三首

鬼魅精魅方八首

鬼神交通方四首

白虎方五首

無辜方二首

除骨熱方四首

盜汗方七首

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一日骨蒸其根在腎旦起體涼日晚即熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變為疰食人五藏二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫卧即浪言或驚恐不之脉數蒸盛之時或變為疰臍下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時骨滿或自稱得症熱兩脅下脹大欬徹背連脾疼眠寐不安或蒸毒傷臍口內唾血因白肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便祕澁蒸盛之時或體腫月赤寢卧不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必

外寒而內熱把手附骨而熱甚其根在五藏六腑其人必因患後得寒骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跖腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸~~蓋~~黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脉蒸脉不~~轉~~或急或緩九肝蒸眼黑十二蒸若乾十一脾蒸脣焦十二肺蒸~~鼻~~乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下脣焦十八大腸蒸鼻右乾乾痛十九三焦蒸亦離病乍熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成痲病必須先防下部不得輕妄療之出第四卷中

崔氏療五蒸失蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸庸醫及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神祟以相疑或蒸盛擦變為瘡而致死者不可勝記其~~然~~有五請略陳之一曰骨蒸早起體涼日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃~~急~~煩亂細喘無力或時腰痛兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內乃變成疔食人五藏苦大便逆方

可服芒消一服一抄寸也日再服亦可搗苦參蜜和為丸如梧子大一服七九日再以飲送之無忌以體輕涼

麻為度

二曰~~蒸~~蒸其根在心日增煩悶~~擲~~手出足冷身熱思水口唾白沫卧便浪語或驚恐不安其脉又數此蒸若盛亦變為疔傍疔時悶或痢不止方

苦參

青箱各一艾葉

甘草各一

右四味切以水四升煮取一升半分為三分用羊胞盛之以

葶藶下部中若不痢堅亡消一方寸匕和冷水合和服之
日再服忌海甘澤松芥

三白皮蒸其根在肺必大喘卓乾口中無水舌上白小便赤如
與蒸盛之時骨中滿悶或自稱得產手攪兩脅不得大欬微背
連脾疼眠寐不安此蒸毒傷五藏甘便唾血方

急與其消一兩以水一分半和分爲三服三日服止訖
以冷水浸手以肘臂間及腋下并骨上及痛處亦可舉
臂拍突側腋下第三肋間腋下空中七壯立止

四日肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無
味食訖便嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時或體腫日赤不
得安寐方

大黃二兩半切如小豆大以水一升過一宿明日取
汁服五合許微利即止若熱不定亦可服消一方

十七日三以體涼爲度

五日內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其
根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨肉自消食飲無味
或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起方

右膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以體涼爲
度出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方

甘草二兩 茯苓三兩 人參二兩

葛根 乾地黄各三兩 知母

石膏五兩 碎 粳米一合

右十味切以水九升煮取二升半分爲三服亦可以水三升

煮小麥一升乃煮藥忌海藻松菜蘆蓂大醋范汪同無甘

草伏苓人參
竹葉止大味

竹葉二把

黃芩二兩

又五蒸丸方

鳥梅

雞骨

紫苑

芍藥

大黃

黃芩

細辛各五

知母加

礬石鍊

栝樓各一

桂心各

右十一味末之蜜茄九如梧子飲服十九日二忌生葱生菜
並出第五卷中一方無桂心

骨蒸方一十七首

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱頰色微赤不能下

食日漸羸瘦方

生地黃三兩細切

葱白細切

香豉

甘草二兩

童子小便升二

右五味切以地黃等於小便中浸一宿平晨煎兩沸絞去滓
澄取一升二合分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差

半夏一升湯洗

粳米合

生薑三兩

右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉鰾海藻

菘菜

又方

麥門冬一升去心

小麥升二

枸杞根勿三升

右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方

大烏梅枚

石膏六兩碎

右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方

患痿痺上於切切下等病必瘦脊骨自出以壯丈夫屈
手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下盡骨極指復
向上來去十二三迴然以中指於兩畔處極彈之若是

此病應彈處起作頭多可三十餘頭即以墨點上記
之取二指大青竹筒長寸半一頭留節無節頭削令薄
似劍葉此筒子數沸及熱出筒籠墨點處按之良久
以力彈破所角處之莖筒子重角之當出黃白赤水次
有膿出亦有蟲出者數數如此角之令惡物出盡乃即
除當日明身輕也

又療骨蒸消溫消中熱中渴痢心熱心忪風虛熱傳屍等方

苦菜一斤 黃連去 知母 栝樓

麥門冬心壯癩各五大

右六味搗篩以生牛乳和併手捻爲丸如梧子大暴乾一服

二十九稍稍加至三十九日再服飽食訖以漿水下如食熱

麴酒如至五十九忌猪肉冷水救急同

又療骨蒸蒼梧道士方

止不利忌海藻菘菜蕪羹熟麩猪肉油膩黏食等處第四
卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方

取枯朽骨碎五大升一切骨皆堪用淮洗剝刮不得

柳枝半大 枯棘針斗大 柳枝斗大

右四味以清水五大石者之減半乃接出汁別取清漿兩大
石投釜中和骨重煮三兩沸然後摠瀝出淨拭釜取此前後
湯相和更報煖隨次取用使患者解髮令散以此湯潑頂淋
之其湯令熱但不破肉爲準一舉淋湯遣盡若覺心悶即喫
三两口冷飯如不能坐即卧淋淋湯之時自當大汗汗出少
處仍偏淋之務取汗勻以祛惡氣淋訖可食一大椀熱葱鼓
粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身連手足使用遍患重者不
過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳出第七卷中

文仲療骨蒸方

生地黃二升搗絞取汁三度搗絞然始汁盡分再服若痢耶減之以身輕涼為度已無美

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晚便劇不能飲食若服生地黃汁即更服此方

龍膽

黃連

桔梗

苦參

青箱

芍藥略

梔子人樹

芒消

大黃略

黃芩三

右十味搗節為散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須慎生食若不藥生食不須服之忌猪肉冷水千金經心錄並作九

服之藥味同

又療骨蒸羸瘦乾口燥欲得飲水上渴竹葉飲方

竹葉捲

麥門冬去心

大棗東籍

甘草二兩

紫苑

桔梗

續斷

青竹茹

五味子略

桑根白皮酢甘草

乾地黄五兩

炙者麻

赤小豆升

右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服服五六劑十年者亦差毋隔五日一劑初發即服大驗勿輕之可頻服立

驗蘇遊女感論云主肺氣熱者相當餘同已海藻菘米猪

肉燕美

又療骨蒸效出膿病重者方

皂莢一兩炙去

白錫一

乾棗七枚

生薑二分

右四味以酒一大升煮取半升去滓先食飯然後服二食如

人行三四里不吐更服二合又如人行二三里不吐總服盡方

便令吐即膿出並出第一卷中

救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺癰之後或為瘡瘻更

後有患產後婦人因產後虛勞漏汗寒熱或為月閉不通無問
男女婦人因天行已後餘熱不除或為頻頻勢復小兒悶癆其
病並緣此十候所致因茲漸瘦損初著盜汗盜汗以後即寒
熱往來寒熱往來以後即漸加效效後面色白西風見赤如燕
脂色團團如錢許大左卧即右出唇口非常鮮赤若至鮮赤即
極重十則七死三活若此以後加吐後痢百無一生不過一月
死服此丸仍得不著後人此病急多寔是鬼病治之方

本草相如田賦

知母

黃連

大黃

枳子人

桔樓

常山

紫蘇

苦參皮

甘草

蜀漆

分五

分五

又療骨蒸方

毛桃人一百二十枚去皮及雙入留尖

右一味搗令可丸平旦以井華水頰服使盡服訖量性飲酒
使醉須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方非其人莫服

取乾人黃燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄
晚後服小便一小升以差為限既常服不可朝朝新
作大坩燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便勿
用自身者小兒者佳

又方

用雄黃二大兩和小便一大升研令為粉乃取黃理
石一枝方圓百一尺左側以炭火燒之三食頃極熱
灌雄黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片薄簍置
石上令患人脫衣坐上石冷停以衣被圍遶身勿令

藥氣淺出莫辭衣物臭也凡經三五度如此必差
又療骨蒸傳屍方

皂莢張一尺者無相續取炙令微佳云黑皮碎之綿裹

黑錫大如雞子

羊肉如常法

右三味取一升無灰清酒貯銅鑊內即著綿裹煎三五沸即
澆去綿裹即肉黑錫使融液盡煎取三合令病者先啜肉汁
即服一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病人坐上有
蟲麈麤馬尾赤色頭黑即効如無以服三合盡為度一服相
去如人行十里必是得驗其禁食一如藥法並出第二卷中
必効主骨蒸病小便方

取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和為
兩服中間如人行二十里服此以後每自小便即取
服之仍去前後取中央者病輕者二十日病重者五

十月二十日以後當有蟲蚰蟻兒其蟲在身當處出俱
令去人五步十步聞病人小便臭者無不差台州丹仙
觀張道士自服非常神驗出符第二卷中

灸心胃蒸法圖四首崔氏別錄灸心胃法三首圖并序中書侍御崔和撰

夫會靈受氣稟之於五常攝生乖理降之以六疾至若歧黃廣
記抑有符籙經攻單行字取命術骨蒸病者亦名傳屍亦謂殘
殍亦稱復連亦曰無辜丈夫以瘳氣為根婦人以血氣為本無
問少長多洎沐此疾嬰焉搗之流傳注更苦其為狀也髮乾而鬢或
髮或分或腹中有塊或腦後近下兩邊有小結多者乃至五六
或夜臥盜汗憂與鬼交通雖目視分明而四肢無力或上氣食
少漸就沈羸縱延時日終於虛盡入赤普奈路州同馬當二日
灸活一十三人前後差者數過二百至如裡骨癩肝徒聞囊說
金牙銅臺空見其能未若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又別

瘵氣瘵風或瘵或勞或邪或癖患狀既廣救愈亦多不可具錄
略陳梗槩又恐傳授謬說以誤將來今故具圖形狀庶人覺者
易悉使所在流布頗用家藏未暇外請各醫傍求上藥還魂反
魄何難之有遇斯疾者可不務乎

灸膏蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法

使患者平身正立取一細繩全於脚下緊踏男女左右其繩前頭使
與大姆指端齊後頭令當腳根後即引向上至曲臂中大橫文
便截繩使斷又使患者解髮分兩邊使見分頭路仍平身正坐
乃取向前截繩一頭與脊端齊引向上終頭通過逐脊骨引繩
向下至盡繩頭即點著又別取小繩一頭與脊端齊合口處一頭
向上至會疊底便截斷將此短小繩於前所點處中摺橫分兩邊
兩頭各點記使與中央初點處正橫相告此小繩兩頭是灸處
當脊初點者非灸處口借為度其點拭却

又法

使患者平身正坐稍縮髀取一繩繞其項向前雙垂共鳩尾齊
即截斷鳩尾是心歧骨人有無心歧骨者可從脊前兩歧骨下
量取寸即當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈處檢當喉骨其
繩兩頭還雙垂當脊骨向下盡繩頭點著又別取一小繩令患
人合口橫度兩吻便割斷還於脊上所點處橫分點如前其小
繩兩頭是灸處長繩頭非灸處拭却以前摺通灸四處日別各
灸七壯以上二七以下其四處並須滿二十壯未覺効可至百壯
乃停候瘡欲差又取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處
逐脊骨上下中分點兩頭如橫點法謂之四花此後點兩頭亦
各灸百壯此灸法欲得取當日量度度訖即下火唯須三月三
日艾為佳瘵差百日以來不用雜食灸後一日許日患者若未
好差便須報灸一如前法當即永差出第七卷中

張文仲說荊州人王元禮當家患骨蒸傳尸死盡有一道士忽
敘矣即斷兼更教人無有不差者欲識此病其病兒乍寒乍熱
有時唇赤或頰赤并有時痢血多唾有時欲得食有時不欲食
兩脊疼常急患兒多欬盜汗以指按按脊骨四邊肉有時心胃
氣滿急黃瘦脊中肉盡遂即著床如著床尚前自動脊骨兩
邊肉盡矣療即難如灸候寅前肉動非事灸法如看病兒是病
更不須選膏日即須將艾去即將病兒於王道頭日午時灸矣
七壯若先知其病又緩即取膏日午時大吉欲灸覆病兒面向
下著地取掖助頭以病兒大姆指自捻著展中指直向脊骨指
頭脊脊中肉少筋上點記從點記處向上至耳下尖頭即中央
屈繩從初點處向上當還脊骨點繩所到記之又更再屈繩從
元點記處向上還準前點記又以杖量取患兒中指頭兩節折
斷還從元點記向下當脊骨點記一邊點四處兩邊俱點捻八
處各須去脊骨遠逆一種並須上下相當下從掖助上至耳根
取直其八處一時下大艾炷如棗核大堅實作灸了即以灰三
西蘭坐處便歸家不須迴顧禁肉麪生冷持忌色及雜食平復
後任休常未平復有犯重發即不可復療

神素師灸骨蒸灸法

當頭耳孔橫量相離三寸許相當灸有穴日灸三壯至第八日
灸二了第三推上第二推下男取左手女取右手頭指依兩指
頭東西灸日七壯至第八日各灸五十壯復五日各灸十五
壯脛取繫鞋橫大文量至膝骨如亞下中分當脛骨外日灸一
七壯滿第八日灸滿三十五日了當辭上皆男左女右取頭
指從腕文當指當頭灸日七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月
節不通取右手頭指當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯
滿上午後灸滿下午前灸並出第一卷中

瘰癧骨蒸方三首

廣濟瘰癧氣心忪骨蒸熱閉風乾甲丸方

鼈甲炙 芍藥 瓊蛇脯炙 大黃焙八

人參 訶梨勒皮熱枳實炙 防風各六

右八味搗篩為末蜜和丸如梧子以酒飲下二十九漸漸加至三十九日再服不種忌菟菜生菜熱麪蕎麥蒜粘食出第

三卷中

備急瘰癧瘰癧氣瘰癧骨蒸秘驗方

大黃別清湯欲成 鼈甲炙 另藤

升麻 甘草二兩 丁香欲成下

右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又用牛

黃犀角桂朱砂麝香各一細研分為三分每服以一分內湯

中服經用多效特忌猪肉粘食生冷菟菜海藻松菜蘇遊

同出第三卷中一方有黃

必效瘰癧瘰癧氣壯熱兼效方為骨蒸驗方

柴胡四兩 茯苓 白朮 枳實各

右四味切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇即如芒

消六分取利熱除之後每三日服一劑差後每月一劑肥白

終身永除忌桃李雀肉大醋出第二卷中

虛損慘頽作骨蒸方四首

張文仲瘰癧虛損慘頽不食四體勞強時翕翕熱無氣力作骨

蒸候方

童子小便一大升 葱白一合 杏仁四十枚 去

右四味合煎取三分中分之二服使盡日別一劑服之至十

劑愈若服經三四劑覺四體益熱即服後方

又方

小便一大升淡葱白音去前後葱白碎合 豉抄 生薑一大兩

生地黃碎

右五味全煎六七沸絞取汁半升許分為兩服或三服每服空至腹脹至二七日必差差後停三四日將息更服二七日神驗每服五六劑覺內少冷即服前方以前二方以意斟酌間服常使食漫填父便即煎服至五更半令服了至欲明更服後九服訖至日出時不妨食至晚間未食更服一服忌蕪荑又方

人頭骨三天鹿射香一兩

右二味搗篩和更搗一千杵丸如梧子一服七丸日再服以粥飲送藥若函月之前有青脉出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必差左每日午時能更服後九一服亦好藥既無毒

蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方

蘆根切訖麥門心地骨白皮各十生薑十四兩合皮切

橘皮 茯苓各五兩

右六味切以水二升者大取人升絞去滓分溫五服服別相去九里晝三服夜二服覆取汗忌酢物木好差更作若兼服其人或胸中寒或直惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩

瘦病方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輒琢齒二七過如此若三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人強

壯出第三卷中

廣濟療瘦病每日西即弄色脚手酸疼口乾壯熱瀨肝丸方

瀨肝丸六合 天靈芝血燒四分 生犀角四分 前胡四分 升麻四分 松脂五分 枳實四分 甘草五分

右人味搗篩蜜和凡如梧子空腹以小便浸鼓汁下二十
九日再不利忘海藻松菜生葱熟麩炙肉魚蒜粘食陳
臭等物

又療瘦病方

天靈芝血大一兩 鹿胎香半斤 桃仁一大扣 朱砂一兩半
好豉一大升 乾炙

右五味各別搗篩訖然後摠和令調每晨空腹以小便半
升和散方寸匕服差止不利忌生血物

又療腹脹瘦病不下食方

柴胡 茯苓各十分 枳實炙 白朮
人參 麥門冬心法 生薑各六分

右七味切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服別
相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食桃李醋物
雀肉等

又知母丸主瘦病及冬瘧黃等方

知母 常山略三 甘草炙 大黃
麻黃去節 黃芩 杏仁略三兩 蜀漆洗
牡蠣各一兩 牡蠣兩熬

右九味搗篩蜜和丸如梧子空心服飲下七九忌猪肉及
葱酒麪服後心悶即吐是此病出候不唾更漸加兩丸此方
言是張文仲去古與公處傳日與諸人服神驗非一忌海藻松
菜生葱心生菜無黃

救急療瘦疾方

甘草短高

右每旦以小便煮甘草三數佛頻服甚良忌海藻紫菜並
出第二卷中

傳屍方四首

蘇滄論曰大都男女傳屍之候心首滿悶背膈煩疼兩目精
明四肢無力雖知欲卧睡常不著者脊脊痛腰膝酸疼多因少
起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日午以後
即四體微熱面好顏色喜見人過常懷忿怒總不排意即欲
嗔志行立脚弱及卧盜汗夢與鬼交通或見先武多驚悸
有時氣急有時欬嗽雖思想飲食而不能食食死在須臾之
精神尚好或兩肋虛脹或時微瀉自單乾口燥常多粘唾有時
唇亦有時欲腫動訖沈音喉猶知水潤不覺其死矣

又論曰傳屍之疾本起於無端莫問老少男步比皆有斯疾大都
此病相剋而生先內傳毒氣周遍五藏漸就羸瘦以至於死死
訖復易家親人故曰傳屍亦名轉注以其初得半卧半起號
為殭珠氣急欬者名曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸兩傳五藏各
之伏連不解療者乃至滅門假如男子因虛損得之各為勞極
吳楚云淋瀝巴蜀云極勞其源先從腎起初受之氣兩脛酸疼
要脊掬急行立脚弱食飲減少兩豆臄臄欲似風聲夜卧夢洩
陰汗痿弱腎既受已次傳於心心初受氣夜卧心驚或多忪悸
心懸之氣咬咬欲盡夢見先亡有時盜汗食無滋味口内生瘡
心常煩熱難欲眠卧朝輕夕重兩頰口唇悉紅赤如傳相脂又
時手足五心皆熱心既受已次傳於肺肺初受氣時時欬嗽氣
力欲弱有時喘氣卧即更甚鼻口乾燥不聞香臭假令得聞唯
覺朽腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌膚枯燥或時刺痛或以蠱

行乾皮細起狀若麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目膜膜面無血色常欲舉眉視不及遠目常乾澀之時赤痛或復睛黃朝暮憂憂常欲合眼及至於臥睡還下著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩肘虛脹食不消化又時渴痢熱食生出有時肚痛腹脹雷鳴唇日焦乾或生癰腫毛髮乾聾無有光潤或復土氣擗肩喘息痢赤黑汗至此候者將死之證也

又論曰毒氣傳五藏候終不越此例但好候之百下失一

又論曰凡患癰瘰之人多成骨蒸者即作水病仍須依癰瘰法灸

之兼服下水藥差

又論曰此病若春豬肉消及兩臂鮑肉消盡骨前骨出八即難

瘵也苦痢赤黑汁煎上氣槿有喘息是為欲死之證也此是藏

壞故爾

又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女日就

消瘦面色痿黃不悟之者將為骨蒸因錯療之屢有死者有此輩者慎勿瘵之待月事通自當差矣

又論曰或有人偶得方云療骨蒸不解尋究根本遂即輕用

文主療既不相當病愈未知何了不求諸鑿者唯知獨桂已功

若此之人寓目皆是至如以主肺痿骨蒸方將療瘵瘰傳屍者斯

乃更增其病豈有得瘵之理向者主肺痿方中多是冷藥冷藥

非瘵瘰之所宜若用以瘵瘵瘰此乃欲益反損非直病仍未差

兼復更損其脾脾唯且溫不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰

之證兩肘虛滿食既不消兼之下痢如斯穿鑿故益反損終莫

能極良可悲哉夫略舉一隅他皆倣此

又論曰凡患骨蒸之人坐臥居處不宜傷冷亦不得過熱冷甚

則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則血脉擁

塞頭眩目痰瘡乾口燥心骨煩悶渴欲飲水此等並是將息過

度之快深可識也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若背傷冷即令效嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節寧可少食保無宿疾數進之勢也必須傷軟教也不宜傷更恐指胃氣此皆以意消息之為佳

又論曰主療之法先須究其根本考其志狀診其三部決其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服即望痊除未及得瘳便復罷藥不言藥病乘越似不相當如此懷疑余所不取亦有因癰後作亦有因病後為此病根其源非一略舉綱紀此類而取療之方法如後所言

又論曰骨蒸之病無問男女持志房室辛勤勞作尤所不宜陳真酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆猪魚油膩酒麪瓜果野

為之屬葵苣蓀葷及生冷等字並不得食自非平復一月以後乃漸開也大略如此觸類而長之此病宜食炙飯鹽豉豆醬薑燒薑葱韭枸杞首蒼若菜地黃牛膝葉並須煮爛食之候病稍退恐肌膚虛弱者可時食乾鹿脯為味中間所有得食之者按其條下具言之

廣濟療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方張文仲方

麴末升

大麥擘末升

生地黃塊大者

白木八兩

牛膝升

桑耳切三升

薑三升

當歸分

生薑治散切

桃人

杏仁各升去尖

近用加橘皮兩

右十二味並細切於日中以水杵搗之如泥內瓶中以物蓋

口封之令洩氣蒸於一大石米中飯熟出之停屋下三日開出暴乾搗為散酒飲服方寸匕日二服漸加至一七半不

利初服十日內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌任意恣口食之唯忌桃李苦須桃李宜去木若不能散蜜丸服之亦得服三十九日二服去病令人能食肥健好顏色忌桃李雀肉蕪蕪出第四卷中

文仲論傳屍病亦名瘵瘡適症骨蒸伏連殭殍此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食不作肌膚或三日五日若微勞即發大都頭顱頸骨間尋常微熱翕翕然死復家中更染一人如此乃至滅門療之方

獺肝一枚 鼈甲一枚 野狸頭一枚 此茶菟分四

漢防已半兩 蜀漆洗 來麴冬法 甘草一條

右八味搗篩以成鍊殺羊腎脂二分合蜜一分烱冷和丸藥如梧子大服十九丸加至十五九日再以飲下之其藥合和訖分一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次服臂

又灸法
上次服門上者大驗忌海藻松朮菟菜

立脚於繫帶處橫文以手四指於文上量脛骨外逼脛骨四指中節按之有小穴取一縷麻刮令薄以此麻縷繫上灸冷麻縷斷男左女右患多損

又方

青鈴羊肺一具破於布上乾之 良薑子一升補 醋升 同漬經三日出各於布上暴之合至乾微火熬薑子各搗篩和以蜜丸如梧子服三九加至四九

地骨皮 白薇 芍藥 甘草

犀角 升麻 茯苓 麥門冬

黃芩 桔梗 枳實 大黃

前胡 茯苓 天門冬 生薑

桑根白皮 羚羊角 當歸

柴胡

朱砂

芫花

鼈甲

蜀漆

知母

石膏

常山

烏梅

香豉

黃耆

地黃

橘皮

以上並可詳度病狀用之並出第二卷中

伏連方五首

廣濟療瘦病伏連傳屍鬼氣疰悞惡氣方

班猫

赤頭

射干根

石膽

桂心

牛黃

別研

犀角

人參

石蜥蜴

一枚

紫石

別研

蜈蚣

麝香

別研

右十一味搗篩為散研相和每日空腹服一寸匕日三服用井

華水二合温即頓服勿臨頃與白米粥喫好覺小便澁好如

合藥勿使婦人小兒雞狗見忌執麩果子五辛酒肉生血生癆

又療瘦病伏連辟諸鬼氣惡疰朱砂丸方

光明珠

砂

桃人

別研

麝香

別研

右三味研朱砂麝香令細末別搗桃人如脂合和為丸如梧

子其和不飲以蜜少許令成說注者飲飯一七九日二服不利忌

生血物並出第十四卷中

崔氏斷伏連解法

先不見一不開曰胡盧埋入地取上齒日開之煮取三匙脂粥

內其中又剪紙錢財將回新塚上使痴兒面背還道皆塚坐

以紙錢及新綠圍塚全病人使匣別將少許紙錢圍外與五

道將軍使人一手捉胡盧一手於坐傍以一刀穿地即以胡

盧坐胡盧地及坐胡盧了使一不病人捉兩箇錄拍病人背

呪曰伏連伏連解伏連伏連不解刀錄發解呪曰生人持地

上死鬼持地下生人死鬼即各異路呪訖全不病人即擲兩

鑠於病人後必取二鏢相背不肯更取擲取相背止乃並還
勿反顧又取高日令病人騎城外車轍面向城門以水三升夾
三重圍病人又作七箇餅與五道將軍呪曰天門開地
戶閉生人死心各異路令五箇之日放捨即歸呪訖乃還莫
迴頭此法大良出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名冒
蒸傳屍其用此方甚驗

人屎撮者五升人小便升新炊粟飯每六月六日麵半餅
右四味取一瓷瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡氣每
且服一大合晝三服無不差若有各藥時勿淨燒香勿令婦人
小兒女子雜入孝子見之出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣殺即四肢無力日漸黃瘦乍好乍惡
不能食方

桃奴各三 茯苓各三 鬼箭羽
人參各三 橘皮各三 生薑兩 檳榔枚

麝香二分 別研

右丸味切以水九升煮取二升七合去滓內麝香温分為三服
如行八九里久忌大醋生冷五年出第十七卷中

飛尸方三首

病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸
其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心曾出第二十三卷中
集驗療飛尸瓜蒂散方

瓜蒂一分 赤小豆各一分 雄黃二分

右三味擣下細篩一服五分已稍增至半錢匕以酪服藥廣
濟同出第七卷中廣濟療卒中惡心腹絞
備急張仲景療飛尸走馬傷方刺氣急服愈

巴豆二枚去心 杏仁二枚去皮尖

右二物綿纏今極碎投熱湯二合 搗取白汁便飲之食頃

當下老小量服之通療鬼擊病忌野猪肉蘆葯文仲同出

第一卷中此方已見卒中 飛尸故不刑也

古今銀驗附著散療飛尸在令皮中又名惡脈又名賊風發時

急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半日乃微差須更復發

皆療之方

細辛

天雄炮

莽草各一分

桂心三分

附子炮

雄黃三分

烏頭炮

乾薑四分

買珠研分

在九味擣下篩服五分匕不知稍增當以好酒服之忌猪肉

冷水生葱生菜出第大卷中

道尺方三首

病源道尺者言其停道在人肌肉血脉之間若卒有犯觸則發
動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻兩脅上衝心胃差後
復發停道不消故謂之道尺也出第二十三卷中

鷄骨手

羚羊半斤

乾薑兩

麝香研

蜥蜴一枚

斑蝥十枚去足

雞屎白三兩

巴豆五枚去心

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

羌青兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

蘇蘆兩

右十味擣篩蜜和丸空腹以飲服如小豆三九日二服稍加
至六七丸以知為度至吐利息生冷油膩猪肉蒜粒食陳臭
蘆葯第一方無斑蝥雜藥
又初得道尺鬼疰心腹中刺痛不可忍方

三月木香法丁香

鬼箭羽

結梗

紫蘇

橘皮

當歸焙人

生薑法

檳榔古分桃木古

右十味切以水九升者大取三升絞去滓分為三服日晚再以

快利為度忌如藥法並出第四卷中一方無橘皮桃葉

集驗療道尸心腹刺痛不可忍方

桂心二畝乾薑二畝巴豆二畝

右三味合搗下篩以好苦酒和之如泥以塗痛處燥即易之

忌野猪心蘆葦子金同用乾薑二兩出第一卷中

五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疰世其狀皆
腹痛脹急不得氣息上衝心胃傍攻兩脅或礪塊踊起或藥引
腰脊令取一方而兼療之

方 搗菝葜子蜜丸如胡豆服二九日三
搗薑陸根熬以薑裹盛之更番熨之冷復易

又方 粳米二升水六升煎二沸服之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之並出第一卷中

荆繁療五尸虫鹽疰中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方

丹砂研 乾薑

芎藭 芫花熬

烏頭炮各四分芍藥 桂心各八分 野葛皮三分

吳茱萸各

右丸味搗篩蜜和為丸如大豆服三九日三清飲進之忌生

血物猪肉生葱出第十卷中一方無巴豆

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸疰沈尸其狀脊腹脹急

衝心攻脅或礪塊踊起或牽腰昏方

破雞子一枚取白生吞之困者搗頭令下文伸肘後同

又方搗氏

雄黃 大蒜各二

右二味搗和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服
有尸疹者當畜此藥用之驗文仲肘後同
又方

乾薑 附子各 桂心二 巴豆三十枚去

右四味搗篩蜜和又內臼中搗萬杵服如小豆二丸此藥無
所不療忌野猪肉蘆筍生葱肘後同並出第一卷中

文仲療卒中五尸方

取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒
茅令熱隨痛追逐逐蹶下痒便差若屋削四角桂燒
用之神驗時後同出第一卷中

古今錄驗八毒赤丸療五尸潰積及惡心痛蠱淫鬼氣無所不
療即是李子豫赤丸方出明

雄黃碎 真珠研 礬石泥裹燒 牡丹皮

右八味搗篩蜜和丸服如小豆二九日一極得吐下欲長將服
者可減一丸已猪肉狸肉蘆筍生血物等
又五尸丸療諸尸症方

芍藥 桂心各 吳茱萸各 丹砂研

芎藭 烏頭炮 乾薑各 蜀椒目去

右十味搗下篩蜜和丸如大豆一服三九日三忌猪肉生葱
蘆筍生血物等並出第七卷中胡洽有羌活四分野
薯皮二分為十二味

尸症方四首

病源尸症者即是五尸內之尸症而挾外鬼邪之氣流注身體
令令寒熱淋瀝沈沈默默不的知所著而無處不惡或腹痛脹
滿喘息急不得氣息上衝心背傍坡兩脅或螺塊踊起或孿引腰

脊或舉身沉重精神雜錯皆由覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就顛滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸病在易易傍人故尸注出第二十二卷中

剛繁療尸在棺自卑或聞哭聲或見尸常發死人席湯方

取死人眠席乾棺內餘棄路者虎口長三寸止一物以水三升煮取一升為一服立効出第十卷中

文仲療尸症方

取新布裏椒薄症上以熨斗火熨焦令汗出立驗

又姚氏方

燒髮灰 杏人熬金紫色分等

右二味搗如脂以猪膏和酒服如梧子三九日三神良千金同

又鶴骨丸療尸症惡氣兼療百病方

鶴骨三寸 挂心三 黃蠟十四枚去 巴豆三枚去

斑猫十四枚去

右五味搗篩蜜和為丸如小豆一服二九日三服清飲進之忌野猪肉蘆笋生葱並出第一卷中

五注方四首

病源注者性也言其連滯停性死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或心腹脹刺痛或支節沈重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五注病皆不顯出其名大體與諸注皆同出第二十四卷中

剛繁華他錄袂五注丸療中惡五注五尸人腹背脅急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已噤將物強發開若不可發扣齒折以灌下藥湯酒隨進之即効方

丹砂研 雄黃研 附子炮各 甘遂半兩
豉六升 巴豆六枚去心

右六味擣下篩巴豆別研令如脂乃更合擣取調自蜜和之
藏以蜜器若有急疾服胡豆三丸不覺更益以飲投之此藥
多有所療殺鬼解毒破積去水良驗忌生血物猪肉蘆笋右
今錄驗同串第九卷中

小品五疰湯主卒中賊風道尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃^{三兩} 桂心^兩 芍藥^兩 當歸^兩 蜜^斤 生薑^斤

烏頭^{十枚炮} 消石^兩 甘草^{三兩} 蜀椒^兩 雄黃^兩

右八味切以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升
投著湯中去滓分服三合如人行三十里又一眼日三不知可
至四合^土 尹威數用之忌海藻菘菜猪肉生葱干金同出

第四卷中

古今錄驗五疰丸一名神仙丸一名千金丸一名轉疰丸一名司
命丸一名殺鬼丸瘡毒病邪鬼疰忤心痛上氣厥夢蠱毒傷

寒時疾疫癘方

丹砂^研 礬石^{泥裹燒} 雄黃^研 巴豆^{云心}

味藜蘆^煮 附子^炮 蜈蚣^{一枚炙}

右七味擣篩蜜和丸如小豆服一九日一即差不解夜半更
服一九定止帶一九辟惡忌猪肉冷水生血物狸肉出第第七

卷中

又五野丸療五疰尸疰哭疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短
氣兩脅月心痛引背腰脊吸吸少氣不能行飲食少面目痿黃
小便難項強不得俯仰腹堅癰臍左右下雷鳴脹手足煩瘡月
不明喜忘又風濕痺腰脊不隨喜夢癰百病皆療之方

牛黃^研 鹿射香^研 蜀椒^兩 雄黃^兩

大黃^研 當歸^兩 蜀烏頭^炮 蜀天雄^炮

消石^兩 桂心^兩 朱砂^研

細辛 乾薑錄三 石蜥蜴一枚 巴豆淨十枚去皮熬

鬼臼分

右十七味搗篩蜜和丸如梧子服三九日再不知稍增以知為度忌猪肉蘆薈生葱生菜生血物出第六卷中

江南九十九症方二首

集驗療江南症病凡有九十九種寒熱石症此病隨月盛衰人有三百六十脉走入皮中或左或右或重或表如刀錐所刺乍寒乍熱喉咽如饅食如噎骨中痛纏臍若痛食不知味腰中難以俯仰兩膝屈伸面或黃或青或白或黑至死更相注易方

取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升如此取汁盡熟豆熟作羊鹿肉羹啜此豆出第一

卷中

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同

金牙研 雄黃研 丹砂研 礬石泥裹燒

寒水石 芫青煎 巴豆去皮熬 朴消

桔梗 茯苓 人參 貫衆

附子炮 蜀椒去汗 露蜂房炙 龍骨

乾薑 牡桂 烏頭炮 石膏研

莽草炙 從蓉 大戟 芫花熬

防風 狸骨炙 商陸根 大黃

細辛 蛇蛻炙 玉支 貝母并子

右三十二味分等下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水生菜生血肉大醋蘆薈集驗同出第七卷中

江南三十六症方三首

崔氏金牙散療江南三十六症人病經年羸瘦垂死服之皆差

并帶之能殺惡氣逐及疰諸惡癘不祥悉去之方出胡洽

金牙研 曾青研 消石研 礬石深暴燒

石膏研 莽草 玉支 雄黃研

朱砂研 寒水石 龍骨 蛇蜕皮炙

芫青熬 當歸 龍膽 大黃

細辛 防風 大戟 芫花熬

治首炙 菴蓉 天雄炮 茯苓

附子炮 烏啄炮 乾薑 人參

桔梗 桂心 椒法目 貫衆

巴豆酥熬 狸骨炙 蜂房炙 鶴骨炙各

右三十六味博篩為散以酒服一錢上漸增五分匕日三并

以三角絳囊貯散方寸匕以穀系頭及心上大良方加蜈蚣蚘

蟻雖苦鑿曾射香毒公合四十二味忌猪肉生血物生菜冷

水大醋蘆葦出第七卷中

水大醋蘆葦出第七卷中

備急瘵乃疰鬼疰者葛氏云即是五尸之中尸疰又挾諸鬼邪為善也其病變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱沉沈嘿嘿不的知其所若而無處不思累年積日漸沈頓滯以至於死後復注易傍人乃至城門覺如此候者宜急療之方

癩肝

右一味陰乾擗末水服一方寸匕日三如一具不差更作姚氏云神良肘後崔氏千金同

又方

桑根白皮灰二升熬令氣出下以釜湯三四升三適重淋取二升清亦小豆二升一宿出風乾復漬汁盡

止乃濕蒸令熟以生肉若鹿肉作羹進此豆飯食一

升漸至二三升重者七八升乃愈病去時體中與見疹

瘡淫淫或若根本不除重為之肘後同並出第一卷中

疰病相染易方三首

深節瘵鬼物前亡轉相染染^染紛^紛紜^紜言^言肌^肌瘦^瘦往來寒熱^{寒熱}嘿^嘿嘿^嘿煩^煩
悶欲^{悶欲}復^復不能^{不能}手足^{手足}熱^熱不能^{不能}食^食或^或欲^欲向^向壁^壁悲^悲涕^涕或^或喜^喜笑^笑無^無常^常牛^牛
黃散方

牛黃研 鬼箭叶 王不留行 徐長卿^{一名鬼箭}

遠志^{去心} 乾薑 附子炮 五味子

石華^{并到去} 黃芩 茯苓^{各二} 桂心^{一分}

代赭^{三分} 白朮^{四分} 交阿冬^{去心}

右十五味搗下篩以蜜生地黃汁相拌合復令相得以酒服
方寸七日三忌猪肉冷水生葱羊肉餽酢物出第九卷中

崔氏療江南三十六疰丸療轉疰滅門絕族旋盡轉逐中外滅
盡復易親友方

堆黃^{研三分} 交阿冬^{去心三分} 皂莢^{去皮} 葶苈^半 冬冬^各

鬼燈^野 烏頭炮 狼毒^母 石膏^{研分}

藺茹^分 無羨 鬼竺^削 菴盧^炙

鸛骨^炙 雷丸 乾漆熬 龜甲^炙 各

狼牙^分 亭長^{七枚} 貝母^{二枚} 凝水石^分

牛黃^分 胡鷲屎^分 桔梗^分 鐵精^分

消石^{研分}

右四十五味搗篩為散先食酒服一匕至日再不知稍增之
有鹽隨大小便出也忌猪肉冷水生葱海藻松菜生血物腥
肉深師子金同出第七卷中

鬼瘵心腹痛方一首

右今錄驗還命千金丸療萬病心腹積聚堅結背脊逆滿效
疰宿食不消中風鬼瘵入腹面目青黑不知人方

雄黃^研 鬼臼 徐長卿 礬石^煑 裏燒

瓜丁

雌黃研

乾薑豆豉

野薑七分

班貓手攷去

班貓是避熬蜀椒四分地膽去鹽射由二分

丹參分

右干三味搗篩蜜和搗三千杵九如小豆先食服一九日三不知漸增以知為度若百毒所螫生觸踐馬所踏啣癰腫瘰癧以一丸於掌中啣和塗痛上立愈正月日以椒酒率家中大小各服一九終歲無病神良有驗祕不傳出第卷中

鬼疰疔腫瘦方二首

古今錄驗黃帝護命千金丸瘰癧瘦歷年為月漸結疥飲食變吐宿食不下中風鬼疰疾瘦方

野薑四分

斑貓手攷去雄黃研

雌黃

鬼日

瓜丁

丹砂研

與石半日燒

沙參

莽草炙

椒去白汗

地膽足射去

鬼日三分

巴豆熱心

右六味搗篩蜜和為丸如小豆服二九日一服忌鯉魚野猪肉

葦蘆笋

雄黃研

馬目毒公丹砂研

莽草炙

葦蘆熟

巴豆熱心

皂莢二兩真珠研

左八味搗篩蜜和丸如小豆一服二九吐下惡蟲數十枚忌野猪肉葦蘆笋生血物並出第卷中

鬼疰方二首

病源注之言住也言其連滯停住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯停住至於死死後注屬傍人故謂之鬼疰也出第二十四卷中

古今錄驗神祕丸療鬼疰邪忤飛尸疰擊犬馬螫蜂蛇毒螫盡皆消除方

大黃^{四兩} 消石^{三兩} 巴豆^{去心} 雄黃^{研各}
右四味搗篩蜜和丸如小豆先食服二九日一服忌野猪肉
蘆筍出^{第七卷中}

崔氏蜀金牙散療鬼疰風邪鬼語尸疰或在脊脅流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張唇焦瓜甲黃方

金牙^{一分} 蜈蚣^炙 蜥蜴^{石上} 附子^{炮各}
人參^{四分} 蜈蚣^{七枚} 徐長卿^{者炙} 芫青^炙
斑^{猶去} 雄黃^研 桂心^{四分} 鬼目^分
野苜^{各十四分} 毒公^分 芎藭^分 石長生
椒^{目汗} 大黃^分 甘草^炙 蛇蛻^炙
露路蜂房^{去青} 真珠^研 砂丹^{各二分}

右十二味搗下篩蜜和搗三千杵丸如梧子服五九日二平
中惡氣絕不知人服如小豆二九老小半之牛馬所齧踐癱
腫若毒毒所齧取一丸著掌中唾和塗瘡中毒上立愈五月
旦以酒率家中大小各一丸一歲不病若傷寒身熱服一丸若
欲親病服一丸病者共卧不恐忘生血物

又犀角丸療百病鬼疰惡風入人皮膚淫淫液夜流無常處四
肢不仁去引腰背腹脹滿心痛逆氣填胸不得飲食論喻短
氣寒熱羸瘦喜惡夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆療之方

犀角^屑 桂心^{三分} 羚羊角^屑 牛黃

鬼臼 附子^炮 獺肝^炙 巴豆^{去心}

蜈蚣^{四枚} 麝香^研 真珠 雄黃^研

丹砂^略 射^略 具齒^略

右十五味搗篩蜜和搗五千杵平旦服如胡豆二九日三慎

生葱猪肉冷水蘆葦生血物等並出第六卷中

鬼氣方三首

崔氏療鬼氣辟邪惡阿魏藥安息香方

阿魏藥即涅盤經云央匱是也服法旦取棗許大研之為末又取牛乳一大升煎之五六沸停令熱定取鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盞飲之取盡至暮又取安息香亦如棗許大分如梧子還以熱牛乳服之令盡每日日暮常然若無乳者即以棗切汁服之患火者不過十日近者不過五日如過三十日不愈便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口特忌特忌禮部孫侍郎家中有此病所在訪問有人從梁漢來云官人百姓服此得効者十餘家孫侍郎即令依方進服七八日即効便以此法傳授親知得

延年療鬼氣骨蒸氣日漸去方
七卷中
驗者非一余時任度支郎中欲廣其効故錄之出第

獺肝分 人參 沙參

丹參分

鬼白

苦參分

右六味搗篩蜜和丸如梧子大一服十九丸飲汁下日三服加

至十九禁生冷猪魚肉生血物等

又至香丸主天行溫疫惡氣熱毒心助氣滿服急及疰鬼氣等方

青木香 犀角屑 升麻 羚羊角屑

黃芩 梔子入 沉香 丁香

薰陸香 麝香 鬼白分 大黃

右十三味搗篩蜜和丸如梧子一服三九飲下日三服加至

七丸以差止禁蒜麪猪魚並出第十一卷中

鬼魅精魅方八首

病源凡人為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜魔或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也出第二卷中

廣濟療傳屍骨蒸痰痺肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血目閉瘡癩丁腫驚癩鬼忤中人吐乳狐狸吃力迦丸方

吃力迦即白木是也光明砂研麝香當門訶黎勒皮

香附子中沉香種青木香丁子香

安息香白檀香草撥上犀角各一兩

薰陸香蘇合香龍腦香各半兩

右十五味搗篩極細白蜜前去味和為丸每朝取井華水

服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裏緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近十全不傳冷水煖水臨時斟量忌生血肉臘月合之有神藏於蜜器中勿令洩氣出秘之忌生血物桃李雀向青魚酢等又療精魅病方

水銀兩

右取水銀內漿水一升炭火上煎三分減二即去火取水銀如熟豆大取當日神符裏水銀突腹吞之晚又吞一服三日止無所忌並出第四卷中

肘後療卒中邪鬼恍惚振慄之方

灸臍下人中及兩手足大指甲甲本合廿九半在水

上半在向上各七壯不止至十四壯便愈集驗同出

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼瘡當得殺鬼丸方

丹砂研 雄黃研 龍骨 馬目毒公

鬼箭各五 鬼臼兩 赤小豆兩 荒青枚

桃人百枚去破

右凡味搗下篩別研雄黃丹砂細絹篩合諸藥拌令和調後內攪和之大如彈丸絳囊裹盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之所服蜜和丸梧子一服三九日三忌五辛生血物出第九卷中

小品療鬼魅四物為頭散方

東海為頭跌黃牙口名良莖 防葵各二

右藥搗下篩以酒服方寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼主者復會一分立有驗防葵良莖並令人迷惑恍惚

如狂不可多服備急千金同出第五卷中

集驗療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所為不能自絕九物牛黃丸方

荆實人精也 白石英也 蒼龍精 玉屑白虎精也 牛黃上精也

雄黃地精也 空青天精也 赤名脂精也 玄參精也

龍骨水精也

凡九物名曰九精上通九天下通九地

右搗下篩蜜和丸如小豆吮食吞一九日三稍加以知為度文仲千金并翼同忌筆血出第三卷中

必効辟鬼魅方

虎爪 赤朱 雄黃 蟹爪

右四味搗令碎以松脂融及煖和為丸不然硬正朝旦及有狐鬼處焚之甚効以重巫人即神去王三師云奇効忌生血

物出第四卷中

近効大麝香丸療積年心痛尺疰蠱毒癰瘰氣承心兩肋下有塊溫瘴精魅邪氣或非或哭蛇蠍蜂等所螫並療之方

麝香 牛黃 菝蘆矣 朱砂

蜀當歸 茯苓 桔梗 兎箭羽

金牙 烏頭 桂心 吳茱萸

貫衆 丹麥 蜈蚣去皮 乾薑

人參 虎骨 鬼臼 芍藥

雄黃 各一分半 巴豆三枚 蛇蝎半枚

右二十三味搗篩蜜和丸如梧子以飲下三丸至辰時下利若不利熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即定然後煮葱食之勿食冷水明日休前服之永差忌熱麪生菜柿子梨等蛇蠍蜂螫取一丸研破和醋塗之便差精鬼狐狸之屬拋

埽瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晚每日服前藥兩丸只三兩日服即差仍每日燒一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸緋綃袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌裡向生血物猪肉生葱芦笋

鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方

野狐鼻矣 豹鼻矣 狐頭骨矣 椎黃

臚臑脂 兎箭羽 露蜂房矣 白朮

虎頭骨矣 阿魏藥矣 馱馬狗馳牛等毛 各四分燒作死入腦骨

右十五味並大秤兩搗篩為散撓使調勻又先以水煮松脂候焯接取以和散和散之時勿以手撓將虎爪撓和為丸

如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥烟洩外別撓

雄黃為味以精藥燒葉節度一如熏香法其藥欲分於牀下
燒熏彌善忌桃李雀肉等出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通語言笑或悲思恍惚方

松脂洋向 內雄黃末

右二味用虎爪撓令調丸如彈丸夜內籠中燒之令女裸坐
籠上被多盲蒙唯出頭耳過三熏即斷深師同

又方

雄黃 人參 防風 五味子并

右四味為散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女喜夢鬼通致恍惚者方

鹿角屑酒服三撮日三並出第二卷中

白虎方五首

近効論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝失理

受此風邪經脈結滯血氣不行蓄於骨節之間或在四肢肉色
不變其疾晝靜而夜發發即徹髓酸疼乍歇其痛如虎之嚙故
名曰白虎之痛也唐濟療白虎方

犀角屑 當歸 芍藥 牛膝

沈香 青木香 虎頭骨 槲葉 脈

麝香一分 研

右九味切以水六升煮取二升六合去滓分温三服如人行
四五里進一服別如麝香末服之不利忌生菜熱麪蕎麥絲
出第四卷中

蘇孝澄療白虎病云婦人夫皆有此病婦人因產犯之丈夫
眠卧犯之為犯白虎爾其病口噤手拳氣不出方

灸臍中七壯

近効療白虎方

炭友五升無灰灰秦灰亦紅藍花七錢蒜七錢

右三味一處攪和熬令熟取好醋燻之梓全浥浥以故布

三內重裹分作四分更玄當外痛處尉之敷數轉勿住手

援之冷熱得所寧令小熱不得作冷冷即報熱令熱又熨之

並用後呪法曰青儂皮青毛出黃儂皮青毛出赤儂皮赤毛

出白儂皮白毛出黑儂皮黑毛出急出吾口神吾口聖唾山

出明唾石石裂得汝字汝不去斫頭斫頭急急如律令其呪

法先令人唾痛處以手接之不佳于便即誦此呪不限遍數

以差即停當誦呪不得令病人及傍人聞呪須先淨漱口潔

淨食効無比千金勿傳

又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方

又療白虎方

猪肉半斤 大麻子一合 酒半

右三味和麻子口含喫上將猪肉三串手擘向痛處來云

呪曰相州張如意張得與足汝白虎本師急急出呪訖將肉

安牀下差送路頭神驗

无牽方二首

崔氏无牽閉癰或頭乾癩癧頭髮黃聳分去或卡痢卡差諸

狀既多不可備說大黃煎丸方

大黃九兩錦文蘇實者是微粉即不堪用削去蒼皮乃和

右一味搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鍋

中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木篦攪攪藥使堪九乃

傳於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常

以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若

多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒不等
以意量之此藥唯下膿及宿結不令覩痢禁牛馬驢雞魚
兔肉生冷粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同此忌
又療无辜腦後兩畔有小結者方

无辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後
取細竹斟酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形
仍將此竹籠結自然未得轉動以大針針結子中央
作兩下去針訖乃塗少許膏藥無者雜油亦得須
待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若
不出復如前針候膿清盡結便自散俗法多用刀
子頭割者謂之割无辜比來參詳殊不如針之以絕
根本此患者不忌故復重說文並出第七卷中
除骨熱方四首

范汪療骨熱理骨丸方

理骨 連翹 陸五 土瓜根 山茱萸

女參 胡鷓鴣屎 並苗 丹砂

馬目主冊公為尾 黃連 芍藥

雄黃 青柏子 龍膽 枳椇 陸五

右十六味搗篩蜜和丸如梧子先食服三九日三不知稍
稍增之以知為度禁食生魚生菜猪肉黃菜米生血物古今

錄驗同

古今錄驗除熱三黃丸療骨熱身多瘡瘡癩疔疔癰腫者方

大黃 黃芩 黃連 當歸

茯苓 桂心 乾薑 芍藥 陸五

枳實 柴胡 分

右十味搗篩蜜和丸先食服知小豆三九不知增至十九欲

取微利以意增之。又方
服益良。忌生蔥醋物猪肉冷水。

大黃

黃連

黃芩各二兩

芒消二兩

右四味搗篩蜜和為丸。一服五九。漸加以知。為度。忌猪肉冷水。並出第四卷中。

盜汗方七首

病源盜汗者。因眠睡而身體流汗也。此由陽虛所致。久不已。令金軀瘠枯。瘦。心氣不足。土津液故也。診其脈。男子平人。脈虛弱。細微。皆為盜汗。脈也。出第三卷中。
崔氏療盜汗。夜睡中即汗。汗不休。必得風方。

麻黃根細

小麥各二升

右二味。以水一斗。二升煮。小麥得九升。內麻黃根。煮之。得三分。去滓。分為三服。常夜服之。不過兩劑。即止。

又方

甘皮

薑各一兩

杏仁三兩去尖皮熬

當歸四兩

右四味。搗合。蜜和。丸服。如梧子五九。漸增之。
又方。取死人席。綠燒。作灰。淋汁。熱洗。從頭至足。愈。
又止汗粉方珠規

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰

枳椇各三兩

白木二兩

米粉三升

右四味。搗諸藥。下篩。為散。和粉。攪令調。以生絹袋盛。用粉身體。日三兩度。忌桃李雀肉。仍灸大椎五六百炷。日灸二七。五七。任意。不能日別灸。亦得汗。即漸止。並出第三卷中。
延年正盜汗。夜卧床。席衣被。並濕方。

麻黃根

牡蠣各三兩

黃耆各三兩

人參各三兩

枸杞根

白皮

龍骨打碎各四兩

大棗七枚

右七味切以水六升煮取二升五合去滓分温六服如人行八九里久中間在食一日令盡禁蒜熱麪等物

又療夜卧盜汗方

左顧牡蠣黃耆各三兩麻黃根五兩杜仲二兩

右四味搗篩為散一服方寸匕日三夜一服用敗蒲扇者火取

汁下桑葉禁蒜麪並出第卷中

古今錄驗療盜汗麻黃散方

麻黃根三分故扇三分燒屑即敗蒲扇

右二味搗下篩以乳服三分仍日三大方寸匕日三不知益

之又以乾薑三分粉三分搗合以粉粉之大善出第十卷中

外臺祕要方卷第十三

右通功即充西浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張

定校斯