



0092052

本草類方丁

齒衄

血汗

欬嗽血

諸汗

怔忡

健忘

驚悸

狂惑

煩躁

不眠

多眠

消渴

遺精夢洩

赤白

癰淋

洩數精尿

小便血

陰痿

強中

囊癢

大便

脫肛

痔瘻

下血

本草類方卷之四

齒衄第三十九

齒縫出血

人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再蘇東坡得此自謂神奇後生小字多患此病子累試之

傷寒齒衄

傷寒嘔血繼而齒縫出血不止用開口川椒四十九粒入醋一盞同煎熟入白礬少許服之。

齒血不止

生竹皮醋浸令人含之噴其背上三週以茗汁漱之。千金方

齒縫出血

香少許研勻擦之。聖惠方

齒縫衄血

童便溫熱含之立止。聖惠方

本草類方

齒衄

齒縫出血

紫礦乳香麝香白礬等分爲末擦之水漱。衛生易簡方

牙縫出血

末傅之即止。衛生易簡方

齒縫出血

頭髮切入銚內炒存性研擦之。華陀中藏經

惡血齒痛

五靈脂末米醋煎汁含咽。直指方

齒縫出血

百草霜末擦之立止。集簡方

齒縫出血

胡粉半兩麝香半錢爲末時時搽牙。聖濟方

齒斷出血

煮一升含漱。千金方

齒疼出血

每夜臨末厚封斷上有汁瀝盡乃附其汁用時叩齒勿住不過十夜疼血皆止忌豬魚菜等極驗

○用后方

牙齦出血 有竅寒水石粉三兩朱砂二錢甘
草腦子一字爲末乾擦○普濟方

齒縫出血 苦參一兩枯礬一錢爲末
日三搽之立驗○普濟方

齒縫出血 麥門冬煎湯漱
之○蘭室寶鑑

牙齒出血 不止動搖白痰藥末
且旦擦之○道藏經

牙疼出血 胡桐淚半兩研末夜貼之
或入麝香少許○聖惠方

牙疳出血 大鯽魚一尾去腸留鱗入甕歸末泥固
燒存性入煨過鹽和勻日用○聖惠方

本草類方

齒吸
卷四

本草類方卷四

血汗第四十

血汗不止

水銀硃砂麝香各等分爲末每服五分用新汲水下。宣明方

九竅出血

荊芥煎酒通口服之。直指方

九竅出血

因暴驚而得其脈虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事

○楊仁齋直指方

九竅出血

服藥不止者南天竺草卽瞿麥搗指大一把山梔子仁三十箇生薑一塊甘草炙半兩燈草一小把大棗五

枚水煎服。聖濟總錄

九竅出血

不止刺薊搗汁和酒服乾者爲末冷水服。簡要濟衆

本草類方

血汗卷四

三

九竅出血

精頭者按塞之。海上方

九竅出血

治人大驚九竅四肢指腋皆出血以水嚥而水并華水也。嘉祐主治

九竅出血

石榴花採塞之取效葉亦可

皮膚血汗

郁李仁去皮研一錢麝香梨搗汁調下。聖濟總錄

皮膚血濺

出者以煮酒罨上紙扯碎如楊花攤在出血處按之卽止。王粲百一選方

九竅出血

荊葉搗汁酒和服

諸竅出血

人中白一團雞子大綿五兩燒研每服二錢溫水服。聖惠方

肌膚出血

胎髮燒灰研之卽止或吹入鼻中。證治要訣

諸竅出血

頭髮敗櫻陳蓮蓬煆燒灰等分每服三錢木香湯下。聖惠方

膚出汗血

五七日不生者用人中白新瓦煨乾入麝香少許溫酒朝服立效。經驗方

本草類方

血汗
卷四

四

本草類方卷之四

欬嗽血第四十一

欬嗽吐血 人參黃耆飛羅麩各一兩百合五錢為末
水丸梧子大每服五十粒食前茅根湯下
朱氏集驗方用人參乳香辰砂等分為
末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸

服一日

吐血欬嗽

龍腦薄荷焙研末
米飲服一錢取效

喘欬嗽血

欬喘上氣喘急嗽血吐血脈無力者人參
末每服三錢雞子清調之五更初服更睡
去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者
服盡一兩甚好一方以烏雞子水磨千遍
自然化作水調藥尤妙忌醋鹹腥醬
麩鮮醉飽將息乃佳沈存中靈苑方

本草類方

卷四 欬嗽血

五

痰嗽帶血

青州大柿餅飯上蒸熟批開每用一枚搗
真青黛一錢即時食之薄荷湯下。丹溪
要纂

欬嗽吐血

甚者殺鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮
去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服
米飲下一錢

心虛嗽血

沉香木一錢半夏七枚入猪心中以小便
濕紙包煨熟去半夏食之。燈治要訣

欬嗽有血

小兒胎髮灰入麝香少許酒下每箇
作一服男用女用男。朱氏集驗

久嗽唾血

自前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水
六升煮一升分三服忌猪肉菘菜。外臺

痰嗽帶血

欬冬花百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼
大每即時嚼一丸姜湯下。濟生方

吐血欬嗽

吐血後欬者紫菀五味炒為末蜜
丸炭子大每含化一九。指南方

欬嗽唾血勞瘦骨蒸日晚寒熱生地黃汁三合煮白粥臨熟入地黃汁攪勻空心食之。食醫

鏡心

吐血欬嗽熟地黃末酒服一錢日三。聖惠方

本草類方

欬嗽血
卷四

六

本草類方卷四

諸汗第四十二

身熱多汗

胡粉半斤雷丸四兩
為末粉身。千金方

風熱汗出

水和雲母粉服三錢不
過再服立愈。千金翼

脚底多汗

燒入場上土鋪于鞋底內
蹉之灰亦可。集玄方

陰汗濕痒

密陀僧末傅之。
戴氏加蛇牀子末

陰汗濕痒

枯礬撲之。又泡湯
沃洗。御藥院方

自汗不止

欝金末臥時調塗
于乳上。集簡方

睡中盜汗

防風二兩芎藭一兩人參半兩為
末每服三錢臨臥飲下。易簡方

本草類方

卷四

七

自汗不止

防風去蘆為末每服二錢浮麥煎湯服。
朱氏集驗方防風用麩炒猪皮煎湯下

一切盜汗

婦人小兒一切盜汗又治傷寒後盜汗不
止龍膽草研末每服一錢猪胆汁三兩點
入溫酒少許調服

○楊氏家藏方

老小虛汗

白朮五錢小麥一撮水煮乾去麥為
末用黃耆湯下。錢。全幼心鑑

自汗不止

粳米粉絹包
頻頻撲之

脾虛盜汗

白朮四兩切片以一兩同牡蠣炒一兩同
石斛炒一兩同麥麩炒揀朮為末每服三
錢食遠粟米湯下

日三服。丹溪方

心悶汗出

不識入新汲水和蜜
飲之甚效。千金方

盜汗陰汗

麻黃根牡蠣
粉為末撲之

盜汗不止

太平白芷一兩辰砂半兩爲末每服二錢溫酒下屢驗。朱氏集驗方

盜汗無度

麻黃根黃芪等分爲末飛麩糊作丸梧子大每用浮麥湯下百九以止爲度。談學翁試

驗方

盜汗不止

麻黃根椒目等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根故蒲扇爲末撲之。奇效

良方

諸虛自汗

夜卧卽甚久則枯瘦黃芪麻黃根各一兩牡蠣水泔浸洗煨過爲散每服五錢水二

蓋小麥百粒煎服。和濟局方

病後虛汗

口乾心驚熟地黃五兩水三盞煎一盞半分三服一日盡。聖惠方

虛勞盜汗

煩熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門冬末各一兩熬至可丸九九如梧子

本草類方

諸汗卷四

八

大每食後米飲服二十九名青蒿煎。聖濟總錄

自汗不止

何首烏末津調封臍中。集簡方

盜汗不止

熟艾二錢白茯苓三錢烏梅三個水一鍾煎八分臨卧溫服。通妙真人方

寐中盜汗

五倍子末蕎麥麩等分水和作餅煨熟夜卧待飢時乾喫二三箇勿飲茶水甚妙。

靈集

盜汗不止

洗日以鼓一升飯炒香清酒三升漬三日取汁冷暖任服不瘥更作三兩劑卽止

虛汗盜汗

衛生寶鑑用浮小麥文武火炒爲末每服二錢半米飲下日三服或煎湯代茶飲。

三方以豬鬃唇煮熟切片蘸食亦良

盜汗自汗

每夜卧時待飢喫蒸餅一枚不過數日卽止。醫林集要

夜出盜汗

非根四十九根水一升煮一升頓服。千金方

自汗不止

糯米小麥麩同炒爲末每服三錢米飲下或煮猪肉燕食

盜汗不止

樹上乾桃子一箇霜梅二箇葱根七箇燈心二莖陳皮一錢稻根大麥芽各一撮水

二鍾煎服

夜出盜汗

麥麩作彈丸空心卧時煮食之次早服妙香散一帖取效

氣虛盜汗

牡蠣粉杜仲等分爲末酒服方寸匕。千金方

出汗不滴

瘦却腰脚并耳聾者米醋浸荆三稜夏四日冬六日爲末醋湯調下二錢卽差。經驗後

方

病後虛汗

及目中流汗牡蠣等分爲末卧時水服五匕不止更服。肘後方

本草類方

諸汗

九

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調茯苓末日服一錢。證治

要訣

睡中汗出

酸棗仁人參茯苓等分爲末每服一錢米飲下。簡便方

卒汗不止

牛羊脂溫酒頻化服之。外臺

虛勞盜汗

牡蠣粉麻黃根黃芪等分爲末每服二錢水二盞煎七分溫服日一。本事方

自汗盜汗

常出爲自汗睡中出爲盜汗用五倍子研末津調填于臍中縛定一夜卽止也。集靈

靈

病後虛汗

傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩水

七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉苳蓉酒浸一宿刮淨一兩牡蠣煨粉二兩煎取

一盞半一日
服盡○聖惠

心虛自汗

不睡者用豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮熟去藥食之不過數服即

愈○證
治要訣

自汗不止

白朮末飲服方寸匕
日二服○千金方

本草類方

諸汗
卷四

十

本草類方卷四

怔忡第四十三

怔忡自汗

心氣不足也。人參半兩當歸半兩用續豬腰子二個以水二盞煮至一盞半取腰子

細切人參當歸同煎至八分空心喫腰子以汁送下其滓焙乾為末以山藥末作糊

丸綠豆大每服五十丸食遠寒湯下不過兩服即愈此昆山神濟大師方也一加乳

香二錢。王

心下悸忪

半夏麻黃九半夏麻黃等分為末蜜丸小豆大每服三十九日三。金匱要略

預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸頻鬱憂愁慘賊喜怒多恐健忘少睡夜多異

夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲茯

本草類方

怔忡卷四

七

神柏子仁人參地骨皮遠志山藥黃精蒸熟硃砂水飛等分為末煉蜜丸茨子大每

嚼一九人參湯下。和劑局方

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉酸棗仁炒黃芪炙

白朮焙茯苓神各兩兩木香半兩炙甘草二錢半皮咀每服五錢薑三片棗一枚水二

鍾煎一鍾溫服。濟生方

...

...

...

本草類方卷四

本草類方卷四

健忘第四十四

心孔昏塞

多忘善誤丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿令人知。別後方

開心益智

人參末一兩鍊成豬猪肥肪十兩以醇酒和勻每服一盃日再服服至百日耳目聰

明骨髓充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病。千金方

健忘益智

七月七日取菖蒲為末酒服方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之久服聰明忌鉄器

金方

補中強志

益耳目聰明用蓮實半兩去皮心研末水煮熟以粳米三合作粥入末攪勻食。聖

方惠

本草類方

健忘卷四

士

雞頭粥

益精氣強志意利耳目雞頭實三合煮去殼粳米一合煮粥食日日空心食。經驗

養心安神

朱雀丸治心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火

全氣氣茯神二兩去皮沉香半兩為末煉蜜丸小豆大每服三十九食後人參湯下

百一

健忘

久服聰明益智慧用白龍骨遠志等分為末食後酒服方寸匕日三。千金方

健忘驚悸

預知散用虎骨酥炙白龍骨遠志肉等分為末生薑湯服日三服久則令人聰慧。

永類

健忘

心孔昏塞多忘善誤取牛馬猪雞羊犬心乾之為末向日酒服方寸匕日三服開一

外臺

本草類方卷四

驚悸第四十五

驚悸善忘

心臟不安上膈風熱化痰安神白石英一兩硃砂一兩為散每服半錢食後煎金銀

湯下。簡要濟衆方

虛勞驚悸

補虛止驚令人能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以水一斗煮取三升細細服

或煮粥食水盡可再煎之。張文仲方

心下有水

煎一升半分三服。梅師方

心下悸病

半夏麻黃丸用半夏麻黃等分末之煉蜜丸小豆大每服三九日三服。金匱要略

驚悸遺精

木饅頭炒白牽牛等分為末每服二錢用米飲調下。乾坤祕鑑

本草類方

卷四

三

心神不足

火不降水不升健忘驚悸朱雀丸用沉香五錢茯神二兩為末煉蜜和丸小豆大每食後人參湯服三十九日

二服。王璆百一選方

清心寧神

宗奭曰用蓮蓬中乾石蓮子肉於砂盆中擦去赤皮留心同為末入龍腦點湯服之

心虛驚悸

羸瘦者荆瀝二升火煎至一升六合分作四服日三夜一。小品方

風毒驚悸

劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗舊絹帛上乘熱纏兩足心並貼兩手心。圖經

安魂定魄

珍珠末豆大一粒蜜一蠟殼和服日三尤宜小兒。肘后

心氣鬱結

羊心一枚咱夫翦即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心上炙熟食之令人心

安多喜。正要

本草類方卷四

狂惑第四十六

狂顛謬亂

不識人伏龍肝末水服方寸七日三服。千金方

風熱驚狂

神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效粉霜一兩以白麩六錢和作餅子炙熟同研輕粉半兩銚白霜二錢牛

為末滴水丸梧子大每服十九至十五丸米飲下。

宣明方

發狂欲走

瓜蒂末井水服一錢取吐即愈。聖惠方

病笑不休

滄鹽煨赤研入河水煎沸噉之探吐熱痰數升即愈素問曰神有餘笑不休神心火也火得風則熾笑之象也一婦病此半年張子和用此方遂愈。儒門事親

本草類方

狂惑

熱病狂邪

不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十九薄荷湯下亦可為末二錢水煎服

金方

癲狂邪疾

防葵研末溫酒服一刀圭至二三服身暈及小不仁為效。肘後方

天行熱狂

芭蕉根搗汁飲之。日華子本草

卒發顛狂

黃芩三升為末以酒一升漬數日絞去滓煎令可九如小豆三九日三服當見而急

頭中如有蟲行額及手足有赤豆處如此並是瘡候也未知再服取盡神良。陳延之小

品方

癲狂邪祟

凡狂發欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此為邪祟以蠶紙燒灰酒水任下方寸七

亦治風癲。肘後方

癲邪狂妄 自賢自聖行走不休白雄雞一隻

心風發狂 黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟細嚼以本汁

送下。楊氏家藏

驚憤邪僻 治因驚憂佈迫或激憤惘悵致志氣錯越心行違僻者白雄雞一頭治如食法珍珠

四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡。肘后

狐肉羹 治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病用狐肉一片及五臟

治淨入或汁煮熟入五味作羹或作粥食京中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙。心鏡

心病邪熱 慈珠丸用豬心血一箇旋花末一匙硃砂末一兩同研丸梧子大每酒服二十九。

效奇

本草類方 狂或 卷四 五

風狂歌笑 行走不休用服豬肉一斤煮熱切膾和醬食或羹粥炒任服之。食醫心鏡

風熱邪病 蝦蟇燒灰硃砂等分爲末每服一錢酒服日三甚有神驗。外臺秘要

熱病發狂 奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以泥固濟蝦蟇

日去火毒研末新汲水服三錢未退再服。斗門方

狂言鬼語 卒死用蝦蟇燒末酒服方寸匕日三。外臺秘要

本草類方卷四

煩躁第四十七

熱渴煩悶

地漿一盞飲之。聖惠方

服藥過劑

煩悶。東流水飲二升。肘後方

服藥過劑

煩亂者。地漿飲之。肘後

服藥過劑

煩亂者。水和胡粉服之。千金方

口中乾燥

煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮。皮爛入定粉。一兩。研勻。丸。茨子大。每含化一丸。嚙汁。

太平聖惠方

膈上煩熱

多渴利。九竅滑石二兩。烏水三大盞煎。去滓。入粳米煮粥食。聖惠方

本草類方

煩躁卷四

六

風熱心躁

口乾狂言。渾身壯熱。寒水石半斤。燒半日。淨地坑內。盆合四面。濕土。攪起。經宿取出。入甘草末。天竺黃各二兩。龍腦二分。糯米糕丸。彈子大。蜜水磨下。集驗方

米糕丸。彈子大。蜜水磨下。集驗方

乳石發動

煩熱。煩渴。滑石粉半兩。水一盞。絞白汁。頓服。聖惠方

服藥過劑

煩亂者。粳米汁飲之。外臺

乳石發動

煩悶。芒硝。蜜水調服。一錢。日三服。聖惠方

五心煩熱

胡黃連末。米飲服。一錢。易簡方

服石發動

石燕子七個。打碎。水三升。煮二升。頻淋洗。以瘡為度。聖濟方

服藥過劑

煩亂者。鼓汁飲之。千金

注車注船

凡人登車船。煩悶。頭痛。欲吐者。宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分。搗

碎以方囊繫半合于衣帶及頭上則免此患。肘後方

心痺心煩

內熱茜根煮汁服。傷寒類要

傷寒煩渴

心神躁熱用秦芫一兩牛乳一大盞煎六分分作二服。太平聖惠方

傷寒厥逆

身有微熱煩燥六脉沉細微弱此陰極發躁也無憂散用人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星末二錢

熱服立甦。三因方

時行熱毒

心神煩躁用藍澱一匙煎汲水一盞服。聖惠方

熱攻心煩

恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為二服。食醫心鏡

氣逆煩滿

水羊角燒研水服方寸匕。普濟方

傷寒煩渴

思飲枯樓根三兩水五升煮一升分二服先以淡竹瀝一斗水二升煮好銀二兩半

本草類方

煩躁卷四

七

冷飲汁然後服此。外臺秘傳

風毒攻心

煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取七合食後服之。心鏡

服藥過劑

悶亂者飴餠食之。千金

煩躁熱渴

葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜漉出拌勻煮熟以糜飲和食。食醫心鏡

霍亂煩躁

坐卧不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服。深師方

骨蒸煩熱

散一切虛勞煩熱大病後煩熱并用地仙散地骨皮二兩防風一兩甘草炙半兩每用五錢生薑五片

水煎服。濟生方

除煩止渴

生葡萄搗聽取汁以瓦器熬稠入熟蜜少許同收點湯飲甚良。居家必用

急勞煩熱

體瘦三皂丸用皂莢皂莢樹皮皂莢刺各一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三

五度煎之候少凝蒸餅丸小豆大人麝香末一分以童子小便浸每空心溫水下七丸。聖

惠方

乳石發動

煩熱石南為末新汲水服一錢。聖惠方

時氣煩躁

五六日不解青竹瀝半盞煎熟數數飲之厚覆取汗。千金方

血氣逆煩

羚羊角燒末水服方寸七。肘後方

血上逆心

煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸七。子母秘錄

中風煩熱

皮膚瘙癢醞酒四兩每服半匙溫酒和服日一

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦以青殺羊角屑微炒為末無時溫酒服一錢。聖惠

下部諸疾

龍液膏用堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水和浸去筋膜復焙入瓷罐內以好蜜

本草類方

頰燥 卷四

六

和勻入銅釜內重湯桑柴火煮一日取出收之每空心白湯下二三匙解煩鬱澀

一切下部疾皆可除。積善堂方

服藥過劑

苦煩生葛汁飲之乾者煎汁服。肘后方

服藥過劑

犀角燒末水服方寸七。外臺

本草類方卷四

不眠第四十八

目不得瞑

乃陽氣盛不得入於陰陰氣虛故目不得眠治法飲以半夏湯用流水千里外者入升揚之葛遍取其清五升煮之炊葦薪火置秫米一升半夏五合徐炊令竭為一升

去滓飲汁一小盃日三飲以知為度○靈樞經

夜不合眼

難睡燈草煎湯代茶飲即得睡○集簡方

晝夜不眠

以新布火炙熨日并蒸大豆更番囊盛枕之冷即易終夜常枕之即愈○肘后方

煩悶不眠

大棗十四枚葱白七莖水三升煮一升頓服○千金

膽虛不眠

心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二錢竹葉湯調下○和劑局方加人參

本草類方

卷四

一兩辰砂半兩乳香

二錢半煉蜜丸服

虛煩不眠

深師方酸棗仁湯用酸棗仁二升蠆母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草炙一兩以水一斗先煮棗仁減三升乃同煮取三分服○圖經本草

振悸不眠

湖浴方酸棗仁湯用酸棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生姜六兩水八升煮三升分服

骨蒸不眠

心煩用酸棗仁一兩水二盞研絞取汁下粳米二合煮粥候熟下地黃汁一合再煮勻食○太

膽虛不眠

平聖惠方用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒服○聖惠

虛勞不眠

乾薑為末湯服三錢取微汗出○千金方

目不得眠

用流水千里者八升揚之萬遍取清五升
煮之炊以葦薪大沸入秫米一升半覆五
合煮一升半飲汁一盃日三以知爲度病
新發者覆盃則卧汗出則已久者三飲而
已

本草類方

不眠
卷四

辛

本草類方卷四

多眠第四十九

穀勞嗜卧

飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重黑黑欲卧食畢輒甚用大麥蘖一升椒一兩並

炒乾薑三兩擣末每服方寸七白湯下日三〇肘后

目瞋息膚

浸七日一日服二次禁醋二七日徧身生瘡是毒出不出以生薑湯

浴之取瘡愈〇千金翼方

膽風沉睡

膽風毒氣虛實不調昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全挺蠟茶二兩以生薑汁塗炙

微焦為散每服二錢水七分煎六分溫服下〇簡要濟衆方

人耽睡卧

花穀葉晒研末湯服一二錢取瘡止〇楊堯輔方

本草類方

卷四

主

仙乳丸

治上焦熱晝常好瞋用伏翼五兩重一枚連腸骨炙燥雲實炒五兩威靈仙三兩牽

牛炒莧實各二兩丹砂鉛丹各一兩膩粉半兩為末蜜丸綠豆大每服七丸木通湯

下以知為度〇普濟方

膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩味砂半兩龍腦半兩分爲末煉蜜丸梧子大每服三十九竹葉

湯下〇聖惠方

目澀好眠

取雄鼠目一枚燒研和魚膏點入目背兼以絳囊盛兩枚佩之〇肘后

本草類方卷四

消渴第五十

消渴引飲 瓦窰突上黑煤乾似鐵屎者半斤為末入生薑四兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲

五合○
聖濟錄

消渴煩熱 銛白霜枯白礬等分為末密丸艾子大綿裹含化嚥汁○又方銛白霜一兩根黃消

石各一兩為末每冷
水服一錢○聖濟錄

消渴煩悶 黑豆許吞津○聖惠方
以陳粟米炊飯乾食

胃熱消渴 之良○醫方心鏡
神效丸用密陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸

消渴飲水 梧子大濃煎蠶繭鹽湯或茄根湯或酒下

本草類方
消渴
卷四

一曰五九日增五九至三十九止不可多服五六服後以見水惡心為度惡心時以

乾物壓之日後自定其奇○選奇方

消渴飲水 綠豆煮汁煎作粥食○普濟方

消渴煩亂 黃芩新汲水服一錢以蕎麥粥壓之○聖惠方

乳石發渴 大麻仁三合水三升煎二升時呷之○外臺

消渴煩熱 水銀一兩銛一兩結砂皂莢一挺酥炙麝香一錢為末每服半錢白湯下○聖濟錄

消中嗜食 多因外傷脾熱內積憂思飲食臧物及麩致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反

堅小便無度輕粉一錢為末姜汁拌勻長流水下齒浮是效後服豬肚丸補之○危

氏得效方

腎消尿數

乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆唯黃一兩半為末蒸餅和丸綠豆大每服十九至三十丸空心鹽湯

消渴引飲

無名異一兩黃連二兩為末蒸餅丸棗豆大每服百丸以茄根蠶繭煎湯送下。聖濟錄

乳石發渴

寒水石一塊含之以麩為度。聖濟錄

消渴引飲

本方浮石舶上青黛等分麝香少許為末溫湯服。又方白浮石蛤粉蟬殼等分為末鯽魚膽汁七個調服三錢神效

夏月渴死

蓋服。外臺濃煮麥汁一

消渴引飲

湯瓶內蘼葛根水萍焙等分每服五錢水煎服。又方湯瓶內蘼蕨莫根炒各一兩

本草類方

消渴卷四

壹

消中易饑

烏梅連核二兩焙為散每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服。聖濟錄

消渴尿多

肉蓯蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧子大每服酒下二十九。醫學指南

肘后方用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下。黃鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒為末水丸梧子大每服五十九溫水下。崔氏治消渴小便

滑數如油黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水猪肉。總錄用黃連未入

三消骨蒸

猪肚內蒸爛鴨九梧子大飯飲下黃連末以冬瓜自然汁浸一夜曬乾又浸如此七次為末以冬瓜汁和丸梧子大每服三四十九大麥湯下尋常

消渴累年

不愈莎草根一兩白茯苓半兩為末每陳粟米飲服三錢日二

乳石發渴

水浸雞子取清生服其良。總錄

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴而面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癰或先癰疽而後發渴並宜當服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃耆箭籜

者去蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃為末每服二錢白湯點服早晨日午各一服亦可煎服名黃芪六一湯。

外科精要

消渴變水

服此冷水從小便出用紫蘇子炒三兩蘿藦子炒三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日二次

○聖濟總錄

乳石發渴

青梁米煮汁飲之。外臺

本草類方

消渴卷四

治

消渴引飲

人參為末雞子清調服一錢日三四服。○集驗用人參栝樓根等分生研為末煉蜜丸梧子大每服百丸食前麥門冬湯下日

二服以愈為度名玉壺丸忌麪酒炙搏。○鄭氏家傳消渴方人參一兩粉草三兩以

雄猪膽汁浸炙腦子半錢為末蜜丸芡子大每嚼一丸冷水下。○聖濟總錄用人參

一兩葛粉二兩為末發時以罇猪湯一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑

錫以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效

起

消渴引飲

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服鄂渚幸祿之患此九年服藥止而

復作蘇枌授此方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不可以平易而忽之也。○陳

日華經方

消渴引水

用上元板橋零門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小

刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩拭秤之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛納黃連末和

九並手丸如梧子大食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定若重者即初服一

百五十九日服一百二十九日一百九四日八十九日五十九日合藥要天氣

晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即

取白羊頭七枚治淨以水三大斗煮爛取汁一半以來細細飲之勿食肉勿入鹽不

過三劑平復也○崔元亮海上集驗方
蒿薇根一把水煎
日服之○千金方

消渴尿多

消渴引飲

本草類方

虎杖燒過海浮石烏賊魚骨丹砂等分爲末渴時以麥門冬湯服二錢日三次忌酒

消渴卷四

五

色魚麩鮓醬生冷
○衛生家寶方

消渴不止

下元虛損牛膝三兩爲末生地黃汁五升浸之口曝夜浸汁盡爲度蜜九梧子大每空心溫酒下三十九丸服壯筋骨

消渴飲水

駐顏色黑髮津液自生○經驗方
骨節煩熱用生芭蕉根搗汁時飲一二合○聖惠方

消渴引飲

豆大每薄荷湯下二九忌甘草○楊氏家藏方
甘遂麩炒半兩黃連一兩爲末蒸餅丸

消渴飲水

凌香花一兩搗碎水一盞半煎一盞分二服○聖濟錄
免絲子煎汁任意飲之

消渴不止

以止爲度○事林廣記
燥渴腸祕 九月十月蒸菰蘆實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒熟爲末食後夜卧各以沸湯

點服二錢。冠宗奭衍義。

百合病渴

栝樓根牡蠣熬等分爲散。飲服方寸七。○永類方。

消渴飲水

瓠瓜去皮每食後嚼二三。兩五七度。○聖惠方。

消渴煩亂

黃栝樓一箇酒一盞洗去皮子取瓤煎成膏入白礬末一兩九栝子人每米飲下。九。○聖惠方。

九。○聖惠方。

消渴不止

拔殼卽莢契咬咀半兩水三盞烏梅一箇煎一盞溫服。○普濟方。

消渴飲水

薏苡仁煮粥飲。并煮粥食之。

百合變渴

病已經月變成消渴者百合一升水一斗漬一宿取汁溫浴病人浴畢食白湯餅。○陳延之。

小品方。

本草類方

消渴 卷四

美

消渴飲水

千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出搗研濾過澄粉晒乾每服方寸七水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之。○肘后方用栝樓根薄切炙取五兩水五升煮四升隨意飲之。○外臺祕要用生栝樓根三十斤以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用

暖酒先食服如雞子大日三服最妙。○聖惠方用栝樓根黃連二兩爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓根人參等分爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓

根人參等分爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓

根人參等分爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓

根人參等分爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓

根人參等分爲末蜜丸栝子大每服三十九日二。○又玉壺丸用栝樓

腎消飲水

小便如膏油用茴香炒苦楝子炒等分爲末每食前酒服二錢。○保命集。

消渴骨蒸

大冬瓜一枚去瓤入黃連末填滿安瓮內待瓜消盡同研丸栝子大每服三四十九煎冬瓜湯

下。○經驗

消渴引飲

非前日用三五兩或炒或作羹勿入鹽入
醫無妨喫至十斤卽住極效過清明勿喫
有人病此引飲無度得
此方而愈○秦憲副方

消渴飲水

日至一石者浮萍搗汁服之○又方用乾
浮萍栝樓根等分爲末人乳汁和龍梧子
大空腹飲服二十九三
年者數日愈○千金方

消渴飲水

烏豆置牛胆中陰乾百
日吞盡卽瘥○肘後方

消渴煩亂

冬瓜瓢乾者一兩
水煎飲○聖惠方

腎消膏淋

病在下焦苦練子茴香等分炒
爲末每溫酒服一錢○聖惠方

三消渴病

梅花湯用糯穀炒白芍桑根白皮等分
每用一兩水二碗煎汁飲之○三因方

消渴飲水

乾生薑末一兩以鯽魚胆汁和丸
梧子大每服七丸米飲下○聖惠

本草類方

消渴
卷四

三

消渴心煩

用小麥作飯及
粥食○心鏡

消渴飲水

金豆丸用白扁豆浸去皮爲末以天花粉
汁同蜜和丸梧子大金箔爲衣每服三二
十九天花粉汁下日二服忌炙燻
酒色次服滋腎藥○仁存堂方

消渴飲水

獨勝散用由了子蘿蔔三枚淨洗切片口
乾爲末每服二錢煎猪肉湯澄清調下口
三服漸增至三錢生者擣汁亦可
或以汁煮粥食之○圖經本草

虛熱作渴

桃膠如彈丸大
含之佳○外臺

消渴不止

冬瓜一枚削皮埋濕地中一日取出破開
取清水日飲之或燒熟絞汁飲之○聖濟
方

消渴不止

小便多用乾冬瓜子麥門冬黃連各二兩
水煎飲之冬瓜苗葉俱治消渴不拘新乾

玄方

補下治渴

麻子仁一升水三升煮四五沸去滓冷服半升日二。藥性論

老人煩渴

寒食大麥一升水七升煎百升入赤飴二合湯即飲之。秦觀書

消渴引飲

日一至一石者波稜根雞內金等分為末米飲服一錢日三。經論

止渴急方

大豆苗嫩者三五十莖塗酥炙黃為末每服二錢人參湯下。聖濟總錄

腎虛消渴

難治者黑大豆炒天花粉等分為末糊丸梧子大每黑豆湯下七十九日二名救活

九。普濟妙方

積熱消渴

白瓜去皮每食後喫三二兩五七度良。孟詵食療

消渴飲水

取稻穰中心燒灰每以湯浸一合澄清飲之。危氏

本草類方

消渴 卷四

消渴飲水

目至數斗小頭赤澀用秋麻子仁一升水三升煮三四沸飲汁不過五升差。肘後

消渴煩悶

烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎一盞去滓入豉二百粒煎至半盞溫服。簡要

濟眾方

消渴飲水

用香水梨或舊梨或江南雪梨皆可取汁以蜜湯熬成瓶收無時以熱水或冷水調服愈乃止。普濟方

忍冬圓

治消渴愈後預防發癰疽先宜服此用忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以

甘草少許碾為細末以浸藥酒打麩糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下此藥不特治癰疽大能止渴。外科精要

消腎溢精

胡桃丸治消腎病因房慾無節及服丹石或失志傷腎遂致水弱火強口舌乾精自

溢出或小便赤黃大便燥實或小便大利而不甚渴用胡桃肉白茯苓各四兩附子

一枚去皮切片姜汁蛤粉同焙為末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下。普濟方

桂漿渴水

夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗入新瓮

瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去掃一重七日

消渴尿多

能食黃蘗一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣飲數日即止。章甫獨行方

今人多作之。圖經本草
水火偏盛消中等證黃蘗一斤分作四分用醇酒蜜湯鹽水童尿浸洗晒炒為末以

本草類方

消渴 卷四

羌

消渴飲水

不止糯米三合水五升蜜一合研汁分服或煮汁服。楊氏產乳

消渴煩亂

大盞同煮一中盞溫服。聖惠方
苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨下蟲

消渴有蟲

如虻而紅色其渴自止消渴有蟲人所不知。洪邁夷堅志

渴而尿多

非淋也用榆皮二斤去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日三服。外臺秘要

消渴尿多

入地三尺桑根剝去白皮炙黃黑剝以水煮濃汁隨意飲之亦可入少米勿用鹽。用后

消渴煩躁

取七家井索近餅口結處燒灰新汲水服二錢不過三五服效。聖惠方

消渴飲水

日夜不止小便數者心鏡用田螺五升水一斗浸一夜渴即飲之每日一換水及螺

或煮食飲汁亦妙。聖惠用糯米二升煮稀粥一斗冷定入田中活螺三升在內待

食粥盡吐沫出乃收飲之立效

消渴重者

衆人溺坑中水取一盞服之勿令病人知三度瘥。聖惠方

聖惠水蛇丸

治消渴四肢煩熱口乾心躁水蛇一條酒者剉皮炙黃為末蝸牛五十箇水浸五日

取涎入天花粉末煎稠入麝香一分栗飯和丸綠豆大每服十九姜湯下

消渴引飲

不止崔元亮海上方用蝸牛十四枚形圓而大者以水三合密器浸一宿取水飲之

不過一劑愈。聖惠用蝸牛焙半兩蛤粉龍胆草桑根白皮炒各二錢半研末每服

一錢楮葉湯下

消渴飲水

用泥鱸魚十頭陰乾去頭尾燒灰乾荷葉等分為末每服二錢新汲水調下日三名

本草類方

消渴卷四

三

沃焦散。普濟方

消渴飲水

半鼻木二個男用化牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四盞煎三

盞熱服甚妙。普濟方

消渴飲水

臘日或端午日用黃泥固濟牡蠣煨赤研末每服一錢用活鯽魚煎湯調下只二三

服愈。經驗方

消渴飲水

用鯽魚一枚去腸留鱗以茶葉填滿紙包煨熟食之不過數枚即愈。吳氏心統

生津丸

治消渴飲水無度以黃頰魚涎和青蛤粉滑石末等分丸梧子大每粟米湯下三十

丸

消渴飲水

用浮石蛤蚧蟬蛻等分為末以鯽魚胆七枚調服三錢神效。本事

消渴飲水

五倍子為末水服方寸
七日三服。危氏得效

消渴尿多

竹瀝恣飲數日
愈。用後方

消渴飲水

晚蠶沙焙乾為末每用冷水
下二錢不過數服。斗門方

渴利不止

羊肺一具入少肉和鹽豉作
羹食不過三具愈。普濟方

消渴飲水

竹籠散用五靈脂黑豆去皮等分為末每
服三錢冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二
服不可更服熱藥宜入味丸去附子加五

味子若小渴者二三服即止。保命集

消渴飲水

因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲
水數尿以麝香當門子酒和作十餘丸枳

椀子煎湯送下蓋麝香敗酒
壞棗枳椀亦敗酒也。濟生

消渴羸瘦

用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠
去滓盡冷渴即飲之極重者不過二兔。

本草類方

消渴
卷四

補元亮
海上方

消渴無度

雄豬胆五箇定粉一兩同煎成丸芡子
大每含化二丸嚥下日二。聖濟總錄

消渴飲水

雞內金洗晒乾搗根炒五兩為末糊丸
梧子大每服三十九溫酒水下日三。總錄

腎消尿數

鹿角一具炙搗篩溫酒每
服方寸匕日二。外臺

消渴飲水

小便數以黃雌雞煮汁冷
飲并作羹食肉。心鏡

下虛消渴

牛羊乳中熱下焦虛冷小便多者
心脾中熱下焦虛冷小便多者

主消渴疾

猪脊湯用猪脊骨一尺三寸大棗四十九
枚新蓮肉四十九粒炙甘草二兩西木香

一錢水五碗同煎取汁
渴則飲之。三因方

胃虛消渴

羊肚爛煮空腹食
之。古今錄驗

消渴無度 乾豬脬十箇剪破去蒂燒存性為末每溫酒服一錢。聖濟總錄

消渴飲水 小便數用野雞一隻五味煮取三升已來汁飲之肉亦可食甚效。食醫心鏡

老人消渴 鹿頭一箇去毛煮爛和五味空心食以汁噉之。郵事

消渴不止 恬樓根煎用生恬樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃牛脂一合慢火熬成膏凝收每酒服

一杯日三。總錄

消渴飲水 小片足用白花鴿一隻切作小片以上蘇煎含咽。心鏡

消渴利水 羊肉一脚瓠子六枚姜汁半合白麩二兩同鹽葱炒食。正要

消渴飲水 日夜飲水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉湯即飲之肚亦可食煮粥亦可。仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩恬樓根白梁米各四

本草類方

消渴卷四

三

兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十九米飲下。食醫心鏡

消渴白濁

時珍主治攷與白濁夢遺方同方用半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃

出火毒去猪苓八煨過牡蠣一兩以山藥糊丸梧子大每服三十九茯苓湯送下腎

氣閉而一身精氣無所管隔妄行而遺者宜用此方蓋半夏有利性猪苓導水使腎

氣通也與下元虛憊者不同。許學士本事方

下虛消渴

上盛下虛心火突鑠腎水枯涸不能交濟而成渴症白茯苓一斤黃連一斤為末煎

熬天花粉作糊丸梧子大每溫酒下五十九。德生堂經驗方

遺精夢洩第五十一

內熱遺精

鐵鏽末冷水服一錢
三服止。活人心統

虛勞尿精

白膠二兩炙為末酒
二升和溫服。外臺

心虛遺精

入線縛白水煮熟食之。唐瑤經驗方
精滑不禁大便溏泄手足厥冷陽起石煨

元氣虛寒

研鍾乳粉各等分酒煮附子末同麩糊丸
梧子大每空心米飲服五

睡即洩精

白龍骨四分非子五合為散
十九以愈為度。濟生方

夢遺食減

空酒服方寸七。梅師方
末用雄豬肚一具洗淨砂礮煮爛石臼搗

本草類方

遺精夢洩
卷四

夢中失精

蘇子一升熬杵研末酒服方
寸七日再服。外臺秘要

玉莖不痿

精滑無歇時時如鍼刺投之則脆此名腎
漏用破故紙韭子各一兩為末每用三錢
水二盞煎六分服日三次

夢遺便澹

愈則止。夏子益奇方
牡蠣粉醋糊丸梧子大每服三

夢遺失精

薰草湯用薰草人參白朮白芍藥生地黃
各二兩茯苓神桂心甘草炙各二兩大棗十

腎虛遺精

分二服。外臺秘要
北五味子一斤洗淨水浸援去核再以水
洗核取盡餘味通置砂鍋中布濾過入好

和藥乾則入汁丸小豆大每服四十丸米
湯下日三服久服身肥食進而夢遺立止

保壽堂方

劉松石

遺精夢洩

遺精夢洩

冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日出火性每空心服一二茶匙百滾湯下。劉公

石保壽堂方

虛勞溺精

用新韭子二升十月霜後採之好酒入合清一宿以晴明日童子向南塢一萬杵平

且溫酒服方寸七日再服之。外臺秘要

夢洩遺尿

韭子一升稻米二斗水一斗七升煮粥取汁六升分三服。千金方

夢寐遺精

乳香一塊拇指大卧時細嚼含至三更熱下三五服即效。醫林集要

積熱夢遺

心忪恍惚胸中有熱宜清心丸主之黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥門冬湯下此大智禪師方也。普學士本事方

五九麥門冬湯下此大智禪師方也。普學士本事方

小便遺精

蓮子心一撮為末入辰砂一分每服一錢白湯下日二。醫林集要

本草類方

遺精夢洩卷四

壽

虛滑遺精

白茯苓二兩縮砂仁一兩為末入鹽二錢精羊肉批片摻藥炙食以酒送下。普濟方

方

心虛夢洩

或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服蘇東坡方也。直指方

夢中洩精

狗頭鼻梁骨燒研卧時酒服一錢

虛勞遺濁

王鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固漩有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺骨節拘痛面黧肌瘦盜汗虛煩食減

乏力此方性溫不熱極有神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末水糊丸梧子大每服七十九食前用鹽湯送下日

三服。

和劑方

陰虛夢泄

九肋鱉甲燒研每用一字以酒半盞童尿半盞葱白七寸同煎去葱日哺時服之出

臭汗為度。
醫聖元戎

勞心夢洩
龍骨遠志等分為末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸蓮子湯下。心統

腎虛失精
水膠三兩研末以酒二鎰化服日三服。千金

睡中遺尿
雄雞肝桂心等分搗丸小豆大每服一丸米飲下日三服遺精加白龍骨

秋石固精丸
治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便數秋石白茯苓各四兩蓮肉芡實各二兩為末蒸棗肉和丸梧子大每空心

鹽湯下三十九丸。承類鈴方

秋石交感丹
治白濁遺精秋石一兩白茯苓伍錢兔絲子炒五錢為末用百沸湯一盞并華水一盞煮糊丸梧子大每服一百丸

九塩湯下。鄭氏家傳方

腎虛遺精
多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢淫紙裹煨熟空心食之飲酒

本草類方
遺精夢洩 卷四

善

玉鎖丹

一盃不過三五服效。經驗方

治精氣虛滑心虛不寧金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山藥白茯苓白茯苓各二兩為末用金櫻子二斤搥碎以水一斗熬八升去滓再熬成膏入少麩和藥丸梧子大每服七十丸米飲下。普濟

濟按此玉鎖丹即名金鎖玉關丸也

盜汗遺精

鹿角霜二兩生龍骨炒牡蠣殼各一兩為末酒糊丸梧子大每塩湯下四十九。普濟

方

本草類方卷四

赤白第五十二

漏精白濁

雪白鹽一兩并築緊固濟服一日出火膏白茯苓山藥各一兩為末棗肉和蜜丸梧

子火每棗湯下三十九粒甘以濟鹹脾腎兩得也。直指方

腎虛白濁

肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分為末米糊丸梧子大每棗湯下三十九。聖濟總錄

小便赤濁

遠志甘草水煮半斤茯苓益智仁各二兩為末酒糊丸梧子大每空心棗湯下五十

丸。普濟

分清丸

治濁病用芡實粉白茯苓粉黃臘化蜜和丸梧桐子大每服百丸鹽湯下。摘玄方

小便白淫

因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三十九

本草類方

赤白卷四

美

煎補骨脂湯下日三服。普濟方

氣虛白濁

黃芪鹽炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白湯下。經驗良方

小便白濁

糯稻草煎濃汁露一校服之。摘玄方

小便渾濁

如精狀木香沒藥當歸等分為末以刺棘心自然汗和丸梧子大每食前鹽湯下三

十九。普濟方

心虛尿滑

及赤白二濁益智仁白茯苓白木等分為末每服三錢白湯調下

白濁腹滿

不拘男婦用益智仁鹽水浸炒厚朴姜汁炒等分姜三片棗一枚水煎服。永類鈴

方

小便赤濁

益智子仁茯苓各二兩遠志甘草水煮各半斤為末酒糊丸梧子大空心姜湯下五

遺精白濁

下元虛憊者用白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨雞一隻如常治淨裝木

瓜腹煮熟
空心食之

小便白濁

生白果仁十枚搗水
飲日一服取效止

白濁夢遺

半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃出火毒去猪苓入煨過牡蠣一兩以山藥糊丸梧子大每服三十九粒苓湯送下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者宜用此方蓋半夏有別性猪苓導水使腎氣通也與下元虛憊者不同○許學

十本

赤白濁淋

好大黃為末每服六分以雞子一箇破頭入藥攪勻蒸熟空心食之不過二服愈○

本草類方

赤白
卷四

三

小便赤濁

心腎不足精少血燥口乾煩熱頭暈怔忡
鼻絲子麥門冬等分為末蜜丸梧子大鹽湯每下

七十九

小便如汁

乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩白石脂二兩兔絲子酒浸二兩桂心一兩牡蠣粉

一兩為末每服二錢大麥粥飲下○衛生寶鑑

白濁頻數

凝面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒
草薢分清飲冊草薢石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服效乃止

藥等分每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服效乃止

男子白濁

魏元君濟生丹用敢麥炒焦為末雞子白和丸梧子大每服五十九粒湯下日三服

腎虛白濁

及兩脅并背脊穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧子大每醋湯下三十九○經

方驗良

男子白濁

陳冬瓜仁炒為末每空心米飲服五錢。救急易方

女人白淫

糙糯米花椒等分炒為末醋糊丸梧子大每服三四十九食前醋湯下。楊起簡便

小便白濁

生蘿蔔剉空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住糯米飯上蒸熟取去茱萸以蘿蔔帶研末糊丸梧子大每服五十

小便白濁

九煎湯下日三服。普濟白糯米治人夜小便脚停白濁老人虛人多此證令人卒死大能耗人精液主頭昏

重糊丸梧子大每服五十九丸木饅頭煎湯下無此用局方補腎湯下若後生稟賦怯弱房室太過小便太多水管寒澀小便如

本草類方

赤白卷四

美

心虛赤濁

膏胎入石菖蒲牡蠣粉甚效。經驗良方蓮子六一湯用石蓮肉六兩炙甘草一

赤白濁淫

及夢洩精滑真珠粉九黃藥炒真蛤粉各一斤為末每服一百丸空心溫酒下黃藥

苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為末糊丸梧子大每服八十九粒

遺精白濁

湯下。潔古珍心虛不寧金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮

子肉芡實肉山藥白茯苓白茯苓各二兩為末用金櫻子二斤搥碎以水一斗熬八升去滓再熬成膏入少麩和藥丸梧子大每服七十

男子白濁

丸米飲下椿根白皮滑石等分為末糊丸梧子大每空

小便白濁

兩半乾姜炒黑白芍藥炒黑黃藥炒黑各二錢為末如上法丸服。月溪方
緣心腎不濟或由酒色遂至已甚謂之上淫蓋有虛熱而腎不足故上邪干水史載之言夏則土燥水濁冬則上擊水清即此理也醫者往往往峻補其疾反其惟服搏全散則水大即濟源潔而流清矣用絡石人參茯苓各二兩龍骨煨一兩為末每服二錢空心米飲下日二服

小便白濁

清明柳葉煎湯代茶以愈為度。集簡方
精葉即楮葉為末蒸餅丸梧子大每服三十丸白湯下。經驗良方
心脾不調腎氣渾濁用厚朴姜汁炙一兩白茯苓一錢水酒各二碗煎一碗溫服。經驗良方

尿渾白濁

白茯苓一錢水酒各二碗煎一碗溫服。經驗良方

本草類方

赤白卷四

完

虛勞白濁

榆白皮二升水二斗煮取五升分五服。千金方

濕疾白濁

牡荊子炒為末每酒服三錢。集簡方

白濁遺精

潔古云陽盛陰虛故精泄也真珠粉丸主之蛤粉一斤黃柏蘄瓦炒過一斤為細末白朮九如梧子大每服一百丸空心用溫酒下日二次蛤粉味鹹而且能補腎陰黃柏苦而

降心火也

遺精白濁

晚蠶蜚焙乾去翅足為末飯丸菜豆大每服四十九丸淡搗湯下此丸常以火烘否則易糜濕也

唐氏方

五淋白濁

螺螄一統蓮殼炒熱入白酒三碗煮至一盃挑肉食之以此酒下數次即効。扶壽

精方

遺精白濁 益汗虛勞桑螵蟻炙白龍骨等分爲細末每服二錢空心用鹽湯送下○外臺

脾虛白濁 過慮傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊腰骨灰一兩姜制厚朴末二兩麩糊九梧子

大米飲下百丸日二服一加茯苓一兩半○濟生方

虛勞白濁 羊骨爲末酒服方寸七日三○千金

漏精白濁 益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中以酒一大

匙熬令香旋添酒一盞攪勻空心飲之每日服一服○聖惠方

白濁遺精 茯苓九治思慮太過心腎虛損真陽不固漸有遺瀝小便白濁夢寐頻泄兎絲子五

兩白茯苓三兩石蓮肉二兩爲末酒糊丸梧子大每服三五十九空心鹽湯下○和

方劑局

本草類方 赤白卷四

單

白濁遺精 石蓮肉龍骨益智仁等分爲末每服二錢空心米飲下○普濟用蓮肉白茯苓等分

爲末白湯調下

本草類方卷四

癰淋第五十三

小便不通 磨刀交股水一盞

小便不通 服之效。集簡方。蝨蚓糞朴硝等分水。和。

小便淋痛 真定瓷器煨研二兩。生熟地黃末各一兩。每用二錢。木通煎湯服。傳信適用方。

卒淋不通 好墨燒一兩。為末。每服一。字。溫水服之。普濟方。

小便不通 梁上塵二指撮。水。服之。外臺秘要。

小便不通 黑鉛到末一兩。生薑半兩。燈心一握。并水煎服。先以炒葱貼臍。聖惠方。

沙石淋痛 古文錢煮汁。服。普濟方。

本草類方

癰淋卷四

聖

小便氣淋 比輪錢三百。文水一斗。煮取三升。溫服。千金方。

小便淋疾 溫水和雲母粉服。三錢。千金方。

小便不通 熏黃末豆許。內孔。中良。崔氏方。

小便轉胞 自取瓜甲燒灰。水服。肘后方。

熱淋瀉痛 扁竹煎湯。頻。飲。生。生。編。

小便不通 滑石末一升。以車前汁和塗臍之。四。時。方。四寸。乾。即。易。之。冬。月。水。和。楊。氏。產。乳。

氣壅關格 不通。小便淋結。臍下妨。悶。兼。痛。滑石粉一兩。水調服。廣利方。

石淋破血 煮石滿一。手。為。末。以。水。三。升。酢。一。升。和。煮。二。升。澄。清。每。服。一。升。傳。信。適。用。方。

血淋砂淋 小便瀉痛。用黃爛浮石。為末。每服。二。錢。生。甘。草。煎。湯。調。服。直。指。方。

氣淋臍痛 鹽和醋服之

血淋心煩 石燕一錢 商陸赤小豆紅花等分 為末 每服一錢 葱白湯調下 聖惠方

小便不通 或鹽湯用或鹽彈丸大 一 枚 茯苓半斤 白木二兩 水煎服之 仲景金匱方

小便淋痛 石燕子七枚 搗黍米大新桑根白皮三兩 判拌勻分作七帖 每帖用水一盞煎八分

空心午前各一服 簡要濟衆

小便不通 白花散用芒硝三錢 茵香酒下 簡要濟衆方

小便不通 濕紙包白鹽燒過吹少許 入尿孔中立通 普濟方

男女轉脬 不得小便 寒水石二兩 滑石一兩 葵子一合 為末 木一斗 煮五升 時服一升 卽利 永類

本草類方

卷四 癰淋

小便不通 揀頭散治小兒小便不通 用延胡索川苦楝子等分 為末 每服半錢 或一錢 白湯滴油數點 調下 錢

仲陽小兒直訣

小便艱難 或轉胞腹滿 悶不急 療殺人 用秦艸一兩 水一盞 煎六七分 作二服 又方 加冬葵子等分 為末 服

一七 聖惠方

血淋熱痛 黃芩一兩 水煎 熱服 千金方

沙石淋痛 黃芩一兩 獨聖散 普濟方

五種淋疾 勞淋 血淋 熱淋 氣淋 石淋 及小便不通 至甚者 透格散 用硝石一兩 不夾泥土 雪白者 生研 為末 每服二錢 各依湯使勞淋勞

倦虛損 小便不出 小腹急痛 葵子末煎湯 下通後 便須服 補虛丸 散 小便不出 時下

血痰痛 滿急 熱淋 小便熱 赤色 臍下急痛

並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝水通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水乃服之○沈

血淋熱淋

白薇芍藥各一兩為末酒服方寸七日三服○千金方

小便關格

徐長卿湯治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶徐長卿炙半兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分瞿麥穗半兩海服五錢水煎入朴硝一錢溫服日二

服○聖惠方

小便五淋

赤芍藥一兩檳榔一箇麩裹煨為末每服一錢水一盞煎七分空心服○博濟方

本草類方

卷四 條淋

聖

小便卒淋

萎蕤一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞半入滑石二錢分三服○太平聖惠方

尿血沙淋

痛不可忍黃耆人參等分為末以大蘿蔔一箇切一指厚大四五片蜜二兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下○永類方

血淋苦痛

亂髮燒存性二錢入麝香少許米飲服○聖惠

小便不通

綿黃耆二錢水二盞煎一盞溫服小兒減半○總微論

小便熱淋

白茅根四升水一斗五升煮取五升適冷暖飲之日二服○肘後方

沙淋石淋

人參焙黃耆鹽水炙等分為末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸炙令乾再炙勿令焦以蜜盡為度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以摩為

度○三因方

癃閉不通

小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等分每溫水服三錢小便不通大黃減半大便不通荆芥減半名

男女淋疾

自取爪甲燒灰水服○肘后方
飲○杏林摘要

小便不通

身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青藥米四合煮粥食常服明目○壽觀養老書

老人淋病

卒不得出者紫苑為末并華水服三撮

婦人小便

即通小便血者服五撮立止○千金方

小便不利

有水氣枳椇瞿麥九土之瞿麥二錢半栝樓根二兩大雞子一個茯苓山苧各三兩為末蜜和丸嚮子大一服三九日三未知

益至七八九以小便利腹中溫為知也○張仲景金匱方

本草類方

卷四 癃淋

器

小便五淋

用苦杖為末每服二錢用飯飲下○集驗方

小便淋痛

服之如神○衛生寶鑑
服蔡花根洗剉水煎五七沸

石淋作痛

取三升服之須臾石下○肘後方
用龍葵根木通兩麥煎

通利小便

湯服之立効○圖經
用龍葵根木通兩麥煎

小便熱淋

服○聖惠方
用龍葵根木通兩麥煎

小便不通

車前草一斤水三升煎取一升半分三服一方人冬瓜汁一方人桑葉汁○百一方

小便石淋

宜破血瞿麥子搗為末酒服方寸匕
日三服三日當下石○外臺秘要

小便不通

竹雞草一兩車前草一兩搗汁
入蜜少許空心服之○集簡方

小便不通

臍下滿悶海金沙一兩臍南茶半兩搗碎
海服三錢生薑甘草煎湯下日二服亦可

末服。圖

熱淋急痛

海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調服二錢此陳總領方也一加清石。夷堅志

血淋痛澀

但利水道則清澀自分海金沙末新汲水或砂餽水服一錢。普濟方

膏淋如油

每服二錢麥冬煎湯服日二次。普濟方

小便氣淋

結澀不通白芷醋浸焙乾二兩為末煎木通甘草酒調下一錢連進二服。普濟方

通利水道

白飛霞白制天九用燈心十斤水粉漿藥晒乾研末入水澄去粉取淨者晒乾二兩五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石水飛

五兩豬苓二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸如龍眼大候砂為衣每用一丸任病換引大段小兒生理向上奉天一生水之妙諸病以水道通利為捷徑也。韓氏醫通

本草類方

卷四

小便卒淋

紫草一兩為末每食前用井華水服二錢。千金翼

五種淋疾

葶麻根兩莖打碎用水煎半盞頓服即通大妙。牛門方

沙石熱淋

馬蘭花七枚燒故箆頭二七枚燒粟米一合炒為末每服二錢酒下日二服名退神散

小便不通

勝腹急痛牛蒡葉汁生地黃汁二合和勻入蜜二合每服一合入水半盞煎三五沸調滑石末一錢

服。聖濟總錄

小便不通

馬蘭花炒茴香炒葶藶炒為末每酒服二錢。十便良方

血淋澀痛

芭蕉根旱蓮草各等分水煎服日。聖惠方

小便不通

葶麻仁三粒研細入紙撚內插入壺中即通。摘玄方

小便澀滯

不通乾筭葉一兩燒灰滑石半兩為末每米飲服三錢。普濟方

小便轉脬

甘遂末一錢豬苓湯調下立通。筆峰雜興方

小便不通

上瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部。肘后方

五淋瀉痛

赤藤卽做草鞋者白茯苓淋根等分為末百沸湯下每服一錢如神。究原方

小便虛閉

兩尺脉沉微用利小便藥不効者乃虛寒也附子一箇炮去皮臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水一盞半燈心七莖煎服卽愈。普濟方

小便不通

腹脹用瓜萸煨研每服二錢熱酒下頻服以通為度紹興劉駐云魏明州病此御醫用此方治之得効。聖惠方

沙石淋疾

重者取去根本用菘蕪二兩為末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾卽通也。聖惠方

本草類方

卷四

小便不通

胡荽二兩葵根一握水二升煎一升入滑石末一兩分三四服。聖濟總錄

小便淋瀝

或有白者以赤根櫻葱近根截一寸許安臍中以艾炙七壯。經驗方

小便不通

陳大麥稽煎濃汁類服。簡便方

小便五淋

船底苔一團雞子大水煮飲。陳藏器

小便沙淋

瓦松卽屋上無根草煎濃湯乘熱熏洗小腹約兩時卽通。經驗良方

老人五淋

身熱腹滿小麥一升通草二兩水三升煮一升飲之卽愈。奉親書

老人淋痛

青豆二升橋皮二兩煮豆粥下麻子汁一升空心漸食之併飲其汁甚驗。養老書

沙石熱淋

痛不可忍用王楙卽薏苡仁也子葉根皆可用水煎熱飲夏月冷飲以通為度。楊

吳

氏經
驗方

熱淋血淋

葱一莖搗酒熱調二錢服。修真秘旨

小便不利

膀胱水氣流滯浮萍日乾為末
飲服方寸七日二服。千金方

小便閉脹

熨小腹氣透即通也。許學士本事方

小便不通

脹急者用苦瓠子三十枚炒爛貼三箇焙
為末每冷水服一錢。並聖濟總錄方

氣淋脹痛

雞腸草三兩石葶去毛一兩每用
三錢水一盞煎服。聖濟總錄

五淋澀痛

用冬麻子即大麻今之火麻子是也半斤
研碎水瀝取汁入梗米二合煮稀粥下葱

板搗空心食
之。食醫心鏡

男婦轉脬

乾箬葉一兩燒灰滑石半兩為
末每米飲服三錢。普濟方

本草類方

癰淋
卷四

聖

小便不通

臍腹脹痛不可忍諸藥不効者不過再服
用續隨子去皮一兩銹丹半兩同少蜜搗

作團瓶盛埋陰處臘月至春末取出研蜜
丸梧子大每服二三十丸通湯下化破

尤妙病急亦可
旋合。聖濟錄

熱淋莖痛

烏麻子蔓青子各五合炒黃緋袋盛以井
華水三升浸之每食前服一錢。聖惠方

小便不通

萬苣菜搗傅臍上即
通。衛生易簡方

小便淋痛

石葶滑石等分為末每
飲服刀圭最驗。聖濟

小便轉脬

石葶去毛車前子各二錢半水
二盞煎一盞食前服。指迷方

小便不通

舊官子搗餅貼臍中
即通。海上仙方

小便不通

止喘紅林散用紅林黍根三兩扁蓄一兩
半燈心百葉每服各半兩流水煎服。張

小便熱淋 馬齒莧汁服之。聖惠方

五淋澀痛 青梁米四合入醬水煮粥下土蘇末三兩每日空心食之。養老書

急淋陰腫 泥葱半斤煨熟杵爛貼臍上。外臺

血淋作痛 桃膠炒木通石膏各一錢水一盞煎七分食後服。楊氏家藏方

血淋疼痛 茄葉熏乾為末每服二錢溫酒或鹽湯下隔年者尤佳。經驗良方

小便不通 烏白根皮煎湯飲之。肘後方

小便轉胞 以布包蒲黃裹腰腎令頭致地數次取通。肘后方

熱淋脹痛 麻皮一兩炙甘草三分水二盞煎一盞服日二取效。聖惠方

本草類方 卷四 癰淋

小便不通 葱白連葉搗爛入蜜合外腎上即通。永類錄方

卒不小便 杏仁二七枚去皮尖炒黃研末米飲服。古今錄驗方

熱淋澀痛 乾柿燈心等分水煎日飲。朱氏方

石淋作痛 桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和服日三服當下石石盡即止。古今

錄驗

諸淋赤痛 三葉酸漿草洗併取自然汁一合酒一合和勻空心溫服立通。沈存中靈苑方

卒患淋痛 大麥三兩煎湯入薑汁蜂蜜代茶飲。聖惠方

小便淋痛 水芹菜白根者去葉搗汁井水和服。聖惠方

沙石諸淋 次不可過焦細嚼鹽湯下且巨服益曠眩

膏○
普濟

小便石淋

葛根一升石當出根挽斷以盬于坎中承取汁

老人血淋

車前五合綿裹煮汁亦能明目引熱下行

小便卒淋

常飲之。范汪東陽方

小便熱淋

生藕汁生地黄汁葡萄酒各

小便淋瀝

三物木防已湯用木防已防風葵子各二

兩咬咀水五升煮二升半分三服。千金

小便氣淋

榆枝石燕子煎水

血淋作痛

檳榔一枚以麥門冬煎湯細磨

本草類方

卷四

小便淋痛

麩煨檳榔赤芍藥各半兩為末每服三錢

冷淋莖痛

檳榔末每服三錢水一盞葱白

熱淋澀痛

黃鵠取自然汁生藕搗取自然汁生地

石器溫服

淋癰瀉血

取乳香中夾舌香研細米

石淋痛楚

便中有石子者胡桃肉一升細米煮粥

五淋血淋

木龍湯用木龍即野葡萄藤也竹園萎淡

常歸各等分煎湯代

胞轉不通

非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房事或過

也沉香木香各二錢為末白湯空服之

沙石淋痛 胡椒朴硝等分為末每服用二錢

男婦熱淋 野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分

小便淋濁 由心腎氣虛神舍不守或夢遺白濁赤白

空心鹽湯嚼下一丸○三四方

小便不通 櫻皮毛燒存性以水酒煎二錢

小便不通 卽通利累試甚驗○攝生方

小便淋瀝 許搗脾臍及囊良久卽通○普濟方

九以赤茯苓湯下亦可蜜

本草類方 卷四 痿淋 五

小便熱短 樺皮濃煮汁

小便轉胞 眞琥珀一兩為末用水四升葱白十莖煮

皆効○

氣結淋病 不通用好綿四兩燒灰麝香半分每

小便膏淋 葎草搗生汁三升酌二合合和頓

血淋瀉痛 葱湯下○經驗良方

血淋不止 櫻櫚皮半燒半炒為末每服

五淋澀痛 榆白皮陰乾焙研每以二錢水

血淋疼痛 晚蠶蛾為末熱酒

小便淋閉

皂莢刺燒存性破故紙等分
為末無灰酒服○聖濟總錄

小便不通

葛洪方用大螻蛄二枚取小體以水一升
漬飲須臾即通○壽域方用土狗下截焙

研調服半錢生研亦可○談楚翁方加車
前草同搗汁服○唐氏經驗方用土狗後
截和麝搗納臍中縛定即通○醫方摘要
用土狗一箇炙研入冰片麝香少許翎管
吹入

葦內

小便不通

全蛇蛻一條燒存
性研溫酒服之

小便五淋

錢每日二服如淋中有軟硬物即加朽木
末五分○

勝金方

石淋諸淋

看首魚頭石十四個當歸等分為末水
二升煮一升頓服立愈○外臺秘要方

本草類方

卷四 癃淋

婦人胞轉

小便不通用桑螵蛸炙為末
飲服方寸匕日用二○產書

小便不通

散飲服半錢匕日三○金匱要略

小便轉胞

不出納衣魚一枚
於莖中○千金方

男婦血淋

用真百藥魚車前子炒黃連各三錢半水
香二錢滑石一錢為末空心燈草湯服二
錢日二服

○普濟方

小便不通

腹脹如鼓用田螺二枚搗半匕生搗傅臍
下一寸三分即通焦彥誠曾得此疾異人
授此方果

愈○類編

沙石淋痛

用九助龍甲醋炙研末酒服方
寸七日三服石出瘰○肘后方

石淋作痛

購珍發明頌曰今方家治石淋導水用麋
蛄七枚搗三兩新瓦上鋪蓋焙乾研末每

温酒服一錢

一七自愈也

小便不通

蝸牛搗貼臍下以手摩之

小便不通

加麝香少許更妙。簡易。白海肥一對生一個燒一個為末

小便不通

以水四升洗甕帶取汁煮葵子二升半分三服。聖惠方

石淋破血

牛角燒灰酒服方寸。七日五服。總錄

小便淋瀝

服血藥不効者用牡蠣粉黃蘗炒等分為末每服一錢小茴香湯下之取効。醫學

成集

小便轉胞

不通用瓦蛻螂二枚燒末。井華水一盞調服。千金

熱淋如血

蠶種燒灰入麝香少許水服。二錢極効方也。衛生家寶

本草類方

瘡淋。卷四

石淋痛澀

髮髮燒存性研末每服用。錢井水服之。肘后方

小便不通

蚯蚓搗爛浸水濾取濃汁半碗服立通。斗門

小便不通

桑螵蛸炙黃。二枚黃。芥二兩水煎分二服

小便不利

蒲席灰七分滑石二分為散飲。服方寸七日。金匱要略

小便淋痛

多年木梳燒存性空心冷水。服男用女用男。救急方

卒患淋疾

牛耳中毛燒取半錢水。服尾毛亦可。集驗方

沙石淋瀝

勻温酒服一錢以利為度。十便良方。白雞屎白炒一兩研

老人尿閉

自頭蚯蚓香等分梓汁。飲之即愈。朱氏集驗方

小便膏淋

羊骨燒研榆白皮煎。湯服二錢。聖惠方

小便不通

雞子殼海蛤滑石等分爲末每服半錢米飲下日三服。聖惠方

小便淋瀝

痛不可忍雞脆內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈。醫林集要

關格閉塞

豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和煎分服。千金

小便不通

豬脂一升水二升煎三沸飲之立通。千金方

小便不通

一枚燒灰水服。外臺

胞轉淋瀝

阿膠三兩水二升煮七合溫服。千金方

小便不通

豬膽一枚熱酒和服。又用豬膽汁籠住陰頭一二時汁入自通

小便不通

服急者象牙生煎服之。救急

通小便

用燕屎豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三九日三服。千金方

本草類方

卷四

三

下石淋

用燕屎末以冷水服五錢日服至食時常尿石水下

石淋疼痛

雞矢白日中午乾炒香爲末以酸漿飲服方寸匕日二當下石出。古今錄驗

直指秋石丸

治濁氣下清精散而成管淋黃白赤點如肥膏蜜油之狀用秋石鹿角膠炒桑螵蛸

炙各半兩白茯苓一兩爲末糕糊丸梧子大每服五十丸人參湯下。仁齋直指方

小便不通

聖惠方用麻根蛤粉半兩爲末每服二錢空心新汲水下。摘玄方用苧根洗研攤

絹上貼小腹連陰際須臾即通

本草類方卷四

溲數精尿第五十四

小便不禁

赤石脂煨牡蠣煨各三兩鹽一兩為末糊九梧子大每鹽湯下十五丸○普濟方

小便不禁

麝塊雌黃一兩半研乾薑半兩鹽四錢同炒薑色黃為末水和蒸餅丸菘豆大每服

十九至二十九空心鹽湯下之○經驗方

男婦遺尿

白礬牡蠣粉等分為末每服方寸七溫酒下日三服○余居士選奇方

小便過多

象牙燒灰飲服之○總錄

婦人遺尿

不拘胎前產後白薇芍藥各一兩為末酒服方寸七日三服○千金方

小便頻數

脾氣不足也雷州益智子鹽炒去塩天台烏藥等分為末酒煮山藥粉為糊丸如梧

本草類方

溲數精尿

書

小便無度

腎氣虛寒破故紙十兩酒蒸茴香十兩塩炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下

或以米糝猪腎煨食之○普濟方

小便淋瀝

生續斷搗絞汁服即馬薊根也○初虞氏古今錄驗

少小便床

蓄薇根五錢煎酒夜飲○外臺秘要

尿白如注

小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飲下○經驗方

小便失禁

蓄薇根煮汁飲或為末酒服野生白花者更良○聖惠方

溲數白濁

熟附子為末每服二錢薑三片水一盞煎六分溫服○普濟方

婦人遺尿

乾故茹為末酒服三錢○千金方

老人遺尿

不知出者草烏頭一兩童便浸十日去皮同鹽炒為末酒糊丸紫豆大每服二十丸

鹽湯下

小便頻數

川草薺一斤為末酒糊丸梧子大每鹽酒下七十九○集玄方

小便淋瀝

免絲子煮汁飲○范汪方

小便滑數

金剛骨為末每服三錢溫酒下睡時○儒門事親方

小便頻數

小豆葉一斤入豉汁中煮和作羹食之○心鏡

止小便利

雞腸草一斤於豆豉汁中煮和米作羹及粥食之○食醫心鏡

小便數多

山藥以酒水煮過自茯苓等分為末每水飲服二錢○儒門事親

小便頻數

茴香不拘多少淘淨入鹽少許炒研為末炙糯米糕蘸食之

本草類方

卷四 聖惠方

小便頻數

胡桃煨熟時嚼之溫酒下

小便淋瀝

或存或無用大蒜一箇紙包煨熟露一夜空心新水送下○朱氏集驗方

夢遺溺白

藏器曰韭子每日空心吞二十粒鹽湯下○聖惠治虛勞傷腎夢中洩精用韭

子二兩微炒為末食前溫酒服二錢

遺尿且澀

桑耳為末每酒下方寸匕日三服○聖濟總錄

小便頻數

白果十四枚七生七煨食之取効止

膏痺尿多

其人飲少用秦椒二分出汗紙幣二分為末水服方寸匕日三服○傷寒類要

小便不禁

酸石榴燒存性無則用枝燒灰代之每服二錢用柏白皮切焙四錢煎湯一盞入糯米再煎至八分空心溫

服晚再服○聖惠方

小便遺尿

麻鞋尖頭二七枚燒灰歲朝非華水服之。近効方

小便不禁

茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新汲水援洗去筋挫乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下。三

小便頻多

白茯苓去皮乾山藥去皮以白礬水淪過焙等分爲末每米飲服二錢。儒門事親

睡中尿牀

麻鞋綱帶及鼻根等惟不用底七童以水七升煮二升分再服。外臺秘要

老少尿牀

白紙一張鋪席下待遺於上取紙晒燒酒服。集簡方

遺尿淋瀝

白龍骨桑螵蛸等分爲末每鹽湯服二錢。梅師方

本草類方

卷四 渡數精尿

葉

小便澀痛

不通用蠶蛇紙燒存性入麝香少許米飲每服二錢。王氏博濟方

夜臥尿牀

本人薦草燒灰水服立差。千金方

小便數多

若蠟五兩燒灰小便三升煮二升分三服神効。乾坤生意

婦人遺尿

桑螵蛸酒炒爲末鹽湯服二錢。千金翼

小便頻數

鹿角霜白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服三十丸鹽湯下。梁氏總要

小便不禁

上熱下寒者鹿角霜爲末酒糊和丸梧子大每服三四丸空心溫酒下。普濟

小便頻數

下焦虛冷也羊肉和鹽鼓食不過三具。集驗方

小便頻數

鹿茸一對酥炙爲末每服二錢溫酒下。日三服。鄭氏家傳方

婦人遺尿

雄雞翎燒灰酒服方寸匕。千金翼

小便遺失

用雞臍脰一具並腸燒存性酒服男用雌女用雄○集驗

下虛尿牀

羊肚盛水煮熟空腹食四五頓○千金

小便不禁

雄雞翎燒研酒服方寸匕○外臺秘要

夢中遺溺

用豬脬洗炙食之○千金

小便不禁

雄雞喉嚨及臍脰并尿白等分爲末麥粥清服之○衛生易簡方

小便頻遺

心鏡用雄雞腸一具作臍和酒服○普濟用雄雞腸水煮汁服日三次

壯年遺溺

時珍主治治遺尿及與白濁遺方同方用半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃出火毒去猪苓入蝦過牡蠣一兩

以山藥糊丸梧子大每服三十丸茯苓湯送下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者宜用此方蓋半夏有利性猪苓導

本草類方

卷四 變數精尿

水使腎氣通也與下元虛憊者不同○許學士本事方

小便不禁

重鵲巢中草一個燒灰每服二錢匕以薑微根皮煎湯服之日二○聖惠

小便卒數

非林令人瘦石膏半斤搗碎水一斗煮五升服五合○肘後方

本草類方卷之四

小便血第五十五

大小便血 好墨細末二錢阿膠化湯調服熱

小便尿血 多者尤相宜。寇氏本草衍義 每服四錢水煎服。活人書

小便出血 茅根煎湯頻飲為佳。談埜翁方

尿血不定 鬱金末一兩葱白一握水一盞煎至三合溫服日三服。經驗方

卒然尿血 不止龍膽一虎口水五升煮取二升半分為五服。姚僧坦集驗方

小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三五呷後煎地榆湯至盡未效再服。指

方迷

本草類方 小便血 卷四 美

小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓等分水煎服。十便良方

小便尿血 荆芥縮砂等分為末糯米飲下三錢日三服。集簡

小便出血 當歸四兩到酒三升煮取一升頓服。肘後方

勞傷溺血 茅根乾薑等分入蜜一匙水二鍾煎一鍾日一服

小便出血 白芷當歸等分為末米飲每服二錢。經驗方

小便尿血 益母草搗汁服一升立瘥此蘇澄方也。外臺秘要

陰虛尿血 人參焙黃耆鹽水炙等分為末用紅皮大蘿藦一枚切作四片以蜜二兩將蘿藦逐片蘸炙令乾再炙勿令焦以蜜盡為度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以麈為

度。三 因方

下焦結熱

小便淋瀝或有血出或大小便出血瞿麥穗一兩甘草炙七錢五分山梔子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭七箇燈心五十莖生姜五片水二盃煎至七分時時溫服名立效散

小便溺血

金陵草一名鬚頭草車前草各等分杵取自然汁每空心服三盃愈乃止○醫學正傳

小便尿血

車前草五合空

小便尿血

車前草一合和服○聖惠方

小便血淋

車前子一錢

本草

小便血淋

小便血淋

生地黄汁車前葉汁各

小便溺血

金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分為末每服三錢米泔空心調服亦治

男婦血淋

亦治五淋多年煮酒瓶頭簪葉三五年至十年者尤佳每用七箇燒存性入麝香少許陳米飲下日三服有人患此二服愈

小便血淋

酸草搗汁煎五苓散服之俗名

小便尿血

麩炒炒香以肥豬肉煎食之○集玄

小便尿血 胡麻三升梓末以東流水二升浸一宿平旦絞汁頓熱服。千金方

小便尿血 萬莖菜搗傅臍上即通甚効。楊氏方

小便血淋 牽牛子二兩半生半炒為末每服二錢薑湯下良久熱茶服之。經驗良方

小便血條 淡豆豉一撮煎湯空服飲或入酒服。危氏得効方

血淋疼痛 桑黃剝白皮各二錢水煎服日一次。聖惠方

小便溺血 葱白一握鬱金一兩水一升煎二合溫服一日三次。普濟方

小便出血 水芹搗汁日服六七合。聖惠方

小便尿血 五葉藤陰乾為末每服二錢白湯下。衛生易簡方

小便血淋 大豆葉一把水四升煮二升頓服。聖惠方

本草類方 小便血 卷四 李

小便出血 蒲葦末每服半錢生地黄汁調下量人加減或加大髮灰等分。聖濟總錄

血淋尿血 苦蕒菜一把酒水各半煎服。資生經

小便尿血 烏梅燒存性研末醋糊丸梧子大每服四十丸酒下

小便血淋 葉氏用乾柳三枚燒存性研末陳米飲服。經驗方用白神烏豆藍花煎湯入墨汁

之服

小便出血 新地骨皮洗淨搗自然汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許食前溫服。簡便方

尿血淋瀝 蓬草鴉生汁三升酢二合和合頓服當尿下白汁。葦宙獨行方

小便尿血 柏葉黃連焙研酒服三錢。濟遠方

小便尿血 離下竹根入土多年者不拘多少洗淨煎湯併服數盞立止。○急救良方

小便尿血 荊葉汁酒服二合。○千金方

小便尿血 槐花炒鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豉湯下立效。○篋中祕密方

小便尿血 棘刺三升水五升煮二升分三服。○外臺祕要

小便尿血 琥珀為末每服二錢燈心湯下。○直指方

小便尿血 五倍子末煴荷鵝和九梧子大每空心酒服五十九。○集簡方

小便尿血 髮灰二錢醋湯服。○承類方

婦人尿血 衣中白魚一十枚納入陰中。○子母祕錄

男婦湯血 龍骨末水服方寸匕。○千金方

本草類方 小便血 卷四

虛損尿血 白膠三兩炙水二升煮一升四分服。○外臺

小便尿血 人指甲半錢頭髮一錢半燒研末每服一錢空心溫酒下。○聖濟錄

小便血淋 血風草井水搗服三度即愈。○劉長春經驗方

小便血淋 蓮房燒存性為末入麝香少許每服二錢半米飲調下日二。○經驗方

小便血淋 蠅蝦研水服。○鮑氏

小便血淋 海螵蛸末一錢生地黃汁調服。○又方海螵蛸生地黃赤茯苓等分為末每服一錢柏葉煎湯下。○經驗方

小便血淋 芎根煎湯服大炒亦治諸淋。○聖惠方

小便血淋 作痛車前子晒乾為末每服二錢車前煎湯下。○普濟方

小便血淋 錢車煎湯下。○普濟方

大小便血

黃連散治腸風大小便血淋瀝痔漏用鹽
黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒
等分為末入麝香少許每服二錢
用米飲送下日三服甚效○聖惠

本草類方

小便血

奎

大小便血

黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒

本草類方卷四

陰痿第五十六

陰痿陰汗

陽起石煨為末每服二錢鹽湯下。○普濟方

陽事不起

慈石五斤研清酒漬二七日每服三合日三夜一。○千金

陽事不起

新五味子一斤為末酒服方寸七日三服忌猪魚蒜醋薑一劑即得力百日以上可御十女四時勿絕藥

功能知。○千金方

陽事不起

覆盆子酒浸焙研為末每具酒服三錢。○集簡方

補腎興陽

用緞米一斤蛤蚧二枚茴香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻乘熱收新餅中密封每服

一匙空心鹽酒嚼下甚妙

本草類方

陰痿

奎

大人陰痿

鯽魚膽雄鷄肝各一枚為末雀卵和凡小豆大每吞一九。○千金方

丈夫陰痿

未連蠶蛾二升去頭翅足炒為末蜜丸梧子大每夜服一九可御十女以菖蒲酒止

之。○千金方

陽事痿弱

紫稍花生龍骨各二錢麝香少許為末蜜丸梧子大每服二十九燒酒下欲解飲生

黃甘草湯

陰寒痿弱

蜂房灰夜傳陰上即熱起。○千金方

陰痿不興

蜂窠燒研新汲井水服二錢可御十女。○胸噤神書

陽事不起

泥鰱煮食之。○集簡方

壯陽益腎

用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙。○心鏡

陰痿不起

用雄雞肝三具兔絲子一升為末雀卵和

男子陰冷

以食茱萸納牛膽中百日令乾每取

鹿茸酒

治陽事虛痿小便頻數面色無光用嫩鹿

茸一兩去毛切片山藥末一兩絹袋裹置

腎虛陰痿

酒壘中七日開瓶日飲三盞

方驗

將茸焙作末服○普濟方
羸瘦精衰少力用獐豬腎一對切片枸杞
葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食○經

本草類方

陰痿
卷四

畜

此處為古籍殘頁，文字模糊，可見部分字樣如“鹿茸”、“酒壘”、“普濟方”等。

本草類方卷四

強中第五十七

強中消渴

猪腎齊荒湯治強中之病莖長興盛不交
精液自出消渴之後卽發癰疽皆由恣意

色慾或餌金石所致宜此以制腎中熱也
用猪腎一具齊荒石脂各三兩人參茯苓

磁石知母葛根黃芩栝樓根甘草各二兩
黑大豆一升水一斗半先煮猪腎大豆取

汁一斗去滓下藥再煮三升分三服後人
名爲石子齊荒湯○又齊荒丸用齊荒大

豆茯神磁石栝樓根熟地黃地骨皮玄參
石斛鹿茸各一兩人參沉香各半兩爲末

以猪肚治淨煮爛杵和丸梧子大每
服七十九空心溫湯下○並千金方

玉莖強中玉莖強硬不痿精流不住時時如針刺捏
之則痛其病名強中乃腎滯漏疾也用韭

本草類方

強中
卷四

子破故紙各一兩爲末每服三錢
水一盞煎服日三卽住○經驗方

本草類方卷四

囊癬第五十八

陰囊濕瘡 腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩米粉一合為末傅之。千金

陰下濕瘡 槐白皮炒煎水日洗。生生方

陰汗作癢 大蒜淡豉搗丸梧子大礫砂為衣每空腹燈心湯下三十九

陰囊濕癢 松毛煎湯頻洗。簡便方

囊瘡痛癢 紅椒七粒葱頭七箇煮水洗之一人途中苦此湘山寺僧授此方數日愈各驅風散

○經
驗方

腎風囊癢 川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊而卧其効。直指方

本草類方 囊癬 卷四

玉莖濕癢 肥皂一筒燒存性香油調搽即愈。攝生方

陰囊濕癢 欲實者用板兒松香為末紙卷作筒每根入椒三粒浸燈盞內三宿取出點燒淋下油搽之先以米

甜洗過。簡便方

陰囊濕瘡 出水不癢用五倍子曬茶各五錢賦粉少許研末先以葱椒湯洗過香油調搽以癢

為度。太平聖惠方

陰囊濕癢 烏賊骨蒲黃撲之。醫宗三法

陰頭生瘡 人不能治者鼈甲一枚燒研雞子白和傅。千金翼

陰癢生瘡 紫葍花一兩胡椒半兩煎湯濕洗數次即愈。總微論

陰囊汗癢 龍骨牡蠣粉撲之。醫宗三法

陰下濕癢

吳茱萸煎湯頭洗取効。外臺秘要

腎風囊癢

用猪尿施火炙以鹽酒吃之。救急

陰囊濕癢

楚炭紫蘇葉末撲之。經驗方

陰頭生瘡

蜜炙甘草末頻塗之。神效。千金方

陰囊生瘡

用蠟面茶為末先以甘草湯洗後貼之妙。經驗方

陰頭生瘡

用溪邊年久螺螄燒灰傅之。奇效

陰頭生瘡

以蜜煎甘草塗之。療。外臺

男子陰腫

鐵精粉傅之。子母秘錄

男子陰腫

服痛蛇床子末雞子黃調傅之。本草類方

本草類方

囊癢 卷四

陰莖生瘡

痛爛者以葶一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾即易之。禁熱食酒蒜芥菜。藥性

論

丈夫陰瘡

莖及頭潰爛痛不可忍久不瘳者以五月五日繁纒燒焦五分入新出蚯蚓尿二分

入少水和研作餅貼之乾即易禁酒 麩五辛及熱食等物甚效。扁鵲方

玉莖瘡潰

絲瓜連子搗汁和五倍子末頻搽之。丹溪方

男子陰瘡

有二種一者陰缺作白膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃蘗黃芩等分煎湯洗之仍以

黃蘗黃連作末傅之又法黃蘗煎湯洗之塗以白蜜。肘後方

玉莖作腫

乳香葱等分搗傳。山居四要

玉莖下疳

雞卵殼炒研油調傅之。杏林摘要

玉莖生瘡

臭腐用猪胞一枚連尿去一半留一半以
煨紅新磚焙乾爲末入黃丹一錢擦之。三

玉莖生瘡

牛蹄甲燒灰油
調傅之。奚囊

五次產先須以葱
椒湯洗。奇效方

本草類方

囊瘡
卷四

矣

本草類方卷四

大便第五十九

大小便閉

張問欲死二三日則殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服。聖惠方

大便壅結

膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每服五丸臨卧溫水下。又方膩粉二錢黃丹

一錢為末每米飲服一錢。普濟方

關格不通

大小便閉脹欲死兩三日則殺人芒硝三兩泡湯一升服取吐即通。百一方

二便不通

鹽和苦酒傳臍中乾即易仍以鹽汁灌臍內并內引氣太鹽水中飲之。家藏方

二便不通

迎勝平者以紙圍環之。經方

本草類方

大便卷四

堯

消風順氣

老人大腸秘瀆防風枳實麩炒一兩甘草半兩為末每食前白湯服二錢。簡便方

大便閉塞

服藥不通者滄鹽三錢屋簷草節七箇為末每用一錢竹筒吹入肛，一寸即通。聖濟方

大便不通

十日至一月者肘後方冬葵子三升水四升煮取一升服不瘥更服。聖惠用葵子末人乳汁等分和服立通

老人冷秘

風秘或泄瀉煖元臟除積冷溫脾胃進飲食治心腹一切瘧冷入硫黃柳木槌研細半煎湯泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百丁九梧子大每服十五丸至二十九丸空心溫酒或薑湯

下婦人醋湯下。和劑方

汗多便閉

老人虛八皆可用肉蓯蓉酒浸焙二兩研洗香末一兩為末麻子仁汁打糊丸梧子

大每服七八丸白湯下。濟生方

老人闕塞

綿黃耆陳皮土白各半兩。末每服三錢用大麻子一合。研爛以水煎服。煎至乳起入白蜜一匙。兩服。冷不熱常服。無秘塞之患。其效如神。

和劑局方

大便不通

當歸白芷等分。為末。每服二錢。米湯下。聖濟總錄

大便不通

枳實皂莢等分。為末。飯丸。米飲下。危氏得效方

大便不通

皂莢一錢。巴霜二箇。同研入雞子內攪勻。封頭濕紙裹。煨熟食之。酒下。即通。集玄方

下部閉塞

葫蘆根一把。搗汁。水和絞去滓。強人每服一升。外臺秘要

本草類方

大便

香白芷炒。為末。每服二錢。米飲入。蜜少許。連進三服。十便良方

大便風秘

蒺藜子炒。一兩。猪牙皂莢。去皮。酥炙。五錢。為末。每服一錢。鹽茶湯下。普濟方

二便不通

諸藥不效。紫花扁竹根。生水邊。者。佳。研汁。一盞。服。即通。普濟方

老人虛秘

冷秘及按瘕。冷氣。半碗。丸。半。夏。丸。炒。生。硫。黃。等。分。為。末。白。煎。薑。汁。煮。糊。丸。如。梧。子。大。每。空。心。溫。酒。下。五。丸。和。劑。局。方

二便不通

生草烏頭。為末。以葱頭蘸藥。納穀道。中。名。提。益。散。王。海。藏。陰。證。略。例

大腸冷秘

附子一。枚。炮。去。皮。取。中。心。如。棗。大。為。末。二。錢。空。水。心。服。之。聖。濟。總。錄

麻子仁丸

麻子。斤。厚。朴。一。尺。大。黃。枳。實。各。一。斤。杏。仁。一。升。熬。研。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。以。漿。水。下。十。五。日。三。服。不。知。再。加。張。仲。景。方

大便不通

生薑制長二寸塗搗
內下部立通。外臺

大小使閉

芍藥七壯。外臺秘要
仍炙七壯。外臺秘要

大腸虛閉

勻氣散用連鬚葱一根薑一塊益一捻淡
鼓三七粒搗作餅烘臍中紫定良久氣
通即通不通再作

楊氏直指方

乾糞塞腸

脹痛不通用毛桃花濕者一兩和麪三兩
作餅餉煮熟空心食之日午腹鳴如雷常
下惡物也

○聖惠方

二便不通

土馬騾水淘淨瓦煨過切每
服二錢水一盞煎服。普濟

二便不通

桃葉梓汁半升服冬
用桃皮。孫真人方

大便卒結

羊蹄根一兩水一大盞
煎六分溫服。聖惠方

本草類方

大便

三

利大小便

萹實為末半兩分二
服新汲水下。聖惠

大便不通

簡要方用牽牛子半生半熟為末每服二
錢薑湯下未通再以茶服。一方加大黃
等分。一方加

生檳榔等分

二便不通

酸草一大把車前草一握搗汁入沙糖
錢調服一盞不通再服。摘玄方

風祕氣祕

雜芎藭炒一合蒲水和皂莢
木二錢服立通。壽域神方

大便艱難

桃花為木水服方
寸匕即通。千金

大腸風秘

結瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮
尖炒炒半兩為末熟蜜丸梧子大每湯服
三十九。

寇氏衍義

大便不通

用冬麻子半斤研碎水瀝取汁入梗米三
合煮稀粥下葱椒鹽豉空心食。肘後考

大便不通

白膠香半棗人屎糞二枚同勻水和作挺納入肛門良久自通。○普濟方

大腸虛秘

風人虛人脚氣人大腸或秘或利用皂莢子一千二百箇洗淨以少酥熬香為末蜜

九杷子六每空心以淡漿子酸棗仁湯下

大便虛秘

松子仁杷子仁麻子仁等分研泥溶白蠟和丸梧子大每服五十九黃芪湯下。○寇

英宗

大便不快

裏急後重用桃仁三兩去皮吳茱萸二兩食鹽一兩同炒熟去鹽茱萸每嚼桃仁五七

粒。○總錄

大腸虛閉

因汗多津液耗潤者沉香一兩肉蓯蓉酒浸焙二兩各剉末以麻仁研汁作糊丸梧

子大每服一百丸蜜湯下。○嚴子禮濟生方

本草類方

大便

畫

大便不通

氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸棗大納入下部少時即通。○食療本草

大便燥塞

太棗一枚去核入輕粉半錢縛定煨熟食之仍以棗湯送下。○直指

大小便秘

雞鼠屎末傅臍中立效。○普濟

老人虛秘

杷子仁松子仁大麻仁等分同研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十

丸日二服。○寇宗奭

大便不通

瓜蒂七枚研末縛裏塞入下部即通。○必效方

大腸悶塞

陳皮蓮白酒煮焙研末每溫酒服二錢米飲下。○普濟

大腸乾結

厚朴生研豬臍煮鴨和九梧子大每薑水下三十丸。○十便良方

二便關格

金方用皂莢燒研粥飲下三錢立通。○明方鐵脚丸用皂莢炙去皮子為末酒

二便關格

麩糊九每服五十九酒下。聖惠方用皂莢燒爛於桶內坐上熏之即通。二三日則殺人。烏曰東南銀白皮乾為末熟水服二錢先以辛硝二兩煎湯服取吐甚效。

二便不通

巴豆連油黃連各半兩搗作餅子先滴葱椒汁在臍內安餅于上灸二七壯取利為度。楊氏家藏

大便不通

烏曰木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通。不用多喫其功神聖兼能取水。斗方門

大腸秘塞

噤喉炒去翅足為末熟酒服一錢。聖惠

二便不通

蜂房燒末酒服二三錢日二服不拘大人小兒。子母秘錄

本草類方

大便

畫

大小便閉

經月欲死者木事推車散用推車客七箇男用頭女用身上狗七箇男用身女用頭新瓦焙研末用虎目樹南向皮煎汁調服只一服即通。楊氏經驗方治大小便不通六七月尋牛糞中大蜈螂十餘枚線穿陰乾收之臨時取一箇令者放淨罇上四面以灰火烘乾當腰切斷如大便不通用上微小便不通用下截各為細末取升華水服之二便不通全用即解

大便秘塞

羊膽汁灌入即通。千金

大便不通

張仲景傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者津液內竭也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎之候凝如飴狀至可九乘熱捻作挺令頭銳大如指長一寸半許候冷即硬納便道中少頃即通也。冷法加皂莢細辛庶末少許尤速

大小便閉

亂髮灰三指撮振
半升水服○姚氏

大小便閉

經月欲死普濟方用上狗推車客各七枚
並男用頭女用身瓦焙焦為末以向兩樗
皮煎汁飲

二便關格

不通關脹二三日則殺人以其齒三枚甘
遂三銖為末槩水和服須臾即通也○肘

方后

大小便閉

統帶煮汁和蒲灰末方寸
七服目三次○千金方

老人虛秘

水煎化入蜜二匙溫服
阿膠炒二錢葱白三根

婦人臟燥

大棗十枚小麥一升甘草二兩每服一兩
水煎服之

亦補脾胃氣

本草類方

大便

志

二便不通

甘遂末以生麩糊調傅臍中及丹田內仍
艾三壯飲甘草湯以通為度又太山赤皮

甘遂末一兩蠟蜜和勻分作
四服日一服取利○聖惠方

二便關格

腸閉欲死二三日則殺人蜀葵花一兩搗
爛齏香半錢水一大盞煎服根亦可

二便關格

腸閉欲絕蔓菁子油一合空腹服
之即通後汗出勿怪○聖惠方

大小便閉

關格不通脹滿二三日則殺人胡椒二十
一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝半

兩煎化服

大小便閉

積蠲為末蜜湯調服二錢或以童子
小便葱白同煎服之亦良○普濟方

大小便閉

鼓脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩為
末生葱白三七根同煎湯調五苓散末

服之日一
服○普濟

大小便秘

明月砂一匙安臍中冷水
滴之令透自通也○聖惠

本草類方

大便
卷四

毒

本草類方卷四

脫肛第六十

脫肛氣熱

孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

兩方

大腸脫肛

鳥龍尾卽梁上塵同鼠屎燒爛于桶內坐上薰之數次卽不脫也。濟急

脫肛歷年

不入者生鐵二斤水一斗煮汁五升洗之日再。集驗方

下痢脫肛

鐵精粉傅之

風熱脫肛

鐵精研同白欬末傅上按入。直指方

虛冷脫肛

石灰燒熱故帛裹坐冷卽易之。聖惠方

本草類方

脫肛

美

大腸脫肛

直指方慈石半兩火煨醋淬七次爲末每空心米飲服一錢。鶴便方用慈石末麩糊調塗臍上。

入後洗去。

大腸脫肛

苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木賊末傅之。醫方摘要

痢痔脫肛

之良。經驗良方

脫肛不收

葶根搗爛煎湯薰洗之。聖惠方

老小脫肛

香附子荆芥穗等分爲末每服一匙水一大盞煎十數沸淋洗。三因方

大腸脫肛

蛇牀子甘草各一兩爲末每服一錢白湯下日三服并以蛇牀末傅之。經驗方

大腸脫肛

本賦燒存性爲末擦之按人卽止。加龍骨。三因方

脫肛不收

黃荖子炒研傅之。聖惠方

下血脫肛 白雞冠花防風等分爲末糊瓦楞子大空
心米飲每服七十九一方白雞冠花炒饅

欄灰羌活一兩爲末每服
二錢米飲下。承類鈴方

大腸脫肛 曼陀羅子連殼一對檫斗十六箇同剉水
煎三五沸入朴硝少許洗之。儒門事親

久痢脫肛 女萎切一升燒薰
楊氏產乳方

大腸脫肛 生栝樓馬汁溫服之以猪肉汁洗
手按之冷暖自入。葛洪肘后方

肛門脫出 用菱切一升燒煙薰
之即入。子母秘錄

陽證脫肛 以荆芥生薑煎湯洗之用龍鱗如錢樣
者去土一兩杜精二錢爲末油調傅之。

全効
心鑑

脫肛 凡大人小兒脫肛每天冷及喫冷食即暴
痢不止肛則下膿久療不瘥者春間收紫

本草類方

脫肛
卷四

七

薰花二斤曝乾爲散加磁毛末七兩相和
研細塗肛上納入即使人喫冷水手面上
使吸入腸中每日一塗藥喫而不過六七
次即瘥矣又以熱酒半升和散一方寸匕
空腹服之且再服漸加至二方寸匕以瘥
爲度若五歲以下小兒即以李杏子許以
酒服之忌生冷陳余
米等物。天寶單方

肛門腫痛 馬齒莧葉三葉酸草等分煎湯
熏洗一日二次有効。類湖方

痔漏脫肛 絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢爲末以
豬膽雞子清及香油和調貼之收上乃止

孫氏
集効方

脫肛瀉血 下止用桑黃一兩熟附子一兩爲末
蜜丸梧子大每米飲下二十九。聖惠

久痢脫肛 白龍骨粉敷之
和衆方

大腸脫下

木饅頭連皮子切炒茯苓等分爲末
每服二錢米飲下亦治夢遺名鎮陽丹○
普濟方

大腸脫肛

水聖散用紫浮萍爲末
乾貼之○危氏得効方

脫肛不收

蒲黃和豬脂傅日三
五度○子母秘錄

大腸脫肛

生萊菔搗實臍中束之
覺有瘡卽除○摘玄方

脫肛不收

茜根石榴皮各一握酒一
盞煎七分溫服○聖惠方

瀉血脫肛

石耳五兩炒白梧子一兩密陀僧半兩爲
末蒸餅丸梧子大每米飲下二十九○普
濟方

脫肛不收

貼水荷葉焙研酒服二錢仍以
荷葉盛末坐之○經驗良方

本草類方

卷四 脫肛

夫

腸頭挺出

秋冬搗胡荽子醋煮熨之
甚効○孟詵食療本草

下痢脫肛

像斗子燒存性研末
豬脂和傅○直指方

下痢脫肛

像斗殼燒存性研末豬脂和
搽并煎汁洗之○直指方

痔漏脫肛

每日空心嚼用椒一錢涼水
送下三五次卽收○急救方

大腸脫肛

炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底繫頭各
一枚燒研傅之按入卽不出也○千金方

大腸脫肛

自收上收後以湯盪其腰肚上下令皂莢
氣行則不再作仍以皂莢去皮酥炙爲

末棗肉和丸米飲下三十九○聖惠方

大腸脫肛

黃皮桑樹葉三升水煎過帶
溫卷納之○仁齋直指方

脫肛不收

五花構葉陰乾爲末每服二錢
米飲調下兼塗腸下○聖惠方

大腸脫肛 槐莢槐花各等分炒爲末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下猪腰子去皮蘸炙亦可

○百一
選方

積痢脫肛 枳實石上磨千蜜炙黃更互熨之縮乃止○千金方

大腸脫肛 椹皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傅之○救急方

痢頻脫肛 黑色堅硬用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許沉軟用真麻油點火滴于上以枯礬龍骨少許爲末搽肛頭上

以芭蕉葉托入○危氏得効方

大腸脫肛 脫下三五寸者用大田螺二三枚將井水養三四日去泥用雞爪黃連研細末入掃

內待化成水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之以軟帛托上自然不再復發也○德

生堂經
驗方

本草類方 脫肛 卷四 堯

脫肛不收 三因方用五倍子末三錢入白礬一塊水一碗煎湯洗之立効○簡便用五倍子半

斤水煮極爛盛坐桶上薰之待溫以手輕托上內服參芪升麻藥○普濟方用五倍

子百草霜等分爲末醋熬成膏賜翎掃傅上即入

大腸脫肛 聖惠治大腸久積虛冷每因大便脫肛用蠅牛一兩燒灰猪脂和傅立縮○又治上

症及痢後脫肛用乾蠅牛一百枚炒研每用一錢以飛過赤汁磁石末五錢水一盞煎半盞調

服日三

下痢脫肛 百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以水一碗煎半碗日二服○聖濟總錄

泄痢脫肛 已久者黑聖散主之大蜘蛛一箇瓠葉兩重包紮定燒存性入黃丹少許爲末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥末置軟

帛上托入收之甚是有効也○乘開方

肛門凸出 鹿骨燒灰末水服方
寸七日三〇外臺

大腸脫肛 久積虛冷以驚頭炙研米飲服方寸
七日二服仍以末塗腸頭上〇千金

大腸脫肛 狗涎抹之白上
也〇扶壽精方

大腸脫肛 蝸牛殼去上研末羊脂溶化
調塗遂入即愈〇李延壽方

腸頭挺出 蟾蜍皮一片瓶內燒烟
燻之并傅之〇孫眞人

大腸脫肛 蟻蜋燒存性爲末入水片研勻
搽肛上托之即入〇醫學集成

痔漏脫肛 虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅丸
梧子大每侵晨溫酒下二十九取効〇勝

金

大腸脫肛 獨皮一斤燒磁石煨五錢桂心五錢
爲末每服二錢米飲下〇葉氏摘玄

本草類方

脫肛 卷四

全

肛門腫痛 欲作痔瘡急取屠刀磨
水服甚效〇集簡方

肛門腫痛 生芋根搗爛坐之
良〇類海集簡方

肛門凸出 故屋東壁上土一升研末以長皂莢把末
粉之仍炙皂莢更互熨之〇外臺秘要

本草類方卷四

痔瘻第六十一

痔瘡腫痛

孩兒茶麝香為末唾津調傳。孫氏集効方。

一切漏瘡

故布裹鹽燒赤為末每服一錢。外臺秘要。

痔瘡腫痛

鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨手見効。嬰童百問。

痔瘡腫痛

鬱金末水調塗之即消。醫方摘要。

外痔腫痛

黃丹滑石等分為末新汲水調日五上之。嬰童百問。

痔瘻腫痛

以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良。

腸風痔瘻

銅青密陀僧各一錢麝香少許為末津和塗之。濟急方。

本草類方

痔瘻 卷四

全

痔如蟲咬

兔絲子熬黃黑為末雞子白和塗之。肘後方。

痔蟲作痒

水銀棗膏各二兩同研綿裹納下部明日蟲出。梅師方。

痔漏腫痛

無名異炭火煨紅米酸淫七次為細末以溫水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈。

○簡便方

痔瘡有蟲

古石灰川烏頭炮等分為末燒飯丸梧子大每服二三十丸白湯下。活法機要。

痔瘡熱腫

鴨嘴青膽礬研蜜水調傳可以消脫。直指方。

痔瘡漏瘡

白礬四兩青鹽四兩為末猪尿脬一箇盛之陰乾每服五錢空心溫水下。趙氏經

方驗

痔瘡疼痛

不可忍者胡黃連末鴨膽汁調塗之。孫氏集効方。

雞冠痔疾

黃連末傅加赤小豆末良。斗門方。

痔病祕結

用此寬腸黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十九空心米飲下。醫方大成。

外痔腫痛

白頭翁草一名野丈人以根搗塗之逐血止痛。衛生易簡方。

痔漏腫痛

荆芥煮湯日方洗之。簡易方。

痔瘡腫痛

不可忍蛇牀子煎湯熏洗。簡便方。

五痔腫痛

耳環草碧蟬兒花援軟納患處即効。危亦林得効方。

痔瘡腫痛

先以皂莢烟熏之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消。醫方摘要。

痔瘡出血

橡子粉糯米粉各一斤炒黃滾水調作粿飯上蒸熟食之不過四五次効。李樓奇方。

本草類方

痔瘡

全

痔漏瘡發

旱蓮草一把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之痔瘡患處重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之得瘥累治有驗。劉松石保壽堂。

腸痔下血

多年不止用木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃二錢半並於銚內炒黑存性為末每粟米飲服二錢甚效。

也。蘇頌綱經本草連翹煎湯熏洗後以刀上飛過絲磨入麝香貼之。集驗方。

痔瘡腫痛

石胡荽痔瘡之。集驗方。

痔瘡腫痛

久不愈變成瘻瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二盞煎湯頻洗。衛生寶鑑。

五痔肛腫

荒根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏內度

痔瘡乳核

於石器中慢火煎成膏將絲線於膏內度

野雞痔病

遇以線繫痔當微痛候痔乾落以紙然蘸膏納竅內去根常永除根也一方只搗汁浸線一夜用不得使水○經驗

先以槐柳湯洗過以艾葉上七叶取效即中王及乘繫入西川數日病痔大作如胡瓜貫於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵者云須灸即墜乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血成併出瀉後遂失胡瓜所在矣○經驗良方

肛門鼠痔

蜘蛛絲縛之即落

肛門痔痛

孫用祕寶方用木鱉仁三枚砂盆搗如泥入百沸湯一盞乘熱先熏後洗日用三次仍塗少許○頤湖集簡方用木鱉仁帶潤者雌雄各五箇乳細作七丸盤覆濕處勿令乾每以一九唾化開貼痔上其痛即止一夜一九自消也江夏鐵佛寺蔡和尚病

本草類方

痔瘻 卷四

金

五痔下血

此病不可忍有人傳此而愈用治數人皆有効
搗藤子燒存性米飲服
三錢有功○寇氏衍義

內痔不出

草烏為末津調點肛門內痔即反出
乃用枯痔藥點之○外科集驗方

腸風痔漏

如聖散用葷薤買衆去土等分為末每服三錢溫酒空心服之○孫尚藥傳家秘寶方

五痔下血

桑耳作羹空心飽食三日一作待孔卒痛如鳥喙狀取大小豆各一升合搗作兩囊

蒸之及熱更互坐之即瘥○聖惠方

痔瘡初起

馬齒莧不拘鮮乾煮熟急食之以湯熏洗一月內外其孔閉即愈矣○楊氏經驗方

痔瘡風腫

作痛胡麻子煎湯洗之即消

肛門酒痔

絲瓜燒存性研末酒服二錢。嚴月軒方

痔瘻下血

若蓬子、蕪臺子、荆芥子、芫荽子、藟菑子、蔓菁子、鱗腸、裴藥在內縫合入銀石器內上下用火煉熟放冷為末每服二錢米飲下日一服

下部痔蠶

掘地作小坑燒赤以酒沃之納吳茱萸在內坐之不過三度良。外臺

痔瘡腫痛

魚腥草一握煎湯熏洗仍以草把痔即愈一方洗後以枯礬入片腦少許傅之。救

急方

痔瘡作痛

用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨非菜一把泡湯中乘熱坐孔上先熏後洗數次自然脫體

也。袖珍方

本草類方

痔瘻 卷四

毒

痔瘡腫痛

苦毒、廬苦、黃菜煎湯先熏後洗乃貼熊膽密陀僧膽礬片腦末良。摘玄方

諸瘡痔漏

久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬末炙焦研細貼之勿動良。普濟

痔瘡腫痛

冬瓜煎湯洗之。袖珍方

痔漏有蟲

黑白牽牛各一兩炒為末以猪肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白米飯三匙壓之取

下白虫為効。又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢為細末欲服藥時先日勿夜飲次早空心將猪肉四兩炙切片蘸末細細嚼食取不膿血為効量人加減用忌酒色油膩三日。備門事親

痔瘻腫痛

楮葉半斤搗爛封之。集簡方

五痔下血

杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾汁煎減半同米煮粥食之。食醫心鏡

癰疽痔漏 水煮棘根汁洗之。千金方

腸痔下血 小豆三升苦酒五升煮熟日乾再浸至酒盡乃止為末酒服一錢日三服。肘后方

腸痔出血 蒲黃末方寸匕水服之日三服。肘後方

五痔作痛 胡荽子炒為末每服二錢空心溫酒下數服見効。海上仙方

痔瘡腫痛 威靈仙三兩水一斗煎湯先熏後洗冷再溫之。外科精義

痔瘡腫痛 瀝草根煎湯先熏後洗。直搗方

腸痔出血 批葉一斛件細小口器中坐蒸之有虫自出。肘後方

外痔長寸 用槐花煎湯頻洗并服之數日自縮。集簡方

痔瘡出血 崔林草一握水二升煮一升服日三次見効。外臺秘要

本草類方 痔瘡

痔瘡腫痛 芥葉搗餅頻坐之。護坐翁經效方

血痔腸風 血竭末傅之。直搗方

五痔諸瘻 忍冬草根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許藥為細末以浸藥酒打越糊丸梧子大每服五十九至百丸湯酒任下。

外科 精要

痔瘡腫痛 批把葉蜜炙烏梅肉焙為末先以烏梅湯洗貼之。集要

蟲痔裏急 以白湯調服二錢

痔瘡如瓜 腫痛如火柳枝煎濃湯洗之艾炙三五壯王及膠中痛此藥更用此方灸之覺熱氣入腸大下血穢至痛一頃遂消馳馬而去。奉事方

痔瘡腫痛

隔年風乾。瘡子桶內燒烟熏之神效。醫方摘要。

痔瘡疼痛

大肥棗一枚。剝去皮。取水銀掌中以唾研令極熟。傅棗瓢上。納人下部良。外臺。

腸風血痔

熟多者。尤佳。桐葉微炙。研末一錢。槐花炒研末一錢。米飲調服。未止再服。冠氏衍義。

腸風痔瘻

銅青密陀僧各一錢。麝香少許。為末。津和塗之。濟急方。

痔瘡初起

痒痛不止。用鹽糝烘熱熨之。冷又易。集玄方。

久近痔漏

三十年者。三服除根。用蓮花蓋黑牽牛頭末各一兩。半當歸五錢。為末。每空心酒服二錢。忌熱物五日見效。孫氏集效方。

反花痔瘡

木瓜為末。以鱈魚身上涎調貼之。以紙護住。醫林集要。

本草類方

痔瘻卷四

內外痔瘡

片臍一二分。葱汁化搽之。簡便方。

痔瘡

冬至日取凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸。九晒。瓶收。每日空心酒吞七十粒。臥時再服。簡方。

痔漏腫痛

椒目一撮。研細。空心水服三錢。如神。海上方。

槐角丸

治五種腸風。瀉血。黃面有血。名外痔。糞後有血。名內痔。大腸不收。名脫肛。穀道四面

弩肉如爛。名舉痔。頭上有孔。名糜瘡。內有蟲。名蟲痔。前皆治之。槐葉去梗。炒一兩。地榆。當歸。酒焙。防風。黃芩。枳殼。麩。炒。各半兩。

為末。酒糊丸。梧子大。每服五十九丸。米飲下。和劑局方。

內痔外痔

許仁則方。用槐葉子一斗。搗汁。晒稠。取地膽。為末。同煎九。梧子大。每飲服十九。兼作局方。

痔瘡有虫

挺子納下部或以苦參末代地膽亦可。外臺秘要作痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便常有虫出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中。梅師方

痔瘡腫痛

必效方用枳殼煨熟熨之七枚立定。本方用枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗

腸風痔疾

用槐葉一斤蒸熟曬乾研末煎飲代茶久服明目。食醫心鏡紫荆皮五錢新水食前煎服。直指方

痔瘡腫痛

赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取山木籠蒸熟晒乾為末酒糊丸梧子大每酒服二十九漸加至五十九。韋

本草類方

痔瘡卷四

炳集驗方

痔漏疼痛

乾坤生意用田螺一箇入片腦一分在內取水搽之仍先以冬瓜湯洗淨。孫氏用田螺一枚用針刺破入白礬末同埋。夜取螺內水掃瘡上又善能止痛也甚妙。袖珍用馬齒莧湯洗淨搗螺麵傅上其病即愈

痔漏疼痛

鯉魚鱗二三片綿裹如棗形納入坐之其痛即止。儒門事親

痔漏出水

唐氏用蠅蛆一枚陰乾入水片少許為細末紙熬蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈。袖珍方用蠅蛆焙乾研末先以礬湯洗過貼之

年久痔漏

用鹽二三個煮取肉二箇香葱醬常常食累驗此疾大忌糟醋等物。便民食療用龍龍皮及骨燒灰米飲空心服

腸風痔疾

錢唐者入紅雜蔥花白礬為末知之

大腸痔疾

鹽餘一箇以磚砌四方安於內泥住火煨存性為末以猪廣腸一截紮定兩頭煮熟切碎蘸蟾末食之如

痔瘡疼痛

直指用赤足蜈蚣焙為末入芹腦少許唾調傳之。孫氏集效用蜈蚣三四條香油煮一二沸浸之再入五倍子末二三錢餅收密封如遇痛不可忍點上油即時痛止

效大

痔瘡腫痛

丹溪用蝸牛浸油塗之或燒研傳之。濟生用蝸牛一枚入麝香少許在內碗盛次日取水

諸痔疼痛

青蛙丸用青色蛙長脚者一個燒存性為末雪糕和丸如梧子大每空心先喫飯二匙次以枳殼湯下

本草類方

痔瘡卷四

灸

風痔腫痛

發歇不定者是也白蠶蠶二兩洗劑炒黃為末烏梅肉和九梧桐子大每薑蜜湯空心下五丸妙

腸痔常血

下部痒痛如虫咬者掘地作坑燒赤以酒沃之搗菜黃二升入坑乘熱坐有孔板熏之冷乃下不過三四度愈。用後方

大腸氣痔

作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二次。集簡

腸痔滴血

常以鯽魚作羹食。外臺

腸痔氣痔

同研如泥每日旋丸黃連末皮硝各一兩用猪膽汁夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥。孫氏集效方

出膿血用穿山甲燒存性一兩肉豆蔻三枚為末每米欲服二錢甚者加蛻皮灰一

兩中病即止。衍義

大腸痔疾

五倍子煎湯薰洗或燒烟薰之自然收縮。直指方

諸痔發癢

用全蠶不拘多少燒烟熏之即效秘法也。袖珍方

肉痔出血

鯉魚煮食其性涼也。便民食療

痔瘡腫痛

蚰蛇膽研香油調塗立效。醫方摘要

痔漏

反花瀉血者用狐手足一副陰乾穿山甲頭川芎麝乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煨紅為末入木香末一兩以

荒荳煎酒調下二錢日三服屢效。永類鈴方

痔瘡有核

白鵝膽二三枚取汁入熊膽二分片臘半分研勻窰器密封勿令泄氣用則手指塗

本草類方

痔瘡卷四

允

之立效。劉氏保壽堂方

血痔不止

鴛鴦一隻治淨切片以五味椒鹽醃炙空心食之。奉親養老方

鼠乳痔疾

牛角臙燒灰酒服方寸七。塞上

久痔下血

野猪肉二斤著五味炙空服食之作羹亦得。食醫心鏡

痔瘡下蟲

錢入乳香五分空心溫酒下日三服即免糞也。集驗方

熊膽塗之神效一切方不及也。外臺

十年痔瘡

熊膽半兩入片臘少許研和猪膽汁塗。壽域方

腸風痔瘻

下血年深日近者如聖散用臘月野狸一枚曬在罐內炒大棗半斤枳殼半斤甘草

腸風痔瘻

下血年深日近者如聖散用臘月野狸一枚曬在罐內炒大棗半斤枳殼半斤甘草

四兩銜牙皂莢二兩同入罐內焙定瓦土
穿一孔搗泥固濟殿令乾作一坩以十
字瓦文住罐子用炭五斤殿至黑爛盡青
爛出取起濕土罨一宿為末每服二錢塩
湯下一方以麪作羹其骨
煙灰酒服。楊氏家藏方

痔瘡腫痛

麝香當門子印城鹽等分
塗之不過三次。外臺

痔瘻出水

用牛膽蟬膽各一枚膩粉五十文麝香二
十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日
取出為丸如大麥大以紙捻送入
瘻內有惡物流出為驗也。經驗

五痔下血

衍義云用狗皮合穿山甲等分燒存性入
肉豆蔻一半空腹熱水飲服一錢妙。外
臺用狗皮三指大重黃如棗大熟艾一錢
穿地作坑調和取便熏之取口中有利氣
為佳火氣稍盡即停三日將息更重之
三度永堯勿犯風冷羹臙將養切忌雞魚猪

本草類方

痔瘻
卷四
孕

痔瘡腫痛

生冷二十
日後補之
用熱童尿入罈三分洗之
一日二三效。救急方

諸痔腫痛

蠶繭內入男子精甲令滿外用童子頭髮
纏裹燒存性研末蜜調傅之仍日日吞牛
膽制過槐子甚效
○萬表積善堂方

腸痔有蟲

獨皮燒末生油
和塗。肘后方

腸痔

有血續肝燒末水
服一錢。肘后方

痔漏有蟲

鈴方用狗肉煮汁空腹能引虫也。
危氏用熟大肉蘸塩汁空心食七日效

痔發腫痛

扁竹搗汁服一升一二服未瘥再服亦取
汁和麪作餅任煮食日三次。藥性論

五痔下血

五月五日采蒼耳莖葉為末
水服方寸七甚效。千金翼

本草類方卷之四

下血第六十二

久近腸風 下血用紫炭三錢祝穀燒存性五錢為末
每服三錢五更米飲下一服天明再服當

日見效忌油膩毒物。普濟方

臟毒下血 百草霜五錢以米湯調露一
夜次早空心服。邵真人經

腸痔有血 葱白三片煮湯熏
洗立效。外臺

下血不止 大古錢四百文酒三升煮
二升分三服。普濟方

久年腸風 石燕磨水常服
勿歇。靈苑方

結陰便血 雄黃不拘多少入裏內線繫定煎湯用磁
一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住

本草類方 下血 卷四 空

添沸湯取出為末共棗子和九梧子大每服三十九煎黑銚湯空心下只三服止。

普濟方

腸痔下血 槐樹上木耳為末飲服方
寸七日三服。肘後方

腸風下血 餅裹食之。普濟方
胡荽子和生菜以熟

腸風下血 脫肛蛇黃二顆火煨醋率七次為
末每服三錢陳米飲下。普濟方

腸風下血 搗羅如麩每服一錢白湯下。斗門方
黃連為末獨頭蒜煨研和九梧子大

臟毒下血 每空心陳米飲下四十九。濟生方
聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛

積熱下血 用一分切炒一分炮切一分水浸晒研末
條黃芩一兩防風一兩為末麩糊九梧子

酒毒下血

大每服五十九米泔浸積殼水食前送下
冬月加酒蒸大黃一兩。楊氏家藏方
老山卮子仁焙研每新汲
水服一錢七。聖惠方

酒痔下血

黃連酒浸煮熟為末酒糊九梧子大每服
三四十九白湯下一方用自然姜汁浸焙
炒。醫

學集成

大腸下血

三七研末同淡白酒調一二錢服三服可
愈加五分入西物湯亦可。瀕湖集簡方

下血不止

二十一年者取地榆鼠尾草各二兩水二升
煮一升頓服若不斷以水清屋塵飲一小
盃投之。

肘後方

結陰下血

腹痛不已地榆四兩炙甘草三兩每服五
錢水一盞入縮砂四七枚煎一盞半分二
服。宣

明方

本草類方

下血 卷四

壘

久病腸風

癖痒不止地榆五錢蒼朮一兩水二鍾
煎一鍾空心服日一服。活法機要

瀉血萎黃

腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥
者自木一斤黃土炒過研末乾地黃半斤
飯上蒸熟搗和乾則又少酒丸梧子大
每服十五丸米飲下日三服。普濟方

王不留行末水服

糞後下血

一錢。聖濟總錄

下血虛寒

日久腸冷者熟附子去皮梧若一兩為末
每服三錢米飲下。又方熟附子一枚去
皮生薑三錢半水煎服或加

黑豆一百粒。龍聖惠方

諸般下血

腸風酒痢血痔鼠痔下血黑狗脊黃者不
用須內肉赤色者即本草買藥也去皮毛

剉焙為末每服二錢空心米飲下或醋糊
丸梧子大每服下三四十九或燒存性

出火毒為末入麝香少許
米飲服二錢。普濟方

諸般下血

香附童子小便浸一日搗碎米醋拌焙為末每服二錢米飲下。直搗方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃味米糊九梧子大每服四十九米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也。

大便下血

經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦人用酒下亦可拌麩作餛飩食之。簡便方用荆芥二兩鹽花一兩同炒。

腸風瀉血

黃者黃連等分為末麩糊丸綠豆大每服二十九米飲下。孫用和秘寶方木香黃連等分為末入肥猪大腸內兩頭紮定煮極爛去藥食腸或連藥搗為丸服。

腸風下血

劉松石保壽堂方三代相傳者縮砂仁為末米飲熱服二錢以愈為度。十便良方。

大便瀉血

羊血煮熟拌醋食最效。吳球便民食療。

本草類方

卷四 下血 聖 熱氣入胃病不可忍鬱金五大箇牛黃一皂莢子為散每服用醋漿水一盞同煎二沸溫服。孫用和秘寶方。

腸風下血

蒼朮不拘多少以皂莢按濃汁浸一宿煮乾焙研為末麩糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下日三服。婦人良方。

脾濕下血

蒼朮二兩地榆一兩分作二服水二盞煎一盞食前溫服久痢虛滑以此下桃花九。

腸風下血

積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取出入青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出火毒研入熟附子末一兩藥命集。

米粥糊丸 梧子大每空心米飲
溫酒任下三十九。○承類方

糞後下血

煎雞冠花并子炒
○聖惠方

腸風臟

下血不止旱蓮子草瓦上焙研末
每服二錢米飲下。○家藏經驗方

卒瀉

小薊葉搗汁溫服
○梅師方

下血

三鼠尾草地榆二兩水二升煮一升頓服二
十年者不過再服亦可為末飲服之。○千

金方

酒痔便血

青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末糞
煎冷水糞後水酒調服。○承類方

腸風下血

有疮瘡瘡破者不治為蘭子一斤研破酒
浸夏三冬七日晒乾何首烏半斤雄黃雌
黃各四兩為末以浸華酒打糊丸梧子大
服三十九溫酒下日三服見效。○普濟方

本草類方

下血 卷四

寄

結陰便血

雞冠花椿根白皮等分為末煉蜜丸梧子
大每服三十九黃芪湯下日二服。○聖濟

總錄

酒積下血

馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸
梧子大每米飲下五十九。○摘立方

痔疾下血

益母草葉搗汁飲
之。○食醫心鏡

腸風下血

香白芷為末每服二錢米飲
下神效。○余居士選奇方

臟毒下血

苦楝子炒黃為末蜜丸梧子大米
飲每吞十九至二十九。○經驗方

糞後下血

凌霄花浸酒頻
飲之。○普濟方

糞後下血

艾葉生薑煎濃汁
服三合。○千金方

疔風下血

生地黃熟地黃並酒浸五味子等分為末
以煉蜜丸梧子大每酒下七十九。○百一

選方

腸風便血

不簍內箬葉燒存性每服三匙空心臨米湯下或入麝香少許○王璆百一選方

腸風漏血

馬兜鈴藤殺精草荆三稜川烏頭炒過四味各等分煎水先熏後洗之○普濟方

腸風下血

黃若煎用荏苈實一升暴乾搗篩生姜半斤取汁銀銅中更以無灰酒二升搜之上

火熏如稠餲卽旋投酒度用酒每旦酒飲卽止慢火煎令可丸大如梧子每旦酒飲

通下三九增至五七九止若九時粘手則以免絲粉襪隔之火候忌緊藥焦瀉失力

也初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下痢疾去利亦止絕有效○篋中方

腸風瀉血

木鱉子以桑柴燒存性候冷爲末每服一錢煨葱白酒空心服之名烏金散○普濟

腸風下血

華陀中藏經用檉藤子二箇不蛀皂莢子四十九箇燒存性爲末每服二錢溫酒下

本草類方

下冊 卷四

奎

少頃再會酒一盞趁口服極效○聖惠方用檉藤子三枚厚重者濕紙七重包煨熟

去殼取肉爲末每服一錢食前黃芪湯下日一服

結陰下血

腹痛草烏頭蛤粉炒去皮臍切一兩茴香炒三兩每用三錢水一盞入鹽少許煎八

分去滓露一夜五更冷服○聖濟錄

大腸下血

王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩爲末蜜丸梧子大米飲下三十丸○指南方

腸風臟毒

下血不止何首烏二兩爲末食前米飲服二錢○聖惠方

腸風下血

梧樓一箇燒灰赤小豆半兩爲末每空心酒服一錢○普濟方

臟毒下血

槐耳燒二兩乾漆燒一兩爲末每服一錢溫酒下○聖濟總錄

腸風下血

霜後乾絲瓜燒存性爲末空心酒服二錢一名蜜瓜一名天羅一名天絲瓜是矣○

許叔微

腸風下血

經霜茄連蒂燒存性為末每日空心酒服二錢匕。靈苑方

久患下血

大茄種三枚每用一枚濕紙包煨熟安瓶內以無灰酒一升半沃之蠟紙封閉三日去茄暖飲

○普濟方

下血危篤

不可救者絲瓜卽天羅一箇燒存性槐花減半為末每空心米飲服二錢。○普濟方

大便下血

敗瓢燒存性黃連等分研末每空心溫酒服三錢。○簡便方

積年下血

寒食蒸餅烏龍尾各一兩皂莢七挺去皮酥炙為末蜜丸米飲每服二十九。○聖惠方

臟毒下血

烏犀散用淡豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧子大煎香菜湯服二十九日二服安乃

本草類方

下血

藥

止永絕根本無所忌。○廬州彭大祥云此藥甚妙但大蒜九蒸乃佳仍以冷蘆水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆服此數十年之疾更不復作也。○究原方

腸風下血

茄葉熏乾為末每服二錢米飲下或隔年尤佳。○經驗方

下血成痔

稻藁燒灰淋汁熱漬三五度瘡。○崔氏纂要

酒疾下血

連旬不止用大羅菊二十枚留青葉寸餘以井水大罐中煮十分爛入淡醋空心任食。○壽親

養老方

腸風瀉血

久者感靈仙雞冠花各二兩米醋二升煮乾炒為末以雞子白和作小餅炙乾再研

每服二錢陳米飲下日二服。○聖濟

腸風下血

大便更瀉木饅頭燒枳殼炒等分為末每服三錢槐花酒下。○楊僕家藏方

大腸便血

大蘿荷皮燒存性。荷葉燒存性。蒲黃生用。等分爲末。每服一錢。米飲下。○普濟

暴下血病

用荊蒜五七枚。去皮。研膏入豆豉。搗丸。梧子大。每米飲下。五六十丸。無不愈。○寇宗爽本草

衍義

腸風臧毒

下血。羹莖子生用。甘草炙爲末。每服二錢。水煎服之。○普濟方

腸風瀉血

牽牛五兩。牙皂三兩。水浸三日。去皂。以酒一升。煮乾。焙研末。蜜丸。梧子大。每服七丸。空心。酒下。日三服。下出黃物。不妨病。減後。日服五丸。米飲下。○本事方

用羹莖葉搗汁三合入

腸風下血

蜜一合。溫服。○聖惠方

腸風下血

蜜炙蘿蔔。任意食之。昔一婦人服此有效。○百一選方

便前有血

石皮。卽石葦爲末。茄子枝煎湯下。二錢。○普濟

本草類方

下血

卷四

腸毒下血

蒜連丸。用獨蒜煨。搗和黃連末。爲丸。日米飲服之。○濟生方

熱毒下血

因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁。一升入。薑一升和服。○梅師方

遠年下血

卷柏地榆。焙等分。每用一兩。水一盞煎。數沸。通口服。○百一選方

腸風下血

敗毒菜根。洗切。用連皮老姜各半。盞同炒。赤以無灰酒淬之。罈蓋少頃。去滓。任意飲。○永

類方

大便後血

桑樹上白鮮花。水煎服。或末服。亦止吐血。○聖惠方

酒毒便血

麴一匙。濕紙包。煨爲末。空心米飲服。二錢。神效

大腸瀉血

血見愁少許。姜汁和。搗米飲服之。○戴原禮證治要訣

瘀血內漏

蒲黃末二兩。每服方寸匕。水調下。服盡止。○肘後方

腸風失血

糊蓀姜燒存性五錢酒或米攸服。仁存方。

一切下血

為赤黑豆緊小者以皂莢湯微浸炒熟去皮為末煉豬胎和丸梧子大每服三十九陳米飲下。華

陀中藏經。

男子便血

黑豆一升炒焦研末熱酒淋之去豆飲酒神效。活人心統。

熱毒下血

或因食熱物發動赤小豆末水服方寸匕。梅師方。

大腸下血

卷柏側柏棕桐等分燒存性為末每服三錢酒下亦可飯丸服。仁存方。

腸風瀉血

皂莢樹上葦瓦焙為末每服一錢溫酒下。首學士本方。

熱毒下血

金犀草陳乾姜各三兩為末每服一錢新汲水下。本事方。

大便下血

葶藶汁人半鍾好酒半鍾空心溫服三日見效。神秘方。

本草類方

卷四

癸

腸風下血

檄髓核燈上燒存性研末每服二錢陳米飲調下。仁齋宣明方。

大便下血

或飲食過度積熱腸間使脾胃受傷糞粕不聚大便下利清血臍腹作痛裏急後重及酒毒一切下血並皆治之。用細茶半斤

碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下。日二服。普濟方。

韞箆晒乾研末人參白蜜煎湯調服二錢日二服。全幼心鑑。

大便下血

橡子子殼用白梅肉填滿兩箇合定鐵線

腸風下血

紫佳殼有性研末每服二錢米飲下一方用硫黃填滿煨研酒

服。余居士選奇方。

腸風下血

皂莢子槐實一兩用占穀糠炒香去糠為末陳粟米飲下一錢名神效散。聖惠方。

腸風臟毒

銀杏四十九枚去殼生研入百藥煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送

下○戴原禮
證治要訣

腸風下血

用寒藥熱藥及脾胃藥俱不效者獨用山裏果俗名酸棗又名鼻涕團乾者為末艾

湯調下應手即愈○百一選方

糞前有血

令人面黃用酢石脂皮炙研末每服二錢用茄子枝煎湯服○孫真人方

大腸下血

櫻筍煮熟切片曬乾為末蜜湯或酒服一二錢○集簡方

大便下血

及酒痢久痢不止用烏梅三兩燒存性為末醋煮米糊和丸梧子大每空心米飲服二十九日三

○濟生方

下血數升

黃蘗一兩去皮雜子白塗炙為末木九綠豆大每服七丸湯水下名金虎丸○普濟

方

本草類方

下血
卷四

堯

腸風下血

銀杏煨熟出火氣食之米飲下

腸風下血

柏子十四箇搥碎囊貯浸好酒三蒸煎八分服立止○普濟方

臟毒下血

潤白丸用椿根白皮去粗皮酒浸晒研粟肉和丸梧子大每淡酒服五十九或酒糊丸亦可○

儒門事親

腸風下血

松木皮去粗皮取裏白者切晒焙研為末每服一錢臘茶湯下○楊氏家藏方

下血經年

枳根三錢木一盞煎七分入酒半盞服或作丸服虛者加人參等分即虎眼樹○仁

存方

大腸下血

隨四時方向采側柏葉燒研每米飲服二錢王濟之舒州病此陳宜父大夫傳方二

一選方

腸風下血

秋米楮皮陰乾為末酒服三錢
或入麝香少許日二服普濟方

脾毒腸風

因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸
間故大便下血用臭椿根刮去粗皮焙乾
四兩蒼朮末泔浸焙枳殼麩炒各一兩為
末醋糊丸梧子大每服五十九米飲下日
三服

本
事
方

酒毒下血

或下痢嫩柏葉九蒸九晒二兩陳槐花炒
焦一兩為末蜜丸梧子大每空心溫酒下
四十九

暴熱下血

生豬膽一條洗淨控乾以炒槐花末填滿
紮定米醋炒爛內煮爛糯九彈子大口乾
每服一丸空心當歸煎
酒化下承類錄方

腸風下血

便前近腎肝使後近心肺皂莢刺灰二兩
胡桃仁破散紙炒槐花炒各一兩為末每
下血
卷四

本草類方

服一錢水飲
下○普濟方

積年腸風

瀉血百藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒各
一兩人脂甲燒焦麝香各一分乾姜炮三
兩為末每服一錢
米飲下○聖惠方

腸風下血

不拘遠年近日普濟方用枳殼燒黑存性
五錢羊脛炭為末三錢五更空心米飲服
如人行五里再一服當日見效○簡便方
用枳殼一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空

心
服

酒毒下血

槐花半生半炒一兩山梔子焙五錢
為末新汲水服二服○經驗良方
用長尺皂莢五挺去皮子酥炙三次研末
精羊肉十兩細切搗爛和九梧子大每溫
水下二

腸風下血

水○聖惠
丸○聖惠

臟毒下血

新槐花炒研酒服三錢日三服
或川槐白皮煎湯服○普濟方

腸風下血

皮鞋底蠶鹽蛻核桃殼紅雞冠花
等分燒灰每酒服一錢○聖惠方

大腸下血

經驗方用槐花荆芥穗等分爲末酒服一
錢匕○集簡方用柏葉錢槐花六錢煎

下血不止

湯日服○袖珍用槐花枳殼等
分燒存性爲末新汲水服二錢

腸風下血

櫻櫚皮半斤栝樓一箇燒灰每
服二錢米飲調下○百一選方

下血後虛

飲時服二錢七糊丸亦可○經驗
下血止後但覺月困元氣虛乏腰膝沉重

蠱痢下血

男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿
血如澁色柏葉焙乾爲末與黃連同煎爲

本草類方

○護命方
○楊子建

○下血
卷四

五

腸風瀉血

○汁服之
○圖經
椿莢半生半燒爲末每服
二錢半飲下○普濟方

瀉血不止

○決效○
○普濟方
巴豆一箇去皮以雞子開一孔納入紙封
煨熟去豆食之其病卽止虛人分作二服

腸風下血

○獨子肥皂燒存性一片爲末
糊丸成米飲下○普濟方

下利鮮血

○錢匕○食療本草
○錢匕○食療本草
○錢匕○食療本草

結陰下血

○汁九梧子大每服九九甘草湯下時五服
○三日斷根

大腸下血

○不拘大人小兒臟毒腸風及內痔下血口
久多食易飢先用海螵蛸炙黃去皮研末

每服一錢木賊湯下三日後服猪臟黃連丸。直指方。

腸風下血

僵蠶炒去嘴足烏梅肉焙各一兩為末米糊丸梧子大每服百丸食前白湯下一日

三服。筆峯雜典方。

臟毒下血

五倍子不拘多少為末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內煨存性為末每服一錢溫酒下。

王璆百一選方。

腸風下血

百一方用活鯽一大尾去腸留鱗入五倍子末填滿泥固煨存性為末酒服一錢或飯丸日三服。又用硫黃一兩如上述煨服亦效。

腸風血痔

用活鯽魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二錢以襪包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下每日二服。直指方。

本草類方

下血卷四

宣

腸風下血

五倍子白礬各半兩為末順流水丸梧子大每服七丸米飲下忌酒。本事方。

中蠱下血

如爛肝者以蚯蚓十四枚苦酒三升漬至蠅死服水已死者皆可治。肘後良方。

腸風下血

百藥煎二兩半生用半炒存性為末飯丸梧子大每服五十丸米飲下名聖金丸。玉璆百一選方。

腸風臟毒

下血不止五倍子半生半煨為末陳米飯和丸如梧子大每服二十九丸食前粥飲送下日三服。

聖惠方。

大腸便血

百藥煎荆芥穗燒存性等分為末糊丸梧子大每服五十丸米飲下。聖惠方。

腸風下血

因酒毒者大田螺五箇燒至殼白肉乾研末作一服執酒下。百一選方。

腸風下血

乾蛭炒白礬燒各二兩為末每服半錢米飲下。聖惠方。

腸痔下血 鱧魚作鱸以蒜蘸食之忌冷毒物。外臺

腸風下血 枯桑樹下虫矢燒存性酒服一錢。聖惠

漏血不止 水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血消即愈。千金

糞後下血 艾湯服一錢。全効心鑑

酒積下血 酒煮鯽魚常食最效。便民食療方

痔痛下血 蠶紙半張盆內燒灰酒服自除。奚囊備急方

腸風臟毒 下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火為末水糊丸如梧子大每服七十丸米飲下。濟生方

積年下血 野豬頭一枚桑西枝一握附子一枚同入瓶內煨過為末每服一錢粥飲空心服。

本草類方

下血 卷四

重

腸風臟毒

救急用猪大腸一條入芫荽在內煮食。奇效用猪臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十九。又方猪臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下。

大便下血

黃牛角一艘一只煨末煮鼓汁服二錢日三神效。近效方

風冷下血

脫肛疼痛野狸一枚大瓶盛之泥固火煨存性取研入麝香二錢每食前米飲服二錢。聖

惠方

腸風瀉血

諸藥不效天南星石灰炒焦黃色為末酒糊丸梧子大每酒下二十九。普濟方

積年瀉血

百藥不效用人指甲炒焦麝香各二錢半乾姜炮三兩白礬枯過敗皮巾燒灰各一

腸風下血

兩為末每粥飲一錢
日二服。聖濟總錄
白刺獨皮一枚銹肉燂焦去皮留刺木賊
半兩炒黑為末每服二錢熱酒調下。楊

氏家

藏方

上下諸血

或吐血或心衄或內崩或舌上出血如簪
乳或鼻衄或小便出血並用亂髮灰水服
方寸七一

三服。聖濟

大便瀉血

血餘半兩燒灰羅冠花柏葉各一兩為末
臥時酒服二錢末早以溫酒一盞投之一

服見效
○普濟

無故遺血

亂髮及爪甲燒灰酒
服方寸七。千金方

下血

五味食之妙。飲膳正要
不止用獾肝一副煮熟入

本草類方

卷四下血

萬

大便秘血

晉草根和生薑油炒
酒衝服。聖濟總錄

腸風瀉血

破絮燒灰枳殼炒等分麝香少許
為末每服一錢米飲下。聖惠方

腸風熱毒

藤菜花焙為末每服
二錢米飲下。聖惠

