


醫家必用類選

冬


漢書門	
一	二
三	四
五	六
七	八
九	十
冊	架
函	號
類	

內閣文庫	
漢書	類
冊	架
函	號



內閣文庫	
番號	漢 12246
冊數	4 (4)
函號	301 79



新刊醫家必用類選卷之四



泄瀉



時令分寒熱新久而施治惟在補脾陰之血脾健則自能施運化之功制水不走治法亦要消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久瀉腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

- 白朮 錢二
 - 白茯苓 錢一
 - 白芍藥 錢一
 - 陳皮 錢一
 - 甘草 五分
- 以上三藥
味甘去皮

若傷食泄黃或食積加神麴大麥芽山香子錢各一妙

黃連分七以消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木

香各五○若小便赤澀短少澤瀉猪苓木通錢各一

以分利之夏月再加茵陳分七山桅仁分四○若口

渴引飲加乾薑分五錢一分人參麥門冬錢各一升麻分四烏

梅肉分二○若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒

黃連蒼朮澤瀉錢各一升麻木通分各五發熱燥渴加

乾葛石膏錢各一黃疸小便黃赤加茵陳錢一山桅木

通各五○若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連

茵陳乾葛錢各一木香分五神麴麥芽分各八○若寒月

澹泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神麴麥芽乾薑

錢各一磁砂益智木香分各七○若久瀉胃氣下陷服

利小便之藥而不效宜加人參黃耆錢各一以補中

氣升麻柴胡分各四以升提之再加羌活防風藁本

白芷等風藥分各三助風以平之更加乾薑分各五以

固之○若久瀉脾胃虛弱食少難化加炙黃芩人

參錢各一神麴麥芽分各二錢一分木香煨乾薑分各五○若

久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻錢一訶子肉赤石脂

錢各一煨木香炙乾薑分各五

泄瀉屬濕屬氣虛有火有痰有食積

戴氏曰凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不住完
谷不化者氣虛也腹痛瀉水腸鳴瀉一陣痛一陣
者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而
瀉瀉而痛減者食積也○燥濕四苓散加二木炒
○氣虛參朮芍藥升麻一云四君子湯加芍藥升
麻○火宜伐火利小水黃芩木通入四苓散○痰
宜豁痰海石青黛黃芩神麴蛤粉或用吐法○食
積宜消導踈滌之神麴大黃○有氣陷下者宜升
提之升麻防風○水瀉用蒼朮厚朴陳皮炒神麴
茯苓猪苓澤瀉地榆甘草冬加乾薑等分○瀉水

多者仍須五苓散○夏月水瀉桂 甘露飲○治

瀉諸茶多作丸服之

脾胃不和世俗類用滑茶治瀉者積久而虛者或
可若初得者必變他證為禍不小殊不知多因于
濕惟分利小水為上策○止瀉用肉豆蔻五錢滑
石春冬一兩二錢五分夏二兩五錢秋二兩以薑
麴糊丸服之

茯苓散 治久瀉服者有驗

茯苓

末四兩

蓮肉

去心末四兩

白朮

末一兩

肉豆蔻

去油末四兩

右為一處每服一錢五分米湯調下

久病大陽氣泄

地黃兩半 白芍炒 知母三錢 乾薑二錢

甘草一錢

右為末粥丸服又灸百會三壯

脾泄丸

白朮炒二兩 白芍炒一兩 山查 神麴

半復各一兩半 黃芩炒一兩 蒼朮一兩

虛加參朮甘草後重加木香換換荷葉煨飯丸

桂苓甘露飲 治暑泄

桂 人參 藿香 茯苓 白朮 甘草

葛根 澤瀉 石膏 寒水石各一兩 滑石一兩

木香一錢

右為末每服三錢白湯調下

治老人水泄

蒼朮 神麴 白朮 肉豆蔻 芍藥 滑石

椿根皮各一兩 厚朴半兩 陳皮兩半 甘草三錢

右用荷葉煨飯丸米飲下八十九

寒熱辨

脈多數身多動聲音響亮暴注下迫此陽也熱也

若脈沉細身不動目睛不了了飲食不下鼻難氣
息者此陰也寒也脾胃濕而寒者理中湯陽証熱
泄平胃散五苓散倍白朮煎加黃芩木通寒泄薑
附湯水泄桂苓甘露飲白朮芍藥湯茯苓湯蒼朮
芍藥湯凡泄胃風湯防風芍藥湯蒼朮防風湯胃
虛泄錢氏白朮散黃芪補胃湯并見玉機

一人病瀉每至五更輟卽利此腎泄也用五味子散
數服而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥請復治
之醫曰此命門火虛不能生脾土法當補其母火
者土之母也遂用八味丸治之補其母瀉漸止食

漸進遂瘥東垣云脾胃之氣盛則能食而肥虛則
不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根
故良醫用八味丸治症效一方只用六味地黃
丸亦取効

五味子散治瀉

五更瀉者名腎瀉蓋陰感而然故脾惡濕則濡
而困困則不能治水水性下流則腎水不足而宜
五味子散主之用五味子多者以強腎水神養五
臟吳茱萸次者除脾中之濕濕少則脾健脾健則
制水不走方得脾胃和矣

五味子 去梗 二兩 吳茱萸 顏色小顆者五錢

右同炒香為細末每服二錢陳米飲下

八味丸

治腎氣虛下元冷憊脬腹疼痛又治脚氣上冲小腹不仁虛勞不足亦治腎泄

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩 熟地黄 八兩

山茱萸肉 山萸 各四兩 附子 去皮

官桂 各二兩

右為末煉蜜為丸每服五十九空酒下內去附

子加五味子各腎氣丸去附桂各地黄丸治腎氣

虛損發熱瘦弱骨蒸等症

六味地黄丸

治腎氣虛久新憔悴瘦汗發熱五臟齊損瘦弱虛

煩胃蒸痿弱下血亦治腎消脾土弱下乘於腎能

令腎泄此藥主之

乾山萸 山茱萸 各四錢 澤瀉 二錢利水道通淋補陰不足

牡丹皮 白茯苓 各三錢 熟地黄 八錢

右為末煉蜜為丸每服五十九空心清湯下

胃苓湯

治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分

陳皮 厚朴製各錢 蒼朮錢二 甘草各七分
澤瀉錢一 猪苓 白朮炒 茯苓各一分

右剉生薑三片棗二枚水煎食前服

加味五苓散

治伏暑發熱及胃實泄瀉或煩渴小便不利

赤茯苓皮去 木猪苓 澤瀉 白朮各二分

車前子 肉桂各一分

右剉生薑五片紅棗二枚水煎不拘時服

升陽湯

治一日大便三四次澇而不多有時泄瀉腸中鳴

小便黃

黃芪錢三 甘草錢二 陳皮錢一 升麻七分

柴胡 當歸 益智各五分 紅花許

右剉水煎食前溫服

人參豆蔻散

治脾胃虛弱臍膈滯泄

人參 肉豆蔻煨 茯苓 甘草各一分 木香

乾薑炮 訶子煨 藿香淨洗 白朮各一分

右咬咀作一服用水二鐘煎至八分食前溫服

四時瀉痢脾泄者 不問遠年初起用

白木 二兩 木香 錢五 芍藥 兩一 黃連 兩一

吳茱萸 同黃連不用 茯苓 兩一 黃柏 兩一

當歸 兩一 右末用糊為丸百丸 一服不拘時此吾松張杏園

先生要藥

三白散 治泄

白木 白芍藥 錢半 白茯苓 錢二 澤瀉

厚朴 薑汁 炒 黃連 一錢 乾薑 分五

烏梅肉 水煎用三錢 如無傷寒加神麩麥芽 錢各一

生薑三片 水鍾半煎一鍾 食前服神麩糊丸服更

如

清暑止瀉藥方

黃連 五分 白木 七分 茯苓 錢五分

陳皮 一錢 甘草 三錢 木通 一錢

車前子 一錢 分水

右咀水煎食遠溫服 一方加香薷一錢 霍香五

分有痰加天花粉 又曰貝母能開鬱結 白荳蔻能

散胸膈結氣

泄瀉一症書云暴瀉非陽久瀉非陰 止可分陰陽利

水道而已直須積滯已消然後可用斷下藥今人
往往便止之多成痢疾者矣治法先理中焦次分
利水穀治中不效然後斷下

泄瀉之症有濕有火有氣虛有痰疾○濕用四苓散
加蒼朮甚者蒼白二朮同加炒用燥濕○火用四

苓散加木通黃芩○痰積宜用海石粉青黛黃芩
神麴糊為丸○氣虛用人參白朮炒芍藥升麻

香連丸 治水瀉暑瀉并痢疾甚効

黃連淨取二兩 吳茱萸去枝梗二兩

右先將黃連茱萸二味用熱水拌和罨一二日或

和勻入磁器內置熱湯鍋中頓煮半日曬乾炒黃
連至紫黃色為度揀去茱萸不用只用黃連末四
兩入木香末一兩米飲淡醋打糊為丸滾湯送下

劉草窓治痛泄要方

白朮炒三兩 白芍藥炒二兩 防風一兩

陳皮炒一兩半

右剉作八服水煎或丸服久瀉加升麻六錢

清濕健脾丸

治脾泄脾胃門所載健脾丸自服甚効與此方大
同小異

白朮 上拌炒去土

黃連 薑汁拌炒

山查 去核晒乾

澤瀉 微炒為末

撫芎 冰洗晒乾為末

白茯苓 去皮晒乾

薏苡仁 水淘淨晒乾

半隻麴 陳年者佳晒

香附子 童便浸一宿水洗

陳皮 晒乾為末

右各製度為細末神麴糊為丸每服二錢食遠白

滾湯送下如胸膈飽悶作痛淡薑湯送下神效

凡泄瀉病誤服參耆等甘溫之藥則病不能愈而或

變為黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥乾生濕熱故反助

病邪久則濕熱甚而為疸矣惟用苦溫苦寒之藥

以治之則愈苦寒瀉濕熱苦溫除濕寒也泄止後

脾胃虛弱不可用參耆等藥以補之

冒風湯

治大人小兒飲食畢乘風涼致瓜冷乘虛客於腸

胃飲食不下水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴

腹痛惡風頭多汗及腸胃濕毒下如豆汁或下赤

血

白朮 白芍藥 川芎 人參 茯苓皮

當歸 錢二 肉桂 半錢

右剉作一服水二鐘粟米一撮煎至一鐘不拘時

服

戊己丸

治脾經受濕熱泄瀉不止米穀不化臍腹刺痛

黃連去鬚 吳茱萸去梗 白芍藥各五兩

石為末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

用米飲湯下

痢疾

痢是濕與熱及食積三者別赤白青黃黑五色以

屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白

相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開

鬱結之氣清化積滯通因通用其初只是下之下

後未愈隨證調之痢稍久者不可下胃虛故也痢

多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老

及虛弱人不宜下

主方

黃芩五分 黃連一分 白芍藥已炒二錢

味痢疾必用之藥 木香 枳殼各一錢

檳榔一錢 甘草一分 石

石到水煎服○若腹痛加當歸半錢 礞石一錢 再加

木香芍藥各五錢 ○若後重加滑石一錢 再加枳殼

換柳各五芍藥生用再加各五黃芩用條實者亦加
分五○若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各錢初欲
下再加各五黃蘗錢五兼食積加山查子枳實各錢○若
紅痢加當歸川芎桃仁各錢半初欲下之再加各五大黃
錢五○若紅白相雜加當歸川芎桃仁各錢半以理血
滑石陳皮蒼朮各錢半以理氣有食積亦加山查枳
實○若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減各錢苓連芍
藥各錢加白朮半錢黃蘗茯苓陳皮各錢礞石各錢
去換柳枳殼再加各錢乾薑分五○若紅痢久胃弱血
虛或下後未愈減各錢苓連各錢加當歸川芎熟地黃

阿膠各錢砂陳皮各錢白朮半錢○若色赤黑相雜
此濕勝也及小便赤澀短少加木通澤瀉茯苓各錢
錢山施分五以分利之○若血痢加川芎當歸生
地黃桃仁炒槐花各錢久不愈減各錢苓連各錢去換
柳和殼再加阿膠各錢砂陳皮各錢側柏葉各錢炒黑乾薑各錢
白朮半錢陳皮錢二○若痢已久而後重不去此大
腸墜下去換柳枳殼用條實黃芩加升麻各錢以升
提之○若嘔吐食不得下加軟石膏半錢陳皮錢一
山施仁分五入生薑汁緩呷之以瀉胃口之熱○
有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳

皮黃連黃芩阿膠之類以補之而痢自止○有一
樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾薑礞石
厚朴肉桂之類○若得痢而誤服溫熱止瀉之藥
則雖稍久亦宜用前法以下之下後方調之○若
得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法治
之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫
二條擇用更加龍骨赤石脂鶯粟殼烏梅肉等收
澀之藥

仲景治痢可下者率用承氣加減下之大黃之寒其
性善先佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘

飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行即止局方用
砒丹已礞類聚成丸其氣凶暴其體重滯積氣已
行而毒氣未過腸胃清純之氣寧無損傷之患乎
可溫者乃用薑附溫之局方類用熱藥為主澀藥
為佐用之於下痢清白者猶可其裏急後重經所
謂下迫者皆屬火熱所為加以澀熱非殺而何
痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來皆以濕熱為
本

初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用之
法用大承氣湯調胃承氣湯下後看其氣病血病

而用藥氣用參朮血用四物痢五日後不可下脾
胃氣虛故也壯寒者亦可下
腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加
桂惡熱者加黃柏
初下痢腹痛者用溫茶薑桂之屬不可用參朮氣虛
胃虛皆不可用
後重者積與氣墜下之故當利氣兼升用升無滑木
香檳榔九保和丸之類甚者用大黃
身熱挾外感者不惡寒小柴胡去參發熱惡寒身首
痛此為表證宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥

甘草生薑

發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必兼升藥溫藥
大孔痛因熱流於下木香檳榔芍連加煨乾薑
仲景法治大孔痛一曰溫之二曰清之若久病身冷
自汗脈沉小宜溫暴病身熱脈洪宜清
下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴硝
有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故也有
濕傷血宜行濕清熱
清六九治血痢此方甚効溫六九治痢
一方治熱痢與血痢用大黃芍連黃芩黃柏枳殼白

芍藥當歸滑石甘草桃仁白朮等分神麴糊丸每服五六十九一云治痢通用

下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死血用

桃仁細研及滑石行之

血痢久不愈者屬陰虛四物為主涼血活血川芎桃

仁之類

先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉

此腎傳脾微邪易愈

痢如薑汁者濕也

古方用厚朴為瀉凝滯之氣稍行即去之枳殼少緩

亦不宜久服二藥皆泄氣藥也慎用只用陳皮以

力倦氣少惡食此夾虛症宜加白朮當歸身尾甚者

加人參及陳皮補之虛回而痢自止

久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以藥治之訶子肉豆

蔻白礬半夏牡蠣之類擇用之然須以陳皮為佐

恐大澀亦能作痛又甚者灸天樞穴在臍旁各開二寸氣海

穴在臍下一寸半

痢已減十之七八疾已盡糟粕未實用芍藥白朮

甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒此丸甚

燥有去濕實腸之功若滯氣未盡者不可遽用
痢後糟粕未實或食稍多或饑甚方食腹中作痢者
以白朮陳皮等分煎服和之

氣行血和積少但虛坐努責為無血倍歸身尾以芍
藥生地黃桃仁佐之以陳皮和之血生自安

痢後脚軟漸細蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩半黃
柏五錢粥糊丸以四物湯加陳皮甘草煎湯送下

禁口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎汁終日呷之
如吐再喫但得一呷下咽便好又用田螺搗署臍

中以引下其熱田口熱結當開以降之不知此

多用溫熱甘味以火濟火以滯益滯也亦有言服
熱毒之藥犯胃者當推明而祛其毒

一小兒八歲下痢純血以食積治蒼朮白朮黃芩白

芍藥滑石茯苓甘草陳皮神麩炒並下保和丸

小兒痢疾黃連黃芩大黃甘草煎服赤加桃仁紅花

白加滑石末

下痢純血者如塵腐色如屋漏者大孔如竹筒者唇

如朱紅者俱死如魚腦者身熱脈大者俱半死半

生經曰身熱則死寒則生脈經謂脈沉者小留連

者生數疾俱大有熱者死嚴氏謂脈宜滑大若弦

急者死其詔生死亦言其大藥耳必無脈症詳之可也

香連丸

治下痢赤白膿血相雜裏急後重一法將黃連同茱萸水頓煮去萸用連

黃連 二十兩用茱萸十兩拌卷

木香 四兩八錢

右為末醋糊丸每服二十丸米飲下

一方加蓮肉

又香連丸方

黃連

兩

木香

兩

芍藥

錢五

枳殼

錢三

右為末醋糊丸每服四五丸白滾湯下

劉草窓

治虛弱患痢方

人參

錢二

白朮

錢二

白茯苓

錢二

芍藥

錢一

神麩

分七

升麻

分五

蒼朮

錢一

石剉作一服水煎若下重加木香分三換搗分黃連

知六

澤瀉

分六

甘草

分五

防風

錢一

酒當歸

錢三

滑石

分五

○因風濕熱論之則火盛而金去獨火未旺而

脾損矣輕則瀉泄身熱脉洪穀不化重則大痢膿

血經曰春傷於風夏必飧泄又曰諸下痢皆屬於

濕又曰下痢膿多滯下前症皆熱症實証也心用
龍骨石脂粟殼等藥

治痢方 重則大黃湯輕則黃芩芍藥湯又有因胃
氣不和若上焦不和治以生薑陳皮中焦不和治
以芍藥川芎桂枝茯苓下焦不和而寒治以輕熱甚
則治以重熱

寒熱辨

或曰瀉痢小便不澀完穀不化而色不變吐利腥
穢澄徹清冷不渴脉微細而遲者寒也脉疾數穀
雖不化而色變赤白煩渴小便赤黃或澀者熱也

凡穀消化便為熱也寒泄而穀化者未之有也

剪金丹

治赤白痢及傷寒腹痛而痢者

大黃 用莊渡者一兩 枯黃芩 一兩 人參 二錢
白朮 二錢 沉香 七錢 硃砂 一兩

用大竹竹瀝將前藥切作片七浸七晒為細末仍
用竹瀝打糊為丸滾湯米飲任下

又治痢方

白芍藥 君 甘草 君 當歸 白朮 神麴
芽 茯苓 枳殼 木香 黃連

石剉水煎溫服

一治諸痛并禁口痢

用石蓮肉去殼不拘多少為末每服三錢陳米飲
調下便覺思食

治瘵疾後變成痢疾從虛治故用補脾胃藥

黃連二錢

木香一錢

礞石一錢

黃芩一錢

炒

陳皮一錢

白朮一錢

白芍藥二錢

甘草五分

當歸一錢

酒洗

右生薑三片水煎食前熱服

通玄一八丹

治積聚止瀉痢之效藥治積聚侵晨用薑湯服之

稍瀉一二次即除以粥補之治瀉痢食後用清茶

服之即止

黃連八兩

芍藥五錢

當歸五錢

生地黄五錢

烏梅五錢

右共為細末用雄猪肚一箇以藥盛於內以線縫

之用菲菜二斤鋪底面於鍋內蒸之候湯乾再添

蒸一日以藥熟為度就將猪肚帶藥用石杵春搗

之糜爛為丸每服七十九此藥以薑湯服之則行

以清茶服之則止能通能塞故名通玄神効

六神丸 治赤白痢甚效可常合備之

神麴 留另為未用 麥芽 茯苓 陳枳殼 炒

木香 根白痢倍之 黃連 赤痢倍之與連用 蘇水 法用吳茱萸

內置湯鍋中頻半日晒乾去萸不用

右上一六味各等分為細末神麴末打糊為丸每服

五十九 赤痢甘草湯下 白痢乾薑湯下 赤白痢乾

薑甘草湯下

白木調中丸

治脾胃不和心下堅痞而脇脹滿脘腹疼痛噫宿

腐氣霍亂吐瀉米穀不消久痢赤白膿血相雜多

日羸瘦不思飲食

白木 研 神麴 炒 人參 去 茯苓 去

猪苓 皮 沉瀉 各 木香 錢 官桂 半

甘草 皮 乾薑 各

右為末麴糊為丸每服五七十九空心淡薑湯下

治痢立効方

人參 錢 白木 五 白茯苓 錢 甘草 五

白芍藥 根 當歸 錢 黃連 錢 陳皮 錢

沉瀉 錢 木香 分 砂仁 錢 枳殼 錢

右剉薑三片水二鐘煎至八分空心服

治禁口痢用

香連丸半一蓮肉一飲半研下

固腸丸

治濕氣下痢大便血去腸胃陳積之症用此以燥下濕亦不單用看病旋作湯使副使宋仰山傳甚効

檉根白皮即臭椿在土根皮炒

右為末酒糊為丸煎冰服之若痢減十之七八積聚已盡糟粕未實用芍藥白朮並炒甘草炙陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十九此藥性燥有去熱實

腸之功若滯氣未盡者不可遽用

瘧疾

瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然後以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗 白朮各一錢半 蒼朮未泔浸一錢已上
 乾葛一錢二分 陳皮七分 甘草五分
 若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢 熱甚頭痛再加川芎一錢 石膏各一錢
 渴加石膏知母麥門冬各一錢 ○若間日或三日發
 午後或夜發者邪入陰分加川芎當歸酒炒芍藥
 熟地黃酒炒知母各一錢 酒洗紅花酒炒黃蘗升麻
 各四分 提起陽分方可截之○若間一日連發二日
 或日夜各發者氣血俱病加人參黃耆白茯苓各一錢
 以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃以補血各一錢

胡

○若陽瘧多汗用黃耆人參白朮以斂之無汗柴
 胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之○若陰瘧多汗用
 當歸白芍藥熟地黃黃耆黃柏以斂之無汗柴胡
 蒼朮川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗
 扶正為主無汗者要有汗散邪為主○若病人胃
 氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參
 一錢 酒炒芍藥大麥芽各一錢 ○若傷食痞悶或有
 食積者加神麴麥芽枳實各一錢 炒黃連各一錢 ○若
 痰盛加薑製半夏南星枳實各一錢 炒黃芩黃連各六分
 ○若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢 烏梅

因^三箇○若日久虛癯寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子湯合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋補氣血

治瘴癘時癘寒熱往來

柴胡一錢

知母

一錢

蒼朮

一錢

黃芩

一錢

乾葛

一錢

陳皮

一錢

半夏

一錢

川芎

一錢

甘草

七分

右制生薑三大片烏梅肉二箇水一盞半煎七分

食前清晨服渣煎四分午前服

因暑邪舍於榮衛之間腠理不密復遇風寒閉而不

出舍於腸胃之外與榮衛並行盡行於陽夜行於

陰並則病作離則病止併於陽則熱病於陰則寒

淺則日作深則間日在氣則早在血則晏

機要謂在太陽經為寒癘治多汗之陽明經為熱癘

治多下之少陽經為風癘一云寒熱癘治多和之此三

陽受病謂之暴癘發在夏至後暑前乃傷之淺者

在三陰經則總謂之溫癘發在處暑後冬至前乃

傷之重者此說良是其三陰經作於子午卯四日

少陰癘寅申巳亥日厥陰癘辰戌丑未日太陰癘

也

瘧得於暑當以汁解或汗不得出鬱而成瘧宜養
胃化痰發汗邪氣得出自然和也
風暑必當發汗因在風涼處歇遂閉汗暑毒無從
而發泄也

虛者必用參朮一二貼托住其氣不便下陷後用
他藥

無汗要汗散邪為生帶補有汗要無汗扶正氣為
主帶散無汗以升麻葛根川芎蒼朮柴胡散之
有汗以川芎歸芍藥地黃人參黃耆黃柏補而收
之

數發之後便宜截之久則中氣虛弱病邪愈深而

難治

砒丹等藥大毒不可輕用

在陰分者用藥徹起陽分方可截邪在陽分用芍
歸芍藥地黃知母紅花酒柏升麻等藥提起陽
分方可捷

大渴大熱小柴胡去半夏加知母麥門冬黃連湯
用生地黃麥門冬天花粉牛膝知母炒栝藹
生甘草

久瘧二陳加川芎蒼朮柴胡葛根白朮一補一發

甚者寒熱頭痛如破渴而飲水多汗可服參芪苓
蓮梔子川芎二朮半夏等藥

痰滯胸膈熱多寒少大便燥濕者大柴胡湯久瘧
不得汗以二陳倍二朮加枳櫛

門日一發受病半年一日一發受病一月二日連
發住一日者氣血俱受病也

暑瘧宜人參白虎湯石膏五錢研知母二錢甘草
一錢右剉作一服入粳米一握水煎加人參一
錢半各人參白虎湯

有痰二陳加草果常山柴胡黃芩

不食者必從飲食上得之當以食治小柴胡加常

山截瘧神效小柴胡湯柴胡二兩半夏八錢黃
芩人參甘草各七錢半右剉分作五服加薑棗

前服

瘧母多在左脇之下令人多汗脇痛用九藥消導

鱉甲為君三稜莪朮香附並醋製海粉青皮桃仁
神麩麥棗隨症加減九服

老瘧係風暑入在陰分在臟宜用血藥引出陽分
而散川芎撫芎紅花當歸蒼朮白朮白芷黃柏
甘草露一宿早服瘧瘧老瘧也三日一發陰受

病也瘧得於暑以汗解或處涼冷汗不得泄鬱
而成痰又復嗜慾縱恣輕試劫藥冒氣大傷其
病難愈必先與參朮陳皮芍藥等劑輔以本經
之茶若得汗而體虛又須補養俟汗通身下過
委中方是佳兆須淡飲食避風涼遠房勞瘵瘧
須用補茶從血分補散邪氣用芎歸知母黃柏
防風柴胡升麻人參黃芪白朮半夏官桂芍藥
間日一發須用解散柴胡防風黃芩知母以解表
除熱陳皮半夏以燥痰白朮以補中數服以常
山草菓栝榔青皮截之

久瘧不愈寒多熱少咳嗽痰涎用四獸飲服後以
參朮草菓截之四獸飲人參白朮茯苓橘紅半
夏製草菓各一錢半烏梅一錢甘草五分薑棗
煎服
久瘧欲吐不吐宜吐之藜蘆為末水調半盞以吐
為度

瘧病能食而瘵伏者小胃丹
婦人久瘧用小柴胡和四物服之
熱瘵者小柴胡合二陳服之
瘧身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下後以

白虎湯微其邪
因勞後或憂思而作汗多食少倦其者補中益氣

湯

清脾湯

治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱瘧

厚朴四兩 烏梅半隻 青皮各二兩 良薑各二兩

草菓兩 甘草兩

右咬咀每服七錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分

未發時服

濟生清脾湯

治瘧瘴脈來弦數但熱不寒或熱多寒少舌苦咽

乾小便赤澀

青皮製薑 厚朴製薑 白朮湯泡 半夏湯泡 黃芩製

草菓 柴胡 茯苓各一錢 甘草各半錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分食遠服

柴平湯

治瘧疾累有驗効

用柴胡湯平胃散二劑空心五更時服平明時

保渣

治瘧熱多宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類寒多

宜養胃湯四獸飲是論極好可用服
太陽瘡頭痛無汗先服九味羌活湯發散次用

柴胡 黃芩 人參 甘草 知母 麥門冬

黃連

有渴乃陽明症加

生地黄 天花粉 牛膝 乾葛 黃柏

知母 各等

右俱用薑棗煎服常自愈忌房勞生冷鮮魚

驅癰湯

常山 酒浸蒸 草果 知母 貝母 苦

右各等分每服 虛弱人并老人小兒只須三

錢用冰酒

矣至大

日天明

煎藥過熟則不效
不二散發之
發之前再
煮過

右咬咀

煎至七

神效飲子

治瘡疾之聖藥

桃枝七箇

肉豆蔻

二箇

一箇

麩

草果

二箇

厚朴

二寸

一寸

生薑

半塊

生薑

半塊

甘草

二寸

一寸

生薑

半塊

生薑

半塊

生薑

半塊

生薑

半塊

右咬咀作一服當發之日水二鍾煎八分五更空

心熱服未効再一服心効

瘡瘍

神僊排毒散

專治外科諸惡毒風毒疥瘡疔瘡小兒惡瘡不問諸惡毒神効膿血俱從大小便出亦治氣滯腹脹婦人月經不通

大黃^{十二兩} 白芷^{六兩} 沉香^{五錢} 木香^{五錢}

乳香^{五錢} 沒藥^{五錢} 川山甲^{五錢}

以上各研為細末先將大黃生酒糊浸宿晒乾為細末量人虛實者不過三錢虛者二錢半臨睡時服服後禁飲食湯水五更覺腹中疼痛三五度稀溫粥補之此藥要致敬合之不可多合恐久不效

當歸連翹散

治一切風熱瘡疽消癰腫解風毒活血脉保真宜通遍身結滯此瘡科第一藥也

連翹 當歸 大黃^{酒蒸} 梔子 芍藥

金銀花 一方加茄蒂効

右各等分每服五錢或六七錢用水一大鍾半煎至七分去相熱服甚者加大黃一方用酒並日三服量力加減熱實加倍利之陰瘡減大黃瘡在上食後服瘡在下食前服

治發背神効方秘方

金毛狗脊草^{為末淨一兩} 斗子鹽^{五錢}

右先將草用酒熬成藥放於盞內入鹽末飲之汗出為度渣敷瘡上神効

一方狗脊草每服八錢好鹽一錢酒一鐘煎至五分服之出汗用三服為止神效
治發背方
凡人中熱毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後即取槐子一大枚揀淨鐵杓內炒茶褐色用好酒一碗滾過澄去槐子止乘熱服酒一汗即愈如仍未退再揀槐子一枚如前炒黃服之極效縱成膿者亦無不愈此三十年屢驗其方也

消毒散 德生堂方 一名紫花地丁散

治惡瘡膿未成已成者腫大等症

紫花地丁去芦 金銀花 當歸 大黃酒浸

赤芍藥 黃芪各半 甘草錢一 加升麻

右剉為末作一服酒一碗銀器煎五分服

黃耆散 去腫毒

漏芦 黃柏 香白芷 天花粉 沒藥

乳香 南星 紫花地丁各半 茯苓

木鱉子 黃耆

右各等分水煎服

化毒為水內托散

治一應毒瘡能消去毒化為黑水從小便出萬無

一失

乳香 白芨 知母 穿山甲 天花粉

貝母 半芩 金銀花 皂角刺 以上各一錢

右以咀用無灰黃酒一碗煎半碗溫服效

冰澄膏 治諸熱瘡

黃連 黃柏 白芨 白斂 各四錢 雄黃 一錢

乳香 沒藥 各五錢

右為細末水調鷄翎掃在瘡腫處

又冰澄膏

白芨 兩 黃連 三錢 黃柏 二錢 南星 五錢

白礬 飛過三錢 天花粉 五錢

右為末醋調貼瘡上

治發背疔腫反瘡護心托裏後二方累有効驗

白龍丸 賈都堂方

用生白礬入鍋內化開麥午為丸用好辰砂二錢為細末為衣為丸每服七丸甘草湯下日進三服三日而止

黃龍丸

用生白礬四兩研為細末黃蠟四兩破鍋化開

去滓離火少澄入礬末且晒且攪如糊傍火為丸用硃砂二錢研細為衣每服三十九滾水下早晚日進二服十日稍歇三日再服十日此二藥若瘡極危者方服前一方稍輕者止用後一方

治楊梅瘡效方

仙遺糧即冷飯團濕者一兩乾者七錢 防風

木瓜 木通 薏苡仁 白鮮皮

金銀花各五分 皂角子四分

如虛加人參 當歸各七分

右十味水煎空心一服午前一服午後一服並二渣煎服

又治楊梅瘡方 此方平和取効且速

當歸 防風 牛膝 羌活 甘草 木瓜

金銀花 皂角子 熟地黃 川芎各一錢

冷飯團兩四分

右用水五鐘煎三鐘空心服一鐘午時服一鐘將晚服一鐘渣再水三鐘煎一鐘半作茶用
治發背秘方 發背不宜用涼藥不生肌也
發背先驗人虛實得之厚味者以清脾飲加防風

通聖散服三五劑若得之氣愜者烏菜順氣散與
荆防敗毒散間服各三劑然後用沒藥一面服一
面醫為是惟陰毒內發為寒攻裏為天戒不治治
若未破急用白礬為極細末以竹紙用無根水浸
濕貼在瘡上苗頭勿蓋以礬末鋪一分厚上以冬
瓜切片壓之頻易如無冬瓜時月只以水漫滴礬
上乾則易之如已破用沒藥

黑蓮丹

燈草灰錢三 枯白礬灰錢一 寒水石煨灰一錢五分
雄黃錢一 輕粉錢一 珍珠生用為末一錢七分

砒霜過火煨醋淬一錢二分 心紅一錢

若痛不可忍加乳香沒藥各一錢

右俱為末候用

白蓮丹

枯礬錢三 定粉錢三 輕粉錢二 寒水石煨三錢
右俱為末候用

生肌拔根散

燈草灰錢三 枯礬錢二 寒水石錢二 黃丹水飛二錢
真珠錢一 乳香錢一 沒藥錢一
孩兒茶錢一

右服前煎茶後先以青布條扎箸子土蘸茶水洗
 患處煎藥水用菖活獨活荆芥防風煎湯待澄清
 晾溫用前法洗瘡畢然後先以白蓮丹用香油調
 勻鋪瘡週圍一分厚然後却將黑蓮丹以井花水
 或淨唾唾於手心內調勻敷瘡口上一日一易七
 日後毒自內拔出瘡與好層裂開則瘡毒山矣即
 日還用前菖活四味湯洗淨瘡却敷生肌茶外白
 蓮丹照舊還敷之瘡起如蓮蓬樣上大下小待瘡
 根漸細以著用力振而落之自易去矣又用生肌
 茶加一二分龍灰斂口龍灰即古石灰也即舊船

底石灰甚好斂口前後十四日愈矣秘秘

真人活命飲 治一切癰毒

- 川山甲 三片切碎以略 天花粉 一錢
- 甘草節 一錢 乳香 一錢 赤芍藥 一錢 白芷 一錢
- 防風 一錢 貝母 一錢 沒藥 五分 當歸尾 酒浸錢半
- 陳皮 一錢 金銀花 三錢 皂角針 五分

如在背俞皂角刺為君○如在腹募白芷為君
 如在脊次加瓜蒌仁二錢○如在四肢金銀花為
 君○如疔瘡加紫河車草根三錢如無亦可
 有作一貼用金華好酒一鐘半煎至一鐘溫服此

茶極有效驗

援毒散

治黃水瘡一應腫毒刀斧傷瘡痔漏

黃連

錢二

黃柏

錢二

大黃

錢一

薑黃

錢一

白芷

錢一

右為極細末冷水調敷濕者乾滲之加防風一錢可治風瘡

治癩瘡方 汪青峯泰政傳

槐花

錢五

松香

錢三

乳香

沒藥

血竭

錢五

枯礬

錢二

陳石灰

錢二

右為細末用相油一半香油一半先用槐花入內

煎黑色瀝出渣後入松香煎沸又瀝去渣入黃蠟

熬膏滴入水中不散為度盡將藥末入內熬黑色

滴入水中成珠即可不問遠年新發癩瘡先用葱

頭防風煎水洗淨其有不平先用唾津塗指捻藥

成塊填在不平處用油紙為膏貼患處候瘡愈皮

老為度棒瘡亦神效

治眼上頑瘡

心紅

黃蠟

先將蠟畧化開心紅末為膏攤紙上將紙扎針眼

散孔貼瘡效

癰疽不分上下或發背效

川山甲過三錢碎炙

白芷三錢

薑蚕三錢直者用

蟬退三錢

北大黃五錢製

右五味用酒水各半鐘煎空心服多則十二貼即愈

荆防敗毒散

治一切時毒瘡腫發寒熱拘急頭痛脈數

防風 荆芥 人參 羌活 獨活 前胡

柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草各一錢

共十二味水煎食遠服內去防風荆芥各人參敗毒散

飛龍奪命丹

治一切惡疔瘡

蟾酥二錢乾者

血竭一錢

乳香二錢

沒藥二錢

雄黃三錢

輕粉半錢

膽礬一錢

麝香五分

銅綠一錢

寒水石一錢

硃砂一錢

蝟牛二錢連殼用

腦子半錢亦可

蜈蚣一條去頭足

右為細末先將蝟牛研為泥和前藥為丸如菜豆大如丸不就入酒打麵糊為丸每服二九先用葱白三寸令病人嚼爛吐在手心男左女右將藥丸

裹在葱白内用酒二三盞送下於避風處以衣蓋之約人行五里許再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗出為度

神異散 治魚口便毒瘡

金銀花 天花粉 木鱉子 甘草

連翹 黃芩 山柰 川山甲

皂角針 木香 大黃

右剉水一鐘煎至半鐘入黃酒一盞煎三五沸空

心溫服

返魂丹

治十三種疥瘡

硃砂 膽礬 血竭 銅綠

蝸牛 雄黃 白礬 麝香

輕粉 沒藥 蟾酥 麝香

右合和先搗蝸牛蟾酥極爛旋入餘藥為丸如鷄頭實大每服一九不拘時令病人先嚼葱白三寸吐在掌心内將藥丸裹在葱内用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘡如危急不能嚼葱

研爛裹茶灌入極有功效

治痔瘡十方不効服此無不愈者

刺蝟皮到八 猪懸蹄及百 槐角米三
 牛角腮八兩 即牛角皮二兩 雷丸用赤者 脂麻二
 敗棕四 亂髮四兩 皂角湯三 苦練根二兩
 熟芋三 防風三 黃耆三 當歸身三兩
 黃連三

右咀碎入磁罈內泥固燒存性研細末入乳香一
 兩麝香四錢研合勻和酒翻丸如桐子大在泥地
 上放紙數層又用細絹裹丸放紙上以磁罈覆蓋
 之出火氣二三日取出晒乾入磁罈內每日清晨
 空心先細嚼胡桃二三枚用白湯或溫酒吞下二

十九壯飢再服甚者日三服最要空心切忌別菜
 及一切辛辣之物

槐花酒

治發背及一切疔瘡腫毒不問已成未成但嫩痛
 者茲治之用槐花四五兩微炒黃粟熟入酒二鐘
 煎十餘沸去粗燕服未成者二三服已成者一二
 服即消

專治疔瘡發背蓮子蜂窠發背俞發左右搭背發前
 後對心發耳後發腎陰發頰翅溫癩瘰癧脹腮乳蛾
 對口婦人乳發一切疔瘡及無名毒惡瘡或毒走

心者惟有脉息可救也方具於後

蟬肚鬱金

五錢四
川者良

雄黃

五錢

巴豆

五錢
去殼

先將鬱金一味為細末後將巴豆雄黃二味各研細末同為一處研均用綿紙一張用圓棒搥將藥捲在紙內捍數次輪流將紙俱各捍成黃紙將藥別用紙包了將黃藥紙另包丸遇生一切有頂之瘡者只用茶紙量大小留瘡頂用醋濕紙貼於瘡上涼水潤數次其效如神

凡面上生疔只用茶紙醋濕貼瘡上涼水潤數天不許再換茶紙只一貼效稀麵糊為丸如菜豆大三

五丸涼水下名神僊奪命丸

凡生疔膿或茶或紙醋滋調貼掃腫處水潤數

次效

凡生白癩凡紙貼在瘡疤上醋潤三二次水潤數次

凡打破或大傷所發走腫者用茶醋調用鷄翎掃在

週圍留瘡口水潤數次其效如神

凡貼一切無名腫毒惡瘡用醋調照前瘡形貼潤若

用茶多者即貼損肉皮起泡

凡用水潤不宜太多洗去茶性時時少潤用之○凡

合蒸宜辰日辰時至誠合之神效

治頭面上生瘡癩自驗神效

搽藥先用晚蚕沙炒過碾為細末量瘡大小用鷄

子清調抹患處先要洗淨後搽之紙蓋於上甚

效甚効服後湯藥

煎藥

連翹 金銀花 薄荷 當歸 白芍藥

防風 川芎 麻黃 甘草 以上各

右吹咀作一服用連鬚葱白三根水煎食後服取

微汗

治諸瘡要方

乳香 三錢 沒藥 三錢 孩兒茶 二錢 血竭 二錢

麝香 片腦 各一錢 黃蠟 二兩

右先將黃蠟化開生絹濾過淨再化開將前諸藥

研極細投入蠟內再用絹濾過入水盆用手捻作

一塊然後用油紙剪如瘡大攤茶覆之即愈一日

一換

治諸瘡方 治疔瘡發背等毒

石中黃子 一斤即土膏 紫花地丁 三兩

黃柏 三兩 牡丹苗 三條

右但為細末用鷄子清調塗四圍腫處

千金漏蘆湯

治一切惡瘡腫毒丹痛癩癰疔腫魚睛五發癰疽等症

漏蘆 連翹 黃芩 白斂 枳殼炒

川升麻 粉草 炙 麻黃各一錢

大黃一錢半 濕紙煨 朴硝別研一錢

右剉作一服蘆三片薄荷三葉水煎空心服刺下惡物為効前症初覺頭痛煩渴拍急皮膚壯熱大便秘瀉小便赤黃並宜服之

內托千金散

治腦背 疽乳便等惡瘡

人參 當歸 黃耆 芍藥 川芎 防風

甘草 瓜蒌 白芷 官桂 桔梗以上各二錢

金銀花三錢

石叟咀每服秤藥七八錢重水二大碗煎至七分入酒半盞去渣溫服如痛甚者倍加當歸芍藥或加乳香二錢日進三服兩服之後瘡口肉有黑血出者或遍身汗出皆藥之功効也如病勢猛惡須秤藥一而水一大碗煎服未成膿者日散已成者不用針砭自透此藥累經功効不可不傳普救衆

苦 風性白 治一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒

治疔腫并諸毒瘡 凡一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒

川烏 三箇 草烏 七箇 杏仁 九箇 飛羅麵 一

右用新汲水調敷留瘡口新汲水時時潤之

煎藥 凡一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒 凡一切惡毒

川芎 白芷 當歸 木通 麻黃 天黃

桔梗 紫花地丁 加倍

右咬咀水煎汗之利之乃効

黃耆散 治疔瘡并一切惡腫毒甚効

漏蘆 黃柏 香白芷 天花粉 沒藥

乳香 南星 紫花地丁 半隻 茯苓

木鱉子 黃耆 以上各等分

右剉水煎服

消毒清心降火方

治生瘡在上者凡瘡天花粉金銀花不可無

黃連 天花粉 麥門冬 金銀花 連翹

桔梗 甘草節

右咬咀水煎服

黃耆散子

治一切疔瘡

金銀花兩一 當歸錢一 連翹 黃耆各五

甘草 大黃 生薑各三 瓜蒌筒一

右吹阻用水一大碗藥一兩慢火煎至相入好酒一升再煎三兩沸去滓頓服

消毒飲子 附方

治便毒初發二四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸 大黃

甘草節 瓜蒌仁 各等

右剉酒水煎服頓提掣項中髮立効

乳香黃耆散

治瘡腫嫩作疼痛

乳香五錢 沒藥五錢 黃耆 當歸酒浸

赤芍藥 川芎 甘草 麻黃 陳皮各一

栗殼去頂蒂蜜 人參去芦

右為散每服一兩分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫服

治發背初起

川山甲炒四 真牛皮膠四兩 在新

右二味研細末用酒二碗調勻從容臉盡求無水

午

患此方極效無比始知牛皮膠之功極大也甚效
拔毒散

治發背瘡敷貼甚效

用莊浪大黃為末蜜調掃於紙上為膏藥貼之
不過三箇神效

凡一切惡瘡先服連翹敗毒散有熱加大黃微利一
二行甚效

千金托裏散

治一切瘡腫發背疔瘡

黃耆半兩

厚朴

防風

桔梗各二兩

川芎兩

白芷兩

連翹二兩

芍藥

官桂

甘草 人參各一兩

木香

沒藥各三錢

乳香二錢

當歸五錢

石為細末每服三錢酒一大盞煎三五沸服或作

咀煎服亦可

拔毒消腫藥各四面楚歌

治諸般癰疽發腫赤痛不可忍未成即散已成即

破用至平復而止

白芨

白斂

荆芥

和根

赤芍藥

黃柏

當歸

大黃

白芷

南星

赤小豆

赤斂

草烏 寒水石 煨商陸 到各
右為末 地黄汁 調塗 各四畔 或苦葶根汁 腫用商
陸根汁 末潰 遍塗 垂起 留瘡口

婦女證

加味四物湯

治婦女月經不通知共十三味

香附 薑便炒 當歸 酒浸 全用 川芎 生地黄 酒浸
白芍 酒浸 晒乾 以 生黃芩 錢六 知母 童便炒
黃柏 炒六 牛膝 酒浸 晒乾 牡丹皮 錢八
柴胡 錢六 紅花 桃仁 二味 量加

右分作十服 水煎 空心一服 食遠一服

神效黑附丸

專治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之
可立致效

香附子 一斤 要此方者分作四分 內一分酒浸
一分米泔浸一分 童便浸一分 醋浸各

一日

艾綿

四兩 要潔淨無細梗及艾塵者用醋二千
下以爛為度 搗如餅子 只錢樣

白茯苓

去皮淨 當歸 酒浸 一兩

人參

去芦淨 一兩

川芎

一兩 要實者

熟地黄 上用酒浸一宿飯 木香 五錢要廣

上等微墨 火煨一兩醋

石九味各為細末醋糊為丸每服五十九空心好

酒下

秘傳金銀花散

治婦人氣脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花 當歸 黃芪 蜜炙 甘草 以上各二錢半

用水二鍾煎至一鍾入酒半盞去滓食後溫服

失笑散

治產後心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂 蒲黃 各三錢

右為末先用釀醋調三錢熬膏入水一盞煎至七

分食前熱服

婦寶丹

治婦女經脉不調等疾

香附子 一斤四兩童便製四兩醋製四兩酒製 大川芎 四兩

當歸身 四兩 熟芩 四兩

白芍藥 四兩鹽製 阿膠 二兩黑豆一合

蘄艾 二兩晒乾原方無艾

石為細末醋麵糊為丸每服七十九空心白米湯

下

百子附歸丸

婦女服此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後
有餘不足諸證悉皆治之

真阿膠

蛤粉炒

蘄艾葉

醋煎

當歸

肥者酒洗去芦

川芎

懷慶熟地黄

水取沉者

白芍藥

肥長者以

香附

赤心者去毛

拌成米水醋各

石為極細末用大陳石榴一枚連皮搗碎東流水
三升熬去滓打麵糊為丸每服百丸空心陳米醋

煎沸湯下

加味益母丸

婦人服

益母草片

川芎

赤芍藥

當歸

廣木香

右為末煉蜜為丸每服五十九丸用好酒或童便酒

送下其效如神服百日有孕

治女人崩漏不止

樗白皮

即臭椿根

枯芩

一錢半

熟棗

一錢

當歸頭

一錢

地榆

一錢

川芎

一錢

芍藥

八分

生地黄

七分

伏龍肝

一錢

南艾葉

炒

右剉水煎入醋一匙煎八分空心服三五服即止

又治血崩不止 此孔文谷先生方

金毛狗脊炙炒為末三錢 乳香末一錢 沒藥末一錢

右三味末共一匙空心好酒調下

催生丹

治婦人難產或橫或逆大有神効

十二月兔腦髓去反膜研如泥 通明乳香半二錢研

母丁香末一錢 麝香一字研

右拌勻以兔腦和凡如雞頭實大陰乾用油單紙

密封每服一九溫水送下即產隨男左女右手于中

握菜出

小兒證

白木膏一名助胃膏

人參 白木炒 白茯苓 甘草炙各二錢五分

白豆蔻筒七 肉荳蔻二筒煨 麪 木香一錢

山藥去黑皮五錢 破仁筒十炒

右為極細末煉蜜為丸肥皂子大每服空心一九

米湯化下

抱龍丸

治風痰壅盛驚搐昏眩

雄黃辰砂 天竺黃 麝香
 牛膽南星 八錢 入臘月牛膽中陰起百日
 右末煮甘草糊丸如皂角子大三歲一九量大小
 與服薄荷湯下

蘆會丸

治小兒疳氣腹急骨熱

蘆會 木香 檳榔 蝦蟆 黃連
 黃連 兩 燕夷 皮 青皮 陳皮 錢
 巴豆 三七粒 同 上 四
 右為末猪膽丸小豆大三歲三十九米湯下

大芦會丸 治脾積

芦會 栗如石榴子色黑
 柴胡 兩 蟾殼 十二箇
 青皮 錢五 青黛 一兩
 白木 兩 枳實 錢五
 厚朴 兩 當歸 錢五
 甘草 錢
 胡黃連 錢五 黃連 兩
 雷丸 錢五 木香 錢二
 三稜 兩 莪朮 兩
 檳榔 兩 陳皮 兩
 蕪荑仁 錢五 熊膽 錢一

右為細末水打麵糊為丸大小如意每服二十九
 漸加至三十九止滾水送下
 肥兒丸

治諸疳多因缺乳喫食太早或因病久臟腑胃虛
日漸羸瘦可服

蘆會錢五 胡黃連兩一 川黃連兩一 木香錢五

肉荳蔻兩一 煨兩一 煨錢五 燕夷兩一

使君子兩一 神麴兩一 麥芽兩一

右為細末用猪膽汁面糊和勻為丸每服三十九

米湯服

五疳保童丸

專治小兒諸疳肚大面黃食積因積等證

青皮去穢 麥芽炒黃 陳皮用鹽水浸去白

川黃蓮去鬚以上各一兩 三稜煨 莪朮煨

使君子肉以上各五錢 蘆會 草龍膽以上各六錢

燕夷三錢

右為細末米飲為丸如粟米大每服三五十九量
大小加減丸數食後米飲送下忌葷腥麵食

治疳丸

小兒不可喫甘甜飲食若食生喪生疳以此治之

胡黃連 蘆會錢五 神麴炒一兩 阿魏

麝香另火研 青黛一錢 黃連煨五錢

使君子去穢五錢

右為未稀糊丸黍米大清湯下

治小兒身熱感冒鼻流清涕或鼻塞咳嗽吐痰輕者

不蒸候一二日愈重者服後方治痰為主輕上

和解之

白木

錢一

白茯苓

分七

桑白皮

蜜炙七分

川芎

桔梗

橘紅

半夏

泡各五分

防風

甘草

炙各四分

薄荷

枯黃芩

各三分

粟米

六分

頭三

五十六

石薑水煎服

治小兒若大便色泔白及小便濁或澄之如米泔此

疳病也宜服後方

白木

白茯苓

山查

澤瀉

炒白芍藥

薑炒黃連

以上各一分

青皮

分四

生甘草

分三

生薑二片水煎服

又芦會丸治疳效

治小兒若傷飲食宜服後方消導之

陳皮

分六

麥芽

一分

厚朴

六分

薑炒不可多用

甘草

分四

枳實

分六

若傷乳及粥飯米麵加神麴炒錢半復分更增麥

芽分五○若傷魚肉果子等食加山查錢確破仁分

炒黃連薑炒○若傷生冷之物腹痛或泄瀉清冷

色白加磁砂仁七分神麴七分山查七分煨木香四分乾薑二分○若傷辛熱飲食及傷食停積日久食鬱作熱嘔吐酸水或大便積痢不快或黃黑色此有熱矣加薑炒黃連七分山查七分川芎七分木香三分○若如常些小傷飲食只用麦芽入生薑二片煎湯飲之治小兒食積鬱熱發於肌表潮熱往來主理中而清

陽明之熱

白朮一分

黃連七分

枳實

川芎七分

山查子一分

香附米一分

乾薑一分

升麻七分

升麻七分

生甘草三分

炙甘草二分

白芍藥一錢

薑水煎服

若積去後潮熱未除減山查枳實香附川芎加人參黃芪陳皮石膏各五分薄荷二分再加白朮二分有痰加半夏六分○若飲食傷脾胃食積在內作熱見於肌表或潮熱往來只理其中而表熱自除不可解表也宜用前消導茶加炒黃連以消食積之熱表熱未除更加乾薑升麻白芍藥生甘草以除脾胃之熱熱壯盛脈有力者更加火煨石膏此皆太陰陽明經茶也

治小兒腹消遙菜一二服積去後泄瀉不止服後方

調理補脾止泄

白木一分

茯苓一分

白芍藥一分

陳皮一分

甘草四分

肉豆蔻四分

黃連四分

神麴六分

煨木香四分

乾薑二分

生薑二片煎食前溫服

泄瀉止後調理以復脾胃之氣前方去乾薑神麴

肉果加人參六分黃芪二分服二三服愈○泄瀉要湯

契可將白木茯苓二味入老倉米煎湯飲之服久

則脾自實而小便自長

治小兒因過服解表瀉利藥傷損脾胃中血氣宜服

此常緩加調理以復胃氣

白木一分

要藥二分

甘草四分

白芍藥一分

酒炒一分

陳皮六分

白茯苓八分

中行一分

山查二分

當歸四分

茶補四分

半隻一分

麥門冬六分

液清一分

川芎六分

歸同一分

此皆和平之劑故可常服雖大人亦可服也若預防小兒急驚覺有動作之兆此屬肝志木火旺也

加薑炒黃連三四分以瀉肝心之火更加枳實三四分佐黃連以消痰濕暑之月常服亦可加黃連三分但急驚是有餘之症先須瀉火及降痰一二服後加養血安神之藥若飲食少或吐或瀉是肝心木火旺以剋脾土便須加養脾之藥調理之治小兒心血虛火動睡中驚不安或受驚嚇而作宜清心安神降痰湯

人參錢一 半隻錢一 泡錢一 湯
 酸棗仁錢一 去錢一 殼
 五味子錢五
 當歸錢七 酒錢七 洗
 茯神錢一 去錢一 心
 橘紅錢七 去錢七 白
 赤芍藥錢七 炒錢七
 甘草錢三 炙錢三

右剉冰煎入生薑汁竹瀝另研入牛黃半分尤妙若溫暖之月覺心經熱多可加生地黄五分山柰仁五分麥門冬七分淡竹葉此方人參半夏茯神五味子補心氣也酸棗當歸赤芍養心血也半夏又與橘紅開痰也炙甘草健脾胃和中也小兒慢驚口中氣冷難治疾在臟故也

新刊醫家必用類選卷之四終

