

THESES

de

Cancri natura et cura

Propositae

AB

IOANNE HENRICO TAENISCH

Medicinae Doctore, Orphanotrophei Imperialis Mosquensis Medico.

Anno 1784.

R25591




Theses, quibus Cancri natura et cura proponitur.

I Cancer externus, vel Carcinoma, in genere definiri nequit. Admodum enim variat. Etenim manifestat se interdum instar tumoris, interdum, ut abscessus, interdum vlcus, interdum sphacelum aemulatur, interdum denique cum excrescentiis fungosis appareat.

2. Hinc distinctiones Cancri,

- 1.** In occultum et apertum,
- 2.** Idiopathicum et symptomaticum,
- 3.** Benignum et malignum.
- 4.** Malignus distingui debet in carcinoma, vel ulcerosum, vel sphacelosum, vel fungosum.

3. *Cancer occultus*, est tumor ardens et pungens cum pruritu mixtus, venis circumdatus magis vel minus turgidis, varii coloris et frequentissime scirrho praevio ortus.




4. *Cancer occultus scirrho praevio ortus, est Cancer occultus Idiopathicus.* Cancer occultus aliis morbis externis accedens e. g. verrucis, tumoribus cysticis etc. est cancer occultus symptomaticus.
5. *Cancer apertus, in genere est vlcus externum , nunquam suppurationem manifestans, vel pus verum ostendens, sed semper ichorem, magis vel minus foetidum , partesque vicinas arroden- tem , carnem fungosam magis vel mi- nus semper producens, quae facile et frequenter sanguinem fundit , et ut plu- rimam valde dolens et puriens.*
6. *Cancer apertus idiopathicus, est cancer scirrho et cancro idiopathicō occulto praevio ortus.*
7. *Cancer apertus symptomaticus , est can- cer omni alii morbo externo , scirrho excepto , superveniens.*
8. *Cancer idiopathicus in genere est talis , qui cum scirrho incipit , et cancer symptomaticus in genere , qui alii mor- bo externo , scirrho excepto , accedit,*
9. *Cancer benignus est talis , qui leuiori- bus symptomatibus , cancer mali- gnus autem , qui grauioribus stipatur.*

10. Ad leviora symptomata cancri pertinent: tumor cancrofus (Thes. 3.) abscessum aemulans, qui, quando rumpitur, ichorem quidem effundit, attamen breui tempore sese ab illo exonerat, et vlcus relinquit partes vicinas minus depascens, sanguinem raro effundens et minus fungosum.

11. Ad graviora symptomata cancri pertinent tumor cancrofus vrens, lividus, inaequalis, cito crescens, semper durus, sanguinem frequenter effundens, valde pruriens, cui succedit ulcus late et profunde proserpens, interdum sphacelum aemulans, interdum excrescentiis fungosis saeviens.

12. *Cancer idiopathicus benignus* itaque est talis, qui cum scirrho incipit et in tumorem cancrosum transit, abscessui similem, qui loco puris ichorem continet, quique, quando rumpitur, ab omni ichore brevi tempore sese exonerat, et vlcus mali generis quidem, attamen sanabile, partes vicinas minus depascens, vel etiam fistulam relinquit.



13. *Cancer idiopathicus malignus*, est cancer exscirrho ortus et postea gravioribus stipatus symptomatibus. (Thes. 11.) Cumque graviora ista symptomata ad tres potissimum classes redigi possint, tres etiam inde derivantur subdivisiones cancri maligni. Scilicet dividi potest in.


1. *Cancrum ulcerosum*, qui consistit in ulcerelate et profunde proserpente, dolente, puriente quodque frequenter sanguinem emittit;

2. *Cancrum sphacelosum*, vbi pars cancrosa, quando ex occulto transit in aperatum, sphacelum aemulatur, ichorem emittit foeditissimum et eodem fere modo a parte sana separatur, quo sphacelus, seu mortuum, a parte viua;

3. *Cancrum fungosum*, qui ut plurimum cito crescit et ad magnitudinem frequenter insignem peruenit, cum tumore duro et inaequali, excrescentias producendo fungosas laeuit.

14. *Cancer symptomaticus benignus*, est cancer levioribus stipatus symptomatibus (Thes. 10.) omni alii morbo externo, scirrho excepto, superveniens.

15. *Cancer symptomaticus malignus* eundem habet originem, sed gravioribus stipatur symptomatibus. (Thes. II) Hinc idem esse potest, vel *ulcerosus*, vel *sphaelosus* vil *fungosus*.
16. His distinctionibus probe obseruatis, cancer eo melius ab aliis morbis externis distingui potest.
17. Causa proxima cancri est stasis humorum in glandulis vel locis glandulosis, vel vasis lymphaticis, vel tubulis lactiferis mammarum vel papillis nerueis, cui depravatio massae sanguineae maior vel minor, vel coniungitur, vel antecedit, vel accedit.
18. Stasis ista producitur vel a causis internis, vel externis. Causae externae solae rarissime producere possunt carcinoma, frequenter autem combinatoria causae externae cum interna.
19. Signa pathognomonica variarum species cancri ex definitionibus patent.
20. Quod ad prognosin attinet, sufficienter notum, cancerum esse morbum frequentissime lethalem. Periculosisimus tamen cancer malignus, et qui-



dem huius generis cancer, qui supra sphacelosus et fungosus est dictus. Hic ultimus, nullis cedit remediis externis aut internis, sola operatione e medio tolli potest.

21. Remedia interna, quae humores corrigit, combinata cum remediis externis saturninis, vel curare possunt cancrum, vel si cura ob niuniam depravationem humorum locum non habet, faciunt tamen ne malum vterius proserpat, leniunt interim dolores, ac lethalitati diu resistunt.

22. Remedium internum specificum, Belladonna dictum, contra hunc morbum parui ut plurimum esse momenti, inueni. Cicuta effectum praestat in cancro a causa scrophulosa orto. Variare debent interna medicamenta prouti caussae variant. Frequenter tamen convenit decoctum vel insusum ex radice bardanae, et calamii aromatici, foliis trifolii aquatici, in quorum colatura solvitur Tartarus solubilis. Pro re nata addenda his laxantia vel rheum vel folia sennae vel utrumque simul. Corpora leucophlegmatica, radice jalappae, cui addas licet vel cremorem tartari, vel sal quoddam medi-

medium, sunt purganda. Diaeta observanda idonea, ne neglectus proprii usus sex rerum non naturalium irritum faciat vnum omnium medicamentorum.

23. Remedia saturnina talia, quae calorem diminuunt, putredini resistunt, carnis fungosae generationem impediunt, haemorrhagias sistunt, sunt propria remedia externa, quae cancris adplicari possunt. Alia, quae vel emolliunt, vel corrodunt, vel irritant etc. nocent.
24. Praeparatis ex plumbo simplicissimis utor, cerussa scilicet, Minio et extracto saturni Goulardi. Debent autem rite praeparari et adhiberi.
25. Praeparantur sequenti modo; pulveris cerussae vel Minii Unc jjj terantur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec pondus eius duplo auctum, et color albus cerussae et ruber minii in nigrum fere mutatus fuerit, id quod post laborem octo circiter horarum ut plurimum fit. Haec ita praeparata appellari possunt *Cerussa saturata et Minium saturatum.*
26. Cerussae vel Minii sic saturati Vnciis sex extracti saturni Gulardi Vnciae IV. paulatim instillantur, iterumque in eodem



dem mortario trituranter, donec haec quantitas dicti extracti cum pulvere perfecte mixta, et pulvis perfecte siccus factus fuerit. Tunc *Cerussa saturata composita* vel *Minium saturatum compositum* appellari possunt. Durante trituratione pars insignis extracti saturni exhalatur. Nam pondus pulveris sic praeparati raro Unc. IX. superat.


27. Vtrique pulveres externe adhibiti, calorem mitigant, excoriationes tollunt, rubedinem, indicium inflammationis, diminuunt, haemorrhagias sistunt, putredini et carnis fungosae generationi obstant et frequenter dolores sedant. Efficiacus autem haec omnia praestare mihi videtur Minium, quam cerussa. Nec minrum, cum istud multo sit specifice gravius.

28. Pulvis cerussae saturatae compositae vel Minii saturati compositi magis putredini et carnis fungosae generationi resistit quam non compositi.

29. Quo magis in ulceribus cancrois, caro fungosa vel excrescentiae fungosae fere manifestant, eo diligentius, minio saturato conspergenda, sin minus, sufficit et cerussae

cerussae saturatae usus. Nam haec aequa
ac Minium putredini resistit, minus autem
efficax est ad excrecentias fungosas tol-
lendas. Cancer sphacelosus cerussa satu-
rata composita aut Minio saturato com-
posito conspergendus, siquidem magis pu-
tredini resistunt, quam non composita.


30. Cancro occulto emplastra vel emollientia,
vel attrahentia, vel fortiter adhaerentia nun-
quam applicanda. Etenim non nisi sequenti
modo parata proficia inveni. Ad unciam
vnam sevi cervini recentis, vel eius de-
fectu, sevi hircini recentis lenissimo igne
liquefacti adde paulatim pulveris ce-
russae saturatae vel Minii saturati Unc.
VI. misceantur exactissime, donec fiat
massa similis emplastro, quod digi-
tum ope supra linteum mollissimum ex-
tendi debet. Nam cum massa ista mi-
nus cohaereat, et aliquo modo friabilis
sit, spatula extendi nequit. Nec tamen
convenit tali modo extensem, ut adhi-
beatur. Conspergendum enim adhuc eo-
dem pulvere, quo parabatur, qui digitis
bene laevigandus est, ut fiat empla-
stum aequale plane non adhaerens.



31. Emplastrum hoc applicari potest tam cancris occultis, quam apertis, cuiuscunque sint generis. Cancer occulto per se applicatur et sufficit bis de die illud mutare. Calorem attrahendo dolores sedat, promovet maturationem cancri et facit, ut ex cancer occulto, cancer fiat apertus benignus. Qua in re conamina mendantis praecipue consistere debent.
32. Cancer apertus pulvere vel cerussae saturatae, vel Minii saturati, vel Cerussae saturatae compositae, vel Minii saturati compositi, prouti circumstantiae variant, probe conspergendum, hocque facto emplastrum, Thesi 30 descriptum, applicatur. Supra hoc linteamina mollissima aptentur, ad iniurias aeris, vel indufii, vel vestimenti arcendas.
33. Cancer apertus frequenter deligandus et quo copiosior ex illo effluit ichor, eo frequentior fiat deligatio.
34. Plane non convenit, vlcera cancrosa linteis carptis implere. Caute solummodo cum his ichor abstergendus, et si quae-dam impuritates, vel crustae, quae fine vi auferri possunt, sese manifestant, hae e medio tolli debent, statimque postea pulvis inspergendus.

35. Quantum fieri potest, providendum in qualibet deligatione, ut ichor liberum habeat exitum.
36. Operatio frequenter necessaria. Instituitur autem optime eo tempore quando scirrhus in cancrum transire incipit.
37. Cancri fungosi cito crescentes, ante quam in cancrum apertum abeunt, citius operatione e medio tollendi. Alias enim in ingentem molem excrescunt, et ancipitem postea habent operationem.
38. En methodum simplicissimam ratione inventam et experientia comprobatam, meoque iudicio maxime omnium aptam cancro medendo. Meliora edocet, eodem candore sua divulget.





Druckfehler.

- Pag. 21. Zeile 15. statt (fluctuation), ließ (fluctuatio).
- 26. — 11. statt sehr, ließ geschwind.
- 29. — 16. muß das Wort innerlich weg.
- 42. — 15. statt arcani, ließ arcaeī.
- 46. — 9. statt selten, ließ seltener.
- 49. — 11 und 12. statt (Cardunculus), ließ (Furunculus).
- 56. — 10. statt bewirkt, ließ bemerkt.
- 63. — 5. statt der, ließ und.
- 66. — 9. statt taraxari, ließ taraxaci.
- 68. — 21. nach dem Worte Auswege muß das Wort da zugesetzt werden.
- 69. — 16. statt extera, ließ externa.
- 69 — 18. statt ferio, ließ ferro.
- 76. — 24. Zwischen Arsenico und vitriolo setze ein Comma (,).
- 83. — 9. statt bezuckert, ließ bepudert.
-

