

永樂大典

四十七

卷一萬四千九百

水樂大典卷之一萬四千九百四十七 六暮

婦 婦人證治二十三

婦人耳聾癰腫

論

巢元方病源耳聾風冷傷於腎。腎氣通於耳。勞傷腎氣。風冷客之。邪與正氣相搏。使經氣不通。故耳聾也。耳聾風腫候。耳聾風腫者。風邪搏於腎氣故也。腎氣通於耳。邪搏其經。血氣壅滯。不得宣發。故結腫也。耳後附骨癰候。附骨癰是風寒搏血。脉入深。近附於骨也。十二經之筋脉有絡耳後完骨者。虛則風寒客之。寒氣折血。血否滯不通。深附於骨。而成癰也。其狀無頭。但腫痛。

婦人眼赤

論

巢元方病源眼皆赤者。風冷客於睛間。與血氣相搏。而淚液乘之。挾然者。則全皆赤。類用方藥。瀕潘思敬加減藥證集。婦人暴赤眼疾。先以導水丸。下訖。次以涼膈散加防已。草龍膽煎服。或四物內加之尤妙。

論

巢元方病源喉痛者。風熱毒客於其間故也。十二經脉有循頸喉者。五臟在內而經脈循於外臟。氣虛則經絡受邪。邪氣搏於臟氣。則土熱。熱乘其肺。然搏咽喉。故令喉痛也。咽中如炙肉嚙候。咽中如炙肉嚙者。此是胃腸痰結。與氣相搏。遂上咽喉之間。結聚狀如炙肉之嚙也。

方

張仲景金匱方論半夏厚朴湯方。婦人咽中如有炙嚙。孫思邈千金要方。治胃滿心下堅。咽中黏黏。如有炙肉。吐之不出。吞之不下。

半夏一升 厚朴二兩 茯苓一兩 生薑二兩

乾蘇葉二兩

右五味以水七升。煮取四升。分溫四服。日三夜一服。十全真方。每服

茱萸半升湯。

洪氏集驗方救生散。治急喉門。產前產後有此疾。皆可服之。

白僵蠶半兩。大黃半兩。川芎半兩。

甘草生一錢半。

右二味各取末秤和勻每服一錢匕以生薑汁調藥令稠灌下便急

以溫茶清衝下

婦人吐血

論

巢元方病源治大婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也。口舌出血候口舌出血者心脾傷損故也脾氣通於口心氣通於舌而心主血脉血榮於臟腑通於經絡若勞損臟腑傷動經脈隨其所傷之經虛者血則妄行然口舌出血心脾二臟之經傷也。治驗陳自明大全良方僕嘗治一人吐血診其脉肝部弦氣口濡此因怒極而得之遂用蘇合香丸和雞蘇丸服即効養生必用方云凡吐血須煎乾薑甘草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服生地黃竹茹藕汁去生便遠。予嘗治一女人年十九歲月水不行遂妄行而嘔血諸藥無効察其形容人肥昧不大不小僕授以四生丸即安。又嘗治一男子因飽食頭負重吐血諸藥無効亦授四生丸及青餅子即安更不發僕觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃藕根以四生丸即安。又嘗治一男子因飽食頭負重吐血諸藥無効亦授四生丸及青餅子即安更不發僕觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃藕

方

孫思邈千金要方竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹
桔梗
桂心
川芎
當歸
白芍藥
甘草大

右為剉散。每服四錢水一大盞。煎七分去滓。不以時候。

太平聖惠方雞蘇散方。治婦人吐血。心煩昏悶。
雞蘇葉一兩
黃耆半兩
刺薊一兩
黃芩三分
當歸三分
生乾地黃一兩
伏龍肝三分
甘草半兩
阿膠一兩
羚羊角屑半兩
麥門冬三錢
心

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。淡竹茹一分。煎至六分。去滓不計時候服。

生地黃煎方。治婦人勞熱至甚。吐血不止。心神煩躁。少思飲食。

生地黃汁一升。生藕汁三分。青蒿汁三分。生薑二兩。取汁
蜜四兩
蘇葉一兩
黃芩一兩
川升麻一兩
桑根白皮一兩
柴胡一兩
知母一兩

永樂本草卷四百九十七

三

鹿角膠一兩。僵蠅半錢。各一合。黃耆杏仁一兩。湯後去皮及火炭仁。燒炒熟黃
右件藥搗細羅為散。與前藥汁同於銀器中攪合。慢火煎成膏收
甕合中。每服不計時候。以清粥飲調下半匙。

生乾地黃散方。治婦人心熱壅悶吐血。

生乾地黃一兩半

麥門冬一兩。生薑三合

甘草半兩。生薑半兩

白茅根二兩。刺藍葉一兩

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。豆豉一百粒。煎至六分。去滓不計時候溫服。

刺薊散方。治婦人頭疼壯熱。心中煩悶吐血。宜服。

刺薊二兩

雞蘇葉二兩

赤芍藥一兩

赤茯苓一兩

石膏一兩

黃芩一兩
茜根一兩

甘草一兩。生薑半兩

生乾地黃二兩

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。青竹茹一分。煎至六分。去滓不計時候溫服。

麥門冬散方。治婦人心中壅毒。吐血煩悶。

麥門冬二兩。去心

生乾地黃二兩。去心

永樂大典

卷一四九四七

犀角屑一兩 黃芩一兩 川芎麻一兩 白茅根二兩半 刺
藍葉一兩 甘草一兩半 滾赤剉

右件藥搗鹿茸為散。每服四錢。以水一中盞。入香豉一百粒。候竹茹
一分。生薑半分。煎至六分。去滓不計時候溫服。

雞蘇散。治婦人虛損。氣逆吐血不止。

雞蘇葉一兩 當歸半兩 赤芍藥半兩 黃芩一兩

伏龍肝二兩 阿膠二兩搗碎。炒令黃燥

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓不計時候

溫服

阿膠散。治婦人吐血。心神煩熱。

阿膠三分。搗半炒令黃燥 當歸三分 犀角屑三分
雞蘇葉三分 紫平角屑三分桂心三分

麥門冬三分去心
生乾地黃二兩甘草半兩文微亦剉

右件藥搗鹿茸為散。每服四錢。以水一中盞。入淡竹茹一分。生薑半
分。煎至六分。去滓不計時候溫服。

紫參散。治婦人卒吐血不定。腎心胸痛。

永樂大典卷一四九四七

四

紫參一兩 鹿角膠一兩搗研。炒令黃燥 青竹茹一兩
羚羊角屑一兩。炒令黃燥 生乾地黃二兩

右件藥搗細羅為散。不計時候。以新汲水磨土薑調下二錢。
五神湯。治婦人熱毒上衝。吐血不止。

生地黃汁三合 白蜜一合 刺薊汁三合
生薑汁半合

右件藥相和。煎三兩沸。放溫。不計時候。取一小盞。調下炒麪塵一錢。
治婦人吐血。百治不差。宜服此方。陳自明大金良方云。千金翼藥十之十。其
神驗不傳方。詳此藥性。治熱毒上血有効。地黃汁用半升。生大黃末一方。
寸匕。

生地黃汁一大盞。川大黃半兩剉碎。微炒搗末。

生乾地黃一兩

右件藥搗細羅為散。不計時候。以生地黃汁調下二錢。

又方

龍骨半兩 當歸三分剉微炒

生乾地黃一兩

又方

青竹茹一兩 生地黃二兩 切羚羊角屑半兩

右件藥以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分為三服

人方

桂心一兩

阿膠半兩 滂碎炒金黃燉

生乾地黃半兩

右件藥搗細難為散每服一錢煎竹茹湯調下不計時候溫服

又方 取伏龍肝細研每服以新汲水調下二錢頻服効

又方 取白茅根新者長五六寸一莖剝以水一大盞煎至七分去滓分溫二服

陳自明大金良方治吐血

桂心末

右水調方寸匕日夜可二十服

柔脾湯治虛勞吐血衄血下白汗出方止養生方

甘草

白芍藥

黃耆各一兩

熟地黃三兩

右為末每服四錢水酒各一錢已上煎至七分去滓取六分清汁溫服食前

四生丸療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

永樂醫案萬四千九百四十七

五

生荷葉

生艾葉

生柏葉

生地黃

犀角地黃湯治內有淤血。犀角吐血而黃大使黑

芍藥三分

生地黃半斤

牡丹皮一兩

一兩如無升麻川者代

犀角屑一兩如無升麻川者代

右咬咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩二兩

青餅子治咯血

青餅

杏仁

各一兩。半個方以杜鵑粉炒杏仁去皮火杜

夾定以瀝紙裹煨令香同嚼粥飲下無時候

乾薑甘草湯治陰乘於陽心肺經寒而嘔血

甘草

乾薑各半兩

右㕮咀水煮頓服局方理中湯亦妙方見和劑

楊仁齋直指方地黃煎治肺損吐血嗽血

蠅不用

生地黃四兩取汁

鹿角膠一兩搗碎炒黃

右為末拌和。每服三錢。童子小便一盞燒熱入薑汁少許調下。無鹿

膠則以透明阿膠炒酥代用。

人參湯治吐血咯血

新羅人參慢火煎服

又方

人參

川芎

茯苓

半夏蜜各三分

甘草炒一分

右剉每服三錢。薑五片煎服。

半夏丸治吐血下血崩中帶下。喘急痰鳴。中滿虛腫。亦消宿癥。百病通用。

圓白半夏剉淨炒熟。以生薑汁調和蜜白蔻。作軟餅包。研半夏慢

大久全已竟。去皮取半夏為末。

右末未糊圓菉豆大。日乾毒三四十九。溫熱水下。
豆蘇湯治上焦有熱。咯血瘀血。煩悶燥渴。

黑豆三合

紫蘇葉莖二條烏梅兩個

右水大挽同煎。臨熟入薑汁三大匙。食後旋服。

永樂本草卷萬四十九四十七

六

薏苡湯治肺癰唾吐濃血

薏苡仁二合

黑豆一百粒

烏梅一箇

右水二盞煎一盞。入透明阿膠。生蒲黃各一錢。再煎沸。食後服。

蘿蔔飲治諸熱吐血衄血

主蘿蔔取汁半盞。入白鹽少許。服之立効。如無生蘿蔔。只用蘿蔔子一分。微炒。紫蘇莖葉半分剉散。用煎亦効。

血餘散治吐血衄血

頭髮燒存性

右研細。每服二錢。米湯調下。衄者更以少許吹入鼻。

蒜連丸治諸血妄行

黃連四錢。人參末。獨頭蒜一顆。燒熟。取肉研細。

右入末。醋些子搗和為丸。梧子大。日乾。每三十九。陳米飲下。

黑散子諸竅出血。並主之。

隔年蓮蓬。敗棕筒

頭髮燒存性等分

右為末。每服二錢。煎南木香湯調下。或只用樣蘭燒灰水。湯調下亦可。

咯血方

天門冬去心

青黛燒乳各四錢 生蒲黃

川薑黃

油髮灰各一錢

右末煉蜜丸梧子大。每五十九入松陽柿中，濕紙包煨，香候冷，乘白皮煎湯，臨卧噙下，柿能健肺，咯血屬肺，吐血屬脾。

九竅出血方

荆芥酒煎通口服

又方暴驚風九竅血，其脉虛者

靈砂百粒分三次人參煎湯下。此證不可錯認，血得熱則宣流，妄用涼藥誤矣。

治口舌出血，槐花日乾，禹木傳之。

劉守真病氣宜保命集，生地黃散諸見血無寒動血下血吐血漏血皆屬于熱，但血家證宜服。

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

石各等分同剉，每服一兩，水二盞，煎至一盞，去粗溫服，脉微身冷惡

風，每一兩加桂半錢，吐血者多有此證。

濟王拔粹方，雞蘇散，治虛損氣逆，吐血不止。

雞蘇葉

黃芩各一兩

當歸半兩

赤芍藥半兩

阿膠二兩

伏龍肝二兩

刺薊

生地黃

《本草綱目》卷一百四十七

七

右為蘇木，每服四錢，薑三片，竹茹、彈子大，水同煎。

韓養和埋霞聖効方，繡煎散，治婦人胎前產後吐血。血運發虛熱，小便不通，脾腹痛。

瞿麥

石膏（孔大者）赤石脂各等分

陳槐花

二兩炒百草霜半兩

右為細木，每服五錢，水一中盞，綿裹同煎服。

阮森經驗良方，治婦人吐血。

何氏衛主，生寶茯苓補心湯，治婦人去血過多，虛勞發熱。

四物湯

一兩半參蘇飲三兩

右拌和勻，每服五錢，生薑五片，水煎。

永樂大典 卷一四九四七

本草大方乾地黃丸治吐血下血妄行並虛月候縮

熟乾地黃兩半 白芍藥

人參

當歸

芍藥各一兩 阿膠半兩炒

犀角四錢

水

右為細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米湯下。

卷之三仙方調脾散治吐血上行。經血行時反上行。肺經有病熱冲然。但要順經調肺氣。紅花散子善能痊。凡婦人吐血有三。一經不行反上行。便傷氣也。二傷沖。三肺經受熱隨上冲。故便吐血。

三棱

莪术各一兩

麥芽半兩

胡椒二錢

緇砂三錢

川芎二錢

茴香二錢

甘草

石為木米飲調下

通桂丸

當歸一錢半

桂不見火

青皮去白

大黃地

乾薑半錢

川烏炮

桃仁去皮炒

莪术

乾漆少半大半生川椒上半一錢

右十味一味各同微微炒。放地上出汗為末。一半用醋熬成膏後入

卷之三萬四千九百四十七

一半更入雞子清同為丸。陰乾醋湯下三十九

婦人臂痛

論

類用方藥。陳自明大金良方論曰。夫婦人臂痛。筋脉掣急。不得屈伸。遇寒則劇。由肝虛為風寒邪氣流於血脉。客於經絡。搏於筋。筋不榮則乾急而痛。其脉緊細。宜服柏子仁丸。舒經湯。若臂痛不能舉。或左或右。時復轉移。一臂。由中脘伏疾。脾氣滯而不行。上與氣相搏。四肢皆屬於脾。脾氣滯而氣不下。上攻於臂。故痛。其脉沉細。宜茯苓丸。控涎丹。

陳自明大金良方柏子仁丸

柏子仁

乾地黃各二兩

茯苓

枳實去核炒

覆盆子炒

北五味

附子炮

石斛去根切酒蒸炒

鹿茸絲

酸棗仁炒

桂心

沉香

石為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。空心酒下。三十九

舒經湯治臂痛。又名五瓣湯。亦治腰下疾。

片子薑黃四兩 甘草

卷活各一兩 白朮

海桐皮

當歸

赤芍藥各二兩

右為蘆木每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服治腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓丸

茯苓一兩

半夏二兩

枳椇半兩羌梟風化朴消一分

右四味為末。薑汁煮糊為丸如梧桐子大。生薑湯下三十九食後服。控涎丹。凡人忽患肩背手足頸項腰膝隱痛不可忍。連筋骨牽隱鈎痛坐臥不寧。時時走易不定。俗醫不曉謂之走疰。使用風藥及鍼灸皆無益。又疑是風毒結聚。欲為癰疽。亂以藥貼亦非也。此乃痰涎伏在心膈上下變為此疾。或令人頭痛不可舉。或神意昏倦多睡。或飲食無味。痰唾稠黏。夜間喉中如鋸聲。多流唾沫。手腳重腿冷。寒氣脉不通。誤認為癰瘍亦非也。

凡有此疾。但以此藥不過數服。其疾如失。

甘遂去心

大戟去皮

真白芥子各等分炒

右為細末糊丸如梧桐子大。臨卧淡薑湯吞下五七丸。如疾猛加至十九丸。

永樂本草卷一百四十七

九

白芥子散治臂痛外連肌肉牽引背胛時發時止。此由榮衛之氣循行失度。留滯經絡與正氣相搏。其痛發則有似癲疾。

真白芥子

木鱉子各二兩炒

沒藥別研

流氣飲子

紫蘇葉

青皮

苦梗

大黃根

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳殼

松慈炒防風各半兩

甘草

橘皮各三分

木香

連皮大腹二兩炒

右㕮咀。每服五錢水二碗。薑三片。棗一枚。煎一錢。去滓溫服。

婦人腰痛

論

類用方藥陳自明大全良方論曰。大腎主於腰。女人腎臟繫於胞絡。若腎氣虛弱。外感六淫。內傷七情。皆致腰痛。古方亦有五種之說。如風腰痛。宜

小續命湯加桃仁杜仲煎服脾腃氣散及寒濕腰痛宜五積散加桃仁如虛損及五種腰痛者青娥丸神應丸諸方並見和劑皆可用也如氣滯腰痛如神保丸黑牽牛茴香橘核必有功也張子和儒門事親書夫婦人腰膝疼痛兩脚麻木惡寒喜暖者內經曰乃是風寒濕痹先可服除濕丹七八十九董虛賓以意加減次以為功散投之鴻十餘行清冷積水青黃涎水為驗後以長流水同主薑茶煎五苓散服之風濕散而血氣和也

葛洪肘後備急方治半腰背痛如折方

鹿角屑

右用酒服方可已日五六可熬令焦黃服

又方 大豆二升酒三升煮取二升頓服

產育諸方治腰痛下血

熟艾一兩

右用酒五盞煮四盞去滓再煎二盞口開者灌之

陳自明大金良方如神湯治男子婦人腰痛

玄胡索

當歸

桂心

永樂卷一百四十九首四十七

十

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服洋人腰病此方得之於歐洲新門失醫真走如神故以名之

獨活寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱肝冷濕地當風所得不時遠治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘掣脚重痺宜急服之

獨活三兩

桑寄生

續斷

杜仲

北細辛

川牛膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

人參

熟地黃

當歸各二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空心氣虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚攀痛渙弱不得屈伸此藥最能除風消血財後有附子一枚無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚氣流注亦效

劉守真病機氣宜保命集玄胡六合湯治婦人腰下冷腹痛腰脊痛四物湯內加玄胡索苦絲炒各一兩

王好古醫學方略治濕六合湯

四物湯加羌活

茯苓等分

一本加白朮茯苓

海藏改正上五味只用荅木相伴治諸痛有神

又方與白术相伴加天麻

茯苓

川山甲

右別為細末酒煎或酒調亦可

危亦林得効方 虎骨散治腰上膏肉處痛不可忍

右以麝香末半錢用酒調服

婦人腰脚疼痛

論

太平聖惠方 累曰夫腎主於腰脚女人腎臟繫於胞絡若勞傷腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰脚疼痛也。類用方藥李仲南水類鈐方 夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡腎虛外感六淫內傷七情皆致腰痛如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎脾肾氣散及寒濕腰痛宜五積散加桃仁煎如虛損及五積腰痛青娥丸神應丸氣滌腰痛如神保丸黑牽牛茴香橘核必有功也

方

太平聖惠方 酸棗仁散治婦人血氣虛腰脚疼痛頭目昏悶食少無力
酸棗仁三分微炒

防風半兩生僵頭

牛膝三分生羌活半兩

當歸三分微炒

芍藥三分

桂心三分

木香三分

海桐皮一分

杜仲三分去蠅皮微炒

續斷三分

附子三分炮裂去皮

草薢三分剉

甘草一分微炒

海桐皮一兩

當歸一兩

芍藥三分

附子三分炮裂去皮

皮硝一兩

桂心一兩

檳榔一兩

桃仁一兩去皮去

皮大腹仁一兩

枳實半兩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢水一中盞人生薑半分煎至六分去滓

食前稍熱服之

仙靈脾散治婦人血風攻注腰脚疼痛

仙靈脾一兩

羌活三分

海桐皮三分

牛膝三分去

當歸三分

芍藥三分

骨碎補三分

去毛炒微黃

仙靈脾一兩

羌活三分

海桐皮三分

牛膝三分去

當歸三分

芍藥三分

骨碎補三分去毛

永樂大典 卷一四九四七

玄胡索三分 桂心三分 木香三分 桃仁一兩湯浸去皮失雙仁乾微炒用

續榔一兩

蜘蛛半兩微炒麝香一分細研入

卷蘭子三分 枳枝三分

右件藥搗細羅為散。每服食前以溫酒調下一錢。秦本散治婦人血風流注。腰脚疼痛不可忍。

秦本一兩半

狗脊一兩去毛沒藥一兩

天麻一兩

麒麟竭一兩

燉鈎一兩微炒骨碎補一兩

桂心一兩

虎胫骨

敗毒

穿山甲已上全二兩各以醋生火

全黃連

麝香半兩研

右件藥搗細羅為散。每服以炒生薑黑豆淋酒下二錢。空心及食前服琥珀散治婦人血風攻注。腰脚疼痛。經絡澤澀。四肢煩痛。

琥珀一兩

牛膝一兩去白當歸一兩

凌霄花一兩

赤芍藥一兩

沒藥一兩

地龍半兩微炒桃仁一兩半湯浸去皮失雙仁乾微炒

水蛭一兩炒金黃酒

麝香一分細研入

右件藥搗細羅為散。每服食前以溫酒調下二錢。

永樂大典卷一四九四七

十二

敗毒散治婦人風毒流注。腰脚疼痛行立艱難。

敗毒二兩全味失雙仁

白僵蠶一兩微炒

沒藥半兩

薏苡仁一兩

當歸一兩剝微炒

桂心三分

乳香三分

虎胫骨二兩空味失全味

地龍三分微炒

杜仲一兩去蕊皮微炒

剝微炒

附子九治婦人血風流注。

腰脚骨節痠疼不可忍。

附子三分微炒

牛膝一兩去白海桐皮半兩剝

桂心半兩

玄胡索半兩

安息香半兩

天麻三分

羚羊角屑三分

芎藭三分

當歸三分

白芷半兩

木香半兩

乾竭一分

酸棗仁三分微炒

羌活三分

防風三分去根頭

滿蘆一兩

燒酒下三十九

續榔一兩

敗毒一兩全味失

虎骨丸治婦人血風流注。腰脚骨節痠疼不可忍。

虎胫骨一兩全味失

金酥三分

續榔一兩

敗毒一兩全味失

今黃
皮膚

防風半兩去蘆頭

附子半兩地梔子

川大黃三分刻碎微炒

赤芍藥半兩

驥驥竭半兩

當歸三分

牛膝一兩去苗木香三分

桂心半兩

沒藥半兩

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大。每於食前以暖酒下二十丸。

草薢丸治婦人血風腰脚骨節瘦疼筋脉拘急。行復難難。兩腿抽痛

草薢一兩剝

牛膝一兩去苗杜仲三分去蠶皮大黃剝

酸棗仁三分

當歸一兩

防風三分去蘆頭

丹參三分

赤芍藥三分

桂心三分

石斛一兩去根剝

附子一兩地梔子皮剝

虎胫骨一兩去毛至醋大全黃

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大。每日空心及晚食前以溫酒下三十丸。

梧桐皮丸治婦人腰脚風冷疼痛。立無力

梧桐皮一兩剝桂心二兩

牛膝一兩去苗杜仲一兩去蠶皮

天麻黃剝石斛一兩去根剝

熟地黃一兩

牛膝丸治婦人腰脚風冷疼痛。久不差

牛膝二兩去苗虎胫骨一兩。鹽酥大黃

沒藥一兩

羌活一兩當歸一兩

桂心一兩

敗風二兩。鹽酥大

今黃

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大。每於食前以溫酒下三十丸。

附子散治婦人腰脚積年疼痛不差

附子二兩。地梔子皮膚

沒藥一兩

桂心二兩

藏靈仙一兩乾漆一兩。鹽酥大黃

牛膝一兩去苗

右件藥搗細羅為散。於食前以溫酒調下二錢。

藏靈仙散治婦人腰脚疼痛。大腸不利

牽牛子二兩微炒

藏靈仙二兩

枳殼一兩。炒沙微黃去殼

右件藥擣細難為散。每日空心以茶清調下二錢以利為効。

婦人腳氣

附脚氣脚滿

論

巢元方病源脚氣之病由人體虛溫濕風毒之氣先客於腳從下而上動於氣故名脚氣也。江東嶺南土地卑下風濕之氣傷於人初得此病多不即覺或先無他疾而忽得之或因衆疾後得之此病初甚微飲食嬉戲氣力如故當察察之其狀從膝至腳有不仁或若痺或淫淫如蟲行或微腫或酷冷或疼痛或緩縱不隨或有掣急或有至困能飲食或有不能食者或有見飲食而嘔吐者惡聞食臭者或有物如暗發於喘悶逆上衝心氣上者或有舉體轉筋者或壯熱頭痛者或心腎衝悸寢處不欲見明或腹內苦痛而兼下者或言語錯亂喜妄誤者或眼濁精神昏憤者此皆其證候也治之緩者便上入腹脅或腫脅滿上氣貢便死急者不全日緩者二三日也其病既入臟證皆相似但脉有三品若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑若風盛者宜作越婢湯加木四兩若脉轉駛而緊宜服竹瀝湯若脉微宜服風引湯二三劑其緊駛之脉是三品之最急脉也脉浮大者病在外也沈細者病在內皆當急治之治之緩慢則上氣便死也脚氣腫

滿候溫濕風毒從脚而上故令四肢懈惰緩弱疼痛甚則上攻名脚氣而津液為風濕所折則津液否澀而蓄積成水內則浸漬臟腑外則流溢皮膚故今腠理張密水氣積不敢散故腫也治驗郭彌中方使集里有婦人少年瘦弱兩足股痛醫者無不進附子補虛其痛不移予曰兩股獨病他無害也肝脈虛而弦長肝主血行于四肢經絡且肝為聚財之府人為散財之地聚散不時過與不及皆能致病何者聚而不散血瘀成腫散而不聚身枯不禁弦長者風也所謂風淫末疾即肝風淫於四肢也重則廢軀則痛婦人非男子之比婦人因血氣衰故易療也或曰何不病于胫乎曰股者節骨斷落筋絡過度肝候于此其所由來者肝虛生風而已方露此證先理其肝股痛自愈乃清其源也病延日久股漸成風法當自源徂流遂進細辛當歸半丸半散法當歸芍血入肝以引衆藥細辛行氣治風辛以治筋加以牛膝引下全脉不終劑而愈類用方藥陳白明大全良方婦人脚氣方論凡頭痛身熱肢節痛大使秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜橘梗生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱寒痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪博或小腹不仁皮膚不知有無之或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食

氣或腎滿氣急或遍體酸痛皆脚氣候或之半有無是也黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱為緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必熱小續命湯主之原成人生薑自其汗最快暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以自合薄荷煎冷水調服極妙大便祕者脾約丸麻仁丸三和散主之仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也番思散加減藥證集治婦人脚氣四物去地黃加附子入薑煎服

方

太平聖惠方牛膝散治婦人脚氣浮腫心神煩悶月候不通

牛膝一兩土茴漢防己三分

牡丹三分

桂心三分

羚羊角屑一兩當歸三分剝微炒

桃仁五十枚湯浸去皮尖尖仁衣炒微黃

赤芍藥三分

川大黃一兩剝碎炒

牛膝硝一兩

甘草三分

燒天微赤剝亦剝

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫

服以利下惡物為効

赤茯苓散治婦人脚氣腫滿腹內防脚月水不通四肢疼痛

永樂本草卷萬四千四七

五

赤茯苓一兩木通一兩剝紫蘇莖葉一兩牛膝一兩上酒

木香半兩防葵半兩

赤芍藥半兩

橘榔一兩

桂心半兩

鱉甲一兩蜜醋炙余黃土

川大黃一兩剝微炒

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞人生薑半分煎至六分

去滓食前溫服以利為効

大腹皮散治婦人風毒腳氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮一兩剝紫蘇莖葉二兩木通一兩剝桑根白皮一兩剝

羌活一兩

赤芍藥一兩

荆芥一兩

獨活一兩

青橘皮一兩湯洗去白瓤

木瓜一兩氣者枳殼二兩剝炒微

青橘皮

三分湯洗去白瓤

人參三分去皮頭

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞人生薑半分葱白七寸

煎至六分去滓食前溫服

半夏散治婦人脚氣發動心腹脹滿食飲不下嘔逆不止

半夏三分湯洗七返去酒

赤茯苓一兩半木通一分剝

陳橘皮

三分湯洗去白瓤

人參三分去皮頭

大腹皮

三分剝橘榔一兩

紫蘇莖葉一兩半

永樂大典

卷一四九四七

桂心三分

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

紅雪散治婦人腳氣臟腑氣壅脅滿脚膝煩疼

紅雪一兩半 赤芍藥半兩 茄根半兩 桂心一分

生乾地黃一兩 紅藍花三分

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

牛角屑半兩 紫蘇莖葉一兩赤茯苓一兩 木香半兩

赤芍藥三分 紅藍花三分 檳榔一兩

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於食前溫服

木香散治婦人腳氣卒發衝心悶亂

木香半兩 郁李仁二兩湯浸土皮微炒 桂心三分

赤芍藥一兩 杏根白皮三分炒

大腹皮一兩炒

赤茯苓三分 檳榔三分

紫雪二兩

永樂真言卷一百四十七

真

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服

紅藍花散治婦人腳氣心神煩悶

紅藍花一兩 柴胡一兩半去苗

羚羊角屑一兩

赤芍藥一兩 杏根白皮二兩炒

檳榔二兩

紫蘇莖葉一兩紅雪二兩

甘草三分。火微赤炒

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人腳氣衝心悶亂不識人宜服此方

紫蘇莖葉二兩吳茱萸半兩湯浸七透培此微炒

木瓜一兩

松木節二兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分次入童子小便二合更煎三兩沸去滓不計時候溫服

牛膝散治婦人腳氣緩弱無力兼軟風

牛膝一兩去苗附子一兩。炮炙去皮鹽

仙靈脾一兩

草薢一兩
羌活一兩
防風一兩
大腹皮一兩
郁李仁一兩

去皮微炒
湯浸

右件藥搗碎為散。每服四錢。以水一中盞。入黑豆五十粒。生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前溫服。

紫蘇散。治婦人風毒脚氣。腹內壅塞。痰息不思飲食。腳重虛腫。

紫蘇莖葉一兩。木通一兩。剉。桑根白皮一兩。茴香根一兩。

枳殼二兩。炒。微黃。去瓤。

獨活半兩。
青皮半兩。湯浸。去白紙搗。

羌活半兩。
木瓜半兩。

大腹皮十錢。剉。甘草半兩。火煅。亦剉。

青皮半兩。湯浸。去白紙搗。

右件藥搗羅為散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。葱白一莖。薑頭。煎至五分。去滓。不計時候。溫服。保全無事。每服三錢。水一盞。薑頭。煎至五分。去滓。不計時候。溫服。保全無事。每服三錢。水一盞。薑頭。

二月。急。一至

桑白皮散。治婦人脚氣盛發。而腳浮腫。小便壅澀。腹脹滿。氣急上昇。不

安穩。
桑白皮一兩。剉。赤茯苓一兩。漢防己半兩。木香半兩。

永樂本草卷萬四千九百四十七

十七

紫蘇子二分。木通三分。剉。大腹皮半兩。剉。檳榔半兩。剉。

郁李仁一兩。湯浸。去皮。微炒。青皮三分。湯浸。去白紙搗。

右件藥搗羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候。溫服。

薏苡仁散。治婦人脚氣緩弱。及頓痺。腫滿。心下急。大使澀。

薏苡仁一兩。防風一兩。去皮。甘草二兩。去黑皮。猪苓二兩。去黑皮。

芍藥一兩。羚羊角屑一兩。漢防己一兩。桑根白皮二兩。剉。

大麻仁一兩。橘榔一兩。郁李仁一兩。湯浸。去皮。微炒。

枳實三分。剉。微炒。微黃。甘草半兩。火煅。亦剉。

右件藥搗羅為散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。食前溫服。

防風散。治婦人脚氣腫滿。疼痛。筋脉拘急。
防風一兩。去皮。甘草二兩。剉。微炒。

羌活一兩。附子一兩。去皮。甘草二兩。剉。酸棗仁一兩。微炒。

芎藭一兩。川大黃二兩。剉。微炒。羚羊角屑一兩。

當歸一兩。剉。微炒。枳實三分。剉。微炒。微黃。

甘草半兩。亦剉。半兩。

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盃煎至六分去滓食前溫服治婦人脚氣卒發衝心煩悶氣急大便苦難小便赤澀心神躁熱宜服紫

紅藍花三分

生黑豆皮二分川大黃三分刻碎微炒

右件藥以水一大盞半煎至一盞去滓食前分溫三服

坐擎散治婦人脚氣厥冷血氣不調

坐擎一兩

銀杏一兩枝梗去核去黃枝取

沉香三分

紫蘇子三分見活三分

蘿蔔子三分微炒

杉木節三分刻用乳香少

桂心半兩

右件藥搗細羅為散每服用水煎木瓜紫蘇莖葉湯調下二錢每於食前服之

木瓜丸治婦人脚氣衝心悶亂腹脹滿不能下食

木瓜一枚蒸熟去皮子

木香一兩

檳榔二兩

草豆蔻一兩去皮

當歸半兩刻微炒

青橘皮三分湯浸去皮白紙包

桂心三分

桃仁二兩湯浸去皮尖雙仁更少微炒

右件藥搗羅為末糊研木瓜和丸如梧桐子大不計時候以溫酒下

三十九

羚羊角丸治婦人脚氣上衝喘急稍促兩脚不行連小腹煩痺頭面浮腫

時復心闊便利常潤

羚羊角屑一兩漢防己半兩

薏苡仁一兩

牛膝一兩去苗

芍藥一兩

川大黃一兩刻碎微炒

獨活半兩

大麻仁半兩

木香半兩

郁李仁一兩湯浸去皮微炒

枳實一兩炒微炒

蒲黃

獨活半兩

玄胡索四兩

當歸酒浸

京芎

乾地黃酒炒

赤芍藥

獨活半兩

地榆

蓬莪术

肉桂不見大已上各一兩

滑石二兩

右為細末每服一大錢空心用酒調下食壓之若用炒薑酒或薄荷茶調下亦可

郭彌明方便集小細辛當歸半丸半散法

華陰細辛二兩去葉

羌活一兩

雀頭川芎一兩

木瓜一兩

生乾地黃一兩先

黃芩三錢

赤芍藥一兩

防風一兩

川當歸二兩洗甘草半兩

右為細末勻和分作二分。一半每服三錢水一錢。入薑三片煎溫服。

酒調尤佳。乃酒行四肢也。一半醋煮糊為丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。一日各一眼散子。無時候。

陳自明大全良方四白散。治男子婦人血虛發熱。夜多盜汗。不進飲食。四肢羸瘦。骨立拘攣。脚痛不能行。

黃耆

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮各一兩

白豆蔻仁

半夏

白茯苓

人參

白芷

天台烏藥

甘草各半兩

京南芍藥一兩半禮香

沉香末一分

羌

右為細末每服三錢水一盞薑三片桑子一箇。煎至七分溫服。自後堵謹退。只有脚掌痛不能行。以荅木丸治之。効此藥大治乾濕脚氣。

筋脉拘攣疼痛。不能行復。兼補下部。

荅木丸方

乳香

沒藥各二錢研

川牛膝

青鹽五半兩研

熟艾四錢

川烏三錢

金竭一錢炒

右除研藥為細末。入研藥令停以木瓜一箇大者切一頭留作蓋去瓢。入上件藥於木瓜內。將蓋簽定。安木瓜於黑豆中蒸令極爛。取出去皮連藥研成膏。却入生荅木末拌令得所。如梧桐子大。每服五十九丸。空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得。一日三服。忌血與蒜。已平服去人血病終無自汗心煩。身體骨立足痛。拘掌不能伸。飲食不進。非止醫亦不能瘳。召渠治之。六脉佳絳。俱曰雖脉以營實非營也。似脚氣而非止脚氣。但當調脾土血。其熱必退。然後攻足則可。望安道。專治方。皆無對證之藥。遂處四白散子與服不半劑。然遂能愈。又處荅木丸治之。筋脉拘攣行而愈。

危亦林傳効方治脚赤腫

荆芥

石膏

地龍炒

薄荷

永樂大典 卷一四九四八

右剉散薑三片蜜少許煎服

永樂大典卷之一萬四千九百四十七

永樂大典卷之一萬四千九百四十七

三