

不利加茯苓二錢 如腹疼漸已泄下漸少宜
訶子散主之

寒泄者大便完穀不化或口不渴而小水清利腹
中鳴時常喜熱手按摩或過食涼藥所致

調中散 治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉

砂仁 蓬朮 乾姜炮 桂心 茴香炒 草菓

麥芽炒 橘紅 益智仁 藿香葉各一錢 蒼朮炒

神麴炒 桔梗各半錢 甘草炙三分 姜朮煎臨服加鹽

大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮

痛如泄瀉不已最能取效 藿香二兩 陳皮

厚朴姜汁炒 青皮炒 木香 人參 肉苳菹煨

良姜炒 大麥芽炒 神麴煨去 白苻

苓去皮 甘草各一兩 乾姜炮五錢 為末吐逆泄瀉不

下食或嘔酸苦水用水一大盞煨生姜半塊

鹽一撮煎服

養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹疼腸鳴

泄瀉 方出瘧門

理中湯 寒而虛者

菴花丸 赤石脂 乾姜 胡椒

扶脾丸 脾胃虛寒腹中痛澹泄無度飲食不化

白朮 茯苓 甘草各二錢 訶子 半夏 烏毒肉

紅苳 乾姜 肉桂各五錢 麥芽 神麩

陳皮各四錢 右為末荷葉燒飯為丸如梧

桐子大每服五十九丸溫湯下二錢方加藿香一

乾姜散 治水瀉無度 乾姜為末粥飲調下錢一

行義云一人大腸寒小便精出諸熱藥服至一斗

二升不効後教服赤石脂乾姜各一兩胡椒五

錢同為末醋糊為丸如梧桐子大空心及食前

米飲下五七十九丸服四劑遂愈

本事方訶子丸 脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮 乾姜 肉苳 龍骨 木香 附

子 赤石脂各等分為末糊丸每服四五十丸米飲下

漿水散 治暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉

弱氣少而不能語甚者加吐此為緊病

右為末每服五錢水煎熱服甚者三四服

若下痢為鶩澹大腸不能禁固大便斂了不

了小便清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬
白朮散 羅謙甫云鶩澹者大便如水其中
有少結糞是也

桂枝湯 桂枝 芍藥 白朮 各五錢 粉草 炙一錢

分四服水煎服

小白朮散 白朮 芍藥 各三錢 乾姜 炮五錢 甘草 炙二錢

錢如前煎服甚者除乾姜加附子一二錢謂辛
能發散也

熱瀉 口渴小水短赤糞如糜

益元散 燈心湯或井花水調下

白芍黃芩木通湯 治水瀉小水短赤 白芍 二錢

黃芩 二錢 木通 八分 白朮 一錢 澤瀉 一錢 茯苓 七分 水煎 溫服

厚腸散 治腹疼瀉黃及瀉久不止熱藥不効者

及治酒積泄 川黃連 好酒煮乾炒 為末每

用二錢空心米飲下

豈菴香連丸 治泄瀉不問寒熱陰陽不調下痢

赤白腹脹攻痛其効如神 黃連 二錢 肉荳蔻

木香 各一錢 右為末粟米飲為丸如米粒大每服

十九米飲下漸加二三十丸日夜各四五服

清六丸 去三焦濕熱泄瀉兼治產後腹痛或自

痢者能補脾亦治血痢 六一散三錢紅麴五錢

此活酒糊為丸 多與清化丸同服並不用單

虛瀉 脉弱無力飲食少四肢倦足背浮腫

口渴皆所當補

錢氏白朮散 治瀉久虛弱清氣下陷口渴或腹

中氣不轉運或不思食或惡心 人參 白朮

茯苓 粉草 葛根 木香 藿香 俱為末

每服二錢米飲調下

參苓白朮散 脾虛泄瀉浮腫 人參二斤 白朮

二斤 薏苡仁一斤 扁豆二斤 山藥 桔梗各一斤 蓮肉

半斤 砂仁一斤 茯苓一斤 甘草炒半斤 為末每服二

錢米飲調下

人參升胃湯 大便一日三四次澹而不多有時

腹鳴泄瀉小便黃 黃芪二錢 甘草炙二分 升麻

六分 柴胡 歸身 陳皮 益智各二錢 紅花少許

六分 人參 水煎食前執服

一味白朮散 治久瀉脾虛脾泄如神

土白朮

米泔水洗淨切片每一斤用陳皮半斤入甌一層口間隔蒸一日炒乾去陳皮

為末每服二錢米飲調下

理中湯 虛寒作瀉或吐瀉不止精神虛憊甚者

加大附子名附子理中湯 方在寒門

參苓滑石湯

治泄而困倦小便不利脉數有虛

熱

白朮

滑石

各一兩

黃芩

人參

芍藥

各五錢

錢

木通

陳皮

各三錢

乾姜

一錢

甘草

炙一錢

分八帖水煎服

桂香丸

臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老

人虛人危篤累効

大附子

炮去皮

肉苁

炮

白茯苓

苓

各一兩

桂心

乾姜

木香

泡各五錢

丁香

一分

糊丸 梧桐子大米飲下五十丸

固中丸

治脾久泄去後與氣不快者

蒼朮

肉苁

煨

各一兩

粥丸

桐子

大每服

五十丸

固下丸

治腎久泄即前方加破故帝一兩炒

東垣白朮神麩丸

老人奉養太過飲食傷脾常

時脾泄

白朮

炒二兩

白芍

酒炒

神麩

炒一兩

山查

炒半兩

半夏二兩 製一兩 黃芩錢五 右為末用青荷葉燒飯為丸 菘荳大每服百丸

實泄 泄瀉腹疼或有積滯雖明新久新者以消導之劑久者以前久泄門按寒熱調治

枳實導滯丸 木香 檳榔 九

七聖丸

腎泄 早晨瀉一次者也

愚謂亦不止如此曾記一老人脾泄二十年一日夜三五次夜多日少以破故帛五錢 鹽水炒 白朮

炒二錢 杜仲鹽水炒 澤瀉一錢 水煎空心服二帖

即愈緣腎者胃之關腎虛則下焦不約故也

東坡四神丸 治腎泄下元虛寒尤宜

破故帛炒四兩 肉蔻二兩 木香五錢 小茴香炒一兩

以生薑四兩煮紅棗肉為丸如梧桐子大每空心鹽湯吞下五六十丸

金鎖正元丹 腎虛泄瀉小更頁數盜汗遺精一

切虛冷之症 龍骨煨 茯苓研各

紫巴戟去心 肉從蓉焙 葫蘆巴焙 補骨脂酒

炒十
兩 五倍子 兩

右為末酒糊丸桐子大每服

三十丸空心温酒鹽湯下

五味子丸 治下元虛寒火不生土及腎中之土

不足以致關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參 五味子 破故布炒 白朮各二兩 山藥炒

白茯苓各一兩半 吳茱萸 川巴戟去心 肉蓯一兩 麩各

龍骨煨 右酒為丸如梧桐子大每服七十九

空心鹽湯下

痢門 已前諸公皆釋名滯下經書又云腸澼

泄痢二症前綱中病機之要論寒熱虛實治法甚

詳陳無擇朱丹溪劉宗厚王節齋諸公又各有

發明今摘其緊要逐一詮次以便按治

內經曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則

入五臟膜滿閉塞下為飧泄久為腸澼是也

內經曰腸澼便血身熱則死寒則生腸澼下白沫

脉沉則生浮則死腸澼之屬身不熱脉不懸絕

滑大者生懸澁者死以臟期之

脉經曰腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大

有熱者死又腸澀筋牽其脉小細安靜生浮大緊死
小訣舉要曰無積不痢脉宜滑大浮絃急死細沉無害
秘藏云假令傷寒飲食腹脹滿而傳飧泄者宜溫
熱之劑以消導之傷濕熱之物而成膿血者宜
苦寒之劑以內疎之風邪下陷并舉之濕氣內
勝者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者
和之洞泄腸鳴無力不足拈衣其脉絃細而弱
者溫之收之膿血稠粘數至圍而不能使其脉
洪大而有力者寒之下之

陳無擇云滯下之症內經所載血溢血泄血便注
下古方則有清膿血近世呼為痢疾其實一也
多由脾胃不和飲食過度停積於腸胃不能化
又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱則赤
傷冷則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁
治法當先用通利之藥疎調臟腑
原病式曰或言下痢白為寒者悞也若果為寒則
不能消穀何由反化為膿也所謂下痢穀反化
為膿血如穀肉菜菜濕熱甚則自化腐爛潰發化

為膿血也其熱為赤熱屬心火故也其濕為黃
濕屬脾土故也燥鬱為白屬肺金也然諸瀉痢
皆屬於濕、熱甚於腸胃之內而腸胃拂鬱以
致氣液不得宣通而成腸胃之燥使煩渴不止
也假如下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤悞豈
知水火陰陽寒熱者猶權衡也一高則必一下
一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃之間而
同為痢乎如熱瘡瘍而出白膿者亦可以白為
寒歟其在皮膚之分屬金故色白也次在血分

屬心火故為血也在肌肉屬脾土故作黃膿在
筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故
紫黑血出也各隨五臟而見五色是其標也本
則一出於熱但分淺深而已大法下迫窘痛後
重裡急小便赤澁皆屬於燥熱而下痢白者必
多有之然則為熱明矣

王機微義云河間謂赤白不當分冷熱乃屬心火
肺金之化也五色各屬五臟本則一出於熱其
論甚當緣心主血肺主氣白屬肺金此氣受病

也赤屬心火此血受病也赤白相雜氣血俱受病也知此則肝青脾黃腎黑之說亦可得而互明矣

丹溪謂赤自小腸而來白自大腸而來

謂大小腸亦心肺之腑也但不若劉宗厚以氣血言尤為明白

統旨曰河間發明痢本於濕熱最為詳切及行血則便膿自愈調氣而後重自除誠哉至言也又謂痢雖有赤白而一本之於熱此足以破局方

好行辛熱者之弊也然痢之白者不可盡歸之於熱亦有因於寒者痢如凍膠或如鼻涕明是冷症此緣多啖生冷脾胃受傷氣微而滯下生焉非姜桂之辛熱不可也又其日久而不愈腸胃氣虛始為熱而未變寒或過服冷藥以致脾胃中寒此亦宜有以溫之也

滯下亦有挾虛挾寒

丹溪曰或問河間之言滯下似無挾虛挾寒者然乎否乎予曰洩利之病水穀或化或不化並無

努圍惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相混雖有痛不痛大痛之異然皆裏急後重逼迫惱人似乎皆熱症實症也予近年涉歷亦有太虛大寒者不可不知如治予從叔委長官等皆用參朮及乾姜姜汁之類是也

劉宗厚曰按滯下之症古人多與瀉瀉同論至三因方始能另立條目蓋實有不同夫病有從外感而得者須分六氣之異外既受傷腸胃鬱結

遂成赤白等症當隨其寒熱溫涼以調之有因臟氣發動干犯腸胃而得者須察其何臟相兼以平治之又有因飲食失節而得者則又審其何物所傷以消剋之但其受病之後腸胃怫鬱膿血稠粘裏急後重諸方雖有寒熱虛實之論劉河間則以為一出於熱然考之內經似亦熱多而寒少也我丹溪先生則以為亦有挾虛挾寒之症深戒學者須宜識此世之局方不辨三因專用滋熱之藥其失甚矣至河間立說專用

苦寒踈下之藥則亦未甚為當何則蓋病有虛
寒治有先後若病氣暴至元氣壯實積滯膠固
瀕宜下之病久氣脫腸胃虛滑不禁者亦宜溫
之溫之大抵治痢當從仲景河間之法可溫則
溫可下則下或解表或利小便或待其自已劉
河間分在裡在表挾風挾熱挾寒等症後之作
者無越於斯但氣血一條未嘗表出立論其於
芍藥湯下有曰行血則便膿自愈調氣而後重
自除蓋謂便膿血是血之滯下也故曰行血自

愈奔迫後重氣之實也故曰調氣自除誠哉是
言但膿血赤白亦有氣病血病之分後重裡急
亦有氣實血實之異學者尤不可不察

裏急後重有寒熱虛實及在氣在血之異

滑伯仁曰裏急謂腹內急迫後重謂肛門下墜惟
其裏急後重故數至圜而不能便也

愚謂此皆脾胃不和或為風寒暑濕令氣所干
或為積滯膠固纏墜或病久陽氣下陷

丹溪曰後重本因邪壓大腸不能升上而重墜也

用大黃檳榔藥者乃瀉其所墜之邪也及久痢與通蕩之後而後重仍在者知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殼訶子五倍子等瀉劑收其氣而固其滑也然大腸為邪壓下之重其重至圍後不減虛滑不收之重其重至圍後隨減以此辨之百發百中也

愚謂氣虛下陷而重者雖用收瀉之劑仍必以升補藥兼之

又云有服升消藥不効者用秦瓦皂角子大黃當

歸苑仁枳殼黃連等劑若大腸風盛者可作服九綱目云自古治裏急後重但用檳榔木香調氣及大黃下積至丹溪始用苑仁滑石滑其死血如鼓應桴實發前人所未發也

又云下墜在血活之後此為氣滯宜前藥加檳榔一枚蓋後重者當和氣積與氣墜下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香檳榔之類

發熱

丹溪曰發熱惡寒身首俱痛此為表症宜微汗和

解蒼朮川芎陳皮芍藥粉草生姜

又云有外感者小柴胡湯去人參 又云下痢發熱久不止者屬陰虛用寒涼藥必薰升散并熱藥姜桂之屬是也 又云下痢初發熱必用承氣湯下後叅症用藥發熱不惡寒脉洪者宜大承氣湯若惡寒者忌下

愚謂發熱而小便不利者柴苓湯加滑石木通夏秋發熱惡心胸腹飽悶不思飲食藿香正氣散不飽悶者倉廩湯

令氣及時疫痢

綱目云夏月痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生薑神効者蓋夏月之痢多屬於暑潔古治處暑后秋冬間下痢用厚朴湯大効者蓋秋冬之痢多屬寒

大全良方云有一境內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖當叅運氣之相勝亦不可狎泥當先審虛實冷熱首用敗毒散加人參甘草陳皮姜隨症用之

身重

身重不知穀味及下如豆汁者皆是足太陰脾經受濕也東垣升陽除濕防風湯升陽益胃湯和中益胃湯出蘭室秘藏濕熱中

腹痛

病機機要云腹痛者宜和劉宗厚云和之一字總言之耳因氣鬱結不行宜行氣開鬱扶寒者溫中湯大熱者黃芩芍藥湯積滯者木香導氣湯血虛者當歸芍藥湯亦有因肺金之氣鬱在大

腸之間以苦梗發之

丹溪云下痢腹痛用姜桂溫散之法如建中湯加姜是也

內經云寒氣客於小腸小腸不得成聚故腹痛後又云太陽病冬月感寒則泄當臍而痛是以今之用溫散者良以此也

仲景治痢不分赤白久新但腹痛甚其脈絃急或瀉浮大按之空虛或舉按皆無力以建中治之甚効

白膿

至機微義曰白屬肺金此氣受病也

統旨曰痢如凍膠或如鼻涕者為冷非姜桂之辛

熱莫効

丹溪方 治白痢 蒼朮 白朮 神麩 茯苓

地榆 甘草 水煎服

又方 治白痢腹脹飲水過度者 蒼朮 白朮

厚朴 茯苓 滑石 神麩 粉草 水煎食

前服飲食不思吞保和丸三五十九

蒼朮芍藥湯 痢疾痛甚者 方在泄瀉

戊巳丸 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹

刺痛 黃連 吳茱萸 白芍藥 右為末

麵糊為丸梧桐子大每空心米飲吞下三九

升麻去濕防風湯 如大便閉或裏急後重數至

圓而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之

升舉其陽則陰自降矣 蒼朮 防風

白朮 茯苓 白芍 右每服一兩先用蒼

朮以水一盞半煎至二盞納諸藥同煎至一

蓋空心稍熱服

胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或如豆汁

方在下血

溫中湯 治白痢腹痛飽脹不思飲食 蒼朮

木香 乾姜 炮各一分 厚朴 砂仁 青皮 芍

藥 炒各一分 加煨姜二片水煎食前服

又方治大人小兒白痢如魚凍 白鴨血用好酒

泡乘熱服下立止

赤膿

王機微義曰赤屬心火此血受病也

治赤白痢

香連丸 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急

後重 黃連 去芦二十兩 吳茱萸十兩 煎 木香

五兩不 右為細末醋糊為丸如梧桐子大每空

見火 心米飲下 秘法以生姜細茶濃煎吞下尤妙

導氣湯 治下痢赤白裏急後重日夜無度

白芍藥 兩 當歸 錢五 大黃 錢二 黃連 錢一

黃芩 錢二 木香 錢一 檳榔 錢一

每服一兩水煎食前溫服

木香枳殼湯 治痢疾裡急後重開胃腸進飲食

破滯氣散內熱 木香 檳榔 陳皮去白 黃

連 蓬朮煨 當歸 枳殼去穢炒 青皮去穢各

香附 黃栢各一兩半 黑牽牛取頭末 右為末

滴水為丸梧桐子大每服五十九或七十九

姜湯下如腫毒加至二百九

木香檳榔丸 治症同前 木香 檳榔 青皮

蓬朮 枳殼 黃栢 大黃各五錢 香附二兩 黑丑

取頭末 右為末滴水為丸梧桐子大每服五六

十丸白湯下

黃連阿膠丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重

臍腹疼痛口燥煩渴小便不利 阿膠炒二兩

黃連三兩 茯苓三兩 右黃連茯苓為末水化阿

膠為丸如梧桐子大每服三五十九米飲下

木香導滯湯 木香二錢 白芍 當歸 枳殼各

錢二 檳榔一錢五分 大黃二錢 黃連一錢

水煎食前溫服

純鮮血

傷風而下清血者宜祛逐之風傷肝肝藏血故下清血者為風也

右謂下痢純血者死此亦要看兼症及以脉叅之未必盡死于嘗治數人皆生方用佛手散加阿膠秦羌炮姜地黃黃連地榆蒲黃之類或以四物湯擇前所加藥一二味增入不必盡加也又不可純用寒涼衍義云有一男子患血痢醫用寒涼藥逆制專用黃連木香治之此藥始感便

用則可病久腸虛者不宜服戒之又云地榆性沉寒若惟下熱血痢則可用若寒人及水瀉白痢皆未可輕用

王好古曰血痢當服胃風湯膠艾湯之類

仲景治下痢便膿血者菹花湯主之丹溪云菹花湯為下血虛且寒者而用非乾姜之溫石脂之澁且重不能止其血也用糯米之甘以引入腸胃集驗方治血痢用乾姜燒黑存性出火毒為末每服一錢米飲下

黃連香茹飲 治感暑下痢純血

清暑益氣湯 治暑病內傷下痢不思飲食發熱

六合湯 治伏熱煩悶或成痢疾 俱見中暑
出附餘

已上治因暑下痢之劑

敗毒散 加石蓮肉 治下痢熱毒不進飲食

倉廩湯 即敗毒散加陳倉米姜朮 治下痢赤

白或先因寒邪中臟腑致發熱者

防風芍藥湯 治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴

及頭疼微汗 防風 白芍 黃芩 各四錢

水煎食前通口服已上治痢疾身熱者之劑

丹溪治血痢 乾姜 錢一 當歸 錢二 烏梅 錢三 黃

栝 錢一 黃連 錢三 水煎食前服或加枳殼

丹溪治血痢後重熱盛者 大黃 黃連 黃芩

黃栝 枳殼 當歸 白芍 滑石 薤仁

甘草 白朮 右各等分為末或作丸用麵糊

或神麴糊丸服 又云悞服熱藥及澁藥毒

氣犯胃者當明審以祛其毒

當歸導氣湯 治膿血痢無度腹中痛

當歸

芍藥

各一錢

甘草

五分

青皮

七分

槐花

生地

酒洗二錢

水二鍾煎至一鍾食前溫服

若後重加木香檳榔末各三分澤瀉五分小便

利去澤瀉

茜根丸

治一切毒痢及蟲注下血如鷄肝心煩

腹痛

茜根

升麻

犀角

地榆

當歸

黃連

枳殼

炒

白芍

右等分為末醋米糊為

丸梧桐子大每服七十九空心米飲下

潔古蒼朮地榆湯

治脾經受濕下血痢

蒼朮

三兩

地榆

一兩

右每服一兩水二鍾煎至

一鍾食遠溫服

丹溪青六丸

治血痢清濕熱補脾消瘀血用此

止痛活血消食酒糊為丸

方在泄瀉門

當歸芍藥湯

治血虛而下血痢

當歸

川芎

各一錢五分

芍藥

酒炒三錢

生地

黃連

酒炒

木香

各一錢

水煎食前服

黃芩芍藥湯

治火熱下痢膿血

黃芩

五錢

甘草

炙一錢

芍藥

炒三錢

水煎食前服

大黃湯 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日
夜無度久不愈者用此微利 大黃一兩 用好
酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃分為二服如
未止再服盡以利為度後服芍藥湯和之利止
再服黃芩芍藥湯以徹其毒也

劉宗厚云此乃陽明經蕩滌之藥用酒煎者欲其
上至頂顛外徹皮毛也

芍藥湯 治腹痛下痢膿血日夜無度裏急後重
是以行血則便膿自愈調氣而後重自除

白芍一兩 當歸一兩 黃連各五錢 檳榔 木香各二錢

桂五分 大黃三錢 黃芩五錢 甘草二錢

右每服五錢水煎食遠溫服如痢不減加大黃

劉宗厚云此行血調氣不熱之藥也大凡用藥之
雜與用藥之多者難以細分經絡當觀其大躰
如何此太陽桂枝例藥也

附禁方

木香散 治腹痛下痢膿血裏急後重 木香五錢

地榆一兩 黃連七錢 赤芍 青皮 枳殼 乳

香 甘草 各五錢 右為末每服二錢白湯下

延胡止痛散 治血痢疼痛飲食不進

延胡 炒 為末每用二錢米飲調下三服全愈

木香甘連湯 治血痢如神 黃連 一兩 甘草 二錢

木香 二錢 水二鍾煎至一鍾食前服先一日

預服五苓散三帖次早服此即止

又方 韭菜連根取自然汁和好酒一盞溫飲 怪驗

又治婦人心痛及治淋散氣行血故也

黃連烏梅丸 治濕熱痢不瘥 烏梅肉 炒 黃連

各四兩 淨為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下

車前湯 治熱痢不止及小便不利

車前子搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

已上治濕熱傷血赤痢之劑

苦參丸 治血痢 苦參不拘多少炒焦為末滴

水為丸如梧桐子大每服五十九米飲下

黃栢丸 下痢純血 黃栢蜜炙令香黃色一兩

為末每服三錢空心溫漿水調下

一方地錦草不以多少晒乾為末每服二錢空心米飲調下

川四物湯保命集治下痢 川芎 當歸 白

^標芍 生地 槐花 黃連 御米殼各等分 水煎服

^標皮丸 治痢清血腹中刺痛 樗根白皮 不

拘多少炒為末米醋糊為丸如梧桐子大空心米飲下三四十九

地榆散 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢

暑痢 地榆 赤芍 黃連 青皮去白 等分為

末每服三錢湯水調下血痢煎服

烏毒丸 治熱留腸胃臍腹疔痛下痢純血或服

熱藥過多毒蘊於內滲成血痢 烏毒肉二兩

黃連三兩 當歸二兩 枳殼去白二兩 右為末醋糊

丸如梧桐子大每服七十九米飲下

血痢極効方 當歸錢一 赤芍 地榆 黃連

生地 甘草 嬰粟殼各五分 石榴皮三分 水煎服

五香散 治血痢脉滑 五倍子炒焦存性 香白芷炒

等分為末每服二錢白湯調服一日三次

紫黑血

丹溪云其或下墜異常積滯中有紫黑血而又痛甚者此為死血証當以菝仁滑石行之或口渴及肛門燥辣是挾熱加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪者是挾寒即加干姜

下痢身熱舌黑下如煤色或去瘀血用犀角人參湯 犀角 人參 黃連 白芍 生地 甘草 丹皮 水煎服

臟毒下血

衍義云曾治洛陽一婦年近五十耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十度大便與膿血雜下大腸連肛門痛難任醫以治血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿又如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下稍服涼藥則泄注氣羸粥愈減服溫平藥則病不知將暮歲醫告技窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之

才一服二服減三服膿皆定自此不十服其疾
遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱
下痢膿血疼痛多日不差檉根白皮人參各一
兩為末空心米飲調下二錢忌油膩濕麵青菜
果子甜物鷄魚蒜等

槐花散 治血痢久不止腹中不疼不裏急後重

此臟毒也 青皮 槐花 荊芥穗

各等分為末水煎空心熱服

又方 治腸風血痢 鯽魚一具破開去腸膽入

白礬二錢燒存性為末米飲空心調下

逐瘀血 治赤痢血痢應驗如響病雖垂殆一服

即愈 阿膠麩炒成珠 枳殼炒 茯苓 川芎

蓬朮 白芷 木通 茯神去木 生地 生甘

草 赤芍 五靈芝炒烟尽 大黃 菔仁去皮

一錢五分 水鍾半蜜三茶匙煎七分去渣入大黃

仍煎一沸空心溫服

豆汁

陳無擇云傷濕則下如豆汁嚴用和云傷濕而下

豆汁者分利之劉宗厚云濕喜傷脾胃胃為五穀之海無物不受常兼四臟蓋豆汁之色如五色之相雜故下豆羹汁者濕也

泄痢作嘔

病機要云如痢或洩而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生姜橘皮中焦不和治以芍藥當歸下焦寒不和治以輕熱藥甚以重熱藥

劉宗厚謂亦有胃火冲上而嘔者有陰虛而嘔者有胃虛而嘔者有積滯毒氣上攻而嘔者

統旨謂痢而嘔者乃胃氣不和用生姜橘皮白朮湯因火上逆而嘔者加姜汁炒黃連胃虛加人參倍朮積滯毒氣上攻而嘔者木香導滯湯陰虛者四物加參朮芍栢陳皮下痢吃逆同治
噤口痢

百一選方云噤口痢是毒上冲心肺所致用石蓮子以通心氣便覺思食

玉機微義云痢而能食知胃未病也若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成噤口

之症理宜除胃口之邪熱而此云毒氣上冲心
肺其毒不知指何者之邪然亦有脾胃虛而得
者有悞服利劑毒藥犯胃者又有服瀋熱之劑
太早而邪氣閉遏於胃口者必當求責

丹溪曰禁口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參
二錢黃連姜汁炒一錢濃煎汁終日細細呷之
如吐再服但得一呷下咽便開又宜引熱下行
用田螺肉搗碎罨臍中入射香少許
又云黃連與參各一錢加砂仁三粒煎服

統旨云毒氣上冲心肺用人參茯苓石蓮肉入此
小菖蒲以通心氣胸次一開自然思食有脾胃
虛弱不能納穀用參朮以健脾胃或參苓白朮
散之類加石菖蒲陳倉米

濟世方云治痢疾不納飲食者謂之禁口痢以脉
症辨之如脾胃不弱而知其頭疼心煩手足温
熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上冲心肺所以
嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米百粒
姜三片束一枚水煎温服

又方加石蓮子白朮
仁丸妙

若其脉微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔
因服嬰粟烏毒苦澁涼藥太過以致聞食先嘔
者此乃脾胃虛弱用山藥一味一半生一半炒
為末米飲調下虛寒甚脉微弱者理中湯

治噤口痢 枇杷葉蜜炙一兩砂仁蜜炒五錢為
末蜜調抹口中噤下

石蓮肉 日乾為末每服二錢陳倉米飲調下便覺
思食或以受日陳壁土炒橘紅為末姜末各煎
佐之

又方 黃連半觔生姜四兩切片與黃連同炒待
姜焦黃色去姜只取黃連為末以陳米飯搗為
丸如梧桐子大每服七八十九赤者陳米飲下
白者陳皮湯下赤白相雜者陳皮米飲下

又方 獨核肥皂一枚去核用鹽填實其內火燒
存性為末先煮白米粥用少許入在粥內食之立効
又方 梨子一枚去心入好蜜一匙蒸熟食之

下痢吃逆 俗名發呃

丹溪曰吃逆病氣從下冲上屬火之象古方悉以

胃弱言之殊不知胃弱者陰弱也虛之甚也滯
下之久多見此症乃因久下而陰虛也詳見吃
逆本門
一人年五十質弱多怒暑月因飢索食不遂後得
瀉痢口乾七八日後發吃遂以人參白朮煎湯
調益元散數日安此虛熱之治痢倘未止者將
此藥蜜丸服之數日全止

下痢大孔痛

大孔痛暴病身熱或脉洪大此熱沉於下也宜清
之若久病身冷自汗脉沉小宜溫之

又方 治大孔痛熱流於下者檳榔木香黃連黃
芩加乾姜

丹溪治一人年二十性好酒色奉養過厚適有事
多憂恐患瘡發寒熱忽一日大發熱大便下皆
是積滯極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷入囁
付後事予曰此大虛也脉皆弦大而浮遂以瓦
片令敲如銅錢員樣燒紅投入童便中急乘熱
取起令乾以紙裹安痛處其時寒恐外寒乘虛
而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味

至半月而安又有用瓦片燒紅投入槐花湯照上用者久下赤白大孔痛不可忍炒鹽熨之又灸枳實熨之日華子云痢久大孔急痛亦有寒熱者熟艾黃蠟訶子燒薰之

治痢大便不禁其大孔開如空洞不閉者用花椒為末葱搗爛塞谷道中併服酸收澁腸之劑如御米殼訶子皮之類收之神効

痢疾肛脫

初起裏急後重脫肛此為邪壓大腸其氣不得宣

通而脫下也宜木香導滯湯內有木香續柳調其氣黃芩清上熱大黃下其積滯歸芍活其血而愈也

若用推積滯調氣之後而脫肛者此為氣虛宜補而升之

痢久氣血俱虛虛中有寒滑下不收者補中加溫澁之劑如真人養臟湯之類

有濕熱在大腸因裏急後重而脫肛者宜清之如保命集地榆芍藥湯之類是也

虛坐努圍

東垣曰虛坐而不得大便者皆因血虛也血虛則裏急加當歸身 凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努圍而不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐之

痢而小便少

劉河間治身發熱下痢赤白小水不利以益元散盪胃中積聚又泄熱從小便中出也
丹溪治一老人年七十面白脉弦數獨胃沉滑因

飲白酒作痢下血如淡膿水腹痛小便不利裏急後重以參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五粒第二日前症俱減惟小便不利以益元散服之安

糟粕不實

痢疾已愈惟糟粕不實此腸胃虛間或有濕參苓白朮散錢氏白朮散吞檗根白皮丸或訶子皮散菝花丸之類擇而用之異功散加肉豆蔻好亦
久痢滑泄不固 有寒有熱有虛