

積則截雖親之遺躰不忍毀傷然不如是則勢必至于夭歿非體親之心也况患處已壞雖解不痛又何憚而不為乎女子亦有此患多因鬱怒虧損肝脾所致治法與前同

○疔瘡

多生四肢發黃疱中或紫黑必先痒后痛先寒后熱也

夫疔瘡者皆臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血凝滯注于毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚

眼花蓋疔腫初發時突起如疔蓋故謂之疔含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在癰疽之上也內經以白疔發于右鼻赤疔發於舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在手足頭面及骨節間者最急其餘猶可緩也凡疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘刺令惡血出乃敷藥力方得入于針孔中則佳若

不刺破藥力不能入又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也諸疔名目雖多其治法畧同初起宜以針刺出毒血將蟾酥丸或迴疔錠子之類從針孔維入之上用膏藥貼之仍服飛龍奪命丹發汗及五香連翹漏芦湯之類并清心之劑蓋諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散而易愈矣

追毒丹

取黃去疔頭追膿毒立效

蟾酥

化用酒

蜈蚣

酒炙 硃砂

白丁香

各一錢無此味加巴豆

雄黃二錢 輕粉一錢 硃砂二錢 巴豆七粒 去壳
右為末用酒打糊為丸麥子大兩頭尖入於針破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追出膿血毒物又有如黑陷漏瘡者四圍死敗肉不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死肌敗肉生新肉愈矣小者用一粒大者加用之病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其敗肉為妙用之神驗

水沉膏 將白芨末放在盞內用冰沉下去用帛貼之如用膏不可用生肌藥 凡用粘点之藥用此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命丹 能立取效驗使腫內消

羌活 獨活 青皮 防風 黃連 赤芍

細辛 甘草節 蟬退 姜蚕 金線重樓

澤蘭 金銀花 各等分

有膿加 何首烏 白芷 要通利加 青木香

大黃 梔子 牽牛 毒在下加 木瓜 各等分

右每服五錢先將一貼加澤蘭金銀花各一兩生薑十片同藥搗爛好酒釀之熱服不善酒者水煎仍以酒水各一盞半生薑十片煎至熱服之汗出為度病退再加大黃二錢煎熱取利一兩次去餘毒為妙

此方以藥味觀之甚若不切然効速如神万不失一百發百中如有別証再出宜隨加減治之若心煩嘔吐加 甘草節 荒荳粉 酸漿 水下 嘔逆惡心加乳香荳粉甘草湯下

飛龍奪命丹

治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便

痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至寶病危者服之立安萬無失一係神人之秘方不可輕

忽血竭

錢一 蟾酥 乾者二 錢酒化

乳香 沒藥

銅元

硃砂

為衣各 錢三

雄黃

輕粉

寒水石

各一 錢

射香

冰片

各五 分

海羊

二十一 條 即蝸牛

蜈蚣

一條酒炙 去頭足

右為末先將海羊連壳研如塊

和藥為丸荒蓋大或加酒打麵糊每服二九

先用葱白三寸爛嚼吐于手心男左女右將藥包在葱內無灰酒三四盞送下避風處被蓋出汗約人行五里許再以熱酒數盞催之以汗出為度

服前藥二九即消如汗不出重者再服二九汗出即効三五日重者再進二九即愈如疔走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗碎裹藥以熱酒吞下服此藥後忌服冷水冷物黃瓜茄子猪魚鷄鷺羊濕麵一切發毒

動風之物不可食之及月婦狐臭人勿見之此藥活人萬誠外科是鑰

拔黃藥 用真取蟾酥飛羅麵為丸梧子大可將

一九放在面前舌下即時黃出

百二散 又名護心散 治發疔煩躁手足不往發狂者

急宜服之 方在癰疽門

蟾酥膏 治疔 新蟾酥以白麵黃丹搜作劑圓

如麥顆大用指甲爬動瘡上挿入重者針破瘡頭用一粒內之仍以水沉膏貼

回瘡錠子 治疔瘡大妙 草烏頭 一兩 蟾酥

巴豆 十箇 去皮 射香 一字 右為細末麵糊和就捏作

錠子如有惡瘡透疔不痛無血者用針深刺至痛處有血出以此推乏上用膏貼疔瘡四畔推

乏其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用 此

証大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砒射出

血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也

丙托連翹散 疔瘡出時皮色不變不疼痛按揉

不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕
 疔火疔諸般疔瘡如瘡黃于黃上用針刺仍服
 內托散自然消散 連翹 生地 白芷
 赤芍各一兩 大黃 山梔去頂 薄荷各七錢 朴硝二兩
 黃芩五錢 甘草一兩 每服一兩灯心竹葉各
 十莖水煎服其人喘加入參少許大病只三四
 服愈如服下心煩嘔者以護心散止之
 護心散 甘草五錢 藜蘆粉一兩 為末分作二次
 酸薤水下

破棺丹 治疔走黃不止 川歸 赤芍藥
 山梔仁 牽牛各二兩半 連翹 牡蛎 金銀花
 紫花地下各一兩半 京三稜 甘草各二兩 大黃三兩
 右為末煉蜜丸彈子大每服一丸童便化開服
 忌飲酒及生冷
 治疔走了黃打滾將死者 牡蛎 大黃 木通
 山梔子 金銀花 連翹 牛旁子 地骨皮
 乳香 沒藥 括萎 皂角刺 每服五錢壯
 實者加朴硝用水一盞酒半盞煎服 此乃救



命仙方也

鐵粉散 治冷疔瘡經久不効用此大妙

多年生鐵三錢 炒過 松脂一錢 黃丹 輕粉各五分

射香一分 右為細末清油調塗瘡口立効

走馬赴筵丹 治疔瘡 沒藥 乳香 蓬砂

硃砂 雄黃 輕粉各三錢 冰片一分 射香一分

右為細末蟾酥汁和為丸黃米大每服一丸温

酒送下立効

金砂散 取疔瘡道人頭微炒一兩 硃砂三錢

雄黃錢 蟾酥為以多 右將瘡四圍刺破以少

油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出

蒼耳散 治一切疔腫神効

蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒存性研

細末用好米醋米泔澄淀和如泥隨瘡大小塗

上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針

破塗之加雄黃丸妙

蒼耳與白堊研爛貼疔上拔去根 毒氣入腹嘔

吐者搗蒼耳汁飲之立効

治疔最有効用蟬退僵蚕為末醋調塗四圍晉瘡
口俟根出稍長然後拔去再用藥塗海藏方
單用姜蚕為末津調塗亦佳

治疔危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房能利大小便 蛇蛻一條 用瓦器盛

鹽塊固濟火煨存性研為細末每服一錢空心

好酒調下少頃腹中大痛止其瘡已化黃水

矣仍服后方

五聖散 大黃一兩 生薑 皂角刺 金銀花各二兩

瓜蒌一枚 甘草一兩 用好酒二升煎六分不拘
時服

治疔瘡最驗 蒼耳 臭牡丹 各一大握搗爛

新汲水調服瀉下黑水即愈 單用蒼耳葉搗

汁和童便服一日三次立効

肘後方 疔腫垂死者一服立効 菊花葉紫莖

一握搗取汁一升入口即活此神驗根莖葉花皆可用

蒼耳散 治疔瘡累用神効 蒼耳根三兩

烏梅五箇帶鬚葱三根用酒二鍾煎至一鍾熱



服出汗浚不散然浚用勝金散

勝金散 取鐵秀炒為末每服四錢或三五六錢

用齋水滾過停冷調服不吐為佳

○反花瘡瘡有努肉凸出者是也

聖惠方治諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末敷

之即縮

肘浚方 治瘡有肉突出烏毒燒灰敷五消

又方 白毒肉杵細入蜜捏成餅貼之妙

又方 馬齒莧燒灰研末猪脂調敷

瘡突出寸許根如小莖或大如梅者用花脚蜘蛛

絲纏其根則漸乾而自脫落

又方 甘草半生半炒 枯凡 人中白 密佉僧分

右為細末以童便半盞用無灰酒和熬竹篦攪

成膏塗瘡上日三五次

經驗方 胭脂各三錢 貝母各三錢 胡粉二錢 白礬砂

沒藥各二錢 為末先用溫漿水洗浚服藥

○雜瘡

諸惡瘡入心腹嘔逆藥食不下 荒荳粉兩半

乾胸脂錢三 定粉錢二 為細末新水調下效

天泡瘡通聖散及蚯蚓塊畧炒蜜調敷妙若從肚皮起者裏熱發外速服通聖散

天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮菘菜葉以蒜蘸啖之即止

人面瘡昔有人左膊有瘡如面歷試諸方惟浚以貝母為末水調灌之數日乃結痂遂愈

足指内生鷄眼子用鷄胃中食措之餘者以石

壓之立驗

天泡瘡小麥炒焦為末以生桐油調敷效若神速

治一切瘡疥神異膏 全虫去尾洗 蛇床子取末

皂角一錠 巴豆七粒 麻油一兩 黃膈半兩 雄黃研另

錢末三 輕粉五分 右先用全蝎皂角巴豆煎油

黑色去粗入蠟化開取出俟冷入雄黃輕粉蛇

床子末撈勻成膏每用少許搽瘡上須先以苦

參湯洗過絕妙

苦參湯 苦參 蛇床子 白礬 荊芥

各等分煎湯溫洗

治漏瘡不收口 五倍子末 血竭末填塞之効

治一切瘡 葵花散 葵花 梔子 黃連 黃柏

各等分 為末冷水調貼痛處

百合散 治頤頰瘡一名獨骨瘡 百合 黃柏

各一兩 白芨二錢 草麻子五十粒 為末朴硝水和餅

貼日三五次

面上耳邊生浸淫瘡久不愈出黃水名香辨瘡

殺羊鬚 荆芥 乾棗去核各二錢

俱燒存性研末入膩粉半錢每用少許清油調
搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効

亦治大人小兒兩脇生瘡

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛 附子半兩炮去皮臍

川椒去目 雄黃研末各二錢半 枯瓦七錢半

右為末麻油調敷瘡上日二次

白蒺藜散 熱毒瘡癢痒心神癢躁 白蘚皮

白蒺藜炒去刺 防風去芦 川大黃炒 赤芍藥

梔子 麥冬 条苓 玄參 桔梗 前胡

炙甘草各一兩 為末每服二錢食後薄苧湯調服

七寶散 熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃耆 川歸 防風 荆芥穗 地骨皮

木通各二兩 明礬一兩 每用一兩水煎五六沸去

粗稍熟漑淋患處拭乾避風 東垣此方曾治

推車客皮膚皴裂不在痛兩手不能執轆足不

能履地日製此藥與之即効明日遂行自是屢

用屢効

玉女英 治瘡痒痛 滑石五分 菴荳粉微炒四兩

右末之用綿包撲上妙 一方加東葉一兩

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人

血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水

連翹 生地 川歸 括萎根 荆芥 黃芩

赤芍 麥冬 瞿麥 木通 大力子炒 防風

山梔 川芎 甘草各一分 每服五六錢水煎

加灯心二十莖不拘時服

紫花地丁散 諸惡毒瘡腫痛如神

川歸 紫花地丁 大黃 赤芍藥 金銀花

黃菁各半 甘草根錢二 每服下兩水酒各一碗煎服

○水銀膏 月蝕瘡多在兩耳及竅邊隨月盈虛

水銀二錢 黃連末 胡粉 松脂各半 猪脂四兩

右先熬猪脂令沸入松脂諸藥及水銀攪令勻

磁器收先以鹽湯洗淨塗上日三五度

○治甲疽瘡氣礬散 綠礬燒赤 盧會一錢

射香二分 俱為末以絹袋盛包患指扎定以差

為度

○漆瘡 生鮮取黃塗之效

又方 湯浸法硝冷洗之效 明礬湯洗亦妙

又方 生紫蘇擦之累效 又人乳汁敷之好

又方 乾荷葉一斤水一斗煮濃汁洗瘡上日三

又方 無名異末水調服

○代指 手指甲頭腫痛

烏莓肉并仁 研爛醋調稀入指浸之愈

升麻和氣飲 治瘡腫癩疥痒痛

升麻 桔梗 蒼朮 乾葛 甘草 大黃煨

錢一 陳皮錢二 當歸 半夏 茯苓 白芷 乾姜

只壳分各五白芍半一錢右作一服水煎服

當歸飲子 治瘡痒疥癬濕毒風燥

當歸 川芎 防風 白芍 生地 蒺藜

荆芥錢各一何首烏 黃耆 甘草錢各一右作

一帖水煎食遠服為末亦可

除濕散 大治一切風毒疥癬癩痒狀如癩風

苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荊子 薄荷各二

白芷 烏蛇酒浸一宿焙乾天麻 川芎 防風各半

右為末每服三錢酒調下日進三次六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故

一掃散 一切瘡疥但相對而生者便是不問乾

濕痒痛日近年深用之立效

藜芦皮二兩雄黃錢五輕粉十帖蚌粉

水粉各一兩為末用大鯽魚一對入麻油煎熟

去魚攤冷調藥搽瘡若效遲加信末少許研

杏仁十粒近陰處勿加

消毒飲舟溪云消毒散氣表藥也防風一兩甘草二兩

荆芥穗三兩大力子四兩每服五錢水煎服

治皮膚風熱遍身生癩疹 大力子 浮萍等分
為末薄苛湯調下二錢且再

東垣云 每風瘡大風病相似好葉葉洗蒸一宿
日乾為末白湯調服二錢

姜蚕散 治風遍身癢疹痛疼成瘡

白姜蚕 洗焙

黃 為末每服一錢酒調服一日三

次立瘥

衍義方 有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連
腦脛臍腹及近陰處皆然涎痰多夜不得卧

苦參末一兩皂角二兩水一大升揉取汁銀石
器熬成膏和苦參為丸如梧桐子大每服二十
丸溫水吞次日便愈

小兒面瘡通面爛無完膚膿水流漓百藥不効陳
年臍猪脂不入鹽者敷之若神

治諸般瘡疥加減法 腫多加白芷開鬱 痛多
加白芷方解石 痒多加枯凡 陰囊瘡加吳
茱萸濕多香油調 乾痒出血加大黃連猪
脂調 虫多加蕪荑錫灰栝即藜芦斑猫 紅

色加黃丹 青色加青黛在上加通聖散 在下部多用瀉川丸下之 腳腫多出血加血分 濕熱藥

膿胞瘡 治熱為主帶燥濕 黃芩 黃連

大黃 各三錢 蛇床子 寒水石 各二錢 黃丹 五分

白礬 錢一 輕粉 白芷 無名異 各少許 木香 少許

痛者 加 為細末麻油調搽

虫瘡如癰狀退熱殺虫為主 乾疥瘡開鬱為主

加吳茱萸 蕪荑 黑狗脊 殺 樟腦 錢一

松栢 頭上多 白礬 雄黃 硫黃 水銀 殺

黃連 方解石 分 蛇床子 定痒 松皮灰 膿

及柏油調搽 濕多加之

疥癩瘡春天發焦疥開鬱為主不宜孤破

枯凡 吳茱萸 各二錢 樟腦 分五 輕粉 帖

寒水石 半二錢 蛇床子 錢二 黃栢 大黃 各錢

硫黃 錢一 楨柳 錢一 右為末猪脂調搽

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡 后復發取羊蹄根去皮細切熬熱以大酢和先

洗淨傳上一時再以冷水洗之日一傳瘡若為
朱傳尤妙

外臺秘要治疥取羊蹄根和猪脂塗上或着鹽少
許即結痂愈

千金翼 治遍身風痒生瘡疥茵陳煎濃洗立効
衍義云有久患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤
甚至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍
以苜蓿三斗剉日乾之為末布席上使恣卧其
間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五

七日其瘡如失應手神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱大煎末水敷瘡上乾
則易之

外臺秘要 治卒發疥秘驗方 風化石灰和醋

漿水調塗隨手即減 一法用石灰炒紅出火

氣香油調敷 千金方淋石灰汁洗之

木香散 一切惡瘡多時不斂此能生肌肉止痛

木香 檳榔 黃連 各半 白芷 錢三 為末先

洗每日一次乾搽有水出勿訝未効再搽 又

方加地骨皮先于瘡上用溫漿水洗溫拭乾上
藥妙不可言藥治下疳瘡如神

洗諸瘡疥取冬瓜藤或皮煎湯洗妙

治風癩瘡黃水瘡此方神效

用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層數層
至滿以稻糠皮火煨之於火盆內週圍固火煨
竹筒內汁滴出以盞接之搗納蘸掃於瘡上數
日即愈

神仙活命飲 治一切惡瘡瘰癧腫毒

川山甲 蛤粉炒黃 貝母 去心 甘草節 分六

防風 去又芦 沒藥 分六 赤芍藥 分六 白芷 分五

當歸尾 錢一 乳香 錢一 天花粉 分八 金銀花 錢一

陳皮 錢三 右作一服用無灰酒一大碗慢火煎

令出氣量上下食前後服如患人不能飲酒者服

藥後隨意飲三兩杯為妙詳曰

真人妙訣世間稀 一切瘡疽總可醫

消腫如同湯沃雪 化膿立見肉生肌

消毒散 治一切惡瘡赤腫疼痛掃之如神

黃連錢五 地骨皮兩一 朴硝兩三

右為末每用三五分水一盞煎至七分去渣停冷用鷄翎掃之立效

○婦人陰瘡

仲景云少陰脉滑而數者陰中即生瘡狼牙湯洗之狼牙二兩水濃煎以綿纏筋頭浸湯瀝洗陰中一日三度

治陰蝕瘡 洗塌散

甘草兩一 乾漆兩一 黃芩 地黄 當歸

芍藥各二兩 龜甲五兩 右細切以水七升煮取

一半去粗以綿帛納湯中用榻瘡處良久即易

日二度每榻湯可作十里許即挹乾捻取甘濕

散薄敷瘡上使徧可經半日又以湯榻之訖如

箭敷藥 有二婢此疾蝕處作兩瘡深半寸用

此湯并浚甘濕散不經七日平復甚效

甘濕散 蚺蛇胆 青木香 硫黃 鐵精

射香隨時加入綠射碎蛇毒

取一錢并花水調日再服先令便利了即以浚



方莖枝薰下部訖然沒取藥如碁子安竹管內
入下部中日再度

莖枝薰法 取東南莖枝五七枝將枝頭輕敲碎
綿纏之蘸硫黃末數轉令厚又截一竹筒先入
下部中却將莖枝藥燒着入筒內薰之

仲景云蛇床子散濕陰中之主藥

蛇床子仁為末以白粉少許和勻相得如束火
納入戶中自然濕散

莖胚散

陰蝕瘡

荒莖粉

蝦蟇灰

各二錢半

胆脂胚二錢 右為細末乾摻

沐浴長春散

男子下元陰濕久冷陰囊左右夜

痒抓之則喜佳之則痛成瘡流水為害甚苦此

方極効 及治婦人陰濕子宮久冷

牡蛎 蛇床子 破故布 紫梢花 乾荷葉

官桂各等 每用一兩半水一小鍋入葱白數

莖煎八分先薰後洗却用後津調散

津調散

治妬精瘡婦人陰濕瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

款冬花

各等分

射香

少許

為細末或先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津調敷之 忌生湯洗

妬精瘡 青黛 欵冬花分射香少

為末先以紫白皮地骨皮煎湯洗軟帛拭乾津唾調末藥敷

婦人玉戶疔瘡 及小兒走馬牙疳

活蜘蛛一枚以生薄荷葉或乾者包蜘蛛燒存性為末酒調服之妙如小兒走馬牙疳以此搽之效

搽之效

○癬

丹溪云初起發熱者防風通聖散去稍黃加浮萍皂角刺

羅太無何首烏散 治脾肺風毒攻腫遍身癬變

成癢疹搔之成瘡或有背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫白癩風頑麻

風症

荆芥穗 蔓荊子 歲靈仙 何首烏

炙甘草 防風 車前子 各等分為末每服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

一錢食後溫酒調下白湯亦可

癰在頸項間后延上至耳成濕癰他治不應以芫
會一兩甘草半兩和勻先用溫漿水洗癰拭乾
敷之效

一方 芫會 大黃 輕粉 雄黃 蛇床子

川槿皮 楨即 為末先刮破癰醋調塗之

乾癰積年生痂此搔之黃水出每逢陰雨即痒用
狼毒末塗之

栢脂膏治乾癰 栢油斤一 黃騰斤半 杏仁四十五粒

朴硝一抄 右件鐵器內用老生姜葱白三根一

順撓五七次煎沸瀝過成膏搽之

又方 山荳根末臘猪脂調塗之

祛濕散 多年濕癰大有神功 蚕沙四兩

薄荷半兩 為末摻之或用生油調搽

羌活膏 治頑癰疥癩風瘡成片流黃水久不瘥

羌活 獨活 明瓦 白蘚皮 硫黃 狼毒

各一兩 黃丹 白附子 蛇床子 輕粉

二錢 為細末油調成膏搽之

八宝散

治風癩松皮頑癬久不瘥神效

藿香 棋郎 破故布 大腹皮 雄黃

輕粉 硫黃 枯丸 各等分為末油調搽日

三五次瘥即搽之

香疥藥 治風疥癬瘡黃水瘡牛皮癬

輕粉 水銀 樟腦 各三錢 大風子 四十枚

川椒 四十粒 杏仁 二十粒 柏油 對 為細末疥

用絹包於瘡上熨之黃水瘡乾搽神效

一 抹散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭 各用生者一枚 為末以羊蹄根搗

取汁調塗不過三次妙絕

牛皮癬及久年頑癬神方

紅粉霜 五分 明凡 一錢 密陀僧 三錢 川槿皮 一錢

杏仁 一錢 去皮油 為末津唾調搽一日三次三日愈

脚瘡皮厚如癬或流黃水黃水延處即爛浸淫年

久不愈者 此方屢試屢驗瘡癬俱佳

紅棗二枚去核將皂礬一錢納棗中以苧麻緊

扎用好酒二碗慢火煮成膏不要攪動膏成去

更不用以膏塗患處二三次全愈 若浸淫瘡
初塗時畧疼少刻便止其瘡就結乾痂妙甚

○臙瘡

夫臙瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之
傍灌於陰交之側風熱毒氣流注而脚生瘡腫
爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於臙骨為重以
其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已口開
濶皮爛肉現臭穢可畏治法當先取蟲然後敷
藥如隔紙膏麝香輕粉散之類須翹足端坐勿

多行履庶可全愈矣

隔紙膏 治內外臙瘡 當歸 白芷 黃連

五倍子 雄黃 沒藥 海螵蛸 血竭

白芨 白欽 黃蘗 厚朴已上各 黃丹

乳香二錢半研 輕粉一錢 右為細末用清油紙貼

藥敷瘡上給帛縛定有膿水解開刮去不緊再
貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛
拭乾待片時水氣乾然後貼藥

又隔紙膏 專治臙瘡如神務要用絹帛縛得着

實貼肉方好過兩日取抹淨翻貼之

滴乳 沒藥各二錢 黃丹炒紫 降真香灰各兩

已上俱另為細末 真黃蠟一兩 真蜂蜜一茶

右將黃丹入銅鉢內炒紫色次下降香灰末攪

令勻却下蜜黃蠟另熬化傾入油蜜攪令極勻

然後下乳香沒藥輕粉片腦再用銅匙攪之又

勻待藥稀稠得所取出磁碗收盛勿令泄氣臨

用看瘡大小攤之油紙綿紙尤佳竹帛不耐藥

在中紙在外翻覆貼之

治臙瘡久不愈

龍骨二錢

乾猪糞半兩 燒

輕粉少許

棋榔兩半

乳香

沒藥各一錢

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清

油調敷瘡濕則搽之

秘傳隔紙膏 治年月深久臙瘡不愈者

老松香 樟腦 谷丹炒 水龍骨即旧瓶

輕粉 久不愈加 白芷 川芎 海螵蛸

總為細末溶化松香加少清油和之以油紙隨

瘡大小糊袋盛藥夾之用水洗淨縛在瘡口上

二日定四日一換若單用白芷川芎蜈蚣三味煎水洗之立効

屢驗方 枯凡錢 墨煤煉存性 研勻以生桐

油做隔帛膏貼之先以五倍子川椒葱三味煎湯洗拭乾貼藥一日一換七日全愈

又方 治似臙非臙 蜂蜜四兩 嫩松香一分

先將蜜熔滴水成珠次入松香末攪勻如上法做貼洗亦同

又方 麻油二兩 熬至滴水成珠又將蜂蜜四兩 熬

至滴水成珠將油換入又將伏龍肝四兩 為末入內攪勻成膏先將瘡洗淨以膏塗之一日二次其効甚速

又方 冬青葉 臙猪胆 百草霜 二味和勻

將冬青葉與本人嚼爛先將瘡用椒葱湯洗淨乃以胆霜敷後却敷冬青葉三四次便愈

粉麝散 治內外癩臭爛數十年不愈者

生龜一枚 去肉取壳醋一盃炙醋盡為度煨令白烟尽存性以盃蓋在地上出火毒為細末

入輕粉射香拌勻臨用先以葱水洗乾敷藥妙
絕妙絕

又方 新起未久者甚好 玉簪花葉小便浸貼

一日一換五日愈


諸凡瘡毒惡瘡多年臭爛成坑不收口者此方極

佳一七成功 乳香 沒藥各五錢 天靈蓋煨一兩

右為極細末摻之神靈鮑清溪之子患痘沒腦

瘡肉爛成坑骨露不收口百藥無功敷此立效

大宮詹少溪吳馭閱校 終



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

赤水玄珠外科第三十六卷目錄

便毒

楊梅瘡

杖瘡

吠咬

風犬咬

蛇傷

瘰癧門



附馬刀

下疳瘡

金瘡

箭傷

砲傷



凍瘡

馬咬 猫咬 猪咬

人咬

瘦 瘤 結核

腸癰門 胃脘癰

痔漏門

湯火門

顛撲損傷門

癘風

終

赤水玄珠外科第三十六卷

新安生生子孫一奎著輯

○便毒 ○疝瘡 ○楊梅瘡

夫便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智也男女太慾不能直遂其志故敗精搏血番聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸暴而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能志

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

生生子曰按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固一說而意猶夫完果如此論當僧尼孀婦官人曠夫多有此患然予目擊商賈中野合不潔淫媾便搆此疾或疝瘡或楊梅者亦由慾火內熾一旦交合不潔為淫火沖動膚腠開通是

以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不苟且便可奏功若曾已發汗利小便躰厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後着也此予歷試良驗特

附子斯

○便毒之劑

退毒散 治便毒腫結 穿山甲焦醋炙 五錢

木猪腰子醋微炙 三錢 為末每服二錢食前老酒

調下 次以醋煮肥皂研膏敷之妙木猪腰子即木猪腰子

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯

腫結痰痛上

桂皮 川大黃 白芍藥 澤瀉 牽牛炒取頭末

桃仁去皮炒 各二錢 甘草一錢 分做二帖 生姜五片

煎食前日二服先小便快熱從小便出後大便利皆是稠毒

敷藥方 治便毒腫痛 雄黃 乳香各二兩

黃柏一兩 為末新汲水調敷腫處自消

括篋散 治便毒等惡瘡 括篋一箇去皮

牛旁子炒 金銀花各三錢 生姜 甘草各半兩

右忌銅鐵器槌碎以酒一大碗煎數沸空心溫服微利為度

服微利為度

三物湯 治便瘡 牡蛎 大黃 山梔子各等分

為米酒水一大盞煎七分空心温服露一宿妙在
 四神散 治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神效
 大黃 木鱉子 姜蚕 貝母各二錢半
 用酒水各一鍾煎至一鍾食前熱服若得汗下
 為妙

止痛妙絕飲 治便毒腫硬不消不潰疼痛無已
 此方一服立能止痛

人參錢五 大黃錢五 酒水各一鍾煎至一鍾入
 乳香沒藥末各一錢空心食前服

曾經瀉後而痛腫如故者此胃氣已弱但當補托
 胃氣使氣血充實邪乃消釋已潰者亦以此補
 之生肉

人參 黃耆各一錢 粉草分五 防風分五 柴胡
分五 當歸錢一 赤芍分五 桂枝分四 白芷

立消散 消便毒癰腫如神 全蝎炒
 楨朮去壳肉只用隔膜炒 等分為末空心酒調下三錢
 下午再服三日全愈

消盡五聖湯 治便毒腫疼神效

五靈脂 白姜蚕 鬱金 貝母 大黃各三
酒水各半煎服連服三帖立愈

○下疳之劑

七寶栴檀散 玉莖疳瘡或漸至蝕透久不愈者

栴檀 密佉僧 雄黃 輕粉 黃連 黃柏

朴硝 各等分為末先將葱白漿水洗淨軟皂

搥乾如瘡濕乾搥如乾少油調搽

玉粉散 疳瘡痛不止 密佉僧 寒水石煨

滑石 各半

膩粉

射香

各少

右為末油調

敷濕則乾搽

金銀花散 治下疳 金銀花 荆芥 朴硝

蛇床子 甘松 白芷 栴檀 每用五錢水

煎加葱白二根數沸盆盛先薰後洗一昕上藥

敷藥 妙方 多年墻上白螺壳炒竹甞骨等分

研極細每一錢入梅花片二厘敷此藥就不痛

先以川椒芽茶飛鹽煎湯入小口瓶內將玉莖

插入瓶中先薰後洗

治下疳 象皮燒灰存性如乾用油調敷瘡上
補遺蛙幹瘡 用黑油傘紙燒灰出火毒傳于瘡
上便結靨甚妙

治外腎陰瘡 抱鷄蛋壳 黃連 輕粉
各等分為細末用煎過清油調敷

楊查瘡之劑

初起者宜清表之 荆芥 防風 升麻 葛根
甘草 川芎 蟬退 當歸 柴胡 酒芩
連翹 白蘚皮 皂角刺各八分 猪胰子二枚

先以土茯苓四兩煎湯後煎前藥七日見效

又方 癩蛤蚧三隻去腸雜入雄猪肚內苧麻扎

縛水煮極爛食之蛤蚧亦所食三五次除根

又方 嫩羊七八斤一隻者如常宰治去腸雜

以土茯苓一斤槌碎入腹中苧麻縛定水煮極

爛听食湯准茶淘飯絕妙服此後其毒皆發

出頭面俱腫五日後自消七日全愈

神應散肥皂煨燒存性五錢另研為末

荆芥 何首烏 天花粉 防風 苦參

各一 薄荷葉錢五 共為末 每日用新鮮白
 土茯苓八兩 雄猪肉四兩 入前末藥五分 核末子一分 共用
 水七碗煮爛去渣其肉听食湯准茶服 不過十
 且全愈再無他餘症 如善肉者可作大劑與
 之

擦藥方 極佳 水銀 明凡各一 杏仁
 大黃各二 膽凡錢三 俱為細末用香油拌勻
 擦手心脚心前溪心每日擦三次不可見風擦
 至七日口中熱氣出或喉嚨作疼乃藥力到也

以淡解毒藥二帖除根 防風 荆芥穗
 牛旁子 玄參 生地 連翹 黃芩 黃連
 大黃錢三 白蘚皮各一 土茯苓兩四
 水六碗煎三碗不拘時服
 點廣瘡方 杏仁去皮 真輕粉各一 雄黃
 辰砂各五分 為極細末以雄猪胆汁調搽一日
 三次三日愈

楊梅瘋 十年二十年筋骨風泡腫痛
 土茯苓斤三 川椒錢二 甘草錢三 黑鉛斤一



青藤錢三

右以好酒入埕將藥用袋盛煮服之

洗楊梅瘡方

臭梧桐 野菊花 金銀花

三味煎湯入旧馬桶內熏之一日二次有痔漏

加枸杞子

楊梅瘡并楊梅風方

川歸 防風 牛膝 羌活 甘草 木瓜

金銀花 皂莢子 熟地 川芎各一錢

土茯苓四兩水五鍾煎三鍾分三次服

加味遺糧湯 治楊梅瘡風毒及候服輕粉癰瘡

筋骨疼痛不能動履者服此除根

防風 木瓜 木通 以仁 白蘚皮

金銀花各五分 皂莢子四分 如虛弱加 人參

當歸各七分 土茯苓二兩即仲遺糧也右以水

煎空心服一日三服輕者十日可愈重者必四

十日痊

○楊梅漏

豬蹄子湯 治楊梅漏 牙皂去皮 麻黃

防風 連翹 地黃各三分 牙硝一分 土茯苓



雄猪前蹄一隻水三碗同藥煮熟听食湯亦盡喫半月全愈

又方 皂角

錢五

金銀花

錢五

土茯苓

兩四

大肥皂煨燒存性為末每用三厘煎藥煎熟調

膏藥

猪油一兩 熬去渣

加香油

錢三

同熬

燻火稍

冷加乳香沒藥各五錢攪勻再入孩兒茶七錢

攪勻又入冰片一分輕粉五分射香一分待冷

做膏藥貼之

十全大補湯加防風與前方相兼服之庶虛弱者

易收功也凡漏瘡膿水既多故屬不足治宜補養為先

○金瘡

治金瘡血不止 半夏 風化石灰 鬱金

右為末摻上血即止

又方 以風化石灰菲葉嫩者同搗入蠶血調和成餅風處陰乾為末傳之血止亦無痕若無蠶血亦可

崔氏 療金鎗刀斧傷破血不止

風化石灰一升千葉紅石榴花半斤搗成餅如
上法陰乾為末摻之

潔古 刀箭傷 乳香分五 沒藥分三 俱為細末
摻之極能止血止痛

又方 生晚蚕蛾風化石灰二味搗勻成餅陰乾
為末傅之極能止血生肌定痛

本事方 治金瘡血不止 血竭為細末摻之立
止生肌

華佗方 治惡瘡金瘡刀斧傷

上好降真香為末傅之入水並無傷痕絕妙

鬼遺方 治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩
為細末白米飲送下方寸七日再服

杖瘡

鬼代丹 受杖不痛 無名異 乳香 沒藥

地龍去土 自然銅煨醋 木鱉子去壳

各等分煉蜜為丸彈子大溫酒化下共一丸任打
不痛

乳香散 治杖瘡神效 自然銅醋淬七 乳香

沒藥錢各三 苗香錢四 當歸錢五 為末每服五錢溫酒調下

若受杖後腹中痛或發熱及杖瘡痛甚如火以鷄鳴散下去惡血立愈

潔古沒藥散 治杖瘡止痛極佳且令瘡不移

密佗僧 乳香 沒藥各一兩半 乾胆脂一兩

膩粉兩半 為細末入毒花水片一錢或五分燒

葱與全羊骨髓同搗研如泥攤在緋帛上貼之妙

又方 生地黄 黃栢 童便加菲菜汁調敷

又方 不破者 以菲菜葱頭杵貼冷即易之

膏藥用紫荆皮乳香沒藥生地黄大黃黃栢之類

又方 用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗碎

敷上神效傷重者多用鹽

杖瘡丹 此方佳妙不可言 劉寄奴末六錢馬

鞭草末四錢蜜調敷如潰者乾搽之

丹溪云 杖瘡用黃栢生地黄紫荆皮敷此皆要

藥也若血熱作痛宜涼藥去瘀血為先須下鷄

鳴散

○凍瘡

張子和曰經云寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大瓊錢厚量瘡大小貼之以艾火加于餅上灸之不計壯數以坭乾為度又易濕餅子灸不拘多少直灸至瘡痂竟痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子于瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也用軟

皂拭乾以木香煑即散敷之如夏月醫之更妙治凍瘡用茄根燒灰淋水洗淨再用雀兒腦髓塗之

又方 用蜜佗僧為末以煎熟桐油調敷羅太無如神散 治凍瘡皮爛不可忍

用川大黃為末新水調掃凍瘡上痛立止張子和治女僮足有凍瘡令服舟車丸濟川散大下之遂愈人或疑之戴人云心火降則寒消何疑之有

NTRA

圖書

香

香

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

冬月脚折皮裂行步疼痛 以温湯洗拭乾將黃
蠟一兩融化投松香末三分攪勻每用少許安
刀頭上融化滴入折中經宿即愈神效
又方 五倍子為末以牛骨髓填縫內即好
治脚指縫爛瘡 搨穢時取穢掌黃皮燒存性為
末濕則搽之

○犬咬

凡犬咬須以人尿洗淨以頭垢傳傷處又用熟牛
糞塗于外

衍義方

用杏仁爛嚼罨傷處以帛縛定立好數
數驗過 紫蘇葉嚼碎塗之亦好

又方先以鹽水洗用草麻子去壳以井水研成膏
貼傷處 虎骨膏敷之亦好

又方 黃荊葉罨瘡上即安

又方 煨生姜乘熱擦之尤妙

犬咬破傷風腫 人參於桑柴火上燒成灰傳之
良愈

羅太無蟬花散

治夏月犬傷及諸般損傷蛆虫

極盛臭惡不可近者 蛇退皮燒存性

蟬蛻錢五 青黛錢五 細辛半二錢 右為細末每

服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如
犬咬傷用醇子和服其蛆皆化為水繩子不敢
再落其上又以寒水石末乾摻上

○風犬咬

羅太無定風散 治風犬咬先口噙漿水洗淨用

綿拭乾貼藥更不再發大有神効

天南星生防風分 為細末乾上再不潰膿功

難盡述

濟世方 治風犬咬用桮莖壳半箇將野人乾糞
填滿以榆皮蓋定罨於傷處再以艾於桮莖上
灸之二七壯即愈永不復發 或用野犬糞灸
仍拔去頂上紅髮

癩狗咬方 用斑猫七枚去頭足翅以糯米少許
於新瓦上同炒以米黃香為度去米不用以斑
猫研碎好酒調下能飲酒人再進一盃看傷上
下服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未

下次日再進如又不下又進之以毒物出為度
若進至七服雖毒不下亦無害矣服藥後腹中
必不安小便莖中刺痛不必慮此毒為藥攻將
下耳痛甚者以蕪菁一匙煎甘草湯送下即止
如無蕪菁之黛亦可疾愈後急以香白芷五錢
雄黃二錢半為末搗韭根自然汁湯酒調下去
班猫毒以水淨漱口嚼生葱白罨傷處留小竅
出毒氣不可用他草藥罨忌犬猪羊及發風毒
物小兒量歲數加減 班猫能治食癩狗肉致

病者治同即愈或過二三年再發治亦如前
治癩狗所傷用班猫二十一枚去頭翅足用稞米
一勺先將七枚入米內微火炒不令焦赤去此
班猫換新班猫七枚入前米內炒令班猫色變
復去之又換新班猫七枚如前法炒以米出青
烟為度去班猫不用以米為末以冷水入清油
少許空心調服頃又再進一服以小便利下惡
物為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急以
冷水調青龍服之以解其毒否則有傷或煎黃

連水亦可不宜便食熱物或以益元散水調服
解之尤妙

又方 取小兒胎髮炒香為末傳用野菊研細酒
調服盡醉立效

又方 治癩犬所傷或經久潰發無藥可療者用
之極驗 雄黃錢五 射香分五
研末勻用酒調二錢服如不肯服者則搯其鼻
而灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒
候利下惡物再進前藥則見效矣

風犬咬後毒發如狗叫者百方不治于化人場中
取頭頂骨燒末敷之立愈

風犬咬毒發如狗叫百方不應者以人骨燒末之
水下方寸匕雖煩亂者亦效

又方 治風犬咬不急治則生小狗必殺人
雄黃 蟬蛻 等分為末調敷傷處立愈

虎傷人生葛根汁服妙并洗傷處 或用白礬末
納瘡口痛立止

馬咬 薄荷汁塗之妙

猪咬 松脂熔作餅貼之 或以黃連甘草煎湯洗立効

○箭傷

劉寄奴散 治箭傷及金瘡口用此並無疤痕右劉寄奴為極細末搽之

又法 治箭鏃傷及金瘡傷

松樹老懸皮生為末風化灰煉紅和勻傳之收口止血神効

又法 治毒箭傷破欲死者 藍汁敷之如無用

靛青搽瘡口立効

又法 葉葉陰乾為末若急用焙乾亦可搽刀箭傷處佳

布智兒從元太祖征回回身中數矢血流滿膝太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血內移時遂甦

李挺從伯顏征郢州砲傷左脇矢貫於胸幾絕伯顏令剖水牛腹納其中良久甦 上二治出元史諸方書無載特揭附此

○蛇傷

毒蛇沙虱所傷眼合口噤手足強直毒已入內急
用蒼耳草研汁和酒服渣厚敷患處

又治毒蛇咬 急取癩蝦蟆搗爛敷上帛縛之

又法 治蛇悞入人口中不出 用刀急破開蛇

尾將川椒一粒入內隨即裹籠縛之須臾就出

人咬傷

治被人咬破指頭痛不可忍久則爛脫手指并手
掌諸方書所不載 急用人尿入瓶將患指浸

在內一宿即愈 如潰爛者用剋蛇龜壳燒灰
敷之 若無龜以蟹壳燒灰敷亦可

○癰瘰門 ○附馬刀 ○瘦 ○瘤 ○結核

癰瘰者結聚成核初如草粒漸成梅李累累相連

大小無定結於頸項夾喉之間增寒壯熱強痛

腫硬不消有風毒熱毒之異其候多緣忿怒氣

逆憂思悒鬱所致初覺便當服散腫潰堅湯或

五香連翹湯漏芦湯之類散之或用大黃牡蠣

湯踈利三兩行瘡上可用十香膏之類貼之及

諸淋洗敷貼等藥治之庶得消散若不散可服
內消丸消之或隔蒜灸之

馬力瘡亦生於項腋之間下脇延及陰勝形如瘰
癧而長於瘰不可認作流注治之皆肝胆怒鬱
之所致也俱當清肝胆之火調氣開鬱以鹹軟
之劑附之繼以養氣血流動經絡之劑收功不
可徒務班猫等毒劑攻逐致成癆怯慎之

柴胡連翹湯 治男婦瘰癧馬力瘡

柴胡 連翹 知母 黃芩 黃柏
酒炒 酒炒 各五錢 酒炒 各五錢

生地 炙甘草 中桂 大力子
各三錢 各三錢 一分 一錢

瞿麥穗 川歸尾
六錢 一分

右剉如麻豈大每服三錢或五錢水二大盞煎
至一盞去渣食後熱服

薄苛丹 解瘰癧風熱之毒自小便出毒後常須

服此

薄苛 皂角 連翹 蔓荊子 荊芥
不蛀者 去絃皮 各一兩

京三稜 何首烏
煨 米泔浸 各一兩

右為末好豉二兩半以米醋煎沸灑豉淹令軟