

奇効良方

五十七

脫肛門	腸澼痔漏門	瘡冷門	疝門
癰風門		諸血門	積熱門



奇效良方卷之四十七

疝門 附論

巢紙病源論疝者痛也其名曰厥曰癥曰寒曰盤曰氣曰附曰
狼比七者疝之名也其厥逆心痛足寒諸飲食吐不下曰厥疝
腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂曰癥疝因寒飲食即脇下腹
中盡痛曰寒疝腹中乍滿年減而痛曰氣疝腹中痛在臍旁曰
盤疝腹中臍下有積聚曰附疝小腹與陰相引而痛大便難曰
狼疝其證發則可驗又有石疝血疝陰疝妬疝氣疝此五者有
名而無形也外有心疝寒疝飢疝疝癖數者其名不同病則大
同小異世俗呼爲小腸氣膀胱氣奔豚氣蟠腸氣橫弦豎弦偏
墜木腎腎餘陰腫由疝之爲病其名別也至於張子和論七疝

曰寒疝水疝筋疝血疝狐疝氣疝癩疝名與諸論不同且如癩疝者外腎堅腫也痛者為陰腫不痛者為木腎一邊墜下者為偏墜

十字語重今刪

靈樞經云邪在小腸連臑係屬腎

貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也內經又云任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脉逆為氣裏急然則任脉雖稱病有七疝之名而無七疝之狀則任脉者是疝病之本源各經是病疝之支流也又云厥陰脉滑為狐疝少陽脉滑為肝風疝太陰脉滑為脾風疝少陰脉滑為心風疝太陽脉滑為腎風疝陽明脉滑為肺風疝此風非外入之風乃肝水陽藏氣動之風也此六疝者應乎六經在於五臟何謂疝病皆屬肝病生於陰起於下陰者內之太陰脾厥陰肝少陰腎皆足之陰經也下者地之

寒氣也足常履地蓋天之風寒皆入於地人之風濕皆從足起或因經虛聚於胞囊小腹兩陰相併二氣相搏則為疼痛矣或冷飲過情水流歸腎或坐卧處濕寒搏留陰以寒攻陰則為疝痛經曰痛者通也疝氣作痛宜通不宜塞宜溫不宜寒通謂瀉其實不瀉其虛塞謂補其虛不補其實實者邪氣也虛者正氣也若正氣虛極則先溫而後瀉若邪氣盛極則先瀉而後補溫者必兼於氣瀉者必兼於寒寒則入於經而導其邪溫則踈其氣養其正也大凡內外之氣交入於腎者為腎氣入於膀胱者為膀胱氣入於小腸者為小腸氣腎與膀胱為藏府其氣相通運為外腎系於臑丸此三經乃相連相會者也其脉當以弦緊弦則為寒緊則為痛從寒則痛從濕則腫疝而不愈邪氣留滯

結成積聚而為疼痛或脇左右如杯或臍上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜卧飲食不為肌膚腹滿嘔吐醫者當臨期審察若因七情而得者當調其氣安五藏外邪相干者散濕祛寒為先去邪之實補肝之虛則亦愈矣

疝氣通治方

聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰脇連背不可俛仰

方見氣門

蟠葱散 治男子脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹痛連脅脇膀

胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

方見氣門

五積散 治體虛冷膀胱小腸氣作痛不可忍每服一兩入鹽

炒吳茱萸茴香各一錢生薑三片葱白五寸煎空心熱服

方見寒門

桂枝烏頭湯 治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身體疼痛風

入腹五臟拘急不得轉側

大烏頭炮去皮臍 桂枝不見 白芍藥

甘草炙各二錢

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗二枚入蜜半匙同煎

至一鍾去滓食前服

益智仁湯 治疝痛連小腹攣搐叫呼不已診其脉沉緊是腎

經有積冷所致

方見氣門

玄附湯 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗

玄胡索炒三兩 附子炮去皮 木香不見火各二錢半

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

金鈴子散 治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大便多閉

金鈴子去皮核取肉一兩用巴豆七粒去殼同炒令黃色去巴豆不用

右為細末每服二錢空心用熱鹽酒調服

狼毒丸 治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

狼毒剉炒 川烏炮去皮臍 芫花醋炒各一兩 椒紅炒

乾薑炮 乾漆炒烟 三稜 龍甲

沒藥各半兩 全蝎去毒九枚

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服四十九空心用生

薑湯或溫酒送下孕婦不可服

木香散 治心疝小腹痛悶不已者

木香 陳皮 良薑 乾薑

訶子去核 枳實已上各一錢半 草薺 黑牽牛

川芎已上各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服或為細末每服二錢

空心用白湯調服

沉附湯 治腎虛無陽小腸氣痛小腹外腎時冷兼治濕證

附子生用 香附各二錢 沉香 萹澄茄

辣桂 甘草各一錢 右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾空心服

桂薑湯 治無陽臍冷疝氣兼治濕證

辣桂

川白薑

吳茱萸

用酒醋浸一宿焙乾已上各一錢

良薑

茴香炒

萆澄茄

縮砂仁

木香

茯苓

益智仁

甘草炙各八分

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

金鈴丸

治膀胱腫痛小腸氣陰囊腫水出不乾

金鈴子

取肉五兩

茴香炒

海蛤

馬蘭花

炒

破故紙

炒

海帶

木香

兔絲子

丁香各一兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或鹽湯送下

川練子丸

治疝氣一切下部之疾腫痛悉皆治之

川練子

取淨肉一斤作四分四兩用麩一合斑貓四十粒同炒黃色去麩不用四兩用麩一

合巴豆

四十九箇同炒黃色去麩不用四兩用麩一

藍一兩

茴香一合同炒黃色去麩不用四兩用麩一

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九用鹽湯送

下甚者日進三次空心食前服

立効散 治疝氣

川芎

青皮去白

川練子

舶上茴香炒

挑仁

黑牽牛炒各二錢

右作一服水一鍾酒一盞煎至一鍾空心服

三茱丸

治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸 去核 吳茱萸 去梗 食茱萸 去梗 各二兩

川練子 一兩用斑猫四十箇去翅 破故紙 一兩七錢炒

青皮 去白 茴香 鹽炒 青鹽 四兩 黑牽牛 炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九用桃仁十

五箇炒煎酒送下或茴香酒亦可空心服

葫蘆巴丸 治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰

腫小腸有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆巴 兩炒 茴香 去土炒 大巴戟 去心炒 烏 炮去皮臍

吳茱萸 湯泡七次炒 川練子 去核取肉炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒

送下小兒服五丸茴香湯下 牽牛二兩

海藻丸 治偏墜小腸氣

海藻 一兩 海帶 一兩 斑猫 二十八箇去足翅 巴豆 二十八箇去殼完全者

右斑猫巴豆一味作一處生絹袋盛用好醋一椀以瓦鈹

盛四味藥同煮將乾去斑猫巴豆不用只將海帶二味細

碾為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋略浸蒸碾為膏和

藥末為丸如梧桐子大每服用麝香少許硃砂三錢乳鉢

細碾却入麝香再碾勻為衣日乾以新瓦瓶收之初服七

粒二服十粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五

粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌食鴨子并鮓醬

動氣之物

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胃膈痞塞

沉香 五分 人參

茯苓 附子炮去

黃芪 白朮

木瓜已上各羌活

芎藭 紫蘇

甘草炙各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服
嘔吐加半夏一錢生薑七片煎服

敷法 治腎囊偏墜

牡蠣煨 良薑各一

右為細末津唾調敷大便屢瀆更如火熱著痛即安

敵金丸 治心氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛遠腹寒

熱往來

荆三稜煨 蓬朮煨 猪苓 白附子

蘿藦子 赤芍藥

牽牛 川練子

山苜陳 青木香

陳橘皮 五靈脂

薑黃 小茴香

海藻酒浸 川山甲煨

海浮石以醋浸火煨

南木香半兩

青皮去白二兩 丁香一分 香附子淨

皮已上各一兩 南木香半兩

澤瀉半兩

炒黃色兩 同炒色焦去 巴豆不用

右為細末酒煮麪糊為丸

酒送下此藥能泄斟酌用

海藻丸 治奔豚心氣膀胱小

切腎氣等疾

如梧桐子大每服三十九丸用温

之 腸氣癩疝木腎及小兒偏墜一

海藻洗焙

木香

甘遂已上各半兩

川烏之老皮

茴香炒

猪苓去皮

黑牽牛二兩取末半兩

右為細末滴水為丸如梧

空心温酒鹽湯任下利下

十五丸至五十九此藥不

忌甘草相反

茴香練子丸 治諸疝證

川練子一兩小茴香三錢

青皮略一木香

檳榔

川椒去目

炒小兒去

吳茱萸炒

澤瀉已上各三錢白牽牛二兩取末半兩

桐子大每服五十九加至百九

黃涎是驗十五歲以下者服二

特利大便亦能利小便服藥後

一兩吳茱萸 二兩海藻 酒洗

澤瀉各半 青鹽 三錢

三稜醋炒

蓬朮醋炒黑牽牛七歲一歲半

右將川練茴香茱萸用酒醋童子小便各浸半兩又用巴

豆去皮斑猫去翅足各二十五箇以川練茴香青皮共炒

色變去巴斑二藥研為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每

服五十九空心用温酒送下

荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核十四箇新者燒灰存性 沉香 八角茴香炒

木香 青鹽 食鹽已上各一錢 川練肉

小茴香各二錢

右為細末每服三錢空心用熱酒調服

安息香丸一名煉陰丹 治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如石痛

不可忍

安息香

阿魏

硃砂

已上各二錢半用酒一盞研開淘去沙

石再用酒醋各一盞
熬成膏子和後藥

青皮

去白 玄胡索 微炒

海藻

昆布

茴香

炒 川練子 去核

馬蘭花

炒各一兩 木香 不見象

大戟

酒浸三宿切焙 沒藥 另研各二錢半

麝香

另研錢

右為細末研勻以前膏和丸如菘豆大每服十九至十五

九空心用綿子灰調酒送下

寸金丸

治奔豚諸疝作痛

當歸

玄胡索

舶上茴香

炒 葫蘆巴 已上各一兩

桃仁

去皮 桑螵蛸 酒洗

川練子

取肉 川五靈脂 另研

白芍藥

各半兩 萆澄茄

木香

各一錢半 全蠍 十箇

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九用鹽湯

送下有熱小便秘車前子赤茯苓煎湯送下

天雄

沉香煎丸 治下元傷憊陽事不能或成下墜及小腸氣

痛腎藏風攻注脾胃不和腰脚重疼

天雄

生剉 附子 生剉

草烏

生剉 漢椒 已上各四兩

防風

生用 牛膝

黑豆

緊小者 天麻 已上各二兩

味以無灰好酒一斗於銀鍋內漫火
煨不得令大沸酒盡為度焙令乾

官桂

去皮各 紫巴戟 去心 沉香

丁香

木香

羌活

乾薑

已上各兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用温

酒送下久服明目雄氣海駐容顏

廣藏煮散 治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮 煨 擯榔 生剉 官桂 皮去粗 附子 炮去

甘草 剉炙各半兩 芎藭 白朮 各三分

右剉碎每服二錢水一盞煎至七分不拘時溫服

山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛

山茱萸 吳茱萸 湯洗炒 川練實 剉碎 馬蘭花

懷香子 炒 青皮 焙去白 陳皮 焙去白 荆二稜 煨

乾薑 炮各三分 附子 一枚重半兩者 炮裂去皮脂

右為細末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服一十九空心用溫酒或鹽湯送下

木香丸 治卒疝腹痛不可忍

木香 官桂 皮去粗 懷香子 炒 蓬莪朮 煨剉

桃仁 雙仁研 擯榔 剉已上 青皮 湯浸去白 萊菔子 炒各半兩

厚朴 去粗皮生薑汁炙剉一兩

右為細末入桃仁泥和勻酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十九食前用溫酒送下

四製茱萸香煉丹 治小腸疝氣陽事衰敗下元虛冷

吳茱萸 一斤 揀去梗分四分 童子小便 一分 裝猪尿 一分 帶尿 一分 裝酒

澤瀉 四兩 枳殼 炒去穢 木香 石菖蒲 炒

青皮 陳皮 茴香 鹽炒 白茯苓

擯榔 草薺 三稜 煨 桃仁 去皮炒

蓬朮煨

乳香另研

官桂

已上各

荔枝核

九枚

川練子

四十九箇入巴豆二十箇同炒黃去巴豆不用

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用温

酒或鹽湯送下常服疎利邪氣進美飲食專治腎經虛弱

寒腫痛諸種疝氣

木香湯 治寒疝攻注胃脇滿痛汗出

木香三分

檳榔

細辛去苗

赤茯苓

去皮

人參去蘆

芍藥

當歸切焙

官桂

去粗皮

前胡去蘆

青皮去白焙各一兩

石剉碎每服三錢水一盞煎七分去滓不拘時温服

三增茴香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏留

不散臍腹痛陰核偏大胃囊壅腫重墜滋長有效行步痿

癢不止時出黃水浸成疔瘍或長怪肉累治不痊致令腎

經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大皆由頻服熱

藥內攻或因斃取以至如此用藥温導陽氣漸退寒邪補

虛消痲暖養腎經能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新

不過三料

第一料藥

舶上茴香用鹽半兩同炒川練子炮去核沙參洗對

木香各兩

右為細末水煑米粉稠糊為丸如梧桐子大每服二十九
空心用温酒或鹽湯送下日進三服小病此一料可安纜

盡便可服第二料藥

第二料藥 加下項藥

葶撥一兩 檳榔半兩

右加入前藥內通共六味重五兩半為細末依前糊丸九數湯使亦如前若病未愈便服第三料藥

第三料藥 又加下項藥

白茯苓四兩緊小實者去黑皮 黑附子半兩炮去皮臍秤或加作一兩

右通前八味重十兩並依前糊丸湯使九數服加至三十

九新久大病不過三料可愈小腸氣發頻及三十年者

疝氣至如栲栳大者皆可消散神效

吳茱萸丸 治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食嘔逆

體羸瘦

吳茱萸湯泡焙炒 乾薑炮 赤茯苓炙微赤已 甘草上各半兩

白朮 桂心 半夏湯泡 赤芍藥

前胡去蘆 當歸微炒 陳皮 川椒去目合口者炒出汗

附子炮去皮臍 人參去蘆 木香已上各一兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

丸生薑湯送下日四五服

蜀椒散 治寒疝心痛如刺繞臍腹中疼痛自汗出氣欲絕

川椒一錢去目及合口者微炒出汗 附子一箇炮去皮臍 乾薑炮

半夏湯泡去滑 桂心 甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢以水一中盞入粳米半合生薑半分棗

三枚煎六分去滓不拘時稍熱服一方無粳米

芫花丸 治寒疝積聚動搖大者如驚小者如杯乍來乍去在

於胃脘大腸不通感風寒則腸鳴心下寒氣上搶胃腸滿

芫花二兩醋二兩川椒炒 川大黃剉炒 川烏頭皮臍去

細辛 赤芍藥 桔心 赤茯苓

木香已上各 吳茱萸湯炮 半夏湯泡 桔梗去蘆各

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服七丸

溫酒送下日三服當下如泥

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布洗去 海藻洗去 蕪荑仁炒 蒺藜子炒去

檳榔坐各 枳殼去穢 大麻子研各 訶梨勒炮去

黃芪 水香已上各 陳皮去白 桃仁去皮尖

兔絲子酒浸一宿別

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研 甘草各一 白礬研二

右為細末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再煖

洗至冷候汗出差

治陰忽疼痛

桃仁湯浸去皮尖雙 苦練子 懷香子

沒藥各一

右為細末每服二錢食前熱酒調服

宣胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛半生半熟取

青木香一兩斑貓七箇同炒香用斑貓五箇

川木通炒一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸用溫酒或鹽湯送下

治蛭刺吹腎囊腫方

右用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

神効方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩淨炒黃色香熟為度次將舶上硫黃研末拌牽牛頭要入內不見硫黃將牽牛紙襯於地上一宿

碾末用宿蒸餅糊為丸每服三十九空心鹽湯下

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷

脾胃不和並宜服之有効

木香 乳香 川練子去核 八角茴香

丁香 香附子 破故紙 葫蘆巴

荆三稜 甘草已上各一兩 杜仲半兩炒去絲

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九加至五十九空心用溫酒或鹽湯送下日進三服

加味通心飲 治諸疝脹痛及小便不利

木通節去皮 梔子去殼 黃芩 瞿麥穗

連翹 枳殼去穰 川練子去核 甘草各等分

右吹咀每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五莖同

煎七分空心温服

喝起丸 治小腸氣及腰痛

杜仲去絲 葫蘆巴炒 破故紙炒 小茴香鹽水浸

草薺已上各 胡桃仁湯浸去

右為細末入胡桃肉和勻為丸如梧桐子大每服三十丸

或五十九丸空心用鹽酒或鹽湯送下

一捻金散 治奔豚小腸諸氣痛不可忍

玄胡索 川練子炒 全蠍炒 舶上茴香炒

附子半兩生

右為細末每服二錢痛時熱酒調下甚者再服効

沉香內消丸 治小腸疝氣陰囊腫大或左右偏腎結核疼痛

難忍下元虛冷久不愈者並治之

沉香 木香各半 葫蘆巴酒浸 小茴香炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心鹽

湯鹽酒任下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛以致悶

亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢抓之成癬瘡皆治之

吳茱萸醋 去枝 梗淨 四兩 酒浸 四兩 鹽湯 乾研 兩

澤瀉二兩去 皮酒浸 一夜 切作 片

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九食前鹽酒

或鹽湯送下馮仲采苦奔豚寒氣攻衝小腹引痛一日只

一服藏府微動痛若失去遂安

救痛散 治小腸疝氣集心疼痛不可忍者

肉苳蔻煨 木香煨 荆三稜煨 馬藺花醋炒

金鈴子去核 茴香炒

右為細末每服一大錢痛時熱酒調下服之立效

尋氣丸 治小腸疝氣偏墜疼痛

甘遂炒 錢 石鷲子雌雄一對 斑貓三箇去翅足炒

右為細末酒煮糊為丸如菽豆大每服三九麝香溫酒送

下空心臨卧食前服忌熱物一時忌甘草一日

神効胡桃酒 治小腸氣

右以胡桃一枚火內燒成炭細研以熱酒調服絕妙

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼痛及治

婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱

傷勞滯癖久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎 當歸 枳殼去穢炒 厚朴薑製

青皮 官桂去皮 乾薑炮 川練子炒

茴香炒 神麴炒 麥蘖炒 乾地黄

三稜煨 人參 茯苓

蓬朮醋浸 木香炮

右為末每服三錢水一盞葱白二寸煎七分入鹽少許熱

服如大便秘澁加大黃煎大便澹利加訶子煎食前服

茴香散 治膀胱氣痛

茴香

蓬朮

荆三稜

金鈴子肉各一兩

甘草半兩

右為細末每服二錢熱酒調服又云每發痛甚連日只二三服立定頃在微城歎尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶予候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通為之奈何適有五苓散一兩許分三服用連鬚葱一根茴香一撮塩一錢水一盞半煎八分服中夜下小便如墨汁者一二升臍下寬得睡翌日診之脉已平矣大抵此疾因虛得之不可以虛而驟用補藥經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所畜之邪然後

補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂此也

小腸氣方 治一切丈夫元陽虛弱小腸虛冷非時氣痛忽衝

心脇疼痛難忍宜服

益智去皮

蓬朮各半兩

茴香

山茱萸去核

牛膝

續斷

川芎

葫蘆巴

防風

牽牛炒熟

甘草已上各一分

右為細末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心連滓服白湯調下二錢七亦得

治奔豚氣

川山甲麩炒 破故紙麩炒 香附去毛各半兩 土狗十箇去頭尾尾焙乾

海藻焙 茴香各一兩 全蠍去毒十五箇 黑牽牛四頭末

木香 一兩

吳茱萸 一兩

右為細末用萊菔一箇大者剝去心肉入茱萸在內用糯米一椀同萊菔煮熟飯爛為度次將萊菔細切入米飯搗細茱萸晒乾同前藥為末與萊菔同搗丸如梧桐子大每服二十九加至三十九食前鹽酒送下

代灸膏 治證同前

木香

附子

吳茱萸

蛇床子

馬蘭花 各等分

右為細末同薑搗熟麩攤開貼痛處

腰子散

治腎氣作痛

黑牽牛 炒熟

白牽牛 炒熟

右為細末每用三錢以猪腰一付薄切開縫入川椒五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻入腎中線繫濕紙數重裹煨香熟出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就挑天明取下惡物即愈

治腎氣疼痛方

治丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青

唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之神驗不可具述

當歸

芍藥 各一兩

沒藥

麒麟竭

蓬朮

玄胡索

三稜

牽牛 醋炒

木香 半兩

芫花 四兩

狼毒 半兩

同芫花於瓦器內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭藥亦作
一處研如飛塵所餘衆藥共作一處搗爲細末方將芫花
狼毒麒麟竭沒藥等末相交令勻更爛研千遍每服一錢
半氣痛時葱酒調下和滓喫不用飽食後喫也若是大腑
秘熱出後不通唇皮焦赤口中涎溢喫此藥一盞見効

八仙丸 治育腸氣

木香

青皮去白

高良薑

桃仁炒去皮尖

阿魏燉果

脛肭臍酒炙 桂心各半

乾蠍微炒

右爲細末用醋浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服二十九食
前以熱酒送下

桃仁丸 治育腸氣疼痛不可忍

桃仁湯浸去皮尖雙

木香各三

阿魏熟爲度

乾蠍微炒 芫花印拌

苦練子

桂心已上各

檳榔一兩

右爲細末以醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服十九不拘
時熱生薑酒送下

摘核丸 治四種癩病如核腫脹偏有大小或堅硬如石或引

臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則
成癰潰爛

摘核炒

海藻洗

昆布洗

桃仁去皮

川練肉炒

海帶洗已上 厚朴薑炙

玄胡索炒

枳實炒

桂心不見 木香不見

木通已上各

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服六十九空心温酒
鹽湯任下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加硃砂二錢
醋煑旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

療超越舉重卒得陰癩

地膚子 十分 白木 五分 桂心 一分

右為細末以飲服一斗圭日三忌生葱桃李雀肉等物一
方用温酒調下

蜘蛛散

治陰狐癩氣偏有大小時時上下脹人

蜘蛛十四箇 桂心半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九空心用米飲
送下為散取八分飲和服亦可

香附散 治癩疔脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒一盞入海藻一錢煎至
半盞先澇海藻嚼細用煎酒調香附末二錢服一方以海
藻為末以熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荊芥末

秘傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癩偏大或

生瘡出黃水

吳茱萸半酒半醋浸

山茱萸蒸去核 馬蘭花醋浸

黑牽牛頭末 延胡索略炒 川棟子蒸去皮核 舶上茴香鹽炒

海藻洗去 橘皮 青皮去白 官桂已上各

桃仁炒去皮 白蒺藜炒刺木香

右為細末酒煑稀糊為丸如梧桐子大每服四十九食前

用温酒或盐湯送下

奇効良方卷之四十七

奇効良方卷之四十八

積熱門 附論

張子和云李屏山素飲酒一日得病醫用酒癥丸熱藥後目覩
天地但見紅色遂成龍火之證卒不能救棠溪李濟之常病目
及居省掾每服補肝散以致睛脹但見窓檻橫排幾至喪明令
涌泄五七次繼服涼劑方始如故丹霞朱僧人曾病三陽畜熱
常居靜室不敢見明明則頭疼如錐每置冰於頂上不能解其
熱歷諸醫莫能辨其病後治之七日而愈其用汗吐下三法而
已後用涼物清鎮之平復如故夫人陰平陽秘神氣以寧盖昧
者徇情縱慾因致積熱之證非一朝一日故也皆出於心熱甚
則能傷血故出於心積熱者熱毒蘊積於內也或有體氣素實

一時感觸熱毒之氣鬱積臟腑之間或在心肺之內令人口苦咽乾涎唾稠粘眼澁多淚心氣通於舌脾氣通於口熱燥相合無所受制故口舌上生瘡小便秘澀非傷寒之熱非風證之熱此乃積聚之熱也又有酒麪煎燂雄附峻補皆能有熱謂之積熱者何哉一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾若偏者皆致成疾過於熱者積溫成熱蘊積於內遂成前證經云偏勝則有偏害偏害則有偏絕不可不察也王安道曰人之所賴以生者氣也氣者何陰陽是也夫陰與陽必以和而平必以乖而否善攝與否吉凶於是辨不能善者故偏寒偏熱之病莫逃乎乖否之餘雖然寒也熱也粗工為之不難設積熱良工猶弗能以為計且以積熱言之始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之

從之不愈則技窮矣王太僕故曰益火之源以消陰氣壯水之主以制陽光又曰取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒時千言萬語之間殆猶和璧之在璞也積熱之病有由來矣久處中和偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷暖得中而已矯枉過正識者憂焉治法以三黃丸凡熱皆出於心熱甚則能傷血或以洗心散四順清涼飲子之類此皆前人立論處方後之學者不可將陰陽虛盛之熱及血分氣分之熱陰盛格陽之熱一例作積熱證治之反悞多矣今開積熱之方條具于後

積熱通治方

涼膈散

治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰壅不利煩燥多

渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱並皆治之



原件短缺

3-4

方見火門

心散 治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘

結小便赤澁

白朮一錢

麻黃

當歸

荆芥穗

大黃麩裹

芍藥

甘草各二錢

右作一服用水二鍾生薑三片薄荷少許同煎至一鍾不

拘時溫服

三黃湯 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連去鬚

黃芩去蘆

大黃煨各三錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

甘露飲 治胃中客熱牙宣齲腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經

方見風門

三黃丸 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤

澁大便秘結

黃連去鬚

黃芩去蘆

大黃煨各十兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸熱水送下

一方以腦麯為衣丸如大豆夜間含化一二丸亦可

薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷末一斤取頭

縮砂末二錢川芎末二錢

片腦半錢

甘草半兩取末二錢半

右為細末和勻煉蜜成劑不拘時任意嚼嚥和劑方無片

腦有桔梗

天竺黃散 治臟腑積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子 去殼 連翹 各三錢 瓜蒞根 一兩 雞冠雄黃 半錢

鬱金 用皂角水煮切 甘草 三錢

右為細末每服一錢食後臨卧新汲水調服

龍腦雞蘇丸 消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽唾血

鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸

口苦並宜服之

此胡 銀州者二兩和木通以湯半 生地黃 六兩另

黃芩 去蘆 麥門冬 去心 木通 同此 人參 去蘆

蒲黃 炒 阿膠 各二兩 雞蘇淨葉 一斤即

甘草 炙一兩半

右除別碾藥外餘藥為細末用好蜜二斤先煉一二沸然

後下生地黃末不住手攪令勻取木通此胡汁慢火熬成

膏勿令焦然後入餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十

九嚼破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血

鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟諸淋車前子煎湯下

噙化三黃丸

大黃 黃芩 黃連 各二錢 黃藥子

白藥子 各一兩半 黃蘗 苦參 山豆根

礞砂 各一兩 京墨 三錢 片腦 半錢 麝香 少許

右為細末用猪膽汁調勻攤在椀內甑上蒸三次露一宿

後入腦麝礞砂為丸如豆大每服一丸食後噙化冬加知

母一方有甘草

大金花丸 治中外諸熱寢汗咬无睡語驚悸溺血淋閉咳衄

血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子

金花丸又名既濟解毒丸

方見火門

神芎丸 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癬咽膈不

利大小便閉澁一切風熱之證並宜服之

大黃生用 黃芩各二兩 牽牛生用 滑石各四兩

黃連 薄荷葉 川芎各半兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九食後用温

水送下

牛黃涼膈丸 治上焦壅熱口乾咽痛煩躁涎潮

牛黃 片腦 麝香各一分 紫石英半兩

馬牙硝 寒水石煨 硬石膏各二兩 牛膽南星三分

甘草微炙

右為細末煉蜜為丸每兩作四十九每服一丸食後温薄

荷人參湯下

酒蒸黃連丸 治膈熱解酒毒厚嘔胃

黃連半斤 斷淨用酒二升 浸以瓦器

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九食前用温

水送下

碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩燥燕物妨悶

或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆治之

芒硝

青黛

石膏

研過

寒水石

研飛

朴硝

硝石

馬牙硝

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篋不住手攪令消熔得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中即愈頻吹効既濟清神散 益腎水降心火清上實下

桔梗

黃芩

川芎

山梔子

當歸

羌活

白朮

茯苓

已上各一兩

知母

甘草

薄荷

各半

右咬咀每眼五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調服

玄明粉

治邪熱所干膈上氣滯五臟秘澀

右用朴硝煎過澄瀘五七遍至夜於星月下露至天明自然結成青白塊子用磁罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上倒下用盆子合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入生熟甘草末二兩一處攪勻臨卧斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下此藥本性寒燒過性溫無毒忌諸般魚及毒物等

地黃煎

治積熱

地黃汁

四升 茯苓

知母

菱鞋

已上各四兩

栝萋根 五兩 生薑汁 生地骨皮 生麥門冬汁

白蜜 各二升 石膏 八兩 竹瀝 三合一方

右咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黃麥門冬汁慢火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取出六升初服四合日三夜一加至五七合四五月作散服之

海仙丸 治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取水之精漬於船板木中累見風日久則日多變為青色以取太陽之氣而曬曝中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之分陰陽去邪熱調臟腑聖人處治以度物之氣味所用且如東壁墻上取之以新水調化取清水服之治腑臟不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾

籍太陽真火之氣以除去濕而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖燒灰乾摻瘡上立已此聖人取其物類相感故也且船板青與上同意

船板青 五兩 酥油餅末 半兩

右為細末稀麪糊和丸如梧桐子大每服四五十九不拘時溫酒送下

硃砂膏 治心臟驚熱至甚不省人事

硃砂 硼砂 酸硝 各二錢半 金銀箔 各五片

腦子 一字 寒水石 石膏 各半兩 粉草 三錢

右為細末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

奇效良方卷之四十八

奇效良方卷之四十九

痼冷門 附論

夫痼冷者痼為年久長固者也冷為寒極至甚者也三因方云人以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不實復啖生冷冰雪之屬致腸胃虛寒陰既停凝陽不能正大便洞泄小便頻數鼻多清涕嘔吐涎沫水穀不化腸胃絞痛肚腹如冰冷洒洒淅淅皆陽虛陰盛之所為也張長沙有陰毒之證雖不為痼冷即冷寒所傷令人為手足冷腰背強臍腹築痛咽喉不利嘔吐下利身如被杖脉細欲絕此由腎氣虛寒外傷風冷或因冷物傷脾蓋脾為太陰內外皆陰則陽氣不守遂成陰毒四肢

逆冷額上手背冷而汗出不止或眼痛不堪任唇口手足爪甲俱青黑氣上衝心而脈沉細伏匿者或多煩渴者精神如失故曰陰勝則身寒汗出身必鼓慄而寒寒則厥宜溫藥以復其陽氣或於氣海關元灸之醫律云冷者陰之至盛陽之至衰陰過曰寒經曰寒者熱之服以熱劑乃治冷之正法內則飲以至熯至剛之藥外則灼以數百艾炷逐其陰而助其陽斯又治冷來攻之道也大抵人身貴乎陰陽升降平和無偏則無疾矣若有偏勝是即有沉寒痼冷之證乃真陽耗散脾胃虛弱失放調理以致胃寒食啖冷物粘膩難化生硬之類經年累月久積而成痼冷漸被其傷脾腎因而清積臟腑以成痼疾矣但有寒冷等輩觸犯速然而作以致手足厥逆畏冷增寒飲食不化或嘔吐

涎沫或大便洞泄米穀不消或小便頻數或肚腹絞痛或逢寒咳嗽或癩疝大作是其證也內經曰寒淫所勝平以辛熱又內經舉痛篇云經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行容於脈外則血少容於脈中則氣不通故卒然而痛岐伯曰寒氣容於脈外則脈寒脈寒則縮蹇縮蹇則脈絀急絀急則外引小絡故卒然而痛得炷則痛立止因重中於寒則痛久矣寒氣容於經脈之中與炷氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留炷氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按也寒氣容於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣容於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也寒氣容於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣容

則脉不通脉不通則氣因之故喘動應手矣寒氣客於背俞之
脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛
按之則熱氣至熱氣至則痛止矣寒氣客於厥陰之脉厥陰之
脉者絡陰器繫於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少
腹相引痛矣厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故
腹痛引陰股寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注
於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣寒氣客於五臟厥
逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣
寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也寒氣客於小腸小腸不
得成聚故後泄腹痛矣然寒則腠理閉則氣道不行故氣收飲
冷積於中遂為痼冷之疾也直指方云入之處世飲食為上湯

藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而為之沉痼
也故有沉寒痼冷之名耶男子遺精女子帶下骨寒腦冷氣乏
血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法在乎溫補不可
用剛劑惟於滋血養氣之中或佐以薑桂則可古人所謂精不
足者補之以味若執剛燥之劑亟欲陽氣頓回猶恐腎水易涸
心火獨盛亢則害承乃制也內經曰陰氣有餘多汗身寒陰陽
應象云陰盛則身寒汗出身常清數慄而寒寒而厥調經篇云
陰盛生內寒岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胃中而不可瀉瀉則
溫氣去寒獨留故為寒中東垣解云此脾胃不足勞役形體中
焦不能營運病傳為寒中宜補陽以附子理中湯為末用葱白
煎羊肉湯取清汁調進數服而愈前人立論至詳凡為醫者深

探其意依經用藥則無天閑之禍也

痼冷通治方

附子理中丸 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進一切沉寒痼冷並皆治之

附子炮去皮

人參去蘆

乾薑炮

白朮

甘草炙各三兩

右為細末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸用水一鍾化開煎至七分空心服

三建湯 治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠困自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事

傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

方見諸虛門

薑附湯 治證同前

方見寒門

沉附湯 治上感下虛氣不升降陰陽不和胃膈痞滿飲食不進肢節倦痛

沉香半錢 附子炮去皮半兩

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾食前服

芪附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪去蘆蜜炙半兩 附子炮去皮四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈但是陽

虛氣弱之證並宜服之

人參去蘆半兩 附子炮去皮三錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

茸附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦

乏但是切虛弱之證並皆治之

鹿茸酒炙 附子炮去皮各四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

桂附湯 治虛汗不止及體虛失血大効

官桂去粗皮三錢 附子炮去皮四錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服

訶子四柱散 治元臟氣虛真陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭

旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止並皆治之

方見泄瀉門

沉香華澄茄散 治內挾積冷臍腹弦痛引腰背面色痿黃臍

腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

沉香 華澄茄 附子炮去皮 葫蘆巴炒

肉桂去粗皮 補骨脂炒 川練子去核 巴戟去心

茴香炒 木香已上各一錢 桃仁雙去皮尖 川烏炮去皮各五分

右作一服水二鍾入塩少許煎至八分空心服

附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞痛

附子大者一枚炮去皮臍三錢 茴香炒 肉荳蔻煨

乾薑炮

人參

白朮

白茯苓去皮

木香一錢上各丁香

甘草炙各五分

右作一服水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

黑錫丹 治元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛

鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦

人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷

不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調

治榮衛升降陰陽補虛損益元陽返陰

方見頭痛門

十補湯 治諸虛百損

人參去蘆 白朮

肉桂去粗皮

白茯苓去皮

黃芪蜜炙

川芎

當歸

熟地黄

白芍藥

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾空心服

加熟附子溫之

八味丸 治下元冷憊腰脚痠重虛勞消渴

方見諸虛門

金鎖正元丹 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠疼頭

目眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫癢精神昏

困手足多冷心胃痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不能久立或

脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹痛氣刺兩脇

虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘

氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切
元臟虛冷並皆治之

方見泄瀉門

來復丹一此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水火
既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎
氣不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問
男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰
助陽為効殊勝

舶上硫黃

用透明不夾沙石者

硝石

各一兩同硫黃並為末入定碟內以微火温炒

陳皮

去白

五靈脂

去沙石曬乾已上各二兩

用柳篋子不住手攪令陰陽氣相入

不可用太過恐傷藥力再碾令極細

青皮

去白

大陰玄精石

一兩另碾

右將五靈脂青皮陳皮為細末入玄精石末及硝石硫黃
末拌勻以好酒醋煮麪糊和丸如豌豆大每服三十粒空
心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或
吐利不止變成虛風搖擗者非風也胃氣欲絕故也用五
粒碾碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血
迷上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服
和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹脇冷疼立効諸疾不辨
陰陽證者並宜服之

灸法

腎與膀胱俱虛灸腎俞伯壯穴在對臍兩邊向後夾脊相

去各一寸五分兼治便濁失精五臟虛勞瘕冷小腹弦急
夢遺泄精三陰交穴灸七壯在內踝上大脉並四指是
諸虛極灸膏肓俞氣海穴壯數愈多愈妙

保元丹 治老弱諸沉寒痼冷小便滑數大便時泄腰腿臍腹
疼痛困倦瘦虛食減

附子炮去皮臍 白朮 山藥 肉苳蓉

赤石脂 乾薑各一兩 肉桂半兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服二三十九空心用
溫酒送下

浴體法 治下元虛寒腰腹冷痛崩漏帶下一切冷病

椒目 川烏 細辛 乾薑

官桂各等分

右為粗末水煮凈洗下部為妙

洞陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰

證並皆治之

川烏炮去皮臍 天雄炮去皮臍 附子炮去皮臍 鍾乳粉各二兩

陽起石火煨 硃砂另研各一兩

右為細末酒煮神麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心
用溫酒或鹽湯送下

接真湯 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足衰憊欲絕

沉香 丁香各二錢 麝香一錢 附子炮去皮臍

右剉碎用水二鍾生薑七片棗二枚去核煎至七分去滓

空心温服

奇効良方卷之四十九

奇効良方卷之五十

諸血門 附論

內經曰諸血者皆屬於心又云肝藏血夫血錯經妄行者豈無因而致哉又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血濕淫汗出衄衄脾移熱於肝則爲驚衄陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥怒則氣逆甚則嘔血肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口可於手太陰經內求宀以瀉之足少陰腎之脈從腎貫肝入肺中循咽喉其病則飢不欲食面黑欬唾則有血金匱要略曰夫酒客欬者必至吐血此因極飲過度所致也原病式曰衄者陽熱拂鬱干於是陽明而上熱則血妄行鼻衄也又云血溢者上出也血有餘而妄行也局

方發揮論口鼻出血皆係陰虛陽盛有升無降血隨氣上竅法
當補陰益陽氣降則血歸經東垣云雜病見血者多積其熱也
夫血者陰也氣者陽也氣主煦之血主濡之今血妄行上出於
口鼻者皆氣逆也分之則各有所屬治之則各有所主如衄血
出於肺嘔吐血出於胃其經有虛實之分當以脈理究治唾血
出於腎血證上行或衄或吐或嘔或唾者皆逆也若血下行者
爲順內經又云榮者水穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑
乃能入於脈也心主之肝藏之脾裹之肺營之腎泄之生化於
脾摠摠於心藏儲於肝宣布於肺隨氣運行灌溉一身夫人目
得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足
得之而能步臍得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡

潤宣通者由此使然也寒則凝滯暑則氣流澤熱則生通爲脈
瀦則血少充則血實血虛常以飲食滋胃乃中焦受氣所汁變
化而赤爲血也故經云水入於經其血乃成又曰血者神氣也
持之則存失之則亡且人身皆藉氣血所養可不謹哉諸經有
云陽道實陰道虛陽易亢陰易乏陽道常饒陰道常乏陽常有
餘陰常不足可見人之生也故氣常有餘血常不足年至四十
陰氣自半起居衰矣男子十六歲而精通至六十四歲而精絕
女子十四歲而經行至四十九歲而經斷而陰血之難成易虧
也如此陰氣一傷最難調治以其陽虛陰虧妄行於上則吐衄
衰涸於中則虛勞忘返於下則便紅移熱於膀胱則癰溺血滲
透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱瘀則爲滯下熱

極腐化則為膿血熱極色紫黑者熱勝於陰發於瘡瘍濕滯於血則為脾痛癥瘕蓄之在上則人喜妄蓄之在下則人喜狂前證諸論至詳其脉沉細者順洪大弦數者逆治法病在何經何病隨經而治之對證之方條具于後且如長沙公言少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻耳目中出是名下厥上竭為難治又不可不知也

諸血通治方

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩

熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓

去皮

人參

去蘆

前胡

去蘆 半夏

陳皮

枳殼

去穢

紫蘇

白芍藥

桔梗

乾葛

當歸

熟地黄

川芎

甘草

各一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食前服

必勝散

治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並皆治之

小薊

并根

人參

去蘆

蒲黃

炒

熟地黄

當歸

去蘆

烏梅

去核

川芎

各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

茜根散

治鼻衄不止

茜根

黃芩

側柏葉

阿膠

蛤粉炒

生地黄

各二錢

甘草

炙一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

天門冬湯 治思慮傷心吐血衄血

天門冬 去心 遠志 去心甘草炭 黃芪 去蘆 白芍藥

麥門冬 去心 藕節 阿膠 炒粉 生地黄

當歸 去蘆 人參 沒藥 甘草 炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大薊散 治食啖辛物傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大薊根 洗 犀角 鎊 升麻 桑白皮 去皮炙

蒲黃 炒 杏仁 去皮尖 甘草 炙各一錢 桔梗 炒各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

雞蘇散 治勞傷肺經睡內有血咽喉不利

雞蘇葉 黃芪 去蘆 阿膠 炒粉 生地黄 洗

白茅根 貝母 桔梗 麥門冬 去心

清黃 炒 甘草 炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

犀角地黄湯 治主脉浮客脉沉浮乳相合血積胃中熱之甚

血在上焦此藥主之

犀角 大黃 各一錢 黃芩 黃連 各二錢

生地黄 四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子 一名清柿飲子 治衄血吐血久不愈

麥門冬 去心 五味子 三十箇 當歸身 人參 各一錢半

黃芪 去蘆三錢 生地黄 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以三升於氣血
出血立愈

人參飲子 治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血吐血

人參去蘆二錢 五味子二十箇 黃芪去蘆 麥門冬去心

白芍藥 當歸身各一錢半 甘草炙一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲酒過度負重傷胃而

吐血者最宜服之忌濕麪煎燻之物

白朮三錢 白茯苓 黃芪蜜浸 人參去蘆

百合去心 苕胡 山藥 前胡去心

甘草炙七分半

右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食遠服

龍腦雞蘇丸 治膈熱咳嗽或吐血衄血

方見積熱門

黃芪為藥湯 治衄血多噦面黃眼澁多眵手麻木

黃芪三錢 芍藥一錢半 升麻 羌活

葛根各三錢 甘草炙二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

人參救肺散 治咳吐血

人參 黃芪 當歸尾 熟地黃已上各二錢

蒼朮 升麻 白芍藥 苕胡已上各一錢

蘇木 陳皮 甘草各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

升陽去熱和血湯 治腸癖下血作派其血唧出有力而射四

散腹大作痛乃陽明氣衝熱毒作也當去濕

白芍藥 二錢 生地黄 牡丹皮 生甘草

橘皮 錢各二 炙甘草 黃芪 錢各一 當歸身

熟地黄 蒼朮 秦艽 肉桂

升麻 錢各半

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

犀角地黄湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣涌泄為衄血

或清道閉塞流入胃脘吐血如鼻衄吐血不盡餘血停留

致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角 鎊 生地黄 白芍藥 牡丹皮 去水各

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服如潮熱發狂加黃芩

大黃

涼血地黄湯 治飲食不節起居不時陰受之則入五臟膜滿

閉塞下為殮泄久為腸癖水穀與血作一派唧出

熟地黄 青皮 槐花 炒 當歸 錢各一

黃蘗 炒 去皮 知母 錢各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

雞蘇丸 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉 八兩 黃芪 防風 去蘆 荆芥 各

菊花 三錢 片腦 半錢 川芎 生地黄

桔梗

甘草 各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚙下

團參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參

黃芪

飛羅麩 各一兩 百合 五錢

右為細末滴水丸如梧桐子大每服三五丸用茅根湯下食遠服

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水

過喘嗽

當歸

川芎

芍藥

黃藥子

白朮

槐花 各一錢

茯苓 去皮

生地黃

黃芩

白龍骨

甘草 各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

生地黃湯 治上熱衄血

生地黃 四錢

阿膠 炒二錢

川芎

桔梗

蒲黃 炒

甘草 生各一錢

右作一服水二鍾入生薑汁二匙煎至一鍾食後服

麥門冬散 治鼻血

麥門冬 去心

生地黃 各三錢

白芍藥

蒲黃 各二錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

藕汁飲 治吐血衄血不止

生藕汁 生地黄汁 大蘗汁各三 生蜜 半匙

右件藥汁調和令勻每服一小盞細細冷呷之不拘時服

犀角湯 治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩者

犀角 蒲黃 瓜蒌根 甘草各二兩

葛根 桑寄生各三兩

右咬咀以水七升煮取三升分三服不拘時

天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬一兩 貝母 杏仁各七錢半 白茯苓

阿膠 甘草各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一九含化嚥津

綠雲散 治吐血

栢葉 百合 人參 阿膠各二兩

右為細末每服二錢不拘時糯米飲調下

雲雪散 治吐血

雲雪 即寒食 蒲黃各一兩

右俱生研勻每服二錢冷水調下

地黃煎 治吐血憂恚絕傷胃膈疼痛及虛勞唾血

右用生地黄五斤絞取汁於銀鍋內微火煎一二沸投白

蜜一升再煎至三升每服半升日三服主胃痛百病久服

佳一方治吐血不止用生蜜和調服之一方用生地黄汁

一升生薑汁一合相和温服日四五服一方治虛勞吐血

生地黄五升搗酒一升煮去滓服

掌中金 治吐血

真蒲黄

黄藥子各等分

右為細末用生芝麻油於手心內調以舌舐之

人參湯 治吐血咯血

右用人參一兩為細末五更時用鷄子清調如稀糊匙抄服若服人參末盡甚効或服半兩亦可服訖却卧一方用烏鷄子清以手磨成水須磨千百次自然化成水然後以人參末二錢調勻約五更服服藥時不得語仰嚼自下自然覺心肺俱涼滿口津液

治傷力吐血方

右用猪肝煮熟蘸白芨末服之

四生丸 治吐血

生地黄

栢葉

艾葉

荷葉

各等分

右四味俱生爛搗團成鷄子大每服一九水三盞煎至一盞去滓不拘時服

生乾地黄散 治卒吐血皆因心經暴熱毒入胃致吐不止

生地黄

阿膠炒令黃

甘草各二分

黃芩

犀角屑

栢葉

刺薊各一兩

右剉碎每服三錢水一中盞入青竹茹如鷄子大同煎至六分去滓不拘時溫服

雙荷湯 治卒吐血

藕節 七箇 荷葉頂 七箇

右以蜜少許搗細用水二鍾煎至八分去滓溫服或為細末調服亦可

松花散 治吐血久不止

松花 半兩 生地黄 鹿角膠 炒黃 薯蕷 已上各

艾葉 一分 菑草根 白茯苓 紫苑 去苗

人參 百合 刺薊 甘草 炙赤各 半兩

右為細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎 治吐血不止咳嗽補肺

生地黄汁 藕汁 各一升 黃牛乳 一升 胡桃仁 十枚 研

生薑汁 半升 乾柿 五枚 細剉 大棗 二十一枚 炙去皮核

研如 清酒 一升 將已上七味一處同酒 入銀鍋中煎沸方下後藥

黃明膠 炙燥 秦艽 各半兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒研

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐著火養成煎後

入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

又方 治丈夫婦人吐血連日不止粥食湯藥不能下者

右用五靈脂不夾土石揀好精者不拘多少研為末以狗

膽汁和丸如鷄頭大每服一九煎生薑酒磨令極細更以

少生薑酒化以湯盪藥令極熱須是先做下粥溫熱得所

左手與患人藥喫不得漱口右手急將粥與患人喫不可

太多

石膏散 治心胃煩熱吐血不止口舌乾燥頭疼

石膏

麥門冬各二兩

黃芩

生地黄

升麻

青竹茹

葛根

瓜蒌根已上一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

杏仁散

治心肺客熱吐血唇口乾燥

杏仁雙皮尖炒

赤茯苓

黃連

梔子仁

黃芩

大黃炒各一兩

桂心半兩

瓜蒌根三分

右咬咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

加味理中湯

治飲酒傷胃遂成吐血

人參

乾薑炮

白朮已上一兩

乾葛

甘草各半兩

右咬咀每服三錢水一大盞煎六分去滓不拘時溫服去

乾葛加川芎治鼻衄理中脘分利陰陽安定血脈

白朮丸

治傷胃吐血

白朮十兩

乾薑

黃芩

伏龍肝

人參各三兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時用

米飲送下

鷄子白丸

治吐血衄血

鷄子白三箇

好香墨

二兩為末

右和丸如梧桐子大每服十九丸不拘時生地黄汁送下

茅花湯

治吐血衄血

右用茅花煎湯服之

蘿蔔飲 治諸血熱吐血衄血

右用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立効如無生蘿蔔只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉莖半分剉碎用煎亦効一方用蘿蔔汁滴入鼻中

門冬飲子 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬 當歸身

人參已上各一錢半 紫苑一錢半

芍藥

甘草

黃芪已上各一錢 五味子五箇

右以咀作二服每服水一盞煎一盞去滓食後稍熱服

三奇散 治衄血不止

亂髮灰 一錢人中白 半錢麝香 一字

右為細末鼻內啗少許上止一方不用麝香髮灰垂困者

焙乾為末湯調服血止

白芨散 治鼻衄及嘔血咯血肺損或食飽負重者服之愈

右用白芨為細末用冷水調紙花貼鼻穴中効一方用雪水調如無以新汲水調自兩眉際傳至鼻上以編子緊繫摺紙扱令緊時蘸冷水挹藥上飯頃即止去藥

吹鼻方 治鼻衄吐血

右用栢葉石榴花為細末每用少許吹鼻中亦用花瓣塞鼻內立止

刺薊散 治鼻衄出血經日不止

刺薊

苦參

黃連

梔子仁

生地黄

側柏葉

大黃炒各一兩

右吹咀每服五錢水一大盞入青竹茹半鷄子大煎至五分去滓不拘時服

千針散 治鼻衄不止

刺薊

木賊各一分

白麩一錢

右為細末每服一錢研青蒿心七枚新汲水調下併二服

二花散 治鼻衄不止

酸石榴花一分

黃蜀葵花一錢

右剉每服一錢水一盞煎至六分不拘時溫服

山梔散 治鼻衄不止昏悶欲死

右用山梔子不拘多少燒存性為末每用少許吹入鼻中

立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裹煨令熟一邊

生用同研為末酒調服一方曾服燒煉藥方致鼻血者生

用煎湯解之蔡子涯云同官無錫監酒趙無疵兄衄血甚

多至危殆血尚未止一醫人過其門聞其家哭詢問其由

醫人云曾服丹或燒煉藥子有藥用之即活囊間出藥半

錢七吹入鼻中立止良久得活

扎指法 治鼻衄不止

右用線緊扎中指中節如在鼻孔出血扎左手中指中節

右鼻孔出血扎右手中指中節兩鼻出血左右俱扎之

大蒜貼足方 治鼻衄不止諸藥不驗者

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一豆許若

左竅出血貼於左脚心下以帛繫定右竅出血即貼右脚心下兩竅出血俱貼之血止即以溫水洗脚心令去蒜氣一方以摩手心亦効

刺薊湯 治熱氣上行衄血汗血

刺薊

雞蘇葉 各二兩

黃連

生地黃

犀角 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

當歸湯

治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因

熱損發或因酒發悉皆治之

當歸

乾薑 炮

黃蘗

熟地黃

小蘗

羚羊角 鎊

阿膠 各三錢

白朮

芍藥 各半兩

黃芩

甘草 各一分

右咬咀每服三錢水二盞入芍藥如指大煎至八分去滓

入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半生再煎至七分不拘時溫服

一方無白朮

竹茹散

治嘔血久不瘥心神煩悶臟腑勞湯

竹茹 如鷄子大

白芍藥

生地黃

當歸 各半兩

茜根 二兩

羚羊角 鎊

麥門冬 去心

鹿角膠 各一兩半

甘草 兩

右咬咀每服三錢以水一中盞生薑三片煎至六分去滓

不拘時溫服

麥門冬汁

治嘔血吐血及鼻衄血

麥門冬性取 生地黃性取 生藕取汁 冷熟水各一

白藥一兩為末

右和令勻每服二盞略煎服不拘時溫服

治嘔血方

黃蘗以蜜塗炙乾

右為細末每服二錢不拘時用麥門冬煎湯調下瘥

治咯血方 趙君猷云屢用効

右以薏苡仁不拘多少為末熟煮猪胰切片蘸藥食後微空時取食之蓋薏苡能補肺以猪胰導入經絡耳陳敏捷云治肺癰唾膿血薏苡仁公末米飲調下一方搗碎用水煎服亦効

聖餅子 治咯血

青黛 一錢

杏仁

四十粒去皮尖以黃明

右同研勻却以所煎蠟少許熔開和之捏作錢大餅子每服用乾柿一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裹慢火煨熟取出以糯米粥嚼下

黑散子 治諸痰出血

蓮蓬年

敗椶櫚

頭髮性燥存

右為細末每服二錢用南木香煎湯調下或只用棕櫚燒灰用米湯調下亦可

治九竅出血方

右用刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青

汁只搗乾者為末冷水調三錢服

南天竺散 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草生薑是如神 生薑一握如山 槐子三干枝

燈草一握 大棗五枚 甘草一握

右剉入磁器中水一大椀煎至半椀去滓不拘時溫服

神白散 治血汗從膚滲出及鼻衄五七日不止

右用人中白不以多少剉在篩上用火過乾研令極細

每服二錢入麝香心許溫酒調下一方治鼻衄不止不用

麝香每用少許吹入鼻中

生血地黃百花丸 治諸虛不足下血咯血衄血腸澀內痔

勞寒熱肌肉枯瘦

生地黃斤 生薑半斤 藕斤 白沙蜜四兩

無灰酒一升

已上五味用銀器或砂鍋內熬至二椀許漸成膏一半磁器收之一半入乾山藥末三兩再熬一二十沸次入後藥

當歸焙 熟地黃焙 肉苁蓉酒浸 破故紙

阿膠炒 黃芪蜜炙 石斛去根 覆盆子

遠志去心 麥門冬去心 白茯苓去皮 枸杞子三兩

右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每服五十九丸用

溫酒調地黃膏子送下空心食前日進三服

蓮心散 治勞心吐血

蓮心五十粒 糯米五十粒

右研為末用溫酒調服不拘時候

側柏散 治內損吐血下血或飲酒太過勞傷於內其血妄行

出如涌泉口鼻皆流瀕死不救即死

側柏葉一兩半

荆芥穗燒灰 人參各一兩

右為細末入飛羅麩一錢新汲水調如稀糊不拘時服

生地黄飲子 治諸吐血下血瀉血衄血

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃芪

芍藥

黃芩

甘草各等分

右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後溫服如脈微身涼

惡風加桂半錢吐血者多有此證

大薊飲 治吐衄血

大薊汁

地黄汁

生薑汁

麥門冬汁

刺薊汁各三合

右用白蜜半匙相和勻冷服

麝香散 治鼻衄不止

麝香半字

明礬半字

龍骨另研各五錢

右和勻每用一字先以米水洗淨鼻內血涕然後吹入鼻

中或以濕紙蘸藥塞鼻中亦可

凡九竅出血皆可用

墻頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴

火燒蓮房用水調

鍋底墨煤可以喫

石榴花片可以塞
火煨龍骨可以吹

生蘿蔔汁可以滴
水煎茅花可以喫

奇効良方卷之五十

奇効良方卷之五十一

腸澼痔漏明 附論

經曰風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉橫解腸澼
為痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精精亡
則邪熱傷肝因飽食行房則筋脉橫解而腸澼痔漏生焉夫痔
者 巢氏病源論有五曰牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也及古諸
方又有酒痔氣痔虫痔番花蝼蛄等痔之名不一且痔於肛門
生癰或在外 或在內有似鼠乳者有似櫻桃者其形不一其
病有痛有癢有硬有軟有膿潰者有不潰者有腫痛便難者有
隨大便下清血不止者有穿竅血出如線者至於失治而成漏
者成漏而穿臀者及有穿腸成孔糞從孔中出者或肛門四圍

生癰數枚膿血浸淫若蓮花者詳此諸證大凡肛邊生乳鼠時
出膿血者為牡痔肛邊生瘡腫痛出血者為牝痔肛邊生瘡且
疼且癢者為脉痔肛內結核寒熱出血者為腸痔肛門腫痛大
便難強力則肛出不收者為氣痔肛門瘡腫流血飲酒即發者
為酒痔肛邊有竅血出如射線者為血痔肛門浸淫濕爛內有
蟻虫蝕腸穿穴遂成漏者為虫痔也然此諸證皆本之於大腸
也大腸者庚金也本性燥清肅殺之氣本位主收所司主行津
液以從足陽明中州土之所化若旺則能生化萬物而衰則損
傷萬物故云萬物生於土而歸於土此之謂也然手足之陽明
同司其化焉若人醉飽行房精氣脫泄其脉空虛酒熱之毒流
着於脉或因醉飽淫極而強忍泄或用藥固其精弗能泄截停

積於脉歸注大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便
閉而痔漏作矣治宜苦寒瀉火辛溫和血潤燥疎風止痛之劑
也靈樞經云足太陽膀胱之脉及筋皆抵腰中入絡腎其支者
貫腎足故主筋為病則生此疾由是推之足厥陰之脉環繞前
後一陰故亦能為痔矣每見人患痔其發則色青痛甚蓋謂肝
苦急而然也且夫痔與漏初致之由雖同所患之病實異初生
肛邊成癰不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝久不止
者曰漏也原此受病者燥氣也為病者濕熱也胃行大腸則化
燥火以乘濕熱之實也若夫腸頭成塊者濕也作痛者風也膿
血潰出者熱勝血腐也潰成黃水者濕熱風燥也大便秘閉作大
痛者風熱鬱滯弗能通泄氣逼大腸而作也大腸結燥者主病

兼受火邪也凡此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而致也而腸
澀者為大便下血也蓋因人之不避風毒恣飲醇酒炙博之物
縱然毒氣無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格
壅滯熱毒下注血滲大腸其腸澀痔漏不可得而無矣經云筋
脈橫解腸澀為痔者此也至於臟毒腸風痔漏而名雖殊其源
實一大抵腸澀之病有可治不可治者若便血身寒則可治身
熱則不治腸澀下白沫脈沉者生脈浮者死如下膿血脈滑夫
者生脈絕則死腸澀脾脈外鼓沉久自已而肝脈小緩則易
治腎脈搏沉身熱則死也醫療之法惟宜祛風消毒解熱涼臟
和血潤燥隨宜施治無不瘥矣

場澀痔漏通治方

秦艽白朮丸

治痔疾并漏有膿血大便燥硬作疼痛不可忍

秦艽

去蘆

桃仁

去皮尖

皂角仁

去皮火燒存性各一兩

枳實 炒

當歸尾

酒製澤瀉

白朮 半兩

地榆 三錢

右為細末與桃仁泥碾勻湯煮麩糊和丸如梧桐子大令
藥光滑焙乾每服一百丸白湯送下空心服待少時以美
膳壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麩酒及五辛辣熱
大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈

秦艽蒼朮湯

秦艽

去苗

蒼朮

皂角仁

性煖

存桃仁 去皮尖各

黃蘗

去粗皮酒製

澤瀉

當歸尾

防風 一錢

檳榔 半錢

大黃 少許

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服待少時美膳壓之忌生冷硬物冷菜之類及酒濕麩乾薑之類如有膿加白葵

秦艽防風湯 治痔漏每日人便時發疼痛如無疼痛非痔漏

也此藥主之

秦艽

防風

當歸

白朮 各半

黃蘗

橘皮

苾胡

大黃 煨

澤瀉 各一

紅花

桃仁

升麻 各五

甘草 各六

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服避風寒忌房事及酒

濕麩辛熱之物

當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜多血苦痛不能

忍者

當歸尾

郁李仁

澤瀉

生地黄

煨大黃

枳實

蒼朮

秦艽 已上各一錢

麻子仁 半錢 皂角仁 一錢 另為細末煎成調服

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服忌風寒處大小便

秦艽羌活湯 治痔疾成塊下垂疣瘡其痒難忍

秦艽

羌活

黃芪 各半

麻黃

防風

升麻

苾胡

甘草 各一錢

藁本

細辛

紅花 各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

紅花桃仁湯 治痔疾經年因飽食筋脉橫解腸澀為痔常去

其筋脉橫解破血絡是也治法當補北方瀉中央

紅花 桃仁 蘇黃各半 生地黃

黃蘗各一 猪苓 漢防已 當歸尾

澤瀉 蒼朮 防風各一

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦艽 枳實各半 當歸 皂角仁去皮 燒

桃仁 澤瀉 白朮各一 大黃煨

紅花半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆 黃芪 枳殼 檳榔

川芎 黃芩 槐花 赤芍藥

羌活各一 白斂 蜂房炒焦 甘草各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

槐角丸 治諸痔及腸風下血脫肛

槐角去梗 防風 地榆 枳殼炒

當歸 黃芩各半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空心用米

飲送下

釣腸丸 治久新諸痔肛邊腫痛或時滄痒有膿血

瓜蒌二箇燒存性 蝟皮二箇燒存性 白礬煨 綠礬煨

白附子生用 天南星 鷄冠花剉炒 半夏略五

胡桃仁十五箇不油者煨存性 枳殼炒 附子炮去皮臍

訶子去核名

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九臨臥用温酒送下遠年不瘥者服十日効又服除根

皂刺丸 治痔漏而復痒

皂莢刺二兩燒烟盡存性 防風 槐花各七

蛇床子 白礬服 枳殼 白蒺藜炒去刺

羌活各半 蜂房炒焦 五倍子各半

右為細末醋調菘豆粉煑糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前以苦練根煎湯送下仍用童子熱尿入白礬末淋洗肛門

皂角煎丸 治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角三錢去核炙 白礬煨 刺蝟皮炙黃

薏苡仁 白芷已上各 桃仁去皮 甜葶藶炒

川芎 桔梗已上各 猪後蹄垂甲十枚燒存性

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用桑

白皮煎湯送下

芎歸丸 治痔下血不止

川芎 當歸 神麴炒 槐花微炒

黃芪

地榆已上各荆芥穗

頭髮燒存

木賊

阿膠炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米

飲送下

乾葛湯 治酒痔

乾葛

枳殼炒

半夏薑製

生地黄

茯苓

杏仁各半錢

黃芩

甘草各半錢

右作一服水二鍾黑豆一百粒生薑五片白梅一箇同煎

至一鍾食前服

橘皮湯 治氣痔

橘皮

枳殼炒

槐花炒

川芎各半錢

桃仁去皮炒

木香

檳榔

紫蘇莖葉

香附

甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食前服

荆芥湯 治氣滯發痔

荆芥穗

枳殼炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘草各等分

右為細末每服二錢空心用米湯調服

神効散 治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜怒不常

致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿漏血其痛

如割不可忍者但是諸腫瘡痔漏及腸風漏血此藥治之

苦參

川椒

苦葫蘆

芫荽子

槐花

枳殼

荊芥

金銀花

白芷

連翹

獨活

小茴香

麻黃

牡蠣煨

威靈仙

椿樹皮略二

右咬咀每用五錢水六七椀葱白二莖煎五七沸去滓以

盆盛藥水上坐先蒸後洗甚驗加黃老茄子二箇尤妙

黑丸子 專治久年痔漏下血用之屢驗

百草霜

白薑各一

木饅頭二兩烏梅

敗櫻

栢葉

亂髮已上各一兩二錢半俱各燒存性為末

桂心三錢

白芷半兩

右為細末研勻醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九空

心用米飲送下

逐瘀湯 通利大小腸取下惡物凡痔漏熱證用之有瘀血作

痛服之見效

川芎

白芷

赤芍藥

乾地黄

枳殼

阿膠

茯苓

五靈脂

蓬朮

茯神

木通

甘草生各一錢

桃仁去皮尖炒

大黃各一錢半

右作二服每服用水二鍾生薑三片蜜三匙同煎食前服

以利為度

蝸牛膏 敷痔瘡極效

蝸牛一枚

片腦

麝香各少許

右同研爛用磁盒盛次早取汁傅瘡上

蝟皮丸 治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮一兩 灸焦 槐花微炒 艾葉炒黃 白芍藥

枳殼炒 地榆 川芎 當歸

白礬煨 黃芪 貫衆各半 頭髮三錢 燒存性

猪後懸蹄垂甲十枚 灸焦 盈尺皂角一枚 醋去弦

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸食前用米飲送下

蝟皮散 治五痔

蝟皮炙 鼈甲醋炙 當歸剉焙各一兩半 大黃蒸三度炒

槐實炒 黃芪焙各二兩 蛇皮炙 露蜂房炙

藁本去苗土 桂心各一分 猪後懸蹄甲十枚 炙

右為細末每服三錢七空心煮白粥飲調服日二服

拔毒散 敷痔腫毒處

大黃 黃蘗 白芨 石膏

黃芩 黃連 白斂 梔子

朴硝 右為末用非花水調余

洗諸痔方

黃連 黃芩 荆芥 蛇床子各一兩

鏡面草 蚶跛草 槐條搗一 側柏葉四兩

右用新汲水煎傾盆內乘熱先薰後洗

七物湯 薰痔

皂莢三握 剉碎 艾一握 鼈甲二枚 剉碎 乾蝦蟆一枚 剉碎

雄黃一兩

麝香一錢

草烏二枚

右搗篩拌勻穿地坑內着熟火一斤方磚一片中心鑽一孔蓋坑口旋入藥一撮披衣坐上熏

加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆 蒸

黃芪

甘草 各等分

右為細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草

熏洗方

槐花 半兩 涼血

蓮房 一箇 涼血

荆芥 五文 去風

五倍子 三錢 去毒

地榆 半兩 去血

右為末每用半兩水一瓶以瓦器煎了入白

錢乘熱先熏後洗

五聖丹 治痔

雄黃

綠礬

朴硝

葉子雌黃

明白礬 各半兩

右件各礮碎以銀鍋一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入

綠礬五入白礬圓瓦片蓋之炭火煨一日夜看青烟出盡

有紅烟方可候冷取出紙襯頓地上用盆覆出火毒一日

夜入乳香沒藥末各一錢同研極細每抄一匙煎甘草湯

調敷外用鷄羽掃藥末蓋之日二次夜一次自然乾硬而

脫逐日須用葱白煎湯入朴硝溫洗軟帛拭乾然後傳藥

治痔猪膽膏

右用猪膽七枚取汁以建盞盛炭火熬成膏用單紙攤傳
須先用槐根白皮温洗後傳藥

寬腸丸 治内外痔

枳殼

黃連

百藥煎各等分

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三十九食前用米
湯送下

熊膽膏

治痔極効

熊膽

片腦

右各等分研細用并花水調以鷄羽掃痔上

治痔穀道中虫痒不止及正發疼痛

水銀

棗膏各二兩

右研和捻如棗核狀薄綿片裹內下部明日虫出若痛如
韶粉三大分作丸內之

熏洗方

右用韭菜不以多少先燒熱湯以盆盛湯在內以器具蓋
之止留一竅却以韭菜於湯內泡之以穀道坐竅上令湯
氣熏蒸候湯温冷却用韭菜輕輕洗瘡上數次自然可

又方

右用韭菜汁一椀蒼耳子菜汁一椀調勻日曬温洗絕根
半夏散 治諸痔疾初生急以此藥治之

右以半夏生為末先以生薑自然汁浴穀道後以半夏末

泡湯洗之不過三兩日即自消

龍腦散 治痔瘡熱痛

鯽魚一枚破開去腸肚入
穀精草與蒲燒存性

右為細末入龍腦少許用蜜調傳之

厚朴煎 本方云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入

厚朴五兩用生薑五兩搗爛
厚朴二兩相伴續炒黃

白朮

神麴 麥蘖 兩同炒黃

右為細末水糊為丸如梧桐子大疾作空心米飲下百丸
平時服三五十九丸厚朴厚腸胃麴蘖消酒食白朮導水血
自不作也五痔諸下血論不及此是亦以脾胃為主也

治痔方

右以鱧魚燒熏下部痔垂盡死

鷄峯烏金散 治痔漏

黃牛角心 猪牙皂角 刺蝟皮

穿山甲炒上同

皂角刺 槐子

枳殼

貫衆

阿膠等分

右為細末每服一錢半用胡桃肉研爛併酒調食前服大

腸有熱荊芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

臭樗皮散 治痔漏下血及膿不止

臭樗皮微炒 酸石榴皮 黃連去鬚 地榆

阿膠炒令黃 艾葉三分

右為細末每服二錢食前粥飲調下

葱青散 治痔漏

右用葱青內刮涎對停入蜜調勻先以木鬘子煎湯熏洗然後傳藥其冷如水唐仲舉云常有一吏人苦此渠族弟親合與之早飯前傳午後來謝拜於庭下云疾已安矣

雙金散

黃連

欒金各等分

右為細末蜜調敷之痔將好用欵口龍骨散

龍骨散

龍骨煨

白芷

黃丹

寒水石煨各等分

右為細末摻瘡口上小便赤色服導赤散

導赤散

生地黄

木通

甘草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

枳殼散 熏洗痔漏

枳殼

貫衆略二

荆芥

大栢皮略一

黃連

蛇床子

地骨皮

無名異

乾薑炮各半兩

蒼耳根

冬青葉

薤頭

栢枝各一把

黑豆半升

右以咀每用一大合用水三大椀煎至二椀先熏後洗日三五次

能消丸 治痔疾疼痛如錐刀刺不可忍

威靈仙一名能消去苗土四兩

卷栢去根

蛭皮燒灰存性

防風去叉

阿膠半兩 糯米炒一合

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九加至二十九不拘時用人參湯送下日二服

試虫散 治五痔痛甚

臭椿皮

景天陰乾即地骨皮 馬牙硝一兩

右為細末用精猪肉一大片摻藥末三錢七在肉上就上坐一二時起看有虫即出無即已

烟熏方 治痔漏痛

白鱈魚骨熟艾各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止

白金散 治久新痔痛如神

右用海螵蛸去籠皮為細末每用二三錢生麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久瘡自消

乳香散 治牡痔生瘡

乳香 猪牙皂角 鯨鯉甲各二兩 箬葉去頭粗梗

黃牛角尖長二寸者一對 蛇蛻一條頭尾俱全者

右入砂礮內蓋口鹽泥固濟曬乾用十斤炭火煨候碧焰出去火放冷取出細研每服二錢七以胡桃一箇取肉細

研拌藥空心酒調下五服見效

猪蹄灰丸 治牡痔生鼠乳肚門癢痛觸着有膿血出不絕

猪懸蹄甲煨存性一兩 水銀三六豆許

右先取水銀用蒸棗肉二枚研勻次入猪蹄灰和為丸如
鷄頭實大先以鹽湯洗下部內一九夜卧再用以瘡為度

檳榔散 治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫痛

檳榔 剉炒 澤瀉 酒浸 瞿麥 甜葶藶 隔紙

防已 藁本 去苗 陳皮 炒 去白 郁李仁 與陳皮

滑石 已上各 羌花 醋拌 炒黃 木香 略一 乾漆 炒 烟盡

右為細末每服二錢七不拘時温酒調下日三服

楸藤散 治痔下血不止生瘡腫痛

楸藤子 取仁 龜甲 醋炙 黃芪 自試 槐子 炒

川大黃 炒 蛇蛻 燒灰 各 藁本 桂心 各半

當歸 剉炒 蜂房 炙 各 猪後懸蹄甲 七枚 炙

右為細末每服二錢食前用粥飲調服

赤小豆散 治酒痔大腸中久積熱毒下血疼痛

赤小豆 炒熟 生地黃 黃芪 各一

白欬 桂心 各半 當歸 微炒 黃芩 各三

右為細末每服二錢食前用槐子煎湯調服

麝香散 治扎痔及一切內外痔瘡疼痛不可忍者

右用瓜萋新黃大者一枚以刀開下頂子不去穰選不蛀

皂莢子填滿却取開下頂子蓋別用紙筋泥固濟約三指

厚以炭火簇合燒令紅放一地坑內出火毒一宿取出入

麝香末一錢研令極細以磁盒盛每服一錢七米飲調下

温酒亦可服一劑永除根本

桑木耳散 治痔疾肝邊痒痛

桑木耳炙 槐木耳炙 蝟皮炙黃 羌活

當歸炒略 枳殼炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

神效方 治痔疾下血日夜不止

白礬五兩 綠礬三兩 黃丹 伏龍肝

蝟皮略

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡為度候冷取出研如粉以麩糊為丸如梧桐子大每服十九食前用酒飲送下

地榆散 治血痔

右用地榆為細末每服二錢七食前米湯調下日三服

治血箭痔

右用苦練子肉為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九空心蒼耳子煎湯送下日三服

止血方 治痔瘡血出不止

右用明血竭為末傳之

治痔疾便血方

右用活鱧魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用糝皮二兩洗淨寸截先將糝一兩鋪在瓦罐子內次安魚上面却將糝一兩蓋之即閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐子開一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用熟炭火六

七斤燒燉候烟絕取確子於淨地以瓦盆合定淨土擁勿
令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米
飲調下忌動風之物

威靈仙丸 治氣痔大便澀

威靈仙 去土 乳香 另研 枳殼 炒各

右為細末以粟米飯和為丸如梧桐子大每服十五丸食
前用米飲送下日三服

熏熨方 治氣痔脫肛

枳殼 炒 防風 去又名 白礬 枯一分

右吹咀拌勻水三椀煎至二椀乘熱熏之仍以軟帛蘸湯
熨之通手即淋洗

洗藥 治痔瘡久不愈者

桃條 柳條 槐條 萱草根

桑條 艾葉 荊芥 蒼耳根

茄根 略三

右吹咀水五椀煎三十沸去滓溫洗次貼後藥

香白芷 輕粉 各二 黃丹 三錢 五倍子 五箇 灰

麝香 少許

右為細末研勻瘡乾葱白汁調搽濕則乾貼之

神驗熏藥方 治痔漏積年不愈者

鰻鱺魚 半斤五月五日 蜷蝦 三枚 研

古件藥取成熟艾和藥末以青布捲之安磁瓶中着火燒

坐向瓶上熏之其虫及惡汁並出不復再發

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角 二兩

枳殼

當歸

蒼朮

陳皮

厚朴 製各一兩

烏梅

甘草 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

結陰丹 治腸風臙毒大便下血

枳殼 去穢

威靈仙

何首烏

椿根白皮

陳皮 去白

荆芥穗

黃芪 各等分

右為細末酒煮糊同蜜少許和丸如梧桐子大每服五十

丸加七十九食前用米飲送下一方不用蜜以醋少許同

陳米飲煎湯下

治腸風臙毒方

一兩茱萸半兩連

二味同炒不同研

糞前菜更調酒下

糞後却用酒調連

猪臟丸

治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不

急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊草煎湯調下

服之三日後効

黃連 二兩到碎

嫩猪臟 二尺去肥

右以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊丸如

梧桐子大每服三五十九食前米飲送下

鯽魚方

治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色痿黃

大活鯽魚 一箇不去鱗肚不穿孔去其腸鱗入白礬

白礬 一塊如金橋大

右用敗椶皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗
內燒帶生存性為細末每服一錢空心溫米飲調下一方
瓦甌內蓋定炭火燒為灰軟飯和丸如梧桐子大每服二
十九食前粥飲下

治腸風及脫肛不收有血下部腫悶疼痛

右用不蛀皂角五莖搥碎水一椀揉令皂角消盡絹二重
濾過取十分清汁將脫肛腸浸在藥水中其腸自收不用
手按如大腸收了更用湯盪其腰腹上下令皂角氣行則
不再作一方皂角去黑皮塗酥炙為末棗肉和丸如梧桐
子大每服十五丸食前粥飲下

勝金丸

一名百藥散治腸風下血瀉血不止及臟毒或便血

百藥煎

三兩一兩生用一兩
炒焦一兩燒存性

右為細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十九空心用米
飲送下一方為細末米湯調二錢服

四季側柏散

治腸風臟毒下血不止

側柏

燒存性春採東夏採
南秋採西冬採北

右為細末每服二錢糯米飲調下一方用葉一斤洗炙為
末每服二錢食前枳殼湯調下

腸風黑散

治臟毒下血

荆芥

燒

枳殼

炒各二兩

亂髮

槐花

槐角

蝟皮

炙

甘草

炙各兩半

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣同枳殼炙木

饅頭為末每服二錢食前温酒調服水煎亦可

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連

貫衆

鷄冠花

烏梅肉

大黃

各一兩

甘草

各三分

右為細末每服二錢不拘時米湯調下

神應丸

治腸風臟毒

黃連

去鬚入兩分作二分一分同薑切片同炒
黑色去薑一分薑汁浸一宿次日晒乾

右為細末糕糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

湯送下

蒜連丸

治腸風臟毒

黃連

研為末

獨蒜

煨熟

右同搗為丸如梧桐子大每服五十九空心陳米飲送下

香梅丸

治腸風臟毒

香白芷

烏梅

燒存性

百藥煎

燒存性

右等為末米糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米

飲送下

椿皮丸

治痔漏下血疼痛

東行椿根白皮

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米

湯送下

猪臟丸

治痔瘻下血

猪臟

一條洗淨控乾

槐花

炒為末填入臟內兩頭
扎定石器內米醋煮爛

右搗和丸如梧桐子大每服五十九丸食前當歸酒下

卷栢丸 治臟毒神効

卷栢生石土高四五寸根黃如絲 右為細末每服二錢空心米飲調服

黃芪各等

治腸風臙毒方

山裏果 晒乾

右為細末每服二錢空心米飲調服

奇効良方卷之五十一

奇効良方卷之五十二

脫肛門 附論

脫肛之證難經云虛實出焉出者為虛入者為實肛門之脫非
虛無故然哉蓋實則溫溫則內氣充有所蓄虛則寒寒則內氣
餒而不能收况大腸有厚薄與肺為表裏肺藏蘊熱則閉虛則
脫三因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因
父利大腸虛冷所為也肛門為大腸之候大腸傷於寒利而用
力勞軀其氣下衝肛門脫出也用香附子荆芥等分煎湯洗之
或以五倍子碾為細末放於紙上托入肛緩緩揉入若或長久
男子變成腸風痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子朴硝
等分煎湯洗之亦用木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便了

貼少許効又有久痢臟虛皆能令人肛門突出有腸頭作痒即
腹中有虫丈夫由此酒色過度大腸者傳道之官腎者作強之
官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治
法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治無不愈矣

脫肛通治方

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮

一箇確內燒
今焦黃存性

磁石

半兩火煨於醋
內蘸淬七次

辣桂 三錢

龍頭 三枚慢火
炙令焦黃

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底炙熱熨按肛
上托入

蛤散 治大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒叫

呼久痢後皆脫肛

文蛤

即五倍子
不拘多少

右為細末水煎汁浸洗更入白礬蛇床尤佳洗後用赤石
脂為末少許摻在芭蕉葉上頻用托入或脫出有長尺許
者以兩橈相並中空一尺以磁瓶盛藥水滿與橈相平令
病人仰卧所脫浸在瓶中逐日換藥水如此浸縮為度

槐花散

治脫肛

槐花

槐角

各等分
炒香黃

右為細末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

縮砂湯

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

各等分

右為細末每服二錢空心用米飲調下

乳香丸 治脫肛腸出

乳香 另研

白丁香 錢半 枳殼 去穢炒

芫青 去頭足 糯米炒

大黃 蒸焙

鶴風草 炒 萹澄茄

牡蠣 煨各 半兩

右為細末粟米糊為丸如梧桐子大每服三十九丸腸風膿
茶清送下諸痔煎薤白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

磁石散 治脫肛

磁石 醋半兩火煨 碎七次

右為細末每服一錢空心米湯調下

香荆散 治脫肛

香附子 荆芥穗 各半 縮砂 二錢

右為細末每服三錢食前用白湯調服

治腸頭挺出

右用蝦蟆皮一片燒付患處一方瓶內燒熏

治脫肛歷年不愈

右用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汗洗日再無不

瘡并燒礬石粉之則亦良

木賊散 治脫肛不熱

右用木賊燒存性為末摻肛門上按之

蜚蠊丸 治肛門癢或出膿血有垂傍生孔竅內

蜚蠊 七枚五月五日收 去翅足炙為末

新牛糞 半兩 肥羊肉 一兩 炒

右共如膏丸如蓮子大炙令熱以新綿薄裹內下部中半

日少喫飯即大便中虫出三五度永瘥

治穀道蠶赤腫又痒方

右用杏仁搗作膏傅之一方熬令黃搗以綿蘸塗穀道中

治肛門腫痛

右用木鱉子去殼取肉四五枚研如泥安新瓦器或木盆以沸湯衝動洗了另用少許塗患處

奇効良方卷之五十二

奇効良方卷之五十三

癘風門 附論

內經云風氣與太陽行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉腫脹而有癘衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癘潰風寒客於脉而不去名曰癘風以其酷熱暴悍可畏耳夫人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出然此邪毒藥雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疙疹與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經

也是以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也
氣受之則在上多血受之則在下多肌血俱受其重非醫之神
手能起此病者鮮矣有或從上或從下以漸而來者皆是可治
之病人見其病勢緩多忽之若能攝養保和得宜鮮有不愈者
也若不能絕滋味遠色慾皆不免再發則終於不能攻矣前人
曾治五人中間惟一婦人得免而疾安以其貧甚無物可喫欲
啖無從所覓餘四人不能禁忌妄作者三二年後皆再發而危
孫真人云吾常治四五百人終無一人免於死非孫真人不能
治也蓋無一人能守禁忌耳此一婦人本病外因又服三五百
貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈若人患此鼻
柱壞爛肌肉瘍潰者是知陽明經分受風木之邪也明矣不可

泥於風寒而已內有臭涎惡血陳疰惡物之類者又何爲而致
然也蓋謂厥陰主生五虫其相火熱甚而制金金衰故木來侮
肺受熱而氣不清矣况血隨氣運涎隨氣降氣既不能施化則
血聚而涎積矣血聚久則汚惡涎積久則臭濁濕涎熱血相爲
熏蒸久則肌肉潰爛而生虫治之使邪出於齒縫大腸之間者
乃是陽明經之道路也蓋真土敗木賊之證宜如此况又不能守
戒忌者歟此丹溪先生所以痛言之深也大風病是受天地間
殺物之風古爲癘風可不畏哉三因方之所載此其惡疾者是
也雖名曰風未必因風所得大率多嗜色慾勞動氣血熱發汗
泄不避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉皮膚傷潰鼻梁
塌壞千金方云所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心

良可嘆也然亦有傳染者原其所因皆夫婦不知禁忌因而不
避風寒暑濕之氣因虛邪入經絡久則漸成斯疾又有勞役飲
食凝結於胃流入經絡風涎相搏致使風痒不可一例作癩風
治之則誤矣內經云脈風成爲癩俗云癩病也先擇皮散從少
至多服三五七日灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈三灸之後
服二聖散泄熱祛血中之風邪戒房室三年病愈藥灸同止述
類右形此治肺風之法也靈樞云癩風數刺其腫上已刺以銳
針針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食以犯其
病且癩病古今以爲難治之證前人救生民之病苦置諸方論
詳備于象後之學者誠心鑒諸

癩風通治方

通天再造散 治大風惡疾

鬱金一兩 大黃一兩 白牽牛取頭末六錢

皂角刺經年者

古為細末每服五錢日未出面東以無灰酒調下盡量為
度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌食發
毒之物半年但食稠粥軟飯漸漸調理自然頭毛皮膚如
常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得
食牛馬驢騾等肉犯者死不救矣

神效追命散 治大風

北大黃半錢 川鬱金半兩 大皂莢刺一兩

右為細末每服二錢用真大楓子油入好酒溫調臨睡服

隔兩日再服宜候瀉下無虫方瘥

皂棘湯 治大風

皂莢刺燒半生半

北人黃一錢輕粉半錢

右為細末每服二錢空心酒調服取下惡物服藥數日瘥
出毒血甚臭

皂角丸 治大風諸癩

肥長皂角二十條先炙透後
去皮去其枝自落

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘瀝去清者候冷入雪
糕杵為丸如梧桐子大每服五十九丸不問飢飽酒送下

硫黃酒 殺癩風虫

天靈蓋不拘多
少研細

右酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前服或添

大楓子油更好

黑虎丹 治大風諸癩惡虫内蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩二箇去頭足
燒存性半生

桃仁去皮

人中白生各
二兩麝香 一錢 雄黃

硫黃各一
兩

穿山甲燒灰老皂莢刺燒存性
各半兩

輕粉二錢
半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸月初五更
米飲湯送下連日取虫盡則愈殺瘵虫通用

烏蛇丸 治風癩殺虫

烏蛇肉酒浸蜂房炙各一
兩半桃仁浸去皮白蒺藜炒杵
去刺

皂角刺炒焦貫仲 獨活 檳榔

苦參各半 蕪荑 雷丸 雄黃

硫黃各半 硃砂二錢 胡麻子四兩 蝦蟆二箇去頭

右為細末以長皂角十條水三升煎成膏和藥末丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒送下

治大風

右用烏蛇三條事治令淨蒸煮熟去骨取肉焙乾為細末用宿蒸餅丸如米粒大以喂烏鷄其鷄食盡烏蛇三條後却烹鷄取肉為末或為丸或作散酒服之丸時仍用宿蒸餅每服三十九甚者不過三五鷄即愈

雷丸散 風癩取虫

雷丸 阿魏 貫衆末各二錢 麝香半錢

水銀 硫黃 雄黃各二錢半用乳鉢入

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

蝦蟆丸 治大風殺五虫

乾蝦蟆一兩 肥長皂角一條先炙透後去皮

右為細末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪籠內置麩上蒸熟去麩入麝香半錢同搗丸如梧桐子大每服二十一丸空心溫酒送下

蔓荊丸 治大風

蔓荊子 蒼耳子 枸杞子 牛旁子炒

黑牽牛炒 胡麻子 香白芷 何首烏

威靈仙 荆芥穗 白蒺藜炒去 直殭蠶炒去

細辛 去苗

皂角刺

苦參

大草烏 去皮尖 生用

獨活 各一兩

右為細末大風油和丸如梧桐子大每服二十四丸食前

用茶清送下

胡麻散 解風熱毒氣癰疹瘰癧

方見風門

得効第一方 治癘風即大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆

因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗出不避邪風使滯氣

相干則肌肉不仁勞氣泣濁則附熱不利故色敗皮膚癢

潰鼻梁塌壞或自作不仁極張之業所致久則或遍身白

皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菘豆

漿添熟水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白

膠香各等分為細末滴水為丸不拘時溫水下三七粒日

三服

仙方 治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩

倒肌膚蒼如苔蘚勢若不可救此方特効

右用皂角刺三斤炭火蒸久曬乾為末濃煎大黃湯下一

七服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

浴法 治大風頑麻癩風紫癩白癩

麻黃根 地骨皮 草烏頭 各二

右剉碎碾朴硝二兩和勻每用藥一兩水一桶椒一合葱

三十根艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去澤
坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上
如珠出更坐室中或睡片時尤佳汗解方着衣避風而出
五日再浴如此浴二次浴罷便服換骨丹

換骨丹

九肋鼈甲

大蜈蚣

細剉各二兩

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性為末巴豆半兩去皮
膜順手碾青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中火燒令焦
存巴豆五分性將棗巴豆碾爛如泥入前二味末碾勻以
醋煮糊和丸如葶豆大每服七丸虛人四五丸用溫薑汁
下候利惡物如膿血爛腸即住三兩服未利更加三丸次

服遇仙丹

遇仙丹

人參

紫參一名一

苦參

白殭蠶去嘴各

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫鹽
湯送下日二服次服踈風散

踈風散

山梔仁半兩 大黃

滑石

熟地黄各一

右為細末入朴硝半兩研令勻每服一錢食後淡茶清調
下次用佛手膏

佛手膏 去黑紫瘡核

斑猫翅七枚去

巴豆去殼

杏仁去皮

紅娘子去翅足

砒霜一錢

韶粉

黃蠟各半

槐角三條

菘豆一合

盆硝

瀝青研

膩粉炒

亂髮略

硫黃

黃丹略

清油四兩

右先將油煎令亂髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味下焦者漉出方下硫黃盆硝丹粉蠟等以篋子不住手攪令勻滴水中成珠不散為度以磁器貯之用時先將針刺瘡核用藥一粟米大放針處次日擠瘡有惡臭黑膿血出三兩日血漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥

滑石

甘草各半

朴硝

大黃略

巴豆去皮炒

黑牽牛生半兩

右為細末麩糊為丸如菘豆大每服十五丸加至三十九臨卧時用金銀薄荷湯送下次服甘草散

甘草散

甘草

滑石各半

大黃一分

山豆根一兩

右為細末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒丸

解毒丸

瓜蒌根

三兩

大黃

二錢

朴硝

二錢半

右為細末麩糊為丸如菘豆大每服二十九加至三十九

白湯下次服黑神丹

黑神丹

訶子

四箇

黑牽牛生

巴戟

半兩

甘遂

三錢

赤小豆生四十九枚

右為細末麩糊和丸如菽豆大每服十九丸加至十五丸不拘時用薄苜湯送下次用水膏藥

水膏藥 傳貼破處及面脚上瘡令生肉

陳米炒升 馬蹄香

藿香各一兩 麝香一錢另研

陳皮去灰去半斤炒紫色

右為細末入麝香用冷水調掃付瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方迺秘傳有驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

三濟丸 治大風惡疾

川芎

當歸

熟地黄

荆芥穗各二兩

細辛去葉

防風各一兩

桂心半兩

右剉碎先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黄一斤搗汁浸一宿焙乾再以酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黄汁浸蒸餅為丸如梧桐子大陰乾收貯後用好烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫熱下藥五十九丸食遠服

八葉湯 淋瀝大風瘡

桑葉

荷葉

地黄葉

皂角葉

菊葉

荅耳葉

菖蒲葉

何首烏葉

右等分曬乾燒存性為細末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡痍茶毒膿汁淋漓眉鬢墮落手足指脫頑痺痛痒

顏色枯瘁鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之惡無越於斯負此病者百無一生

換肌散 治大風疾年深久不能愈以至毛髮墮落鼻梁崩壞

額顛腫破不至踰月取效如神

白花蛇酒浸一宿黑烏蛇酒浸一宿地龍去土沙苑蒺藜

蔓荆子 威靈仙 荆芥穗 甘菊花

苦參 紫參 沙參 天門冬

木賊 不灰木 赤芍藥 石菖蒲

川芎 定風草 何首烏 胡麻子炒

草烏去皮蒼朮去皮米泔浸木鱉子 甘草炙各三兩

當歸 細辛 香白芷略一兩天麻二兩

右為細末每服五錢七酒調下食後服酒多為妙

如聖散 治大風疾洗瘡藥大有神效

苦參 玄參 紫參 荆芥穗

沙參 陳皮 厚朴 頑荆子

麻黃去節各二兩防風 白芷 蔓荆子

威靈仙略二兩

右為細末每用三錢桃柳枝各一把水五升同煎臨睡時

熱洗忌五辛物

黃精煎 治大風癩病面赤疹起手足攣急身發瘡痍及指節

已落者

黃精生者十斤白蜜 五斤 生地黄肥者五斤

右先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻煎之成稠煎為度每用溫酒調化二錢七或三錢七日三夜一久服風癩瘡平面如童子延年不老

治大風瘡

右用楓木子不以多少燒存性灰研研與輕粉等分用麻油調敷瘡上極妙如濕則乾摻之經驗方云昔章貢有鼓角匠生肉瘰因詰之云舊害大風得道人傳此藥今遂愈

蒿艾酒 治癩疾

右取白艾蒿十束如升大煮取汁以麩糯米亦如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡疾偏體面目有瘡皆可服

雄硃散 治大風

雄黃

硃砂

滑石

阿魏

雌黃

雷丸炒

藜蘆炒

生犀角屑

硫黃各一錢半

斑猫

芫青

各去翅足糯米炒各用二十四箇

黑皂角刺錢七

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

白花蛇造酒方 治大風

每白花蛇一條蒸米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之頓於麴上然後糜和勻頓於蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨為末每服酒一盞溫服蛇末少許仍將酒脚并糟做餅食之尤佳

治身上癩瘡

右以蒼耳子葉煎湯洗之

卷之五十三

卷之四