



小兒衛生總微論方卷第十一

八痢論

小兒氣血怯嫩藏腑軟弱因觸冒風寒飲食冷熱以邪干正致脾胃不和凝滯停積蘊毒結作或水穀不聚或膿血純雜變而為痢其候有八一曰水穀痢謂便下糞稀薄而不聚駛利出易水穀不化也然雖是瀉便時亦覺裏急後重故為痢也二曰冷痢謂便下純白膿也三曰熱痢謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜也五曰積痢謂有積傷為痢浸久或瘥而復發也六曰疳痢謂患疳瘡而下痢也七曰蠱痢謂如蠱毒下紫黑血或如赤豆汁或如雞鴨肝片

也八曰休惜痢謂下血黑黯中有白物如腸中之脂或如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更休愛惜故以名之亦名休息者謂患即無休息而至死也凡痢若粥藥不能進者此便為死候也治水穀痢方已具前瀉項之下

治冷痢方

玉腸散 治冷痢初即大便青色後乃作膿

白石脂火凝當歸酒洗丁香 白朮各一兩草薺去皮

厚朴姜製各半兩

右細末每服半錢粥飲調下無時

厚朴圓 治藏寒泄瀉下痢純白腹中絞痛虛氣脹

滿手足逆冷

厚朴姜製半兩訶子半兩炮去核白龍骨半兩火凝

肉豆寇一錢面裹

右為極細末麴糊和圓黍米大每服十圓米飲

下食前

烏骨散 主治如前

右烏魚骨去皮研細末每服半錢米飲調服或炙黃用之亦治婦人漏血

藍汁 主治如前

右以藍青取葉搗令極爛絞取汁略溫每服半合

或一合無時

馬齒汁 主治如前

右杵生馬齒菜絞汁略温每服一合入蜜一匙頭許調勻空心服

石蓮散 主治如前

右以石蓮不拘多少去皮用沙糖炒過為細末每服一錢米飲調下乳食前累驗

胡黃蓮圓 治血痢下多久而不差或作藏毒下血

帶青黃色

胡黃蓮 炒蕪荑棟淨炒夜明沙

各等分水飛取明淨者

右末猪胆汁和圓黍米大每服十圓陳米飲下無

時

治赤白滯痢方

罌粟飲子 治赤白滯痢 罌粟殼 半兩去蒂

人參 去芦一分 厚朴 去粗皮生薑製一兩 白茯苓 半兩 甘姜炮 一分

烏梅 三箇去核用 御米殼 三箇 阿膠 炒三片 煨蛤粉

右同末每服一錢水酒各半盞煎數沸温服乳食

前嘔吐者不可服

三奇湯 治白痢 御米殼 二兩塗 酸石榴皮 塗一兩

炙阿膠 半兩蛤粉

右細末每服半錢烏梅甘草湯調送下乳食前

治熱痢方

白梅飲子 治熱痢下血

右以白梅一枝去核盪水研爛合臘茶醋湯沃服之昔陳應之治曾相痢血百餘日諸醫不能療陳用此一啜而差又梁相亦病痢血應之曰此挾水穀者用三物散數服而愈

三物散 胡黃蓮 烏梅肉 竈下土 各等分

右末每服一錢臘茶清調下食前空腹溫服

又方 治熱痢下血頻併不差

右以白梅五箇取肉臘茶二錢同研勻細每服一錢或半錢白湯點服或以醋湯沃服之量大小加減食前

黃蓮丹 治如前 黃連 去須二兩

當歸 去芦并土 白頭翁 去芦三分 蔓菁根 洗三焙

乾木香 兩半 川練子 殼裏殼去

右細末粳米飯和圓黍米大每服十粒米飲下乳食前或十五粒

必効圓 主治如前 川黃蓮 去須二兩 大棗 半升

乾姜 一兩 白礬 兩

右用一器盛之塩泥固濟留一孔竅木炭火煨煙息為度取出為末麵糊丸黍大每服十圓食前米飲下

雄黃散 治腸胃虛冷下痢頻併腹痛不可忍

右末飯和圓如麻子大每服一二十圓米飲下食

前雄黃一分研乳香一分白礬一分雄黃散遺失藥品今葺後

當歸散 治如前 當歸一分并土芍藥一分

黃蓮一分去須一分枳殼一分去穢一分

右細末每服半錢水五分煎至三分溫服下血多者入甘草一寸同煎乳食前

槐花散 治血痢不差 槐花棟淨炒地榆炒各等

右細末每服半錢一錢米飲調下乳食前

聖効散 治血痢久不差 赤石脂一兩燒赤

白龍骨一兩阿膠一兩炒蛤粉訶梨勒煨去核木香

兩黃蓮半兩乾姜半兩甘草半兩炙

右細末每服半錢煎粟米飲調下食前

厚腸圓 治血痢腸虛 黃蓮炒須川練子一兩

木香半兩阿膠炒蛤粉去粉當歸去土吳茱萸去核

右細末粟米飯和圓黍米大每服一二十圓米飲下食前

下食前

勝金圓 治血痢不止

後重努軀肛脫

黃栢皮半兩赤芍藥四錢

右同研勻每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下日三服乳食前或飯丸麻子大每服二三十丸

艾葉湯 治虛冷下痢白膿

艾葉一兩當歸一兩乾姜一兩木香半兩

訶梨勒煨去核用半兩

右細末每服一錢水一小盞入粟米少許同煎至五分去滓溫服食前大小以意加減

又方 治如前

右以臘茶一錢入熱醋少許調服乳食前大小以意加減

又方 治如前

右以沙牛角鯁燒存性為末粥飲調下一錢或半錢乳食前

阿膠圓 治如前 赤茯苓赤芍藥 各一兩為末

右以米醋煮阿膠一兩和圓葉荳大米飲下一二

十圓乳食前

酒煎湯 治腸胃虛冷泄瀉不止變成白痢

御米殼三箇 阿膠三片蛤粉炒焦去粉

右同細末每服一錢水酒各半盞煎數沸溫服乳

食前嘔吐者不可服

三神丹 治如前

右以肥大無尖草烏頭三箇各去皮一箇生一箇炮熟一箇燒作黑灰同為細末麵糊圓如蘿蔔子大每服三粒水瀉井花水下白痢乾姜湯下赤痢

甘草湯下赤白滯痢乾姜甘草湯下食前

木香炒蓮圓 治脾胃虛弱寒濕冷熱相搏滑泄下

痢赤白

黃蓮 二兩粗好折開加姜四兩淨洗亦勿不住手攪貴得勻也炒

焦脆去姜不用只用

木香 半兩

剉勻如豆大又用生大同入石銀器中炒訶子 煨去核用半兩

右同細末以濕紙包粟米飯慢火煨水脉溜取出

和藥圓如棗莖大每服二三十圓食前來飲下神

金鎖散 治赤白滯痢日久不瘥

黃蓮 去須一分用菜萁一分同炒厚朴 去粗皮半兩去菜萁不用只用黃蓮

右同細末嬰孩一字二三歲半錢紫蘓木瓜湯調

下日三服食前

赤脂丹 治如前

赤石脂 乾姜 炮肉荳蔻 各一兩麴裏煨香去麴用

右細末麵糊圓黍米大每服十粒米飲下食前

治小兒下痢膿血

華澄茄 兩破故紙 半兩黃蓮 半兩去須 木香 一分

右細末每服半錢陳米飲調下食日二服量見加

減

治小兒風邪所干下痢頻併裏急後重

以天南星一兩生為末每服半錢水二盞生姜十

片米十粒煎至半盞溫服食前

治小兒久痢藏毒下膿血不止

以好大棗一箇去核入黃丹半錢硃砂一皂子許
膩粉一分並研細置棗肉內用大麥麵裹慢灰火
中炮香熟去麩并棗皮了研極細入少軟飯圓如
麻子大量兒大小加減圓數煎槐花湯下甚者二
服定食前

小桃花圓 治小兒赤白痢 赤石脂 龍骨煨

蜜陀僧 定粉 黃丹 炒紫黑色用

右等分醋糊圓菜菔六每服十圓十五圓米飲下
乳食前

治赤白諸痢 以蜂房燒末飲服量大小與

又以鷄腸草取汁一合和蜜溫服良以雲母粉半兩
更研極細量兒大小加減煮白粥拌勻空腹食之
又以胡粉熟蒸熬令色變飲服之亦治無辜痢良大
小以意加減

治久痢不差 以沒石子二箇剉熬令黃研細作餛
飩食之

治小兒諸痢香連圓 黃蓮去龍骨煨白石脂

全川姜 炮 枯礬 各一兩

右末以粟米粥和圓麻子大每服三十圓米飲下
乳食前量大小與服

木香黃蓮圓 治冷熱相雜下痢赤白裏急後重腹

痛絞撮及腸胃氣虛暴傷乳哺

木香

黃蓮

去須各一分

白附子尖

二箇

右細末粟米飯和圓菘莖大或黍米大每服十圓至二三十圓量大小與之食前米飲下日夜三四

服

四神散

治諸般赤白痢

當歸

去蘆

乾姜

炮

黃蘗

炒黃連 去須炒各等分

右四味各自為末如水穀利各用半錢和勻量兒

大小一錢至半錢濃煎烏梅湯調下赤痢者加黃

蘗倍之白痢者加乾姜倍之後重重急

神書

服沈存中言牙家常作此藥最獲大効

搨皮湯 治如前

右以新搨皮不拘多少去外黑皮細切熬乾每服

二錢水一盞煎至半盞去渣更煎如膏量大小溫

服立差食前

又方 治如前

右以鷄子一箇取清攤連紙一張令徧照乾疊作

四重包撮烏梅十箇有肉好者安熨斗內炭火燒

煙歆盡存性取出頓一椀中上用蓋子合之候冷

研細更入水銀粉少許和勻量兒大小分三五服

空心甘花水調下如一服微利止後服

二色圓 治如前神 吳茱萸棟去枝 二兩黃連去須 二兩巴豆四十九箇去皮

右同於銚子內炒令黃赤色去巴豆不用只將上面二味各自為末麵糊和圓如蘿蔔子大看大小緊慢加減圓數如白痢只服茱萸圓赤痢只服黃連圓白多赤少者多服茱萸圓赤多白少者多服黃連圓少服茱萸圓赤白相等者中半服之

御米湯 治如前 御米十箇和穀取汁草 二錢當歸焙一分洗黃連去須 兩

右末每服一錢米飲調下乳食前 嬰粟圓 治如前 嬰粟殼一兩蜜炒酸石榴皮燒

性四 錢甘草半兩阿膠粉一錢到蛤 炒去粉右末煉蜜和圓小鷄頭肉大每服一圓水六分盞化開煎至四分溫服乳食前

二烏圓 治如前 川烏箇一草烏箇一巴豆箇七右各燒及九分同研細酒煮黃蠟鎔化入少好油拌和撈勻成膏每用旋圓茱萸大每服三圓看大小加減血痢黃連湯下白痢乾姜湯下水穀利倒

流水下赤白痢乾姜甘草湯下 固腸圓 治赤白滯痢多日不可漸成羸瘦 黃連去須 兩木香兩二半夏洗七次湯 乾姜 兩赤石脂煨五次厚朴去粗皮 兩白朮兩

赤石脂煨五次厚朴去粗皮 兩白朮兩

右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓米飲下乳食前

建胃丹 治赤白等痢疾日久疰羸

黃連炒去須剉微 白龍骨煨半兩 白石脂煨半兩

神麴炒半兩 烏梅肉炒兩 乾姜炮兩 白礬分一

右細末醋糊圓和黍米大每服十粒十五粒米飲

下乳食前

妙應膏 治久痢赤白諸藥不効 蜜陀僧末半兩

黃丹研半兩 定粉半兩 研已上三味同於餅子內

訶梨勒皮去核 木香各一兩 巴豆十枚去皮

砒霜半錢 射香一錢

右同研勻細先以黃蠟四兩慢火鎔化入姜汁勻

熬成膏每用旋圓黍米大週歲兒一粒二三歲兒

二粒四五歲三粒六七歲五粒血多冷甘草湯下

膿多溫艾葉湯下臨臥服忌熱物亦治積痢

金華散 治滯痢多時羸瘦休弱不堪疾勢困重

右好黃連為細末每服一錢水一小盞煎至半盞

入蜜少許和勻放溫服之日五六服食前

又方 治如前

右以麻子一合炒香熟為末每服一錢溫蜜漿水

和服立効

木香三使湯 治赤白久痢拖延時月至天寒不斷

右以木香方寸許黃連半兩水半升同煮至水乾去黃連不用只將木香薄切焙乾為末分三服第一服橘皮湯調下第二服陳米飲下第三服甘草湯調下乳食前

烏金散 治赤白滯痢及有所傷下痢

右以青州棗不拘箇數去核入白礬末滿以紙裹煨存性為末每服半錢米飲調下未愈宜取之如赤者更入好茶半錢同調服白者不用

治精痢方

軟金丹 治久積成痢 砒霜 雄黃 研水飛

已豆 去皮膜

右三味等分各研細末先以黃蠟看多少於石銀器內炭火鎔化入藥末竹篦子左右手各攪四十九遍如此七次數足取下火乘軟搓成小錠以油單裹置新磁器中要用火烘軟旋圓如粟米大或如蘿蔔子大三五粒量大小病勢加減赤痢溫藥汁下白痢或赤白雜下並米飲下乳食前

大尊重圓 治虛中有積腸滑下痢裏急後重臍腹

疼痛 粉霜 三錢 黃丹 半兩 定粉 半兩 礪砂 兩

膩粉 錢三 京三稜木 一兩 白麵 量五錢少即

右為末同勻滴水和圓照乾炭火上炒令裂俟再拆羅為末棗肉和圓菜豆大每服一二九米飲下

乳食前

朱砂萬應丸 治積痢久痢滯痢一切諸痢多日不

差 朱砂末 一錢 硃砂末 一錢 巴豆 七箇去

臘二棗 大許

古於鈹子內先鎔蠟化入巴豆○熬至黑焦去巴

豆不用却用上二味揅極勻放疑為劑如用旋丸

如菴豆大每服三丸白痢艾湯下赤痢黃連湯下

赤白痢黃連艾湯下水穀痢新水下乳食前

針頭丸 治如前 朱砂半錢硃一錢

巴豆七箇用油煎 硫黃只使骰子大 研末

更用蠟為丸

右旋丸針頭丸每服一圓米飲下量兒大小加減

圓數食前

燒青丸 治諸積痢 輕粉錢二文精石一分霜粉一錢

硃砂 一錢

右為末入白麵二錢拌勻滴水和劑捻作餅子文

武火燒熟再研為細末滴水和丸芥子大漿水下

三四丸一方保州郡廉訪方無硃砂却有龍腦一

字餘並同亦不燒只為末水浸蒸餅圓麻子大一

歲兒一九二三歲二丸四五歲三丸六七歲五丸

並夜深空腹冷水送下如虛中沉積泄痢膿血交

下腹痛煩渴百藥不效不敢取轉者服之便愈並

不動氣忌一切生冷油膩毒物又名瑞白丸

治疳痢方 在疳疾之下

治蠱毒痢方

育腸湯 治蠱痢下血如豆汁赤水腹痛

罌粟穀五兩細挫水酒炒黃地榆槐花蜜拌炒赤

厚朴去粗皮甘草炙橘皮去白酸石榴皮水

當歸去芦白芍藥 五倍子去其中虫

阿膠 蛤粉炒二兩去蛤粉

右為粗末每服二錢水一盞入陳粳米二十粒錫

一塊皂子大煎至五分去滓温服食前

緩腸湯 治蠱痢如前

人參去芦白朮去芦當歸去芦白茯苓

厚朴去粗皮白芍藥 甘草炙阿膠蛤粉炒

黃耆蜜炙陳粳米炒御米殼三兩蜜炙黃

右為粗米每服二錢水一盞入生姜三片棗一箇

同煎至五分去渣温服空腹食前日三服

犀角散 治蠱痢如前 犀角屑 地榆剉

黃連去須栢葉微炒黃蘗微炙黃芩炒當歸

赤薜荔取葉生地黄各白朮

右為細末每服一錢粥飲調下乳食前

地榆圓 治蠱痢腸中畜毒下血如豆汁或諸惡物

地榆多黃連去須乾藍葉兩川升麻一兩

川練子去核半兩苦練子去核半兩

右為細末軟飲和丸如黍米大每服十九米飲下

量大小加減乳食前附下食前

地榆樗皮丸 治如前 地榆四錢樗根白皮三錢

白芍藥一錢阿膠蛤粉炒去當歸去芦洗

烏梅肉半錢木瓜一錢枳殼去穰炒茯苓一錢

肉苳蔻一箇麩裏甘草二錢木香一錢綿姜半錢

金櫻子二錢人參半錢

右為末煉蜜丸麻子大每服三二十九米飲下乳

食前

地榆散 治蠱毒痢下血或如鷄鴨肝片腹痛不止

地榆兩甘草半兩赤芍藥兩栢葉微炒茜根兩

當歸去芦洗淨訶梨勒煨用皮黃連炒

右為麁散每服二錢水一小盞煎至六分去滓溫

服乳食前

白頭翁散 治蠱毒痢如鷄鴨肝片隨膿血而下

白頭翁去芦黃蓮微炒茜根煨蘇枋木剉故紙皮

炙各犀角屑兩地榆半兩甘草一錢

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫

服乳食前

地黄汁 治蠱痢畜毒下血

右以生地黄汁一升分四五服量大小與服食前

立効

治休息痢方

鯀湯丸 治休息痢下五色膿血如爛魚腸無糞腸

中攪痛 粉霜錢一 輕粉錢一 朱砂研一錢 硃砂研一錢

白丁香錢末四 乳香研半錢 巴豆心七箇去油

右為末和勻蒸去皮棗肉為丸粟米大嬰孩二三

圓二三歲兒四五丸旋丸兒大者圓如麻子大鯀

湯送下日三服及與調胃氣藥間服大良亦治積

痢蠱痢藏毒痢

神安圓 治如前 砒霜字一 龍骨二字 烏魚骨字二

赤石脂字二 茯苓字三 黃連去須三字 定粉字三 乾姜字三 炮字三

黃丹 三字火飛

右為細末入射香少許拌勻飯和丸黍米大每服

五丸輕粉湯下亦治諸痢赤者甘草湯下白者乾

姜湯下赤白雜者乾姜甘草湯下

樗根散 治積年毒痢無休息

樗根白皮大眼樹是也取北陰下者亦可

訶子七箇取去核取皮

右用河水三升煮取一升去滓時時呷服一方二

味等分為粗末每服二錢水一大盞煎至半盞去

滓溫服時時呷服痢住喫淡粥飲乳將息

治諸痢雜証

龍骨散 治下痢體熱煩渴 白龍骨煨 兩 茯神分

人參去 三分 胡黃連兩 蘇根三分 麥門冬三分 焙

右為散每服一錢水一盞煎至五分去渣服乳

食前

青黛散 治下痢發渴不止 晴舉方 青黛一分 乾藕節

一蜜陀僧兩 半 漢羅一分 乃旱螺

右為末每服半錢米飲調下無時

冬瓜汁 治如前 右杵冬瓜汁飲之

烏梅飲 治如前 烏梅十箇 麥門冬一分 蜜二兩

右分為五七服用水一小盞煎半盞入蜜攪勻服

之無時

楮葉湯 治下痢發渴得水飲便嘔逆不止

右以楮葉炙令黃香用漿水半升浸之候水綠色

去葉以木瓜一箇切碎內汁中煮五七沸去木瓜

放溫細細服無時

治嬰小下痢腹大且堅

右以衣中白魚摩腹上

治小兒熱下黃赤汁洙及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠶

生虫 黃連去 須 藥皮炒 苦參 鬼舊獨活去 芦

橘皮 芍藥 阿膠蛤粉炒去蛤粉各半兩

右為末以藍汁及蜜和丸小豆大日服五丸至十

丸冬時無藍汁用子一合為末入藥內

治小兒久痢膿汁濕墜生瘡
右以艾葉一味每服二錢水一盞煎至半盞去渣
溫服更量大小加減乳食前

治小兒下痢腹脹堅硬
右以故衣帶多垢者切碎水三升煮取一升分服

治小兒卒暴下痢
以小鯉魚一頭燒灰末之米飲
調下以鷄子和黃蠟作煎餅與服

又以林檎楮子同杵取汁服以意服之
黃柿餅治秋痢以黃柿搗和米粉作餅或作粥
與食之

治小兒洞下滑痢以羊角中骨燒存性為末飲調
服方寸匕

治小兒脾胃虛怯泄痢腹痛
以棟肉豈菹絕大好者一箇開一深竅填乳香一
塊用酵麵裹了慢火煨麵熟將藥為細末麵糊和
丸菴荳大每服二十九乳食前米飲下

養胃丹治小兒藏寒下痢白膿頻數
附子一牧重半兩者赤石脂煨兩川姜炮兩

訶梨勒皮一兩
右為細末粟米飯丸黍米大每服十粒米飲下乳
食前

脫肛

脫肛

脫肛

小兒脫肛者謂大腸肛頭脫出也此因瀉痢日久腸滑冷氣相搏裏急下重而便難用力努軀致肛頭脫而下出寒冷干乘不能收返得入今叙治方後
治小兒肛頭脫出以故麻鞋底炙熱得所按令入頻上接之即不出或燒蠶頭灰研細附上然後按入永差

以木賊燒存性為末摻上用指按令入

蠶頭丸治小兒因瀉痢及冷搏積久脫肛下出不

能返收腸中疼而不得入死蠶頭二箇炙令焦

小婿皮一箇炙令焦磁石火煨米醋淬不許過數以

桂心三兩不見火

右為細末煉蜜和丸小豆大三歲至五歲兒五七

九溫米飲下日三服一方不用蠶頭只三味全

赤石脂散治因瀉痢努軀氣下推出肛頭不入

真赤石脂伏龍肝等

右為細末每用半錢傅肛頭上頻用按入

蛛丹散治因瀉痢脫肛疼痛又名黑神散

右以大蜘蛛一箇瓠葉重裏繫定入合子內燒黑

灰存性入黃丹少許研勻凡用先煎白礬葱椒湯

洗拭乾將藥末摻在軟綿上手掌按接入收之甚

妙亦治大人又一方桑葉裏鹽泥固燒

蕪荑丹治久痢大腸虛冷肛門脫出

白蕪萸

去枝一兩

微炒

鼈甲

一兩

酥炙

蝸牛殼

一兩

磁石

煨醋研水飛

黃連

炒去須

蚺蛇胆

半兩

右為細末軟飯和丸黍米大每服十粒粥飲下乳

食前

二金散治火痢腸頭虛冷肛門脫出

龍骨

一兩

枯鼈殼

一枚

塗酥炙

右為細末每用一字或半錢乾糝上按按均之

又方以白龍骨研如粉撲之

又以鼈頭燒灰細末撲之

又以沿業螺燒末和猪膏傅上立縮收之此螺全似

蝸牛而微黃小兩後沿業而生

又以虎骨燒末水調服半錢或一錢日三甚良

治小兒大腸隨肛帶出轉久不能收之料以生括樓

取汁塗之

又以猪肉汁蘸手隨按之令暖自入

又以乾胡荽切一升燒煙熏之則縮入

又以木賊不拘多少燒存性為末摻上按按之

縮砂散治小兒滑瀉肛頭脫出

以縮砂一兩去皮為末每用一錢以猪腰子一片

批開入藥末在內線繫米泔煮熟與兒食之次服

白礬丸如脫肛氣逆遍身虛腫喘急者死不治

白礬丸

如脫肛

氣逆

遍身虛腫

喘急

者死

不治

白礬丸

白礬丸

粘定粉

寒水石

煨各等分

白右為細末爛飯研細和丸黍米大每服五丸煎烏梅湯送下乳食前

斗門散人治小兒瀉痢多時青黃羸瘦脫肛不收

訶子肉兩枳殼去穢麩炒黃地榆各等分

右為細末每服一錢來飲調下一歲下者半錢乳

食前煎下

又方治如前香附子 荊芥穗等分

右為粗末每用三匙以水一大碗煎十數沸淋

又方以浮萍草不拘多少曬乾杵為細末乾貼上

蝴蝶兒不拘多少陰為乾末塗手心按上即止

小兒衛生總微論方卷第十一

小兒衛生總微論方卷第十二

五疳論

小兒疳病諸論叢雜唯五疳之說為當其証候外則

傳變不同內則悉屬五藏一曰肝疳其候搖頭揉目

白膜遮精遍身多汗喜覆面而臥眼中澁痒色澤青

黃髮豎頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多日漸羸

瘦二曰心疳其候渾身壯熱頰赤面黃心膏兩腕煩

躁滿悶口舌生瘡盜汗多驚下痢膿血神彩衰耗三

曰脾疳其候腹大鼓上多筋脉喘促氣粗心腹壅

脹多啼咳逆水不消唇口乾燥好食泥土情意不

樂憎明好暗痢多酸臭肌肉內消形枯力劣甚則大

肉陷下四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮毛焦落咽喉不利揉鼻咬甲口鼻生瘡腹內氣脹乳食不進大腸不調泄利不常憎寒木標糞中米出洞下白疳五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒斷生瘡耳焦腦熱手足逆冷吐逆滑泄下部生蠶脫肛不收夜啼饒哭漸成困重甚則高骨乃敗小兒疳疾乃與大人勞瘵相似故亦名疳勞大人勞者因腎藏虛損精髓衰枯小兒疳者因脾藏虛損津液消亡病久相傳至五藏皆損也大人勞疾骨削而氣耗小兒疳疾腹鼓而神羸以其病之始也其藏之傳受不同故也至於傳久五藏皆損則一也故五損者經言一損於皮毛皮聚毛

落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌肉脾也三損於血脉血脉虛少不能榮於藏府心也四損於筋筋緩不能自收持肝也五損損於骨骨痿不能起於牀腎也病極則大肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒有疾多是上下所壞小兒藏府嫩軟易虛易實一切於諸病悞行轉下致脾胃虛弱津液內耗皆能成疳且如潮熱日中時發者是脾藏虛心藏實日冲之時而內發其熱法當先補其肝母肝乃心之母也肝實而後瀉心心得母氣則平而潮熱乃愈醫見潮熱妄謂其實便以大黃牙硝等冷藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癰病發作寒熱飲水脇

下有形而硬痛法當用藥漸消磨之醫見有癖便以
巴豆礪砂葷駛藥下之下既多而津液耗則漸成癖
也又如傷寒五六日之後有下証因以冷藥下之太
過致脾胃虛而津液耗即便引飲不止而熱生如此
則熱氣內耗於津液肌肉外消而羸瘦他邪相干証
變百端亦因成癖也又如吐瀉病久津液耗亡亦能
成癖也又如小兒食肥甘物多因傷為積則蘊痢發
熱津液內耗亦能作甘故甘即癖也聖濟經云肥甘
之過積為癖黃乃謂是矣故諸病皆能成癖也甘癖
之候眼濡多困或生白膜唇口淡白身色黃黑食泥
土生米喜臥冷地疥癬頭瘡洞泄青白黃沫下痢膿

血腹滿喘咳耳鼻生瘡髮稀作穗頭大項細肚大青
筋脚手垂痺瘦瘠飲水筋痿骨重形劣疋羸皆其証
也本因脾虛津耗久則漸變而成傳緩者則為慢癖
傳緊者則為急癖又當辨認冷熱肥瘦其肥熱癖者
乃因食肥甘積聚生熱而作故多病於初也錢乙治
用黃連丸其瘦冷癖者乃因轉下瀉痢生冷而作故
多病於久也錢乙用木香丸通治冷熱癖者錢乙用
如聖丸凡治小兒之病必量虛實冷熱不可妄行轉
下恐變生癖也若病初之脾虛津少發渴欲飲者當
生胃中○津液煎錢乙白朮散與服惟多則緣好其
錢乙諸方本集載之

又有一証其候腹中有塊身体羸瘦毛髮焦稀腹大氣喘冷痢脫肛與食愛吐俗曰無辜寶鑑云按玄中記有無辜之禽一名姑護一名鈞星鬼但喜夜飛人有暴露小兒衣袂裊包其禽飛立在上令兒患此疾也予性好尋閔異書十餘年間竟不知玄中記之所出又此禽既云夜飛必有形狀世間亦莫之曾見是必覘假以鬼名而偽言者也今詳其証而對其病實乃疳疾之候耳特為破其邪說以祛惑亂矣

治五藏疳方

地黃丸 治肝疳拘急疳氣入眼隱澁或生白膜暈

腎赤脉等疾

熟地黃八錢 山茱萸取四錢 乾山藥四錢

牡丹皮去心三錢 白茯苓去黑皮三錢

右為細末煉蜜和丸桐子大三歲下兒一二丸上者三四丸溫水化下空心

熊膽天麻丸 治肝疳羸瘦搖頭揉木目百脉拘急

熊膽 天麻 羌活去土 蟬殼去土

使君子去殼 胡黃連各兩 盧會 乾蟬各半兩

右為細末粳米飯和丸黍米大每服十九煎荆芥湯下量大小與無時

奪命丹 治心疳体熱驚搐煩渴髮稀肚大泄瀉羸瘦

朱砂 射香 牛黃 腦子 盧會

沒藥

鴨砂

熊膽

麒麟竭半兩

粉霜

一錢使君子十個去殼

青黛三錢

右為末滴水和九豌豆大每服一粒薄荷水化下

日三兒大二三丸

朱黃丹 治心疝挾驚發熱煩渴盜汗羸瘦

朱砂一分研

天竺黃兩乾全蝎一個

天漿子十四個去殼微炒

人參一兩胡黃連一兩

青黛一分研

龍腦一錢研

右為末拌勻煉蜜和丸黍米每服十粒人參湯下

無時

黃栗丸

治脾疝發黃身腫

黃土一兩末

陳皮一兩白木香一分巴豆二枚去殼出油

右為末飯和圓粟米大每服三二丸煎黑豆汁送

下無時

木香煎 治脾疝因不知飢飽清滯內停腹大脚細

下利無度

南木香一兩肉荳蔻一兩煨去殼

乾蟾酥二個

胡黃連一兩使君子一兩去殼五靈脂一兩

巴豆七個去殼紙裏出油射香一分研

右為末細勻滴水和劑入石臼杵一二百下圓如

黍米大每服一二丸至五七丸量大小與溫生姜

湯下乳食後一歲下者一丸二歲上者三丸以意

加之

肉苳蔻丹 治脾疴如前

肉苳蔻 一兩 麩 使君子 一兩 去殼 青皮 麩 一兩

牽牛子 一分 炒 黃 盧舍 一分 研 射香 半錢 研

右研勻細糯米飯和丸黍米大每服十圓生姜湯

下食後

香連散 治脾疴泄瀉腹大脚細漸成瘦弱及諸脾

胃不和氣不調順竝能治之

木香 一分 黃連 麩 須半兩 訶子 麩 去核 灰

肉苳蔻 三個 麩 去麩 甘草 一分 炙

右為細末每服一字或半錢米飲湯調下乳食前

射香丹 治肺疴皮毛枯燥咳嗽上氣

胡黃連 一兩 半 夏 紫蘇子 一分 微炒

五味子 一分 乾蟾 一個 酒炙 乾 射香 一分 研

盧會 一分 研 朱砂 一分 研

右為末細勻棗肉和丸黍米大每服五七粒米飲

下無時

灵砂丹 治肺疴因咳嗽羸瘦皮枯毛落

人參 半兩 去皮 甜葶藶 一分 五灵脂 一分

胡黃連 一分 為末 辰砂 半兩 研 射香 一分 研

盧會 一分 研 杏仁 去皮尖 麩 炒 黃 一分

右為末拌勻粳米飯和圓黍米大每服十九人參

湯下無時

石綠散 治腎痺耳生瘡及治肥痺頭瘡鼻爛浸
久不差 石綠 白芷 各等分

右為末先以生甘草水洗瘡拭乾傳藥一日愈

蛙鷄灰散 治腎痺成腫腸虛虫蝕下部肛盡腸等

右以長脚蛙青背一枚鷄骨一分同燒為灰細研

為末吹入下部中令深入效用大効

桃白散 治如前 飛根白皮 一兩 黃蘗 一兩 蜜煉

黃連 兩 去頭 炒 蛇蛻 半兩 乾爛牛 燒灰 一

青州棗 五十个 去核燒灰

右為細末入定粉一分射香末一錢同研勻每服

一掌至半錢粥飲調下乳食前量輕重加減用藥

如聖丹 治如前 乾蟬殼 燒 灰 半兩 土 不

蚺蛇膽 一分 大棗 一分 以上先為木 黃丹 一分

定粉 研 一分 射香 一錢 研

右同拌研勻細用好醋看乾濕拌勻白杵一二百

下成膏丸黍米大每服五七粒米飲下量大小加

減又化三二粒調塗患處若虫出乃愈

烏金膏 治腎痺入經灌注陰囊黃亮色腫

通草 一分 燒 黃皮 一分 燒 各存性

右同研為末每用一錢以豬膽調成膏於陰腫

處徧塗之如末退更煎蛇床子湯之 再調塗 必効

二肝丸 治疝痢不止 龍膽草 去芦 一兩

漏芦去芦 一兩 菖蒲節者 一兩 九胡黃連中 一兩

地榆先研為末 一兩 雞肝一兩 豬肝一兩

右將藥末入二肝內裏定以水二盞入鹽少許煮至肝熟於石臼中杵一二百下成膏九黍米大每服十粒射香湯下食前

金靈散 治腎痺時久骨沉力弱項細頭重致天柱

骨倒不能擊舉擡頭

右以白疆蚕不拘多少揀直者去絲紫炒焦為末每服半錢或一字一錢薄荷酒調下日消更用生

力散塗之

生力散 右以鼈子三個單麻子三十箇各去殼取

肉同研細每用一錢許津唾調攤紙上先緊抱定

兒搯項上令熱貼之 治痔瀉痢方

赤石脂散 治痔瀉不止 赤石脂 川芎 各等分

右為細末量大小多寡米飲調下乳食前

二聖丸 治瀉久不愈羸瘦成痔宜常服之

川黃連去須 黃栢去粗皮 各一兩

右為細末將藥入猪膽內湯煮熟取出丸棗豆大每服二三十九米飲下無時

竹茹丸 治疴氣泄瀉煩渴其効如神

好黃連去須 一兩 吳茱萸棟去枝梗 一兩

右一味以蜜相和拌勻炒赤黃色去茱只用黃連

為末薄糊和丸蘿蔔子大每服十九煎竹茹米飲送下無時

六神丹 治疳氣羸瘦藏府怯弱泄瀉虛滑乳食減少引飲無度心腹脹滿

丁香

木香

肉荳蔻

各半兩並麩

訶子

半兩煨去核皮

使君子

去殼

盧會

一兩細研

右為細末棗肉和丸麻子大每服五七丸温米飲下乳食前服此藥於夏秋間應小兒泄瀉色白或瀉多服藥不差者但與之便定

如聖丸

治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連去漬

白蕪荑

去扇取仁

使君子

去殼一兩

射香

半錢

乾蟾

三個到酒熬膏

右為細末入蟾膏和丸麻子大二三歲以下者呢五七丸以上者十九一十五丸入參湯下食前

木香散

治疳瀉腹脹

木香

青皮

去穢各一兩

陳粟米

一合巴豆

三十粒去皮同米炒至巴豆焦黃去巴豆留米用

草荳蔻

二箇一箇生用

煨熟

蟻娘

二箇去頭尾麩

右為細末每服一字或半錢米飲調下食前

硫黃丸

治疳瀉色白如米泔

巴豆

十四箇去皮膜

硫黃末

一錢

青黛一錢末

蕪荑

去皮一錢

右拌研勻細水浸蒸餅和丸菜豆大米泔水送下

三丸食前

金粟丹 治疳瘦泄瀉腹大好食泥土

母丁香 草龍膽去芦厚朴去粗皮生薑製

加黃朱砂研飛青黛研各一兩夜明砂微炒

蟾殼去上訶子肉微炒

右為細末和蜜一半麩糊一半相心丸黍米大每

服十粒米飲下無時

橘香丸 治疳積黃瘦盜汗腹脹泄瀉宿滯不化氣

促發喘 陳皮 木香各一兩姜黃切片

草荳蔻仁 白木剉炒 牽牛子炒各半兩

右為細末滴水和丸麻子大每服十丸葱白米飲

下食後

木香芥粒丸 治如前 陳粟米二合

巴豆半兩去皮膜同米炒 陳皮半兩 檳榔研一兩

人參去芦一分 木香一分

右為細末飯和丸芥子大每用看虛實大小加減

三五丸木湯下不拘時

射香丸 治脾熱生疳泄瀉氣弱不食

川苦練取肉一兩用童子小便浸一宿焙乾 盧會 檳榔

蕪荑去扇各半兩 沒石子一分 巴豆半兩皮膜同苦練慢炒火至微紫色

去肥豆 射香少許

右為細末猪膽汁浸蒸餅和丸黃米大每服十丸

米飲下食後

吳婆散 治疳瀉不止不計度數漸成羸瘦飲食減

少農藥不効 莖根白皮一分 黃栢蜜炙一分

蕪荑去皮一分 黃連去頭一分 沒石子一錢半

厚朴去粗皮一分 木香一錢 丁香一錢

棟根白皮半錢 檳榔一錢

右為末三歲以下兒每用半錢以上至六七歲者

一錢煎紫蘇木瓜米飲調下食前日三屢驗此藥

性小溫暴熱瀉者不可服一方無沒石子丁香檳

榔三味

水蓼丹 治疳氣羸瘦血痢 蛇蛻一兩 牛黃一分

雞頭殼燒存性二味 胡藟連半兩 水蓼半兩

硃砂半兩研 盧舍一分研 粉霜一分研

右拌勻細軟飯和丸黍米大每服五七粒射香湯

下無時

龍骨湯 治疳氣瘦弱下痢白膿久而不差

龍骨半兩 訶梨勒皮半兩焙 赤石脂半兩

酸石榴皮炒一分 木香一分 使君子仁一分

右為細末每服一字或半錢射香湯調下無時

丁香散 治如前 丁香二個 黃連一寸 大棗一個

右以棗裹二藥麻纏火上燒存性研為細末米飲

調下無時

芫蔚粥 治如前

右以芫蔚葉即益母草也煮粥食之或取汁飲亦妙

薔薇汁 治如前

右以生薔薇根洗淨細切前濃汁稍飲之

勝金丸 治如前及加腹脹

右以鷄子一枚打一眼子如豆大入去皮巴豆一粒臙粉一錢在內以五十重紙裹於飯甑內蒸三次取鷄子肉同藥研更入射百少許細勻添少糊丸如黍米大食後臨臥溫湯下二三丸量大小與服一方用鷄子一枚打破和臙粉炒乾為散米飲

薤糯餅 治如前

右以薤白一握生杵如泥同蜜和糯米粉研作餅炙熟與喫不過二三次差

樗白棊子 治如前

右以樗根白皮搗細碎麪拌和切作小顆棊子日燉少時又拌麪一次凡三過為度水煮熟加鹽醋頓服糧大小與困重者服之差

樗根米泔汁 治如前

右以樗根白皮煮濃汁半鷄子殼和粟米泔半鷄子殼同灌下部再作即差其驗如神

木香使君丹 治疳氣羸瘠雖能食不生肌肉時

泄利無休 使君子去殼二兩木香一兩丁香一兩

厚朴去粗皮生沒石子一兩胡黃連一兩

肉荳蔻麩一兩以上先為末 盧會一分研

射香一分研

右為末同勻以粟飯和丸黍米大每服十粒煎

陳橘皮湯下無時乳食前

君子丸 治疳勞發熱掃眉咬甲髮踈脹脹不思乳

食羸瘦虛滑不痢無度愛食泥土

厚朴去粗皮製甘草炙青黛

訶子炒去核取皮用各半兩陳皮一分

白蕪荑去扇使君子去殼一兩麩煨熟

右為末煉蜜和丸鷄頭子大三歲下兒半丸上者

一九乳汁或米飲化下着夾熱瀉用之極妙

青黛散 治諸疳瀉痢毛焦羸瘦

右以青黛研為細散水調服之量大小與

歌曰

孩兒雜病變成疳 不問強羸女與男

或侶積傷食不進 漸成柴瘦困耽

休熱口乾頻飲水 皮毛枯槁四支攤

腹大時更下痢 青黃白赤一般

眼滯面黃鼻爛赤 口氣增寒卧不安

忽然瀉下如泔淀 只似膿膠涕作團

肛頭凸出饒嗽唯

不吹哺乳淚潛

腹中有病須醫療

何須祈禱賽神盤

此方便是青黛散

孩兒服餌立安痊

赤虎丸 治疳積瀉痢

朱砂 別研 胡黃連

川黃連 去須 盧會

膩粉 各一 硫黃 二別研

肉苳菘 麩裏煨 一个去麩 巴豆 廿四个去皮用麩炒至

射香 少許 右為末研勻細麩糊和丸如蘿蔔

子大甘草湯下一歲兒一丸以意加減

漏芦煮肝散 治疳氣肚脹冷熱不調瀉痢無度

右以漏芦一兩為末每服一錢 猪肝一兩鹽少

許水煮熟空心頓服大 疳無毒疳

君子散 治五疳小便白濁瀉痢無度

右以使君子仁為末米飲調服食前

厚脾丸 治疳勞虛冷白痢泄瀉手足逆冷

厚朴 夫粗皮姜 肉苳菘 一个麩煨去麩

龍骨 半兩煨 訶子肉 煨去核用半兩

右為細末糊丸菜豆大米飲下十九無時

蝦蟇丸 治諸疳疳瀉 盧會 研 黃連 去須

穀精草 桂心 朱砂 研各 縮紗仁 二

熊膽 半錢 溫水化 研 射香 半錢 研

右除研藥外細判用大一蝦蟇去了肚腸入到藥在

內以線縫合先用好醋浸少時次慢火炙酒醋又

炙至焦黑放冷杵研為末入研藥拌勻取獭猪膽汁和九葉豆大每服五七丸米飲下量大小加減此乃知信州王紹祖方

治諸疳虫動方

肥兒丸 治諸疳久患藏府胃虛虫動口漸羸瘦腹

大不能行髮豎作穗肌体發熱精神衰弱

黃連夫須神麴炒各一兩使君子仁肉荳蔻麴裏

麥蘖炒各半兩木香二錢檳榔二个不見火

右為細末麩糊和丸蘿蔔子大每服二三十九

熟水下食空服

盧會凡 治五疳羸瘦虫咬腹痛肚大青筋一切疳

盧會 末香 胡黃連各一分

乾蟾浸一个酒炙焦檳榔二錢青黛二錢

青皮去穢一分切碎入去皮巴豆只用青皮

使君子仁三十个蕪荑一錢射香一字

右為細末用猪膽汁和丸黍米大每服十九米飲

下無時

又方 盧會純色木香 胡黃連 川黃連去

青皮去穢白蕪荑取仁雷元 鶴虱微炒各半兩

射香一錢研

右為細末粟米飯和丸葉豆大米飲下一二十九

無時

又方 盧會半錢 赤石脂一錢 使君子七個去殼

雷元一錢 姜黃一錢 川練子去核一錢

檳榔一錢 巴豆七個去皮膜出油尽

右為細末攪猪膽汁糊丸黍米大一歲兒二三丸
以上者三四丸量大小與之冷水香湯下無時

射香黃連丸 治疳氣羸瘦白虫作

胡黃連 白蕪荑 去扇各宣連半兩辰砂一分

射香一字研 木香半兩

右為細末糊丸菜豆大米飲下五七丸三歲上者
十丸無時

榆仁丸 治疳熱瘦悴虫作痛

榆仁去皮 黃連去頭各一兩

右為細末用猪膽七個取汁在椀中和藥安甌上
蒸九次每日一次候數足研射香半錢入之以白

湯浸蒸餅和劑丸菜豆大米每服五七丸至一二十

丸米飲下無時

椎黃丹 治五疳羸瘦多生虫動 乾蟾酥炙焦

胡黃連 白蕪荑去扇 川黃連去頭

乾漆 半兩炒烟 椎黃半兩飛 射香一錢研

右為末拌勻猪膽汁和丸黍米大每服十粒新汲
水下無時

乾漆散 治疳疾虵動腹痛疼

乾漆一錢炒使君子十四個白蕪荑六十片去

棟樹東邊皮日曬去粗皮取白皮一分

右為細末每二三歲兒半錢下者一字砂糖熟水

調下無時

使君子散 治如前 使君子仁一錢炒

黑牽牛炒過為末二錢輕粉二錢

右為末每用半錢於五更初疎米飲調下無時

三根散 治疳疾虵作腹痛啼叫不止每至月初間

即甚狀如神崇 貫虫根去上棠梨根取皮用

酸石榴根各一兩栗刺 故綿 乾漆各半兩

忘六味炆燒存性為細末每服一錢水八分盞前

至四分去滓溫服無時

猪肚丹 治疳瘦盜汗少力大便有虫曾經大効

川黃連去頭胡黃連 木香各一兩羌活去

盧會 肉豆蔻去殼去油白蕪荑去扇

鼈甲酥炙焦去裙欄各半兩

右為細末用猪肚一个先刷令淨以好白芷二兩

內肚中蒸極軟熟去白芷不用却入諸藥縫合再

蒸如泥取出同肚入臼杵二三百下成膏丸黍米

大每服十粒米飲下量大小加減無時

綠礬丸 治疳疾有虫愛食土泥

右以綠礬為末猪膽汁和丸菴豆大每服五七丸

米飲下無時

又方治如前

右以市令人聚時買市中羊肉半斤用繩繫之頓地上令人把繩頭拖至家水洗淨炒炙依科與兒食之未能食者煮至汁與飲一方肉一斤繩繫曳數里勿洗炙與食

除毒丹 治疳疔不差傳染兄弟姊妹

鬼臼去毛一兩 苦參剉半兩 青箱子半兩

草龍膽去芦半兩 硃黃一分 緋絹一分

乾蟾一分 白礬一分

右件藥剉伴一處並燒存性為末練蜜和丸麻子

大每服十粒磨沉香湯下無時

治小兒疳疔

右以鷓鴣糞乾為末炙猪肉蘸與之啖奇妙糞多在水山石之上紫色如花就上刮取之

治小兒疳濕痛痒下部生蠶虫蝕瘡

以沒石子為末吹下部中

又以地榆煮汁洗之日二

又以鐵衣著下部中

治小兒疳濕生蠶蝕痛

以地蒿蓄一把水二升煮至半升空腹服半合大

小以意加減

治小兒疳熱伏結腸下赤黃汁沫及如魚腦雜血肛
中瘡坐蠶生虫蝕痛痒

黃連 去頭 藥皮 炒 苦參 鬼臼

獨活 去芦 橘皮 芍藥

阿膠 各半兩判蛤粉炒去蛤粉

右為末以藍汁入少熟蜜和丸小豆大每服五七
丸米飲下無時冬時無新藍取汁用子一合春為
末入藥內蜜丸

治小兒疳濕生蠶蝕下痒痛

胡粉 雄黃 各一分水研飛

右同研細每用少許傅下部中

治小兒疳痢不差久成濕蠶

右以艾葉半兩水一升煮取半兩量兒大小以意
加減與服

治諸疳方

五疳保童丸 治五藏諸疳一切竝主

青黛 研 雄黃 研 射香 列 盧會 研

熊膽 研 胡黃連 黃連 去頭 龍膽 去芦

苦棟皮 取皮 蝦蟇灰 蝸牛 微炒 白鮮魚 炙焦黃

白燕 代 夜明沙 微炒 五倍子 青皮 去白

天漿子 微炒各一分 蟾頭 一枚炙令黃

右為細末糯米飯和丸麻子大每一歲兒十九溫

米飲下日三服無時

龍香散 治五疳瘦悴多啼乳噎口瘡髮穗

白朮 一分 石膽半錢 龍腦一分 陳皮末一錢

射香半字研

右為細末每服半錢米飲調下二歲下者服一字

無時

醒功散 治五疳 苦楝根皮生子東引者米泔浸

鶴虱各等分

右二味為末拌勻每服半錢熱水調下連進二服

無時

使君子丸 治諸疳和脾胃

使君子仁兩 川芎一分 厚朴去麁皮生

用一分 陳皮一分去白穢

右為細末煉蜜和丸皂子大三歲已上一粒已下

半粒陳米飲化下無時

二香青蟾丸 治久疳積熱面青口乾咬甲擗眉愛

鹽食土咳嗽肚大青筋紫瘦狂羸

母丁香三個 射香半字 青黛一分 蟾一隻去腸肚

右為細末煮漿水飯和圓粟米大溫水送下三九

無時

盧會丸 治五疳不長肌肉食減日漸黃瘦

盧會 蕪荑去皮 青黛 檳榔

黃連 去須各一分 胡黃連 半兩 蟬殼 二十一個去土

猪膽 二個 射香 少許

右除猪膽外為細末却用猪膽和丸麻子大每服五七丸飲飲下無時

橘連丸 治疳氣脾胃不和飲食不化日漸羸瘦

陳皮 一兩 黃連 去須一兩半米泔浸一宿

右為細末別研射香末半錢拌勻用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候至臨熟各以針微劄破以熟為度取出入粟米飯和丸菘豆大每服一二十九米飲下無時

熊膽丸 治諸疳羸瘦 熊膽 使君子仁 各等分

右研細放入磁器中蒸焙宿蒸餅就丸麻子大米飲送下二十九無時

蝸牛殼 治一切諸疳

右以蝸牛殼七箇洗去塵土曬乾內酥蜜於殼中磁器盛之紙封糊蓋於蒸飯下饋時頃饋中蒸至飯熟取出細研漸令服一日至盡

香蟾丹 治諸疳肌瘦肚大筋多髮稀脚細

乾蟾 五個水浸去骨川斤藏瓶一個頂上取一
竅入蟾肉在內鹽正固齊通留數子木炭
火燒至烟息存性取出放地上 胡黃連 二兩
一宿出火毒為末

蛇蛻 兩 地龍 去土半 天竺黃 一分 朱砂 研兩

射香 一分研

右為末勻細糯米飯和丸黍米大每服十粒米飲下無時

夜明沙丹 治五疳腹脹目濇多睡

夜明沙微炒 胡黃連半兩 草龍膽去芦半兩

苦棟根皮兩半 乾蟾五個 青黛味先為末

射香 盧會各一分 研細

右研勻細粳米飯和丸黍米大每服十粒米飲下

無時

紫霜丸 治諸疳發熱肚大脚細髮穗面黃宿滯不

消或作寒熱腹內疼痛經年瘦弱及中惡等病

代赭石火煨得碎為度 朱砂研一分 射香研一分

牛黃研二錢 朱砂研一分 射香研一分

鼈甲醋一分 巴豆一分 枳殼去穢炒二錢

當歸去芦并上 甘草三分 木香一分 生犀末二錢

大黃三分

右為細末煉蜜和丸黃米大每服三五丸米飲下

無時

如聖丸 治五疳羸瘦面黃腹急盜汗體熱乳食不

消 白蕪荑微炒 黃連去頭 神麴炒

麥蘗微炒各一兩

右為細末積猪膽汁和丸菘豆大每服五七丸射

香湯下

金瓜丸 治疳熱黃瘦作熱發渴久服解熱進食肥

肌黃連去頭黃蘗 甘草炙 青皮去穢各

右為細末積猪膽汁和勻却入膽中線繫定於銀

石器內以漿水煮五七沸取出風裏懸一宿於膽

內出藥入鉢再入射香少許同研爛勻丸藥菜豆

大三歲下五七丸上者十數丸空心米飲湯下日

三服無時

肥肌丸 治五疳黃瘦久不美食手與脚俱浮腫煩

渴飲水常服退熱肥肌殺虫去疳此衛小兒之寶

也 川棟子去核取肉 川芎二兩 橘皮揀淨四兩

龍膽二兩 芦巴豆十四個 去皮同橘皮龍

右為細末麩糊和丸麻子大朱砂為衣每服十九

十五丸米飲下腹脹橘皮湯下無

香蟾丸 治諸疳 大蟾一隻 去腸肚好醋浸三日

蕪荑去皮 黃連一分 甘草一分 使君子去殼

夜明沙炒至焦 黃去米 射香一字 研

右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服五七丸米

飲下無時

又方名同治同 乾蟾三個 酥 五靈脂去沙石二兩

蟬殼半兩 雄黃半兩 訶子肉半兩 母丁香半兩

胡黃連一兩 黃連去頭 使君子仁一兩 青黛半兩

右為細末麩糊丸菜豆大湯下二三十丸無時

又方名同治同 鼈甲去裙襖爛蝦蟇炙黃訶子炮取

木香各一兩 盧會研 鐵粉研 雄黃研飛

胡黃連各半 射香二分研

右都如粉細勻糊丸粟米大每服一十九米飲下
病大羸瘦者不過五七服愈曾經効驗

牛黃煎 治諸疳食傷氣脹体瘦壯熱髮穗多困疳

羸齒爛鼻瘡

瀉痢丁奚潮熱等疾 大蟾一隻去皮骨肚腸炙焦

猪猪膽一個取汁同熬成膏 胡黃連 訶子炮取 使君子仁

蟬殼去土 沒石子 盧會 蕪荑去扇 熊膽

夜明沙 朱砂 水飛 椎黃 水飛 各分 木香

肉荳蔻炮裏煨去殼 夏用半 秋冬一分 牛黃一錢別研

射香一錢別研 腦子半錢別研

右為末入蟾膏和丸麻子大米飲下五七丸驚疳

金銀薄荷湯下乾疳腹脹桃仁茴香湯下疳疝東

引石榴苦棟根湯下五歲上者十九此藥尤治疳

利着挾熱者不可服

黃連丸

治疳氣眼滯多困手足發熱脾胃虛弱髮黃作穗

漸漸羸瘦不思乳食

胡黃連 使君子肉 白蕪荑去扇各一分

巴豆十四箇去皮膜出油盡

右為末猪膽汁和丸麻子大每服三五丸米飲下
空心日二服

盧會丸

治五疳面黃肌瘦腹脹髮穗目瀼口臭斷爛鼻瘡
咬甲搗肩愛喫泥土瀉痢無度寒熱往來

乾膽

大皂角

二味等分同燒存性為末每兩用下項藥

青黛

一分

研盧會

一錢

研射香

一錢研

朱砂一錢研水飛

右為末和勻浸蒸餅和丸麻子大每三歲下兒一
十丸上者以意加至二十丸溫水飲送下無時

龍膽丸

治諸疳發熱

龍膽草

去芦

黃連

去須

使君子肉

青皮

去穰各等

分

右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服一二十九
丸熟水下無時

粉糖丸

治疳愛食泥土

右以膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大米飲下
一丸良久取下泥土立差

龍粉丸

治疳渴飲水

龍膽草 去芦 定粉 微炒 烏梅肉 焙 秤 黃連 去須

右為細末煉蜜和丸麻子大米飲下一二十九

香葛散

治如前

藿香 去土 乾葛 甘草 炙各 白梅肉 半兩炒

右同為細末煎浮萍草湯調下半錢量大小與服

無時

熊膽丸

治疳瘦肚腫煩渴喫水

熊膽 雄黃 佛頂青 各半兩入射肉桂末

人參各一錢末

右為末同勻糯米粥和丸菘豆大每服五七丸米

飲下無時此方大妙

推水散

治疳渴衆藥不効

天仙子 不以多少新瓦上焙乾四月乾姜 一兩

烏梅肉 焙 枳實 湯瓶 鹹 半兩 甘草 一分

右為細末每服半錢或一字煎水索頭湯放冷調

下無時良久推水不要飲是効

覆蚕丸

治諸疳瀉痢驚風等疾久不痊差及斷乳後羸瘦

疰羸漸困不能治者回死神妙

覆蚕細研以線串其頭陰乾只取向後有糞處

下辰砂三錢研射香三字華撥三錢雄黃三錢半

胡黃連三錢半

右為末以新蒸粟米飯一塊泥裏煨之取中心軟

者和藥丸菜豆大每服五七丸射香湯送下

雞肉煎丸

治十歲已上疰勞壯熱形瘦骨熱漸成勞瘵者

宣連去頭土柴胡去芦蕪荑去扇川鶴虱半兩

知母兩秦艽去芦黃芩兩使君子肉兩

右為細末以黃嶋雞一隻重一斤許者籠之專以

大麻子飼五日殺之去毛令淨於臀間開一孔去

腸肚淨洗拭乾入藥末在鷄腹內以線縫合用一

小甌先於甌底鋪黑豆厚三寸頓鷄在中四傍又

以黑豆圍塞上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚衙

後放溫冷取鷄出腹中藥別頓將鷄擊剔去筋骨

脊頭翅以淨肉研和藥得所如乾入少酒糊丸如麻

子大及菜豆大兩等每服一二十九以意量大小

加減空心臨卧煎麥門冬熟水下如疰勞骨熱發

蒸年十五已上溫酒下忌猪肉

錫骨丹

治一切諸疰羸瘦下痢証候全備又如邪此乃

疔毒傳深俗呼無辜者此乃疔毒也

乾蝎虎

雄者一箇雌者一箇

蝎牛殼細研一分蘭香根一分葶花一分

雄黃一分射香一分龍腦一分

右為末入研拌勻米醋煮麵糊和九黍米大每服十粒煎芝蔴湯下乳食後量大小輕重加減無時

香甲湯

治如前能祛毒辟邪

漏蘆去芦一两沉香半兩牛蒡子微炒半兩安息香半兩

訶梨勒皮微炒半兩鼈甲去相半兩乳香細研半兩

右為末勻細每服一錢水八分入人參少許同煎

至四分去滓溫服量大小加減無時

大射香丹

治諸疔積癖羸瘦肚大青筋頭重項細腹中有積

毛焦氣急俗呼為丁奚哺啜呼為無辜此皆疔証

也

射香半兩朱砂半兩粉霜半兩五靈脂揀淨

肉荳蔻麩裏煨一两乾蟾兩夜明砂兩白礬枯半兩

地龍去土一分炒乾蟻七箇去翅足

右為細末入研拌勻煉米和九黍米大每服五七

粒溫水下無時

問命散

一切諸疔可分輕重逆順

瓜蒂 半兩 細辛 去苗一分 乾地龍 去土一分 白礬灰 一分

梨蘆 去芦一分

右為細末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有虫出即愈

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦

以鯽魚膽汁滴鼻中連三五日効

治小兒腹疳

以珠燒熟噉之

治小兒疳熱煩渴乾瘦

以蝸牛三四十箇放一淨盤中以物蓋之令行即有涎似銀泥同膩粉和搗便丸如粟米大溫水送

下三九無時

治小兒疳渴飲冷不休水

射香 人中白 各一分

右同為末蒸餅和丸麻子大一二歲服二九煎皂子湯送下空心服

還肌散

治小兒疳瀉及洞瀉穀不化

肉荳蔻 一箇 訶子 二箇 沒石子 一箇 二味各用

煨焦黃香熟木香 半皂子大

右為細末每服半錢米飲調下如人行五里久更進一服神驗仍調服須用陳米飲也

又方一即中錄四歸明原別新米也

治如前

黃連去頭木香半兩蕪荑去扇檳榔一箇

右為末猪膽汁和丸菘豆大每服十九米飲下無時作三等丸量大小與服治疳痢日夜無度

治疳瀉

以赤石脂研如麪粥飲調半錢服立差一方以川芎等分同為末服妙

盧會丸

治小兒諸疳

盧會 檳榔 蕪荑炒取胡黃連 使君千二

川苦棟和核雷元浸刮去黑橘皮半兩洗

巴豆四十九箇去皮膜同橘皮炒至巴豆焦色

右為細末猪膽汁煮糊和丸麻子大米砂射香

細末為衣每服十九十五丸如頭面浮腫木瓜湯

下若瀉而發渴陳米飲下更量大小加減

又方治同前

盧會 黃連去頭川棟子和核蕪荑去扇各三

天竺黃一錢射香少許

右為細末以猪膽汁和飯研爛和劑於甑上蒸兩次丸菘豆大以朱砂為衣每服五七丸至十九熱

水下無時

鼈血煎丸

治小兒諸疳

吳茱萸

胡黃連

剉碎用鼈血浸一宿同吳茱萸炒令乾焦去茱萸不用

白蕪荑仁

柴胡

去芦各等分

右為細末用獾猪膽汁浸蒸餅和丸菴豆大每服

十九丸熟水下無時

捉疳丸

治小兒一切諸疳

蛆退先用米泔浸三日以杖子攪擊漉出又以泔

水浸三日五日攪擊淘漉如前次入清水浸淘二

日至無穗氣淨時於日中曬乾男子患用黃連女

兒患用黃蘗與蛆退等分為末每藥末半兩入射

香半錢同研勻以獾猪膽汁和丸黍米大每服三

四十九丸量大小加減空心陳米飲送下神効屢驗

一方六月取糞坑中蛆水淘淨入竹筒盛封口至

乾時為末每服一二錢入射香米飲調下甚妙

消疳丸

治小兒諸般腹脹四肢腫滿氣上喘促小便不利

木香

檳榔

各二兩

青皮

去穢

姜黃

蘿蔔子

炒

牽牛子

各取七錢半

右為末糊丸黍米大每服二三十丸食後姜湯送

下無時

治小兒一切疳疾

以棘針瓜蒂等分為末每用取黍米許吹鼻中日
二次用

治小兒諸疳

以黃連不拘多少同烏梅煮至黃連透時只用黃
連為末別以烏梅肉和丸如麻子大每服二十九
溫水下無時量大小加減

熊膽射香丸

治小兒一切疳疾心腹虛脹愛食泥土四肢壯熱

熊膽研一錢射香半錢壁宮一枚去頭足尾麩裏

黃連去頭取

右同研極細末以膽酥和丸黍米大每服五丸米
湯送下量大小加減無時

香膽散

治小兒食疳羸瘦不進乳食

乾膽一枚塗酥麩一分去麩麥蘖一分微炒

神麩一分微炒

右同為細末每服半錢粥飲調下無時

又方

治同前

朱砂水飛一錢研射香半錢端午日膽眉脂

右將膽眉脂和二味丸麻子大空心米飲下一丸

如腦疳以乳汁調內鼻中無時
治妳疳水瀉

以川椒一分去目并閉口者為末酥調少許傳腦
上日三次

治疳痢垂死

以益母草煮食之取足即差甚佳取汁飲之亦治
痔妙以地榆煮汁和錫糖食之以樗白皮和倉朮
來葱白甘草香豉同煎飲服

治小兒疳渴飲水無渡

以大鮎魚一頭先燒一地坑令紅接魚坑中便以
蛤粉專令一人摻在魚上須臾取出用蘆刀刮下
粉入射香少許拌勻和丸蘿蔔子大每服五丸
繩根煎湯送下一方云冷水旋丸服

五疳丸

治小兒一切諸疳

川棟子 川芎 等分

右為細末以漿水煮猪膽取汁和丸麻子大每服
一二十九丸溫水送下日三四服

治小兒疳氣不可療者

以綠礬火煨通赤醋淬之如此三次細研為末
棗肉和丸棗豆大每服五七丸溫水下無時日二
三服

桃柳湯

一切諸疳服諸藥後皆可用此法也
右以桃柳枝各一握並剉用水兩大碗煎數沸通
手俗兒甚佳浴畢用一青衣蓋之疳虫自出為驗

小兒衛生總微論方卷第十三

諸蟲論

經言人臟腑中有九虫內三虫偏能發動為病人臟
腑實強則不能為害若臟腑虛弱則隨虫所動而生
焉故經亦別立三虫之名一曰虵虫又曰長虫居胃
脘之間動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛若
虫貫心者即死二曰繞虫居洞腸之間多則發動為
痔瘻蝨蝕瘡疥痂癩三曰寸白虫居腸胃之間動則
損人精氣令腰脚痛弱更有一虫形若細絲或如馬
尾故俗呼謂之馬尾虫此虫不拘九虫之數或云飲
食中誤嚙油髮所變亦居胃中動則令兒腹中攪刺

發痛不可忍受小兒虫動者多病於諸病之外蓋因
臟腑虛弱故也患疳勞吐瀉者尤甚錢乙論小兒虫
動之証面皖白心腹痛唯是口不吐沫及無清水出
也故乙又言心腹痛而吐者虫痛也心腹痛而不吐
水者冷痛也但吐水不止腹痛者胃冷也又虫痛亦
與驚癇証畧畧相似但目不邪手不搐也以此別之
則無悞矣乙治虫痛者用安虫散然世人用治虫之
藥多於臨卧服之並無日分故多不驗唯於每月初
四五日間在五更時服之至日午前虫盡下矣後以
平調藥一兩服和之不可多也凡虫在人腹中每月
上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下是以中下旬服
藥則不入虫口所以不驗也亦如牛馬生子上午生
者行在母前中旬生者並母而行下旬生者行在母
後又如猫之食鼠上午則食前段中旬則食中段下
旬則食下段此物理之自然莫不知也然虫痛極者
雖不貫心亦能斃人昔錢乙治辛氏女五歲病虫痛
他醫以巴榛礪砂之屬藥治之不効至五日外多哭
而倦仰睡卧不安自按心腹時大叫面無正色或青
或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至六日胃高
而卧轉不安召乙至詳而視之用蕪荑散三服見目
不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至
次日見辛曰夜來三更而瀉乙於瀉盆中看如藥汁

以杖攪之見有藥丸乙曰此子肌厚當氣實今証反
虛不可治也何以然師曰脾虛胃冷則虫動今日青
此肝乘於脾又更加瀉知其氣極虛也而藥丸隨糞
下即脾胃已脆蕪形病不相應故知死病後五日昏
篤七日而死錢乙用方集載之學者當此以為法尔今除疳
勞虫動已具於疳疾門之下外諸虫之方叙而具後
使君子

治疔咬心腹疼

右以使君子火煨熟去殼與食以殼煎湯送下

紅桃散

治疔咬心腹痛發歇有時

風化石灰一兩燒赤朱砂一錢細研為末水飛

右拌勻細用飯飲一大盞入艾三五葉煎二三沸

看多少調一字或半錢與服但少用多則難喫

龍膽湯

治疔虫攻心其痛如刺吐出清水

右以龍膽草一两剉碎水二盞煮取一盞去滓隔

宿不食至五更頭頓服量大小與之

三角散

治如前

右於七月七日採蒺藜子不以多少陰乾為散每

服半錢或一錢飲服日三量大小加減無時

木香桃仁丹

治就攻心痛不可忍

木香兩 桃仁湯浸去皮尖并雙仁 檳榔一分

鶴虱煉一兩 黑狗脊一兩 苦棟根白皮半兩

右為細末攪猪膽汁和丸黍米大每服十粒射香

湯下無時

奪命丹

治如前病至危困者

狼牙草一兩 菡蓄一兩 苦參一兩 雷元半兩

蕙苡仁半兩 鶴虱半兩

右為細末糯米和丸黍米大每服十粒生地黃汁

下無時

乳香丸

治虫動心腹疼痛

乳香末 青皮去穰炒黃為末 槐花半合炒末

風化石灰研細半兩

右為末勻細每服半錢槐花湯調下無時

乾漆散

治如前

乾漆炒煙盡 使君子仁二七箇 蕪荑片去角六十錢

棟根白皮取東邊者一錢

右為細末每服一字沙糖熱水調下二三歲半錢

四五歲一錢無時
棟皮汁

治如前

右取棟根皮削去外蒼皮不用只用白者以煮濃汁量大小與服

抵聖散

治如前痛不可忍者

苦棟根白皮二兩白蘘蒘法散半兩

右為末每服一錢水一小盞煎取半盞放冷待發時服量大小加減無時

勝九子

治如前

龍腦研蘆薈研射香各一

牛黃半字研

胡黃連半錢末

右為末同研勻熊膽和丸菴豆大每服三五丸生米泔水化服無時

又方

以檳榔生為末用東引石榴根煮湯調下量大小與服或半錢一錢治寸白虫神効上旬空心食前服之

治小兒虱虫動作

以棟實一枚煮濃汁內孔中亦治燒虫

以槐子杵爛內孔中亦治燒虫
治小兒寸白虫

以桃葉杵爛絞汁服之

雷元散

治小兒三虫

雷元 川芎等錢

右為細末每服一錢飲調之日二服無時

胡粉牛黃丸

治小兒疝動腹內時時疼痛

胡粉三錢 牛黃一錢 射香一錢

右同研為末用價猪膽一枚取汁浸蒸餅和丸

豆大五歲兒糯米下七丸以意加減無時

又方

治如前

以葶藶子一分生為末水三合煎取一合一日一

服進

以薏苡根煮汁作糜食之甚香而効

治燒虫內齧心腹疼痛

以鶴虱為細末用肥猪肉汁調服五歲兒服二合

虫出便止更以意加減

治燒虫及虫攻蝕下部痒痛

以篇蓄一把水二升煮熟五歲兒空腹服三二合

乳食前

治燒虫攻蝕下部

以胡粉雄黃各一分同研為末每以少許傳下部

補胃膏

治如前痛甚不可忍啼哭不止

良姜一兩微泡肉桂去粗皮一兩烏梅肉半兩

肉苳蔻麩裏煨半兩乾漆炒烟盡半兩

右為細末煉蜜和丸雞頭子大每服一二粒米飲

化下無時

香雷散

治如前

雷元鶴虱苦棟根皮白蕪荑兩

右為細末每服一字或半錢用生猪肉煮淡湯調

下無時

化虫丸

治虫咬腹中攪刺痛疼

蕪荑去扇一分檳榔二錢川鶴虱一分

右為細末猪膽汁和丸麻子大每三歲五丸五七

歲十丸陳米飲下無時

川棟丸

治胃寒虫動心腹疼痛及上中二處焦因虛而虫

動

乾漆

三分碎炒烟出盡

雄黃

一分

研

巴豆霜

一錢

一錢

右為細末糊丸黍米大每服五七丸量大小加減

取東引石榴根煎湯下痛甚者煎苦棟根湯或煎

蕪荑湯下

蕪荑散

治上中二焦虛及胃寒虫動心腹刺痛危惡証候

與驚癇相似

白蕪荑

揀淨

乾漆

炒烟盡

等分

右為末每服一字或半錢米飲調發時服兒大者

一錢無時

三靈脂散

治虫動攻心痛欲絕

五靈脂

去沙石末

二錢

白礬

枯半錢

右拌勻每服一錢或半錢水八分煎至減半溫服

當吐虫出

綠礬丸

治腹中有虫愛食生物

右以綠礬不拘多少為細末猪膽汁和丸菘豆大

每服五七丸米飲下無時

蜂窠蛹子

治腹有諸虫口中吐出

右以蜂窠中蛹子與食之

檳榔散

治寸白燒蛭諸虫

檳榔一箇木香一錢

右同為末每用一錢煎棟根白皮湯調下如棟根赤者不堪用即害人須在月初四五日間至五更頭先嚼肉脯一小片只嚥其汁少頃服藥至日午前虫下勿登廁但用盆子或在淨地上庶見取下虫多少也一服永絕根本且食粥一二日不須服補藥忌生冷硬物五七日佳

碧金散

治寸白蛭燒諸虫隨時大便糞下

苦棟根皮一兩微炒劉鶴虱半兩棟淨檳榔兩

猪牙皂角三錢燒灰使君子仁半兩以上先末

青黛半兩研射香一分研

右拌勻細每服一字淡猪肉湯調下無時

化虫丹

治數歲上食肥甘物多而虫動

鶴虱一兩棟淨檳榔一兩苦棟根皮一兩以上

胡粉半兩研白礬半兩研

右為細末拌勻麩糊和丸黍米大每服十粒温漿水入生油一兩點攪勻送下無時

黑金散

治虫煩擾亂服之煩已得睡為驗

乾漆一兩肉桂半兩草薹菹仁一分石榴根分

六椎黃一分研

右都於一瓦器中燒存性研為極細末每服一字或半錢研射香少許煎粟米飲調下

黃金散

專治吐利後虫動

乾漆一兩炒烟盡白蕪荑去角半兩

肉苳菹以麩裹煨去麩半兩雄黃三分研水飛

右研拌勻每服半錢煎葱白湯入生油一二點同

調下須調令勻熟即得如藥冷再上火溫服不拘

時候

胡粉丹

治燒虫發動甚者成痔瘡疥

大棗五十箇蒸熟取肉去皮核水銀半兩二味同研勻細

胡粉一兩研雄黃半兩研水飛

右同入棗膏研勻丸黍米大每服十粒煎苦楝根

湯送下無時

蝟皮散

治燒虫耗損氣血已成痔者

蝟皮一兩燒灰鼈甲一兩酥炙黃去裙襴

蛇蛻皮一兩燒灰露蜂房半兩微炙

右為細末入射香末一錢拌勻每服半錢米飲調下無時

櫻櫚散

治如前

櫻櫚一兩燒灰荆芥穗一兩側柏一兩炙黃

牛膝去芦半兩枳殼去穢麩炒黃半兩

黃耆半兩

右為細末每服半錢米飲調下乳食前

神瞻穀精丹

治諸病有虫下如絲或如馬尾甚者便至危殆

乾瞻三枚五月五日穀精草三兩入一瓶內鹽

黃連半兩皂角三兩瓜蒂半兩

母丁香半兩以上先為末粉霜一分研

蘆薈一分研射香一分研

右同拌勻以猪膽汁和丸黍米大每服十粒溫米

飲下無時

食氣積癖論

小兒積聚癖癥者其證不同積聚乃氣之所為癖癥乃食飲所作經言積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積乃五藏所生其發有常處其痛不離其部氣之所聚名曰聚乃六腑所成其發無根本其痛無常處是以積聚皆氣之所為也癖癥者其始因脾胃虛冷乳食不化而以成傷不為早治停滯留結乃成癖癥也癖者邪僻也所居在脇下癥者正證也所居在腹中皆有其形或長或短或塊或片其狀不一皆堅硬作痛其因乳得者名曰乳癖癥俗云妳癖者是也其因食得者名曰食癖癥

其因水漿得者名曰水癖癥若因按之或因轉動時
自有聲響者此乃水癖癥也是以癖癥皆食飲所作
也故小兒常當節適乳哺調順寒溫若稍失保衛則
病從而生矣如或乳哺不時寒溫失宜則脾胃不保
氣不調順其候口頻撮面眊白無精光口中氣冷不
思乳食便當以藥和之若不即治則成胃冷其候乳
食不化或但吐水急當用藥溫之又不可與治則脾胃
浸以成虛其候面眊白色弱腹痛口吐痰沫白綠急
當用藥溫補若下利者更當與調養其中又不與脾
胃既已虛次飲食先已不化乳哺再稍失宜即便乃
成傷也其候身體壯熱口中氣溫面黃腹脹目無精

光或白精多喜睡脾胃食肚熱大便酸臭或為吐瀉
水穀不消須宜穩藥尅化不可便行駛藥取轉小兒
氣實脾胃壯者患之有漸若氣怯脾胃弱者但稍失
調養便成傷也昔錢乙治黃承務子二歲因傷食而
瀉他醫與止之十餘日便青白乳不消身涼加噎氣
昏睡以謂困篤而居乙乙先與益黃散補肺散三日
而身溫不噎氣後以白餅子微下之復與益脾散而
利止得安或問何以其然乙曰此本脾虛傷食而作
利初不與下之留連十餘日上實下虛脾氣弱則引
肺亦虛脾肺子母故也今先補脾肺病退身溫不噎
氣是也然後下其所傷又問既有所傷何不先下而

後補乙曰糞青白為虛冷若先下之必大虛也故先
實而後下則不虛後更與補之乃安此乃治所傷也
若傷重則不與急治則停滯留結而為癖癥其候與
食傷相似而更加困重及一向不食但微飲少乳或
渴而飲水時作寒熱亦與潮熱相似昔錢乙治曹宣
德子三歲病面黃時發寒熱不食而微飲乳及飲水
不止眾醫以為潮熱用退熱藥不愈又用止渴藥反
吐請乙至乙曰此乃癖也與白餅子下之後補脾乃
以消積圓磨之果愈或問何以故乙曰不食但飲水
者食伏於胃脘內不能消致令發渴服止渴藥吐者
藥衝於脾氣逆不得下故也下之乃愈又錢乙論小
兒癖癥由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止
或喘而嗽與潮熱相似不早治之必成疳勞以其有
癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多
即蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀脉沉細
益不能食遂漸羸瘦而成疳也錢乙所用之方本集
載之及脾胃虛冷米穀不化可利者泥其于前瀉門
之下外合用諸方叙後

半兩丸

治五積六聚

巴豆 去皮

大戟 剉碎各半兩

右二味同入銚內油炒焦黃為細末糊九麻子大

每服三九量虛實大小加減與服臨卧米飲下乳
食前

三稜汁

治諸氣積氣聚氣癖

右以京三稜取汁作羹粥米麵任為與乳母食之
每日取棗大與兒喫大者漸加之又治十歲以下
至百日兒無辜疳癩疝癖神妙大効功不可述

三稜煎丸

治氣積氣聚氣塊疝癖水氣奔豚腎餘五疝五噎
及一切諸般氣滯凝結

京三稜炮蓬莪茂炮各四兩洗淨元花一枝去梗

右將上二味入磁瓶內以米醋五升浸滿封閉瓶
口用炭火攢煮之度量微乾時取出以餘醋炒元

花至醋盡藥乾為度同上二味剉焙乾為末醋煮糊丸菜豆大每服三五丸生姜鹽湯下乳食前更量大小加減

姜橘丸

治乳哺失宜脾胃不和

右以好陳橘皮不拘多少極陳者尤妙洗淨去白焙乾為細末每五兩入生姜末三兩和勻煉蜜丸麻子大每服三四十九丸米飲下無時更量大小加減與服

調中散

治乳哺冷熱失宜脾胃不和

木香一兩剉人參去芦一兩青皮去穢一兩丁香半兩白朮半兩白茯苓半兩大腹皮剉兩甘草半兩炙

右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片煎至五分去滓服無時

益胃丹

治如前

當歸去芦洗焙木香白朮沉香各半兩剉白芍藥剉人參去芦剉蓬莪茂炮剉宿砂仁各分

右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒射香湯送

下無時

枳木汁

治胃冷正氣

右以枳木皮煎至服之

益兒丸

治胃冷氣不和食不消化亦治疳氣

神麴炒黃白蕪蕘去扇炒各一兩宣連去頭二兩

陳皮 木香 各半兩

右為細末猪膽汁和藥末成劑再入膽內繫口定

以漿水煮數取汁和九菘豆大每服一二十九米

飲下腹脹木瓜湯下無時一方有浸石子黃耆各

益脾散

治脾胃虛冷腹痛不利全不入食

陳皮一兩青皮去穰半兩訶子肉半兩

甘草半兩剉炒丁香二錢乾山藥三兩

右為細末每服二錢水一盞入生姜二片棗一箇

同煎至五分去滓溫服無時

消食丸

治傷飽乳食不化壯熱腹脹疼痛

木香半兩枳殼去穰麩炒黃當歸去酒土

代赭石以火煨紅末醋淬不計遍數朱砂研水飛各半兩

巴豆十分取霜

右為細末糊丸黍米大一歲兒一九溫水下乳食前服

大麥麵

治乳食過飽煩悶腹脹但欲睡

右以大麥生麵水調服一錢如無麥藥亦得如無只用白麵炒微香調服一錢小兒食不知饑飽但燒鼠二枚為末服之

香橘丸

治宿食不消痰滯

木香 陳橘皮 各半兩 牽牛子炒黃取末一分

白朮一分 草薹蔻仁一分 藜蘆煨 姜黃一分

右為細末滴水和丸黍米大每服十粒葱白湯下大小便秘澁不通乳食前服之

惺惺丸

治宿食不化心腹脹滿身熱不思乳食

青皮 溫湯浸軟去穢焙乾稱一兩 胡黃連一兩

蓬義茂一兩炮巴豆霜半錢

右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸乳汁下大者白湯下量大小加減乳食前

小沉射煎丸

治宿滯不化滿悶身熱

烏梅一箇連核去仁巴豆二箇去殼并心膜

丁香三箇胡椒四箇
右為末醋糊為丸芥子大每服三四丸飲下臨卧
消乳丹

治傷乳凝滯能磨積消疳大妙

蝦蟇十箇燒灰木香一兩蓬茂一兩半炮

青皮去穰一兩青黛一兩肉苳蔻一兩麩兩裏煨去麩

膩粉二錢續隨子一分炒射香少許

右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁下
無時

蝎稍丸

治乳食所傷涎痰壅滯諸般積聚急驚食癩

黑鈆二錢以水銀二錢結沙子輕粉二錢

粉霜二錢天南星一分木香四錢青黛二錢

白丁香四錢炒全蝎二錢去毒乳香一錢

巴豆霜一錢半滑石二錢射香半錢腦子半錢

右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁或
米飲下治驚風搐搦者更入天麻白附子各二錢
此藥與千金紫丸同然効更妙

大真珠丸

治如前

滑石末三錢天南星末二錢半夏麩末二錢

輕粉三錢全蝎十箇巴豆十四箇去皮膜出油

射香少許
右為細末蒸餅和丸菜豆大一歲兒一九葱湯送下乳食前

小真珠丸

治宿食凝滯不消乳癖積聚大小便秘澁腹脹氣痞取磨虛中之積

木香 白丁香 直者丁香各半錢 滑石末二錢

巴豆 十四箇去皮膜水浸一宿研細 輕粉半錢

許為衣

右細勻以濕紙裹陳米飯燒取中間軟者和丸麻子大一歲兒一九炮皂子湯放溫送下挾風熱秘澁難動者先服涼藥一服乳癖者虛實加減丸數隔日臨卧更服

葱湯丸

治諸般積癖腹脹顛腫

天南星末二錢 白附子末二錢 滑石末二錢

全蝎七箇 輕粉二錢 朱砂一錢半研

巴豆十四箇去皮心膜出油盡取霜

右為末麵糊和丸黍米大每服三五丸葱湯送下

臨卧

水晶丹

治一切積癖及百物所傷

天南星一錢滑石一錢水銀粉半錢蕪荑仁去
水晶半錢巴豆十四箇去皮膜取油盡留霜

右為細末爛飯和丸菴豆大每服二三丸其湯泡
生葱湯送下服時酒令空心不可與乳食放稍飢
臨卧服利過忌生冷粘膩硬食果子等物以藥補
之

北亭丸

治一切積癖黃瘦吐食

北亭一錢末朱砂一錢末膩粉一錢牙硝一錢

巴豆廿一箇取霜

右同勻細末用蒸餅劑裹藥煨熟去焦硬者取中

心軟處近藥調劑者用藥和劑如硬滴入水得所丸

菴豆大每一歲兒一九荆芥湯下乳食前

消堅丸

取積癖下交妳隔實消食化癖潰癥

硃砂一錢末水銀沙子兩皂子大明膠五錢末

巴豆霜一錢輕粉一錢細墨少許

右同為細末麵糊和丸麻子大一歲兒一九倒流

水下食後

神妙丸

取虛中積滯化痰涎乳癖

白丁香半錢朱砂一錢水飛定粉半兩

粉霜一錢半 輕粉一錢 射香少許

右為末 粟米飯和丸 黍米大捻作餅子 火炙紫色 粟米飲下一餅 乳食前

妙香丸

取虛中積及治發寒熱 心腹脹滿疼痛

辰砂一兩 水飛 牛黃 龍腦 射香各一分

金箔十四片 粉霜 臍粉各一分 蠟二兩

巴豆一百粒 去皮膜 出油盡為霜

右於鈔子內先鎔化蠟 入巴豆霜 拌勻及入諸藥

攪勻和劑 量大小 虛實 旋丸 麻子大 每丸米飲下

要藥勢緊者 捻藥匾 若見大或疾重者 加之皆用

針刺藥餅作孔 以行藥力 如取積癖 九菴豆大 治

吐逆 下胸中虛煩積滯 尤妙

靈砂丹

取虛中積滯及治臍疝 虛滑久經 取轉裏急後重

又積惡痢或暴瀉不止 神効無比

通明朱砂 顆塊有塢壁者一錢

通明礪砂 一錢 各研細

右拌研細 用蠟半兩 先於盞內鎔化成汁 以去皮

全者 巴豆二十一粒 入內煎至紫色 漉巴豆出 研

細 與上二味 拌勻 將蠟用三分中 取一分 再鎔成

汁 傾藥於內 急攪令勻 下大凝冷 刮出 成劑 磁合

貯之如用取即絕手三九菜豆大濃煎甘草湯放
冷送下臨卧時服久積病大者藥隨病共下小可
病輕者不動便安治暴瀉惡痢濃煎艾湯先呷三
五口候冷下藥治水瀉者冷水下見大稍增丸數
蒜貼膏

治乳癖

石燕子煨 半夏各等分

右為末用蒜一頭杵爛攤在舊絲絹帛子上比兒
患處大小煎作屬子摻藥上貼患處候病兒口鼻
中蒜氣時揭去綿子作効更不得安藥

神應散

治如前

硫黃 栗子大塊 鵬砂 皂子大塊 訶子 一箇去核

蜜陀僧 皂子大塊

右為細末每服半錢乳汁調下服了時就有癖處
卧少時當取下黑物効

丁香餅子

治如前

大丁香 二錢 蜜陀僧 二錢 木香 半錢 硫黃 半錢

白丁香 一錢揀直兩頭尖者 礶砂 半錢 甘草 一錢半炙

射香少許

右為細末湯浸蒸餅丸菜豆大捻作餅子每服二

餅乳香生姜湯下乳食前

軟銀丸

治如前

水銀一錢用鉛一錢續隨子四十白丁香末錢一

膩粉一錢鷹糞白味一錢巴豆十四箇去皮

右為細末棗肉和丸菜豆大一歲兒一九溫水下

乳食前

丁香散

治如前

黑丁香七箇蜜陀僧一箇硫黃一箇白丁香各一分

肉荳蔻一箇麵裏煨去麩

右為細末每服半錢溫水飲調下乳食前

白丁香散

治如前

白丁香十四箇直者石燕子一箇火煨瘦者乃是雄

硫黃一皂子大膩粉十箇蜜陀僧半兩

黑丁香二十一箇

右為細末每料分作十服用麵絲湯調下或者麵

湯亦得服了取下如蝦蟇胎之類惡物是効

三稜散

治妳癰結實服藥不差

京三稜一兩炮剉碎鱉甲一兩酥炙去裙襴

赤茯苓去黑皮一两 白朮半两 木香半两
枳殼麩炒去穰一两

右為細散每服一錢水一盞入生姜五片煎至五分去滓溫服時時與也

聖餅子

治乳癖疔瘦

粉霜一錢 硃砂一錢 膩粉五箇 石燕子一箇 火
玄胡索三箇去皮 已豆霜一錢

右為細末入生麵一大錢拌勻滴水和劑分十二處捻作餅子用刀上煨熟每服一餅煎皂子湯下

鼠肉汁粥

右以鼠肉煮汁作粥與食

聖効丹

治癥結癖積久不瘥

當歸去芦土一两 木香一两 桂心一两 朱砂水飛一两
甘遂煨黃一两 慢火 京三稜半兩 炮鱉甲半兩 薑半兩 蘇半兩
濕麩仁一分 湯浸 射香一分 巴豆廿一箇 去皮
好酒煮一宿研

右為末拌勻細研用黃蠟六兩慢火鎔化入藥攪勻成膏丸黍米大一歲兒一粒二三歲者二粒四五者三粒六七者五粒溫米飲下乳食前

大腹湯

治癥癖腹脹小便不利

大腹皮 一两剉炒 檳榔 半两 枳殼 炒去穢半

人參 去芦半两 知母 半两 陳皮 半两 湯去白

甘遂 一分 慢火煨

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓放

温服無時

治幼小胎中宿熱乳母飲食簾惡及多辛苦乳汁不

起兒乳哺宿滯不為肌膚心腹痞滿痿黃瘦瘠四支

萎躄服之充悅

芍藥 二兩 大黃 人參 去芦各 柴胡 去芦二兩

鼈甲 酥炙去裙襴 茯苓 各一两 甘草 半两

乾姜 半两 有熱者去 乾姜用枳實炒

右為末煉蜜和丸大豆大一歲已下兒服一九上

者二丸乳服

牛黃鼈甲丸

治幼小癖實壯熱食不消中惡忤氣

牛黃 半两 鼈甲 酥炙去 麥麩 炒柴胡 去芦

枳實 麩炒 大黃 煨 芍藥 各一两 厚朴 去皮姜製

茯苓 桂心 不見火芍藥 乾姜 各半两炮

右為末煉蜜為丸如小豆大以意量大小與服日

二服無時

丁香散

治小兒疔癖一服取効不動臟腑不損胃氣
二船上硫黃一棗大塊丁香二箇蜜陀僧一棗大
右研細量大小臨卧以荆芥湯調下來日下黑物
乃病故也永不復發

治小兒乳癖脇下結塊不消

膩粉一錢雄雀糞一分微炒兩頭尖者是

右同研勻細去皮棗肉和丸粟米大新汲水下
丸取下惡物是効更量大小虛實用之

治小兒閃胸成癖腹大痞滿

以鶴雀脚骨及嘴煮汁服之亦可燒灰存性研為
末飲服

治小兒積癖髮黃羸瘦及生瘰癧

以生林檎杵爛醋和傳上若癖移則就傳之以苦
瓠未破者煮令熟解開熨之亦入熱湯在內熨之

治小兒乳癖

橘皮揀淨青皮去穰牽牛各一分三味並為末

右用蒜一顆每瓣入巴豆一粒煨熟去巴豆研如
泥和藥末豌豆大朱砂為衣每服一丸細嚼酒送
下一方用蒜去青皮同巴豆研爛和丸臨卧冷茶
清下一丸更量大小加減乳食前

小兒衛生總微論方卷第十四

心腹痛論

小兒心腹痛者由臟腑虛而寒冷之氣所干邪氣與臟氣相搏上下衝擊上則為心痛下則為腹痛上下俱作心腹皆痛更有証發則腹中撮痛乾啼無淚腰曲背弓上唇乾額上有汗此名盤腸內吊之痛亦由冷氣入臟所為也今叙諸方于後

木香丸

治心腹痛及脾痛

木香一分肉桂一分茯苓

去黑皮 檳榔半兩

當歸去芦一分醋浸一宿炙令黃焦

右為細末酒糊丸黍米大每服五七九柳枝湯下
不拘時候

蓬莪散

治氣刺心腹痛

右以蓬莪朮炮熟透剉杵羅為細末每服一錢熟
酒調下無時

寬中湯

治心腹疼痛不可忍悶亂啼哭不止

良姜 木香各半兩 丁香 桔梗去芦

青皮 去穢炒黃甘草炙各一分

右為細末每服半錢溫酒調下無時

當歸木香丸

治如前

當歸去芦蓬莪朮一兩木香半兩人參

桂心半兩見火半兩牛一錢微炒

右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸生薑湯下

無時

當歸丸

治腸胃冷襲而痛啼哭不休

當歸去芦芍藥等分

右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸生薑湯下不拘時候

乳香湯

治如前

木香 五靈脂去沙石 乳香各一錢別研

天南星取中心末一錢

右為細末同研勻每服半錢水半鍾生姜一片煎

至三分去滓溫服無時

溫胃丸

治腹痛哭不止

人參去芦一兩 白朮一兩 木香一兩 良姜半兩

五味子去枝梗半兩 當歸半兩

右為細末麩糊和丸黍米大每服十九米飲湯下

無時

橘香湯

治如前

青皮去穢一兩 吳茱萸揀淨一兩 當歸去苗一兩

乾姜半兩 丁香半兩

右為末每服一錢水八分生姜二片煎至五分共

滓稍熱服無時

烏藥散

治乳母冷熱不調敗壞乳汁因心飼兒致兒心腹

疼痛或時下利但令乳母服藥調和乳汁哺兒

香附子炒去毛 良姜 赤芍藥 烏藥各等分

右為細末每用一大錢酒水各半盞煎至六分去

澤溫服無時見能服藥者兼與之

鯉魚腸

治腸胃中有瘡而作疼痛

右以鯉魚腸煮食之

釣藤膏

治盤腸內吊腹痛

好乳香研沒藥研木香 姜黃各四錢

木鱉子仁 二十箇

右為細末煉蜜為劑收之一歲兒半皂角子大煎

釣藤湯化下無時量大小加減次用魏香散

魏香散

右以溫水化阿魏一錢去砂石浸蓬莪朮半兩一

晝夜取出焙乾為細末每服半錢煎米飲紫蘇湯

調下空心服

阿魏丸

治盤腸吊痛日夜叫啼不止

右以阿魏為末用大蒜半瓣火炮熟研爛和末丸

麻子大每服五七丸煎艾湯送下無時

乳香蠟稍丸

治盤腸內吊痛不可忍

乳香一錢半 蠟稍十四箇 沒藥半錢 沉香半錢

右為細末煉蜜和丸黍米大嬰孩三丸一歲兒五

九三歲兒七九乳香湯下不拘時候

桃符丸

治如前

銀硃一錢研乳香一錢研大蒜一錢研煨熟研爛

右上二味和勻入蒜膏再研硬軟得阿九菜豆大
每嬰孩三九半歲五九一歲七九二三歲七九薄

荷湯下無時

腹脹論

小兒腹脹有虛有實或因吐瀉或因乳食動於脾胃
致脾胃虛而氣攻所作也實者悶乳喘滿治可下之
錢乙用紫霜九白餅子虛者不喘治不可下又不可

以丁香木香橘皮其冠大溫藥治之以脾胃虛氣未
出故雖腹脹而不喘只好用藥使上下分消其氣則
愈錢乙用塌氣丸若候下之則脾虛氣上附肺而行
脾肺子母皆虛也肺主目胞腮之類脾主四肢色黃
虛甚則目胞頰頰四肢黃色而腫錢乙用塌氣丸若
虛氣已出附肺而行即皮胃內弱每生虛氣入於四
肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受寒溫服寒則
生冷服溫則生熱當識此勿候也胃久虛熱多生瘧
病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四肢
面目腫若水狀腎氣浸浮於肺即大喘也錢乙亦用
塌氣丸未愈漸加丸數病愈後面未紅者虛衰未復

故也若治虛腹脹塌氣丸未愈腹中有食積法糞小
便黃時微喘脉伏而實飲水能食者可下蓋脾初
虛而後有積滯也所治宜先補脾後與下之下後又
復補脾即愈也若不先補而便下之則大虛矣又不
可補肺恐生虛喘也錢乙所用方本集載之外叙諸
方于後

家寶塌氣丸

治小兒啼哭未定或氣息未調遽以乳飲或寒冷
相干腹脹氣急乳食不化

巴豆十片胡椒十粒丁香十箇青皮十箇湯浸
去穢

右將青皮每箇入巴豆一片胡椒一粒丁香一箇
裹了以麻線纏定都裹十箇畢頓鍋內入醋醋二
碗煮至醋乾取出細切同諸藥焙乾為末米糊和
丸粟米大每三歲下兒三丸上者五丸五歲兒七
丸七歲兒十九丸米飲湯下無時

福銀丸

治痰涎氣壅鬲實上熱乳食停滯腹脹喘急

巴豆去殼半兩好墨八錢射香半錢研

水銀半兩結沙半兩鉛二錢

右將巴豆霜與墨并研勻入沙子射香又拌研至
細勻以陳米粥和丸菉豆大捻福一歲兒一九二

三歲三九煎薄荷湯放冷送下不得化破食後服
厚朴丸

治風令寒邪客於臟腑腹脹滿悶氣不宣通

厚朴去麁皮一兩丁香一兩木香一兩白朮一兩

青皮去穢半兩牽牛子一錢炒

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九煎陳皮湯

下無時

分氣丸

治腹脹腹痛

巴豆十箇去殼皮木香一錢附子一箇重半兩

右為細末麵糊和丸麻子大每服三二九熱水送

下

又方治腹脹又名塌氣丸

鰵半兩胡椒一兩木香半兩巴豆一錢

右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸蔥白湯

下無時

胡粉鹽

治腹脹

右以胡粉鹽炒色變以摩腹上或以車穀中脂和

半輪下土作丸吞之

韭根汁

治如前

右以菹根汁和猪脂煎服或燒父母指甲灰乳頭
上飲

半夏丸

治腹脹及暴腹脹欲死

右以半夏隨多少火炮為細末酒和丸粟米大每
服三五丸兒小者乳汁下大者生姜湯或米湯下
未差加之日二服只用末貼臍亦佳

又方

治心腹脇肋脹滿煩悶欲死

右以雞子殼燒末酒服一錢或半錢

塌氣丸

治脾胃氣虛腹脹滿悶

全蠍一錢

黑牽牛

四錢一半熟
一半生用

蘿蔔子

四錢一
半炒熟

一半陳皮

去白

青皮

二錢

去襍

京三稜

二錢

炮剉

蓬莪朮

二錢

炮剉

一方生用

右為細末麵糊和丸蘿蔔子大每服一二十九生

姜湯下無時

塌氣丸

治脾胃氣滿如腫

胡椒半兩

甘遂一分

黑牽牛

半

兩炒

一半生一

木香一錢

右為細末糊丸菜豆大每服五七丸姜湯送下無

時

塌氣丸

此方便是錢乙集中方也

治脾虛腹脹或面目四肢發腫

胡椒一兩蠟尾半兩去毒

右為細末麪糊和丸粟米大每服五七丸至一二

十丸陳米飲下無時量大小加減一方有木香一

錢一方全蠍一枚胡椒十粒同為末一剉耳米飲

調下

五百丸

治氣虛腹脹

郁李仁別研胡椒丁香黑牽牛

蘿蔔子各一百粒

右為細末葱汁和丸菜豆大每服三五丸兒大加

之或葱湯下無時

白朮膏

治脾胃不和腹脹氣痞小便不利

白朮半兩白茯苓去黑皮人參去芦一分

滑石一分澤瀉半兩

右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時

薑薤散

治腹脹煩渴小便少而吐瀉

硫黃一分白滑石三分丁香半分

肉苳菴 麵裹煨半分
右為細末每服一字或半錢米飲調下無時
托養丸

治陰陽氣痞不通腹脹膨悶嘔吐煩渴手足時厥

礞黃 水銀 各半兩同附子炮去 木香

當歸 各半兩 洗焙 大黃 一兩 濕紙裹慢火煨熟

右為末拌勻煉蜜和丸櫻桃大每服一丸生姜湯

化下無時

木香丸

治小兒氣脹腹滿不食 能去惡氣

木香 訶梨勒煨 各等分

右為末以沙糖水煮糊和丸菴豆大每服一二丸

丸米飲下無時

葛根汁

治小兒熱氣痞滿腹脹

以生葛根杵爛絞汁飲下

桂心丸

治小兒食雜果腹脹氣急

以桂心為末飯和丸菴豆大熱水下五丸未差再

服不拘時候

治小兒腹中脹滿

以父母指甲燒灰乳上服

治小兒腹中脹滿或未能服藥者

以晚桑葉不以多少濃煎湯熏下部通手時淋洗

肚腹

治小兒腹脹滿急不能服藥

以生姜煨熟綿裹內下部冷即易

賺氣丸

治小兒腹脹

丁香一錢 蘿蔔子半兩用巴豆一分煎碎同炒

右為末水浸蒸餅心和丸菜豆大每服五丸猪皮

湯下無時

治小兒上熱痞悶氣在生脹滿

以葛根擣汁量大小輕重與服

腫病論

小兒腫病有二一者氣腫因脾胃虛而氣攻腹腹脹

誤行轉藥下之致虛氣上附於肺行入四肢面目而

作腫也疝氣亦然二者水腫因上焦煩渴飲水無度

脾胃虛而不能約制其水腎反乘脾土隨水行上附

於肺主皮膚脾主四肢故水流走於四肢皮膚而作

腫也甚則腎水浸浮於肺則生大喘為難治也

欵肺散

治小兒風痰欵嗽喘氣逆嘔吐面目浮腫

白姜蚕五兩湯洗去灰絲 玄胡索去皮三兩生

右為細末每服一字或半錢煎淡薑汁放冷調下
如嬰孩乳汁調半字不拘時候

熊膽丸

治小兒疳氣體瘦肚腫喫水

熊膽 雄黃 研水飛 佛頭青 各半兩入射香少許同研細

桂心 人參 去芦各一錢為末

右拌研勻糯米粥和丸菜豆大每服五七丸米飲

下食後

檳榔丸

治小兒疳氣腹脹四肢腫滿氣急喘悶小便不利

檳榔 木香 各二錢 青皮 姜黃 各一兩

羅蔔子 炒壺牛子 各取末七錢半

右為末糊丸黍米大生姜湯下二三十丸食後

緋綬丸

治小兒疳氣黃瘦肚大手足浮腫飲水不休

川棟子 去核 芩 各二錢 橘皮 四兩 龍膽 去芦二兩

巴豆 十四箇去皮膜將陳皮龍膽同巴豆炒焦黑時去巴豆不用

右四味為末糊丸麻子大朱砂末為衣每服十五

丸或二十九丸米飲下腹脹陳皮湯下食後

治小兒手足身體浮腫

以小便溫煖漬之大良

又方

治如前

以巴豆五十箇去皮心水三升煮取一升綿蘸拭病上隨手即消

治小兒渾身頭面及陰囊虛腫

以使君子一兩去殼用蜜半兩炙盡為細末每服一錢米飲調下食後只三服効

內消丸

治小兒頭面手脚虛腫

青皮

五箇湯泡去穢

巴豆

七箇去壳

木香

一錢炮

防已

一錢半

丁香 十四箇

右先以青皮巴豆銚內同炒至巴豆蒼黑去巴豆

不用將青皮諸藥五箇細末蒸餅和丸麻子大每服

三五丸量大小加減兒孩兒煎陳米湯下女孩兒

煎艾葉湯下七八歲者十九不拘時候

紅粉散

治渾身虛腫氣喘不食

硃砂

一錢

煨柳

一錢

輕粉

半錢

右為末每服一字或半錢薄荷煎湯調下一服利

止後服用家寶觀音散或人參散調補忌生冷堅

硬之物

通草散

治一身黃腫透明

通草 蜜塗炙乾為末 木猪苓去黑皮為末各等分

右為細末并入研細去土地龍射香少許每服半錢或一錢米飲調下神效亦治腎腫

聖餅子

治如前

大戟子半兩 甘遂末一分 牽牛末一兩

右拌勻每用半錢以白麵半錢水和作餅子如錢大煮令熟放冷細嚼姜湯下小者一餅大者二餅

食前

金華散

治水氣腫滿通身明亮

大黃末四錢 牽牛末四錢 朴硝研末八錢

巴豆肉五箇研

右同拌勻每服一字生姜蜜水調下此方猛烈斟量所宜

葶藶丸

治水氣腹腫小便澁滯

右以葶藶子半兩微炒杵如泥入棗肉再杵和丸棗豆大每服五丸棗湯下空心晚後

郁李仁丹

治一切諸腫

郁李仁皮半兩湯浸去微炒 檳榔半兩 牽牛子一錢炒

右為細末滴水和丸每服十粒煎葱白湯下空心服

海蛤散

治身體腫滿大小便不利

海蛤 桑白皮 各一两 漢防己 半两 白朮 半两

赤茯苓 去黑皮 半两 甜葶藶 紙糊 炒熱 川朴硝

木猪苓 去黑皮 各一分

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓温服

乳後食

杏仁膏

治小兒卒然而面目浮腫杵杏仁膏傅之

治小兒渾身虛腫及頭面陰囊並腫

木香 一錢 檳榔 一枚 剉以茱萸炒去 青皮 一錢 以巴豆七箇去

皮炒去巴豆

右同為末每服半錢或一錢陳米飲調下食前

治小兒因瀉痢後身軀虛腫

硫黃 一两 煅硝 三錢

右同研細蒸餅和丸蘿蔔子大蚌粉為衣每服十丸米飲下量兒加減食前

虛羸論

小兒虛羸者由諸病之後或誤行轉藥或吐而利致脾胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌膚消瘦乃成

虛羸也有冷者時時下痢唇口青白有熱者身躰温
壯肌肉微黃此冷熱虛羸也錢乙治冷者木香丸夏
月不可服如有証則少服之治熱者胡黃連丸冬月
不可服如有証則少服昔錢乙治齊卽其人好收藥
散施有子忽患臟熱齊自取青金膏三服併一服餌
之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多生驚
又與一服再瀉兩行加口乾而身熱齊言尚有其熱
又欲與青金膏其妻曰用藥瀉十來行未安莫生病
痞召乙看之乙曰已成虛羸也先多煎白朮散時
與服後用香瓜丸十日愈乙又治朱監簿子五歲發
熱腮赤唇紅煩躁引飲前鑿曰此心熱也遂用牛黃
圓及以一物瀉心湯下之來日加無力而不能食又
下之乃便利黃沫召乙看之乙曰此心經虛而有留
熱在內必被涼藥下之致此虛羸也乙先用白朮散
坐胃中津液以生犀散治之朱曰大便黃沫何如乙
曰胃氣正卽瀉自止此虛熱也朱曰鑿用瀉心湯何
如乙曰瀉心湯黃連一物耳性寒多服則利能寒脾
胃也坐久前鑿至曰實熱乙曰虛熱若實熱何以瀉
心湯下之不愈又加面黃頰赤五心煩熱不食而引
飲前鑿曰既虛熱何大便黃沫乙笑曰便黃沫者服
瀉心湯多故也乙復與胡黃連丸愈乙又治一子夜
發熱曉卽如故前鑿作熱治以涼藥解之不愈其候

多涎而喜睡豎又以鉄粉丸下之其病益甚至五日
大引飲唇白不食召乙看之乙曰此肺怯有熱不可
下之若下之則損脾胃致虛羸也乃用白朮散更以
朮一两煎藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作
瀉否乙曰無生水不作瀉縱瀉亦不作恠也但不可
下耳朱曰先治何病乙曰止瀉治涎退熱清神皆此
藥也至晚服盡乙看曰更可服之又作三升服盡稍
愈第三日又作三升與服其子不渴無涎遂投阿膠
散二服而安已上三証皆因誤下轉下之藥亡耗津
液致胃虛發渴不食而成虛羸錢乙並先煎白朮散
與服以生胃中津液得胃氣正然後依本病為治也
如齊郎中子臟熱與香瓜丸朱監簿子心虛熱與生

犀散胡黃連丸次子肺怯與阿膠散並皆安愈故問
忠孝云轉下過多洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗
也不問陰陽煎錢乙白朮散使滿意取足飲之彌多
彌好今特為詳而論之使學者法矣錢乙所用方本
集載之外治虛羸諸方具于後

丁香黃耆散

治脾胃虛弱不能食漸致肌瘦虛羸

丁香 綿黃耆 剉人參 去芦 白朮 當歸 去芦

鱉甲 塗酥炙焦去裙襴各一两 胡黃連

甘草 炙各半兩

右為細末每服一錢水一小盞生姜二片棗一箇煎至五分去粗溫服食前

集香煎香

治如前

丁香 沉香

木香

藿香 去土

厚朴

去麩皮姜製各一兩

白朮

白茯苓

白芷

各半兩

右為細末入研細射香一錢拌勻以水一升蜜半斤大棗三十枚生姜二十片於銀器中慢火熬成膏去姜棗不用攪勻頓當風處陰乾每用皂角子大米飲化下乳食前

國老丸

治瘦瘠虛羸憊少氣

右以甘草炙焦黃杵末煉蜜和丸菜豆大每服五丸溫水下日三服一歲兒五丸已上者七八丸以意加減無時

欬嗽論痰飲上氣附

夫欬嗽者內經以為肺感微寒而所作也若七八月之間肺氣旺盛之時病嗽者其病必實非久病也其証面赤痰盛而身熱治當下之錢乙用葶藶丸若病久者不可下若十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背第三推肺俞穴入其痊頓悶惡風憎寒晝輕夜甚治當汗之錢乙用麻黃湯若有熱症則面赤

飲水涎壅咽喉不利錢乙兼用甘桔湯若嗽於五七
間其病身熱痰盛唾粘或痰盛不甚喘面赤或時飲
水錢乙並以禰銀丸下之若肺盛嗽而後喘身熱悶
亂面腫或飲水不飲水者錢乙用瀉白散昔錢乙治
張氏孫兒九歲病肺熱欬嗽前醫以硃犀龍射牛黃
藥治之一月不愈其證欬嗽喘急悶亂飲水不止全
不能食召乙治之乙用使君子丸益黃散張曰本有
熱何又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無効乙曰
涼藥又則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候
飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子
欲飲藥以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不虛乙曰先
實其脾然後瀉肺故不虛也

又傷風寒欬嗽無熱症而但嗽者錢乙用麻黃湯及
化痰藥治之若肺虛而嗽有哽氣時時長出喉中有
聲者此久病當補也錢乙用阿膠散昔錢乙治杜氏
子五歲自十一月病嗽至三月未止始得而吐痰乃
風寒入肺也風在肺中故嗽而吐痰宜以麻黃皆發
散後用涼藥壓之即愈他醫却以諸藥下之其肺即
虛而嗽甚至春三月間尚未愈乃召錢氏看之其候
面青而光嗽而喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十
已八九矣所以然者面青而光乃肝氣旺也春三月
者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病自十一月至三

月久即肺虛痿又曾下之脾肺子母俱虛復為之所
勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也乙急與瀉
青丸瀉肝後與阿膠散實肺次日面青而不光乙又
與補肺其嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白
如練乙曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛
絕肺病不得時而肝勝之今三瀉其肝而肝病症不
退三補其肺而肺病尤虛此不久生故言死也此症
病於秋者十救三四病於春夏者十難救一果大喘
而死

又肺氣不足謂寒邪所干欬嗽喘滿短氣者治補肺
昔錢乙治李轉運孫八歲病嗽而喘滿短氣他醫以

為肺經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘召乙

治之乙曰此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺

脾勿服涼藥李曰已服竹葉湯牛黃膏乙曰何治也

前鑿至曰退熱退涎乙曰何熱所作鑿曰肺經熱而

生嗽嗽久不除生涎乙曰本虛而風寒所作何熱也

若作肺熱何不治肺而反調心也竹葉湯牛黃膏皆

調心之藥鑿有慚色乙依所論而治愈

又欬嗽咯膿血者肺熱也錢乙用甘桔湯治之而吐

痰涎喘者先實其脾錢氏用益黃散和脾下之錢乙

用福銀丸涎除即補肺乙用阿膠散昔乙治段齊郎

子四歲欬嗽身熱吐痰數日咯血前鑿以桔梗湯防

已丸治之不愈涎上攻吐喘不止請乙治之乙下編
銀丸一大服復以補脾藥治之或問此子咯血肺虛
何以下之乙曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎
上壅而吐當下其痰若使不吐涎為甚便蓋吐涎能
虛又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法只宜先下
其痰為順此治先下後補與前論先補後下其意相
反者經以謂病有緩急治有先後也治病症如錢乙
所以得聖人之旨趣學者宜為法耳嗽而吐青白綠
水者此胃冷有停飲也乙用百祥丸下之嗽而吐痰
涎乳食者此有傷宿滯不化也乙用白餅子下之
若久嗽肺虛亡津液者乙用阿膠散補之治嗽大法
盛則下之久則補之風則散之更量大小虛實意以
施治是以慎護小兒須索著夾背心雖夏月熱時於
單背心上當背更添襯一重蓋肺俞在背上恐風寒
傷而為嗽嗽久不止亦令生驚若百晬內兒病嗽者
卜中一二得全亦非小疾也

又有停飲作痰者由兒乳飲失宜致脾胃不和停滯
其飲不散留結成痰隨氣上干於肺而嗽者此為痰
嗽若不嗽者則肺壅不利咽塞唾涎脇腹壅滯
又脾胃冷熱不調涎不歸胃致涎流口角而無休止
冷者鼻上色青及大便青白熱者鼻上赤色及大便
赤黃已上除錢氏所用方本集載之外今叙諸方于

後

金華散

治嬰小欬嗽

鬱金半兩 防風去芦及叉枝一分半 夏一分

巴豆二十一粒 皂角一錢

右以水一升於銀器內用煮諸藥至水乾去巴豆皂角不用外三味別用温湯洗淨焙乾為細末每嬰孩一字二三歲半錢四五歲上者一錢薄荷蜜水調下不拘時候

藿香散

治不因風寒所得肺胃氣不和而欬嗽

藿香去土二十一箇葉 枳殼一斤去穢温紙裹煨令熟

蚪粉和殼大一塊

右為細末嬰小服一字二三歲半錢蜜水調下不過二三服安兒大以意加之無時

紫金丸

治諸咳嗽墜化痰涎

右以葉子雌黃不均多少研細入鍋子內微火中燒令成汁候冷取出再研細軟飲和丸蘿蔔子大熟水下丸二箇臨睡

杏仁煎

治小兒咳嗽上氣

右以去皮尖炒黃杏仁一升熟搗用蜜二合先入
一合搗令強次入一合搗如膏又入一合搗熟每
食後用少許頓兒口中含化因之日三夜無時
生薑煎

治幼小欬嗽

生薑一兩 乾姜六錢炮 桂心一分 甘草四錢炙

杏仁去皮稍炒黃 欬冬花去枝梗 紫苑各四錢

右為末以蜜一兩入藥在內微火上煎之如飴量
大小多少與含化嚙百日兒如棗核大日三甚効

欬冬花丸

治小兒咳夜甚初不得息不能睡者

欬冬花 紫苑各一兩 桂心半兩 伏龍肝三分

右同為細末煉蜜和如泥每取棗核大傅乳上令
兒吮之漸令兒飲一日三次

麥門冬湯

治初生兒十日上至五十日卒得驚欬吐乳嘔噎

暴嗽晝夜不息

麥門冬去心一兩 紫苑去葉三分 甘草一錢半

桂枝半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分以綿蘸滴兒
口中晝夜四五過仍節乳哺

五味子湯

治小兒風冷入肺咳嗽氣逆面青喘迫晝夜不食
飲食不下

五味子 去核 當歸 去芦 各一分 麻黃 去節

乾姜 炮 桂心 人參 大 芦 紫苑 甘草 各一分

細辛 去苗 十分 大棗 三枚

右為麤末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服

量兒大小

人參半夏湯

治小兒痰逆咳嗽不止

人參 法 半夏 麴 白芷 各半兩 藿香葉 去土一分

丁香 杏仁霜 各半分

右為細末每服二錢米一鍾生姜五片陳米五

十粒煎至七分去滓時時呷服日三四次

燻生冷

款肺散

治小兒風壅痰盛咳嗽氣急壯熱頰赤

面目浮腫飲食減少

白僵蚕 五兩淨洗去絲頭足焙乾 玄胡索 三兩

右為末每服一字或半錢淡薑汁溫調服之無時

嬰孩只乳汁調半字

治小兒咳嗽聲不出

杏仁 一兩湯浸去皮尖及双仁者以水一鍾一飯取汁

紫苑 去芦半兩洗去土為末

右將紫苑末入杏仁汁中更入蜜一合同煎成膏
每服半茶匙清粥飲調下無時

皂莢豉湯

治小兒咳嗽

右以皂莢燒灰研細末每服半錢或一錢豉湯調

下無時

露蜂房散

治如前

右以露蜂二兩淨洗去蜂糞塵土以快火燒為灰

取末飲下無時

葶藶散

治如前

甜葶藶半兩炒 麻黃去根節一兩 甘草一分炙

貝母去心炒一分 杏仁去皮尖一分炒黃研

右為細末每服半錢水半盞煎至三分去粗溫服

無時

訶子膏

治如前

右以訶子一兩每箇分作兩片甘草一分水一大

盞燂至水盡為度焙乾為末煉蜜和膏雞頭子大

每用一大豆許薄荷熱水化下無時

生姜浴湯

大豆指前湯

治如前

右以生姜四兩煎湯沐浴

一捻金散

治風熱咳嗽頰赤痰盛喘促氣急吐嘔浮腫乳食

減少

白疆蚕

直者去絲嘴一兩

甘草半兩炙

玄胡索

去皮一分

右為細末每服一捻薑汁調下嬰孩只乳汁調下

半字食後

傷風散

治傷寒風熱痰壅咳嗽

桔梗

去芦

細辛

去葉

人參去芦甘草剉炒

白茯苓

去皮

白朮

瓜蒌根各半兩

右為細末每服二錢水一盞薄荷五葉煎至半盞

溫服如要和氣更入生姜三片同煎一方更有防

風一分

保肺丸

治肺胃受風熱痰盛咳嗽喘吐連聲不止及治久

嗽不愈

白疆蚕

去絲嘴炒二兩

山藥半兩

白茯苓

去皮一兩

紫蘇葉一兩

藿香

去土一兩

百部半兩

黃芩一兩

防風去芦一兩杏仁去皮尖麩炒一兩百合半兩

五味子去枝梗一兩

右為細末煉蜜和丸雞頭大每服半丸一九煎桔梗湯化下食後臨卧服

貝母湯

治肺感風邪咳嗽喘滿

貝母去心一兩炙黃半夏一兩白礬湯洗七次焙乾

乾姜半兩炮麻黃去根節半兩

欵冬花去枝梗半兩甘草半兩炙

右為細末每服一錢水一小盞生姜三片杏仁二箇去皮尖同煎五分去粗溫服不拘時

菖蒲煎

治肺中風邪有息喘鳴或發上嗽

石菖蒲一兩一寸九節者良欵花去枝梗一兩

紫苑去土淨洗焙乾一兩人參去芦一兩挂心一兩

右為細末煉蜜和劑入石中杵一二百下丸皂角子大每服一粒煎糯米化下食後涼卧服

絳朱丹

治驚風涎痰咳嗽喘滿

天南星二兩炮半夏二兩湯洗七次去滑

枯白礬一兩半滑石二兩火煨通赤

鉛白霜一分

右為細末麵糊和丸麻子大硃砂為衣每服十粒
姜湯送下食後臨卧服

人參犀角散

治時氣寒雍咳嗽痰逆喘滿驚悸風熱

前胡去芦八錢 桔梗五錢 人參去芦三錢

甘草三錢 炙黃杏仁浸去皮尖曬乾為末五錢

右先將上四味為末入杏仁末拌勻羅篩過每
服二錢水一盞煎至七分去粗溫服食後亦能調
和五臟六腑進美乳食又治一切風熱服尋常涼
藥即瀉減食者尤宜與服

油滾丸

治痰盛咳嗽亦治乳嗽

五靈脂末一錢 雷元末一錢 巴豆二十箇去皮膜取霜

右為細末滴水丸芥子大每服三五丸油滾并水
送下臨卧而服

龍爪散

治涎喘咳嗽

右以猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每箇猪甲內入
半夏白礬末各一字入一罐子內封閉不透烟火
煨通赤放冷為細末入研細射香一錢拌勻每服
半錢糯米飲調下空腹

辰砂半夏丸

治寒痰咳嗽

天南星 湯洗半夏湯洗七次

瓜蒌根 蜜炙

右為末生薑自然汁和丸麻子大硃砂為衣每服

十九生薑湯下不拘時候

玉珠丸

治諸涎救

半夏一兩湯洗七次 硝石一分

右為細末滴水丸麻子大每服三五丸生薑湯送

下不拘時候

百部丸

治肺寒咳嗽微喘

百部 焙乾秤三分 麻黃去根節秤三分二味先為末

杏仁四十箇去皮尖微炒更焙三五沸焙乾研細

右同勻細末煉蜜和丸皂子大溫水化下二三丸

日三服錢乙加松子仁五箇糖和丸含化大妙

露蜂房丸

治肺胃虛寒咳嗽喘滿嘔逆不食

露蜂房 二錢炒

蟬殼 去土二錢炒

蛤蚧 一隻重四錢 金酥炙乾

木香 丁香

人參 去芦 地黃

麻黃 去根節

馬兜苓子

五倍子 去虫各二錢

五味子 去枝梗

貝母 云心焙

杏仁 煮小使浸二宿去皮尖炒

半夏麴各二錢半欵冬花去枝梗半兩

右為細末煉蜜和丸菜豆大每服二三十九生姜湯下日三四服食後

緩息湯

治風傷肺氣虛喘咳嗽上氣

桑白皮一兩半 白茯苓半兩 白僵蚕半兩去系炒

甘草一分炙 杏仁半兩去皮尖研後入人參去芦一分

桔梗去芦半兩 白朮半兩 陳皮半兩去白

右為細末每服一錢水一盞生姜三片杏仁二箇

煎至六分去滓時溫服

白朮五味湯

治氣逆上喘咳嗽

白朮 五味子去枝便炒 人參去芦 欵冬花去枝梗各半兩

細辛去土葉一分

右為細末每服一錢生姜三片煎至四分去滓放

溫時服

桔梗湯

治咳嗽痰壅呀呷咽膈不利

桔梗去芦半兩 甘草半兩炙 紫蘇葉半兩去土微炙

石膏半兩 半夏半兩湯泡七次皂角一分燒灰存性

右為末每服一錢水一盞生姜三片煎至五分去

滓放溫時服無時

淡竹瀝

治咳嗽短氣膏中吸之咯唾稠濃臭粘唾音唾

右以淡竹瀝一合服之日三四次

木香半夏丸

治肺胃有寒咳嗽

木香 半夏湯泡七次焙乾肉苁蓉 麩裹煨各一兩

藿香去土 丁香 白木各半兩

右為細末生姜自然汁和丸黍米大每服十九煎

人參湯送下不拘時候

白蛻殼散

治卒然暴嗽不止

右以白蛻殼不拘多少杵研極細每服半錢米飲

調下無時

五靈脂丸

治久嗽漸成羸弱恐變疴勞

五靈脂去沙土半兩 蟾頭一枚酥炙黃 蟬殼去土半兩

款冬花去枝梗半兩 青黛一分研 雄黃分研水飛

右同研勻細糯米飯和丸黍米大每服十九煎人

參湯下食後

人參半夏丸

治痰飲咳嗽

人參去芦 半夏湯泡七次 白木 川姜炮

南星微炒各半兩

右為細末生薑自然汁煑糊和丸黍米大每服十丸姜湯下月內百晬兒丸針頭大乳上吮服不拘時候

馬兜鈴圓

治肺壅咳氣喘大便不利

馬兜鈴去心紫蘇子炒人參去芦各一兩

木香欬冬氣紫殼梗各半兩 杏仁湯浸去皮尖

右五味先為末入杏仁末拌勻研煉蜜和丸黍米大每服十丸生薑湯下不拘時候

百合湯

治肺經風寒痰壅不利

百合 紫苑洗焙 白朮 人參去芦各一兩

白茯苓去黑皮 青皮去穢 甘草

麥門冬去心各半兩

右為末每服一錢水八分淡竹葉三片薄荷二葉煎至五分去滓溫服不拘時候

爽神湯

消寒痰除肺壅清神爽意

白朮 人參去芦 白茯苓各一兩 桔梗去芦

瓜蒌 甘草各半兩 細辛去苗一錢

右為末每服一錢水八分荆芥薄荷各少許煎至

五分去滓温服不拘時候

蘇香湯

治肺壅消痰滯

紫蘇葉去土 木香 人參去芦各半兩

五味子去枝梗 甘草 陳皮各半兩

右為細末每服半錢生姜自然汁少許荆芥湯調

下不拘時候

蟬殼湯

治肺氣壅滯不利

蟬殼去土微炒 人參去芦 五味子去枝梗各一兩

陳皮 甘草各半兩

右為細末每服半錢生姜湯調下無時

神麴湯

治痰涎壅滯氣不和順腹脇滿悶

神麴一兩微炒 木香一兩 半夏一兩用姜半斤同杵爛炒

蕪荑一兩 青皮去穰半兩炒 甘草半兩炙

白茯苓半兩

右為細末每服半錢鹽少許沸湯調温服無時

白金丹

消肺壅痰實治胸膈不利

桑白皮一兩剉 前胡去芦一兩 半夏一兩湯泡七次

白朮一兩 人參去芦半兩 陳皮半兩

甘遂一分微炒

右為細末煉蜜和丸黍米大溫水下五七丸周時
兒至一二歲兒三丸已上者以意量加不拘時候
前胡半夏丸

治風熱痰實肺氣壅滯涎流口出

前胡去芦一兩 半夏一兩湯泡七次焙乾 大黃半兩炮

麥門冬去心半兩 川朴硝半兩

右為細末生姜自然汁和丸黍米大每服十九煎
人參湯下不拘時候

犀角丸

治風熱面赤胃氣不和大小便秘瀝痰實涎盛三

焦壅滯及積熱蘊毒瀝音瀝

生犀末一分 人參去芦半兩 黃連去鬚一兩

枳實去穰炒半兩 檳榔半兩 大黃二兩酒浸一宿切作

片子以巴豆一百粒去殼皮貼大黃上鋪羅定飯上蒸三次去

巴豆切研炒焦

右為細末煉蜜和丸麻子大每服五七丸臨卧熟
水下未動加丸數服此疎利極穩之藥

治小兒痰壅肚熱諸病

以雞子亂髮熬良久得汁與服之良

枳殼湯

治痰實肚熱心膈煩悶氣不調順不早治恐生驚

癩

枳殼一兩去穰麩炒 乾姜半兩炮 甘草半兩

前胡去芦一兩 木香一兩 半夏一兩 湯洗七次

右為末每服一錢水一小盞生姜三片陳皮一片煎至六分去滓溫服不拘時候

溫脾丸

治脾胃宿冷口角涎流若涎漬頰頰口角生瘡名曰滯

頰別立干後

一兩用生姜六兩同杵爛炒令黃

丁香一兩 木香一兩 半夏

青皮去穰半兩炒 白朮半兩 乾姜半兩微炒

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九米飲下不

拘時候

丁香湯

治如前

丁香一兩 白朮半兩 肉苳蔻麩裹煨半兩

半夏半兩白礬水浸一宿洗淨炒黃 乾姜半兩

甘草半兩 人參去芦半兩

右為細末每服一錢水八分姜二片煎至五分去

滓溫服不拘時候

治小兒口中涎出

以白羊尿內口中

麻黃湯

治小兒風中肺經喘 肩息氣上不安 急

麻黃去根節二兩半夏 生姜各二兩製熟

甘草一兩 桂心半兩 五味子去枝梗半升

右咬咀每服二錢水一盞煎六分去滓服無時

馬通粟粒丸

治小兒喘急肩息氣通脇下作痛寒熱往來不進
乳食漸成羸瘦

馬通中粟粒三分杏仁湯浸去皮尖

紫苑去芦細辛去苗各半兩石膏 秦艽去芦

半夏湯泡七次茯苓去皮 五味子去枝梗各一分

右為末煉蜜丸小豆大每服十九生薑湯下日三
服加至二十九不拘時候

小兒衛生總微論方卷第十四

小兒衛生總微論方卷第十五

黃疸論

小兒有身體肌膚面目悉黃者此黃病也因將息過度飲食傷飽脾胃受熱與穀氣相搏蒸發於外脾胃象土其色黃候肌肉故為是病也慎不可灸則熱轉甚矣若身軀痛背膊強大小便澁腹脹滿一身盡黃及目睛爪甲皆黃小便如屋塵色著物皆黃此疸病也若發渴小便澁腹滿脈沉細為難治也黃病者稍輕疸病極重又有自生下面身深黃者此胎疸也因母臟氣有熱熏蒸於胎故也經言諸疸皆變色深黃者是也若身微黃者胃熱也若但面黃腹大渴而

食泥土者脾疳也此二項各有本病具之外黃病疳
病叙方於後

三黃散 蘇林重之白土

治黃病

黃川大黃一兩剉碎微炒 黃芩半兩 黃連去頭半兩

神右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫

食後時服

子苓散

治如前

黃芩 瓜蒌根 茯苓去心肉各一兩 甘草炙

胡黃連各半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服

不拘時候

葎根汁

治如前

右杵葎根取汁滴兒鼻中大豆許

丁香散

治黃病遍身如金色

右六月六日收瓜蒂四十九箇丁香四十九箇入

乾鍋子內火燒烟盡取出放冷研細末每用半字

吹鼻中及揩牙

蔓菁子汁

治如前

右以慢青子汁水和服之半錢或一錢亦治疸病
猪苓通草散

治黃病透明黃腫

木猪苓去黑皮 通草 塗蜜炙乾各等分

右為細末更入研細射香去土地龍末各少許拌
勻每服半錢或一錢米飲調下不拘時候神効

括樓根汁

治小兒忽發黃面目皮膚悉黃

右以生括樓根杵取汁三合蜜一大匙煖鎔相和
量兒大小服之不拘時候

雙連丸

治諸疸病

川黃連去頭一兩 胡黃連一兩

右為細末用黃瓜一枚切蒂頭留作蓋子去穢入
藥末在瓜中却以蓋子蓋定用麵裹慢火煨令麵
熟焦去麵杵爛成劑丸菜豆大每服五七丸至十
丸温米飲下量大小加減不拘時候

茅煎湯

治黃疸病

柴胡去苗淨洗焙乾一兩 甘草一分

右以咀每服二錢水一盞白茅根少許同煎至五

分去滓温服無時

螺肉酒

治如前

右取田螺肉一二十箇作刮剝酒服之

驢乳汁

治嬰小熱黃胎疸

右取驢乳汁少少與服

客忤論

小兒中客忤者小兒神氣嫩弱忽有非常之物或未
經識見之人偶然觸而見之其客氣與兒神氣相忤
以生病謂之客忤其候吐下青黃白色水穀鮮離腹
痛夭矯面頰變易五色不常病仲熱癇但目不上視
其脉弦急數者是也若不即治久則難療聖濟經曰
出處不時而為客忤戒其恐見非常人物為病也千
金曰小兒衣帛綿絮及鞋襪中皆不得令有頭髮又
青衣不可用白帶白衣不可用青帶或諸不識人物
外來者並當令兒避之勿見若誤有觸犯並令兒患
客忤或有犯而患者急視其兒口中懸癰左右有腫
核如麻豆大者便須刺摘令續之用綿纏釵積頭展
去其血兼服諸藥為治

治小兒客忤腹痛夭矯面色變易

以香豉數合水拌令濕搗熟丸作丸子如雞子大

用摩兒顙上及手足心各七遍及摩兒心臍上下
行轉摩之食頃破其丸視其中當有細毛即擲棄
去丸於道中痛乃便止

治小兒卒中客忤塗法

電中黃土

蚯蚓糞等分

右研細水調塗兒頭上及五心中大良

又方 法

治如前

以馬糞三升燒令烟絕用酒三升煮數沸去滓將

以浴兒

以豚猪糞二升熱湯灌攪適溫暖浴兒

治小兒客忤服法

以牛口沫塗乳上飼兒

以銅鏡鼻燒令赤內酒中能飲者令自飲不能飲
者含而灌之

治小兒中客忤吐青白沫及乳食皆出腹中痛氣欲
絕者

以桂心一兩為末一二百日兒以半錢煎水一小

盞煎至五分去滓溫分四服不拘時候量兒大小

加減

又方

又治小兒客忤

右以白僵蚕七枚為末酒調服半錢至一錢

又方

治如前

右取書中白魚十枚傅乳頭令兒吮服今人呼為衣魚

又方

治如前

右取驢乳汁少與服或以熱馬屎一塊絞汁飲
燕下即愈

射香乳

治客忤項強欲死

右以射香少許研細用乳汁調抹兒口中如大豆
許良

又方

治如前

右以桔梗燒末半錢調服量大小加減

治馬毒客忤

右以馬尾於兒面前燒令兒嚙其烟氣每日用之
取差

治客忤夜啼禳法

右用本家厨下燒殘火柴頭一箇以焦頭為上朱
書云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼

一縛永不放急。如今書了勿令兒知立在兒床
下倚前脚裏廂立之男左女右

辟邪膏

治客忤及治中惡邪厲鬼氣其候似癇但目不視
上倒視脉弦急中之卒暴者立至蘇省

降真香剉

白膠香別研沉香

虎頭骨酥炙

鬼臼去毛

龍膽草去芦人參去芦

白茯苓神去心内木各半兩

右為細末次入研飛過雄黃末半兩研細射香一
錢拌勻煉蜜和丸雞頭子大每服一粒煎乳香湯
化下及丸一彈子大用綠絹袋盛之帶兒衣上仍

於卧處常燒炒

三症論

小兒疰病有三一者鬼疰小兒神菟氣弱早晚抱持
出入無時為鬼厲邪氣所干其候皮膚掣痛游易無
常或心腹刺痛天矯悶亂欲死迺名中惡甚者卒致
於死緩者涎引歲月更變沉滯以至於死又注傍人
二者尸疰人腹中有虫曰尸疰小兒血氣嫩弱邪氣
外傷留滯身中尸虫移引相乘為病其候沉、嘿、
不知的病之處或寒或熱或心腹悶痛涉引歲月遂
至於死又註傍人三曰蠱毒疰謂諸毒虫之中有一
能啖其餘者即為之最名之曰蠱或因人作或因引

注隨飲食入而兒腹中食人臟腑其候心腹刺痛煩悶欲絕利下無時或便血片急者即死名曰中蠱之毒緩者涉引歲月以至臟爛乃死又注傍人今叙諸治方于後

虎頭枕

治中鬼氣為遊氣為魔

右以虎頭骨為枕與兒枕之

千金湯

治小兒暴驚啼絕死因人從外來邪氣所逐令兒得疾衆醫不治

右以蜀椒左顧牡蠣各六銖碎之酢漿一升煮取

五合分服

豆豉丸

治中惡鬼氣寒熱

右以濕豉丸雞子大摩兒腮上及手足心六七遍又摩心腹臍上旋以言祝之了即破其豉丸看之當有細毛棄道中

又方

治中惡邪鬼氣或於病間忽然而卒絕右以生菖蒲根杵爛取汁灌之

又方

治如前

右以羊屎燒烟以熏鼻中

又方

治如前

右視其死者上唇裏弦有核子如黍米以針挑破之復蘇

又方

治如前

右以皂莢末或生半夏末少許吹兩鼻中

又法

治如前

右凡中惡邪或魔死者不得用燈火照之亦不得近前急喚或與接氣恐被污染多致殺人但只與痛咬脚跟及足把指甲邊多唾其面即活

又方

治如前

右以好酒浸綿半盞及手按其汁灌鼻中

又法

治如前

右以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖撚作任子刺鼻中

又方

治中惡鬼邪遊痛如刀刺或胸膈腹中絞痛急切

手不可近而按摩

右以好酒灌鼻孔亦治中惡吐血下血

又方

治如前

右以鹽一錢水一盞攪和令勻服并以冷水噴之
取吐即差

又方

治如前

右以蓬茂酒研令服

又方

治如前

右取全下黃土水調服之

又方

治中惡鬼邪為祟及鬼症尸症

右以桃仁研碎水煨頓服當吐即差不吐或吐不
盡病再作或以桃仁汁煨米為粥與食

鱉頭散

治尸症瘦瘠時發寒熱

右以鱉頭一枚燒灰杵末新汲水調下半錢

雌黃丹

治尸症

雌黃研水飛雄黃研水飛川大黃慢火煨黑色

鬼臼去毛各一兩射香一分研桃仁三十箇湯浸去
白頭翁去芦半兩巴豆拾箇去皮膜紙裹去油
右為細末拌勻以羊脂五兩鎔化和藥成膏丸黍
米大每服三五粒荆芥湯下無時
立効散

治尸症

川大黃一兩炮剉乾桃柳葉各一兩洗焙
梔子仁半兩赤芍藥半兩硃砂一兩別研水飛
雄黃一分別研水飛射香一分別研
右為細末拌勻每服半錢蜜湯下無時

神效散

治中蠱毒

大甘草半兩生末 晉礬一兩末
右拌勻新水調下一錢或半錢吐出毒物効
雄射散

專治蠱毒

雄黃一兩水飛研 射香一兩研 羚羊角一兩屑
鬼臼半兩去毛 赤芍藥一兩 齊荒去芦半兩
敗鼓皮一兩炙黃焦 馬兜鈴根半兩
右除雄射外為細末入二味拌勻每服半錢濃煎
甘草湯調下無時

射犀湯

治如前

甘犀角一兩屑 鬼箭取羽一兩 安息香一兩

苦參半兩 牡丹皮去心半兩已上先為末

雄黃一兩研水飛 射香半兩研

右拌勻細每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫

時服

甘草湯

治中蠱毒欲死

右以甘草半兩剉碎用水一盞煎至五分去滓溫

服當吐出毒物

寶靈丹

治中蠱毒

硃砂一兩研水飛 雄黃一分研水飛 黃丹一分研

苦藥子一分 續隨子一分去皮毛 山豆根一兩生

蜈蚣二條一條微炙一條生用 斑猫一分去頭翅尾半生炒

巴豆二分去皮膜出油不 射香二分研

右為細末拌研勻於端午日重九日合之最佳事

急者不拘脩合時忌見鷄犬婦人用糯米粥和丸

麻子大若未能語兒中毒即休如能語兒但將藥

一粒入門即患兒先聞其香是驗以臘茶清送下

一丸不得嚼破須臾患兒必言心頭作響毒物

便下或從口鼻出或自大便下嫩即是血老即是

諸虫狀其形不一藥隨物下凝血中裹之取出丸
以香水洗淨收之一丸可救四五兒口噤者拗灌
之如知用蠱之人即不得根究必再發不可治
治中蠱下血欲死

以藍搗汁頻服半合

治中蠱毒腹中堅痛面目青黃淋露骨立病變無常
以桃上寄生為末茶點眼日四五

桔梗丸

治鬼疰尸疰蠱疰皆療

桔梗去芦 黎蘆去芦 皂莢去皮子 巴豆去壳心膜

附子各半豆許

右為末煉蜜和劑入臼杵萬下每服二丸或一丸
如黍米芥子仰卧勿側眠至食時許病在膈上者
即吐在膈下者即瀉取下惡物如科蚪蝦蟇胎或
長一二尺下後大虛口乾但作鷄羹飲五合與極
飲或食粥三四日乃痊病未除尽再服

夜啼論

小兒夜啼者症候甚多其所專者不出三種一者冷
謂脾臟寒則腹痛而啼其候面青白手冷腹肚冷口
中氣亦冷曲腰而啼不肯吮乳又有從生下多啼入
夜則甚者此胃寒也亦曰胎寒聖濟經言積冷而夜
啼夜則為陰冷則作痛故夜間痛甚令兒啼哭也二

者熱謂心臟熱則煩燥而啼其候面赤小便赤口中
氣熱心腹亦煖仰身而啼不肯吮乳又有多饒驚悸
惕跳或睡中忽然叫哭此風熱也亦曰驚啼心主熱
其候驚故熱則生驚又心為火熱則火旺故熱邪燥
甚令兒啼哭也三者邪崇謂有鬼氣所持其候睡卧
不穩或作疼痛且鬼崇者陰物也入夜則旺小兒精
神怯弱血氣嫩微夜間被鬼所持故令兒啼哭也外
客忤蟲動重舌口瘡等病亦皆能為夜啼其治方各
逐本項下具之非若此三等之為專也今叙方于後
蒜香膏

治冷症腹痛夜啼

右以大蒜一顆慢火煨香熟取出切細研爛於日
中暴或火上炕半乾可丸時即以好乳香秤半錢
研細如粉入拌再研極勻丸如芥子大每服七丸
乳頭粘服或乳汁送下食空

當歸丸 治如前

當歸 去芦洗淨焙乾秤 白芍藥 人參 去芦各一分

甘草炙 桔梗 去芦 陳皮 不去白半分

右為細末每半錢水煎時服之

龍角丸

治小兒五驚夜啼

龍角一分 黃芩半兩 牡蠣一分半 火煨一作牡丹

蘇醇 去土二枚 牛黃小豆大五塊 川大黃一分半

右為末煉蜜和丸麻子大葶中兒二丸大小以意
加減

芎藭散

治小兒夜啼至明則安

芎藭 白朮 防己 各半兩

右為末以乳和與兒服以意量大小多少又母用
手掩入兒臍中摩兒頭脊大驗兒生二十日已裏
未能服者以乳和麻子大一丸置兒口中乳汁送

下

又方

治風寒客於喉厭語聲不出

川芎三分 遠志去心甘草水焙三分 麥門冬去心三分

人參去芦半兩

右為細末煉蜜和丸小豆大平旦空心米飲下五
九日三兒大加之又服立効

渴論

小兒有渴而飲水者此因臟腑有熱熱則臟燥故多
體熱發渴亡耗津液即令作渴欲飲水以解之也又
有瘡渴吐瀉發渴霍亂發渴者各逐本項具之閱考
忠云凡小兒諸渴因亡失津液引飲者但多煎錢氏
白朮散與服使任意取足飲之彌多彌好其方本集

所載熱渴者叙方于後
蓮湯散 治嬰小發渴心燥

右以粉霜研極細每嬰孩一字三四歲下者半錢煎蓮花湯調下冬月無花時蓮肉代之

香葛湯 治渴甚津液燥少

木香 乾葛根剉人參去芦各一兩 白茯苓

長蘂香葉去土 甘草炙各半兩

右為細末次用射香半錢研細入藥拌勻每服半錢或是一錢生姜湯調溫服無時

葛根湯 治體熱煩渴

葛根 人參去芦各一兩 麥門冬去心 白茯苓

當歸散

治胎寒氣喘不止久能變癩

右以當歸為末每用小豆許乳汁調抹兒口中日夜五服

三黃丸

治熱症心燥夜啼及諸熱症

黃芩半兩 大黃去皮濕紙裏煨熟一分 黃連去酒一分 右為細末麵糊和丸菴豆大每服五七丸人參湯

下亦治晝啼

又方

治熱煩腹痛夜啼

右以真牛黃少許如小豆大乳汁化服又於臍下
又書一田字差

又方亦治熱症心燥夜啼

右以燈花三兩顆用燈心煎湯調抹兒口中乳汁
送下日三錢氏亦治臟冷夜啼但頓乳汁令兒吃
之又經驗方以燈心燒灰塗乳上吮兒

紅桃散 治風熱身如湯火夜啼不乳

天南星 二箇每箇中心刻作窩子入朱砂裝滿用木蓋之
調取下中心末塗縫擦一地坑頓在內以炭蓋之用火煨赤放冷取
出研末

全錫半錢為末 白附子大者二十箇為末

臍粉一錢

右拌研勻每用一字金銀薄荷湯調下

綠霞散 治如前

栢葉二錢末 錫末一錢 天南星炮過為末一分

白殭蚕去絲紫末一錢 釵金末一錢 雄黃末一錢水

右拌勻細每服一字或半錢薄荷蜜水調下無時

前胡丸 治風熱氣喘

右以去蘆前胡為末煉蜜和丸小豆大日服一丸
熟水下服至五六丸即差

牛黃膏

治兒睡着時忽然乍驚哭而覓面赤口乾狀若神

崇此雖夜啼非名夜啼也乃風熱邪氣乘心臟而
作名曰驚啼

真牛黃研五分煨過牡蠣粉 硃砂研水飛

雄黃研飛各一分人參五分甘草各半兩

龍腦半分研

右為末拌勻煉蜜和膏雞頭子大每服半粒或一
粒薄荷湯化下乳食後

安神丸 治如前

麥門冬去心焙 馬牙硝 白茯苓 乾山藥

甘草半兩 寒水石研各半兩 朱砂一兩研水飛

龍腦一字研

右為細末煉蜜和九雞頭子大每服半九沙糖水
化下無時

虎睛散 治驚惕夜啼

右以虎睛為散竹瀝調少調許抹口中

又方 治如前

右取車轄脂小豆許內口中又取內臍中

又方 治如前

右以父亂頭髮燒灰研末酒調服一字更量大小

溫水亦得

又方 治如前

右以鷄糞白燒灰研末米飲調服

明砂丸

治心神不寧多驚心腹疼痛夜啼不止

朱砂通明者二錢杏仁十四個去皮入炒黃好坯子半

右為末軟飯和丸黍米大每服五丸薄荷湯下

射香散

治驚啼夜哭發歇不止

右以射香研細用半字清水調下日二三服

鐵涎膏

治諸驚夜啼

丁頭代赭石半兩火煨醋淬不記遍數以易碎為度

鐵胤粉一錢 白附子一錢 水飛

射香一字研 龍腦一字研

右為細末拌勻蒸棗爛和成膏旋用嬰孩半皂子

許至二三歲一皂子許金銀薄荷湯化下不拘時

候

七寶輕青丹

治驚啼夜哭及諸熱等疾

螺青半兩 蛤粉一分 鈞藤炒為末一錢

白附子三字 鉛錫灰二錢 丁香一字炒

天竺黃一錢

右為細末入射香半皂子許研細拌勻米粉煨糊

和丸豌豆大每服一九薄荷湯磨水下無時

又方 治夜間卒驚啼哭似有痛處而不知疾狀

右取雄鷄冠血臨兒口上滴少許入口中即差

又方 治如前

右以亂髮燒灰為末塗乳上令兒吮之能食者飲

調亦得

甌帶法治鬼祟邪厲夜啼

右取甌帶懸戶上

又法 治如前

右以胡粉水調二大豆許與服日三

馬骨末

治小兒諸夜啼

右以馬骨為細末傅母乳頭上令小兒吮服即止

又方 治如前

右取狼糞中骨燒灰研為細末服黍米許便止

又方 治如前

右取鷄窩中草安於卧席之下勿令乳母知之

諸津論

小兒有遍身喜汗出者此榮衛虛也榮衛相隨通行

經絡榮周於身環流不息榮陰衛陽榮虛則津液泄

越衛虛則不能固密故喜汗出遍身也錢乙用香瓜

丸若睡中汗出不自知覺者此肌肉而盜汗也如盜

者竊物使人不知覺也又有但額上汗出者此厚衣
温煖將養過宜也上二項錢乙並用止汗散若上至
頭下至項有汗而不曾過膏者此六陽虛汗也六陽
脉皆上至於頭故也若上至項下至臍有汗者此胃
虛汗也當與補胃昔錢乙治張氏三子大者喜遍身
汗出次者汗上至項下至臍小者但頭面有汗至項
下而無他醫以麥煎散治之不効遂請乙治之大者
與香瓜丸次者與益黃散小者與石膏湯各五日而
愈錢乙治方本集載之外收諸方叙之後

沉香黃耆散

治榮衛虛遍身喜汗

沉香剉綿黃耆剉蜜炙去芦 當歸 去芦洗淨焙

赤芍藥已上各二兩 木香 桂心 各半兩

右為細末每一大錢水一小淨盞入生姜三片棗
一枚同煎至半盞去滓放温食前時時與服

蕤蓉丸

治血少喜汗

肉蕤蓉一兩酒浸一宿刮去外皮炙乾 鼈甲 一兩酥炙黃去裙襴

綿黃耆半兩蜜炙 何首烏半兩

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九米飲送下
食前

木槿花 治盜汗

右取木槿花開而再合者焙乾為末每用一錢猪皮煎湯調下食後臨卧

牡蠣散 治盜汗

牡蠣一兩煨赤 麻黃根二兩剉 甘草半兩

右為末每用二錢以野水一盞煎至七分去滓放温無時

升麻湯 治肌熱盜汗

升麻 綿黃耆去芦蜜炙 人參去芦各二兩

熟乾地黄 天竺黃研 牡蠣粉研各半兩

右為細末拌勻每服半錢或一錢煎竹葉湯調下無時

柴胡人參散 治如前

柴胡去芦 人參去芦 白朮 白茯苓 青皮去穢

桔梗去芦 麥門冬去心 川芎 白芍藥 甘草炙

桑白皮 升麻

右等分為末每服一錢水一盞煎至七分温服食後

紫蘇飲

治肌熱煩燥多渴盜汗揉鼻腹滿

柴胡去苗 藿香去土 甘草 烏梅肉 乾葛

紫蘇葉去土 人參去芦 茯苓 麥門冬去心

秦艽去芦 地骨皮去骨 防風去芦并叉枝

右等分為末每二錢水一盞煎至七分去滓放温

時：呷

沉香鼈甲丸 治潮熱盜汗

沉香判草龍膽去戶鼈甲童子小便浸一宿塗酥炙焦去

裙襴各一兩 綿黃耆一兩剉蜜炙 川黃連 去酒半兩

川大黃半兩微炮

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十九丸用麥門冬

去心煎湯送下無時

柴胡黃連膏 治盜汗潮熱往來

柴胡去苗 胡黃連等分

右為末煉蜜和膏丸鷄頭子大每一二九銀器中

用酒少許化開入水五分重湯煮二三十沸放溫

服無時

黃耆散 治虛熱盜汗

牡蠣粉 黃耆蜜炙 生乾地黃焙乾等分

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫

服無時

虎杖散 治實熱盜汗

右以虎杖剉細水煎服之量大小多少與服

黃連粉 治盜汗

黃連去須 牡蠣粉 貝母去心各等分為細末

右如三味各一兩即入米粉一兩研勻細以粉身

龍膽粉 治如前千金治頭汗

牡蠣粉 茯苓各二兩

右同為細末於生絹袋子盛之有滓即撲身

牡蠣粉 治諸滓

牡蠣粉二兩 麻黃根 赤石脂 糯米粉各二兩

右勻為細末入龍腦末一錢拌之每用一時頭新
綿包撲有滓之處止盜汗最佳

又方 名同治同

牡蠣粉二兩 麻黃根一兩 蛇床子 乾姜各半兩

右同為細末用如上法

治小兒臟熱多滓犀角飲子

犀角屑三分 茯神去心肉木 龍齒各二兩 甘草半兩

麥門冬去心二兩半 白木一分

右為末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服無
時

不語論

小兒有不能語者其証有三 一者心氣不足心繫

舌本氣營而舉之則舌本動而語聲作矣今氣怯而

不能營用於舌故不能語也此証已在五氣項下具

之 二者卒不能語因風寒之邪干於啞門連絡舌

本使舌本緊急故卒不能語也又一証喉嚨為氣之

道路會厭為聲之門戶暴為風容於喉厭則失音而

語聲不出非不能語也 三者因病後不能語此因

服清藥以利小便致腎虛而不能上接於陽故不能
語昔錢乙治王氏慢驚病愈後有聲而不能語衆以
為失音乙曰既失音何開目而能飲食又無不噤口
不緊而能嚥藥衆醫皆不曉乙曰此因用清藥利小
便致虛腎氣不能上接於陽故也遂用地黃元補腎
而漸漸能言一月而愈其方本集載之外收方具後
菖蒲散

治感風寒容於啞門卒不能語

菖蒲 桂心 遠志 去心甘草水煮各一分

右為細末每一錢水一中煎至五分溫服無時

桂散

交道中土 伏龍肝各一抱

右同研細水調少許飲之

治小兒夜啼

以蟬蛻去土為細末用生薑蜜水調塗兒下唇

又方 治如前

男左女右臂上書尹喜二字更於手心內書天字
一箇

又方

治小兒驚啼夜啼

以臘月縛猪繩燒灰水調服

以蝟皮三寸燒灰著乳上飲之瘰如物刺啼

燈花丸

治如前能祛邪止痛

以燈花二十箇乳香皂子大兩塊同為末粟米飲和丸芥子大每服七丸桃心湯下無時

萬金散

治臟寒氣弱面色青白過夜多啼狀若神宗

沉香剉 丁香 人參去芦 五味子去枝梗炒

當歸去芦洗焙各一兩 白朮剉 赤芍藥各半兩

桂心一分

右為細末每用一錢淡漿水一小盞煎至五分放溫時滴口中兒大稍飲立効

澤瀉

甘草炙各半兩

右為細末每服一錢水八分入生姜二片薄荷三葉煎六分去滓溫量大小服無時

涼肌丸 治肌熱臉赤煩渴燥悶

草龍膽去芦二兩 玄參去芦一兩 當歸去芦洗淨一兩

右為細末煉蜜和丸棗豆大每服一二十丸竹葉湯下無時

葛根飲子 治熱渴久不止

右以葛根半兩剉碎水一盞煎至六分去滓頻服無時

神羈散 治一切諸渴

右以大牡蠣於臘日端午日用黃泥裹煨通赤放
冷去泥為細末取活即魚煎湯調下半錢只一二
服差

治小兒熱渴久不止

右以石蓮心三十箇炒黃浮萍一分水一中生姜
少許同煎至六分去滓每服半合徐服

血溢論

小兒諸血溢者由熱乘於血氣也血得熱則流溢隨
氣而上從鼻出者為鼻衄從口出者多則為吐血少
則為唾血若流溢滲入大腸而下者則為便血滲入
小腸而下者為溺血又有血從耳目牙縫斷舌諸
等出者是血隨經絡虛處著溢自皮孔中出也今叙
方于後

益消一分研 亂髮一分燒灰研 紅藍花一分為末

右同勻細以綿纏子搵藥塞鼻孔中

槐花散 治如前

槐花二兩炒蒲黃半兩 川麩姜一分

右為細末每服半錢新水調下無時

又方 治如前

右以滑石為細末飯丸蘿蔔子大每服三二十九
微嚼破新水嚥下未能碎者槌碎與之

又方 治如前

右以生蘿蔔搥碎研取汁入酒相當量大小温服立止

華蓋散 治唾血吐血

阿膠半兩蛤粉炒如珠子去蛤粉黃芩一分人參去芦一分

右為細末每服半錢陳米飯調下無時

紫參散 治如前

紫參 山梔子仁 生乾地黄各二兩 荆芥燒灰

亂髮燒灰 蒲黃研炒 伏龍肝研各一分

右拌細勻每服半錢或一錢煎竹茹湯調下無時

黃連散 治吐血

右以黃連一兩去鬚為細末每服一錢水七分入

豉二十粒同煎至五分去滓温服無時

又方 治如前

右以蒲黃細研每服半錢用生地黄汁調下無時

又方 治如前

右以蛻蛻皮炒焦黃為末乳汁調下

又方 治如前

右以黃明膠新綿各一兩並燒灰研為細末每服

半錢或一錢糯米飲調下日三

又方 治如前

右以燈心淨椀內燒灰以物蓋之研為末每服半

錢或一錢射香湯調下

甌帶灰 治大便下血

右以甌帶燒灰研末塗乳下與兒吮之南人以蒲
為甌帶久經蒸溜或敗爛者良

又方 治如前

右以車釭燒赤內水中飲服

又方 治如前

右取鷓鴣翅下血與服或以鯨頭一枚炙黃黑為
末飲調半錢服

車前散 治小兒尿血

車前子一分 牡蠣半兩煨為粉 甘草一分研

川朴硝一分

右為細散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫

服

又方 治如前

右以甘草二兩炙黃為末煉蜜和圓菜豆大每服
五七丸溫水下日二或生剉以水六合煎取二合

去滓服

神白散 治諸吐衄便溺等血妄出

槐花半兩微炒 蛤粉一兩

右為細末每服半錢或一錢煎柳枝湯調下

青龍丹 治小兒熱盛一切血妄行神効

甘草 貫衆 茯苓 乾葛 龍腦 薄荷葉

藿香各一兩 縮砂五兩去皮 山茵陳者根

寒水石各六兩

右為細末麩糊和丸櫻桃大別 研細青黛為衣每服一丸細嚼溫水下食後臨卧

又方 治諸血妄行從耳目口中鼻中出

右以赤馬糞燒灰研為細末溫酒調下一字或半錢看大小與服

地黃散 治舌上出血如針孔

生熟地黃二兩 明膠半兩炒

右為末溫湯調下一二錢

又方 治如前

右以豉一合水一盞煎數沸溫服半盞或一盞亦

治下血

又方 治如前

右以小豆一合為末水三盞和攪汁飲之

戎鹽丸 治舌上有數黑孔血出如湧泉

戎鹽 黃芩 黃蘗 大黃各二兩半 人參

桂心各二兩 甘草半兩炙

右為細末煉蜜和丸菜豆大飲下五七圓日三如

舌上孔穴大血不止者仍燒鐵烙之

苦竹葉汁 治牙齒斷縫間血不止

右以苦葉不拘多少水煎濃汁入塩少許通口漱

盥

又方 治如前

右以童子小便半盞煖熱通口漱盥

嚏法 治九竅四肢指岐間皆出血此暴驚所致

右勿令患人知覺以井花水猛嚏其面

治小兒尿血

以鵲巢燒灰并花水調服

以川升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒日

服盡

小兒衛生總微論方卷第十五

