

新 最
藥 物 名 彙

藥學叢書之二

14

一九四八年六月

凡 例

- 1、本書之藥物名係按拉丁字母之順序排列。
- 2、藥物名係採用美，英，日，三國藥典所載之拉丁名，而以美、英、兩國藥典所載者為主。
- 3、藥物名前附有『。』號者係新藥名。
- 4、凡係藥物之別名，及與其他藥物有相同或近於相同之組成者，在『主要成分』欄內均註有『同』或『類似』字樣，可參看各該相同之藥物。
- 5、新藥之中文名係譯音。
- 6、英文名僅記載英國藥典之英文名；日文名僅記載日本製品之名稱。
- 7、法定藥品之中文名，係採用一般通用譯名。



3 0543 6005 6

418.04
700
- 1 -

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Abasin	阿巴新			$\begin{array}{l} \text{NH-COCH}_3 \\ \\ \text{OC} \\ \\ \text{NH-CO-C} = (\text{C}_2\text{H}_5)_2 \\ \\ \text{Br} \end{array}$	催眠	內用 1次0.2-0.4g
Abery	阿俾利	アベリー		Vit. B 複合體	抗V. B 缺乏	l.c. 皮, 靜注
Aber ₁ -B ₁	,, -B ₁	アベリー-B ₁		Vit. B ₁	抗脚氣	皮, 筋注
Acacia	亞拉伯膠	アラビアゴム	Gum arabic	Arabin	粘 滑	10-20% 外用 丸, 錠劑固結用
Acetanilidum	醋醯安樂 (安替非布林)	アセトアニリ ド (アンテフ ニプリン)	Antifebrin	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH-COCH}_3$	解熱, 鎮痛	1次0.05-0.1g
Acetarsolm		アセタル ゾール		同Spirocid		
Acetarsone	阿西他生			同Spirocid		
Acetopyrin	阿西安匹林			Antip rinum acetysali- cylicam	鎮 痛	急性性瘧疾 1日2.0g
Acetosol				同Aspirinam		
Acetylcholin	醋醯胆素			$\begin{array}{l} (\text{CH}_3)_3 \\ \\ \text{Cl-N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OOCCH}_3 \end{array}$	血管擴張	高血壓, 血管障 碍, 腸管麻痺, 皮, 筋注
Acidum Acet- ichin	醋 酸	醋 酸	Acetic acid	CH_3COOH	制 渴	1次 0.25-1.0內用

367816

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Acidum Aceticum Glaciale	冰醋酸	冰醋酸	Glacial acetic acid	“	腐 蝕	外用，製藥原料
“ Acetylsalicylicum	醋基柳酸 (阿斯匹靈)	アスピリン (アセチルサリチル酸)	Acetylsalicylic acid (Aspirin)	$C_6H_4 \begin{matrix} / O-COCH_3 \\ \backslash COOH \end{matrix}$	解熱，鎮痛	內用 1次0.5-1.0g
“ arsenicosum	亞砷酸	亞砷酸		同 Arseni Trioxidum		
“ Benzoicum	安息香酸	安息香酸	Benzoic acid	C_6H_5-COOH	祛痰，防腐	內用1日0.05-0.5 外用0.1-0.25%
“ Boricum	硼 酸	硼 酸	Boric acid	H_3BO_3	防腐，消毒	含嗽2-3% 外用
“ Camphoricum	樟腦酸	カンフル酸 (樟腦酸)	Camphoric acid	$\begin{matrix} CH_2-CH-COOH \\ \\ CH_3-C-CH_3 \\ \\ CH_2-CH(CH_3)-COOH \end{matrix}$	制 汗	內用1次0.5-2.0 含嗽0.5-2.0%
“ Chromicum	鉻 酸	無水クロム酸		同 Chromii Trioxidum		
“ Citricum	枸橼酸 (檸檬酸)	クニン酸	Citric acid	$\begin{matrix} CH_2-COOH \\ \\ CH(OH)-COOH \\ \\ CH_2-COOH \end{matrix}$	止 渴	0.5%
“ Gallicum	沒食子酸	沒食子酸	Gallic acid	$\begin{matrix} HO \\ \\ HO-C-COOH \\ \\ HO \end{matrix}$	收 斂	口內炎，陰炎， 尿道炎0.5-2%
“ Hydrochloricum	鹽 酸	鹽 酸	Hydrochloric acid	HCl		製藥原料
“ Dilutum	稀鹽酸	稀鹽酸	Dilute hydrochloric acid	HCl	止 渴	0.5%
“ Lacticum	乳 酸	乳 酸	Lactic acid	$CH_3-CH(OH)-COOH$	腐 蝕	外用20-80%

薬物名	和文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Acidum Muriat- icum	鹽 酸			同 Acidum Hydrochloricum		
„ Nitricum	硝 酸	硝 酸	Nitric acid	HNO ₃	腐 蝕	外用10%
„ Oleicum	油 酸	オレイン酸	Oleic acid	$\begin{array}{c} \text{C}_8\text{H}_{17} \\ \text{H} \end{array} > \text{C} = \text{C} < \begin{array}{c} \text{H} \\ (\text{CH}_2)_7 \\ \text{COOH} \end{array}$		油酸系原料
„ Phenylchi- nolin-carbonicum				同 Cinchophenem		
„ Phosphoricum	磷 酸	磷 酸	Phosphoric acid	H ₃ PO ₄	止 渴 尿結石治療	1日0.5—1.5g
„ Picricum	必 苦 酸	ピクリン酸		同 Trinitrophenol		
„ Pyrogallicum	焦 性 没 食 子 酸	焦 性 没 食 子 酸		同 Pyrogallolum		
„ Salicylicum	柳 酸 (撒酸)	サリチル酸	Salicylic acid	$\text{C}_6\text{H}_4 \begin{array}{l} / \text{OH} \\ \backslash \text{COOH} \end{array}$	防 腐	神経痛—1日1.5 防腐劑—1—5%
„ stearicum	硬 脂 酸	ステアリン酸	Stearic acid	C ₁₇ H ₃₅ -COOH		Vanishing cre- am原料
„ Sulfuricum	硫 酸	硫 酸		同 Acidum Sulphuricum		
„ Sulphuricum	硫 酸	硫 酸	Sulphuric- acid	H ₂ SO ₄	腐 蝕	試薬、製薬原料
„ Tannicum	鞣 酸	タンニン酸	Tannic acid (Tannin)		收 斂	内用1次0.05— 0.5g 外用5—10%用法

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Acidum Tartaricum	酒石酸	酒石酸	Tartaric acid	$\begin{array}{c} \text{CH}(\text{OH})-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}(\text{OH})-\text{COOH} \end{array}$	止 渴	0.5—1.0%
„ Trichloracet-icum	三氯化醋酸	トリクロル酸	Trichloroacetic acid	CCl_3COOH	腐 蝕	疣，浪傷塗布
Aconitum	烏 頭	アコニツト根	Aconite	Aconitin	鎮 痙	神經痛 1次0.06g
Acrical	阿克里卡	アクリカール		0.25% Acrifravine 3.8% Cal-Glucon. 10.9% Glucose	殺 菌	淋，腎盂炎等 5.0—20.c.c. 靜注
Acrichin		アクリヒン		同 Atebrin		
Acrifravina	黄色素	アクリフ ラザイン	Acrifravine	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ (3)\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2(6) \\ \\ \text{CH}_2\text{Cl} \end{array}$	殺 菌	化膿性疾患 0.5%10c.c.注， 0.1—1.0%外
Acrinolum	阿苦利諾兒	アクリノール	Acrinol	2-Aethoxy-6-g- diamino-acridin- lactate	殺 菌	0.1—0.2%
Adalin	阿達林			同 Carbromalum		
Adeps	豚 脂	豚 脂	Lard			軟膏基礎劑
„ benzoatus		安息香豚脂		同 Adeps Benzoinatus		
„ Benzoinatus	安息香豚脂	„	Benzoinate- d lard	安息香 1.0 豚脂 50.0		軟膏基礎劑

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Adeps Lanae	無水羊毛脂	脱水ワロロン	Wool fat	Zeroic acid		軟膏基礎劑
" anhydricus				同前		
" cum Aqua				同 Adeps Lanae Hydrosus		
" Hydrosus	含水羊毛脂	ワロロン	Hydrous wool fat	Zeroic acid		軟膏基礎劑
" suillus				同 Adeps		
Adipron	阿基普隆	アデブロン		同 Sulfapyridin		
Ados	阿託斯	アドース		活性炭素	吸 著	止瀉 1次0.3~0.6g
Adrenalina	副腎鹼	鹽酸ニヒレナミン (アドレナリン)	Adrenaline (Evinephrine)	$\begin{array}{c} \text{HO} \\ \text{HO} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{C}_6\text{H}_3\text{-CH-CH}_2\text{-NH} \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{CH}_3 \end{array} \right.$	血管收縮	0.1~1.0cc 皮下注射 0.1~0.015% (外用)
Adrenalin suppositories				0.1%-Adrenalin 配合	止 血	痔出血 1日1~2回
Adron		アドロン		同 Sulfaminum		
Adsorbin	阿託索爾賓	アドソルビン		酸性白土	吸 着	止瀉 1次2~5g
Aether aceticus	醋酸醚	醋酸エテル	Acetic ether	CH ₃ CO-OC ₂ H ₅	興 奮	痙攣, 失神 5~10gtt
" Anaestheticus	麻醉用鹽	麻醉用ニエテル	Purified ether	C ₂ H ₅ O-C ₂ H ₅	麻 醉	50~200cc 吸入

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Aether Pro narcosi				同前		
Aethylis Chloricum	氯化乙酯	クロール ニチル	Ethyl chl- oride	C_2H_5Cl	局 麻	噴射
Aethylam amino benzoicum				同 Benzocaina		
,, bromatum	溴化乙酯	ブロムニチル	Ethyl bro- mide	C_2H_5-Br	鎮 靜	5滴嗅用
,, chloratum				同 Aethylis Chloridum		
Aethylmorphin- um hydrochloricum	鹽酸乙 基嗎啡	鹽酸エチル モヒルネ	Ethylmorph- inehydro- chloride	$C_{17}H_{17}N \cdot O(OH)-$ $(OC_2H_5), HCl + 2H_2O$	鎮痛, 鎮靜	0.01g皮注 1次0.01~0.03 内可
Aethynal	依替那兒	エチナール		Fur. 1-zer, 1-p-oxy-phenyl- l-urea	解 熱	結核熱, Typhus 1日2回
Afenil				同 Fenarin		
Agar	寒 天	寒 天	Agar	Gelose		粘滑劑 培養基
Agar-Agar	(凍瓊脂)			同前		
Agarieinum	阿加利欵	アガリテン	Agaric acid	CH_2-COOH $C(OH)-COOH$ $CH-(C_{16}H_{35})-COOH$	制 汗	内用 1次0.005~0.05
Agomensin "ciba,"				黃體月經促進 Hormon		内服-1日3回2~ 3錠, 注-1週 2~ 3次4c.c.度, 筋

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
○Aiol	愛伊洛爾			同 Bismutum oxyjoāo-gallicum		
○Aktisol album		白色アクテゾール		同 Sulfaminum		
○Aktiweiss		アクテワイス		(水溶性) Na.SO ₃ ·(CH ₂ NH)SO ₂ NH ₂	消 毒	同 Sulfamin
○Albasil	阿爾巴的爾	アルバジール		同 Uliron		
○Albroman	阿寧羅曼			$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \quad \text{Br} \\ \quad \\ \text{OC} \quad \text{NH} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH} \cdot \text{C}_2\text{H}_7 \end{array}$	催 眠	1次 0.4
○Albucid	阿爾卜西得			同 Neo-Poleon		
Albuminum tannicum	鞣酸蛋白			同 Tannalbinum		
Alcaloidum Opii hydrochloricum	阿片總鹼鹽 酸 鹽	阿片アルカロイド鹽酸鹽	Pantopon	嗎啡，可待因	鎮靜，鎮痛。	1次0.01—0.02g 皮注，內用
Alcohol	醇 (酒精)	アルコール (酒精)	Alcohol	C ₂ H ₅ OH	消 毒	酊，浸膏製造
○Alepsin	阿列普新	アレブシン		1錠中 Luminal 0.03 Nitroglycerin 0.0002	鎮 靜	痲痛 2—4錠
○Aleviatin		アレビアテン		同 Epanutin		
○Algopan				同 Alcaloid. Opii hydr-ochlor.		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Allobarbital	阿洛巴比特魯	アロバルピタル		$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CHCH}_2 \\ \\ \text{C} < \begin{array}{l} \text{CO-NH} \\ \text{CO} \end{array} \\ \\ \text{CH}_2\text{CHCH}_2 \\ \\ \text{CO-NH} \end{array}$	催眠	内：0.1g
Allonal (Allional)				1錠中 Pyramidon 0.1 Namal 0.06	鎮痛	1日3次1錠
Allopon		アロポン		類似 Alcaloid. Opii hydrochlor.		
Aloe	蘆薈	ロカイ	Aloes	Aloin	健胃、瀉下	健胃：0.01~0.03 瀉下：0.3~1.0
Alopon				同 Alcaloid. Opii hydrochlor.		
Alsilin	阿爾西林	アルシリン		鍍銀砒酸 40% 鍍銀末 10% cacao 50%	殺菌、吸著	1次0.5~7.0g
„ weiss „	白阿爾西林	アルシリン ワイス		鹽化銀膠狀砒酸 4.0 鍍銀糊狀炭末 1.0	殺菌、吸著	1次1.~2.0g
Alumen	明礬	明礬	Alam	$\text{KAl(SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	收斂	外：2~4%
Alumen ustam	燒明礬 (村礬)	燒明礬	Esiccated alumi	$\text{KAl(SO}_4)_2$	收斂	外：0.3%
Alurate	阿羅來梯			$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{-C-CO-NH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3\text{-CH} \quad \text{CONH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \end{array}$	催眠	0.06~0.18頓用
Alypin	阿里賓			$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-N(CH}_3)_2 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{CO-COC}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_2\text{-N(CH}_3)_2 \end{array} \cdot \text{HCl}$	局麻	内：2%.15~20滴 外：2~5%粘膜炎

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Amelsin	阿曼依新	アマイジン		蟻酸1.000倍液 加. 1%Novocain	鎮 痛	樓麻質斯 1~2 cc 局所注
Amidopyrina	匹拉米洞	アミノピリン (ピラミドン)	Amidopy- rine	<i>m</i> -i-methylamino- antipyrin	解熱鎮痛	1次0.1~0.2g
Aminocordinam		アミノコル デン		同 Coramina		
Aminoformin		アミノホル ミン		同 Benzocaina		
°Aminophyllin				同 Euphyllin		
Aminopyrinum	威基倍林	アミノピリン		同 Amidopyrina		
Amisulf		アミズルフ		同 A ktiweiss		
Amittase		アマターゼ		同 Faex medicinalis		
Ammonii Brom- atum	溴化銨	ブロームア ンモン	Ammonium bromide	NH ₄ Br	鎮 靜	1日3次0.3~1.0g
„ Carbonas	炭酸銨	炭酸アンモン	Ammonium carbonate	NH ₄ HCO ₃ +NH ₄ CO ₂ NH ₂	祛 痰	1次0.3~1.0g
„ Chloridum	氯化銨	鹽化アンモン (鹵砂)	Ammonium chloride	NH ₄ Cl	„	1日數次0.3~1.0g
Ammonium Bromatum				同 Ammonii Bromatum		
„ Carbonicum				同 „ Carbonas		
„ Chloratum				同 Ammonii Chloridum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Ammonium Sulfoichthyolicum	魚石脂	イヒテオール スルホン 酸アンモン		同 Ichthammol		
Amylis Nitris	亞硝酸 五	亞硝酸 アミル	Amyl nitrite	$C_5H_{11}-ONO$	血壓降下	狭心，瘧疾 1次1~4滴吸入
Amylium nitrosam				同前		
o.Amylocain				同 Stovain		
Amylum	澱粉	澱粉	Starch			撒布劑 散劑緩釋劑
o.Anabion	阿那比恩	アナビオン		$NH_2-\text{C}-SO_2-NH-\text{C}-SO_2$ CH_3-NH	消 毒	同 Sulfamin
o.Anaesthesin	阿內斯太金	アネステジン		同 Benzocaina		
o.Analgin	阿那金	アナルギン		樟腦，冬綠油，薄荷油	鎮 痛	神經痛，癱瘓質 斯塗擦
o.Anaptol		アナプトール		同 Stypticin		
o.Androstin	安得洛斯欵			睪丸 Hormon	男性器發育	糖衣錠：1日3~8 錠 注：A,B交互 皮，筋注
o.Anesthone				同 Benzocaina		
o.Animasa	阿尼曼薩			動脈內膜抽出物	血壓降下	1日1~2錠3回食間 1~2月連用
o.Animosan		アニモサン		同 Normosan		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Antacidin	安他齊丁	アンタチデン		磷酸銨鎂	制 酸	1日1.5~6.0
Antereum	安敵羅伊	アンテロイム		Pyramidon; Chinin-Urea	神經痛劑	1cc局所注
Anticaiolin	安替卡羅林	アンテカロ リン		O-Brom-salicylic-cal- cium	消炎, 解熱	毎日, 隔日25cc 靜注
Antidotum Ar- senici	亞砒酸劑 解毒劑	亞砒酸劑 解毒劑	Arsenic A- ntidote	Fe ₂ (SO ₄) ₃ , MgO	吸 著	毎30分1食匙
Antifebrinum				同 Acetanilidum		
Anti-fluorin	安替沸林	アンテフル オリン		Bacillus Vaginalis	障 防 菌	粉末1~2g, 膠種入 錠 1~2錠
Antimoni et Potassii Tartaras	酒石酸鉍 錫	吐酒石	Tartar eme- tic	C ₂ H ₂ -(OH) ₂ -(COOK)- (COOSbO)-½H ₂ O	催吐, 皮 膚, 刺戟	1次0.02~0.05 20%軟膏
Anti-phlogisti- ne				Kaolin, 冬綠油, 鞣酸, 薄荷, 甘油, 等	消 炎	患部貼用
Antipyrino-coff- einum citricum	枸橼酸咖啡 因安替匹林	クエン酸カフ エインアンテ ピリン		同 Migræninum		
Antipyrinum	安替匹林	アンテピリン		同 Phenazonum		
" salicylicum	柳 酸 安替匹林	サリテル酸 アンテピリン	Antipyrine salicylate	(C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O) · C ₆ H ₄ < $\frac{OH}{COOH}$	解熱鎮痛	1日3次0.5~1.0g
Antitoxinum Diphthericum	白喉抗毒素	デフテリア 血 清	Antidiphthe- ric serum		抗白喉症	筋注
" Tetanicum	破傷風血清	破傷風血清	Antitetani- c serum		抗破傷風	筋注

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Antitoxinum Welchicum	瓦斯壞疽 抗毒素	ガス壞疽血清	Gas-gangrene antitoxin		抗瓦斯壞疽	“
Antitussin	安基知細	アンチツツ シン		同 Paracodin		
Antuitrin G	安知伊托林			腦下垂體 成長 Hormon	成長促進	侏儒 0.5~2.0cc 皮、筋注
“ S	安知伊托林			腦下垂體前葉 Hormon	男女性器 發育	1回 0.1~5.0cc 皮注
A.O.	阿 歐	ア-オー		結核Vaccin		治療; 1~4號每10日1管 預防2~3號 每月1回皮注
Aperitol	阿培利托兒			Acethylphenolphthlei- n, 外	緩下	1次 0.2~0.5g
Apetin	阿俾欵	アペチン		胆汁, 胆那總 alkaloid	消 化	1次 1.0~1.5g 食前
Apicosan	阿比古散			蜂毒	鎮 痛	關節炎, 神經痛, 最初1號皮注漸增
Apiecar	阿比苦兒			同前		
Apiretin	阿比列欵			同 Phenazonum		
Apomorphinae Hydrochlori- dam	鹽酸阿朴 嗎 啡	鹽酸アポモ ルビネ	Apomorphine hydrochl- oride	$C_{17}H_{17}NO_2 \cdot HCl + \frac{1}{2}H_2O$	催 吐	0.005~0.01皮注
Apomorphinum Hydrochloricum				同前		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Pyrexin	阿比列克辛	アピレキシン		同 Eibon		
Pyron	阿比龍			$C_6H_4 \begin{matrix} \diagup O-COCH_3 \\ \diagdown COO-Li \end{matrix}$	解熱，鎮痛	1次0.2~0.5g
Aqua Ammoniae	氨 水	アンモニア水		同 Liquor Ammoniae Dilutus		
„ Armeni- acae	杏仁水	杏 仁 水	Apricot water	H ₂ CN	鎮 咳	1次0.5~1.5g
„ Calcariae	石灰水	石 灰 水		同 Liquor Calcii Hydroxidi		
„ Camphorae	樟腦水	カンフル水	Camphor water	0.1%Camphor	矯 臭	
„ Cinnamomi	桂皮水	桂 皮 水	Cinnamon water	桂皮油	矯 味	1次1.0~1.5g
„ Cresolica	煤溜油水	クレゾール水	Cresol water	Cresol	消 毒	手術時器具，
„ Destillata	蒸餾水	蒸 餾 水	Distilled water	H ₂ O		製劑用，
„ Floris Aurantii	橙花水	橙 花 水	Orangeflower water	橙花油	矯 臭	
„ Foeniculi	茴香水	茴 香 水	Fennel water	茴香油	矯 臭	
„ Menthae	薄荷水	薄 荷 水	Peppermint water	薄荷油	矯 味	
„ Phenolata	石炭酸水	石炭酸水(フェニール水)	Phenol water	石炭酸	消 毒	創傷，器具
„ Sterilisata	滅菌水	滅 菌 水	Sterilised water	H ₂ O		注射劑溶解用

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
◦Arabon	阿拉邦	アラボン		同 Carbromalum		
Araroba depurata				同. Chr y sarobinum		
Argenti Nitras	硝酸銀	硝酸銀	Silver nitrate	AgNO ₃	收斂腐蝕	點眼-0.5~2.0% 洗滌-2~10%
Argentum Colloidale	膠狀銀	コロイド銀	Colloidal silver	Ag	防腐, 殺菌	3-5cc靜注, 5-10%軟膏,
„ Nrticum			同Argenti Nitras			
„ Proteinicum	蛋白銀	プロテイン銀	Protein sirver	蛋白, 銀	殺 菌	眼-0.25% 尿道-0.25~0.5%
◦Arklemine	阿克列明	アークレミン		動脈之中膜・內膜 Autohormon	血壓降下	1日2cc皮下注
◦Arsaminol				$O=As \begin{matrix} \swarrow OH \\ \searrow OH \end{matrix} \begin{matrix} C_2H_5 \\ C_2H_5 \end{matrix} > N-CH \begin{matrix} \\ CH_2 \\ \\ OH \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ -NHCO-CH_3 \end{matrix}$	驅 微	他藥靈劑不適者皮, 筋注
◦ „ (Sankyo)	阿爾薩米諾兒	アルサミノール		同 Arsenobenzolum		
◦Arsemin	阿賽民	ア-セミン		„		
◦Arsen-blutose	阿爾鎮李爾托賊	アルゼンブルト-ゼ		As 0.003% Fe 0.3%	造 血	貧血, 白血病 1日10~20cc
◦Arseni Trioxidum	亞砷酸	亞 砷 酸	Arsenious acid	As ₂ O ₃	變質, 腐蝕	1次0.001丸劑, 4%-Faste

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Arsenobenzol-Natrium		アルゼノベンゾールナトリウム	Salvarsan sodium	$C_{12}H_{10}N_2O_2As_2Na_2$	驅 黴， 回 歸 熱	1~2星期間隔 靜注
Arsenobenzolum	阿斯凡明 (撒佛散)	アルゼノベンゾール	Arsenebenzon	$C_{12}H_{12}N_2O_2As_2 \cdot 2HCl \cdot 2H_2O$	，，	，，
Arsenobillon	阿塞諾必龍			同前		
Arsen-Polytamin	阿爾鎮泡利他命	アルゼンポリタミン		As0.01%含有Polytamin	造 血	1次10cc
Arsol	阿索兒			同 Arsenobenzolum		
Arsoval	阿爾索芭兒	アルソバール		Nat.-Methylarsinate Nat.-Glyceri.-Phosph.	強 壯	1星期2~3次 1次2cc皮，靜注
Arsozon	阿爾索遜	アルソゾン		$O=As \begin{cases} CH_3 \\ ONa \\ ONa \end{cases}$	造 血	5%2cc，隔日 10~12次 皮，靜注
Arsphenamina	阿斯凡納明			同 Arsemobenzolum		
Asafoetida	阿 魏	ア ギ	Asafetida	Ferula酸	鎮 靜	神經強壯劑 速擊 1日數次 0.2~1.g
Ascoltin	阿 斯 克 欽	アスコルチン		l-Ascorbinic natrium	抗壞血病	1日1~2回1~2cc 皮，筋靜
Askaridol	阿斯卡利得			Ol.Chenopodii之成分	回蟲，十二 指腸蟲驅除	膠球3個 液30~04cc

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Askorbin saures Eisen	阿斯可爾 賓 酸 鐵			Vit. C > 配合 Fe	造 血	1日2回500內用 1日100緩徐靜注
Asmon	阿斯蒙	アスモン		Ephedrin Hyoscyamin	氣管擴張	末1日2~4g 液2~8cc, 100皮注
Aspidium	綿馬(貫衆)			同 Filix Mas		
Aspipheain	阿斯比費寧			1錠中 Aspirin 0.3 Phenacetin 0.2	解熱, 鎮痛	1日1~3次1錠
Aspirinum	醋 柳 酸	アスピリン		同 AcidumAcetylsalicylicum		
Asthmolysin	阿 斯 托 胃 利 金			臍下腺體後葉Hormon 副腎髓質Hormon	脉搏減少 氣管擴張	喘息, 呼吸困難 1次100皮注
Ataxin	阿他克辛	アタキシン		Papaverin 次碳酸鈣 碳酸鈣	鎮 痛	胃酸過多, 胃液過多 1回1~2錠
Atebrin	(阿的平)	アテブリン		(C ₂₃ H ₃ ON ₃ Cl)-2HCl	Maralishizont 有効	1日3次1錠 (0.1g) 5日連用
Athinon	阿 齊 濃	アチノン		同 Sulfatiazolum		
Atmuratin	阿托母拉丁	アトムラテン		同 Lobelinum hydrochloricum		
Atomor	阿托冒兒	アトモール		Morphin-HCl 0.01 Atropin-H ₂ SO ₄ 0.003	鎮痛, 鎮痙	0.5~1.0cc皮注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Atoinin	阿托寧	アトニン		牛之腦下垂體後葉中葉成分	平滑筋收縮	子宮出血，微弱障 礙 0.2~0.5cc 皮 1cc
Atophan	(辛可芬)			同 Cinchopenum		
Atophan, l	阿托法尼兒			Atophan-Na. Na-Salicylic	解熱鎮痛 尿酸排泄	痲瘋質斯，痛風 1日1次4日連用 靜筋注
Atropinae Sulphas	硫酸阿托品	硫酸アトロピン	Atropine sulphate	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH-CH} \quad \text{CH}_2\text{OH} \\ \quad \quad \\ \text{N-CH}_3 \quad \text{CH-OCO-CH} \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{-CH-CH}_3 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	散腫，鎮痙	眼—0.5~1.0% 皮注— 0.5~1.0c.c.
Atropinum sulfuricum				同前		
Avertin	阿佛丁	アヴェルテン		$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} > \text{C} < \text{OH} \\ \\ \text{OBr}_3 \end{array}$	鎮 靜	月經痛 注腸—0.08~ 0.1g/kg
Azodermin	阿走得爾明			C ₁₆ H ₁₇ ON ₃	肉芽發生	4~8%軟膏
Azoule	阿子兒			同 Stiben, l		
Bagnazin	巴古那金	バグナジン		同 Bagnon		
Bagnon	巴古濃	バグノン		規那，Coffein Uretan	解 熱 原形質毒	筋注
„ stark	強巴古濃	強バグノン		規那，25% Antipyrin 25%	„	肺炎，流感，1日2~ 3cc副作用注意

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Balsamum Copaivae	古巴香	コバイババ ルサム		同 Copaiba		
" Peruvianum	秘魯香	ペルーバル サム	Balsam of Peru	Zinnamein	分泌制止 防 腐	1日0.1~0.2内服 疥癬5~10%軟膏
" Tolutanum	妥路香	トルーバル サム	Balsam of Tolu	Toluresinotannol	祛 癢 臭	内用 0.2~1.0 矯臭一塗布
Barbitalum		バルビタール		同 Barbitonum		
" soluble		溶性バルビ タール		同 " Solubile		
Barbitonum	巴比特魯	バルビタール	Barbitone	$\begin{matrix} C_2H_5 > C < CO-NH \\ C_2H_5 > C < CO-NH \end{matrix} > CO$	催 眠	1次0.2~0.5g
" soluble	溶性巴比 特 魯	溶性バルビ タール	Soluble barbiton	$\begin{matrix} C_2H_5 > C < CO-NH \\ C_2H_5 > C < OC-N-Na \end{matrix} > CO$	"	1次0.2~0.3g
Banccain	邦 卡 因	バンカイン		同 Procainae Hydrochl- oridum		
" , Solution		バンカイン 注 射 液		同 Novolamin		
Bauchrom	邦克羅木	バンクローム		同 Mercurochrome		
Barii Sulphas	硫酸 鋇	硫酸バリウム	Barium sulphas	BaSO ₄	造 影 劑	150g加澱粉・單含
Barium sulfuricum				同前		
Belladonal	貝拉得那兒			Bellafolin 0.25mg Luminal 50.0mg	鎮 靜 , 鎮 痙	1次1.2錠
Belladonnae Folium	莨 菪 葉	ベラドンナ葉	Belladonna Leaf	Atropine H / osc yamus	鎮 痛 , 鎮 痙	1次0.03~2.0g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Bellafolin	貝拉賀林			Belladonna 總 Alkaloid	"	1次0.5-2.0cc皮注 1日10~20滴內用
Bellergal	貝列爾葛兒			Bellaforin Gynergen Luminal	鎮 靜	神經炎, Basedo, 盜汗
Benzaldehydum	笨 醛	ベンツアル デヒド	Benzaldehyde	C_6H_5-CHO	矯 臭	
Benzedrine	笨齊巨林			$C_6H_5-CH_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-NH_2$	Ephedrin- 類似, 疲勞 恢復感	鬱血症, 疲勞 每朝食前 10~20mg
Benzium Petrolei	石油笨膏	石油ベンテン	Purified Pet- roleum Benz- ine	Pentan Hexan	驅 蟲	蟻蟲, 皮膚寄生 蟲塗擦, 有機溶劑
Benzocaina	對萘基安息 香酸乙酯	アミノ安息 酸エチル	Aethyl amin- o-benzoate	$H_2N-C_6H_4-COOC_2H_5$	鎮靜, 鎮痛	1次0.3~0.5內服
Benzolum	笨	ベンゾール	Benzene	C_6H_6	血球破壞	血球病1日3次 10~30滴製藥原料
Benzolum benzoicum	安息香酸 笨甲酸	安息香酸 ベンチール		$C_6H_5-CO-O-H_2C-C_6H_5$	Papav- erin類似	腸痛, 喘息, 吃 逆 1次20~30滴
Beprochin	貝布洛信			同 Plasmochin		
Berberol	貝利貝洛兒	ベリベロール		Vit. B 複合體	抗脚氣 抗Pellagra	注-1~5cc皮筋注 末-1日3g 液-1日9cc
Betansaphthol	乙腓因醇	ベタナフト ール	Naphthol	$C_{11}H_7-OH$	防 腐	內-1日 數次0.2~0.5 皮-1~10% Alcohol

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Betarin	貝他克辛			同 Vitamin B		
Bigin	必苦辛	ビクシン		Catalpa ovata 之有效成分	利尿	1日8~12g水劑
Bilivaccin T, phus	傷寒內服 疫苗			Typhus 內服vaccin錠+ 胆汁錠	Typhus 預防	空腹時胆汁錠服用 15分後vaccin錠
Biocalc	必歐卡爾克	ビオカルク		Cal. phosph. Cal. carb. 膠狀	強 壯	1日3次0.25~1.0g
Biocaltin "Comet"	必歐卡爾丁	ビオカルテン 「コメット」		乳酸菌、糖化菌 配合 Calcium劑	異常醱酵 防止	1日3次0.5~1.0g
Biofermin	表飛鳴	ビオフィエル ミン		Bacillus bulgaricus製劑	,,	1日1.0~3.0g
Bioflavin	必歐弗拉餅	ビオフィラビン		Vit. B ₂	發育促進	營養障礙 1日2~ 4cc皮・筋・靜注
Bioganine	必歐賊寧	ビオゼニン		Bulgaria菌 Acidophilus菌 納豆菌	異常醱酵 防止	1次0.3~0.9g
Biolaxin	必歐拉克辛	ビオラキシン		Aceth l-isovaleryl-phen- olphthalein 乳酸菌、糖化菌	腸內防腐 緩下	1日0.3~0.8g
Biotomosan	必歐托冒散	ビオトモサン		消化菌、乳酸菌 活性硅酸素	異常醱酵 防止	1次0.5~1.5g
Bisatinum	必薩欽	ビスアテン		同 Isacen		
Biamon	必斯蒙			膠狀Bi劑	收斂、止瀉	1日1.5~5.0g

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Bismutum oxyiodogallicum	次没食子酸 碘錫	次没食子酸 ヨード若鉛	Bismuth oxyiodogallate	$(1-BiO_3 : (C_6H_2-COO)H_2 + H_2O)$	防腐, 收斂	火傷・創傷・下疳 10%軟膏
"subcarbonicum	次碳酸錫	次碳酸若鉛	Bismuth subcarbonate	$(BiO)_2CO_3$	收斂, 制酸	胃痛, 嘔吐 1.5~3.0g
"subgallicum				同 Dermatollum		
"subnitricum	次硝酸錫	次硝酸若鉛	Bismuth subnitrate	$BiO-OH + Bi(NO_3)(OH)_2$	制 瀉	1日3次1.5~3.0g
"subsalicylicum	次柳酸錫	次サリチル酸若鉛	Bismuth subsalicylate	$C_6H_4 \begin{matrix} OH \\ COOBiO \end{matrix}$	"	"
"tribromphenylicum				同 Xeroform		
Bistolán	錠斯托蘭	ビストラン		同 Trepol		
Blutose	不爾托賦	ブルトーゼ		Proteose; 有機性絨化合物	造 血	1日10~20cc
Bolus alba	白陶土	白陶土		同 Kaolinum		
Bonpyrin	奔匹林	ボンピリン		同 Novalgin		
Bonsol	奔佐兒	ボンゾール		同 Lysol		
Borax	硼 砂	硼 砂	Borax	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	制 酸 防 腐	尿酸中和1次0.5~ 2.0 含嗽1~5%
Borocain	抱洛卡因			Novocain-borat.	粘膜炎瘳	鼻、尿道、眼 塗布
Borovertin	三硼酸烏 羅 堯 品	ボロベルテン		Triboric-urotropin	尿路防腐	1日1~2g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Boraginol	抱拉給諾兒	ボラギノール		Asperifoliaceae 屬植物之抽出脂肪	痔疾癩	朝、夕、就床時 肛門挿入
Bosmin	報斯明	ボスミン		同 Adrenalina		
Brocal	孛洛卡兒	ブロカール		Ca.Br ₂	鎮 靜	5~20cc皮筋, 靜注
Brocalnose	孛洛卡爾 諾賊	ブロカール ノゼ		Ca.Br ₂ 2% 葡萄糖 10%	鎮靜, 消炎	10~20cc 靜注
Brocanon	孛隆卡濃	ブロカノン		"	"	隔日, 毎日 20cc 靜注
Brocarose	孛洛卡羅賊	ブロカロゼ		"	"	"
Brocin	(野櫻皮素)	ブロチン		櫻皮有効成分	鎮 咳	末—1日3~6g 液—1日10~20g
Brocoese ,,Sankyo"	孛洛可斯	ブロコース 「共」		同 Brocanon		
Bromag	孛洛馬亮	ブロマダ		5% MgBr ₂ 高張糖液	鎮 吐	10~20cc 靜注
Bromdiaeth, 1- aeth luraa				同 Carbromalum		
Brom-Grelan	孛洛母格 列實	ブロームク レラン		Grelan, Ca.Br ₂ , Cal.-gluconate, Glucose,	消炎, 鎮吐	1日1~2回 20cc 靜注
Brom-Iveton	孛洛母伊 北屯	ブロームイ ベトン		Iveton 10% Ca.Br ₂ 2%	鎮靜, 消炎	20cc 靜注
Bromural	白洛母拉爾			同 Bromvalerylurea		
Bromvalerylurea	溴吉草酸 尿素	ブロムワレ リル 尿素	Bromiso- valer, lurea	(CH ₃) ₂ :CH-CHBr-CO NH ₂ -CO-NH	催 眠	1次0.5~0.8

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Brotacin	李洛他丁	プロタチン		同 Avertin		
Brovarin	李羅芭林	ブロザアリン		同 Bromvalerylurea		
Bufotalis	蟾 酥 素	ブホタリス		ϕ -Bufotalin-bromid (蟾酥成分)	Digitalis 類似	内—1次3—5錠 注—2—4cc筋.靜
Bulbus Scillae				同 Scilla		
Butamin	李他明			同 Tntocain		
Butesin	李特金			P-amino-ben- zole-butyl	鎮痛, 粘麻	内—0.002g
Butocain	李托卡因	ブトカイン		同 Nupercaïn		
Butolan	李托蘭			$C_6H_5-CH_2-C_6H_4-O-CO-NH_2$	蟻蟲驅除	1日1.5g分3・5—7 日連用 最終日下劑投與
Butyn	李 丁			NH_2 C_6H_4 $COO(CH_2)_7-N(C_4H_9)_2$	麻 醉	耳鼻用
Cabromin	卡李羅明	カブロミン		CaCl ₂ 2% NaBr 5%	消炎・鎮靜	癢痒, 内出血 10—20cc標注
Cadechol	卡的可兒			Camphor-Des- oxycholic acid	催癢, 強心	傳染病時強心 1日數次 1 錠
Caffeina	咖 啡 因	カフニイン	Caffeine	CH_3-N-CO CO C-N < $\begin{matrix} CH_3 \\ CH \end{matrix}$ CH_3N-C-N	興奮, 強心 利 尿	1次0.1—0.5

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Caffeina et sodii Benzoas	安息香酸鈣 咖啡因	安息香酸ソーダ カフェイン (ナンテカ)	Caffeine and Sodium benzoate	咖啡 安息香酸鈣	”	1次0.3~0.5内用 1~5cc皮，筋注
” ” ” ” Salicylas	柳酸鈣 咖啡因	サリチル酸ソーダ カフェイン (サリソ カフェイン)	” ” ” sali- cylate	咖啡因 柳酸鈣	強心，利尿 ，鎮痛	1次0.3~1.0内用 20% 1~2cc皮注
Calcaria chlorata				同 Calx Chlorinata		
” sulfurata				同 Calx Sulphurata		
” usta				同 Calx		
。Glucicol	(葡萄糖 酸鈣)	カルチコール		Gluconic Calcium 3.5%	消炎，強壯	5~10cc皮。靜。筋。 注，内服 1日1.5~2.0g
Calii Carbonas Praecipitatus	沈降炭酸鈣	沈降炭酸石灰	Precipitated calcium carbonate	CaCO ₃	制 酸	1日數次 0.5~2.0g
” Chloridum	氯化鈣	鹽 化 カルシウム	Calcium chloride	CaCl ₂	消炎，止血	1~3% 靜注 1日1.0~2.0水劑
” Lactas	乳酸鈣	乳酸石灰	Calcium lactate	(CH ₃ -CHOH-COO) ₂ Ca	強 壯	1次0.3~1.0g
” Phosphas	磷酸鈣	磷酸石灰	Calcium phosphate	CaHPO ₄ ·2H ₂ O	制酸，消炎	結核，腺病 1日數次1.0~5.0g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Calciphon	卡爾齊汎	カルチファン		$\begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COO} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_6\text{H}_5\text{N}-\text{COO} \end{array} \text{Ca}$	尿酸排泄 消炎解熱	食後0.5—1.0g
Calcirin "Takeda"	卡爾西林	カルシリン 「タケダ」		$\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ (\text{NO}_2\text{H})_4 \\ \\ \text{COO} \end{array} \text{Ca}$	還元性解毒	蕁麻疹， 防止 Sulfanin 之 副作用 皮，靜注
Calcium carbonicum praecipitatum				同 Calcii Carbonas Praecipitatus		
" chloratum				同 Calcii Chloridum		
" diureticum	利尿素鈣	ヂウレチン カルシウム		同 Calcium		
" gluconicum	葡萄糖酸鈣	グルコン 酸 石 灰		同 Calcicol		
" glycerino- phosphoricum	甘油磷酸鈣	グリセロ 酸 石 灰	Calcium glycerop- hosphate	$\begin{array}{c} \text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CaPO}_4 \end{array}$	神經營養	1次0.2—0.5g
" hypo- phosphorum	次亞磷酸鈣	次亞磷酸石灰	Calcium hypophosph- hite	Ca (H ₂ PO ₂) ₂	營 養	1日3次0.2~0.5g 0.1g—皮注
" lacticum				同 Calcii Lactas		
" Phosphoricum praecipitatum		沈降磷酸石灰		同 Calcii Phosphas		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Calcium "Sandoz,"				Glucolactbionic calcium	消炎，強壯	毎2-3日5-10cc 靜注・末1日2-3g
Calomelas				同 Hydrargyri Subchlori- dum		
Calmotin	卡爾冒丁	カルモチン		同 Bromvalerylurea		
Calumba	非洲防己根	コロンボ根	Calumba root	Columbamin	健 胃	1日3次0.5-2.0g
Calx	煅製石灰	生石灰	Lime	CaO	消 毒	石灰乳
,, Chlorinata	晒 粉	晒 粉 (クロル石灰)	Chlorinated lime	CaCl (ClO)	消 毒	洗滌，1-5% 消毒0.2-0.5%
,, Sulphurata	硫化鈣	硫化石灰	Sulphurated lime	CaS	負質溶解	疥癬5-10%軟膏 ・浴劑
Calys-nin	卡利葉寧	カリヤニン		同 Calcicoid		
Camafeton	卡馬啡屯	カマフニトン		同 Caronasin		
Camphenal	康非那爾	カンフニナ ール		β -Oxocamphor	強 心	靜注
Camphoechol	康活可兒			Dioxycholenic campor	"	Digitalis 禁忌時 1日0.3-0.5g内用
Camphora	樟 腦	カンフル	Camphor	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ \qquad \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CO} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	強 心	1日3次 0.05-0.6内用 10-20%皮注
Camphora dep- urata	精製樟腦	精製カンフル		同前		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Camphora monobromata	溴樟腦	ブロムカンフル	Monobromated Camphor	-CH-Br -CO	鎮靜，鎮痙	1日31.3 內用 油溶液注射
Campolon	康泡倫			肝效製劑	造 血	12支筋注
Camporisin	康泡利金	カンポリヂン	Camphor 柳酸鹽		神經痛劑	局部ice注，
Canfan	康 坦			l-Ascorbin酸	抗壞血病	1~2cc皮，靜注 1日3次1餐內服
Cantharidinum	斑 蝥	カンタリス	Cantharides	Kanthalidin	皮膚刺激	敷布塗布
Cantharis				同前		
Caprokol	卡布羅可兒			H ₂ C=O H ₂ C=C(OH)-(CH ₂) ₄ -CH ₃	鱈魚十二脂 鱈魚肝油	0.5g頓用 1日1回 0.5g3日連用
Capsicum	蕃 椒	蕃 椒	Ca,enne pepper	Capsaicin	刺激	煎原料
Capsolin	卡布索林			樟腦，蕃椒， Ol. Terebin	神經痛劑	塗劑
Capsulae Gelatinosae	膠 囊	カプセル	Gelatine capsules			藥劑充實用
Carbarsone	卡佛遜			$\begin{array}{c} / \text{OH} \\ \text{As}=\text{O} \\ \backslash \text{OH} \\ \text{NH-CO-NH}_2 \end{array}$	對阿米巴 菌殺菌	0.25g 1日1~2次 10日連用
Carbo Medicinalis	藥用炭	藥用炭	Medicinal charcoal	C	吸 著	1次0.3~1.0g

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Carbonei Tetrachloridum	四氯化炭	四氯化炭素	Carbon tetrachloride	CCl ₄	驅 蟲	1次1~2.g(膠液)
Carbromalum	溴鑾二脞醋 酸基尿素	ブロムデニ チルアセテ ル尿素	Carbromal	$C(C_2H_5)_2Br-CO$ NH-CO-NH	催 眠	1次0.5—1.0g
Cardamomum	小豆蔻	小豆蔻	Cardamoms	揮發油	健 胃	苦丁原科 1日0.3~1.0g煎劑
Cardex	卡爾得克斯	カルデツクス		同 Hacethrol		
Cardiazol	卡池阿走	カルデアゾ ール		$CH_2-CH_2-CH_2$ CH_2-CH_2-C / \ N-N N-N	樟腦， Digitalis 兩様作用	1.0%1~2cc皮， 靜注
Cardion	卡爾基濃	カルジノン		心筋 autohormon	强 心	1日數次1~2cc 皮，筋，靜 内服1日20滴
Caronasin	卡羅那金	カロナジン		生理食鹽水中 0.5% Camphor	”	1~10cc皮注
Carvophyllum	丁 香	丁 子	Glove	Eugenol	健胃，矯臭	1日數次0.3~1.5
Casbis	卡斯必斯			Bi(OH) ₃ -BiO(OH) 油性懸濁液	驅 菌	0.5cc適2~3次筋 注 1cc 12—15cc
Cascara Sagrada	波希鼠李皮	カスカラ サグラダ	Cascara Sa- grada	Cascarin	緩 下	1日數次 3~10cc(浸)
Cascarin	卡斯卡林			”	”	1次0.25g
Caseinol	卡賈伊諾兒	カゼイノール		同 Caseosan		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Caseosan	卡賊廠散			4.5%-Casein solution	刺激療法劑	丹毒，胃潰瘍 1週2次皮，筋注，
Cataflavin	卡他弗拉餅	カタフラビン		同 Bioflavin		
Catechu	兒 茶	尙 仙 藥	Gambit	Gallicin	收 斂	1日數次0.3~1.0
Cathalax	卡他拉克斯	カタラツクス		同 Isacen		
Cebion	塞必恩			1-Ascorbin酸		注-1~2cc 内-1日3次1錠
Cera Alba	白 蠟	晒 密 蠟	White beeswax	Myricin		軟膏基礎
„ Flava	黄 蠟	密 蠟	Yellow beeswax	„		„
Cerium Oxalicum	草 酸 鈣	蓚 酸 セリウム	Oxalate cerium	$Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$	鎮吐，鎮靜	1次0.1g
China-Bultose	規 那 李 爾 托 賊	キナブルト ーゼ		規那劑 鐵蛋白酸鹽	造 血	1日10~20cc
„ -Polytamin	規 那 袍 利 他 命	キナポリタ ミン		規那 Polytamin	„	1日30cc
Chineron	奎 錠 倫	ヒネロン		Aethyl- apochinin	肺炎治療	1日5~6次，cc皮注 1日1.5g分5~6
Chinidin	奎 尼 金			同 Quinidine		
Chininum aethylcarbonicum		ニethyl炭酸 キニーネ		同 Quininae et Aethylis Carbonas		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Quinimum bithydrochloricum	重鹽酸奎寧	重鹽酸キ ーネ		$(C_{20}H_{24}O_2N_2) \cdot 2HCl$	解熱	肺炎，産婦25% 1cc靜注（緩徐）
„ ferro- citricum				同 Ferri et Quininas Citras		
„ hydro- chloricum				同 Quininae Hydrochlori- dum		
sulfuricum				同 Quininae Sulphas		
„ tannicum				同 Quininae Tannas		
Chinofolin	奎諾後寧	キノフオニン		同 Yatren		
Chlonacal	苦羅那卡兒	クロナカール		$CaCl_2, NaCl$	消炎，止血	5~10cc靜注
Chloralis Hydr- as	水化氯奎	抱水クロラ ール	Chloral Hy- drate	$CCl_3 \cdot CH(OH)_2$	催眠，鎮靜	1次0.5~2.0g
Chloralum hydr- atum				同前		
Chloramina	氯胺 (氯亞明)	クロラミン	Chloramine	$H_3C \cdot \bigcirc \cdot NO$ $\begin{matrix} NCl \\ ONa \end{matrix}$	消毒，殺菌	限—1—2% 洗滌—0.1—0.2%
Chlorazene	克羅拉鎮			同前		
Chlorbutanol	克羅爾亭 他諾兒			同 Chlreton		
Chloroformum pro narcosi	麻醉用氯仿	麻 醉 用 ク ロ ロ ホ ル ム	Chloroform for Anaesthesia	$CHCl_3$	麻 醉	吸入 0.05~5.0

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Chlorethyle	(氯化乙醯)			C_2H_5Cl	寒冷麻醉	局所傾注
Chloreton	青羅列屯			$\begin{matrix} CH_3 \\ \\ CH_2 \\ \\ C < \begin{matrix} OH \\ \\ CCl_3 \end{matrix} \end{matrix}$	催眠	1次0.5~1.0g
Chlotemin	青羅托明	クロトミン		同前		
Cholelith	可列利托			涌酸毒，撒曹，哥太，薄荷油	排 胆	胆石 1日2次2~4粒
Choleretin	可列列丁	コレレテン		同 Decholan		
Chromii Trioxidum	無水鉻酸	無水クロム酸	Chromic acid	CrO_3	腐 蝕	10~20%塗布
Chrysarobinum	苧極素	クリサロビン	Chrysarobin	Anthrachinon Antranol誘導體	還元性皮膚劑	疥癬 10~20%軟膏
Chylin	細 林	ヒリン		Lypoid蛋白質	刺戟療法劑	0.5~2.0cc 皮， 筋注
Cibalgin	齊芭爾金			Dial 0.03 Pyramidon 0.22	鎮痛，催眠	筋，靜注 1次1錠內用
Cibazol	齊芭佐兒			同 Sulfathiazolum		
Cinchona	辛可那 (金鷄納皮)	キナ皮	Cinchona	Chinin Chinidin 等	健 胃	煎劑 1日1~5g
Cinchophenum	辛可芬	キノフェン	Cinchophen	$C_6H_5-C_9H_5N-COOH$	神經痛劑	1日3次1.5~3.0g
Cinnamomum	桂 皮	桂 皮	Cassia bark	Cimtaldehyde	健胃，矯臭	1日0.5~2.0g
Cinnapyrinum	辛那匹林	シンナピリン		同 Elbon		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Citoral	齊托拉兒	チトラール		Nat.-citrate 10%	止血(輸血)	咯血, 吐血 10cc靜注
Clauden	克拉烏田			肺臟抽出劑	止 血	皮注5.0~10cc 靜注10.~15. cc
Cocainae Hydrochloridum	鹽酸可卡因	鹽酸コカイン	Cocaine hydrochlori- de	$C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$	局麻 鎮痛	(內) 1次0.01~ 0.03(注)1~5%皮 注, (限)0.5~2%
Cocainum hydrochloricum				同前		
Codeinae Phosp- has	磷酸可待因	磷酸コデイン	Codeine phosphate	$C_{17}H_{17}NO(HO)(OCH_3) \cdot H_3PO_4 + 2H_2O$	鎮咳, 鎮痛	1日3次0.3~0.1g
Codeinum phos- phoricum				同前		
Codeonal	古的歐那兒			Veronalcodein Veronal-natrium	鎮咳, 催眠	1~2錠頓用
Coffeinum	咖啡 因	カフェイン		同 Caffeina		
„ -Natrium benzoicum				同 Caffeina et Sodii Be- nzoas		
„ salicylicum				同 „ „ „ Sal- icylas		
Coffeminal compositum				Coffein Luminal	鎮 吐	船中予防 出發前 3錠
Cognac	蒸溜酒	コニアク	Brandy	C_2H_5OH	興 奮	1次15~30cc
Collodium	火棉膠	コロデオソ	Collodion	Nitrozellulose	被蓋創傷	患部塗布

藥 物 名	中 文 名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Colophonium	古羅佛牛母	コロホニウム	Colophony	Abietinic acid		硬膏原料
Combarimon	困芭利蒙	コンバリモン		黃體水溶性 Hormon 腦下垂體前葉,, 副腎皮質,,	月經促進	末—1次0.5~1.0g 注—1次2cc腎筋
Comenin	古 隆 寧	コメニン		同 Compral		
Comet-Pank		コメツトパンク		同 Pancreatinum		
Comphormon	困泡爾蒙	コンボルモン		睾丸, 攝護腺製劑	男子性器發育	1次2cc皮注 1日3次0.5~1.0g
"	"	"		濾胞, 各內分泌器製劑	女性器發育	"
Compral	困布拉兒			Pyramidon Voluntal	鎮 痛	1日1.5g
Comsison	困基斯蒙	コンジスモン		黃體Alcohol- 溶性Hormon	月經制止	末—1次0.5~1.0g (3~4錠)注—1次 2cc腎筋
Convalon	(鈴蘭素)	コンパロン		鈴蘭成分	digitilis 類似, 強心	1次0.5~2.0cc皮 靜注 末—1日1.5~4.5g
Copaiba	古 巴 香	コバイババル サム	Copaiva	樹脂, 揮發油	尿路防腐	1次0.5~2.0g (Capsul)
Coramin	可 拉 明	コ ラ ミ ン		Nicotin誘導體 Pyridin-β-carbonic-di- ethylamid, 等	血管運動, 並呼吸中樞 刺激性強心	內—1日1~3cc 注—25%1~2cc 皮靜注

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Cornicin	可爾尼金	コルニヂン		同前		
Corpora Lutea				黃體浸膏之水溶液	子宮發育 月經調節	1回1cc皮注
Cortex Chinae				同 Cinchona		
„ Cinnamomi				同 Cinnamomum		
„ „ Loureirii	肉桂	肉桂	Japanese Cinnamon bark	Cinnaldehyde	健腸 胃味	桂皮代用
„ „ Condurango	康德郎皮	コンヅランゴ皮	Condurango bark	Conduragin	健胃	1日數次3~5g
„ „ Granati	石榴皮	石榴皮	Pomegranate bark	Pelletierin	驅除蟪蟲	30g~50g(煎劑)
„ „ Rhamni Purshianae				同 Cascara Sagrada		
Cortin	可爾丁			副腎皮質Hormon	治療Addis- on氏病	每日4~40cc 筋・靜注
Cotarninium chloratum	氯化可塔寧	鹽化コタルニン	Cotarnine chloride	Narcotin酸化物	止血	子宮出血，月經過多 10%1cc靜注， 0.05~0.15g內
Creosotum	木溜油	クレオソート	Creosote	Gnajakol Kreosol	防腐	1日3次0.3~0.2
„ Carbonas	炭酸木溜油	炭酸クレオソート	Creosote carbonate	Guaiacol-carbonas	„	乳，丸劑 1日3次2~10
Cresol	煤溜油碎	粗クレゾール	Cresol	CH ₃ -C ₆ H ₄ -OH	„	Lig. Sapo Cresol 原料

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Cresolum crudum				同前		
Crimag	苦利馬克	クリマク		Magnesia Milk 7~8%	瀉下	5~10cc 食後頓用 (5~12倍稀釋)
Crocos	蕃紅花	サフラン	Saffron	Crocin	健胃, 通經	丸, 浸劑 1日數次 0.3~1.0g
Cruculon	苦爾苦倫	クルクロン		莖黃製劑	利胆	肝, 胆道疾患 1日3次 1.5~2g
Cryogenine	苦利歐給寧			Phenyl-semicarbazid	解熱	結核熱 1日 0.4~0.8g
C-Tamin	西他命	シータミン		Nat-l-ascorbin.	抗壞血病	1.~2cc 皮注
Cubeba	畢澄茄實			同 Fructus cubebae		
Cupri Sulphas	硫酸銅	硫酸銅	Copper sulphate	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	收斂, 催吐	眼 0.2~0.5% 內 0.05~0.5g (水劑)
Cuprum citricum	枸橼酸銅	クエン酸銅	Copper citrate	$C_6H_4O_7Cu_2 \cdot \frac{1}{2}H_2O$	眼科殺菌	砂眼 5~10% 軟膏
„ sulfuricum				同 Cupri Sulphas		
Cyoliton	齊苦利屯			Diethylamide of dimethyl-isoxazol 4-carbonic acid	呼吸中樞刺激	Morphinismus 2~6cc 靜注 內 1日 20~40滴
Cystamin	齊斯他明			同 Hexamin		
Dagenan	打給南			同 Sulfapyridin		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
oLankern	彈 刺 論	ダンケルン		Novalgin Glucose	鎮 痛	神經痛 20cc靜注
oD.D.T.				$(ClC_6H_4)_2:OH-Cl_3$	殺 虱	撒布
oLeba	得 色			同 Barbitalum		
oDecholan	得 可 蘭			Dehydrocholic Natrium	催胆，利尿	5%~10%靜注 3日連用
oDecicain	得 齊 卡 因			同 Pantcain		
oDejica	得 利 卡	デ リ カ		Vit. B 複合體	抗 脚 氣	液—1日6~12g 發膏—1日5~10g
o-merol	地 美 露			1-Methyl-4-phenyl- piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	同 Dolantin	
Dermatolum	次 沒 食 子 酸 鈣	デルマトール	Bismuth subgallate	$(HO-Bi-\overset{O}{\parallel}-O-COO)H_2$ +H ₂ O	止瀉，防腐	1日數次 0.5~1.5g內用， 撒布；
o-ermoreiz	得 妙 額 此	デルモライツ		同 Anti-phlogistin		
oDesiccated placenta	乾 燥 胎 盤			乾 燥 胎 盤 提 質	乳 汁 分 泌	1日1~2次1Capsul
Dextrinum	糊 精	デキストリン	Dextrin	澱 粉 發 酵 製 品		散劑賦形藥
Dextrosun	葡 萄 糖	葡 萄 糖	Glucose	C ₆ H ₁₂ O ₆	榮 養，強 心	5% 200~1,000cc 皮 注，10~30% 靜 注，5%—注 腸

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Diacetylmorphinum hydrochloricum	海洛英	ヘロイン		同 Diamorphinae Hydrochloridum		
Dial	基阿兒			同 Allobarbital		
Diamorphinae Hydrochloridum	海洛英	鹽酸チアセチルモルヒネ (ヘロイン)	Heroin	Diacetylmorphine hydrochloride	鎮咳，鎮痛，鎮癢	内—0.003~0.01
Diarsoenol	基塞諾兒			同 Arsenobenzolum		
Diastase	澱化素	ヂアスターゼ		麥芽成分	澱粉糖化	1日3次0.3~1.0g
Dichloramin T	雙氯亞明			$H_2C-O-SO_2-NCl_2$	殺菌	創傷2~10% 眼疾0.5~1.0%
Dicooid	大可地特			Hydrocodeinor 之鹽酸鹽，磷酸鹽	鎮咳，鎮痛	1錠=0.005g 又0.01g 1日2-3錠，1cc皮注
Dicoumarin	取翹橋素		Dicoumarol	3,3-Methylenebis-(5-hydroxy-Coumarin)	抗凝血	肺，血管栓塞 每日0.15~0.3g 分3
Digalen	地葛連			Digitalis 配糖體	強心	1日1~3cc内服 1c.c皮，靜注
Digenea	海人草	海人草	Digenea		驅除蛔蟲	煎劑 1日10~40g
Digenin	地給寧	ヂゲニン		海人草製劑	，，	1日4~8g
Digifolin	地給福林			Digitalis-glycosides	強心	注—1cc皮注，靜注 液—1日2~3cc

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Digiherton	地給黃爾屯	デギヘルトン		同前		
Digilanid	地給拉尼陀			Digitalis lanata之成分	強心	副作用少，急症 2~1cc靜注
Digilanogen	地給拉諾根	デギラノー ゲン		同前		
Digitalis Folium	洋地黄葉	デギタリス葉	Digitalis leaf	Digitoxin Digitalin	強心	1日3次0.1~0.5g
Digitalon	地給地倫			同 Digitalin		
Digitamin	地給地命	デギタミン		同前		
Digitalol	基給托兒	デキトール		Pangital之10倍濃縮品		
Dilantin	大倫丁			同 Epantin		
Dinitrophenol	二硝基酚			$\text{NO}_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{<}\begin{matrix} \text{OH} \\ \text{NO}_2 \end{matrix}$	新陳代謝 促進性發 熱	發熱療法，肥胖症 體重1kg-3mg 2~3月連用
Diodrast	大歐得托			$\text{C}\begin{matrix} \text{Cl=CH} \\ \text{Cl=CH} \end{matrix}\text{>N-CH}_2$ (HOH ₄ C ₂)NH-HOOC	腎盂攝影劑	35% 20cc 徐徐靜注 8~20分後攝影
Dionin	大奧寧	デオニン		同 Aethyl-Morphium hydrochloricum		
Diothane	大奧散			Piperidino-propanediol- di-phenylurethane-hy- drochloride	局麻	1%，用新製

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Diplosal	基布魯薩兒			Salicyl-salicylicum	解熱鎮痛	1日1.0~1.5g
Diselon	基塞倫	オセロン		同 Neo-poleon		
Diseytal	基世布池兒	デセプタール		同 Uliron		
Juicalcin	(利尿素鈣)	ヂウカルテン		Cal.-diuretin	利 尿	動脈硬化，浮腫 1日1.5~3.0g
Diuretinum	利尿素	ヂウレチン		同 Theobromina et Sodii Salicylas		
Dolantin(Bayer)	得蘭丁			$C_6H_4-NH-C_2H_4OCH_3$ $COO-C_2H_4-NC_5H_{10}$,HCl	局 麻	1%生理食鹽水溶液皮下注
,,(,,新)				$CH_3-NC_5H_5-C_6H_5$ $COOC_2H_5$	鎮痛，鎮靜	滑平筋攣攣，喘息2cc支，筋注
Dormalgin	得爾馬爾金			Peraceton Pyramidon	鎮 痛	神經，月經痛 1次1錠 2cc皮筋注
Dormin	得爾明			同 Carbromalum		
Dormiol	得爾米歐兒			$CCl_3-CH < \begin{matrix} OH \\ O-C-CH_3 \\ C_2H_5 \end{matrix}$	催 眠	1次0.5g
Dormonal	得爾冒那兒			同 Barbitalum		
Dormigene	得馬伊鎮			同 Bromvalerylurea		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Doryl	得利兒			$\text{NH}_2\text{-CO-OCH}_2\text{-CH}_2\text{-N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Cl}$	血管擴張	消化器atonie, 血管 障礙 0.5—1 Amp 皮注
Drasmin	得拉斯明	ドラスミン		同 Santosol		
Duotal	知宅爾	ゾオタル		同 Guajacollum Carbonicum		
Dysphagin	吉斯法金			Anaesthesin Tutocain Menthol	鎮 痛	嚙下痛 1錠內服
Ebios	愛表斯	ニビオス		同 Faex medicinalis		
„ cryst. Sol.	愛表斯 結晶液	ニビオス 結晶液		Vit. B ₁	抗脚氣	1—2cc 皮, 筋注
„ losung	愛表斯 注射液	ニビオス 注射液		VitB ₁ + VitB ₂	抗神經炎	50—500單位皮, 靜注
Edera	愛的拉	ニデラ		各內分泌腺製劑	食慾增進	1日0.6—0.8g 食前
Ehramisol	益啞 梅兒	ニ—ラミ ゾ—ール		同 Arsenobenzolum		
Eklysin	也克利金	ニキリジン		碳酸鉍, 磷酸鉍, 磷酸鈣	吸管殺菌	肺炎—1日2—3g 痰劑—1—3g 頓用
Elbon	也爾碰			$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH:CHCO-O-NH}_2\text{-CO-NH} > \text{C}_6\text{H}_4$	解熱, 鎮痛	結核熱 1日3—6g
Emetineae Hydrochlori- dum	鹽酸吐根素	鹽 ニ メチン	Emetine hydrochl- oride	$\text{C}_{23}\text{H}_{40}\text{N}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{HCl}$	阿米巴赤痢	1次0.02—0.05 皮注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Emetinum hydrochloricum				同 前		
Emol	也毛兒	ニモール		Brom 之有機化合物	鎮 吐	惡阻 1日3次3錠 1次2cc皮注
Empirin	音比林			同 Aspirinum		
Emplastrum Cautschuc adhesivum	膠絆創膏	ゴム絆創膏	Rubber adhesive Plaster		黏帶材料	
„ Lithargyri	單鉛硬膏	單鉛硬膏	Lead plaster	PbO, Ol. Arachidis, Ol. suillus	硬膏基礎劑	
„ Saponatum	柳酸石鹼硬膏	ビツク硬膏	Salicylated soap plaster	柳酸10%	消 炎	皮膚炎 貼用
Emulsio Olei Jecoris	魚肝油乳劑	肝油乳劑	Emulsion of Cod-liveroil	50%.Ol Jecoris	強 壯	
Enarmon	英男兒萌	ニナルモン		尿抽出男性Hormone	男性器發育	每日，隔日 0.5~1.0cc皮，筋 注・1日3~6錠連用
Enasin	也那金	ニナジン		同 Omupadin		
Enex	也餒克斯	ニネツクス		副腎皮質Hormone, Vit C.	解 毒	惡阻 1日1~2次 1cc皮筋注
Enspamol	普斯巴 冒 兒	ニスバ モール		Atropin 0.0002. (1cc中) 安那加0.03	鎮痙，強心	皮，注
Entrastin	音托拉斯丁	エントラ スチン		同 Anti-phlogistin		
Enzeima	音在馬	エンツアイマ		同 Faex medicinalis		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Epanutin	也潘丁			$\begin{matrix} \text{C}_6\text{H}_5 > \text{C} < \\ \text{C}_6\text{H}_5 & \text{NH-CO} \\ & \text{CO-N-Na} \end{matrix}$	鎮靜	癲癇 1日3次0.1g
Ephedralin	也費拉林			同 Ephrin		
Ephedrinae Hydrochloridum	鹽酸麻黃素	鹽酸 エフェドリン	Ephedrine hydrochloride	$\begin{matrix} \text{C} < \text{CH-CH-CH}_3 \\ \\ \text{OH NH}_2 \end{matrix} \cdot \text{HCl}$	平滑筋緊張	喘息 1cc皮注 1次0.25~0.05g 内日
Ephedrinum hydrochloricum				同前		
Ephetonin	也費托寧			同前 d-,l-, 混合		
Epinephrin	也比緩弗林			同 Adrenalina		
Epireuamin	(副腎腺)	ニピレナミン		同前		
Equiodin	伊克佐沃金	イクイヨチン		同 Sajodin		
Ergamin	也爾發明			同 Histamin		
Ergota	麥角	麥角	Ergot	Ergotamin Ergotoxin	子宮緊縮 止血	1日3次0.5~2.0g
Erion	也利恩			同 Atebrin		
Ernil	也爾米兒	エルミール		同 Mercurochrome		
Erstin	也爾斯欽	エルステン		同 Omunadin		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Erycon	也利混	ニリコン		2-p-Methoxy-phenyl-quinolin-carboxylic acid	尿酸排泄	健麻質斯 10cc 靜注
Eryosan	也利歐散	ニリオザン		30% Casein	非特異刺激	解熱，健麻質斯 0.5cc 支注
Erytrin	也利托林	ニリトリン		P-Acetylaminophenyl-sulfonamide	體內殺菌	1日3次1.0~3.0g 食後
“ ” “Ing.”	”	ニリトリン 注 射 液		同 Sulfaminum		
Eserin	也醉林			同 Ph, sostigmin		
Eserinum Salicylicum				同 Physostigminae Salicylas		
” Sulfuricum				同 ” Sulphas		
Estimon	也斯其蒙	ニステモン		$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$	類以卵巢 Hormone	有內用，注，
Eucainae H, drochloridum	鹽酸優克因	鹽 酸 オイカイン	Eucaine hydrochloride	$\text{C}_5\text{H}_7\text{N}(\text{CH}_3)_3 \cdot \text{O}, \text{HCl}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}$	局 麻	1~2% NaCl-Sol. 眼，齒科
Euchinin	優奎寧	オイヒニン	Equinine	同 Quininae et Aethylis Carbonas		
Euflevin				同 Gonacrin		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Eukoal	優可大			Dihydroxycodoinon	鎮痛，鎮咳	1次1錠 (0.005g)
Eumydrin	歐伊米得林			Atropinum methylnitricum	制汗，瞳孔散大	結核性盜汗 1次0.001—0.002g 其他用眼科
Eupaco	優巴古			Eupaverin, Atropin, Pyramidon, Luminal	鎮痙，鎮痛	疼痛時1—2錠
Eupaverin	優巴北林			1-(3,4-Methylenedioxy)-benzyl-3-methyl-6,7-Methylenedioxyquinolin	滑平筋鎮痙	1日1—3回1—2錠 1—2cc筋注
Euphyllin	優費林			Theophyllin aethylendiamin	利尿，血管擴張	筋注用2cc(0.08g) 靜—10cc (〃) 錠—1錠=0.1g
Eustaptin	歐伊斯丁	オイスタブチン		同 Stypcticin		
Euvestin Tablets	歐伊佛斯丁錠	オイベステン錠		C_2H_5 $CO-O-C_6H_4-C=C-C_6H_4-OCO$ C_2H_5 H_5C	類似卵巢Hormone	1日1—3錠・連用
Eval	也巴爾	ニバール		同 Phenovalinum		
Evastamine	愛巴斯他明			同 Asthmolysin		
Evion	愛表歐			Vit.E	抗生殖機能減衰	1日膠囊1—3個
Evipal soluble	溶性愛必巴兒			同 Evipan Natrium		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Evipan Natrium	愛表派鈉			$C_6H_9 \cdot C \begin{matrix} CO-NNa \\ CO-NCH_3 \end{matrix} > CO$	催 眠	短時間麻醉 10% 10cc 靜注
Exihos	愛可厚斯	ニキネス		同 Anti-phlogistine		
Extractum Aloes	蘆薈浸膏	ロカイエキス	Extract of Aloes	同 Aloe		緩下—0.03~0.1g 瀉下—0.1~0.3g
" Cannabis indicae	大麻浸膏	印度大麻ニキス	Extract of Cannabis		鎮 痛	1日0.03~0.1g 20% 擦劑
" Cascarae Sagraeae fluidum				同 Extractum Cascarae Sagraeae Liquidum		
" " Liquidum	波希良李流浸膏	カスカラサグラダ流動ニキス	Liquidextract of Cascara Sagraeae	Cascarin	緩 下	1次20~30滴
" Chinae				同 Extractum Cinchonae		
" " fluidum				同 " " Liquidum		
" Cinchonae	金鷄納浸膏	キナニキス	Extract of cinchona	Chinin Cinchonin	健 胃	1日0.5~3.0g
" " Liquidum	金鷄納流浸膏	キナ流動ニキス	Liquid extract of Cinchona	"	"	1次5~10滴
" Condurango fluidum	康德郎流浸膏	コンブランゴ流動ニキス	Fluidextract of condurango	Konduragin	"	1日數次20~30滴

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Extractum Coptidis	黃連浸膏	黃連エキス	Extract of coptis	Berberin	收斂 健胃	1日0.3~1.0g 散 丸
„ Ergotae	麥角浸膏	麥角エキス	Extract of ergot	Ergotin Ergotoxin	止血 子宮收縮	子宮atonie, 子宮出 血 1日3次0.05~0.5g
„ Liquidum ”	麥角流浸膏	麥角流動エキ ス	Fluidextract of ergot	”	”	1次20滴
„ Faecis	酵母浸膏	酵母エキス	Extract of yeast			丸劑賦形藥 調味藥
„ Fellis Bovini	牛胆汁浸膏	胆汁エキス	Extract of ox bile	苦味質	健 胃	1次0.3~1.0g
„ Ferri pomati	苹果鐵浸膏	リンゴ鐵エキ ス	Extract of iron malate	苹果發鐵	補 血	1日數次0.3~0.6
„ Filicis	綿馬浸膏	綿馬エキス	Extract of male fern	Filicin	驅除雜蟲 十二脂腸 蟲	1日5~10g (Capsal)
„ Gentianae	款龍胆浸膏	ゲンチアナ エキス	Extract of gentian	Gentiopierin	苦味健胃	1日數次0.5~2.0g
„ scabrae ”	龍胆浸膏	龍胆エキス	Extract of gentiana s- cabra	Gentiopierin Gentianose	”	1日0.5~2.0g
„ Glycyrrhizae	甘草浸膏	甘草煮	Licorice	Glycyrrhizin	矯 味	丸劑賦形藥
„ Hepatis Siccum	乾燥性肝 浸膏	乾燥肝臟エキ ス	Dryextract of liver		利 胆	1次2.0
„ Hydrastidis fluidum	北美黃連 流浸膏	ヒドラチス 流動エキス	Fluidextract of hydrastis	Berberin Hydrastin	止 血	子宮出血 1日3次15~20滴

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Extractum Liquiritiae	甘草流浸膏	甘草ニキス	Extract of liquorice	Glycyrrhizin	矯 味	丸蒞賦形藥
„ Hyoscyami	莨菪浸膏	ヒヨスニキス	Extract of hyoscyamus	Hyoscyamin	鎮靜鎮痛	1日數次0.01~0.05g
„ Nucis Vomicae	番木碱浸膏	ホミカニキス	Extract of nux vomica	Strychnin Bruicin	強壯, 刺戟	1次0.01~0.05g (丸, 散)
„ Opii	阿片浸膏	阿片ニキス	Extract of opium	Morphin 等	鎮 痛	1次0.005g(散, 丸)
„ Rhamni Purshianae fluidum				同 Extractum Cascarae Sagradae Liquidum		
„ Rhei	大黃浸膏	大黃ニキス	Extract of rhubarb	Emodia Rhein	健 胃 緩 下	1日0.1~0.5 健胃 1日0.5~1.0 緩下
„ Scopoliae	東莨菪浸膏	ロートニキス	Extract of scopolia	Hyoscyamin	鎮 痛	1日3次 0.01~0.05g
„ Secalis cornuti aquosum				同 Extractum Ergotae		
„ „ fluidum				同 „ „ Liquidum		
„ Strychni				同 Extractum Nucis Vomicae		
Faex medicinalis	藥用酵母	藥用酵母	Medicinal yeast	各酵素, Vit.	消 化	1次1~1.5g
„ fagol	法够兒	フアゴール		Methylen-guajakol	腸内殺菌	結核 1日3次0.2~0.5g
„ Fastase	法斯他賊	フアスターゼ		同 Pancreatinum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
。Febasenin	費巴塞寧	フェバセニン		同 Elbon		
。Febron	費不龍	フェブロン		同 Amidopyrinum		
。Fenurin	費奴林	フェヌーリン		CaCl ₂ Urea	胃炎	予病 Salvarsan 副作用 3%20cc靜注
Ferri-Ammonii-citricum				同 Ferri et Ammonii Citras		
Ferri Carbonas Saccharatus	含糖炭酸鐵	含糖炭酸鐵	Saccharated iron carbonate	FeCO ₃	補 血	貧血 1日3次 0.1~1.0g
Ferri et Ammonii Citras	枸橼炭酸鐵	クエン酸鐵 アンモン	Iron and Ammonium Citrate	錯鹽	„	1日3次0.1~1.0g
Ferri et Quininae Citras	枸橼炭酸奎寧	クエン酸鐵 キニーネ	Iron and quinine citrate		補血，強壯	1日3次0.1~0.5g
„ -Kalium tartaricum	酒石酸鐵鉀	酒石酸鐵カリ	Tartarated iron	CH(OH)-COOK CH(OH)-COOFeO	„	1日數次0.2~1.0g
„ Sulphas	硫酸亞鐵	硫酸鐵 (硫酸亞酸化鐵)	Ferrous sulphate	FeSO ₄ ·7H ₂ O	補血，收斂	內1日0.05~0.2g 外0.5~1.0%洗滌
Ferrum carbonicum saccharatum				同 Ferri Carbonas Saccharatus		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Ferrum citricum oxydatum	枸橼酸鐵	クエン酸鐵	Ferric Citrate		補 血	1日3次0.1~0.5g
" jodatum saccharatum	含糖碘鐵	含糖ヨード鐵	Saccharated ferrous iodide	FeI ₂	"	1日3次0.2~1.5g
" lacticum	乳酸鐵	乳 酸 鐵	Ferrous lactate	Fe(CH ₃ -CH(OH)-CO ₂) ₂	"	1日3次0.1~0.5g
" Redactum	還元鐵	還 元 鐵	Reduced iron	Fe	"	1日3次0.01~0.3g
" reductum				同前		
" sesquichloratum	氯化高鐵	鹽化第二鐵 (過クロル鐵)	Ferric chloride	FeCl ₃ ·6H ₂ O	止 血	製劑原料, 試藥
" sulfuricum				同 Ferri Sulphas		
Filix Mas	縮馬根	縮 馬 根	Male Fern (Aspidium)	Filicin	驅除絛蟲 十二脂腸蟲	煎劑1次5~10g
Filmaron				Aspidinol-filicin 10%	驅除絛蟲	8~10g
Flava	弗拉芞	フ ラ バ		Bacillus Vaginalis	陰 防 腐	縮尿 1次3~4cc
Flavinin	弗拉必寧	フ ラ ビ ニ ン		同 Acriflavina		
Flores Zinci	鋅 華	亞 鉛 華		同 Zinci Oxidum		
Flos Caryophylli				同 Caryophyllum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Flos Chamomillae	開密支列花	カミツレ花 (カミルレ花)	Chamomile	Terpenalcohol	發汗，驅風	10%浸劑，器法
„ Cinae	西那花	シナ花	Santonica	Santonin	驅除蛔蟲	1次1~3g
Flamejodin	弗爾摩沃金	フルメヨヂン		Dijodoxymercurifluoresciin-Nat.	消 毒	創傷 1~2% 洗滌 0.1%
Foeniculum	茴 香	茴 香	Fennel	Anethol Fenchon	健胃，驅風，矯臭	浸劑—10%
Folium Digitalis				同 Digitalis Folium		
„ Eucalypti	桉 葉	ユーカリ葉	Eucalyptus leaves	Cineol		製劑原料
„ Hyoscyami				同 Hyoscyamus		
„ Menthae	薄 荷 葉	薄 荷 葉	Japanese peppermint leaves	Menthol Menthon	興奮，發汗，驅風	5~10%浸劑
„ Pruni macrophyllae	巴苦其葉	バクチ葉	Bakuchi leaves	Prunasin		杏仁水原料
„ Scopoliae	東莨菪葉	ロート葉	Scopolia leaves	Hyoscyamin	鎮痛，鎮痙	1日0.5~0.15g
„ Sennae				同 Sennae Folium		
„ Stramonii				同 Stramonium		
„ Uvae Ursi	熊果葉	ウワウルン葉	Bearberry	Arbutin	尿路防腐	1日數次10%煎劑

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Formigenin	福爾給寧	フォルゲニン		蜂毒	鎮痛	神經痛 1次 1~2c.c皮, 筋注
Formaldehydum solutum	甲醛溶液			同 Liquor Formaldehydi		
Formalinum	福爾馬林	ホルマリン		同前		
Formine	福爾明			同 Hexamina		
Forton	福爾屯	ホルトン		合成男性Hormone		毎日0.5~1.0筋注 1日3~6錠連用
Fructamin				同 Cantan		
Fructus Anisi	阿尼斯實	アニース實	Anise fruit	Anethol	驅風	0.5~2.0g內用
„ Capsici				同 Capsicum		
„ Cardamomi				同 Cardemomum		
„ Catalpae	梓實	キササゲ實	Catalpa	p-Oxy-benzoic acid	利尿	1日7~10g煎劑
„ Cubebae	華澄茄	クベバ實	Cubeba	Dipenthen	尿路防衛	1日3次1~3g
„ Foeniculi				同 Foeniculum		
„ Piperis Nigri	胡椒	胡椒	Black pepper	Piperin	矯味	1日0.5g
„ Fujivarsan	弗吉芭爾散	フジバルサン		同 Neo-Arsenobenzolum fortius		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
。Gadamin	葛打命	ガダミン		10%-Camphor	強 心	1cc皮，注
Galla	五倍子	五倍子	Japanese Galls	Acid. Tannic.	收 斂	1日數次0.5~2.0g
。Gallosterin	葛魯斯特林	ガ스로テリン		Vit. A Acid. Cholein.	營 養	1回0.2~0.4g
。Gamelan	葛摩亂			蠟，脂肪 Lipoid	非特異免疫	5cc1週2次皮注 有塗擦劑
。Gedox	解毒素	ケドツクス		Nat. Glycocholate Vit. B, Glucose	解 毒	惡阻1日1~2次 10~15cc靜注
Gelatina alba				同 Gellatinum		
Gellatinum	膠	ゼラチン	Gellatin	Gultin	止 血	0.5%1食匙內服 ， 靜注
。Geneglandol	蓋納格蘭德	ゲネグラン ドール		卵巢實質製劑	女性器調節	1日1cc皮，筋注
。Genesol	給餒索兒	ゲネゾール		Nat. Glycocholate	解毒，催胆	催阻—1日3錠內用 解毒—1%5cc靜注
。Genestyptol	給餒斯世 布托兒	ゲネステプ トール		卵巢實質製劑	月經抑制	子宮出血，月經過 多1日1cc皮筋注
。Gennopon	根諾本	ゲンノポン		Geranium屬 有效成分	收斂，殺菌	腸炎 1日3次0.5g
Gentiana	歐龍胆	ゲンチアナ根	Gentian	Gentiopieirin	苦味健胃	1日數次0.2~1.0g
。Geramin	給拉明			睾丸成分	男性器發育	每日，週2~3次1cc 注，1日3~6錠連用
。Gerbamin	給兒莨明	ゲルバミン		酵母蛋白與鞣酸化合物	收 斂	1日2~6次 0.5~1.0g食後

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Gerison	給利遜	ゲリゾン		同 Sulfaminum		
Gifron	給弗龍	ギフロン		Bi(OH)_3 $\text{C}_2\text{H}_2(\text{OH})_2(\text{CO}_2\text{K})$ - (CO_2BiO)	驅 黴	1週2次2cc筋注
Gitosan	給托散	ギトーザン		同 Cinchophenum		
Glandura Thyre- oidea siccata				同 Thyroideum		
Giosal	格魯撒兒	クロサール		Triacetyl, dipi enol- isatin	降 下	1次0.015~0.2g
Glucosum	葡萄糖			同 Dextrosium		
Glycerinam	甘 油	グリセリン	Glycerin	$\text{CH}_2\text{-OH}$ CH-OH $\text{CH}_2\text{-OH}$	皮膚軟化 瀉腸	注腸, 塗布
Glycyrrhiza	甘 草	甘 草	Liquorice	Glyc; rrhizin	矯 味	丸劑基礎藥
Gombardol				同 Sulfaminum		
Gonaerin	够那克林			3, 6-Diamino-10-methyl- æridin-chloride	殺 菌	尿道注入0.1%~ 0.01% 靜注1%~5cc
Gonadotropin	够那得托 魯品	ゴナドトロ ピン		尿製性上位Hormone	性器發育	1日1次200~500 RE 皮, 筋注

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Gono-Brocannon	勃諾李隆 卡漢	ゴノブロカ ノン		淋菌多價 vaccine	抗 淋 菌	1次20cc 嚮注
Gonostagen	勃諾斯他根	ゴノスター ゲン		淋菌與化學菌製劑	”	”
Gossypium deparatum	脫脂綿	脫脂綿	Purified cotton			綿帶料
” Hydrargyri bichlorati	昇汞綿	昇汞綿	Sublimate cotton		防 腐	”
” Stypticum	止血綿	止血綿	Styptic cotton	FeCl ₃	止 血	”
Grelan	格理真	グレラン		同 Pyrabitalum		
G-Strophantjn Solution	G-毒毛旋 花素溶液	ジーストロ ファンチン 注射液		g-Strophantjn 食鹽水溶液	強心利尿	朝夕1次1cc
Guaiacol	癩瘡木醇	グアヤコール		$\begin{matrix} \text{C} & \text{-OCH}_3 \\ & \text{-OH} \end{matrix}$	防腐, 鎮痛	結核 1日0.1~0.3
Guaiacol-Bluto- se		グアヤコール ブルトローゼ		Blutose, Guaiacol-sulphonic acidsalts	造 血	1日10.0~20.0cc
” Polytamin		グアヤコール ポリタミン		Polytamin Potassium guaiacolsul- phonate	”	1日3~4次5~15 cc
Guajacolum				同 Guaiacol		
” carbonicum	炭酸癩木 木醇	炭酸グアヤ コール	Guaiacol carbonate	CO(C ₆ H ₄ OCH ₃) ₂	防 腐	結核 1日3次0.2~1.g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
G-U-cide		ヂーユーサイド		同 Uliron		
Gummi arabicum	亞拉伯膠	アラビヤゴム		同 Acacia		
Gyndanol	給男得兒	ギナンドール		尿製濾胞Hormone	女性器發育	1日1~2cc皮下注 1日3次2錠食前
Gynergen	給綏爾根			Ergotamin之 酒石酸溶液	止血・ 子宮收縮	0.5~1.0cc皮下筋注 1~2錠內服
Haemojinal	海毛爾那兒	ヘモヂナール		Trichloroacetaldehyde誘 導體	痔疾劑	坐墊 1日1~2個挿入
Haemoplastin	海馬布拉斯丁			馬、牛之血清製劑	止 血	1~2cc皮下、靜注
Haliva	哈利巴	ハリバ		Halivat魚族肝油	Vit. A, D 補給	1週1~2次靜筋注 1日3~5粒內服
Helomin	哈羅民	ハロミン		同 Chloraminum		
Hematogen	海馬托根	ヘマトーゲン		脫纖干血	造 血	1日3次5~15g食前
Haribromin	哈利爾羅明	ハリブロミン		同 Calcicol		
Harmim	哈爾明	ハルミン		Peganum Harmala 之成分	神經中樞 興奮	流瀉 1~2cc 1日 3次0.2g (Capsul)
Hasethrol	哈塞斯羅兒	ハセスロール		$\text{NO}_2\text{-CH}_2\text{-C} > \text{C} < \begin{matrix} \text{CH}_2\text{-NO}_2 \\ \text{CH}_2\text{-NO}_2 \end{matrix}$	血管擴張	高血壓・ 0.1~0.2g內服
Hectalin	海苔他林	ヘクタリン		同 Acrinolum		
Hefen	海 芬	ヘーフエン		同 Faex medicinalis		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Helmitol	海爾米托兒			Urotropine anhydromet hylene-citrate	尿路防腐	1日1~2g
Heminal	海米那兒	ヘミナル		Inosit-磷酸鹽 Vit. B	造 血	1日2~4g分3
Hemol	海毛兒			Hemoglobin製劑	,,	1日3次0.5g
Hepan	費 潘	ヘパン		肝臟成分	,,	粉末1日1~3g 注-2cc筋注
Hepatose	費巴托威	ヘパトーゼ		生肝粉末; Vit., 消化酵素	,,	1日3次1g食後
Heptomim	費布托明			肝製劑	,,	1次2c.c.
Herba Cannabis indicae	印度大麻	印度大麻草	Cannabis	Cannabin	催眠, 鎮痛	喘息一吸煙 1日0.2~1.5內用
,, Swertiae	當 藥	當 藥	Japanese chiretta	Swertiamarin	苦味健胃	健胃散原料
Heroin	海洛英	ヘロイン		同 Diacetylmorphinum hydrochloricum		
Hesperin	海斯培林	ヘスベリン		Vit. p	毛細管之抵 抗力強化; V.C共同	出血性紫斑病, 滲 出性胸膜炎, 1日 0.5~1.0g內服1日 2~5cc皮筋, 靜注
Hexal	海克薩兒			Urotropinesulphosalicy late	尿路防腐	1錠(0.5g)-2錠食 後, 5%-一含嗽
Hexalet				同前		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Hexamethylen-tetraminum	六甲烯胺			同 Hexamina		
Hexamina	六個一烯四 胺(烏羅特 羅平)	ヘキサメチレ ンテトラミン (ウロトロピ ン)	Urotropine	$(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$	尿 防 腐	1日數次0.5~2.0g
Hexeton	海克塞屯			$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}-\text{CO} \\ \quad \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2 \end{array}$	Camphor 同 樣	1%靜注 10%筋注
Himarsen	喜嗎神	ヒマーセン		同 Neosarsphenamina		
Hisorin	黑索林	ヒゾリン		同 Arsenobenzolum		
Histment A	黑斯他門A	ヒスタメントA		Histamin 冬綠油	血管擴張	傷寒、瘧疾、 外用塗布
“ B	“ B	“ B		Histamin Lanae, 蜂蠟	“	凍傷、燙傷 外用塗布
Histamin	組織胺		Histamine	$\begin{array}{c} \text{NH}-\text{CH} \\ \\ \text{HC} \leq \\ \\ \text{N}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2 \end{array}$	血管擴張 胃液分泌	1cc皮，筋注
Histidin	黑斯其金	ヒステチン		同 Isuleus		
Holopon	賀魯本			阿片水性抽出濾液	鎮 痛	阿片劑同樣
Homatropinae Hydrobromidum	氫溴酸後 馬託品	フローム水 素酸ホマト ロピン	Homatropine hydrobrom- ide	$\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{NO}_3-\text{HBr}$	散 瞳	點眼0.5~1.0%

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Homatropinum hydrobromicum				同前		
Hustagin	夫斯太金	フスタギン		車前草成分= Aucubin	祛 痰	末—1日1~2g 液—1日3~4c.c.
Hustol	夫斯托爾	フストール		桔梗，麻黃之有效成分	” 鎮 咳	末—1日3~4g 液—1日3~7c.c.
Hydrargyri Iodidum Rubrum	紅碘化高汞	赤色ヨード汞	Red mercuric iodide	HgI ₂	驅 蟲	1日0.005~0.01 (丸劑)
” Oxidum Flavum	黃碘化高汞 (黃降汞)	黃 降 汞 (黃色酸化汞)	Yellow mercuric oxide	HgO	殺 菌	0.5%軟膏 角膜炎，結膜炎， 1~5%軟膏
” Oxycyanidum	氧氰化汞	オキシシア ン水銀	Mercuric oxycyanide	HgO·3Hg(CN) ₂	驅 蟲	1%0.5~1.0cc注
” Perchloridum	昇 汞	昇 汞	Mercuric chloride	HgCl ₂	消 毒	0.1%外用
” Subchloridum	甘 汞	甘 汞	Mercurous chloride	Hg ₂ Cl ₂	瀉 下 驅 蟲	瀉下—1次 0.2~ 0.5g，瀉腸—擦布
Hydrargyrum	汞	水 銀	Mercury	Hg		製藥原料
” Ammoniatum	銻氨氯化高汞 (白降汞)	白 降 汞	white precipitate	Hg-NH ₂ -Cl	收斂，防腐	梅毒性潰瘍 5~10% 眼科—1~5%軟膏
” bichloratum				同 Hydrargyri Perchloridum		
” bijoatatum				同 ” Iodidum Rubrum		
” Chloratum				同 ” Subchloridum		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成份	主作用	用途及劑量
Hydrargyrum Oleatum	油酸汞漿	オレイン酸水銀 (油酸汞)	Oleated mercury	$(C_{18}H_{33}O_2)_2Hg$	驅 蟲	梅毒性皮膚病20% 軟膏—1日1~2次 1.5~2.0g
" Oleicum				同前		
" Oxycyanatum				同 Hydrargyri Oxycyanidum		
" Oxidatum Flavum				同 ,, Oxidum Flavum		
" ,, rubrum	紅氯化汞漿 (紅降汞)	赤降汞 (赤色氯化汞)	Red mercuric oxide	HgO	刺激, 腐蝕	梅毒性傷 2~10% 軟膏, 散膏
Hydrargyrum praecipitatum album				同 Hydrargyrum Ammoniatum		
" salicylicum	柳酸汞	サリチル酸水銀	Mercuric salicylate	$C_6H_4 \begin{matrix} OH \\ \\ COOH \end{matrix} Hg$	驅 蟲	1日2次0.005~0.01(丸) 1% 塗液 1cc 皮注
" sulfuratum rubrum	朱	朱	Cinnabar	HgS		丸衣料
Hygylol	黑給托兒	ヒギトール		柳酸汞之可溶性複鹽	驅 蟲 殺 菌	1日1cc 有腸用, 靜用 利尿—1次 2~3cc 筋注
Hyoscinae Hydrobromidum	莨菪碱 莨菪素	ブロム水素莨 スコポラミン	Scopolamine hydrobromide	$C_{17}H_{21}O_4N \cdot HBr \cdot 3H_2O$	鎮 靜, 鎮 痛	1日0.1~0.5mg 內服, 皮注
Hyoscyaminus	莨菪葉	ヒヨス葉	Henbane	Hyoscyamin	,,	1日0.1~0.2g
Hyponal	黑浦那兒	ビブナール		同 Nirvanol		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Hypnogen	黑浦諾根			同 Barbitalum		
Hypnotin	黑浦諾丁	ヒプノテン		同 Bromvalerylurea		
Hypo-apo	黑浦阿逸	ヒポアポ		亞硝酸, I, Br Ca-Theobromin	血壓降下	1日2~3g食後
Hypocain	黑泡卡因	ヒポカイン		同 Benzocaina		
Hypoform	黑泡費爾木	ヒポホルム		同 Orthocaina		
Hypophorin	黑泡費林	ヒポホリン		腦下垂體前葉製劑	男女性器發育	1日1次1~2cc皮筋注 末-1日0.3~0.6g食後
Hypophysin	黑泡黑金			腦下垂體後葉製劑	同 Pituitrin	
Hypotonal	黑泡托那兒	ヒポトナール		$\text{CH}_2\text{-CO-NH-(CH}_2\text{)}_2\text{-NH}_2$ $\text{CH}_2\text{-COOH}$	血壓降下	1日1~2g食後
Hypotonin	黑保多寧			$\text{CH}_3\text{-NH}_2\text{(CH}_2\text{)}_2\text{>NH}$ $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{-CO>NH}$	”	1日2~3次0.3g 1週服用, 1週休
Ichthammol	磺酸基魚 石油酸鈣 (魚石脂)	イヒチオー ルスルホン 酸アンモン	Ichthyol	Thiophen化合物	鎮痛, 消炎, 防腐	5~2%—軟膏 1~3%—尿道注入
Ictemin	伊苦特明	イクテミン		菌陳菌成分	利胆	1日1.5~2.0g
Igrosin	伊兒羅辛	イグロシン		同 Salyrgan		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Imamicol	伊馬米可爾	イマミコール		Nat.-Hydrarg.- sulfosalicylate	驅鼠 咬症	筋注0.5~1.0cc 靜注0.5~1.0cc
Eminol	伊米諾爾			Papaverin, Agaritin Coffein, Theophyllin	喘息發作 予防	1次1錠
Incisin	因其金	インテチン		同 Aeth, lis Chloridum		
Indoramin	因得拉明	インドラミン		Chinin-hydrochlorid- ure	解 熱	肺炎, Malaria 大人4%, 小兒2% 筋, 皮注
Inselin	因賤林	インゼリン		同 Insulinum		
Insulinum	胰岛素	インシュリン	Insulin	降糖 Hormone	血糖調節	糖尿病-1日 40 E. 皮注 肥胖療法-1日 3次5~10. E
Intelligen (A,B)		インテリゲン		甲状腺, 胸腺, 腦下垂體全腺,	成長促進	成長障碍 1日3次1~2錠
Infere nin	因鐵列寧	インテレニン		牛副腎皮質製劑	血壓降下, 疲勞性減少	Adison氏病, 筋無力, Morphinismus, 1日1~2cc皮注
Invert zucker "Inj"	轉化糖 注射液	インベル糖 注射液		同 Iveton		
Iodoformum	碘 仿	ヨードホルム	Iodoform	CHI ₃	防腐, 制沁	撒布 5~10%軟膏
Iodum	碘	ヨード	Iodine	I ₂		製劑原料
Ipecacuanha	吐 根	吐 根	Ipecac	Emetin	催吐, 祛痰	1次0.2~1.0g

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Irmerin	依爾察林	イルメリン		$\text{HO}-\text{C}(\text{CH}_2-\text{NH})-\text{C} \begin{matrix} \diagup \\ \text{H}_2\text{N} \\ \parallel \\ \text{NH} \end{matrix}$	血液凝司促進	5% 1~2cc 皮下注 1日 1.5~2.0g 內服
Irradiol	依拉得兒			同 Vigantol		
Isacen	依薩森	イサツエン		$\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OOCCH}_3)_2$ $\text{NH}-\text{CO}$	瀉下	1次 0.005~0.015g
Isobromyl	依索不羅米兒			同 Bromvalerylurea		
Isomin	依索明			同 Carbromalum		
Israviv	伊斯拉濱	イスラビン		同 Acriflavina		
Isulens	伊斯烏爾克斯	イスウルクス		$\text{CH}=\text{C}-\text{CH}_1-\text{CH}-\text{COOH}$ $\text{N}-\text{C} \begin{matrix} \diagup \\ \text{NH} \\ \parallel \\ \text{NH}_2 \end{matrix}$	胃、十二指腸液滯抑制	毎日 5cc 皮下注 3週應用
Iveton	伊北屯	イベトン		轉化糖	營養、強心、解毒	5% 一生理食鹽水 同様注 10~20% 靜注
"Iwashiya" Sal. Bro		「イワシヤ」 サルプロ		同 Salso-Brocannon		
Jalapa	藥喇叭根	ヤラツバ根	Jalay	Convolvulin	瀉下	緩下—1日 0.05~ 0.3g 瀉下—1次 0.5~ 1.5g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Japiol	藥比歐兒	ヤピオール		同 Yatren		
Jecoramin	賦可拉命	ゼコラミン		汗油製劑	Vit. A補給	注—0.5~2.0cc 筋注 內—1日3次1~3球
Jod-Blutose	沃得不爾 托賊	ヨードブル トローゼ		Jod Ferrum 各0.2%	造 血	1日10~20cc
Jod incalein	沃得地烏 卡爾丁	ヨードヂウ カルテン		Dinealcin Jod	利 尿 血 壓 降 下	1日3次0.6g
Jodicanon	沃地卡濃	ヨヂカノン		CaI ₂ 2% Glucose 10%	鎮 靜, 消 炎	每日, 隔日10~20cc 靜注。
Jodipin	沃地賓			碘—脂肪酸化合物	變 質	喘息, 喉病, X線 造影 內服, 10% 7~10cc 皮注, 1~2cc
Jodival	沃地芭兒			$(\text{CH}_3)_2\text{-CH-CH J}$ $\text{NH}_2\text{-CO-NH} > \text{CO}$	鎮 靜	神經痛, 喘息 1日3~4次0.3g
Jodoformium	碘 仿			同 Iodoformum		
Jodol	沃 多 爾	ヨドール		Tetraiodopyrrol	變 質	微毒, 甲状腺腫 1日3次0.12; 又 Jodform代用
Jodostarin	沃得斯他林			Diiodtartarin acid	,,	1日0.5~2.0g
Jod-Polytamin	沃得池利 他命	ヨードポリ タミン		含有0.3%Jod, polytamin	造 血	1次5~10cc
Jodtetragnost				同 Natrium Tetrajodoph- enolphthalein		

藥 物 名	中 文 名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Iodum				同 Iodum		
Jukuromin	有克魯命	ニコロミン		CaCl ₂ 2% NaBr 5~10%	消 炎 鎮 靜	瘡癤 5~10cc靜注
Junghorn		ユングホルン		尿製男性Hormone	男性器發育	1日1~2cc皮注
Jvaela	有貝拉	ユベラ		小麥胚芽製 Vit. E劑	抗不妊	朝夕2次3~5錠
Kali causticum				同 Potassii Hydroxidum		
Kalium bicarbonicum				同 Potassii Bicarbonas		
" bitartaricum				同 ,, Tartaras Acidus		
" bromatum				同 ,, Bromidum		
" carbonicum				同 ,, Carbonas		
" chloratum				同 ,, Chloridum		
" chloricum				同 ,, Chloras		
" iodatum				同 ,, Iodidum		
" Natrium tartaricum				同 Sodii et Potassii Tartras		
" Nitricum				同 Potassii Nitras		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Kalium permanganicum				同 ,, Permanganas		
„ sulfo-guajacolicum	癩瘡木酢 硫酸鉀	グアヤコール スルホン酸カリ (チオコール)	Potassium guaiacolsulphate	$C_6H_3(OH)(OCH_3)SO_3K$	体内防腐	結核、下痢 1日3~6次0.5~2.0g; 20cc静注
„ sulfuratum				同 Potassa Sulphurata		
„ sulfuricum				同 Potassii Sulphas		
„ tartaricum	酒石酸鉀	酒石酸カリ	Potassium tartarate	$C_2H_4(OH)_2(CO_0K)_2$	利尿, 緩下	1日數次1~2
Kellikrein				Pankreas-Kreis-lauf hormon	血圧降下抗-Adrenalin	毎日2次 1/2 Amp 筋注
Kamala	カ馬拉	カマラ	Kamala	Rottlerin Bisliotoxin	蟻蟲驅除	1日2次3~5g
Kaolinum	白陶土	白陶土	Kaolin	$Al_2(HSiO_4)_2 \cdot H_2O$		賦形劑
Kativ	カチーフ	カチーフ		Vit. K	止 血	1次1~2cc皮, 筋注
Kavidol	カ維得兒	カウイドール		J, Bi, CaCl ₂ , 樹脂	收 斂	痔疾, 坐劑
Kei-mag	珪 鎂	珪 マ グ		Mag-silicate 95% Magnesia 5%	制 酸	1日3次0.5~1.0g 食間
Kengol		ケンゴール		同 Uiron		
Kharsivan				同 Arsenobenzolum		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Kharsulphan	卡爾素兒方			同 Myosalvarsan		
Klimakton	克里馬克屯			卵巢-Ext., Bromral 甲狀腺Ext., Dicalcitol	月經調整	月經閉止期 1日3次2錠
Klimaseñan	克里馬塞蘭	クリマセダン		卵巢, 甲狀腺腺下 垂體前葉, Verosecin,	..	1日3次 3~4錠
Koagulen	可阿古林			Blood-Lypoid; 骨髓製劑	止血	內服—2~3g 皮注—30cc
Kocal	可卡兒	コーカール		同 Calcicol		
Kembefin	隈貝丁			k-Strophanthin	強心	0.25~0.3mg 藥注
Kriobin	克利歐濱	クリオビン		Terebinthinae, Eucupin 其他	刺戟療法劑	癩, 濕疹 1週2次1cc 筋, 皮注
Kuronin	克羅寧	クーロニン		同 Calcirin		
Lacarnol	拉卡爾諾爾			循環系 Hormone	強心	狹心症 1cc 皮筋注
Lactiferin	拉克其非林	ラクチフェリン		胎盤Lypoid	催乳	醫防3.5cc 皮注1cc 內服1日3次1~2錠
Lactin	拉克丁	ラクチン		同 Biofermin		
Lactoleber	拉克托列德	ラクトレバー		Vit. L, Vit. B.	催乳	產褥中 1日3次3g 食開
Lactophenin	拉克托飛寧			NH-COOH(OH)-CH ₃ ○ CO ₂ H ₅	鎮痛	流感, 傷寒 賢斯 1日1~2g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Lactostase	拉克托斯他	ラクトスタゼ		同 Biofermin		
Lactosum	乳 糖	乳 糖	Lactose	$C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$	營 養	賦形劑
Lactvitan	拉克托丹	ラクトビタン		Vit. C劑	Vit. C補給	乳兒用 授乳時1錠
Lactylphenetidinum	乳酸鹽安 基萊乙酯	ラクテルフ ニネチデン	Lactylphenetidine	$C_6H_4 \begin{matrix} \text{OC}_2\text{H}_5 \\ \text{NH}-\text{CO}-\text{CH} \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	鎮 痛	1日3次0.5~1.5g
Laevulosum	果 糖	果 糖	Fructose	$C_6H_{11}O_6$	營 養	糖尿病
Laktoflavin	拉克托濱			Vit. B ₂	發育促進	2cc 筋注
Langerin	莫給林	ランゲリン		Insulin 注射液	此Insulin 作用緩弱	1日3次2~3錠 8日連用
Larostidin				同 Isulcus		
Landanon	拉烏倫澀			同 Alcaloidum Opii hydrochloricum		
〃 -Atropin	阿托品			Landanon 0.02 Atropin 0.0005	Ice 鎮痛，鎮痙	0.5~1.0cc皮注
Lauamin	拉烏明	ラウミン		Luminal, KBr, Migraenin	鎮 靜	0.4~0.6頓用； 皮，筋注
Laxaphen	拉克沙分			葡萄糖0.52 柳酸0.39	瀉 下	單含30.0cc 5~10cc
Laxatol	拉克沙托兒	ラキサトール		同 Phenovalinum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Lazal	拉薩兒	ラザール		$\begin{matrix} R \\ \\ CH_3 > N < CH_3 \\ \\ Cl \end{matrix}$	消 毒	昇汞代用, 手, 器具 1% 創傷 0.1-0.5%
Leber „Riken,,	列 笹 「理研」	レバ ー 「理 研」		乾燥肝臟粉末	強 壯	貧血症 1日2g分3
Lentin				同 Doryl		
Lienalin	利益那林	リエナリン		脾臟製劑	止 血	2cc皮注,
Lignum Guajaci	癭 瘡 木	癭 瘡 木 (グアヤク木)	Pock wood	Guaiaconic acid		原料
„ Picrasmae				同 Quassia		
„ Santali album	白 檀	白 檀	Sandal wood	α (β)-Santalol		白檀油原料
Limonada citrica	枸 櫞 酸 水	クエン酸リ モナーデ	Lemonade of citric acid	Citric acid 1.0 Syrupus 30.0 Aq 200.0	清涼止渴	1日數次
„ hydrochlorica	鹽酸檸檬水	鹽 酸 リモナーデ	Lemonade of hydrochloric acid	準前	”	”
Linimentum ammoniatum	氨 擦 劑	アンモニア 擦 劑	Ammonia liniment	Ammonia Ol. Sesami	皮柄刺戟	神經痛, 打傷 局部塗擦
„ Calcrias	石灰擦劑	石灰擦劑	Lime linim- ent	石灰水, 胡麻油	粘膜清淨	火傷, 瘡癩, 塗布
„ Camphorae	樟腦擦劑	カンフルオ レーフ油	Camphorat- ed Oil	Camphor Ol. Olivae	興 奮 鎮 痛	1次1~2cc皮注, 神經痛一塗擦
„ Chloroformii	氣仿擦劑	クロホル ム 擦 劑	Chloroform liniment	Chloroform; Linim.-Camph.	鎮 痛	神經痛 塗擦

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Linimentum saponatocamp-horatum	肥皂樟腦劑	石鹼カンフル擦劑 (オポデルドック)	Gpodeldoc	Alcohol, Camphor, soap	皮膚刺激	神經痛, 癱瘓質斯塗擦
Linum	亞麻仁	亞麻仁	Ljussed	粘液, 亞麻仁油	粘滑劑	含嗽瀉腸10%(煎)
Lipatren	利巴托連			Lypoid; yatoren	刺戟療法劑	內用, 筋注
Lipiodol	利波得兒			20-40% Jod- 鹽粟油溶液	X線造影劑變質劑	梅毒, 腺疾患, 1日2-5Capsule
Lipolysin	利泡里金			卵巢其他	肥伴病治療	1日3次1-3錠食後 每日・隔日1cc皮注
Liquor Adrenalinae Hydrochloridi	鹽酸腎上腺素溶液	鹽酸ニピレナミン液 (アドレナリン)	Solution of Adrenaline hydrochloride	Adrenaline	血管收縮	外用— 1.000-15.000倍 皮注—1次 0.1-1.0cc
" Ammonii acetici	醋酸錫溶液	醋酸アンモン液 (ミンデル精)	Spirit of mindererus	CH ₃ -COONH ₄	發汗, 利尿	1日3次3-5g 2-5%—含嗽, 罌法
" Aluminii-acetici	次磷酸鉛溶液	醋酸アルミニウム液	Solution of aluminium acetate	Al(OH)(CH ₃ CO ₂) ₂	收 斂 性 毒 消	耳鼻喉, 子宮洗滌— 10-50倍 罌法—10%
" Ammoniae Dilutus	氨 水	アンモニア水	Ammonia water	NH ₄ OH	興 齊	0.1-0.5g—內服 (永) 刺傷拿布
" Arsenicalis	亞砷酸鉀液	亞砷酸カリ液 (ホーレル水)	Fowler's Solution	KAsO ₂	變 質	皮膚炎, 神經症 1次0.05-0.3g
" Fowleri				同前		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Liquor Baelzi	俾魯支水	ベルツ水		同 Liquor Kali glycerinatus		
" Calci chlorati	氯化鈣液	氯化カルシウム液	Solution of Calcium chloride	CaCl ₂	消炎、止血、變質	1~10% 20cc 靜注
" Calci Hydroxidi	石灰水	石灰水	Lime water	Ca(OH) ₂	制酸、止血、收斂	1日 50~100cc 内服 火傷塗布
" Cresolis Saponatus	木樹精石鹼液	クレソール石鹼液	Lysol	Cresol	消 毒	3~5%
" Epinephini hydrochloridei				同 Liquor Adrenalinae Hydrochloridei		
" Ferri Perchloridi	氯化高錳液	氯化第二錳液 (過プロール酸液)	Solution of Ferric chloride	FeCl ₃	止 血	1日 2~10滴 (内) 細花浸漬貼用
" sesquichlorati				同前		
" Formaldehydi	蟻醛液	ホルマリン (ホルムアルデヒド液)	Solution of formaldehyde	H-CHO	防腐、消毒	0.1~1.0%
" Gelatinae sterilis fusa	凝固膠液	凝 固 膠 液 ゼラチン液	Sterilized solution of gelatin	Gelatin	止 血	10~40cc 皮注
" Hoffmanni				同 Spiritus Aetheris		
" Hydrogenii Peroxidi	過氧化氫液	過酸化水素水	Solution of hydrogen peroxide	H ₂ O ₂	殺菌、消毒	洗滌 1~3% 含嗽 5~10%

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Liquor Hydrogenii peroxidati				同前		
" Iodi Fortis	碘 劑	ヨードテンキ (ヨード精)	Strong tinctura of iodine	I ₂	消毒 鎮痛, 消炎	内用1~3滴加水用 外用一創傷塗布
" " Mitis	稀 碘 劑	稀ヨード チンキ	Weak solution of iodine	"	"	"
" Iodi compositus				同 Liquor Lugoli		
" Kali caustici				同 " Potassii Hydroxidi		
" " glycerinatus	甘油卸液	グリセリンカ リ液 (ペルツ 水)	Solution of potassium-glycerin	Glycerin KOH C ₂ H ₅ OH	皮膚軟化	外用塗布
" Kalii acetici	醋酐液	醋酸カリ液	Solution of potassium acetate	CH ₃ -COOK	利尿	1日2~3回2~10g
" " arsenicosi				同 Liquor Arsenicalis		
" Lockei	羅克氏液	ロツク液	Lock's Solution	NaCl, KCl, CaCl ₂ NaHCO ₃ Dextrose	營養, 強心	300~1,000 皮, 筋, 靜注
" Lugoli	複方碘液	ルゴール液 (複方ヨード 液)	Compound solution of iodine	I ₂ -1.0 KJ-2.0 水-27.0	殺 菌	咽喉炎, 塗布
" Natrii chlorati physiologicus				同 Liquor Sodii Chloridi Physiologicus		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Liquor Plumbi subacetici	次醋酸鉛液	次醋酸鉛液 (鉛 醋)	Solution of Lead sub-acetate	$PbAC_2 + PbO \cdot H_2O$	收 斂	1~2% 塗法
" Potassii Hydroxidi	氫氧化鉀溶液 (苛性鉀溶液)	カリ 液液	Solution of Potassium hydroxide	KOH	腐 蝕	外用 試藥
" Ringeri	林格兒液	リンゲル液	Ringeri's solution	$NaCl-8.0$ $CaCl_2-0.2$ $KCl-0.075$ 水-1,000 $NaHCO_3-0.1$	緊急補血	200~1,000 皮注, 靜注
" Sodae Chlorinatae Chirurgicæ	含氯醇溶液	デーキン氏液	Dakin's solution	澱粉, 次亞氯酸鈉, 硼酸	消 毒	創傷塗布,
" Sodii Chloridi Physiologicæ	生理氯化鈉溶液	生理食鹽水		NaCl 0.9%	緊急補血	皮注, 靜注
Lithargyrum				同 Plumbi Monoxidam		
Liver Extract	肝臟浸膏			肝臟浸膏	造 血	貧血症 1日3~6g
Lobelinum hydrochloricum	鹽酸北美山梗菜鹼	鹽酸ロベリン	Lobeline hydrochloride	Herbæ Lobeliae之成分	呼吸興奮	1% 1cc 筋注
Localein		ロカレイン		同 Novolamin		
Loreton				同 Yafren		
Lubrokal	爾不羅卡兒			KBr 0.6 Luminal-Nat. 0.04	鎮 靜	癲癇, 不眠 1次1~2錠

藥 物 名	中 文 名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Luestin	爾登斯丁	ルエステン		Hg(CN) ₂ -HgJ	驅 蟲	500靜注， 0.5~1.0cc—筋注
Luminal	魯米那兒			同 Phenobarbitalum		
Lusil	爾季兒	ルジール		同 Sulfaminum		
Luteinol	爾特伊諾兒	ルテイノール		水溶性牛卵巢黃體製劑	月經調整	皮注
Lutren	爾托連			黃體 Hormone 油溶液	月經抑制	月經過多 1cc筋注連用
Lycopodium	石松子	石松子	Lycopodium	Phytsterin		丸衣 撒布料
Lynosol	利森索兒	リノゾール		Calcium Guaiacol-Sulphonic.	腸內殺菌	注 3% ² ~3cc皮注 末 1~2g 1日5次
Lypase	利巴眼	リバーゼ		脂肪消化酵素		1日0.5~1.0g
Lysol	來索爾	リゾール		Cresol 綠石鹼 >等量	消 毒	皮膚—20倍 器具—20倍
Macnin	馬昔寧	マクニン		海人草製劑	驅 蟲	1回1~2g
Macuron		マキユロン		同 Mercurochrome		
Madarmon	馬伦爾蒙	マグルモン		酵母，消化劑	營養，消化	1日3次 0.5~1.0g食前
Magaton	馬克阿頓	マグアトン		MgSO ₄ 5%；加 Atropin	鎮痙，鎮痛	胃痙攣，胃潰瘍， 1次10~20cc靜注
Magbron	馬季克龍	マグブロン		Brom-Magnesium-Urea MgBr ₂	鎮 吐	1次10~20cc靜注 內—1日4~6cc分3

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Magnesia usta				同 Magnesii Oxidum		
Magnesii Carbonas Levis	炭酸 鎂	炭酸マグネシウム	Light magnesium Carbonate	MgCO ₃	制酸，緩下	内—1次 1.0~3.0g 撒布料
” Oxidum	煅製 鎂 (氧化鎂)	マグネシウム (煅製マグネシウム)	Magnesium Oxide	MgO	”	内—1日 3次 0.5~3.0 撒布料
” Sulphas	硫酸 鎂	硫酸マグネシウム (滷利鹽)	Epsom salt	MgSO ₄	緩 下	1日3次5~30g
Magnesium carbonicum				同 Magnesii Carbonas Levis		
Magnesium Citricum effervescens	沸騰 炭酸 鎂	沸騰炭酸マグネシウム	Effervescent magnesium citrate	MgCO ₃ Citric acid	緩下，清涼	1次5~10g 爲沸騰散
” peroxydatum	二酸化 鎂	過酸化マグネシウム		同 Petin		
” sulfuricum				同 Magnesii Sulphas		
Magnesol	馬克錠佐兒	マグネゾール		MgSO ₄ . Glucose	鎮痙，脱水	子痙，浮腫 20cc 靜，筋注
Magrol	馬克羅兒	マグロール		MgSO ₄ Nat-Benzoate	”	”
Mallophen	馬羅芬			同 Pyridium		
Malone!	馬羅那兒			同 Barbitalum		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Mapharsen	馬法生		Mapharside	m-Amino-p-hydroxyphenyl-arsine oxide	驅梅	劑量爲606之 $\frac{1}{10}$
Marfanil	馬爾法尼爾			$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{-O-SO}_2\text{-NH}_2$	抗化膿菌	同 Sulfamin劑
Mecholine	甲基醋 酸胆素		Mecholyl	Acetyl- β -methylcholina	血壓下降 ・流汗	雷諾氏病 皮注，肌注，
Medinal	瞭地那兒			Barbitalum solubile		
Mel depuratum	精製蜂蜜	精製蜂蜜	Purified mel	Dextrose Fructose	矯味	
Melubrin	瞭兒不林			Natrium Antipyrin-amino-methansulfonicum	解熱，鎮痛	機摩賓斯 內日1~2g 50%一度，靜注
Menthol	薄荷腦	薄荷腦	menthol	$\begin{array}{l} \text{CH} < \text{CH}_2\text{-CH(OH)} > \text{CH} \\ & \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_2\text{-CH}_2 \\ & (\text{CH}_3)_2\text{CH} \end{array}$	鎮痛，制痒	1日0.02~1.0 ——水劑 散膏原料
Merbaphen				同 Novasrol		
Mercuriley		メルキレイ		同 Mercuriochromam		
Mercurimin	馬克利明			Chlormercuri-oxypopyl-theobromin	利尿	1~2cc，皮，筋 靜，注

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Mercurochrom- um	紅 (220)	マーキエロ クロム		Dinatrium-dibrom-hy- droxymercurifluorescein	消 毒	創傷塗布2~5%
Mercuriol	馬克羅芬			Nucrein Silver	白血球 增加	淋・結膜炎・中耳炎 用生理食鹽水溶液
"	"			核酸水銀	驅 殺	0.03~0.12g
Mercurphen	馬克羅芬			$\text{NaO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Hg}(\text{OH})-\text{NO}_2$	消 毒	
Mersalyl				同 Salyrgan		
Mesuroil	糜子羅兒			$\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_3-\text{COO}(\text{BiO})-\text{OH}$	驅 殺	1週1~2次1cc筋注
Metabolin	噠他保林	メタボリン		同 Vitamin B ₁		
Metaphyllin	噠他啡布林			同 Euphyllin		
Methenamina	噠特那明			同 Hexamina		
Methylamin	噠其拉明	メテラミン		同 Helmitol		
Methylenum coeruleum	品 青			同 Methylthioninae Chloridum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Methylis Salicylas	冬 綠 油 (柳 酸 一 酯)	サリチル酸メチル (冬綠油)	Methyl salicylate	$\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$	矯 臭	
Methylsulfonylum				同 Methylsulphonal		
Methylsulphonal	甲 基 砒 翁	メチルスルホナル	Methylsulphonal	$\text{CH}_3-\text{C}(\text{SO}_2-\text{C}_2\text{H}_5)_2$	催 眠	1次0.5~1.0
Methylthioninae Chloridum	硫 次 藍	メチレン青	Methylene blue	Tetramethylthionine chloride	殺 菌	神經痛、淋 内—1日 0.1~0.2 洗—2%
Metilon	密 其 倫	メチロン		同 Novalgin		
Metrasol	歐 托 拉 佐 兒			同 Cardiazol		
Migraeninum	米 古 列 寧	ミグレン	Antipyrin- caffeine citrate	Antipyrin 85% Caffein 9% Acid. citrici 6%	解 熱 鎮 痛	0.5~1.0g 頓 用
Migrelgin	米 古 拉 兒 金			Antiprin 88% Caffein 9% Acid. salicylici 3%	鎮 痛 利 尿	1次0.5g
Milanenon	米 拉 諾 伊 因	ミラノイニン		同 Milanol		
Milanol	米 拉 諾 兒			$\left(\begin{array}{l} \text{CCl}_3 \diagdown \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CO}_2-\text{CH}_2\text{CO}_2 \\ \text{CCl}_3 \diagup \end{array} \right)_3 \text{Bi}$	驅 瘧	1週2~3次 1~2cc 筋 注
Mileval	米 萊 巴 爾	ミレバル		同 Isacen		
Millional	米 利 歐 兒	ミリオナル		同 Disulfamin		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Minapon	米那蓬	ミナボン		同 Elbon		
Missmon	米斯蒙	ミスモン		卵巢製造細胞Hormon; 水溶性	女性器發育	1cc=1000~50.000 M. E 1cc皮注
Mitigal	滅疥	ミチガール		同 Thiantholum		
Mizuhonin	米子賀寧	ミヅホニン		Vit. B 複合體	抗脚氣	2cc皮, 筋, 靜注 末-1日3g 液-1日10c. c.
Mohiatropin		モヒアトロ ピン		同 Atmar		
Moljodol	毛兒沃得兒	モルヨドール		同 Lipiodol		
Monapon	毛那蓬	モナボン		同 Alcaloidum Opii hydrochloricum		
Morphinae Hydrochloridum	鹽酸嗎啡	鹽酸モルヒネ	Morphine hydrochloride	$C_{17}H_{17}NO(OH)_2 \cdot HCl$	鎮痛, 鎮痙	内-1日 0.001~0.03 注-1.0%皮注
Morphinum hydrochloricum				同前		
Moxol	毛克索兒	モクソール		Histotoxin	血管擴張	偉薩質斯, 喘息 皮, 靜注20cc
Mucilago Acaciae	亞拉伯膠漿	アラビゴム漿	Mucilage of Acacia	同 Acacia		
" Gummii arabici				同前		
Mucilago Salep	撒萊撲漿	サレツプ漿	Mucilage of Salep	同 Tuber Salep		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Mucilago Tragacanthae	西黄耆膠 漿	トラガント漿	Mucilage of tragacanth	同 Tragacantha		
Multin	穆魯欽	ムルチン		同 Omnadin		
Muphiran				同 Pitocin		
Musolin	穆索林	ムソリン		同 Ulixon		
Myoarsemin	妙阿賽民	ミオアーセ ミン		同 Myosalvarsan		
Myocanon	妙阿卡濃	ミオカノン		同 Lacarnol		
Myo-Ehramisol	妙阿益啞 梅佐元	ミオエーラ ミゾール		同 Myosalvarsan		
Myosalvarsan	阿阿斯凡 納明			Natrium Dioxydiamino- arsenobenzol-dimethan- sulfonat	驅 徵	有1~4歲 皮注
Myotonin	妙阿托寧	ミオトニン		惹苡仁之成分	神經痛劑	1次1~3cc筋注
Myrrha	沒 藥	ミルラ	Myrrh	樹脂，揮發油等	分泌抑制 收斂健胃	1日數次0.2~ 1.0g
Naphthalinum	萘因(並因)	ナフタリン	Naphthalene	$C_{10}H_8$	防腐，驅蟲	內—1日3次0.15~ 0.3 塗—10%油液
Narbin	納爾濱	ナルビン		肝臟製劑	造 血	1日1~2cc皮，筋注 未1日3回1.0g
Narcein	納爾卡因	ナルカイン		同 Pantocain		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Narcophin	納爾可芬			Morphin-narcotin-meconate	鎮 痛	皮注3%1cc 內用1日0.02~0.03
Narcopon	納爾可蓬	ナルコポン		同 Alcaloidum Opii hyd-rochloricum		
" Scopolamin	納爾可蓬 斯可彼拉氏	ナルコポン スコポラミン		Narcopon + scopolamin	鎮痛，麻醉	麻醉補助劑 手術前40分0.5~0.8cc皮注
Nargol	納 格 兒			Nucrein-silver	白血球增加	淋疾 1~2%
Narlon	納 爾 倫	ナルロン		同 Phonocasil		
Natrium aceticum				同 Sodii Acetat		
" benzoicum				同 " Benzoas		
" bicarbonicum				同 " Bicarbonas		
" bromatum				同 " Bromidum		
" carbonicum				同 " Carbonas		
" chloratum				同 " Chloridum		
" citricum				同 " Citras		
" jodatam				同 " Iodidum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Natrium nitros-um				同 Sodii Nitras		
„phenylæthyl-barbituricum				同 Phenobarbitonum Solubile		
„ phosphoricum				同 Sodii Phosphas		
„ salicylicum				同 „ Salicylas		
„ sulfo-phenolicum				同 „ Phenolsulphonas		
„ sulfuricum				同 „ Sulphas		
„ Tetraiodo-phenolphthal-ein					胆道X線造影劑	前日下劑投與，夕刻，膠球3~10個服用 10—16時間後攝影
„ thio-sulfuricum				同 Sodii Hyposulphas		
Natrum canstium				同 „ Hydroxidum		
„Neaborin	緩阿北林	ネアベリン		同 Novolamin		
„Nolkegan	緩爾克幹	ネルケガン		Sod. Oxymercuri-2-methoxy-4-allyl-phenoxy-acetate with Ba-rbiton	利 尿 曠 徵	第1次0.5cc 3日毎2cc靜注，

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
◦Nematol	餵馬托兒	ネマトール		Ol. Chenopodii	蛔蟲驅除	早朝20~30滴頓用 2時間後Ol. Ricini 服用。
◦Neo-Aflron	新阿得龍	ネオアフロ		同 Uliron		
◦Neo-Antimosan	新愛的摩斯			Sb(O ₂ C ₆ H ₂ -(SO ₂ Na) ₂) ₂ -Na	抗住血吸蟲	毎2日1cc-(5次) 3cc-(2次)5cc,(全 10次)筋注
◦Neoarsaminol	新阿爾敏 本諾兒			同 Neoarsenobenzolum		
◦Neo-Arsenoben- zolum				同 Neoarsphenamina		
" fortius	強新阿爾 凡諾明	強ネオアル ゼノベンゾ ール	Novarseno- benzene(st- rong)	同 Neoarsphenamina		但用量少
◦Neoarsphenami- na	新阿爾凡 諾明	ネオアルゼ ノベンゾール	"	As = As NH ₂ () () NH ₂ CH ₂ -O ₃ SNa OH OH	驅 殺	各號, 筋注
◦Neobistoran		ネオビスト ラン		同 Casbis		
◦Neocain	諾歐卡因	ネオカイン		同 Procainae Hydrochlor- idum		
◦Neodiarsenol				同 Neoarsphenamina		
◦Neo-Disseptal	新基世布 他兒	ネオデセプ ター		同 Salfathiazolum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Neodorm	諾歐得倫			$\begin{array}{c} \text{CH}_3 > \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \text{CO-NH}_2 \\ \\ \text{Br} \end{array}$	催 眠	1次1錠 (0.3g)
Neoshamizol	新益菴梅佐兒	ネオエーラメゾール		同 Neosarsphenamina		
Neo-Evanin	新也巴寧	ネオエバニン		桔梗根-Saponin 安息香酸鈉	祛 痰	末1日2~3g 液1日2~3cc
Neo Hatunon	新哈茲蘭	ネオハツモン		代謝酵素 Vit. B.	除去代謝 障礙劑	隔日1次1~2cc 皮注
Neo-Hormonal	新賀爾嗎那兒			脾臟抽出液	自働中興 毒性下劑	靜注用 筋注用
Neo-hypotonin	新黑保多尼	ネオヒボトニン		亞硝酸鹽	血壓降下	每3~5日 0.5~1.0cc皮注
Neo-Kansei	新 肝 精	ネオ肝精		鰵之肝成分； 牛胆汁酸	造 血	1日3次0.5~0.7g
Neokarsivan				同 Neosarsphenamina		
Neo-Parantrin	新巴拉透林	ネオパラストリン		同 Vitamin B ₁		
Neopirin	緩歐匹林	ネオピリン		$\text{O}-\text{C}(\text{OCH}_3)_2 \\ \\ \text{COO}-\frac{1}{2}\text{Ca}$	溶解(水溶 性)	1日1.5g
Neo-Poleon	新泡列歐恩	ネオポレオン		H ₂ N-O-SO ₂ NHCOCH ₃	抗化膿菌	水溶性，能多量使 用， 靜注
Neo-Raminon		ネオラミノン		同前		
Neos A(B)	緩歐斯A	ネオスA(B)		Ca(IO ₃) ₂	變質，強壯	結核，佝僂病 B=小兒用，

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Neosalvarsan	新撒佛散			同 Nearsphenamina		
Neosaviol		ネオサビオール		同前		
Neo-Silber-Salvarsan	新銀撒佛散			Neosalvarsan Silber-Salvarsan	驅 殺	0.1~0.45g有5號 ，靜注
Neospirarsen	新斯匹拉爾鎮	ネオスピラルゼン		同 Nearsphenamina		
Neo-Spirosan	新斯匹魯散	ネオスピロザン		[Neo-Arsenobenzolam] fortins		
Neostibarsan	新思妻把兒散	ネオステバルサン		Arsphenamina, 配合Ag;Sb,	驅 殺	自 0.1g 漸增至 0.6g
Neo-Stibosan	新斯的波霜			$\text{NH}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SbO}(\text{OH})_2\text{-NH}_2$ (C_2H_5) ₂	熱帶病治療	Kala-azar, Leish- mania, cure 8次, 靜筋注
Neo-Tase	新他世	ネオターゼ		非引濕性 Diastase		
Neotropin	新透羅平			2-Butyloxy-2'-6'-diamino 5-3'-azopyridin	消 腫	膀胱炎, 腎盂炎 1日3次1~2錠
Neocid	諾伊細得	ノイチツド		同 Neo-Poleon		
Neocridin		ノイクリヂン		同 Acriflavina		
Neuralgin	諾伊拉爾金	ノイラルギン		柳酸, Pyramidon Urethan, Camphor	神經痛劑	局部1cc注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Neurarsin	諾伊拉兒津	ノレラルジン		Nat-glyceriophosphoricam, Strychnin Veronal	鎮 靜	神經衰弱 每日隔日10cc 靜注
Neurogin	諾伊魯金	ノイロギン		Antipyrin 水楊酸	鎮 痛	神經痛, 局所注
Neuromatin	諾伊魯馬丁	ノイロマチン		Phenol, 水楊酸	"	神經痛 癱瘓 斯局 可條注1日5cc以內
Neuronal	諾伊魯那兒			$\begin{matrix} C_2H_5 > C < Br \\ C_2H_5 > C < CONH_2 \end{matrix}$	鎮 靜	1日2~4g
Neutral	諾伊托拉兒	ノイトラール		Acriflavin 0.5% Albein 1%	殺 菌	膀胱炎, 尿道炎 1次5~10cc靜注
Neuzilon	諾伊季倫	ノイヂロン		同 Phonocasil		
Nikelgin	尼卡兒金			同 Ināramin		
Nipron	尼布倫	ニブロン		同 Salfaminam		
Nirvanol	暖文諾			$\begin{matrix} C_2H_5 > C < CO-NH \\ C_6H_5 > C < NH-CO \end{matrix}$	催 眠 鎮 靜	不眠症 0.25~0.5g 頓服
Normaton	諾爾馬屯	ノルマトン		Nucleinic acid 之分解產物	血 壓 降 下	皮注 1日2cc 內服 1日3~6g
Normolactol	諾爾冒拉克透			乳酸, 乳酸鈉	陸 防 菌	5% 洗滌
Normosan	諾爾妙爾	ノルモザン		Al ₂ Si ₆ O ₁₅	吸 著 防 腐 收 斂	胃酸過多, 十二指 腸炎 每食前3g
Nosuprin	諾斯普林			2~4% Novocain 含有 Adrenalin	局 麻	齒科用 1~2cc 局所注

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Novalgin	諾巴爾金			Methyl-Melabrin	解熱，鎮痛	1日1~2g，1~2cc 靜，筋，皮，注
Novapon	諾巴噴	ノバポン		同前		
Novargan	諾巴爾幹			雲白質銀	尿道殺菌	0.2%
Novarsen				同 Neocarsphenamina		
Novasuro	諾巴支羅爾			$\begin{matrix} \text{Cl} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{OCH}_2\text{COONa} \\ \\ \text{Hg}-\text{C}_7\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_3 \end{matrix}$	利尿，驅蟲	第1次0.5cc每3日 2cc 靜注
Novatophan	諾巴托蘭			$\begin{matrix} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 > \text{C}_9\text{H}_4\text{N}-\text{COOC}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	解熱，尿酸 排泄	1日1.5~3.0g
Novocain	諾波卡因	ノボカイン		Procainae Hydrochloridum		
Novolamin	諾波拉明	ノボラミン		Procain Epirenamin	局麻	1~2cc局所注
Novoloform	諾波羅法爾 木	ノボロホルム		同 Benzocaina		
Novonal	諾波那爾			$\begin{matrix} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{matrix} \text{C}_3\text{H}_5 \\ \text{CO}-\text{NH}_2 \end{matrix} \end{matrix}$	催眠	1次0.5g
Novophyllin	諾波菲林			Theophyllin Aethylendiamin Luminal	利尿，血管擴張	狹心症，浮腫 1日3次1~2錠； 靜，筋注，

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Novopon	諾波噴			同 Alcaloidum Opil hydrochloricum		
Novoprotin	諾波普羅丁			植物性蛋白	非特異性 免疫劑	自0.2cc漸增至 1cc筋注、
Novotox				同 Procainae Hydrochloridum		
Nupercain	奴波開因	ヌペルカイン		$C_9H_5N \begin{matrix} \text{CONHC}_2\text{H}_4\text{-N}(C_2\text{H}_5)_2 \\ \text{OC}_4\text{H}_9 \\ + \text{HCl} \end{matrix}$	麻 醉	腰麻，粘膜炎 0.5% 1~2%
Natrimin	奴托利明	ヌトリミン		Vit. B複合體	抗脚氣， 發育，	1cc皮筋，筋注，末 1日5g；液1日20cc
Natrogen	奴托羅根	ヌトローゲン		磷，肝油，卵黃， Lecithin	強壯劑	肺癆，貧血，虛弱 食前，1日10~30g
Nax Vomica	番木鱗	ホミカ	Nax vomica	Strychnin Barcin	中樞神經 麻痺	消化不良—內用 製劑原料
Oeenta	歐專他			胎盤，腦下垂體前葉 浸膏，各Vit.	催 乳	1日3~4次 3~4g
Ochimon	歐其朋	オチモン		胃，十二脂腸之生理的有 效成分	食慾增進	內—1日0.5~1. 0g食前注—1日 1~2cc皮，筋，
Getinam	歐克丁			$\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-NH} > \text{CH-CH}_2\text{-CH}_2 \\ \\ (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH} \end{matrix}$	大小腸之 緊張低下	胃，腸痙攣， 皮筋注1cc 末1日 0.15~0.3g
Gestimon	愛斯季萌	エステモン		同 Estimon		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 份	主 作 用	用 途 及 劑 量
Gestroglandol	愛斯得魯 格真得兒			精胞Hormone	女性器發育	注，1週2~3次 1000~2000I. E. 内一日3~6錠
Ogardin	歐哥爾丁	オガルデン		同 Ommadin		
Ohma	歐 馬	オーマ		同 Petine		
Ohnes-T(-D,P)	歐饒斯-T	オーネス・ テイ		結核免疫元		T=治療用， D=診斷用， P=予防用，
Okinormol	歐其賀爾蒙	オキホルモン		α-Allyl Hormone, 胎 幼 出 Hormone	女性器發育	1日1次1cc皮注，
Oleo-Bi	歐列歐器			油酸鈣 12.5% 油酸液	驅 蟲	每週2~3次2cc筋 注， 1course 7~15次
Oleum Arachis	落花生油	落花生油	Pea-nut oil			膏劑原料
" Armeniacae	杏仁油	杏 仁 油	Apricot ke- rnel oil			製劑原料
" Aurantii Floris	橙花油	橙 花 油	Oil of oran- ge flowers	Pinea, 等	矯臭，矯味	水劑用，
" " Pericarpii	橙皮油	オレンジ油	Oil of orange	d-Limonen n-Decyaldehyd	"	"
Oleum Bergamo- ttae	香檸檬油	ベルガモツ ト油	Oil of bergamot	l-Linalylacetat d-Limonen	矯 臭	
" Cacao				同 Oleum Theobromatis		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Oleum Cajupati				同 Oleum Cajupati		
„ Cajuputi	白柴油	カヤブテ油	Oil of cajuput	Cajuputi; Terpineol	殺菌發汗,	發汗-1日0.5-2.0g 頭痛5%油塗擦
„ Camphorat- um				同 Linimentum Camphorae		
„ Caryophylli	丁香油	丁子油	Oil of clove	Eugenol	鎮菌痛, 健胃	傷痛患部挿入
„ Chenopodii	土荆芥油	ヘノボヂ油	Oil of chenopodium	Ascaridol	驅 蟲	1次0.5g
„ Chloroformii	氯仿油	クロロホルム油	Chloroform liniment	等量混合,	鎮 痛	神經痛, 德麻質斯塗擦
„ Cinnamomi	桂皮油	桂皮油	Oil of cassia	Zimmeridehyd	健胃, 驅風 矯味,	1次2-3滴
„ Citri				同 Oleum Limonis		
„ Citronellae		シトロネラ油	Oil of citronella	Geraniol Citronellol	矯臭, 防蟲 鎮痛,	2% Alcohol 液 塗布
„ Crotonis	巴豆油	巴豆油	Croton oil	Crotonol	浚 下	1次 $\frac{1}{2}$ -1滴
„ Eucalypti	桉葉油	ユーカリ油	Oil of eucalyptus	Eucalyptol	防腐, 刺殺	神經痛, 德麻質斯塗布
„ Foeniculi	茴香油	茴香油	Oil of fennel	Anethol	驅風, 矯臭	1次1-3滴
„ Gaultheriae	冬綠油			同 Methylis Salicylas		
„ Hydnocarp- i	大風子油	大風子油	Hydnocarpus oil	Hydnocarpic acid	治 癩	1次0.25-0.5g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Oleum Jecoris				同 Oleum Morrhuae		
„ Jodatum	碘化油	ヨード化油		同 Moljodol		
„ Lavandulae	薰衣草油 (拉芬大油)	ラベンデル油	Oil of lavender	Linalylacetat	矯 臭	
„ Limonis	檸檬油	レモン油	Oil of lemon	d-Limonen	矯味, 矯臭	
„ Lini	亞麻仁油	亞麻仁油	Linseed oil		瀉 下	瀉下—30~60g 火傷—塗布
„ Menthae	薄荷油	薄荷油	Peppermint oil	Menthol	興奮, 驅風 矯味,	1~5滴
„ Morrhuae	魚肝油	肝 油	Cod-liver oil	VitA, D	營養, 強壯	1日15~40g
„ Olivae	橄欖油	オリーブ油	Olive oil			製藥原料
„ Ricini	蓖麻油	ヒマシ油	Castor oil	Ricinolic acid	瀉 下	1次10~30g
„ Rosae	薔薇油	ローズ油	Oil of Rose	Genaniol	矯 臭	
„ Rosmarini	迷迭香油	ロスマリン油	Oil of rosemary	Terpen Pinen	刺 戟	擦劑
„ Santali	白檀油	サンタル油	Oil of Santal	Santalol	尿路防腐	淋疾 1日數次0.2~0.5g
„ Sesami	胡麻油	胡麻油	Sesame oil			代用OL.Olivae
„ Sinapis aethereum	揮發芥子油	揮發芥子油	Volatile oil of mustard	SCN-C ₃ H ₅	引赤, 覺醒	引赤—塗布 覺醒—稀薄吸入

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Oleum Sojae	豆 油	大豆油	Soy bean oil			製劑原料
" Terebinthinae	松節油	テレピン油	Oil of turpentine	d-Pinen	制止氣道分泌引赤	肺壞疽吸入，神經痛，擦劑
" Theobromatis	可可油脂	カカオ脂	Cacao butter			栓劑基礎劑
" Thymi	麝香草油	チミアン油	Oil of Thyme	Thymol	皮膚刺激	軟膏塗劑
" Zinci	氧化鋅油	亜鉛華 オレーフ油	Zink paste	Zinc oxide; Ol. Oliv. 同量混和	乾 燥	濕疹，火傷塗布
。Omnadin	櫻草納丁	オムナデン		非病原菌之新陳代謝產生蛋白，	非特異免疫	1次2cc 皮，筋注
。Omnicaïn	歐拜尼卡因	オムニカイン		同 Procainae Hydrochloridam		
。Omnigen	歐母尼根	オムニゲン		同 Omnadin		
。Omnin	歐母寧	オムニン		同前		
。Omnopon				同 Alcafoïdum Opii Hydrochloricum		
。Omorol	歐冒洛兒			銀蛋白	消 毒	創傷 Diphtherie 敷布；3%溶液
。Oophorin	歐賀林	オーホリン		卵巢實質製劑	女性器發育	1日2cc皮注， 1日3次1錠，
。Oophormin	歐賀爾明	オーホルミン		"	"	每日，隔日1次 1—2cc皮注，1日 1.0—1.5g分3食前

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Opacain				同 Natrium Tetraiodophenolphthalein		
Opium pulveratum	阿片末	阿片末	Powdered opium	Morphin Codein	鎮痛，止瀉	1次0.01~0.1g
Opodeldoc		オポデルドツク		同 Linimentum saponato-camproratum		
Oporeuin	歐泡列寧	オポレニン		同 Adrenalina		
Opostatin	歐泡斯他丁	オボスタテン		脾臟衰弱	止 血	2cc皮注 2日3次，1g内服
Oprival	歐布利兒	オブリバル		同 Acrinolam		
Orarcid	歐拉爾細	オラルチツド		同 Spirocid		
Orarson	歐拉爾孫			同前		
Orasthin				同 Pitocin		
Orhic substance	歐爾喜斯	オルヒス		睾丸衰弱	男性器發育	1日3次0.1~0.3g 隔日1cc皮注
Orexiu	歐列起辛			同 Phenazolinum tannicum		
Orthocaina	歐爾托卡因	オルトカイン	Orthocaine	$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}_3$ H_2N	局 麻	胃痛—1日數次0.5 ~1.0g 外用— 5~10%撒布
Orthoform	歐爾托賀木			$\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}_3$ HO	”	”

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
。Oryzae	歐利借	オリゼ		Aspergillus oryzae (紫 外線照射)	抗尙癩病	末—1日10~20g 錠—1日6~10錠
。Oryzanni	歐利扎寧	オリザニン		Vit. B複合體		1~2cc皮注, 末 1日6g; 液—1日20g
。 " Cryst. Sol.	歐利扎寧 結晶液	オリザニン 結晶液		同 Vit. B ₁		
。Oryzaviton	歐利扎比頓	オリザピトン		Vit. B ₁ ; Vit. C		1日1~1cc 皮, 筋, 靜注
。Osaminol		オサミノール		同 Spirocid		
。O-Sex-Hormon	歐塞克 斯賀蒙	オーセツク スホルモン		卵巢Hormone	女性器發育	1cc皮注,
。Osvanyl	歐斯巴尼兒	オスパニール		Bromural, Veronal Veronalpyramidon	鎮痛, 催眠	0.5~1.0g頓用
。Osvarsan	歐斯佛散	オスバルサン		同 Spirocid		
。Otalgan	歐他爾幹			Antipyrin; Ext. Opii Glycerin	鎮 痛	外聽道噴滴; 1日1~2次
。Otalginin				同前		
。Otitol		オチトール		同前		
。Otolysin		オトリチン		同前		
。Otreon				同 Ataxin		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
○Onabain	歐烏阿巴因			同 Uabanin		
○Ovahormon	歐巴賈爾蒙	オバホルモン		尿製造細胞 Hormone (水溶性)	女性器發育	適當單位loc皮， 筋，靜注，內服— 1日1~2g分3
"-Benzozat	安息香酸歐 巴賈爾蒙	オバホルモン ベンツアート		Oestronbenzozat (油溶)	" (強力)	每日，隔日loc 筋注
○Ovaraden	歐巴拉登			卵巢實質製劑	月經催進	1日3次1~2錠
○Ovarial	歐巴利阿兒			卵巢乾燥粉末	女性器發 育 調 整	1日3次0.4~1.0g
○Ovarian	歐巴利安	オバリアン		"	"	1日0.13~0.26g
" Residue Desiccated	乾燥卵 巢實質			無黃酸乾燥卵巢實質	月經催進	無月經 1日3次0.3~1.3g
○Ovarin Substance Desiccated				同 Ovarian		
○Ovarin	歐巴林	オバリン		同前		
○Ovastron	歐巴斯托龍	オバストロン		同 Ovahormon		
○Ovoglandol	歐碧格實得			卵巢實質製劑 (水溶性)	女性器調整	1日1~3Amp 皮注 1日3~5錠
○Overal	歐萊拉爾	オボラール		Vit. D	抗佝僂病	乳幼兒 每日2~3滴
○Oxarsan		オキサールサン		同 Spirocid		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Oxygolum concentratum	強過氧化氫	強オキソドール		H ₂ O ₂ -30%	殺菌	適宜稀釋
Oxygenium compressum	壓縮氧	壓縮酸素	Compressed oxygen	O ₂		呼吸困難 吸入
Pancreatinam	胰酸	パンクレアチン	Pancreatin	Trypsin, Lipase, Amylase	消化	1日數次 0.1-1.0g
Pangital	邦給他兒	パンギタール		Digitalis製劑	強心	液-1日2-3cc 注-皮下注 末-1日1.5-3g
Panopin	邦歐平	パンオピン		同 Alcaloidum Opii Hydrochloricum		
Pansecal		パンセカール		同 Acrical		
Panseptin		パンセプテン		同 Acriflavina		
Pansil	邦季兒	パンジール		同 Erytrin		
Pantocain	邦安開因			CH ₃ (CH ₂) ₃ NHCO ₂ - (CH ₂) ₂ N(CH ₃) ₂ -HCl	麻酔	尿道-0.1-0.5% 浸潤-0.05% 浸灌-0.5%
Pantopon	潘托蓬	パントポン		同 Alcaloidum Opii Hydrochloricum		
Pantopon-scopolamin	潘托蓬 斯可破拉民	パントポン スコポラミン		Pantopon 0.04 Scopolamin 0.6	鎮靜・麻酔 解熱補助	Typhus, 肺炎之興奮 -0.3cc 喉痛補助 0.5-0.7cc
Papain	巴巴因	ババイン		Carica Papaya 製蛋白質 化酵素	蛋白質消化	1日0.3-0.5g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Papavel		パバヴェール		同 Papaverin		
Papaverin	罌粟鹼			Tetra-methoxyhenyl-is-ocniolin	滑平筋之鎮痙	内1日0.04~0.1g 注 1cc 淨注
Paracodin	巴拉可津			Dihydrocodein	鎮痛，鎮咳	1次0.01~0.03g
Paraffinum Durum	石 蠟 (硬石脂)	パラフィン 固形パラ フィン)	Hard par- affin			有劑基礎劑
„ liquidum	液狀石蠟 (流動石蠟)	流 動 パラフィン	Liquid paraffin			灌腸料 有劑基礎劑
„ Molle Albam	白色凡士林 (白石脂)	白色ワセリン	White soft Paraffin			軟膏基礎
„ „ Flavam	黃色凡士林 (黃石脂)	黃色ワセリン	Yellow soft paraffin			„
„ solidum				同 Paraffinum Durum		
Paramid		パラミド		同 Sulfaminum		
Paramidyl		パラミヂール		同前		
Paranutrin	巴拉奴透林	バラヌトリン		Vit. B複合體		1日1~3cc皮，筋 注，末—1日3~6g 液—1日10cc
Parasitol	巴拉季透兒	バラジトール		同 Carboneum tetrachl- oratum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Parathyrenin	巴拉齊列寧	パラテレン		副甲狀腺浸膏	增加，調節 血中鈣分	注—1cc皮注 末1日0.02-0.05g 錠—1日1-3錠
Parathyroid Tablets	巴拉齊洛 伊得錠			副甲狀腺製劑	”	Tetanie, 痙攣 1次1錠
Pasta Sulfuris cum Pice liquida	爹硫膏	タールバスタ (爹硫膏)	Paste of tar and sulphur	Tar, S, ZnO, Lard.	皮膚病治療	患部塗布
Paviloin		パビロイン		同 Pavinal		
Pavinal	巴比那兒	パビナル		Dihydrocodeinon Hydrocotalmn	鎮痛，鎮咳	內—0.0025～ 0.01g 注—1cc皮注
” -Atropin	巴比那兒 阿託品	パビナル アトロピン		Pavinal 0.01 Atropin 0.0003	鎮痛，鎮痙	胆石，嘔吐 0.3～1.0cc皮注
” -Papaverin	巴比那兒 罌粟鹼	パビナル パバベリン		Pavinal-Atropin; Papaverin 0.02	”	1cc皮注
” -scopolamin	巴比那兒 斯可微拉民	パビナルース コボラミン		Pavinal 0.02 Scopolamin 0.0005	鎮痛，麻 醉補助	1cc皮注
Pavon				同 Alcaloidum Opii Hydrochloridum		
Pectamol “Hata”	培克他胃兒	ベクタモール 「ハタ」		Calcium Iod-quinine- salicylate	解熱消炎	每日，隔日 20cc靜注
Pestol		ベクトール		”	”	結核性疾患 20cc靜注
Pegnin	培克寧			Labferment	消化牛 乳蛋白	100cc—牛乳 加—1g
Pelanin	培拉寧	ペラニン		尿製濾胞 Hormone	女性器發育	A—(水溶) 皮注 B—(油溶) 筋注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
o.Pellidol	培利得兒			$\begin{array}{c} \text{N}(\text{COCH}_3)_2 \\ \\ \text{O} \\ \\ \text{N}=\text{N} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	殺菌・促進 上皮形成	尿道注入—5% 創傷—軟膏
o.Penicillin	青 黴 素			Penicillium notatum製劑	抗 Grem 染 色陽性菌， 淋菌	筋注每2—4時 5,000—10,000 單位，能靜注
Pepsinam saccharatum	含糖酸酶劑 (含糖胃液 素)	含糖ペプシン	Saccharated pepsin	pepsin	消 化	日3次0.5—1.0g
o.Perandren	培拉得連			合成男性 Hormone	男性器發育	1週1—2次1支皮 注・筋注
o.Percain	培爾卡因			同 Nupercain		
Pericarpium Aurantii	橙 皮	橙 皮	Bitter oran- ge peel	揮發油，	健 胃 味	製劑原料
Peripherminum		ペリフェル ミン		同 Saxyl		
o.Peristaltin	培利 斯他爾丁			Cortex Rhamni Purshianae之成分	緩 下	內—1次0.1—0.3g 筋注—皮筋，靜注
o.Perlatan	培爾拉單	ペルラタン		尿性濾胞Hormone	女性器發育	筋注—500— 1,000M. E. 內—1—2錠
o.Pernocton	培爾諾克屯			$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 = \text{C} - \text{CH}_2 \\ \\ \text{Br} \end{array} > \text{C} < \begin{array}{c} \text{CONNa} \\ \\ \text{COCH} \\ \\ \text{CO} \end{array}$	鎮靜催眠	催眠 10% 2—3cc 鎮靜 10% 1—6cc 靜注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Peronia	培羅寧			Bentylmorphin hydrochloride	鎮痛，鎮咳	1日0.02~0.04g
Petin	培汀	ベテン		過氧化錳	制酸	1次0.5~1.0g
Phenacetinum	非那西汀	フェナセチン	Phenacetin	Aceto-p-phenetidine	解熱鎮痛	1次0.25~0.5g
Phenazolinum tannicum	單寧酸非那宗林	タンニン酸フェナゾリン	Orexine tannate	Phenylidihydrochinazoline tannate	小兒健胃消化	小兒量 1日3次0.3~0.5g
Phenazonum	安替非林(非那宗)	アンチピリン	Antipyrin	Phenyl-dimethyl-pyrazolone	解熱，鎮痛	1日3次 0.5~1.0g
Phenobarbitalum				同 Phenobarbitonum		
Phenobarbitonum	因基巴魯	フェノバルビタール	Phenobarbitone	$C_6H_5 > C < \begin{matrix} CO-NH \\ CO-NH \end{matrix} > CO$	催眠，鎮靜	1次0.1g
" solubile	可溶性因基巴魯	溶性フェノバルビタール	Soluble Phenobarbitone	$C_6H_5 > C < \begin{matrix} CO-NH \\ CO-NNa \end{matrix} > CO$	"	內--1次0.1g 皮注--20%1cc
Phenocoll	非諾寇兒			p-Amino-acetophenetidin	解熱，鎮痛，發汗	百日咳，波羅賓斯 1日2g
Phenol	因醇	石炭酸(フェノール)	Carbolic acid	-OH	防腐，消毒	5~20% 器具消毒
" Liquefactum	液狀因醇	液狀石炭酸(液狀フェノール)	Liquefied phenol	"	"	"
Phenolphthaleinum	酚酞	フェノールフタレイン	Phenolphthalein	$(C_6H_4OH)_2C < \begin{matrix} C \\ O \end{matrix} > CO$	緩下	1次0.05~0.5g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Phenoquin				同 Cinchophennum		
Phenovalinum	非奴巴林	フェノバリン		Acetylphenolphthalein; Isovalerylphenolphthalein	緩 下	1日 0.6g
Phenylacetyl-barbituricum				同 Phenobarbitonum		
Phenyldimethyl-pyrazolonum salicylicum				同 Antipyriam salicylicum		
Phenylum salicylicum	柳 酸 因 (薩羅)	サリテル酸 フェニール (ザロール)	Pphenyl salicylate	<chem>Oc1ccc(O)cc1C(=O)O</chem>	腸 防 腐	1日3次 0.5~1.0g
Phonocasil	非諾卡孚爾	ホノカジル		$C_6H_7SO_2N_2-C_6H_5SO_2N$ $C_6H_7SO_2N_2-C_6H_5SO_2N$ >CO	同 Disulfamin	
Phosphorus	磷	黄 磷	Phosphorus	P	營 養	骨諸症、佝僂病、 1次0.0005g(丸劑)
Phnisol		フテゾール		同 Lyosol		
Physostigminae Salicylas	柳 酸 毒 素 扁 豆 素	サリテル酸エ ゼリン(サリ テル酸フィゾ ステクミン)	Eseric salicylate	Semen Physostigmatis 之成分	縮 瞳	點眼 0.25~0.5%
" sulphas	硫 酸 毒 素 扁 豆 素	硫酸エゼリン	Eseric sulphate	"	"	"
Phytin	菲 丁			Inosit-hexa-phosphoric- acid之Mg;Ca鹽	神 經 強 壯	佝僂病 1日1.0~1.5g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Pilocarpinum hydrochloricum	鹽酸正盧卡品	鹽酸ピロカルピン	Pilocarpine hydrochloride	Folia Jaborandi 之 Alkaloid	發汗，縮瞳	1~2% 0.5cc 皮下注 1% - 點眼
Pilula Aloes	蘆薈丸	ロカイ丸	Pill of aloes	Aloin	健胃，瀉下	緩下 1~2丸 瀉下 5丸
" et Ferri	蘆薈鐵丸	ロカイ鐵丸	Pill of aloes and iron	Aloe; 鐵	造血，瀉下	貧血症，便秘 1日3次 1~6丸
Pillae Acidi arsenicosi	亞砷酸丸	亞砷酸丸	Pill of arsenous acid	As ₂ O ₃	變質強壯	1次1丸漸增至5丸
" Aloes et Jalapae	蘆薈藥喇丸	ロカイヤラツバ丸	Pill of aloes and Jalap	Aloe; Jalap	緩下	1次2~5丸
" Creosoti	木溜油丸	クレオソート丸	Pill of creosote	creosote	食慾整腸	1日3次 2~4丸
" carbonici	炭酸木溜油丸	炭酸クレオソート丸	Pill of creosote carbonic	Creosotum carbonici	"	"
" Ferri et Chinini	規鐵丸	規鐵丸	Pill of iron and quinine	還元鐵・規那	補血強壯	1日3次 1~3丸
" Rhei compositae	複方大黃丸	複方大黃丸	Compound pill of rhubarb	Ex. Aloe; Ex. Rhei Resina Jalap	健胃，緩下	1次2~3丸
Pinealgland Tablet	匹尼兒錠			幼牛松果腺製劑	予防早熟	早熟症 1次1錠連用
Piperocainum				同 Eucainae Hydrochloridum		
Pisul "Comet"	匹索兒	ピソール「コメット」		Vit. B複合體		皮下注・靜注，末-1日 3~6g，液-1日 10g
Pistin		ピスチン		同 Takalidin		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Pitocin	腦下垂體後葉素	ピトシン		腦下垂體後葉 Hormone	子宮收縮	陣痛微弱 2-3I. E. 皮、筋注
Pitaglandol	匹知諾莫得			"	"	陣痛微弱、腸管麻痺、產科用、外科用共皮注、
Pituglasin		ピツグランシン		同前		
Pituitrin	匹知意詩林	ピツイトリン		同前		
Pitu-Renin	匹知列寧	ピツレニン		腦下垂體後葉+副腎 Hormone	氣管擴張 血壓亢進	氣管枝喘息發作時 1cc皮注
Pix liquida	木焦油	木タール	Tar		防 腐	塗布
Planadalin				同 Carbromalurn		
Planocaine				同 Procainae Hydrochloridum		
Plasmochin	柏拉斯哥因		Pamaquine	$\text{CH}_3\text{CH}-(\text{CH}_2)_3-\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ $\text{NH}-\text{C}_9\text{H}_5\text{N}-\text{OH}_3\text{C}$	Malaria-gameten 體有効	1日3次 0.02g 5日連用 3日休、4日服藥
Plenin		プレニン		同 Sulfaminum		
Plambi Acetas	醋酸鉛	鉛 糖	Lead acetate	$\text{PbAc}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	收 斂	1-2% 電法
„ Monoxidum	氧化鉛	一酸化鉛 (蜜佗倫)	Litharge	PbO		膏劑原料

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Plumbum aceticum				同 Plumbi Acetas		
" oxydatum				同 " Monoxidum		
P-Marukotin	培馬爾古丁	ペーマルコチン		類似 Pavinal		
Poleon	泡列恩	ポレオン		同 Uliran		
Polyfermin	泡利費明	ポリフェルミン		乳酸菌 蛋白消化菌	防 止 異 酵	1日1~3g食後
Polytamin- Liquid	液狀泡利他明	液狀ポリタミン		Polytamin; Ferri- Glycerio-phosphorate	造 血	1次1cc
Polytamin puriss	泡利他明	ポリタミン末		動物性蛋白之消化體	營 養	1日2~3g
Ponsil	蓬季兒	ボンジール		同 Sulfaminum		
Pontocain				同 Pontocain		
Potassa Sulphurata	硫 肝	硫化カリ	Salphurated potassa	$K_2S_3; K_2S_2O_3$	角質溶解	疥癬 0.1~10%洗液
Potassii Bicarbonas	重碳酸鉀	重碳酸カリ	Potassium bicarbonate	$KHCO_3$	制 酸	1日數次 0.5~1.0g
" Bromidum	溴化鉀	ブロムカリ	" bromide	KBr	鎮 靜	1日3次 0.5~2.0g
" Carbonas	碳酸鉀	炭酸カリ	" carbonate	K_2CO_3		瀉風、瀉麻質斯 1日3次0.1~1.0g
" Chloras	氯酸鉀	鹽素酸カリ	" chlorate	$KClO_3$	防 腐	口腔炎 2~5%含漱

薬物名	中文名	日名文	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
„ Chloridum	氯化鉀	鹽化カリ	„ chloride	KCl	利尿	Liq. Ringeri 原料
„ Hydroxidum	氫氧化鉀	苛性カリ	Caustic potash	KOH	腐蝕	30~50%塗布 試藥
„ Iodidum	碘化鉀	ヨードカリ	Potassium iodine	KI	變質	1日3次 0.1~1.0g
„ Nitras	硝酸鉀	硝石	„ nitrate	KNO ₃	利尿	1日數次 3~9g
„ Permanganas	高錳酸鉀	過マンガン酸カリ	„ permanganate	KMnO ₄	消毒	洗滌 0.05~0.5% 含熱 0.01~0.05%
„ Sulphas	硫酸鉀	硫酸カリ	„ sulphate	K ₂ SO ₄	瀉下	下劑 1日數次 1~2.5g, 製劑原料
„ Tartras Acidus	重酒石酸鉀	重酒石酸カリ (精製酒石)	„ bitartrate	CH(OH)COOK CH(OH)COOH	瀉下, 利尿	緩下 1次 3~5g 利尿 1日數次 0.2~2.0g
„ Praehormon	普雷賀爾蒙	プレホルモン		腺下垂體前葉 Hormone	男女性器發育調整	自1日100E漸增
„ Prematonin		プレマトニン		同 Thyrophysine		
Procainae Hydrochloridum	鹽酸普魯卡因	鹽酸プロカイン	Procaine hydrochloride	$\text{NH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{C}_2\text{H}_4\text{N}-\begin{matrix} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \diagdown \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	局麻	1~2% 皮注
„ Progynon	普羅給濃			尿製濾泡 Hormone (油性)	女性器發育	1日50~20,000M. E. 1日2~3錠
„ Projod	普羅沃得			牛乳蛋白 碘化合物	變質	鹽化, 甲狀腺肥大 1日10~20錠
„ Prolan	普魯蘭			尿製性上位 Hormone	男女性器發育	防注 1日1~2cc 內服 1日2~3錠

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Proluton	普魯爾頓			黃體 Hormon	保護妊娠	月經過多 1次1支筋注
Prominal	普魯米那兒			$\begin{matrix} C_2H_5 & & CO-NH \\ & \diagdown & / \\ & C & \\ & / & \diagdown \\ C_6H_5 & & CO-NCH_3 \end{matrix} > CO$	鎮靜	癲癇 1H0.2~0.4g
Pronbal		プロンバル		同 Sulfaminam		
Pronsepal		プロンセル		同 Neopoleon		
Prontosil album				同 Sulfaminam		
Prontylin				同前		
Proponal	普魯蓬那兒			$\begin{matrix} C_3H_7 & & CO-NH \\ & \diagdown & / \\ & C & \\ & / & \diagdown \\ C_3H_7 & & CO-NH \end{matrix} > CO$	催眠	1次0.1~0.3g
Proseptasine				同 Septazine		
Proseptia				同 Septazine		
Prostigmin	普羅司的明			$C_6H_4 < \begin{matrix} OCG-N(CH_3)_2 \\ N(CH_3)_3-SO_2CH_3 \end{matrix}$	丸進腸蠕動	手術後腸管麻痺 慢性便秘 1cc皮注
Pro-Sulfamin	普爾佛斯命	プロスルファミン		$NH_2 \circ SO_2-N(Na)_2$ (水溶性)	同 Sulfaminam	
Protamylase		プロタミラーゼ		同 Pancreatinam		
Protargol	普魯塔格兒			同 Argentinum proteinicum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Psicain	普西卡因			d- <i>c</i> -Cocain-bitartrate	麻 醉	精液麻醉 2~5% (耐煮沸)
Eubergen	普培羅根	アペローゲン		尿製上位Hormone	性器發育	1日1~2次皮注
Pulpa Tamarindi depurata		精製タマリ ンド	Purified tamarind	酒石酸；糖	緩 下	1次25~50g
Pulvis aerophorus	湧騰散	湧 騰 散	Effervescing powder	重曹 2g 酒石酸 1.5g	”	御藥時服用
,, aromaticus	芳香散	芳 香 散	Aromatic powder	桂皮，小豆蔻，生薑	健胃，驅風，矯味	1日數次 0.3~1.0g
,, Doveri				同 Pulvis Ipecacuanhae et Opii		
,, Ipecacuanhae et Opii	托氏散(復 葉根散)	ドーフル散	Dover's powder	Opium Ipecacuanha	止瀉，鎮咳	1日0.5~1.5g
,, Stomachicus	健胃散	健 胃 散	Stomachic powder	NaHCO ₃ ; Herba Swertiae	健胃，制酸	1日數次 0.5~1.5g
,, Zinci cum Amylo	銻華澱粉	亞銻華澱粉		ZnO Amylum 等量	乾 燥	撒布
Pyrosalin	匹諾札林	ピノザリン		○-GOJ-○-NH-CC-NH ₂	解 熱	1日1.5~2.0g
Pyribitalum	匹拉必它爾	ピラビタール		Veronal Pryamidon	鎮痛，催眠	頓用0.3~0.5g 皮注
Pyramidon	匹拉米洞	ピラミドン		同 Aminopyrinum		
Pyretin	匹列丁	ピレチン		同 Novalgin		
Pyrezon		ピレゾン		同 Sulfaminum		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Pyridium	西利能穆			$H_2N-C_5H_2N < \begin{matrix} N:NC_6H_5 \\ NH_2, HCl \end{matrix}$	尿路防腐	淋、口内炎；皮注 内服1日0.3~0.6g 外用.05~1.0%
Pyriform		ピリホルム		同 Yatren		
Pyripan		ピリパン		同 Pyridium		
Pyriseptin		ピリセブテン		同 Sulfapyridin		
Pyrogallolum	焦性没食子酸	ピロガロール	Pyrogallol	$C_6H_3(OH)_3(1,2,3)$	還元性皮肉腐	皮膚炎塗布 10%軟膏
Quassia	苦木	苦木	Japanese quassia	Quassin	苦味健胃	1日數次1~2g
Quiaapon	規那朋	キナボン		規那, Coffein, Strychnin, Uretan	解熱	1日1次2~5cc 解.皮注.
Quinidine	奎寧精			Chinin之異性體	強心	自0.2g漸増0.3g 一日3次
Quininae et Aethylis Carbonas	乙醣炭酸奎寧	エチル炭酸キニーネ	Equinine	$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_{20}H_{23}N_2O$	解熱. 強壯	1次0.5~1.0g
Hydrochloridum	鹽酸奎寧	鹽酸キニーネ	Quinine hydrochloride	$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$	原形質毒	Malaria 1日4次 0.3 8日連用
Sulphas	硫酸奎寧	硫酸キニーネ	" sulphate	$(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2H_2SO_4$	"	"
Tannas	鞣酸奎寧	タンニン酸キニーネ	" tannate		"	1日數次1~2g
Quinophenium				同 Cinchophenam		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Quinophenyl		キノフェニール		同 Atophenyl		
Racedrin				同 Eph. tonin		
Radix Colombo				同 Calumba		
„ Derridis,	毒魚藤	デリス根	Derris root	Rotenone	治疥，殺昆蟲	浸液擦入
„ Gentianae				同 Gentiana		
„ „ scabrae	龍膽	龍膽	Japanese gentian	Gentiopicrin Gentianose	苦味健胃	1日數次 0.3—1.5g
„ Hibisci	黃蜀葵根	黃蜀葵根	Hibiscus	Araben Gelactan	刺激緩和	腸炎 10%煎劑 丸劑賦形藥
„ Ipecacuanhae				同 Ipecacuanha		
„ Liquiritiae				同 Glycyrrhiza		
„ Platycodi	桔梗根	桔梗根	Platycodon root	Kikyo saponin	祛 痰	1日4g煎劑
„ Polygalae	遠志	遠志	Polygala	Polygalit	„	同 Senega
„ Sarsaparillae	撒爾撒根	サルサ根	Sarsaparilla	Sarsasaponin, Perillin	變 質	1日20—50g煎劑
„ Senegae				同 Senega		
Redoxon		レドキソン		同 Cantan		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Reformin		レホルミン		同 Coramin		
Region	列給恩	レギオン		同 Neo-poleon		
Ramijin	雷米津	レミチン		Aethylhydrocaprein	原形質毒	肺炎—1日1.5g毎 2時、眼科應用
Renarcol	雷那可			CBr_3-CH_2OH	同 Aver- tin	
Rephrin	列弗林			人工. Adrenalin; Epnetonin	氣管擴張	1cc皮注
Resina Jalapae	茛菪脂	ヤラツバ脂	Resin of jalap	Convalvalin	健胃、瀉下	健胃1次0.03— 0.1g 瀉下1次 0.2—0.5g
„ Phorbittidis	牽牛子脂	牽牛子脂	Kaledana resin	Pharbitin	瀉 下	1次0.1—0.3g
Resorcinol	間位二元醇 (雷環辛)	レゾルシン	Resoleinol	$HO-C_6H_3-OH$	防 腐	皮膚炎—3—15% 軟膏 尿道—2—5%
Resorcinnam				同前		
Rheum	大 黄	大 黄	Rhubarb	Rheumemodin, Rhein	健胃、緩下	1日數次 0.3—1.0g
Rhizoma Coptidis	黄 連	黄 連	Japanese coptis	Berberin	苦味健胃	1日3次0.5 (浸)
„ Filicis				同 Filixi Mas		
„ Hydrastidis	北米黄連根 (金印草根)	ヒドラスチ ス根	Hydrastis	Berberin Hydrastin	止 血	子宮出血 用浸膏

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Rhizoma Iridis	依利斯根	イリス根	Iris	Iridin	矯 臭	
„ Pinelliae	半 夏	半 夏	Pinellia	揮發油	鎮 吐	惡阻 8—15g (煎)
„ Rhei				同 Rheum		
Rhizoma Scopoliae	東莨菪根	ロート根	scopolia	Hyoscyamin, Scopolamin	鎮痙, 鎮痛	1次0.01—0.05g
„ Todaiwo	唐大黃	唐大黃	Todaiwo	Emodin	同大黃 (Rheum)	
„ Valerianae				同 Valeriana		
„ Zedoary	莪 茂	莪 莖	Zedoary	Sineol	健 胃	0.5—1.5g
„ Zingiberis				同 Zingiber		
Rhodan-Diucalcin	羅 彈 吉 烏 卡 欽	ロダンチウ カルチン		Diucalcin 5.0 KSCN 1.0	血 壓 降 下	1日3次0.5g
„ Rimaon	雷 瑪 恩	リマオン		同 Acrinolam		
„ Rivanol	雷佛諾爾			同前		
„ Rivasepon		リヴァセポン		同前		
„ Rodealin	萬年青素	ロデアリン		Rodea Japonica之成分	強 心 利 尿	心臟機能不全、浮腫、末—1日0.5—0.6 g; 液—1日5—6cc; 皮注

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
• Roto-Normosan	莫 著 諾 爾 妙 霜	ロートノ ルモザン		含有0.6%Ext. Scopoliae	鎮痛、吸著	胃腸煩擾、胃液過多 1次 5食前
• Rubrum scarlatinum purum	純斯卡雷特	純スカレット (シヤルラハロート)	Scarlet red	<chem>CC1=CC=C(C=C1)N2C=CC(=C2)N(C)C3=CC=CC=C3O</chem>	表皮形成	4~8%散膏
• Saccharinum Solubile	糖 精	溶 性 サツカリン	Soluble saccharin	<chem>CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC(=C2)N(C)C3=CC=CC=C3O</chem>	甘味質	糖尿病 1次0.03~0.05g
• Saccharum				同 Sacrosum		
• „ Lactis				同 Lactosum		
• Sajobrolin	鹽 不 溶 明	サヨブロリン		Calcium o-Brom-iod-salicylate	消炎、解熱	25cc靜注
• Sajodin	薩 沃 金			Calcium Monoiod benenate	消炎、鎮靜	1.0~3.0g内服
• Sal Carolinum fectifitium	人 工 鹽	人 工 カ ル ル ス 鹽	Artificial Carlsbad salt	Na ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ , NaCl, NaHCO ₃	緩 下	1次5.~10g水劑
• „ Seignetti	賽 尼 耶 托 鹽	セニエツト鹽		同 Sodii et Potasii Tartras		
• Salen	薩 連			Ethyl (Methyl) salicyl-glycolate	神 經 痛 劑	配伍同量alcohol 而發售
• Salipyrin	里 匹 林	サリピリン		同 Antipyrinum salicylicum		
• Saliso-Calcicol	撒 曹 卡 爾 齊 可 兒	ザリソカル チ コール		葡萄糖酸鈣 6% 柳 酸 鈣 2.5%	鎮 痛 解 熱 消 炎	每日隔日 20c.c.靜注
• Salol	薩 羅 爾	ザ ロール		同 Phenylum salicylicum		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Salomethyl	撒魯梅齊兒	サロメチール		冬綠油	神經痛劑	患部塗擦
Salso-Brocaine	撒曹不魯 卡爾諾賊	ザルソプロ カルノーゼ		CaBr ₂ , 2%; Glucose- 10%; 撒曹 2.5%	鎮靜, 消 炎, 營養	10-20cc 靜注
Salso-Brocannon	撒曹不魯 魯卡濃	ザルソプロ ロカノン		類似前記	”	”
Salso-Brocarose		ザルソプロ カローゼ		同前		
Salyrgan	撒利爾幹			C ₆ H ₄ CO-NH-C ₂ H ₅ -C ₅ H ₆ O ₃ Hg O-CH ₂ -COONa	利尿驅蟲	第1日0.5cc 每3日2cc 靜筋注
Salvarsan	撒佛散			同 Arsenobenzolam		
Sanakin	撒那琴	サナキン		同 Bagnon		
Sanar				同 Neoarsenobenzolam		
Sanatogen	撒那托根			牛乳蛋白; 甘油磷酸鈉;	強壯劑	1日數次4g
Sancal	山卡兒	サンカール		同 Calcicol		
Sandaraca	山打拉苦	サンダララク	Sandarac	Collitris quadrivalvis 之樹脂		膏劑原料
Sanoidin	撒諾伊津	サノイヂン		Lypoid	非特異元 免疫元	隔日1cc皮下 20次-1course
Santoninum	山道寧	サントニン	Santonin	C ₁₅ H ₁₈ O ₃	驅除蛔蟲	1次0.025-0.05g

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Santosol	山道索爾	サントゾール		Sod. santoninate 10%	,,	1日1cc 2~3日連用 皮注
Sapientin-M		サビエニン エム		睾丸 Hormone	男性器發育	毎日、隔日 20cc 靜注
Sapo D urus	硬肥皂 (藥用肥皂)	藥用石鹼	Hard soap		刺 戟	瀉腸料 賦形藥
,, kalinus				同 Sapo Mollis		
,, medicatus				同 ,, Durus		
,, Mollis	軟肥皂 (鉀肥皂)	カリ石鹼	Soft soap		洗滌、消毒	手指洗滌
Saridon	撒利頓			Isopropylantipyrin; Phenacetin; Sedormid; Coffein.	鎮 痛	頭痛、齒痛 1次0.5~1.0g
Sasapirinum	撒札匹林	サザピリン		同 Diplosal		
„Sassalon	撒札龍	サザロン		同前		
Saviol		サビオール		同 Arsenobenzolum		
Saxyl	撒克西兒	サキシール		同 Pellidol		
Saxylon	撒克西倫	サキシロン		Saxyl; 鎮痛劑;	上皮形成 促進	患部塗布
Scabol	斯卡波兒	スガポール		同 Thiantholam		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Scilla	海葱	海葱	Squill	Scillain; Scillin,	強心, 利尿	1日3次 0.03~0.2g
Scillaren	海葱素			Scilla之成分	"Jigi類 (似作用)	1日3次1~3錠 1日1cc, 皮, 靜注
Scoloid	斯可洛伊得	スコロイド		Rhizoma Scopoliae之全 Alcaloid.	鎮靜鎮痛	胃液腸胃酸過多 1日1g 1~2cc皮注
Scopolaminum hydrobrom- icum				同 Hyoscinae Hydrobromidam		
Sebum bovinum	牛脂	牛脂	Beef tallow			軟膏基礎 石鹼原料
„, taqirum				同前		
Secacornin	賊卡可爾寧			麥角製劑	止血, 子宮收縮	1日0.5~1.0cc
Secle cornutum	麥角	麥角		同 Ergota		
Secaltin	賊卡爾丁	ゼカルテン		麥角製劑	止血, 子宮收縮	內-1~3cc, 皮, 筋 注-0.5~1.0cc
Sedakol	聖打可兒	セダコール		同 P;rabitalum		
Sedalon	聖打龍	セダロン		同前		
Sedanamon	聖打那蒙	セダナモン		Veronal-Nat. P;armidon	鎮痛, 催眠	1次0.3~0.6g

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
„Sedes	聖的斯	セデス		類似 Saridon		
Semen Amygdali dulce	甘扁桃	甘扁桃	Sweet almond	Emulsin 脂肪油		乳劑原料
„ Armeniacae	杏仁	杏仁	Apricot seed	Amygdalin	鎮咳	製劑原料
„ Lini				同 Linum		
„ M;risticae	肉豆蔻	肉豆蔻	Nutmeg	M;ristin	健胃，矯味	1次0.5~1.0g
„ Pharbitidis	牽牛子	牽牛子	Kaladana	Pharbitin	峻下	1次1.0~3.0g
„ Sinapis	芥子	芥子	Black mustard	Sinigrin	引赤	芥子泥塗布
„ Strophanthi				同 Strophanthus		
„ Strychni				同 Nux Vomica		
Senega	歐遠志	セネガ根	Senega	Senegin	祛痰	1日2~5g(煎)
Sennae Folium	番瀉葉	センナ葉	Senna leaf	Rhein: Aloe-emodin	瀉下	緩下—1.0~2.0g 峻下—2~4.0g (浸)
„Sepsorbin	聖普索爾賓	セブソルビン		Urotropin: Sulfamin;	治淋	1次500靜注

藥 物 名	中 文 名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Septacrol	聖普他克老			2-7-Dimethyl-3,6-diamino-10-metnylaeridin-nitrat, silbernitrat	殺 菌	傷面— 0.05~0.5% 筋注— 0.5%4cc
Septazine	聖普他津			$C_6H_4 \begin{matrix} SO_2NH_2 \\ \diagdown \\ NHCH_2C_6H_5 \end{matrix}$	對連續狀球菌作用強	1日1.0~2.0g
Serum anti-diphthericum				同 Antitoxinum diphthericum		
" Anti-dysentericum	赤痢血清	赤痢血清			抗赤痢	4,000—10,000 單位 注
" Anti-meningitis	流行性腦脊髓膜炎血清	流行性腦脊髓膜炎血清			抗流腦	
" anti-tetanicum				同 Antitoxinum Tetanicum		
Sexanol	聖克薩諾兒	セキサノール		石蒜之成分 (Lycorin, Sexamin)	祛 痰	末—1日2~3g 錠—1日8~12錠
Sermain	聖克馬因	セキマイン		鯨抽出男性Hormone, Vit. B.	男性器發育	0.5cc=15H. E. 1錠=5H. E. 0.5cc皮, 筋注
Silber-arsolan				同 Silber-Salvarsan		
Silver Arsphe-namine				同前		
Silber Salvarsan	銀 阿 斯 凡 納 明			$(C_{12}H_{12}O_2N_2As_2) : (AgOH)_2$	驅 微	効力-Salvarsan之 二倍

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
◦Sinomenina	西諾美寧	鹽 酸 シノメニン		Radix Sinomenii 之成分	鎮 痛	神經痛、俄城賈斯 1日1~3次1cc皮， 癩注
Syrupus Ferri iodati				同 Syrupus Ferri Iodidi		
„ Fragariae	覆盆子糖漿	イチゴシロ ツブ	Syrup of strawberry		矯 味	
„ Polygalae	遠志糖漿	遠 志 シ ロ ツ ブ	„ „ polygala		祛 痰	小兒用 1日1茶匙
„ Senegae	歐遠志糖漿	ゼ ン ガ シ ロ ツ ブ	„ „ senega		„	„
„ simplex				同 Syrupus		
◦Sistomensin	西斯托面津			黃體月經制止 Hormone	抑制月經	月經過多、子宮出 血、1日3次1~2錠 ；1~2cc皮筋注
Sodii Acetas	醋 酸 鈉	醋酸ソーダ	Sodium acetate	CH ₃ COONa-3H ₂ O	利尿，緩下	1日數次 2.0~4.0g
Sodii Benzoas	安息香酸鈉	安息香酸ソー ダ	Sodium benzoate	C ₆ H ₅ COO-Na	防 腐	鴉口瘡 Diphthe- rie 5%含嗽， 1日數次1.0~3g 0.2 1%含嗽
„ Bicarbonas	重碳酸鈉	重碳酸ソーダ (重曹)	„ bicarbonate	NaHCO ₃	制 酸	1日數次1.0~3g 0.2 1%含嗽
„ Bromidum	溴化鈉	ブロムナト リウム	„ bromide	NaBr	鎮靜，鎮痙	1~2.0g
„ Carbonas	碳酸鈉	碳酸ソーダ	„ carbonate	Na ₂ CO ₃ -10H ₂ O	粘液溶解	0.5%含嗽， 粘膜炎症
„ Chloridum	氯化鈉	食鹽(クロー ルナトリウム)	„ chloride	NaCl	造血，止血	止血—20%靜注， 貧血—0.85%皮注

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Sodii Citras	枸橼酸鈉	クエン酸ナトリウム	Sodium citrate	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{COONa} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{COONa} \cdot 2\text{H}_2\text{O} \\ \\ \text{CH}_2\text{COONa} \end{array}$	防止血液凝固，止血	輸血—5.0% (對血液) 止血—10% 10cc 靜注
„ et Potassii Tartras	酒石酸鉀鈉	酒石酸カリソダ (セニエツト鹽)	Rochelle salt	$\begin{array}{c} \text{CH}(\text{OH})\text{COOK} \\ \\ \text{CH}(\text{OH})\text{COONa} \end{array} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	緩下，利尿	利尿 1 日 數次 0.5 2.0g 緩下 1 日 數次 5.0 ~ 10.0g
„ Hydroxidum	苛性鈉	苛性ソーダ	Caustic soda	NaOH	同 KOH	
„ Hyp.-sulphas	次亜硫酸鈉 (硫磺酸鈉)	チオ硫酸ソーダ	Sodium thiosulphate	Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	解毒	I, As, CN, Pb, Bi 中毒 1 次 0.5 ~ 1.5g 1 ~ 2% 10cc 靜注
„ Iodidum	碘化鈉	ヨードナトリウム	„ iodide	NaI	同 Potassii Iodidum	
„ Nitris	亞硝酸鈉	亞硝酸ソーダ	„ nitrite	NaNO ₂	血壓降下	狭心症發作時 1 次 0.05 ~ 0.1g ; 1 ~ 2% 1cc 靜注
„ Phenolsulphonas	酚磺酸鈉	フェニールスルホン酸ソーダ	„ Phenolsulphonate	HO-C ₆ H ₄ -SO ₃ Na + 2H ₂ O	防腐，收斂	1 ~ 3% 尿道注入
„ phosphas	磷酸鈉	磷酸ソーダ	Di-sodium hydrogen phosphate	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	瀉 下	1 日 數次 0.5 ~ 4.0g
„ Salicylas	柳酸鈉	サリチル酸ソーダ	Sodium salicylate	C ₆ H ₄ < $\begin{array}{l} \text{OH} \\ \text{COONa} \end{array}$	解熱，鎮痛	健康質斯，1 日 1 ~ 3g ; 20% 10cc 靜注
„ sulphas	硫酸鈉	芒 硝	Glauber's salt	Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	瀉 下	1 次 10 ~ 30g






藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
◦Solaesthin	索列斯丁			CH_2Cl_2	吸入麻醉	誘導麻醉 80~100滴
◦Solarson	索拉爾遜			$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{Cl}-(\text{CH}_2)_4 \\ \text{O}:\text{AS}-\text{OH} \quad \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{ONH}_4 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	變質	貧血症 1cc皮，靜注； 10~20次1 cure
◦Solchin		ゾルヒン		同 Bagnon		
◦Solpirin		ゾルピリン		同 Neopirin		
◦Solution Calcii bromati	溴化鈣溶液	ブロームカルシウム液		CaBr_2 2% . 3% . 4%	鎮靜	神經衰弱，神經痛， 癱瘓病 5~20cc 靜注
◦" " Jodati	碘化鈣溶液	ヨードカルシウム液		CaJ_2 1~5%	變質，強壯	結核，喘息，梅毒 1週2~3次 自1cc 增至3~5cc皮，靜
◦" " Salicylici	柳酸鈣溶液	サリチル酸カルシウム液		柳酸鈣 1~3%	解熱，消炎，利尿	傷寒質斯，胸膜炎 2cc靜注
◦Somatose	索馬托賊			肉蛋白製劑	造血	1日4~5茶匙
◦Sorbefacin				同 Anti-phlogistine		
◦Sovolin	索報林	ソボリン		Novalgin: Velamon,	解熱，鎮痛	頭痛，感冒，神經痛 1次2錠
◦Spasmalgin	斯巴斯麻爾金			Papaverin 0.02 Fantopon 0.01 Atrial 0.001	鎮痙，鎮痛	胃腸痙攣，胆石痛 1cc皮，注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Spasmolysin	斯巴斯 督利金			腦下垂體後葉+副腎上皮 小體Hormone	痙攣中樞 抑制	癱瘓，小兒一殼 痙攣 1次1cc~5cc皮注
Spelzon	斯蓋爾宗	スベルゾン		Vit. B複合體		1cc皮，筋注；末1日 3~5g；液10~20g
Spermatin	斯蓋爾馬丁	スベルマチン		男性Hormone		每日，隔日1~2cc 皮，靜，筋注
Spermin	斯蓋爾明			男性器抽出物 $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-(\text{CH}_2)_4-$ $-\text{NH}-(\text{CH}_2)_5-\text{NH}_2$	強 精	1日2cc皮注， 1日3次2錠 (20~30滴)
Spicain		スピカイン		同 Procainae Hydrochloridum		
Spigelia	斯比給利阿			Spigelia marilandica 的根之流動浸膏	驅除蟲蟲	4.0~8.0cc
Spinacin	斯比那欵	スピナチン		蕨蓆草之成分	食慾增進	食部1.5~1.0cc 皮，筋注
Spinocain	斯比諾卡因			Pitkin氏液 (Novocain等)	麻 醉	腰推麻醉
Spirit Nitri dulcis				同 Spiritus Aetheris Nitrosi		
Spiritus Aetheris	醚 醇	エーテル精 (ホフマン液)	Spirit of Ether	Aether 1.0 Alcohol 3.0	興 濟	1次20~30滴(茶 匙)外用一塗布
" Nitrosi	亞 硝 酸 二 硫 隨	甘 硝 石 糖 (亞硝酸 エチル精)	Sweet spirit of nitre	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$	興奮，回 蘇，發汗	貧血，熱心， 1日3~5g(水)， (吸入)
" Ammoniae Aromaticus	芳香氨醇	芳香アンモ ニア精	Aromatic Spirit of ammonia	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3:\text{NH}_4\text{OH}$ ， Gl. Lemon, Alcohol	祛痰，制酸	1日1~3g 吸入，塗布

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Spiritus Aetherris foeniculatus	氨製茴香腦	アンモニア茴香精	Foeniculated spirit of ammonia	茴香油、鹽水、乙醇	祛 痰	1日1~3g永劑
„ Camphorae	樟腦腦	カンフル精	Spirit of camphor	Camphor 1.0 Alcohol 7.0 Aqua 2.0	神經痛劑	神經痛、凍傷痕跡
„ Chloroformii	氯仿腦	クロロホルム精	„ „ Chloroform	Chloroform 5.0 Alcohol 100.0	„	„
„ Jodi				同 Liquor Iodi Fortis		
„ dilutus				同 „ „ Mitis		
„ Menthae				同 Spiritus Menthae Piperitae		
„ „ Piperitae	薄荷腦	薄荷精	Spirit of Peppermint	薄荷油 1.0 酒精 9.0	健胃、驅風、矯臭	1日0.5~1.5g(水)外用一塗布
„ Mindereri				同 Liquor Ammonii acetici		
„ Sinapis	芥子腦	芥子精	Spirit of mustard	Ol. sinapis 1.0 Alcohol 49.0	引 赤	10~20滴貼用。
。Spirocid	斯匹羅細得			OH、 O=AS-C ₆ H ₃ <NH-COCH ₃ H、OH	驅 微 Maralia	內-1日3次0.25 4週14g (體質考慮)
。Spirosin		スピロチン		同 Novasrol		
。Stabilarsan	斯他爾散			Salvarsan-diglucoside	驅 微	毒性Neosarsphen- amina之ㄨ

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Staphylon		スタヒロン		同 Disulfamin		
Stibenyl	斯其北尼兒			$\begin{array}{l} \text{NaO} \backslash \\ \text{O} = \text{Sb} - \text{C}_6\text{H}_4\text{NH} - \text{CO} - \text{CH}_3 \\ \text{OH} / \end{array}$	抗 Tripa- osoma, K- ala-azar	筋・靜・注； 每2~3日； 自50~100mg 至400mg全2.g
Stibio-Kalium tartaricum				同 Antimoni et Potasii Tartaras		
Stibnal	斯其不那兒	ステブナール		$\begin{array}{l} \text{CH}(\text{OH})\text{COONa} \\ \text{CH}(\text{OH})\text{COO-SbO} \end{array}$	抗吸血病， Distoma； Spiroheta,	0.3~0.6g 3日； 每3日，靜注 1cure = 15~20次
Stibosan	斯的波霜			$\begin{array}{l} \text{NaO} \backslash \quad \text{Cl} \\ \text{O} = \text{Sb} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH} - \text{CO} - \text{CH}_3 \\ \text{OH} / \end{array}$	治療 Kala- azar；Schi- stosoma,	1% 20cc 每3日 靜注
Stimiu	斯其明	ステミン		同 Omnadin		
Stovain	斯伦巴因			$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 - \text{C} - \text{O} - \text{CO} - \text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2 \cdot \text{HCl} \end{array}$	腰 麻	5~10%
Stovarsol	斯陀巴爾 爾索爾			同 Spirocid		
Stramomium	曼陀羅藥	マンダラ葉	Stramonium	Hyoscyamin；Atropin	鎮 痛	1次0.03~0.15g； 喘息煙草
Streptocide	斯陀列普 陀塞得			同 Sulfaminum		

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Strophanthin	毒毛旋花素	ストロファンチン		Strophantus屬植物之主成分	強心、利尿	1c.c.皮筋注 急時徐徐靜注
Strophanthon				同前		
Strophantus	毒毛旋花子 (康批箭毒子)	ストロファンツス子	Strophanthus	Strophanthin	„	原原料
Strychninum nitricum	硝酸士的寧	硝酸ストリキニーネ	Strychnine nitrate	$C_{21}H_{22}N_2O_2 \cdot HNO_3$	胃腸自動中樞興奮	食慾亢進，強壯 1日0.001g 0.1% 1c.c.皮注
Styrax liquidus depuratus	精製流動蘇合香	精製流動蘇合香	Storax	Stresin ;		氣管支炎 1日3次0.5~2.0g (丸) 疥癬—塗擦
Stypticin	蘇齊普齊欵			Gotarnin Hydrochloride	止血，鎮痛，鎮靜	內—1日0.1~0.3g 皮注—10% 1c.c.
Styracol	蘇齊拉可			Guajacolum cinnamylicum	腸內殺菌	腸結核，膀胱炎 1日0.3~1.0g
Subentin	蘇補克丁			$C_2H_5OOC \cdot C_6H_4 \cdot NH \cdot SO_2 \cdot C_6H_4 \cdot OH$	浸潤麻 醉鎮痛	局麻： 膀胱鏡無痛操作
Subtonin	蘇補通寧	ズプトニン		腦抽出物	血壓降下	0.5~0.2cc皮注
Succus Liquiritae				同 Extractum Glycyrrhizae		
Sacrosam	蔗糖	白糖	Refined sugar	精製蔗糖	矯味	
Suginron	蘇給烏龍	スギウロン		同 Uroselectan B		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Sulfadiazina	磺 胺 噁 啶			$\text{NH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-NH-}$ 	類似Sulfathiazol (排泄緩徐)	最初2g、 後毎6時1g
Sulfaguaniidina	磺 胺 胍	スルフアグ アニチン		$\text{NH}_2\text{-}$ 	腸内殺菌 (不易吸收)	赤痢 最初2~6gr 毎4時間1~3g
Sulfaminum	磺 胺	スルフアミン	Sulphanil- amide	$\text{NH}_2\text{-}$ 	抗化膿性菌	1日3次 0.6~5.0g食後 2~20cc靜皮筋注
Sulfapyridin	磺 胺 吡 啶	スルフアピ リチン		$\text{NH}_2\text{-}$ 	特効肺炎	最初2~4g后毎4時 1g; 平熱持續24 時后毎6時1g
Sulfasuxidine	琥珀酰磺 胺 噁 啶			Succinylsulfathiazole	腸内殺菌	第1次2~6g 毎4時1~3g
Sulfathiazolum	磺 胺 噁 啶	スルフアテ アゾール		$\text{NH}_2\text{-}$ 	抗化膿性菌 肺炎變球菌	第2次2~4g 毎3時1g
Sulfonalum	索 佛 拿	スルホナール		同 Sulphonah		
Sulfur depratum	精製硫黃	精製硫黃	Washed sulphur	S	緩下 皮膚殺菌	緩下1~3g 外用20~30%軟膏
Sulphanilamide				同 Sulfaminum		
-Pyridine				同 Sulfapyridin		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Sulpharsenobenzolum				同 Sulpharsphenamina		
Sulpharsphenamina	硫阿斯凡納明	ミオサルバルサン	Sulpharsphenamine	$\begin{array}{c} \text{NaSO}_3\text{-CH}_2\text{-NH} \\ \text{HO} > \text{C}_6\text{H}_3\text{-As:} \\ \text{As-C}_6\text{H}_3 < \text{NH-CH}_2\text{-SO}_3\text{Na} \\ \text{HO} \end{array}$	驅菌，(但皮注。安定)	但0.3g以上時 2箇所注
Sulphonal	索佛傘	スルホナル	Sulphonal	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 > \text{C} < \text{SO}_2\text{-C}_2\text{H}_5 \\ \text{CH}_3 < \text{C} < \text{SO}_2\text{-C}_2\text{H}_5 \end{array}$	催眠	1次0.3~1.2g
Sulphonamide P				同 Sulfaminum		
Sulphur Praecipitatum	沈降硫黃	沈降硫黃	Precipitated Sulphur	S	緩下 皮膚消毒	緩下1次1~3g 皮膚病一軟膏
Sublimatum	昇華硫黃	硫黃華 (昇華硫黃)	Flower of Sulphur	S	皮膚病治療	軟膏，Paste,
Salpyrinam	斯爾匹林	スルピリン		同 Novalgin		
Sulthia	薩爾其阿			同 Sulfathiazolum		
Suppositorium Glycerini	甘油栓劑	グリセリン坐劑	Suppository of glycerin	甘油，重曹 Stearic acid	瀉下	肛門挿入
Suppositoria Opii	阿片栓劑	阿片坐劑	Opium	Opium Ol. Cacao	鎮痛，止瀉	”
Scopoliae	莨菪栓劑	ロート坐劑	scopolia	Ext. Scopoliae Ol. Cacao	鎮痙，鎮痛	”
Suprarenin				同 Adrenalina		
Synephrine	辛内弗林			類似 Adrenalina		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及用量
Synhormon	津賀爾蒙	ジンホルモン		合成男性 Hormone (Androsteron)		毎日、隔日1cc 筋、皮注 1日3次2~3錠食間
Synphyllin				同 Euphyllin		
Synthalin	津他林	ジンタリン		$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \qquad \qquad \text{NH}_2 \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{C}-\text{NH}-(\text{CH}_2)_{10}-\text{NH}-\text{C} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{NH} \qquad \qquad \qquad \text{NH} \\ +2\text{HCl} \end{array}$	血糖降下	第1日5mg×3; 第2日10mg×3; 第3日10mg×3; 第4日休
Syntropan	辛託品			$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_2\text{OH} \\ \quad \quad \\ \text{N}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{CH}_2\text{O} \text{C} \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{CH}_3 \quad \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	同 Atropin	胃腸、膀胱痙攣 内—1次1錠;皮注
Syrupus	單舍利別 (糖漿)	シロップ	Syrup	白糖	矯味	
„ Aurantii	橙皮糖漿	橙皮シロップ	„ of orange	Tr. Auranti, Syrupus	矯味, 矯臭	
„ Ferri Iodidi	碘化低 鐵糖漿	ヨード鐵シ ロップ	„ „ ferrousiodide	Fe, I; Syrupus	變質, 透血	貧血, 腺病 1日數次1—6g
„ Sennae	番瀉葉糖漿	センナシロ ップ	„ senna	Senna Folium Syrupus	小兒瀉下	1次1茶匙
„ zingiberis	薑糖漿	生薑シロップ	„ ginger	Zingiber	健胃, 驅風 矯味	1日數次2—3g
Tacamol	他卡冒爾	タカモール		同 Solution Calcii Salicylici		
TaKa-diastrase	多價糖化素	タカデアス ターゼ		Aspergillus oryzae製	Diastrase 之2倍	1日0.3—0.9g 食直後

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
o. TaKaIdin	他卡里津	タカリチン		包米胚苳之成分	利尿	1日3g 腎炎浮腫
Talcum depuratum	精製滑石	精製タルク	Purified talc	$3MgSiO_3 + H_2SiO_3$		撒布
o. Tartarin		タルタリン		同 Pyridium		
Tannalbinum	鞣酸蛋白	タンナルビン	Albumin tannate	蛋白、鞣酸	收斂	下痢 1日3次0.5—1.0g
o. Tannigen	單尼根			Diacyltannin; Triacyltannin,	"	" 1日0.5g
Tanninum acetylicum	醋壁單寧	アセテルタ ンニン	Acetannin	Acetyltannic acid	"	1日3次0.25—1.0g
o. Tanvarsan	坦羅爾散	タンバルサン		同 Arsenobezolam		
o. Tanvonin	坦報寧	タンヴォニン		黃柏製劑	腸内殺菌	1日3次0.3—0.5g
Tartarus depuratus	精製酒石	精製酒石		同 Potassii Tartras Acidus		
o. Taugen	他烏根	タウゲン		Taurin; Betain, Glycoen	結核治療劑	1日3—4g
o. Tantron		タウトロン		同 Iveton		
Tela depurata	沙布	ガ ー ゼ	Purified gauze			繃帶料
o. Telygan	太利幹			卵巢+甲状腺+腦下垂體 + Yochinbin	女性器發育	女子性器不全 1日3次1錠; 毎日1cc皮注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Teorgan	太歐爾幹	テオルガン		常歸、芍藥、白朮、茯苓	治療婦人病	1日3次2錠(3cc)
Terebinthina	松節油	テレピンチ ーナ	Turpentine		皮膚刺激	膏劑原料
Terpinum hyd- ratum	水化松二 個醇 (水化松 節油精)	抱水テルベン ーテ	Terpin hydr- ate	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{OH} \end{array} > \text{C} < \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{OH} \end{array}$	祛 痰	1日數次0.1~0.4g
Terachi-Matsu	照 內 末	照 內 末		Vit. B複合體	抗 脚 氣	1日1~5cc皮注, 末—1日3~5g; 總 —10~20c.c.
Testiglandol	太斯其格 莫得兒			睾丸Hormone	男性器發育	1日1~3cc皮注, 1日3~5錠
Testinon	太斯其澆	テストノン		尿抽出男性Hormone	”	毎、隔日0.5~1. 0cc筋注
Testogan	太斯透幹			睾丸Hormone, 甲狀腺 副腎, 腦下垂體,	”	1cc皮、筋注, 1日3次1錠食後
Testaviron				同 Perandren		
Tetrasil	太透拉季兒	テトラジール		同 Phonocasil		
Tetronal	太透羅那兒			$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array} > \text{C} < \begin{array}{c} \text{SO}_2\text{-C}_2\text{H}_5 \\ \text{SO}_2\text{-C}_2\text{H}_5 \end{array}$	催 眠	1次1g
Theobromina et Sodii Salicylas	柳酸 ^ナ 柯 柯豆素	テウレチン	Theobromine and sodium salicylate	Theobromino-Nat; Nat. Salicylat. 之複鹽	利 尿	1日數次0.5~2.0g

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Theobrominum natrium salicylicum	利尿素)	サリチル酸 テオブロミ ンソーダ		同前		
Theocin	特歐欽			同 Theophyllolum		
Theominal	特歐米那兒			Theobromin 0.3 Luminal 0.03	血管壁緊 張低下	狹心症, 貧血性 頭痛 1日2~3次1錠
Theophyllinum	茶葉素	テオフィリン	Theophylline	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-N-CO} \\ \text{CO C-NH} \\ \text{CH}_3\text{-N-C-N} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \text{CH} \end{array}$	利尿	1次0.1~0.2g
Theophylolum	茶葉素醋 酸	テオフィロ ール		Theophyllino-natrium aceticum	強力利尿	1日3次0.1~0.2g 3%靜注,
Therapol	特壽伯爾	テラポール		同 Sulfaminum		
Thermol				同 Dinitrophenol		
Thiantholum	其安透爾	チアントール		$\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_3\text{<S>C}_6\text{H}_3\text{-CH}_3$	皮膚藥	寄生性皮膚病 治療, 塗布
Thiazon	其阿宗			同 Sulfathiazolum		
Thio-Bismol	其歐錫斯冒			$\begin{array}{l} / \text{S-CH}_2\text{COONa} \\ \text{Bi-S-CH}_2\text{COONa} \\ \backslash \text{S-CH}_2\text{COONa} \end{array}$	驅 蟲	1cc, 皮筋注, 1course = 10次
Thiobis	去海錫斯	テオビス		同前		
Thiocol	其歐寇兒			Pot.o-Gnaja-col- Sulphonate.	腸內殺菌	結核, 腸內消毒, 1日0.5~3.0g

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Thiazimide				同 Sulfathiazolum		
Thrombogen	特倫波根	トロンボゲン		肺，脾，之抽出物	止血	胃腸出血，手術出血 5g內服；5cc皮注
Thrombrin	特倫布林	トロンブリン		脾抽出劑	''	1日6錠分3 5cc皮注，
Thymol	麝香草腦	チモール	Thymol	$C_6H_3(OH)(CH_3)(C_3H_7)$ (1.3.6)	驅蟲，防腐	十二腸蟲1次2~4g 皮膚疾—1~5%軟膏，
Thymophysin	齊冒非伊金	チモフィジン		胸下垂體後葉+胸腺浸膏	子宮收縮	微痛 1次0.5—1cc臀筋注
Thymus Gland Desiccated	乾燥胸腺末			綿羊胸腺乾燥粉末		眼疾 奧用性甲狀腺腫，瘧風， 1日1~2次0.13g
Thyradin		チラーチン		同 Thyroideum		
Thyreoglandol	其列歐格爾得			羊甲狀腺製劑	代謝機能促進	甲狀腺機能不全， 1日3次1~2錠，1週 2~3支注，
Thyreoid	甲狀腺素			甲狀腺製劑	''	粘液水腫，脂肪過多， 1日0.3g
Thyroideum	甲狀腺粉	乾燥甲狀腺	Thyroid	Thyroxin	'' 骨體形成	粘液水腫， 1日3次0.05~0.1g
Thyroidine		チロイデン		同 Thyreoid		
Thyroxin				人工甲狀腺成分	代謝機能促進	內—1日2~6錠 皮，筋注—1cc

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Tinctura amara	苦味酊	苦味テンキ	Bitter tincture	橙皮，龍胆， 小豆蔻，	苦味健胃	1日3次1~2cc
"Asafcedidno	阿魏酊	アギテンキ	Tincture of asafedida	揮發油	驅風，祛痰 腸蠕動除，	Histories暗示療法 1日數次1~3g
"Benzoes	安息香酊	安息香テンキ	"benzoïn"	Benzoesinol	防腐	和皮膚外用劑配伍
"Galumbae	非洲防己酊	コロンボテンキ	"calumba"	Columbamin	苦味健胃 收斂	1次1.5~3.0g
"Cantharidis	斑蝥酊	カンタリス テンキ	"cantharides	Cantharidin	皮膚刺激	禿頭， 1日2~5滴塗布，
"Capsici	蕃椒酊	蕃椒テンキ	"capsicum"	Capsicin	健胃 刺激	和興奮劑配合1% 含嗽，神經痛塗布
"Catechu	兒茶酊	阿仙藥テンキ	"catechu"	Tannin; Catechin	收斂 止瀉	1日數次1~3g 2~8%灌腸，
"Chinae				同 Tinctura Cinchonae		
"Composita				同 "Composita"		
"Cinchonae	金雞納酊	キナテンキ	Tincture of cinchona	Quinin Cinchonin	苦味健胃	1日2~5g
"Composita	複方金雞納酊	複方キナテンキ	Compound tincture of cinchona	奎寧，橙皮，龍胆， 桂皮，	健胃，強壯	1日3次1.~3.g
"Cinnamomi	桂皮酊	桂皮テンキ	Tincture of cinnamon	揮發油，	芳香健胃， 矯味，香料	1日3次1~3.g
"Colombo				同 Tinctura Galumbae		

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Tinctura Digitalis	毛地黄酊	デキタリス テンキ	Tincture of digitalis	Digitamin Digitoxin	強 心	1日3次1~3g
„ Ferri pomati	苹果鐵酊	リンゴ鐵 テンキ	Tincture of iron malate	Ext. Ferri pomati Ag. cinnamomi	補血強壯	1日數回2~6g
„ Gentianae	歐龍胆酊	ゲンチアナ テンキ	„ gentian	Gentiopiarin	苦味健胃	1日數次1.5~3.0g
„ Iodi Fortis				同 Liquer Iodi Fortis		
„ „ Mitis				同 „ „ Mitis		
„ Ipecacuanhae	吐根酊	吐根テンキ	Tincture of ipecacuanha	Emetin	祛 痰	1日30~60滴 小兒吐瀉。
„ Myrrhae	沒藥酊	ミルラテンキ	„ myrrha	揮發油, 樹脂.	分泌抑制	氣管, 子宮之分泌 抑制健胃1日1~2g
„ Nucis Vomicae	番木鱈酊	ホミカテンキ	„ nux vomica	Strychnin Bilein	強 健 壯 胃	1日3次0.5~1.0g
„ Opii	阿片酊	阿片テンキ	„ opium	Morphin	鎮痛止瀉	止瀉—0.1~1.0g 瀉腸—10~20滴
„ Picrasmae				同 Tinctura Quassiae		
„ Quassiae	苦木酊	苦木テンキ (カシア テンキ)	Tincture of Quassia		苦味健胃	1日3次0.2~1.0g
„ Rhei	大黃酊	大黃テンキ	„ rhubarb		健胃, 瀉下	健胃—1日數次2~5g 瀉下—1日 15g
„ Scopoliae	莨菪酊	ロートテンキ	„ scopolia	Hyoscyamin	鎮痛, 鎮痙	1日3次0.5~1.0g

薬物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Tinctura Strophanthi	康毗箭毒 商	ストロファン ツステンキ	Tincture of strophanthus	Strophanthin	強 心	1日數次3~6滴
„ Strychni			同 Tinctura Nucis Vom- icae			
„ Valerianae	續草商	吉草テンキ	Tincture of valerian	Pinan; Camphen	鎮 靜	Histeric, 神經過敏 1日數次1~3.g
„ Zingiberis	生薑商	生薑テンキ	Tincture of ginger	Syogaol	芳香健胃 香 味	1日數次2~3g
Tocanon (Bany- G.)		トーカーノン 「万有」		同 Brocanon		
T. lder		トルダー		同 Sulfaminam		
Tolysin				同 Novatophan		
Tomosan	透妙散	トモサン		活性矽酸器	吸 著	胃酸過多, 胃炎 1日3錠
Tonephin	透緩弗因			腸下垂體後葉成分	腸蠕動亢進 利尿抑制	尿閉症, 腸管痙攣 0.5~1cc筋注
Toriseptin-M		トリセプテ ンニム		同 Sulfathiazolum		
Totaquina	辛可那全錠	トタキナ	Totaquine	奎寧全成分	原形質毒	Malaria, 代用鹽 規; 1次0.1~0.6
Tragacantha	西黃耆膠	トラガント	Gum tragacanth	Bassorin; Arabin		製劑原料
Trasentina	屈來生丁		Trasentin	(C ₆ H ₅) ₂ CH-CO-O-C ₂ H ₄ - N(C ₂ H ₅) ₂ -HCl	鎮 痛	胃腸痙攣, 月經痛 1日3次1~2錠, 1 cc皮筋注

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Trepol	托列泡兒			Nat·Kali·tartar. ; Bi之油性懸濁液	驅 徵	每週2~3次1~2 cc筋注
Trianon	托利亞濃	トリアノン		同 Sulfapyridin		
Trigemin	托利給明			$\text{CCl}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH} \begin{matrix} \text{OH} \\ \text{OH} \end{matrix}$	鎮 痛	神經痛 1次0.5~1.0g內服
Trihelomin	托利哈羅民	トリハロミン		同 Acriflavina		
Trinitrophenol	必苦酸	ピクリン酸	Picric acid	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})(\text{NO}_2)_3$	殺 菌	皮膚疾患 0.1~1 % Alcohol 液塗布
Trional	特利歐那兒			同 Methylsulfonalum		
Trocain		トロカイン		同 Procainam hydrochloricum		
Tropacocainum hydrochloricum	鹽酸顛茄古柯鹼	鹽酸トロバコカイン	Tropacocain hydrochloride	$\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{NO}_2\text{-HCl}$	局 麻	眼、耳科3~5% 1cc.注 腰盤1~10% 1cc.
Trophoblastin	托羅賀不拉斯丁	トロフオブラステン		胎盤、妊娠尿抽出 Hormone	治療阻	阻月經異常、 1日2cc皮注
Trypaflavin				同 Acryflavina		
Tryparsamide	台盼砷胺			$\text{NaO} \begin{matrix} \diagdown \\ \text{O}=\text{As}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CH}_2 \\ \diagup \\ \text{OH} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \text{NH}_2-\text{CO} \end{matrix}$	抗 (Trypanosoma)	神經梅毒。 靜、筋注。
Trypsin	(蛋白消化素)	トリブシン		唾液之蛋白消化酵素	蛋白消化	1日3次0.1~0.3g
Ruber Jalapae				同 Jalap		

薬物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Tuber Salep	撒萊普根	サレツプ根	Salap	粘液	緩和劑	1日4~10g
Tuberculinam	舊結核菌素	ツベルクリン	Tuberculin			結核診斷、治療。
Tussiasit	茲西阿斯特	ツシアスト		Ephedrin; Papaverin; 等	血管、氣管擴張	氣管支喘息、百日咳末—1日1.5~2.0g; 皮下注
Tussidrin		ツシドリ		同前		
Tutocain	茲托卡因			$\text{NH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH-(CH}_3\text{)}$ $\text{(CH}_3\text{)}_2\text{N-CH-CH(CH}_3\text{)}$	局麻	眼科浸潤麻醉 0.5% 塗布—1.~5%
Usabanin	烏阿巴寧	ウアバニン		g-Strophanthin	強心利尿	第1次0.05mg 加 葡萄糖液。靜注; 皮下注 (但有痛)
Uliron	烏利龍			$\text{NH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-NH-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-N(CH}_3\text{)}_2$	同 Sulfaminam	
Uden	恩 激			濾胞 Hormone (水溶)	女性器發育	內—每日自10~30 IE. 至500IE. 筋注—1次1.000~ 50.000IE.
Unguentum Acidi boric	硼酸軟膏	硼酸軟膏	Ointment of boric acid	10% 硼酸	創面防腐	皮膚炎、創傷、火傷、塗布。
„ Ammonii sulfoichthyolici				同 Unguentum Ichthammol		
„ Argenti colloidalis	膠狀銀軟膏	コロイド銀軟膏 (クレデ軟膏)	Crede's ointment	5% -Argenti colloidale	消炎、殺菌	創傷面、皮膚、 筋肉炎症、塗布

藥物名	中文名	日文名	英文名	主要成分	主作用	用途及劑量
Unguentum camphoratum	樟腦軟膏	カンフル軟膏	Camphor ointment	2% Camphor		癩癧質疥，凍傷，打傷，塗擦。
„ Hebrae	黒布拉克軟膏	ヘブラ軟膏	Ointment of lead oleate	Emplast. Lithargyri; Ol. Arachidis	被蓋劑	濕疹，瘡創，塗布。
„ Hydrargyri	汞軟膏 (水銀軟膏)	水銀軟膏	„ mercury	30% -Hg	驅蝨 驅除毛虱	1日3~5g 塗擦
„ album	白降汞軟膏	白降汞軟膏	White precipitate ointment	白降-汞10%	腐蝕粘膜	寄生性皮膚症，角膜潰瘍，塗布
„ Ammoniaci				同前		
„ cinereum				同 Unguentum Hydrargyri		
„ flavum	黃降汞軟膏	黃降汞軟膏	Ointment of yellow mercuric oxide	5%。(限.1~2%)	粘膜炎 面腐蝕	梅毒性潰瘍，眼科，塗擦。
„ Ichthammol	魚油脂軟膏	イヒチオール スルホン酸 アンモン軟膏	„ ichthammol	10%	消炎，防腐	塗布
„ Kalii iodati				同 Unguentum Potassii Iodide		
„ Picis liquidae	木樨油軟膏	木クール軟膏	Tar ointment	Tar 10.0 Cera 4.0		濕疹，疥癬，塗布
„ Potassii Iodidi	碘化鉀軟膏	ヨードカリ軟膏	Potassium iodide ointment	20% -KI	變質。	眼病，皮膚病，塗布
„ Scopoliae	莨菪軟膏	ロート軟膏	Scopolia ointment.	10% -Ext. Scop	鎮痛	神經痛，癩癧質疥，塗布

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Unguentum simplex	單軟膏	單軟膏	Simple ointment	(J.P.) Cera flava 1.0 Ol. Sesami 2.0		軟膏基礎
" "	" "	" "	" "	Lanolin 50.0 (B.P.)Paraffin 100.0 Vaselin 850.0		"
" Wilkinsoni	威爾金森軟膏	ウィルキンリン軟膏	Wilkinson's ointment	Tar(1);Sulphur(1); Soft Soap (2);Talc(0.5) Benzoinated Lard (2)	疥癬藥	塗布
" Wilsoni	威爾遜軟膏	ウィルソン軟膏	wilson's ointment	Zinc oxide(1) Benzoinated Lard(4)	皮膚藥; 收斂	皮膚病, 創傷. 塗布
" Zinci	氧化鋅軟膏	亜鉛華軟膏	Zinc ointment	Zinc oxide (1) Benzoinated Lard (9)	"	濕疹; 損傷; 擦傷, 塗布
" oxidī				同前		
Urea	脛	尿 素	Urea	NH ₂ -CO-NH ₂	利 尿	肋膜炎, 浮腫. 10~20g (水劑)
Urethanum	乙 烷 脲	ウレタン	Urethane	H ₂ N-CO-C ₂ H ₅	催 眠	他劑禁忌者, 小兒 1次, 2~4g
Urinogen		ウリノーゲン		同 Uliron		
Uritone				同 Hexamina		
Uroboraminum	三硼酸六甲糶	ウロボラミン		Hexamethylenetetramine-tri-borate	尿路防腐	1日3次7g
Uropyrin		ウロピリン		同 Cinnapyrium		
Urosalin		ウロザリン		同 Hexal		

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
Uroselectan B	烏羅塞列克丹			$C_6H_5N \left\langle \begin{array}{l} C(CO_2Na)-Cl \\ C(CO_2Na)-Cl \end{array} \right\rangle CO$	腎盂攝影用	20cc 靜注 20分后撮影
Urosil	烏羅吉兒	ウロジール		Sulfamin Disulfamin 混合	同 Sulfaminum	
Urotenamin	烏羅特納明			同 Hexamina		
Urotro-Brocanon	烏羅特羅不洛卡濃	ウロトロブ ロカノン		Brocanon Urotropin 10;20% MgSO ₄ 0.2;0.4%	尿路防腐	20cc 靜注
Urotropin	烏羅特羅平			同 Hexamina		
Uvaul	瓦屋兒	ウワウール		1cc=Fol. Uvae ursi 1g	利尿防腐	1日5-6g
Uvaurtin	瓦烏爾斯	ウワウルチン		Folium Uvae ursi 製劑	„	1日3-5g
Vaccinum Gonokokken	淋菌瓦克辛	淋菌ワクチン				第1次0.1cc; 第2次0.2cc; 第3次0.4cc; 第4次0.6cc; 第5次1.0cc;
„ Typho-paratyphosum	傷寒混合疫苗	チフスバラチフスワクチン	Anti-typhoid-paratyphoid Vaccine			予防注射
„ Typhusum	傷寒瓦克辛	腸チフスワクチン				„
„ Vaccinae	痘 苗	痘 苗	Vaccine Lymph		予防天然痘	接種

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
◦Vaginol	瓦給諾兒	ワキノール		Saponin; 乳酸・乳酸鈉	腔 防 腐	3—4%洗滌, Tampon
◦Vagostigmin	瓦够斯齊明	ワゴステグ ミン		$C_6H_4 < \begin{matrix} OCO-N(CH_3)_2 \\ N < SO_4CH_3 \\ (CH_3)_3 \end{matrix}$	迷走神經 刺激性下 劑	0.5—1.0cc 皮, 靜 注
Valeriana	纈草根	吉 草 根	Valerian	Valerianester Kessylalcohol	鎮靜, 鎮痙	神經症 1日10g (浸)
Vaselinum album				同 Paraffinum Mollé Album		
„ flavum				同 „ „ Flavum		
Veramon	維拉蒙			Veronal 1分子 Pyramidon 2分子	鎮痛, 催眠	頭痛, 月經痛1次 0.3—0.6(內); 皮注
◦Verocadon		ヴェロカドン		同 Pyrabitalum		
◦Verocetin	維魯西丁	ヴェロセチン		Barbital, Phenacetin	鎮痛, 催眠	1日0.6—1.0g
◦Veronal	維魯納爾			同 Barbitalum		
◦Verophen	維魯芬			Phenacetin, Veronal,	鎮痛, 催眠	1日0.5—1.0g
◦V.E.T.	維 托	ベツト		小麥胚芽製 Vit. E 劑,	保護生殖	1日3次2錠
◦Vidalon	維打倫			Vigantol; 肝油,	Vit. A + D 作用)	1日1次5—10cc
◦Vigantol	威干托爾			Vit. D	抗佝僂病	油—5—10滴 錠—1—3錠

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
◦Vikura	威 克 拉	ビクラ		Fruct. Korae; As;P;Strychain;	強 壯	1日10—15g
Vinum	葡 萄 酒	葡 萄 酒	Wines		強壯，興奮	1次10—30g
◦Vioferm	(費沃芳)			Jod-chloroxychinolin	類似Yatren	(外)創傷，下疳， 口內炎—撒布， (内)赤痢，疫痢， 1日0.5—1.0g
◦Vitampher	維他康佛	ビタカンフ ア—		P-Oxocampher; Trans- β -oxocampher.	強 心	1日數回皮，靜注
◦Vitacardin	維他卡爾金	ビタカルヂン		同 Coramin		
◦Vitace	維他斯			同 Cantan		
◦Vitamimin	維他西命	ビタシミン		植物抽出 1-Ascorbic acid	抗壞血症	1—2cc皮，筋，靜注
◦Vitamin B ₁	維他命B ₁	ビタミン B ₁		$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \qquad \qquad \text{CH}_3 \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{C}_4\text{H}_9\text{N}_2\text{-CH}_2\text{-NC}_3\text{HS-Cl} \\ , \text{HCl} \quad \text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \end{array}$	抗神經炎	脚氣，B ₁ 缺乏—皮 筋注 輕症 50—100單位 救急 2,000單位
◦VitaminC“Nissan”	維他命丙 (G)	ビタミンシ 「ニッサン」		同 Vitacimin		
◦VitaminD“Riken”	” 丁(D)	理研 ビタミン D		椎茸抽出 Ergosterin	抗佝僂病	佝僂病 發育障礙 結核 1日5—10滴
◦VitaminE“Riken”	” 戊(E)	理研 ビタミン E		Vit. E	保護生殖	預防流產 1日4膠球

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 分	主 作 用	用 途 及 劑 量
。Vitaminol	維他米諾兒	ビタミン ール		Vit. B 複合		1日1~5cc皮, 靜注 末1日3~5g, 液1 日10~20cc
。Viton	維 頓	ビトン		合成 d-Arabo- ascorbic acid	抗壞血病	1次2~5cc皮注 1日10~15錠
。" pulver	維頓末	ビトン末		純 viton	"	1日3次0.025g
。Vivasmon	維巴斯蒙	ビバスマン		睾丸製劑	男性器發育	每, 隔日1~2cc皮 筋, 靜注
。Vogan	報 幹			魚肝油製劑	補給 Vit. A	液—1日5~10滴 錠—1日2~4錠
。Voluntal	報論他兒			$OC \begin{matrix} NH_2 \\ \\ OCH_2-CCl_3 \end{matrix}$	催 眠	1次0.5g
。Wakamoto	若 素	ワカモト		同 Faex medicinalis		
。Xeroforam	塵基性三 溴酚鐵	キセロホルム	Bismuth tri- bromphenol- ate	$(C_6H_2Br_3O)_2BiOH, Bi_2O_3$	收斂, 防腐	下痢, 腸炎, 1日3次0.5~1.0g 創傷, 潰瘍 2~10%軟膏
。Yanol	藥諾兒	ヤノール		類脂製劑	強壯, 非特 異兒疲元	強壯, 結核 皮, 筋注
。Yatemin	藥特明	ヤテミン		同 Yatren		
。Yatokonin	藥托可寧	ヤトコニン		Calcium Fructose-mono- phosphate	結核治療	隔日0.25g (餉水 溶解) 皮注

藥物名	中文名	日 文 名	英 文 名	主 要 成 份	主 作 用	用 途 及 劑 量
Yatren	藥特靈			$\begin{matrix} \text{I} \\ \\ \text{OH} \end{matrix} \text{C}_9\text{H}_4\text{NSO}_3\text{H} \\ , \text{NaHCO}_3$	深部防腐 及刺激	胃潰瘍，赤痢，盛 熱 1日0.5~1.0(內) 2~5%5cc筋，靜注
Yeast	依斯托	イースト		純粹培養活性酵母劑	消 化	1日3次0.5~0.7g
Yohinbin	若新賓	ヨヒンビン		Corynanthe yohunbe 之成分	血管擴張	高血壓，催淫 內—1次0.005g; 1cc皮注
Yuron	有 倫	ユーロン		同 Uliron		
Zokin		ザオキン		同 Sulfaminum		
Zimmdon		テムドン		同 Uliron		
Zinci Chloridum	氯化鋅	鹽化亞鉛	Zinc chlor- ide	ZnCl ₂	腐蝕，收斂 防腐	小莖子劑， 0.2~1%洗滌
„ Oxidum	氧化鋅	亞鉛華	Zinc oxide	ZnO	乾燥性收斂	撒布 軟膏原料
„ Sulphas	硫酸鋅 (時禁)	硫酸亞鉛	Zinc sulph- ate	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	收斂，防腐	眼—0.2~0.5% 尿道—0.2~1.0%
Zincum Chlori- dum				同 Zinci Chloridum		
„ Sulfuricum				同 „ Sulphas		
Zingiber	薑	生 薑	Ginger	Zingiberol; Shogaol	芳香，健胃	1日數次0.3~0.5g

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

藥 物 名 彙

編 集.....室勉・二村
出 版.....東北藥專
印 刷.....東北畫報社

