

醫準繩卷之三

金壇王肯堂輯門人新安閔承詔校

潰瘍

癰疽七破膿出者

也

集驗云癰疽既破膿

出肉腐當用拔毒膏貼

邪氣漸退氣血亦虛脉之

洪數漸宜減退當內補

此裏必使氣血滋榮正氣強

盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣

生血秋冬微加禦

風寒之藥十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加

香附如意勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪

四物湯之類癰疽雖已見膿根脚赤暈反展開闊或

不痛或大痛此毒氣一退金銀白芷散十宣散去厚  
朴桂倍人參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角瓜蔓根  
消毒毒之藥春末夏間久秋初宜加酒芩黃連黃檗羌  
活腰已下可去桔梗見膿後須以補氣血藥爲主解  
毒藥助之或不宜於補藥者宜忍冬丸四圍腫焮處  
用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮服藥脉得和  
緩爲佳或破後不潰瘍口堅硬者風也用蜈蝎散傅  
之或蠶肉不腐用雄黃輕粉敷之大忌紅腫不退或  
飲食進少從權且調理脾胃或兼他證又另議藥治  
腐肉不知痛痒正黑者可去之但不傷四畔好肉及

裏面良肉當去外之黑腐者下皆去黃白如絮之狀  
腹內有紅血絲路又不可動此項大膿次日必自脫  
落庶免傷其良肉若怕刀砍三四日必自脫落但用  
刀去者新肉易長氣漸消凡腐肉亦有少臭氣腐  
敗去後則無變四圍腐者漸漸去令淨用長肉膏貼  
間日用豬蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可  
愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下  
面良肉色白而平無紋理亦不能如米如粟不見  
漸生之意或膿水清淡或臭此積毒內連五臟血氣  
枯竭乃是危證肉不能長氣血不禁衛氣不護瘡則

風寒着之用北艾黃芩湯熏洗生肌長肉藥傳之用  
乳香膏長肉等膏貼之或肉雖長起色紫者遺毒也  
用地榆湯活血散敷追毒膏貼之卽自紅活瘡口漸  
收仍用長肉膏貼或瘡口痒用細茶蔥鹽煎湯熱洗  
或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消即使長肉必  
防流注之患或更迷違瘡口如錢大時恐轉他證危  
殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可便去膏藥  鬼遺  
方云凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼  
或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺  
已上者其赤腫焮熱者卽用緊急收赤腫藥圍定不

令引開中心卽用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透  
內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大  
小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補雖破  
穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎不令再腫須疼  
止腫消患人自覺輕便卽是順疾也最宜節慎飲食  
其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是  
毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑卽止  
矣膿謂參芪之屬排內補謂皂角刺之屬

薛膿熟而不潰者陽氣虛

也宜補之如聖愈湯之類 疔肉不腐有宜大補陽  
氣更以桑柴火灸之 不作膿膿不潰氣虛也托裏

消毒散去金銀花白芷連翹三味加參木肉桂如不應暫用十全大補湯 腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲 腫出反痛氣血虛也去三味加參芪歸地 漬後食少無睡或發熱者虛也宜補之內補黃芪湯之類 倦怠懶言食少不睡者虛也宜補之黃芪人參湯之類 寒氣襲于瘡口不斂或陷下不斂者溫補之十全大補湯脈大無力或濇而微肌肉遲生者氣血俱虛也峻補之十全大補湯倍用參芪 肉赤而不斂血虛有熱也托裏消毒散去三味加熟地丹皮 肉黯而不斂

陽氣虛寒也前散去三味加參芪白斂官桂

漫腫

不痛或肉死不潰脾氣虛也前散去三味加人參白

木如不應加薑桂更不應急加附子

肉白而不斂

陽氣虛也前散去三味加參芪歸木

膿多而不斂

氣血虛也前散去三味加參芪歸木熟地黃如不應

暫用十全大補湯

飲食少思而不斂胃氣虛也前

散去三味加參芪如不應暫用補中益氣湯

飲食

難化而不斂脾氣虛也前散去三味加參木如不應

暫用六君子湯又不應佐以八味丸

膿多而帶赤

血虛也前散去三味加歸地參木如不應暫用八珍

湯加牡丹皮

出血作痛發熱等另分條在後

集驗云脉緊而數爲膿未成緊去但數爲膿已成以手按上熱者爲有膿不熱者爲無膿按之牢硬未有膿也按之半軟半鞶已有膿也大軟方是膿成也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之卽復者爲有膿也不復者無膿也小按便痛薄皮剝起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深也淺者宜藥點破高突者宜鉗針深者宜烙更詳虛實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結

微腫久而不消後亦成癰此是寒熱所爲也留積經久積陰生陽寒化爲熱以此潰必成瘻宜早服內塞藥以排之諸癰瘡疣贅等至年衰皆自內潰不一於補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒熱勞渴經久不消其人面色萎黃被熱上蒸已成癰也治見本條手足指稍及乳上宜溫熟大潰方可開之麻豆後肢節上癰稍覺有膿便須決破遲則成攣曲之疾

**黑癰**凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按

皮薄者  
用替  
針丸

之白良久方亦遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿成則宜針疽膿成則宜烙切宜孰視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用替針丸自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不可用針刀也

丹溪云精要論戒用針刀  
業外科者當拳拳服膺

替針丸 治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香

各壹字

硇砂

壹字以上

没藥

乳香

各壹字

石灰餅藥內種糯米拾肆粒其法用石灰伍升爐

每參升以水伍升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至  
參貳升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞  
濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯  
米拾肆粒種在皮紙面上一宿即是

右爲細末糯米飯丸如麥粒大每用壹粒未破用  
津貼瘡頭薄處卽破農滯不快則用壹粒納瘡口  
內使農不滯好肉易生

又方

雄雀糞貳拾粒納砂

陳倉米

浸藥各壹字

右研勻以米飯充如粟大每用壹粒貼瘡口眼中  
卽潰膿出

簪針丁香丸

草烏

失

硇砂

白丁香

堅者

右爲末酸醋調點將破者令速潰若急則無如刀  
快蜞針一法亦妙見後

梅治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀  
糞塗頭上乾卽易之雀糞中豎者爲雄

本事治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紙  
卽曬出巴豆壹枚去皮膜不去心油鹽豉拾肆粒

口中含去皮令軟同研爛真麝香少許如難丸入  
少稀糊捏作餅子如鼠糞大小臨時看瘡口絀  
之只以紙撲子送入藥須臾必痛忍之良久膿遂  
出

丹出一切瘡口用出蛾繭殼燒存性無灰酒調下每  
服壹枚服下一個時辰便有瘡口一个若服兩枚出  
瘡口兩個

精癰成膿宜針其鐵用馬銜鐵爲之形如韭菜兩面  
皆利可以橫直裂開五六分許取其毒血如覺病輕  
須先灸而後裂 腰按癰如椒眼數拾粒或如蜂窠

蓮房而膿出痛不除宜用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各各灸之亦佳不必裂也

靈鉗針者末如劍鋒以取大膿

素夫癰氣之息者

宜以針開除去之

病疑篇王注云息癰也死肉也

今世用刀割去死肉者是也

治腐腫者刺腐上視癰大小深淺刺刺大者多血小者深之必端內針爲故正者長刺節論大者多血小者深之八字衍文也大小

深淺刺七字取膿之法盡矣備矣

精疽成膿宜烙可用銀篦大二分長六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿爲効

鬼遺凡癰覺在虛處

皮厚  
毒深  
宜烙

父眼不見處皆是惡症如發高腫紫赤皮薄光澤覺  
裏有膿毒諸藥貼煥不破者宜用熟銅鍼於油火上  
燎透先用墨筆點定却當頭以鍼淺刺入隨針出膿  
者順也有不隨針膿出當用白紙作絳紙入針孔引  
出膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫  
不退疼不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡  
輕三逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托  
裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深  
如有膿卽用針烙無害稍緩卽恐傷筋骨內疼凡近  
筋脉骨節處不得亂行針烙反致他病也 患疽初

生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者卽是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵腳者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作絰子紝入候次日取出其膿卽隨絰下矣膿色黃白卽好若赤黑色防後有鮮血出卽患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙 凡患發背覺似有膿成便用大熟鐵針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通紅烙入可二寸許初入肉卽須橫

插入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰然  
更不得用針烙如是橫長赤引開闊當須兩頭下火  
針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥  
人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛  
受氣實也尤宜詳審不可造次便行針烙亦看患人  
氣脉勻和榮衛氣不節滯血脈不致凝滯卽行針烙  
無畏切須仔細患人氣虛脉氣大者亦不可亂行針  
烙針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色  
大光澤者卽可用針烙如皮肉未變不可用針針亦  
無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不

可用針烙

丹或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈

何皮厚肉深難穴者既前無內托之藥先致力於內後又不用烙以開竅脉膿何由出 膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則毒氣浸淫好肉亦化爲膿腐此所以烙法有功於潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐嚇而脇取利也

發表

一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而兼表邪也以補中益氣湯加川芎白芷三劑而止更以托裏藥而愈 一男子風襲齧口牙關緊急腰背反張以玉真散二服而愈仍以托裏藥而斂 一男子患癰將

欽遍身作痒脉浮以消風散二服而止更以托裏藥  
而愈

托裏

薛

一人胸患癰焮痛煩躁發熱作渴脈數而實

時季冬子謂此熱毒內畜須捨時從證欲治以內疎

黃連湯彼以時當隆寒乃雜用敗毒藥愈熾仍求治

投前湯二劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連

翹山梔四劑出水而消

羅謙甫治賈倉使父見癸

清熱

一

男子患癰潰而飲酒焮痛發熱服黃連解毒

湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便

秘脉實者用清涼飲治之

已寒

羅

至元壬午有王伯祿者年五十七右臂腫脹

盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微脉

症俱寒舉瘡醫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲

以燔起之膿清稀解待日再開之加吃逆不絕彥和

與丁香柿蒂湯兩服稍緩待日吃逆尤甚自利躋腹

冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸

二七壯又處以乾薑附子木香沉香茴香羌活類藥

咬咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然

不得不然內經一脉細皮寒瀉利前後飲食不入此

謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆屬心火是  
定理也此症內外相反須當捨時從症非大方辛熱  
之劑急治之則不能愈也遂投之諸症悉去飲食進  
瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫  
守常者衆人之見知變者大人之事知常而不知變  
細事因而取敗者亦多矣况醫乎守常知變豈可同  
日而語哉 陳錄判母治案見醫

托裏溫中湯 治瘡爲寒變而內陷者膿出清解皮  
膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短  
促吃逆不絕不得安卧時有昏憒

丁香

沉香

茴香

益智仁

陳皮

各壹錢

木香

壹錢半

羌活

乾薑

總各參錢

甘艸

炙畫

黑附子

鹽去皮  
肆錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表以爲君羌活苦辛溫透關節炙甘艸甘溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒爲佐瘡氣內攻氣聚而爲滿木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿爲使也

右㕮咀作一服水參盞生薑伍片煎至壹鍾去滓  
不拘時溫服忌一切冷物

補虛方

薛一童子腋下患癰不歛膿清肺大倦怠懶食

少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月  
而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒  
肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可 一男

子腰患毒膿熟不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈  
湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩  
月而愈此人後患濕氣遂爲痼疾凡瘡膿血去多瘡  
口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必

難治療慎之 一婦人患臂癰瘍口紫陷膿清不飲

彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘍瘍之證腫起  
堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子  
餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈 一婦人患附  
胃癰久而不歛致腿細短軟脉來遲緩以十全大補  
湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰  
之後脉滯遲緩者易愈以其有胃氣故也脉來細而  
沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑  
癟散者難療以其正氣虛而邪氣實也 一男子腰

中患此發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿

也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪  
歸木膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生大凡癰  
疽藉氣血為主若患而不起或潰而不腐或不收斂  
及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之  
劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後  
發熱作渴脉大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱  
不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰  
而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰  
及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免  
矣及患後當調養若瘰癧流注之證尤當補益否則

更患他證必難措置慎之

一上舍年踰四十因怒

脇內作痛不止數日後外結一塊三十許漫腫色赤按之微痛予謂怒氣傷肝致血傷氣鬱爲患以小柴胡湯對四物倍用芩歸黃芪貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用况此證爲氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證併臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪肉桂芩歸

數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成針之  
却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血  
凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲  
以益其虛况各經氣血多寡不同心包絡膀胱小腸  
肝經多血少氣三焦膽腎心肺脾少血多氣然前證  
正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脉  
證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏散為主乃補  
氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫熱  
痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍  
亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲

老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見  
以流氣十宣二藥繁治結腫之證以致取敗者多矣  
趙無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而色  
赤想是平日多服金石藥毒發所致問之果然因令  
侵晨飲羊血三五升始用退熱解毒生氣血之劑煥  
以生肌膏半月後肥生膿少予因歸令服此藥百餘  
貼方可安全一月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚  
如常但食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平  
遂止不服脉之沉微甚因知其氣血止可供給瘡平  
而比於真氣則已竭不可治卽古人所謂死於瘡結

瘡之後果不出半月而死不獨此膿出後之虛若因虛而發癰疽者亦然若以常法攻之則氣血不勝藥力之散而愈虛邪得以乘機入內多成不救

加味十全湯 治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪

蒸

地黃

蒸

當歸

川芎

人參

茯苓

芍藥

炒

白朮

陳皮

各壹兩

粉草

炙

桂心

五味子

各半兩

烏藥

末

右㕮咀每服壹兩用水壹盞生薑伍片棗貳枚同

煎分作二服留查晒乾為末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱症之緩急時之寒熱加減用之

丹溪云加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實爲切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平痛寬遂以爲安漫不加省往往于結痂後兩三月或半年虛證乃見醫者不察病者不悟無補接調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟

言問不答肌上起白屑如麪片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾於臂背腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予爲作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者太半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸子作料煎飲子頓服之予諫之不聽因而不救書以爲警云

補中益氣湯 治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪

大而無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱  
而煩

黃耆

炙壹錢五分

甘草

炙

人參

當歸

酒炒

白术

炒各壹錢

升麻

柴胡

陳皮

各叁分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎壹鍾空心服  
人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌  
肉消瘦面色痿黃吸收短氣飲食無味不能收斂  
或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不  
變他病

白芍

桑半錢

人參

陳皮

黃芪

蠶炙

桂心

當歸

酒辨

白术

甘草

炙各

壹錢

熟地黃

酒辨

五味子

茯苓

各半

分半

達志

去心炒  
伍分

四君子湯

治脾胃虛弱或因冠伐腫痛不散潰歎

不能宣通此以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒七

惡隨至肺胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作

嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血

尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜

於前湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生  
若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門  
火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參

茯苓

白术

各貳錢

甘草

炙壹錢

右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼耗伐腫痛不消或  
不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈卽前方加

陳皮半夏

異功散 治脾胃虛弱飲食少思卽四君子湯加陳

庚

四物湯 治血虛發熱或因失血或因耗伐或因潰  
後致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於  
脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒  
炒白朮以補脾

熟地黃

當歸

各三錢

芍藥

三錢

川芎

一錢五分

右水煎服

八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食  
退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸

酒洗

川芎

芍藥  
炒

熟地黃

酒拌

人參

白术  
炒

茯苓

各一錢

甘草

炒伍分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食前服  
十全大補湯 治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多  
或清或白 汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或  
膿成不潰潰而不歛若血氣不足之人結腫未成  
膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參

肉桂

地黃

酒洗  
蒸焙

川芎

白芍藥  
炒

茯苓

白朮

炒

黃芪

鹽水  
拌炒

當歸

酒拌各  
壹錢

甘艸

炙伍分

作一劑用水貳鍾薑棗煎服

歸脾湯

治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不

能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或

心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦

人經候不准晡熱內熱或唇瘡流注等症不能消

散潰欬

白朮

白茯苓

黃芪

炒

當歸

龍眼肉

遠志肉

酸棗仁

炒各壹錢

木香

伍分

甘艸

炙參分

人參

壹錢

右薑棗水煎服

黃芪人參湯

治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢

氣所觸者

黃芪

貳錢

人參

白朮

麥門冬

蒼朮

陳皮

升麻

五味子

當歸身

甘草

各壹錢

黃檗

炒肆分

炒麴

伍分

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或晴熱  
內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數  
大便不實等症

當歸

黃芪

人參

熟地黃

川芎

芍藥

甘艸

各伍分

石水煎服

內補黃芪湯

見癰疽症痛條

兼

人參散 治癰疽內虛不足

人參

白朮

白茯苓

枸杞子

各壹兩

熟地黃

黃芪

剉各貳兩

桂心

白芍藥

當歸

微炒

甘草

炙各半兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞入生薑半分棗叁枚煎至陸分去滓不拘時溫服

麥門冬湯 治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬

去心

黃芪

剉

五味子

炒

白茯苓

去黑皮

人參

去蘆

官桂

去粗皮各壹兩

當歸

切焙

遠志

去心

芎藭

各壹兩

甘艸

炙半兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半入生薑半分擘碎大

棗貳枚擘破同煎至壹盞去滓空心溫服  
護壁都尉 治諸發已潰去舊生新老人氣血虛  
宜補之此潰後服至愈而止

防風

去蘆

厚朴

粗皮薑汁炒

苦梗

白芷

黃芪

各半

川芎

甘草

柳桂

當歸

各參錢

人參

貳錢

右爲末每服貳錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後  
更服爲佳不飲酒亦可湯兼服降氣湯尤妙方見  
大味丸一名六味此壯水之劑夫人之生以腎爲主  
地黃丸

凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血失精水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃

生者白  
製捌兩

山茱萸肉

山藥

各肆兩

白茯苓

牡丹皮

澤鴉

各參兩

右地黃杵膏餘爲末蜜和丸桐子大每服半錢

丸滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺卽前方加肉桂附子各壹兩經云益火之源以消陰翳卽此方也

加減八味丸治症同前卽六味丸加肉桂五味子各壹兩

東垣癰疽用藥加減法 如發背疔腫膿潰前後虛而頭痛者托裏藥內加五味子 忡惚不寧加入參茯神 虛而發熱者加地黃瓜萎根 潮熱者加柴胡

胡地骨皮

渴不止者加知母赤小豆

虛煩者加

甘草

枸杞天門冬

自利者加厚朴

膿多者加當歸川

芍

痛甚者加芍藥乳香

肌肉遲生者加白斂官

桂

有風邪者加獨活防風

心驚悸者加丹砂

口目瞞動者加羌活細辛

嘔逆者加丁香藿葉

瘻多者加半夏陳皮

作痛

丹溪云膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛

者此為虛也宜補之

托裏消毒散去後  
三味加參芪歸地

脉數虛而痛者屬虛火宜滋陰

加生地

脉數實而痛者邪氣

實也宜泄之

脉實便秘而痛者邪在內也宜下之

清涼  
飲

脉濇而痛者氣血虛寒也溫補之

定痛丸  
裏散

亦有穢氣所觸者宜和解之

東垣黃氏人參湯丹  
溪云芍藥乳香之類

亦有風寒所逼者宜溫散之

敗毒散丹云防  
風桂枝之類

若有

膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之或用  
利刀剪之腐肉堵塞者去之

丹權小娘瘡後右腿股生癰破後筋骨疼脉虛而濇  
詢之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

川芎

當歸頭

條芩

生地黃

赤芍藥

牛膝

黃檗

甘草

炙貳分

青皮  
炒

檳榔

伍分

通草

叁分

桂皮

壹錢

右煎食前熱飲之

人參內托散 治瘡瘍潰爛而作痛者

人參

黃芪

當歸

川芎

厚朴

防風

桔梗

白芷

官桂

紫草

木香

甘草

右入糯米壹撮水煎服

餘見後兼證痛門宜參看

卷之二 戴院使云未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見

鬼神膿去已多而大熱不休者似爲難治蓋毒之得  
膿猶傷寒表證之得汗汗已而反大熱則爲壞傷寒  
矣又云想癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多  
病於渴縱有發熱躁擾等證不可以治宜用益榮生  
津之劑若大熱不止者難療 脉浮或弱而熱或惡  
寒者陽氣虛也宜補氣補中益氣湯 脉濶而熱者血虛  
也宜補血四物湯 人參養氣湯 午前熱補氣爲主四君  
子湯 黃芪六一湯 午後熱補血爲主四物湯 聖愈湯 脉浮數發  
熱而痛者邪在表也宜散之 脉沉數發熱而痛者  
邪在內也宜下之

薛滄瘡發熱煩躁或出血過多或潰爛大泄或汙多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也若發熱無寐血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯發熱煩躁肉瞶筋惕氣血虛也用八珍湯大渴面赤脈洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脈沉而微陰盛發躁也用四君加薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發熱者重陽無陰也當峻補其陰治者詳之

托裏消毒散加減法

頭痛發熱邪在表也本方加

川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用人參敗

毒散

頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹二味倍

參芪

發熱飲熱便祕內熱也去參芪歸木加大

黃

發熱飲熱便祕內虛也去二味加參芪歸木

面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去

連翹金銀花

正三味倍黃芪當歸如不應暫用

當歸補血湯

身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣

脫發躁也

去三味加肉桂附子如不應暫用附子

理中湯

若婦人勞役恚怒或適經行發熱譖語

虛

或夜間熱甚病在血分也去三味加生地黃牡丹皮柴胡如不應轉用加味四物湯

一男子膿熟不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之膿涌出熱益甚乃虛故也急以人參黃芪湯二劑熱愈甚此藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而瘡東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁宜嘗歸補血湯主之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脈洪大按之無力此氣血虛寒也用十全大補加麥門五味治之其

桂枝  
附佐

症益甚仍用前藥加附子壹錢四劑諸證悉退却去  
附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡  
寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加  
附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因  
考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰  
吐痰作渴頭痛惡寒或熱來復去或不時而動仍用  
補中益氣數劑諸症漸愈元氣漸復乃去附子再加  
肉桂五分百餘劑而愈 一男子背瘡不斂小便赤  
澁舉腫瘍熱口乾體倦脉洪數而無力用參芪歸木

熟地芍芍陳皮麥門五味炙草肉桂以補元氣引火

歸經厥症益甚此藥方未能及也再劑頓退却去肉桂又數劑而愈此症因前失補元氣故耳 操江伍都憲背瘡愈後大熱誤爲熱火用苦寒藥一鍾寒熱益甚欲冷水浴身脉浮大按之全無余曰此陽氣虛浮於肌表無根之火也急用六君子加附子一劑卽愈

宜下  
續篇

外舅子見素膏梁厚味四十三歲疽發于背瘡醫投五香湯躁熱欲狂予固沮之而後已潰後平靜一日熟復大作五六日益甚脉洪數無倫醫皆以爲虛宜補予私計膏梁之變重以五香之熱當治以苦寒追

大便不行數日矣盍下之以泄其毒乎乃研石膏末  
兩許知母二三錢甘草一錢黃瓜蔓一枚和仁搗  
爲一劑命僮熾炭注水而自煎之醫夏生苦口力諫  
以隆冬潰瘍無用白虎法余故復加石膏兩許而置  
大黃片五錢於袖中湯既沸則以袖籠藥銚若爲移  
遠火者而潛下大黃於銚中時妻叔二三輩皆環爐  
坐注目而視不覺也夏生語于聲甫飲是藥必死別  
去聲甫以告余晒之藥成持以飲外舅少頃大便下  
結糞及食物未化者溝行清少熟退身涼乃以四君子  
湯調之月餘而平先是每日診脈皆言不思食食

少而瘡大去死肉多自慮何以生肌歟口乎予信之初意其便溺阻隔而漫下之亦不知爲傷食啖熟也夏生愧甚遠徙去

黃芪散 治癰潰後補虛去客熱

黃芪

石膏

各貳兩

知母

麥門冬

去心

白芍藥

各貳兩

白茯苓

桂心

熟地黃

人參

去蘆

川升麻

各壹兩

甘艸

炙微赤半兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓溫服日

三四服

當歸補血湯

治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目

赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全

無此脉虛血虛也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃芪

炙壹兩

當歸

酒拌參錢

作一劑水壹鍾半煎陸分服

沉香散

治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香

剉

紫胡

去苗柒錢半

黃芪

麥門冬

去心各壹兩

白朮

柒錢半

熟地黃

貳兩

黃芩

瓜蔞根

甘草

生剉半兩各

右剉每服肆錢水壹中盞入竹葉貳柒片小麥伍

拾粒煎至陸分去滓不拘時溫服

加味逍遙散 治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒  
寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽  
乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛  
或胸乳腹脹小便不利

甘草

炙

當歸

芍藥

酒炒

茯苓

白朮

炒

柴胡

各壹錢

牡丹皮

山梔

炒各半分

右水煎服

梔子黃芩湯

治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝

不到發熱不往用以退熱

漏蘆

連翹

山梔仁

黃芩

去心

防風

石葦

如無有根桑白皮爲

生甘草

生犀角

屑

人參

苦參

名去蘆

茯苓

去皮各貳錢半

生黃芪

壹兩去叉蘆

服

一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪大料四劑而止。膜水尚多投八珍湯加桂數劑漸少。惟瘡口不合以附子餅及十全大補湯每劑加炮附。

子五分數劑乃去附子又服月餘而愈

一男子潰

後畏寒脉虛以四君子加炮薑四劑而愈以十全大  
補湯月餘而歛仲景云脈虛則血虛血虛生寒陽氣  
不足也瘡腫脉虛宜托裏和養血信夫

嘔逆丹溪治一老人年七十

云云見兼症嘔條

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲

食

方見內癰門肺癰條下

翹加參犀角若用於腫瘍猶可借其飛走以攻散其  
毒使不延蔓若用於潰瘍雖多有參芪甘草之緩補

而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下  
重虛之戒可不省乎

精要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香  
美益其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾土若香  
美者但能起火經以熱傷脾熱傷氣爲戒今曰益脾  
養氣若施之於腫瘍者似有暢達之理潰瘍後用香  
美恐有發濕熱損真陰之患矣

精要云熱盛脉數與漏蘆湯单煮大黃等湯不甚熱  
肌緩弱只投五香連翹湯夫熱盛脉數若腫瘍時臟  
腑祕而體實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者

熱盛脉數去死為近其可下乎緩弱之脉古人皆以  
為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒  
丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決

無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則  
膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑  
使膿自托出乎其真原夫甘草大黃苦参白芷  
精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清  
臘湯萬金散五香連翹湯六味草朶散千金漏蘆湯  
皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則

津液生氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示  
脉症何以知其當下後又言下利後渴又不止却用  
補藥又不明言脉症恐是但有大渴必與峻下下後  
尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎况渴  
屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣  
之虛何以待下利後方議其虛哉

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪于不得內托以致  
熱毒衝心與琥珀星角膏夫於腫瘍時用之猶或近  
理若於潰瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不助病  
邪致虛以速其死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪

用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰體虛縱有舊熱將自漸因膿血而消何必以峻冷利動藏腑若在秋冬何異用刀劍耶

漬後  
寒熱  
忘正  
氣散

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出不可專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此證者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散濁衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之

漏衛可乎若用於腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又未知用於腫瘍耶潰瘍耶

鬼遺穴有孔慎風仍慎再合如再合者爲風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣害人之命也

三因瘡瘍未合風入爲破傷風濕入爲破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癰疽瘰癧潰後尤宜謹之

金匱要略癰之薄皮剥起癰疽之瘡口緊細瘰癧火針破核之後皆可用追蝕破膿之藥癰疽開後瘡口

再閉宜用藥紅以通之或用紙或用髮或用乾稻草葉皆可塗撚紅塗以蟾酥硇砂白丁香巴豆寒食麵之類或用五灰膏隨輕重塗紅用之瘡疽腐敗可用手法去之或用金寶膏去之或用雄黃輕粉傅之多待數日亦自脫落疽破後有蠹肉努出者遠志末酒調塗之則漸漸消去如不消用五灰膏塗之則消癰疽久流膿水不腐不敗氣血不能滋養瘡口滯毒日漸內侵好肉而為蠹肉膿水過處漸成膜管如鵝毛管而軟其瘡口如魚嘴樣日久不能愈筋爛骨壞用金寶膏或塗或紅或封之一日三四次用之不耐痛

者一治二次用之其蠭肉膜管消盡以滋潤膏藥貼

之薛新甫云瘡瘍之症膿成者當辨其生熟淺深

肉死者當驗其腐潰連脫丹溪先生云癰疽因積毒

在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅固而行經活

血佐之令其內消余常治肺症虛弱者用托裏之藥

則氣血壯而肉不死脉症實熱者用清熱之劑則毒

氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因

血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已

成自潰又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或

內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝灸及

十全大補加薑桂壯其陽氣則四肢卽消瘡頭卽腐  
其毒自解又何假於針割若脾胃虛弱飲食少思用  
六君倍加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死  
者自潰已潰者自斂若初起或因冠伐或犯房事以  
致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附  
湯溫補回陽亦有可生 吳庠史邦直之內仲夏患  
背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少食口乾飲湯脈洪  
大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用  
六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進諸症頓退又用十  
全大補仍加薑桂之類五十餘劑而死肉潰又五十

餘劑而新肉生斯人氣血充盛而瘡易起易歛使醫者逆知預為托裏必無此患

六合回生丹

又名六合奪命散

治發背癰疽潰爛者有回

生之妙

鉛粉

壹兩

輕粉

銀硃

雄黃

乳香

蜀上炙焦

沒藥

亦炙各貳分半共壹

兩、壹錢、分半

右六味各擇真正好者研為極細末收貯凡治其病先煎好濃茶將瘡洗净軟帛拭乾後剖開豬腰子壹枚用藥壹分摻於豬腰子上却傅患處待豬

腰子上發熱如蒸良久取去自此拔毒氣減痛苦  
定瘡口出膿穢不可手擠第二日依前法仍傳之  
第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只  
傳一次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同  
前

泌陽焦闊老先生嘗施此方用藥壹分傳一次則  
止茶仙施此方加藥至參伍分傳數次見効尤速  
功多在拔其毒耳瘡口大者恐一個豬腰子傳之  
不足可加半分割腰子法不可割脫做兩斷須要  
相連如大約量瘡口大小摻藥則可用  
續豬腰子爲佳其腰子有毒宜深埋之

若腫瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上  
量瘡大小裁其蠟紙炙熟摻藥壹貳分粘在蠟紙上

上面貼瘡綿帛縛住任瘡出盡惡水卽愈若患下疳用豬腰子切作寬片摻藥縛裹疳上或以尖刀穿開豬腰子納藥于內龍套其疳亦良羊魚鴟雞犬鴨及發毒藥物俱忌之

驪龍散

治發背癰疽破與不破二者之間功能捷

奏

珍珠

伍分

牛糞

十一月生用  
餘月燒存性

鐵鑄

各重壹兩

右研細末以豬腦髓和好醋調傅瘡口三五次愈初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飲石膏 在膿潰後圍瘡口

麥飯石不拘多少炭火煅至紅以好米醋淬之如此煅碎十數次研爲末重羅去粗者取細末入乳鉢數人更遞研五七日如麵極細爲妙 白斂研爲

細末

鹿角

不用自脫者須用帶腦頭骨全者却是生取之角截作二三十長炭火燒令黑

盡研羅爲末再入乳

鉢更遞研令極細

右用麥飯石細末

貳兩

白斂

末貳兩

鹿角灰

肆兩

最要研得極細方有効粗則反致甚痛細則大能止痛收口排膿精粗之異如此和合量藥末多寡用經年

好米醋入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末用竹箇子不住手攪熬一二時又令稀稠得所提

出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令着塵用時先  
以豬蹄湯洗去膿血以故帛搘乾鵝翎蘸膏塗傅  
四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大未  
潰能令內消已潰則排膿如流水逐日瘡口收斂  
瘡久肌肉腐爛筋骨露出露用舊布片塗藥貼瘡但  
內膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉亦不可  
口氣吹着合藥亦忌腋氣之人及月經有孕婦人  
見之仍可熬好米醋一大碗收磁器內候逐日用  
藥于瘡上久則藥乾以鵝翎蘸醋拂拭藥上勿令  
絳也初則一日一洗一換藥十日後兩日一換

古方云麥飯石顏色黃白類麥飯曾作磨者尤佳  
按麥飯石不可作磨狀如麥飯團生粒點如無此  
石常以舊麵家磨近齒處石代之取其有麥性故  
也或溪中尋白石如豆如米大者卽是也其石大  
小不等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯

解毒百用膏

豬牙皂角

煨

南星

各壹兩

大米

壹合炒黑

臭小粉

乾者肆兩焦去火毒炒

右爲末和勻蜜水調圍 治癰撲酒醋調圍

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜

用逼毒散

黃藥子

白藥子

各壹兩

赤小豆

或兩

雄黃

壹錢

右爲末水調傅

青散子

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡

口生肌

槿花葉

盛時收陰乾取肆兩爲末

白芨

各貳兩

青赤小豆

右爲末臨時用槿花末參錢匕白芨小豆末各壹錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

藥

用貼

雄黃解毒散 治一切癰腫潰爛毒勢盛者先用此  
藥二三次以後用豬蹄湯

雄黃

壹兩

白礬

肆兩

寒水石

壹兩

用滾水貳碗乘熱入前藥壹兩洗患處以太乙  
膏或神異膏貼之

豬蹄湯 治一切癰疽腫毒消去氣去惡肉凡瘡有  
口便須用此湯洗

香白芷

不見火

黃芩

去心

赤芍藥

露蜂房

取有蜂兒者

當歸

去蘆

羌活

生甘草

各等

右爲粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將積  
豬前蹄兩隻壹斤只用白水叁升煮軟將汁分作  
二次澄去面上油花盡下面滓肉每次用藥壹兩  
投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸  
藥湯溫溫徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗  
訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并  
月經見行婦人貓犬並不許入病人房洗瘡切勿  
以手觸着洗疽之方所傳甚多唯此方極効其用  
露蜂房有理蓋以毒驅毒也

集香散 洗癰疽潰爛

白芷

藿香

茅香

香附子

防風

各三錢

木香

甘草

各一錢

作一劑用水參益煎數沸去粗淋洗患處

薛按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得  
臭則逆卽此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡  
或有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後宜用此方  
須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有  
瘡口卽用膏藥貼之至收口為度最忌生肌之劑

熏洗方 凡諸發及癰疽瘻瘍等疾  
或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或  
已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤  
一握搗細用無灰酒瀝汁服之以滓傅瘍四圍用  
雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘍之上俟其  
瘍出膿便以豬蹄湯等十分淨洗久洗為妙至  
一二時辰不妨次用後藥熏之

好降真香末

楓香末

右二味於銚中攬熔丸如彈子大却取香爐一枚  
依爐口造紙煙筒一個如燒龍涎香樣慢火爇之

緊以煙筒口熏滄上不拘丸數稍倦暫止然後更熏未出膿者卽出已出膿者卽乾直候生肌合口然後止向後有赤腫去處又再熏大槩欲屏去穢氣也

癰疽有死肉不去者用白丁香霜梅深則絃之淺則乾摻於膏藥上甚妙

海又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃散 以雄黃壹錢另研巴豆不去皮研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

烏金膏 治發背中央肉死塗之卽腐未死塗之卽

生若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之  
卽潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒  
根以紙擦蘸紙其內有等發背因元氣虛弱或因  
尅伐元氣胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不  
潰服大補之劑中塗三四十許至五六日間赤黯  
之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸黑漸脫須用  
純陽之藥以接其元氣庶能收斂若妄用刀針去  
肉出血陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不  
解氣血愈虛非徒無益而又害之

用巴豆一味去殼炒黑研如膏點於患處臨用金  
之

追毒丹 治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內此丹使之  
潰然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽  
並皆治之

巴豆

柒粒去皮心不  
去油研如泥

輕粉

各壹錢

雄黃

白丁香

黃丹

各貳錢

右件研和加白麵參錢滴水爲丸如麥大針破瘡  
內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌  
不去不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾

小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散 治瘡口惡肉毒潰膿血

巴豆

五錢

寒食麵

壹兩

好細墨

壹錠

右為細末用水和麵作餅子將巴豆包定休教透氣文武火燒成深黑色為細末量瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用掃五七次妙

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水調稠厚周圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸

勿令滚出麵外次日用金銀花煎湯洗淨再如前  
用一次只用醋洗不痛爛肉自去

醉按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛  
不能腐化者宜用大補之劑

治惡瘡有死肉者及追膿

保

白丁香

輕粉

粉霜

雄黃

麝香

各壹錢

巴豆霜

叁分

右為細末新飯和作錠子用之

神異膏 治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃

伍錢

滑石

倍用

右爲末洗後摻瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後  
破爛者用此貼之

止痛拔毒膏 治一切瘡發臭爛不可近未破則貼  
破已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

蟹蝥

肆拾玖枚

柳枝

肆拾條

木鱉子

柒个

乳香

沒藥

麝香

少許

松脂

叁錢

右用真清油拾肆兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃  
丹伍兩滴入水中成珠爲度却入諸藥攪令勻入  
甕器中收了後用

郭氏青金錠子

銅綠參錢

青礬

膽礬

輕粉

砒霜

白丁香

苦草庵各壹錢

腦子少許

麝香

右將草庵研細次下研藥同研極細打稠糊爲錠子或煉蜜加白芨末壹錢爲錠如麻黃粗細約二寸長看瘡口深淺紉入疼者可治不疼難治

第一般緊峻碧雲錠子砒霜生開瘡口用  
第二般緊緩碧霞錠子砒霜煅去死肉用

第三般緩慢碧玉錠子去砒霜加枯礬生好肉用

霞錠子 治年深久漏目久惡瘡有歹肉用之

銅綠

寒水石

煅

滑石

各參錢

明礬

膩粉

砒霜

雲母石

研細粉各壹錢貳分半

右研細末糊爲錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡  
口深淺絀之如修合候天色晴明則可  
信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子

黃丹

砒霜

鷹屎

土硝

白芨

銅綠

各壹錢半

腦子

麝香

各少許

右研細末些兒乳汁和爲錠子用中病即止

紅玉錠子 去歹肉生肌

乾臙脂

白礬

枯各參錢

輕粉

砒霜

黃丹

腦子

麝香

各少許

右研極細末稠糊和爲錠子用之  
時効針頭散 追蝕惡瘡歹肉兼治癰癧

赤石脂

半兩

乳香

白丁香

各貳錢

砒霜

生

黃丹

各壹錢

輕粉

麝香

各半錢

蜈蚣

壹條焙乾

右爲極細末摻於瘡口內自去矣若動刀針其  
瘡雖可有瘢

追毒餅 治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿  
脹痛不可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不  
閉膿水自出瘡自乾好

極好信石

半錢

雄黃

大硃砂

各壹錢

輕粉

少許

雌黃

內服內追毒丹

方見前

右研爲細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生  
膿將藥入內仍以膏藥貼之

薛按此以毒攻毒之意也嘗治一縣尹背瘡竟背

腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用桃紅散

色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋

此亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故攻毒

有効然有氣血虛不能腐潰宜補養氣血常治疾

背初起未成膿先用烏金膏或接生膏點患處數

點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或

不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮

腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處

候有瘡口卽用紙作撲蘸烏金膏紉入瘡內若有

膿爲筋膜間隔不出致作脹痛用針引之腐肉堵  
塞者去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗如膿稠焮痛  
飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之  
仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好肉卽去之如膿  
不稠不稀仍作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑枝灸  
患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不  
焮痛者服大補之劑仍用桑枝灸之以補接陽氣  
解散鬱毒其肉自腐

瘡  
翠青錠子 又名善効錠子治腦疽發背惡瘡并潰  
爛追膿水長肌

銅青

肆錢

明礬

一撮

韶粉

乳香

另研

青黛

各壹

輕粉

各壹

麝香

半錢

杏仁

貳柒粒去皮尖另研

白歛

如有死肉加白丁香

壹錢

右爲細末稠糊爲餅子或糯米飯和亦得看淺深  
絍之直至瘡平復猶可用之大有神効如前數方  
不宜多用謂犯生砒也此藥無毒恐病家猜疑是  
毒藥請口內嘗之爲憑也

搜膿錠子 先用追蝕等錠子蝕去死肉惡物止有  
膿水皆宜用之

自然銅

川芎

白芷

各半兩

黃連

白斂

各貳錢半

木香

壹錢半

麝香

少許

右爲極細末糯米飯和爲錠子用之或作散末乾上亦佳

右二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人無筭凡瘡口深而窄者先以綿杖子展淨釀水却以軟飯和成錠子長短大小一以瘡爲準須令藥到底乃効外以膏藥護之若瘡口淺而闊大者藥湯洗過拭乾只以乾末摻之如瘡口乾燥以自死竹蘸豆

油點着以盃承取滴下油瀝調前藥末雞羽蘸塗  
膿汁自止新肉自生神効

麝香輕粉散 治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡

皆治

麝香

輕粉

各半錢

白礬

飛過

乳香

沒藥

各壹兩

右為細末量瘡乾貼

神効當歸膏

治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能

止痛推陳致新

當歸

貳兩

麻油

肆兩

白蠟

伍錢如用黃蠟壹兩尤効

先用當歸入油煎至焦黑色去粗入蠟溶化卽成

膏矣此方用蠟爲君前人每云蠟爲外科之要藥  
生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善訟者  
杖後隨食蠟兩許飲酒一兩碗一睡之後血散痛  
止輕者卽消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功爲  
大用者不可忽之

神異膏

精要

治諸般惡毒瘡癩瘍背癰疽其妙如神

露蜂房

要用蜂兒多者爲

妙細剪

淨壹兩

去蘆各

玄參

半兩

去蘆各

半兩

去蘆各

半兩

繩黃芪

柒錢

半兩

去蘆各

半兩

去蘆各

半兩

去蘆各

半兩

去蘆各

半兩

去蘆各

全蛇蛻

鹽水洗

焙乾

伍兩研

細研

黃丹

伍兩研

細研

後入

杏仁

去皮尖切

壹兩

小片

壹兩

去皮尖切

男子亂髮

洗淨焙乾

如雞子大

真麻油

壹斤

半斤

右件藥先將麻油入銀錠中同亂髮於風爐上慢  
慢文武火熬候髮焦熔盡以杏仁投入候杏仁色  
變黑好綿濾去粗再將所熬清油入銀錠內然後  
入黃芪玄參二味慢火熬一二時取出錠子安一  
冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻  
二味將柳枝急攪移錠於火上不住手攪慢火熬  
至黃紫色用綿濾過後復入清油在錠內乘冷投  
黃丹急攪片時又移錠於火上文武火慢慢熬不  
住手用柳枝攪手餘轉候藥油變黑色滴於水中  
凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時

必候得所然後用。甕器內封收待用。或恐偶然熬  
火太過，稍硬難用。却入少蠟，熬添麻油在內。甕器  
盛封蓋於甌上。蒸乘熱攪勻收而用之。膏藥熬成  
了，須用所盛甕器置淨水盆中出火毒。一晝夜歇  
三日，方可用。熬此膏藥極難於火候。須耐煩看火。  
緊慢火猛，卽藥中火發。千萬謹戒。膏藥方甚多，  
効無出於此。

垣  
熬瘡寒膏藥

當歸

水洗焙乾壹兩

杏仁

湯浸去皮尖壹百個

黃丹

研細陸兩

肥嫩桃枝

壹兩切如寸，洗淨乾

肥嫩柳枝

壹兩切如寸，洗淨乾

麻油

壹斤

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裹當  
歸杏仁同煎至柳枝黑焦爲度去藥渣瀘油澄淨  
抹去銚中查滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成  
滴水中不散爲度

### 寒瘡熟膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸梢桃柳枝分  
兩倒過便是

神仙太乙膏 治八發癰疽及一切惡瘡軟癰不問  
年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣蟹犬  
咬傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以

溫水洗滌淨軟帛拭乾却用紺帛攤膏藥貼瘡即  
用冷水下血氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒  
下咳嗽及喉閼繩喉風並用新綿裹膏藥置口中  
含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服  
以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下  
腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白  
皮湯下諸漏先以鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙  
攢貼每服壹丸如櫻桃大蛤粉為衣其膏可收十  
年不壞愈久愈烈一方久遠癰瘡同上瘻瘡鹽湯  
洗貼酒下壹丸人血脉不通甘草湯下一切瘡

癤并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參

白芷

當歸

赤芍藥

肉桂

去粗皮

大黃

生地黃各一兩

右剉碎用麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色濾去粗入黃丹壹斤青柳枝不住手攬候滴水中成珠不粘手為度傾入磁器中以甌蓋口搗窖子埋陰樹下以土覆三日出火毒欲服丸如雞頭子大

金絲萬應膏 治擗撲傷損手足肩背并寒濕脚氣

疼痛不可忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青貳斤半

威靈仙

黃蠟各貳兩

木鼈子

貳拾捌個去殼切片子研

蓖麻子

壹百個去殼研

沒藥

乳香各壹兩

麻油

夏貳兩春秋叁兩冬

兩

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪候  
焦黑色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出  
秤二斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟蓖麻木鼈子  
泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手  
扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加

瀝青試得如法却下乳沒未起鍋在炭火上再用  
槐柳條攬數百次又以麤布瀘膏在水盆內扯拔  
如金絲頻換水浸一日却用小銚盛頓如落馬墜  
車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉爲驗連換  
熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患  
處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

善應膏

得効

治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫

打撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火  
漆瘡疥癬貼之卽愈又治婦人吹乳以藥丸如梧  
子大新汲水下貳拾丸肺癰腸癰亦可爲丸吞服

溫酒米飲或北梗甘艸煎湯皆可不可犯葷手及

火焙

上等黃丹

搗兩研極細

白膠香

明沒藥

癩乳香

並別研

大當歸

川白芷

杏仁

去皮尖

大黃

草烏頭

川烏頭

赤芍藥

檳榔

生乾地黃

土芍

亂髮

淨洗

滴青

別研各  
一毫兩

右除乳香沒藥外將釐石銚子盛香油壹斤浸華  
一宿慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮煎少時

用生絹帛瀝去滓留下壹兩藥油復將所瀝油於慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不往手攬候有微烟起提起藥銚將柳條點藥滴在水面上凝結成珠不敢方成膏如不成珠上火再熬直待成膏提起藥銚攬無烟出却入乳香沒藥自膠香末攬勻傾出甕器內將元留下浸藥銚油一併收拾器內用新汲水將藥器坐放水內一日一換過三日出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內攬勻得所

熬膏極難於火候須耐煩看火緊慢火猛則藥

中火發不損失藥性又  
療傷藥人面目慎之

玄武膏 治癰疽發背丁腫內外廉瘡陰疽下諸惡

瘡及頭項癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿  
散毒止疼生肌累有神驗若丁腫先用銀龜或鹿  
角針於丁瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒  
餅如小麥大擦入孔中却用此膏貼之如瘡壞爛  
至甚難以藥則將皂角二三片煎油調勻此膏  
如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙  
大巴豆去殼膜 拾兩 木鱉子去殼各貳兩  
淨黃丹肆兩研細 槐柳嫩枝各柒條剉細  
右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏 治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋

寒諸病

當歸尾

川白芷

杏仁

去皮尖

玄參

豬牙皂角

去皮

草烏

生剉用

白膠香

明者  
捌兩

連鬚葉蔥

肥者  
捨根

滴青

明者  
半斤

乳香

沒藥

別研爲末  
各半兩

黃蠟

明者  
壹兩

男子亂髮

洗淨接布  
雞子大

右用清油半斤將八味依前法熬濾却入膠香滴  
青攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥

貼膏法 如瘡有膿血不淨瘀癥閉礙須用藥水洗

淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出  
流用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日

三日一換貼至愈

長肌膏 治年久諸般爛瘡貼之卽愈

白燭油

肆錢

黃蠟

捌錢

香油

捌錢

大楓子

去殼切  
細伍錢

番木鱉肉

切細貳錢

黃檗

叁錢

右同煎濾去粗入後

枯礬

叁錢

輕粉

叁錢

蜜陀僧

伍分研細各

右將前七味煎濾入後三味拌勻俟凝看瘡口大  
小做薄餅簪穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶

湯洗瘡洗餅再貼以好為度

**附註**大肌肉者脾胃之所主也潰後收斂遲速乃血氣衰盛使然但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑若膿毒未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或達欽而已怯者重者必致內攻或潰爛而不斂其害大矣 薛氏云瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪晡熱內熱陰血虛也四物加參术膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應

竹葉石膏湯熟渴而小便頻數腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日而歟蓋瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之歛由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源爲人身之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本牢固誠哉是言也可不慎歟外治用翠青錠子看淺深紅之如刲肉惡物已去止有膿水却用搜膿錠子瘡口淺平則以散末乾上直至膿淨肉滿方用生肌散四畔輕輕撲之蹙令漸小以至合則無他患矣

精要生肌散

寒水石

碎

滑石

鱗

烏蠣骨

龍骨

各壹兩

定粉

各半錢

蜜陀僧

右爲細末乾摻用之

平肌散

治諸瘡久不斂  
各半錢

蜜陀僧

煅

花藥石

煅

白龍骨

各壹兩

乳香

另研

輕粉

各壹錢

右爲細末和勻乾摻

止應散

郭氏

治金瘡血出不止并諸

又不生肌

寒水石

煅壹兩半

花藥石

龍骨

黃丹

沒藥

各半兩

黃藥子

柒錢半

一方加白芨乳香輕粉

右為細末如一切金刀刀鎌傷者用藥敷上絹帛  
紮之不作膿血瘡膿水乾貼生肌定疼

生肌散

白芨

枯

擗榔

名壹兩

黃丹

血竭

各壹錢

輕粉

半錢

蜜陀僧

壹錢半

軟石膏

煅半兩

黃丹

炒壹錢半

完肌散

定粉

枯礬

黃連

乳香

龍骨

黃芩

輕粉

各壹錢

右各料為極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用

之

生肌散 治瘡口不合

木香

貳錢

黃丹

枯礬

各伍錢

輕粉

貳錢

右件各另為細末用豬膽汁拌勻晒乾再研細摻

患處

薛按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能生者當用托裏之劑又有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆豉餅灸之若流注頑瘡內有膿管或瘀肉或癰核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大潰當用神効當歸膏則能去腐生新止痛大有神効

神祕方

治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去

膿

右用地黃汁壹升松脂貳兩薰陸香壹兩羊腎脂牛酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消卽內羊脂酥更用蠟半雞子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

收口東垣飲瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡上生肌飲肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏梁熟瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

末香檳榔散方

木香

檳榔

黃連

各等分

右爲極細末新汲水調攤紙上貼之濕則乾貼

治寒瘡歟瘡口藥

當歸身

壹錢洗淨晒乾

青皮

去白三分

木香

壹分

黃連

伍分

右四味爲極細末蠟油調塗取効甚速

保命乳香散

瘡口大者

寒水石

一錢

滑石

各壹兩

乳香

沒藥

各半兩

腦子

少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

聖妙散 收斂瘡口

黃檗

壹兩去粗皮細切炒至赤黑色

穿山甲

壹兩炒黃

檳榔

木香

各半兩炒令黃色

雞肫脰

柒枚生用

右爲細末每用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻

瘡口

桃紅散 疎瘡口定痛辟風邪

滑石

肆兩

乳香

輕粉

各貳錢

小荳粉

壹兩

寒水石

叁兩

右爲細末乾摻口上 一方改小荳粉爲定粉

又方治瘡口久不收

小椒

去目炒  
黑壹錢

定粉

風化硝

貳錢

白礬

貳錢半

乳香

沒藥

各壹錢

右爲細末摻之

有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔膜耳自謂必死用大鯽魚一尾去腸肚以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥爲細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此爲瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮於瘡遂致如此用

北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯  
澆洗瘡口四圍淨肉以絹帛兜艾葉乘熱澆沃一日  
一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神  
異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難  
安藥亦無効夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱  
洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪於冷滯大抵  
潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一  
時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非  
虛而何可不先議補接乎

補接卽參芪歸  
术之類是也

蘇亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取壹錢匕酒

調服治瘡久不合神驗

丹溪云髮補陰之功甚大

丹收斂瘡口止有柳皮白斂煎湯飲之

黃丹散

斂瘡口

黃丹

煅

便灸之

白礬

枯

龍骨

寒水石

和再

乳香

則止

末

木香

不見火

黃連

黃芩

檳榔

膩粉

各參錢

腦子

少許

右爲末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾  
却摻其上用不可太早須臘血去盡臨好方用不

然則又舉作

味甘性平，主風寒太早，風飄血去，益顏發色，用不  
過。然未審氣薄，庶用之薄順風，風虛者，發熱發渴。

異名

各處有

鳳翶子

少苦

君能知其君

君

安息香

功以

黃芩

燥不知備

實則

君

洗於寒水

降香

宋而

木香

宋而

君

瀆

黃丹

非行

白礬

以實甘

藥骨

君

黃丹

燒

白礬

以實甘

藥骨

君

丹

燒

白礬

以實甘

藥骨

君

燒

白礬

燒

白礬

以實甘

藥骨

君

君

久漏瘡

因漏瘡須先服補藥以生氣血卽參芪歸芍爲主  
大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷  
隨漏之大小便灸令微熱不可令痛乾則易之乾者  
再研爲末再和再灸如困則止來日再灸宜至肉平  
爲効亦有用附片灸者仍以前血氣藥作膏藥貼之

姜

經云肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間

谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗  
榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大脈留于節湊  
必將爲敗瘡寒留含榮衛不養肉縮筋肋肘不得伸

內爲骨痺外爲不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也

時康祖大夫患心痛二十年嘗胸數竅血液長流醫皆莫能治或曰竅多則愈損閑則慮冗他岐當存其一二猶爲上策坐此形神困瘁又積苦腰痛行則僵仆不飲酒雖羨魚蟹蛤之屬皆不入口淳熙間通判溫州郡守韓子溫見而憐之爲檢聖惠方載腰痛一門考熱二症脉之使自擇康祖曰其年老久羸安敢以爲熟始作寒症治療取一方用鹿茸者服之逾旬痛減更覺氣宇和暢遂一意專服悉屏他藥洎月餘

腰屈復伸無復呼痛心漏亦愈以告醫者皆莫能測  
其所以然後九年康祖自鎮江通判滿秩造朝訪子  
溫則精力倍昔飲啖無所忌不漏愈之後日勝一日  
子溫書吏吳弼亦苦是疾照方服之浹旬而愈其方  
本治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆  
貳兩鹽花參分爲末棗肉丸三十丸空心酒下 天  
聖中工部尚書忠肅公家有媼病漏十餘年一日有  
醫過視之曰此可治也卽取活鱠一竹針五七枚乃  
擲鱠于地鑿因屈盤就盤以竹針貫之覆瘡良久取  
視有白虫數十如針着鱠卽鉉置杯水中蠕動如線

復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰蟲因未盡然  
餘皆小虫請以常用藥傳之時得檳榔黃連一味卽  
爲散傳之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先  
洗瘡口然後傳藥蓋人血氣冷必假艾力以助陽而  
艾性亦能殺蟲也如是者再卽生肌不逾月愈醫曰  
瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡漏  
不可遽合則結毒實虫所爲又曰人每有疾經月不  
瘳則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚疳二廣則  
并治瘡癩由此醫名大著有人脚肚上生一瘡久  
遂成漏經三年百藥不効自度必死一山人見之云

此鱠漏耳但以石灰二三升白沸湯泡薰洗如覺  
痒卽是也如其言用灰湯淋洗果痒三兩次遂乾

一婦項下忽生一塊腫漸緣至腋上腫起莫知何病  
偶用刀刺破出清水一碗日久瘡不合有道人見之  
曰此蟻漏也緣用飯誤食蟻得此耳詢之果然道人  
云此易治但用穿山甲數片燒存性灰爲末傅瘡上  
遂愈蓋穿山甲蟻之畏也 柳休祖者善卜筮其妻  
病鼠瘤積年不瘥垂命休祖遂十得順之復按卦合  
得姓石人治之當獲鼠而愈也旣而鄉里有奴姓石  
能治此病遂灸頭上三處覺佳俄有一鼠逕前而伏

呼貓昨之視鼠頭上有三灸處妻遂差

梅師云經云腎移寒於脾發爲癰腫少氣脾移寒於肝發爲癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸硬而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口不合變爲疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以此骨碎補丸主之

骨碎補丸方

骨碎補

補骨脂

熟地黃

川當歸

續斷

石楠葉

黃芪

石斛

牛膝

杜仲

草薢

以上各貳兩

附子

炮一兩

白芍藥

川芎

兔絲子

沙參

羌活

防風

獨活

天麻

各半兩

此方與大僂方相表裏前桂枝拾遺後有木瓜兔

絲子白朮

右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

元戎云邢三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿  
山甲湯透之復以地黃當歸湯補之繼以骨碎補丸  
外治

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃  
生大瘻宜用

羌活

防風

細辛

附子

甘草

川芎

續斷

白芍藥

白朮

當歸

桂心

麻黃

黃芪

熟地黃

此方與前骨碎補丸相表裏

營氣不從逆于肉理乃生癰腫 陷脉爲瘻留連肉  
腠廡氣化薄傳爲善畏及爲驚駭

桂附丸 治氣漏諸瘻

桂心 附子

炮裂米醋中浸再  
炮三五次去皮臍

厚朴

薑製半錢

粉草

炙

白米

各壹兩

木香

貳錢半

乳香

研貳錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下貳參拾  
丸丹溪云精要治冷漏諸瘻與桂附丸此冷只因  
瘡久不全風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫

其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情  
相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全  
湯隨時令經絡加減用之爲當又虛甚者宜參术  
歸芪膏

陷脉散 治漏瘡及二三十年癰瘤或大如盆孟久  
久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰  
令人驚惕卧寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑

炮

琥珀

研

大黃

附子

炮去皮各壹兩

丹參

柒錢半

石硫黃

研

白石英

研

鍾乳粉

研

烏鵲骨

研各半兩

纂

右爲末貯以甕合韋囊勿令泄氣若瘡濕卽傳無  
汁卽煎豬脂和傳之以乾爲度或死肌不消加芒  
硝貳兩益佳一法胡蘿蔔窠壹枚

丹治漏瘡

川芎

半兩

細辛

貳錢

白芷

貳錢

甘草

細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小  
用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撲成繩子撲入孔  
中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之  
子和小渠袁三因強寇入家傷其兩脰外臙作瘡數

年不已。膿汁常涓涓然，但飲冷，則瘡間冷水浸淫而出，延爲濕瘡。求治，戴人曰：「爾中焦當有綠水二三升，涎數掬。」袁曰：「何也？」戴人曰：「當被盜時，感驚氣入腹，驚則膽傷，足少陽經也。兼兩外臟皆足少陽之部。此膽之甲木受邪，甲木色青，當有二升水，少陽在中焦，如漚既伏，驚涎在中焦，飲冷水咽，爲驚涎所阻，水隨經兩旁入瘡中，故飲水瘡中水出，乃上湧寒痰，汗如流水，次下綠水果二三升一夕而瘳，乾真可怪也。」

嘗治足膝下至踝漏瘡，通足腫大，於好足二倍行步，不全用五龍丸，大下之者六番，每番皆五七行，下後

醫

用黃檗蒼术芪芍地黃甘草升麻葛根南星半夏牛膝滑石桂調之近三四個月而安

本草治瘻有頭出膿水不止以啄木鳥壹隻燒灰酒調服壹錢匕立瘥

東垣云瘻醫自幼至老凡所經驗必須寫之臂記瘻惡瘻諸藥不効者取蟾蜍煎去兩頭安瘻口上以艾炷灸之七壯一易不過七枚無不効者又法用乞火婆蟲兒灸之同前法累驗神効人皆祕之往往父子不傳

取朽骨久疽及瘻漏者有者

取黑骨雞胫骨主等此霜實之鹽泥固濟火燄通  
紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟  
米大以紙擦送入孔竅內更用膏藥貼之

本草雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻  
之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之用黃瑩置  
石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三日三夜其烟上  
着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗  
記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒輔車外腫  
若覆甌肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方  
彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘍中少頃取

朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃整卽

瓦盒也

豬骨膏 治諸瘡口氣冷不差

豬筒骨

貳箇取箇

松脂

貳錢通明者研

乳香

另研

黃連

去鬚爲末

白芨

研末各貳錢半

鉛丹

別研

黃蠟

各半

右搗研熔蠟和爲膏不拘時傳之

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子

半兩去皮臍

川椒

去目

雄黃

細研各貳錢半

白礬

朱錢半火煅研

膾粉

貳錢

爲細末研勻每用清麻油調傅瘡上

雄黃散

治冷瘡緩瘡口

雄黃

研

百合

乳香

黃檗

炙去粗皮

牆上爛白蜆殼

小蚌蛤子是各壹分

右爲細末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭乾傅之

黑靈散

治漏瘡

牡蠣粉

虢丹

硫黃

研各壹分

露蜂房

剝取

右同炒令烟盡爲細末入髮灰壹分麝香少許和

勻傳之

馬齒莧膏 治一切瘻

馬齒莧

陰乾

臘月燭燼

臘月

鼠夾

右爲細末以臘豬脂和先以溫泔清淨洗拭乾然後以藥傳之日三

治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以鹽少許安白牛耳內然後取牛耳中垢以傳瘡上卽瘥如不用鹽卽牛耳不痒難取垢

治諸瘡久不合口用炮附子去皮尖爲細末唾津和隨瘡大小作餅置患處用艾壯於餅上灸之更服

大補氣血藥用江西豆豉爲餅多灸之亦効  
神應膏 宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此  
膏愈之如腸毒胃毒爲丸服之神効

當歸

壹兩

赤芍藥

各壹兩

大黃

各壹兩  
伍錢

香白芷

官桂

各壹兩

玄參

壹兩  
貳錢

川續斷

壹兩  
貳錢

莪朶

壹兩

生地

壹兩  
貳錢

右九味細剉用真香油貳斤浸春五日夏三日秋  
七月冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去渣  
如熱天用黃丹廿兩冷月十五兩旋旋下丹不住  
手攬試水中沉爲度不可令婦人雞犬見如漏布

孔者以膏送入孔內外以膏攤貼之

檳榔散

治癰疽瘍瘍膿潰之後外觸風寒腫欷膿

硬膿水清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊

干及好肌不生及療瘡瘍惡瘡浸潰不斂

方見潰瘍斂瘡

口藥卽木香攢榔黃連等分爲末是也

治漏外寒藥

蘆甘石

童便  
蜜漬

牡蠣粉

右爲極細末傳之

烏金散

貼惡瘡瘍

橡斗子黑

一實黃丹一實白礬末相合定用黑

俏麻

內燒研細加麝少許洗淨瘡貼之

東垣截瘻散

治癰瘻瘡瘍

苦連

麝香粉

龍腦

各半兩

蜜陀僧

黃丹

白芨

白欽

各壹兩

輕粉

錢壹

右爲細末和勻乾摻在絳上以膏貼之

應効散

又名裏散

治氣瘻瘍瘍多年不効者

地骨皮

不以多取只取皮葉乾

爲細末每用紙燃薰絳瘍

口內自然生肉

用米飲調貳錢無時服日三

治漏瘍以五倍子末和血竭末塞之

久漏瘍

足內踝上二寸

灸三壯六壯

如在上者肩井

鴉尾

肺脉微緩爲癰瘍緩者多熱

人癰疽所兼諸證

○渴

大法瘡瘍作渴不問腫消但脉數發熱而渴用竹葉黃芪湯脉不數不發熱或脉數無力而渴或口乾用補中益氣湯若脉數便秘用清涼飲尺脉洪大按之無力而渴用加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此尤妙

薛瘡瘍作渴若燒炭火熱便利調和者上焦熱也用竹葉石膏湯腫瘍發熱大便秘滯者內臟熱也用四順清涼飲微通甚者毒蘊結也用仙方活命飲

漫腫微痛者氣血壅滯也用補中益氣湯若因胃火消爍而津液短少者用竹葉黃芪湯若因胃氣虛而不能生津液者用參苓益氣湯若因胃氣傷而內亡津液者用七味之參散若因腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或舌黃乾硬小便數而疽生者尤惡候也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免後患

丹癰疽發渴乃氣血兩虛用參芪以補氣歸芍以養血或忍冬丸黃芪六一湯

任氏云瘡作渴其急與神仙追毒丸取下惡毒清腔  
湯千金漏蘆湯五香連翹湯六味車螯散萬金散皆  
可選用利後仍渴却用生津補氣藥津液生氣血完  
渴自止 丹溪曰大渴而與利藥非明示脉證何以  
知其當下後言利後仍渴却用補藥又不明言脉證  
恐是但有大渴必下後尚渴方與補藥古人治未  
病如此用藥可乎况渴屬上焦當腫瘍時猶或可用  
若潰瘍後渴多因氣血之虛何待利後方議其虛也  
**精要**口乾與口渴不同不宜用丹藥鎮墻用之其禍  
如反掌用桑枝煎五味湯以救陰水 丹溪曰此妙

方也而不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦未易除也

李氏云病癥愈後發渴多致不救惟加減八味丸最妙蓋癰疽多因虛而得疽安而渴者服此丸則渴止安而未渴者服此丸永不發渴或未疽而先渴者服此不惟渴止而疽亦不作 薛氏曰前證屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅煩躁不寧或二三年先作渴飲水

或口舌生瘡兩足發熱痰氣上壅或瘡愈三四年口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知

其因預服前丸可免此患若兼手足厥冷真陽虛也  
宜服八味丸大凡瘡後審其腎水不足用加減八味  
丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補  
湯陽氣虛寒加薑桂如不應用八味丸

托裏消毒散加減法 飲冷作渴熱毒也加赤小豆  
知母如不應暫用竹葉黃芪湯 善食作渴胃火  
也加石膏山梔天花粉如不應暫用竹葉石膏湯  
食少體倦作渴胃氣虛也去正翹金銀花加人  
參白朮如不應暫用補中益氣湯 腫多而作渴  
氣血虛也去二味加熟地黃五味子 如不應暫

用十全大補湯加五味子麥門冬 口乾舌燥腎氣虛也去三味加熟地黃山茱萸山藥如不應兼六味丸又不應佐以補中益氣湯 自汗內熱口乾胃氣虛也去三味加參芪歸术如不應暫用六君子湯 滴汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟地黃麥門冬五味子如不應暫用當歸六黃湯

竹葉黃芪湯

神秘

治癰疽大渴發熱或瀉或小便如

淋

生地黃

黃芪各貳錢

當歸 酒拌

淡竹葉

川芎

甘艸 炙

黃芩

炒

白芍藥

炒

人參

括萎根

石膏

附各宣錢

麥門冬

去心貞錢

水貳鍾薑參片煎八分食遠服

薛氏曰前證乃七惡中之一也此方治之其功甚捷亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右手脉沉實而熱或渴者宜躁去內邪若潰後作渴或小便如淋或脈大而無力者屬氣血虛也宜大補氣血亦有潰後熱不止或作渴遂以爲敗證不治若素有胃火或胃經熱毒未盡胃脉尚數者仍宜服前湯服而脉反大熱愈甚則愈作斯爲敗證

蓋因真氣虛而邪氣實也。全之潰瘍畏石膏黃芩  
二藥性冷多不育服若胃脉未靜非此藥莫能治  
也。若因循日久煎熬氣血，養血愈多氣血愈虛，反  
成敗證矣。治者當捨證從脉可也。大抵瘡瘍之證  
七惡內見一二惡甚可畏，虛中見惡證者不治，實  
證無惡候者自愈。

托裏黃芪湯 治證同前

黃芪

炒陸錢

甘草

炙

括萎根

各壹錢尤妙

水貳鍾煎，捌分頻服之。加人參壹錢尤妙。

薛氏曰：愚用此方治氣虛作渴甚効。若氣血俱虛

或膿血大泄作渴或兼發熱者宜托裏養榮湯

托裏養榮湯

人參

黃芪

當歸

酒拌

芍藥

熟地黃

麥門冬

去心

川芎

白术

各壹錢

五味子

研

炙甘草

各伍分

水煎鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食遠服

黃芪六一湯 常服終身可免癰疽實治渴補虛之  
要劑也

綿黃芪

陸兩用淡米水潤飯上蒸七分乾

甘草

壹兩一半生一半炙

每剉壹兩水貳鍾煎剝分食遠服 或爲細末每  
服貳錢早晨日午白湯調服 加人參尤妙  
七味白朮散 治胃氣虛或因耗伐或因吐瀉口乾  
作渴飲食少思

白朮

茯苓

去皮

人參

各半錢

甘艸

炙壹  
兩半

木香

貳錢  
半

藿香葉

半兩

葛根

壹  
兩半

右爲細末每服叁伍錢白湯調下

竹葉石膏湯

治癰疽胃火盛腫痛作渴

淡竹葉

石膏

桔梗

木通

薄荷

甘草

多

右薑水煎服

玄參散 治癰疽成膿水不能下食心煩口乾煩渴  
飲水多四肢羸瘦

玄參

黃連

去鬚

土瓜根

麥門冬

去心

赤芍藥

白鮮皮

各兩

升麻

柴錢半

火麻仁

川朴硝

川大黃

剉炒各  
壹兩半

右剉每服參錢水壹中盞入生地黃壹分細切同  
煎至陸分去滓不拘時溫服

葛根散 治癰腫熱盛口乾煩渴或時乾嘔

葛根

黃芪

升麻

麥門冬

瓜萎根

赤芍藥

梔子仁

生地黃

各壹兩

黃芩

柒錢半

甘草

半兩  
生用

右剉每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓無時溫服  
乾葛飲 治發背作渴

黃芩

朴硝

各壹兩  
貳錢半

乾葛

壹兩

右剉散每服參錢用枇杷葉去背上白毛淨洗同  
煎不拘時服

忍冬丸 治渴疾既愈預防發疽先將忍冬草入瓶  
忍冬丸

內後入無灰酒微火煨一宿取出晒乾少加甘草  
俱爲末又以所浸餘酒調糊丸如梧桐子大每服  
陸柒拾丸溫酒下又治五痔諸癰

桑枝方大治口渴取嫩桑枝細切壹升炒以水叁升  
煎壹升日服五七劑更多尤妙抱朴子云療風痺  
乾燥臂痛脚氣四肢拘攣上氣眩暈久服補肺消  
食利小便輕之聰明令人光澤其功不能盡述

薛氏曰桑枝蕩血氣生津液輕身明目補肺腎之  
良劑也

五味子湯 治腎水枯涸口燥舌乾

黃芪

炒參兩

人參

貳兩

五味子

麥門冬

去心各一兩

粉甘草

炙五錢

每服伍錢水煎日夜服五七劑

薛氏曰此乃六一湯生脉散之複方滋化源之良劑若腎水既涸虛火上炎而口燥作渴者須佐以加減八味丸

加減八味地黃丸

懷慶地黃

肥大沉水若干酒洗淨碧盞盛之大碗

之濕紙糊縫勿令泄

冷取出晒極乾秤准兩重再如前法蒸之乘

熟杵爛

乾山藥

山茱萸肉

五味子

各肆兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

酒浸蒸焙各參兩

肉桂

貳兩

右各另爲末入地黃和勻加煉蜜丸如梧桐大每服半掬拾丸空心食前白湯下

李氏曰一貴人病疽未安而渴作日飲水數升予用前方諸醫大笑云此藥若能止渴我輩不復業醫矣仍用木瓜烏梅百藥煎等渴愈甚不得已用此丸三日渴止父服氣血益壯飲食加倍

○嘔

精要云嘔逆有一證一證謂初發不曾服內托

散伏熱在心一證謂氣虛脾氣不正其伏熱在心者與內托散三兩貼氣虛者宜嘉禾散有寒熱宜正氣散兼與山藥丸以補腎丹溪曰諸逆衝上嘔噦皆屬於火內托散性涼固有降火之理若嘉禾散補力已少徒溫緩以助火耳山藥丸補腎以壯下焦之陰粗爲近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛治之若年老因疽潰後嘔逆不食者宜參芪白朮膏峻補取効佐使藥隨時隨證加減恐用山藥丸緩急未易得力河間謂瘡瘍嘔者潔氣侵胃也藥中宜倍加白朮

薛瘡瘍作嘔不可泥於毒氣內攻而槩用敗毒等藥  
如熱甚焮痛邪氣實也仙方活命飲解之作膿焮痛  
胃氣虛也托裏消毒散補之膿熱脹痛氣血虛也先  
用托裏散後用針以泄之焮痛便秘熱蘊於內也內  
疎黃連湯導之若因寒藥傷胃而嘔者托裏健中湯  
胃寒少食而嘔者托裏益中湯中虛寒淫而嘔者托  
裏溫中湯肝木乘脾土而嘔者托裏抑青湯胃脘停  
痰而嘔者托裏清中湯脾虛自病而嘔者托裏益黃  
湯鬱結傷脾而嘔者托裏越鞠湯若不詳究其源而  
妄用攻毒之藥則腫者不能潰潰者不能歟矣丹溪

雖曰腫瘍當作毒氣攻心治之潰瘍當作陰虛治之亦大槩之言耳今之熱毒內攻而嘔者寡脾胃虛寒而嘔者多豈可膠柱而鼓瑟哉 又曰欲嘔作嘔或外搽內服寒涼或痛甚或感寒邪穢氣而嘔皆胃氣虛也托裏消毒散去三味加藿香倍參术

然盛脉數精要與漏蘆湯单煮大黃湯等若不甚熟脉緩弱只投五香連翹湯 丹溪曰熱盛脉數若腫瘍時藏府祕而體實者猶可與也若潰瘍膿血出多熱盛脉數去死為近豈可下乎緩弱之脉古人皆以爲邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

李氏云癰疽逆是毒氣衝心非脾胃之冷當服內托散楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背發大疽自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投之終夜大嘔連進內托散嘔止瘡潰赤水淋漓四日而愈又有患癰者痛過徹嘔此卽止今有病疽不服此藥者故引楊氏之言以解世人之惑

丹溪治一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自服內托散膈中不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急發參芪歸木煮膏以牛

膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥壹斤半淋止思食七  
日後盡藥四斤膿自涌出而得睡又兼旬而安

男子年六十餘性好酒肉背疽見膿嘔逆發熱蓋其  
得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以  
溫胃行氣時七月大熱肺洪數有力予因謂此肺證  
在潰瘍尤忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡  
藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不薄味  
必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左  
脇傍生一軟塊如餅二年後軟塊為疽本人見膿血  
淋漓而脉洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入

竹瀝飲之又十餘斤百餘竿而安今八十歲強健如  
舊此病兩以老年氣血弱專服人參竹瀝而愈若與  
內托十宣恐未能若是之安全也 妻全善治一男  
子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服嘔即愈

薛新甫治一人腹癰焮痛煩躁作嘔脉實河間云瘡  
瘍者火之屬須分內外以治其本若脉沉實者先當  
疎其內以絕其源又云嘔噦心煩脉沉而實腫硬木  
閼或皮肉不變邪氣在內宜用內疎黃連湯治之遂  
用前湯通利二三行諸證悉去更以連翹消毒散而  
愈 一人患臂毒瘡痛作嘔服托裏消毒藥愈甚以

涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消  
新甫又治一人年踰四十患發背已潰忽嘔而瘡痛  
胃脉弦緊彼以為餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足  
厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後痰嘔不食者濕氣侵  
於內也又云體出而反痛此為虛也今胃脉弦緊木  
乘土位其虛明矣欲以六君子湯用酒炒芍藥砂仁  
霍香治之彼自服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥  
更以補氣血藥兩月而愈大抵濕氣內侵或感穢氣  
而作嘔者必喜溫而脉弱甚者毒內攻而作嘔者必喜  
涼而脈數必須辨認明白

橘半胃苓湯 治癰疽嘔吐不下食不知味

水夏 薑製各壹錢 蒼朮 米泔浸炒一

橘紅

半夏

薑製各壹錢

蒼朮

米泔浸炒一

白朮 炒

厚朴

薑製

甘草

炙

茯苓

人參

澤鴻

茅根

名貳錢

薑汁

數匙

水貳鍾煎壹鍾入薑汁煎一二沸作十餘次飲之

薛氏曰前證七惡中之五惡也用此方後胃氣將

醒宜用六君子湯兼服之亦有煩躁飲冷不食脉

沉實而嘔者恐不可用此宜內疎黃連湯

方見腫瘍

加減托裏消毒散 治瘡瘍欲嘔作嘔或外搽內服

寒涼或痛甚或感寒亦穢氣而嘔皆胃氣虛也去

白芷連翹金銀花加參术藿香

方見腫  
內托條

托裏健中湯 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等證

人參 白朮

茯苓 各貳錢

半夏

炮薑 各壹錢

炙甘草 伍分

黃芪

壹錢  
伍分

肉桂

叁分

右薑棗水煎服

托裏益中湯 治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散

或潰而不斂

人參

白术

陳皮

半夏

茯苓

炮薑

各壹錢

木香

炙甘草

各伍分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯 治脾土虛弱肝木所侮以致飲食少  
思或胸膈不利等證

人參

白术

茯苓

半夏

各壹錢

芍藥

柴胡

甘草

各伍分

陳皮

壹錢

右薑棗水煎服

托裏清中湯 治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等

證

人參

白朮

陳皮

茯苓

各壹錢

半夏

捌分

桔梗

柒分

甘草

伍分

右薑棗水煎服

托裏益黃湯 治脾土虛寒水反侮土以致飲食少  
思或嘔吐泄瀉等證

人參

白朮

陳皮

茯苓

半夏

各壹錢

炮薑

丁香

炙甘草

各伍分

右薑棗水煎服

托裏越鞠湯 治六癆所傷脾胃虛弱飲食少思等

證

人參

白术

合貳錢

陳皮

半夏

各壹錢

山梔

川芎

香附米

蒼朮

各柒分

炙甘艸

伍分

右薑棗水煎服

人參理中湯 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少  
思肚腹作悶或有形症 脘飲食不入

白术

人參

乾薑

甘草

參

古方  
寒水煎服

○痛

夫瘡瘍之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒可以止痛殊不知因病制宜自有活法故因熱而痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也因寒而痛者以溫熱之藥熨其寒則痛自除也因風而痛者除其風因濕而痛者除其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡滯滯者利之憂愁者遂志酒飲之虛寒

而痛者乳香沒藥止之大抵癰疽不可不痛不可大  
痛若大痛悶亂者危 薛新甫云瘡瘍之作由六淫

七情所傷其痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在內  
便祕而作痛者內疎黃連湯導之熱毒熾盛焮腫而  
作痛者黃連解毒散治之不應仙方活命飲解之瘀  
血凝滯而作痛者乳香定痛散和之作膿而痛者托  
裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之  
若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪  
腎虛而痛六味地黃丸口乾作渴小便頻數者加減  
八味丸此皆止痛之法也

托裏消毒散 加減法

若高壘焮痛熱毒也加黃連

漫腫微癰氣虛也去金銀花連翹

加參术 腫赤

作痛血凝澤色加羌活

沒藥如不應暫用仙方活

命飲 膽苦反痛氣虛也去金銀花連翹白芷

加參芪歸地 滾腫不爛或肉死不潰脾氣虛也

去三味加入參白术如不應加薑桂更不應急加

附子

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃芪人參湯

黃芪人參湯

人參

蒼朮

水滑  
炒

白术

炒

陳皮

麥門冬

去心

當歸

酒朴

神麴

炒

甘艸

炙

五味子

桔各  
壹錢

黃芪

炙  
貳錢

黃檗

炒

升麻

各肆分  
壹錢

薛按前證七惡中之三惡也宜此方治之亦有潰後虛而發熱或作痛少寐尤効若痛少止大便不

實黃檗麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之後若脉洪大則難治自利者不治

癰疽大痛不止宜用加味解毒湯

加味解毒湯

黃芪

鹽水  
拌炒

黃連

炒

黃芩

炒

黃檗

炒

連翹

當歸

酒搗各

甘艸

炙

白芍藥

梔子仁

炒各  
壹錢

作一劑水貳鍾煎捌分服之藥下痛卽止

按此方若脉洪大按之有力者用此解之其功甚捷亦有便秘脉實而痛者宜用內疎黃連湯下之若潰而反痛者宜用內補黃芪湯補之

內補黃芪湯

黃芪

鹽水  
拌

熟地黃

酒  
拌

人參

茯苓

炒  
貳錢

甘艸

炙各

芍藥

炒

川芎

官桂

遠志

去心炒

當歸

酒拌各  
捌分

麥門冬

去心  
伍分

作一劑水壹鍾半薑參片棗貳枚煎陸分食遠服

當歸和血散

治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦

人產前產後腹痛

當歸

煎錢

乳香

半錢

沒藥

壹錢

白芍藥

參錢

右爲細末每服壹錢水壹中盞煎半分和滓溫服

日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木

香婦人服之加赤芍藥

廻瘡金銀花散

治瘡瘍痛甚色變紫黑者

金銀花

連枝葉俱用  
剉研貳兩

黃芪

肆兩

甘草

壹兩

右咬咀用酒壹升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時辰取出去滓頓服之方無黃芪

郭氏定痛托裏散 治一切瘡腫疼痛不可忍如少

壯氣充實先用疎利後服此藥

粟殼

去殼炒  
貳兩

當歸

白芍藥

川芎

各半兩

乳香

沒藥

桂

各參錢

右咬咀每服伍錢水煎

乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止

粟殼

陸丙  
製

白芷

參兩

甘艸

長

陳皮

各壹半

乳香

沒藥

各壹兩

丁香

半兩

右咬咀每服參錢水壹盞半煎

乳香黃芪散 治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼痛不

可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀  
砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪

去蘆

當歸

酒洗

川芎

麻黃

去根節

甘草

生用

芍藥

人參

去蘆

粟殼

各壹兩  
蜜炒

乳香

另研

沒藥

各伍錢  
另研

陳皮

壹兩

右爲細末每服參錢水壹盞煎至半分去粗溫服  
如瘡在上食後在下食前服之  
人參內托散 治瘡瘍潰膿而作痛者

人參

黃芪

當歸

川芎

厚朴

防風

桔梗

白芷

官桂

紫草

木香

甘艸

右入糯米壹撮水煎服

乳香丸 治铁背及一切疽瘡潰爛痛不可忍

乳香

別研

沒藥

別研

羌活

五靈脂

獨活

各一錢

川芎

當歸

真葛豆粉

交趾桂

川白芷

白膠香

各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸細嚼薄荷湯送下手足損痛不能起者加草烏用木瓜鹽

湯送下

乳香定痛散 治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香

沒藥

各伍錢

滑石

寒水石

各壹兩

冰片

壹錢

右爲細末擦患處痛卽止 敷藥中加南星半夏  
能止痛更加蓖麻仁尤佳

豆豉餅 治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并  
切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅爲末唾津和作餅子  
如錢大厚如參文置患處以艾壯於餅上灸之乾  
則易之如背瘡用漱口水調作餅覆患處以艾鋪  
餅上灸之如未成者卽消已成者亦殺其大毒如  
有不効氣血虛敗也

乳香膏 治諸瘡痛久不瘥

食鹽 松脂

乳香

壹兩  
別研

杏仁

去皮尖研各壹兩半生

地黃

取汁合白羊腎脂半斤參

黃蠟

參兩

煎候臘熔盡入香幽松枝煎以柳筆攪令勻稀稠

得所磁盒盛

瘡口日三二度

又乳香膏

木鬚子

去殼細剉

當歸

各壹兩

柳枝

貳寸寸剉同以清

黑色次用後

油肆兩煎令

乳香

沒藥

各半兩

白膠香

明淨者肆兩同研細入油煎化用

者肆兩同研細入油煎化用

而子濾之

右煉藥鐵鉗令極淨弄傾前藥油蠟在內候溫入  
黃丹壹兩半以兩柳枝攬極得所再上火煎不住  
手攬候油沸起住攬注在水中成珠不散爲度秋  
冬欲軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之  
戴院使云有不傳藥時大痛傳節不痛有不傳藥不  
痛傳之則痛蓋寒熱風濕并憂怒等氣積而內攻則  
痛不禁藥拔出之故不痛也死血陰毒在中愈伏愈  
深愈不覺痛藥發之於外故反痛也

○出血

薛瘡瘍出血因五臟之氣鬪損虛火動而錯經妄行

也當求其經審其因而治之若肝熱而血妄行者四物炒梔丹皮芩术肝虛而不能藏血者六味地黃丸心虛而不能主血者四物炒連丹皮芩术脾虛熱而不能統血者四君炒梔丹皮右脾經鬱結用歸脾湯加五味子肺脾氣虛用補中益氣加五味子氣血俱虛用十全大補陰火動用六味丸加五味子大凡失血過多見煩熱發渴等證勿論其脉急用獨參湯以補氣經云血生於氣若非參芪歸术甘溫等劑以生心肝之血決不能愈若發熱脉大者不治凡患血症皆當以犀角地黃湯為主

翰林屠漸山年四十患

濕毒瘡疾誤用輕粉之劑虧損元氣久不能愈一日  
將晡之際診之肝家益渙數而有力余曰何肝脉之  
如此侵晨瘡出黯紅三四碗體倦自汗雖甚可畏所  
喜血黯而脉靜余曰此輕粉之熱血受其毒而妄行  
輕粉之毒亦得以泄邪氣去而真氣虛也當急用獨  
參湯主之余重其爲人體恤甚篤但惑於他言不果  
致邪氣連綿不已惜哉

一人背瘡出血煩躁作渴

脉洪大按之如無此血脫發躁用當歸補血湯二劑  
少愈又以八珍加黃芪山梔數劑全愈

一婦人潰

後吐鮮血三椀許余用獨參湯而血止用四君熟地

手歸而瘡愈此血脫補氣陽生陰長之理也若用涼  
血降火沉陰之劑脾土生氣復傷不惟血不歸源而  
死無疑矣一老婦手大指患疔爲人針破出鮮血  
手背俱腫半體皆痛神思昏憤五日矣用活命飲始  
知痛在乎瘻旁雖惡不宜大攻再用大補劑又各一  
劑外用薑蒜灸喜此手背赤腫而出毒水又各一劑  
赤腫漸潰又用托裏藥而瘥南儀部賀朝卿陞山  
西少叅別侍余見其鼻青黑且時搔背問其故曰  
有一小瘡耳余與視之果疽也此脾胃敗壞爲不治  
之證余素知其悲其途次不便殯斂遂托其僚友張

東沙黃連留之勉與人補但出熱血虛極也或謂毒  
熾不能為體乃服攻寒藥一錘以致嘔逆脫果卒  
於南都 余憲張碧璽腰患症聲而入房脉洪數兩  
尺更大余辭不治翁發其子強留頃間吐臭血五  
六椀余意此腎經虛火而並妄行血必從齒縫出將  
合肉桂等補腎制火之藥合用確別煎熟聽用血止  
拭齒視之果然遂合一錘少服之熱渴頓止少頃溫  
服一鍾脉細欲脫氣息奄奄得藥則脉少復良久仍  
脫其子疑內有膿欲刺之余曰必無乃以鶩翎管紙  
內果如余言次日脉脫脚寒至膝腹內如冰急用六

君加薑附腹始溫膿始潰瘍口將完彼因侍者皆  
妾又患小便不通此陰已癥而思色以降其精精內  
敗不出而然耳用加減八味丸料加參芪白朮一劑  
小便雖愈瘍口不歟而沒

東垣聖愈湯 治諸惡瘍血出不止以寒水石細末  
摻之立止或瘍時間作黑色不可潰也藥力去盡  
却紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血  
也此湯主之

熟地黃

生地黃

各參錢

當歸身

壹錢半

川芎

葛根

黃芪

伍分

人參

參分

右㕮咀都作一服水煎盞半煎至壹盞去滓稍熱  
服無時按此方參以與歸地  
輕重懸殊故有此也

濟生黑角地黃湯 治胃火血熱妄行吐衄或大便  
下血者

星角

鎗末

生地黃

赤芍藥

牡丹皮

各壹錢半

升麻

黃芩

炒各壹錢

右水煎熟入星角末服

若因怒而致加山梔柴胡若脾氣虛而不能攝用  
歸脾湯若肝脾火動而妄行用加味逍遙散若脾  
氣虛而不能統用補中益氣湯加炮黑乾薑若血

虛有火而妄行用四物加炮薑若腎經虛火而血妄行用六味丸料不應急加肉桂以引虛火歸源獨參湯 治一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫補氣陽生陰長之理也用人參貳兩棗拾枚薑拾片水煎徐徐服

托裏消毒散加減法 腫多帶赤血虛也去金銀花連翹白芷三味加歸地參末如不應暫用八珍湯加牡丹皮 怒怒脯熟而出血肝火血虛也去三味加牡丹皮炒黑山梔熟地如不應暫用八珍湯

送六味丸 面青脇脹而出血肝氣虛而不能藏  
血也去三味加山茱山藥五味子如不應兼六味  
丸 食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去  
三味加參木歸地黃芍藥怒少寐更加遠志酸棗仁  
茯神龍眼肉如不應暫用歸脾湯

○瘡僵肉

梅治背瘡肉長疾皮不及裹見風卽成僵以寒水石  
燒研爲細末傅瘡上再用銅綠細末上之肉卽不作  
僵矣

○瘡癰急牽陰入腹

圖經古方療惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急擘牽入  
小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁壹  
升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此  
外國方永嘉以來用之起死神効

○咽喉口舌生瘡

精要犀角膏 治咽喉口舌生瘡昔有一貴人因疽  
而生此證醫者以為心臟絕盡皆辭退愚進此藥  
一日而安

真琥珀

研

生犀角

各壹錢

辰砂

研

茯神

去木名  
貳錢

真腦子

研壹字  
人參

去  
蘆

酸棗仁

去皮研  
各等量

右人參茯神犀角爲細末入乳鉢內別研藥味和  
勻用蜜搜爲膏子以堯瓶收貯俟其疾作每服壹  
彈子大以麥門冬去心濃煎湯化服一日連服五  
服取効此方潰瘍  
不宜用

○大便秘結

薛東垣先生云瘡瘍熱毒深固嘔噦心逆發熱而煩  
脉沉而實腫硬木悶大便秘結此毒在臟宜諫通之  
故曰諫通其內以絕其源又曰瘡瘍及諸病面赤雖  
伏火熱不得妄攻其裏而陽氣拂鬱邪氣在經宜發

表以去之故曰火鬱則發之凡大便不通飲食雖多  
肚腹不脹切不可通若腹痞脹而不通者乃直腸乾  
涸也宜用豬膽汁導之若腸胃氣虛血涸而不通者  
宜用十全大補湯培養之若瘡症屬陽或因入房傷  
腎而不通者宜用前湯加薑附回陽多有得生者經  
云腎開竅於二陰藏精於腎津液潤則大便如常若  
潰瘍有此因氣血虧損腸胃乾涸當大補為善設若  
不審虛實而一於疎利者鮮有不誤 一人仲夏患  
發背黯腫尺餘皆有小頭如鑄黍狀四日矣此真氣  
虛而邪氣實遂服蘇葵服活命飲二劑其邪頓退乃

純補其真又將生脉散以代茶飲瘧邪大退余因他  
往三日復視之飲食不入中央死肉大便祕結小便  
赤濁余曰中央肉死毒氣盛而脾氣虛也大便不通  
腸虛而不能傳送小便赤濁脾虛而火下陷治亦難  
矣彼始云莫非間斷補藥之過予曰然乃急用六君子  
加當歸柴胡升麻飲食漸進大便自通外用烏金  
膏塗中央三寸許四圍紅疪漸消中央黑腐漸去乃  
敷當歸膏用地黃丸與前藥間服將百劑而愈

男子腿患癰因服射伐虧損元氣不能成膿余爲托  
裏而潰大補而斂但大便結燥用十全大補湯加麥

門五味而潤月餘仍結惑於人言乃服潤腸丸而瀉  
不止余用補中益氣湯送四神丸數服而止

潤腸丸 治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用

此丸通之若結在直腸宜豬膽汁導之蓋腎主五  
液開竅於二陰若津液滋潤大便通調若津液不  
足脾氣虧損必當培補猶忌前藥

麻子仁

桃仁

去皮尖  
各壹兩

羌活

當歸尾

大黃

煨

皂角刺

秦艽

各伍錢

右各另研爲末煉蜜或豬膽汁丸桐子大每服參

肆拾丸白湯下若使豬膽汁導之而不結燥急補

元氣

○大便瀉利

醉瘡瘍大便泄瀉或因寒涼耗伐脾氣虧損或因脾氣虛弱食不尅化或因脾虛下陷不能升舉或因命門火衰不能生土或因腎經虛弱不能禁止或因腎虛寒不能司職所主之法若寒涼傷脾用六君加木香砂仁送二神丸脾虛下陷用補中益氣送二神丸命門火衰用八味丸料送四神丸腎虛不禁用薑附湯加吳茱萸五味脾胃虛寒用參附湯送四神丸

病機云脉沉而細身不動作睛不瞭瞭飲食不下鼻  
準氣息者薑附湯主之身重四肢不舉者參附湯主  
之仲景先生云下痢腸鳴當溫之脉遲緊痛未止當  
溫之大孔痛當溫之心痛當救裏可與理中附子四  
逆輩精要云癰疽嘔瀉腎脉虛者不治此發內經之  
微旨也凡此實難治之症如按前法治之多有可生  
者一婦年踰四十背疽不起發泄瀉作嘔食少厥  
逆脉息如無屬陽氣虛寒用大補劑加附子薑桂不  
應再加附子二劑瀉愈甚更以大附子薑桂各參錢  
參芪歸木各伍錢作一劑腹內始熱嘔瀉乃止手足

漸溫脉息隨復更用大補而潰再用托裏而斂十年  
後仍患脾胃虛寒而歿

加減托裏消毒散 治飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄

瀉乃脾氣虛寒也去芷翹銀花加炮薑木香手足

逆冷脾血虛寒也更加附子煎送四神丸

和氣散 治癰疽潰後氣虛滑泄四肢逆冷

蒼朮

肆兩米泔浸三日洗淨晒甘中炙  
乾再以米醋炒令香黃色

青皮

去穰各壹兩

良薑

炒

肉桂

乾薑

炮各半兩

陳粟

半升

右七味爲末每服壹錢用炒茴香末半錢相和溫

酒調下不拘時

按此但有燥溫耳無補氣藥非氣虛者所宜

四神丸 治脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹

作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

肉豆蔻

五味子

各貳兩

補骨脂

肆兩

吳茱萸

湯浸炒  
壹兩

右爲末別以水貳椀生薑捌兩煮紅棗壹百個熟  
爛去皮核用和末爲丸桐子大每服伍朱拾丸空  
心食前白湯下

三神丸 治脾腎虛寒不思飲食或侵晨五更泄瀉  
或飲食少思大便不實其功甚効如不應乃命門

火衰急服八味丸補火而生土

破故紙

肆兩炒  
貳兩生用

肉豆蔻

貳兩生用

右爲末用大紅棗肆拾枚生薑肆兩水煮熟去薑取棗肉和藥丸如桐子大每服伍拾丸空心鹽湯送下

○小便淋閟頻數

薛滄瘍小便淋漓頻數或莖中濇者腎經虧損之惡症也宜用加減八味丸以補陰足腎逆冷者宜用八味丸以補陽若小便頻而黃者宜用四物湯加參木麥門五味以滋肺腎若小便短而少者宜用補中益

氣加山藥麥門五味以補肺脾若熱結膀胱而不利者宜用五淋散以清熱若脾氣燥而不能化者宜用黃芩清肺飲以滋陰若膀胱陰虛陽無以生者宜用六味丸若膀胱陽虛陰無以化者宜用滋腎丸腎虛之患多傳此症非滋化源不救若用黃檗知母反瀉其陽以速其危若老人陰痿思色精內敗革中痛而不利者用加減八味丸加車前牛膝不應更加附子多有復生者若精已竭而復耗之大小便中牽痛愈痛則愈便愈便則愈牽痛以前藥加附子亦有復生者王太僕云無陰則陽無以化無陽則陰無以生當

滋其化源苟專用淡滲復損真陰乃速其危也

職

方王菂塘背疽潰後小便淋漓或時自遺作渴引飲  
煩熱不寐瘡口焮赤時或如灼時或便遺余曰此腎  
虛之惡症用加減八味丸加麥門數劑而痊

駕部

林汝玉冬不衣綿作渴飲冷每自喜壯實哂余衣綿  
診其脉數大無力余曰至火令當求余也三月間果  
背熱便悶肺澁用四物加芩連山梔數劑大便稍和  
却去芩連加參术茯苓二十餘劑及前丸半斤許渴  
減六七背熱亦退至夏背發一疽純用托裏之劑而

歛

托裏消毒散加減法 莖中痛而小便不利精內敗

也去連翹白芷金銀花三味加山茱萸山藥澤瀉

如不應佐以六味丸 愈便則愈痛愈痛則愈便

精復竭也去三味煎送六味丸 食少體倦口乾

飲熱小便黃短脾肺虛熱也去三味加五味子山

茱萸如不應暫用六味丸 勞役而小便黃元氣

下陷也去三味加升麻柴胡 午後小便黃短腎

虛熱也去三味加升麻柴胡煎送六味丸

黃芩清肺飲

治肺經陰虛火燥而小便不通若因

脾經有熱當清其脾若因心火尅肺當制其心

黃芩

壹錢

梔子

參枝打碎

右水煎服

滋腎丸 治腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等  
證凡不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥  
經云無陰則陽無以化若脾肺燥熱所遺當滋其  
化源

知母

黃檗

各酒炒  
壹兩

肉桂

貳錢

右爲末水丸如梧桐子大每服百丸空心白滾湯

五苓散 治下部濕熱瘡每小便赤少

下

澤瀉

貳兩伍錢

豬苓

去皮壹兩半

肉桂

柒錢半

白朮

赤茯苓

各壹兩

伍錢

右爲細末每服壹貳錢熱湯調下

清心蓮子飲

治膀胱氣虛濕熱玉莖腫痛或莖竅

滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝

熱

黃芩

麥門冬

地骨皮

車前子

炙甘艸

各壹錢半

石蓮肉

白茯苓

黃芪

柴胡

人參

各壹錢半

右水煎服

五淋散 治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如沙石或如膏汁或熱沸便血

赤茯苓

壹錢半

赤芍藥

山梔

各貳錢

當歸

甘草

各壹錢五分

右用燈心貳拾根水煎服

清肺飲 治渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水  
生化之源宜用此藥以清化源其水自生而便自  
利矣

茯苓

貳錢

豬苓

參錢

澤瀉

琥珀

蘿麥

各伍分

通草

陸分

木通

萹蓄

各柒分

車前子

壹錢

燈草

壹分

右為細末每服伍錢水煎服

腎氣丸

治腎經陽虛陰無所化以致膀胱淋漓或

脾肺氣虛不能通調水無所化而膀胱癃閉或腎

氣虛熱干於厥陰之絡陰挺痿痺而溺頻數或腎

水虛弱陰虧難降使津液敗濁而為痰水又治腎

虛便血及諸見血發熱自汗盜汗等症之聖藥也

卽六味地黃丸

琥珀散 治諸般瘡癧表裏有熱小便赤澁

白茯苓

黃芩

茵陳

紫草

瞿麥

茅根

石韋

烏藥

琥珀

連翹

車前子

各等分

右為極細末每服貳叄錢用燈心湯調下不拘時  
候

瞿麥散 治癰疽發背排膿止痛利小便

桂心

赤芍藥

當歸

黃芪

茅薦

瞿麥

白斂

麥門冬

去心  
各等分

赤小豆

壹合  
浸炒乾

右咬咀每服肆錢酒煎溫服如諸癰已潰未潰瘡  
中膿血不絕痛難忍者加細辛白芷白斂薏苡仁  
○頭痛眩暉

托裏消毒散加減法 初腫頭痛發熱邪在表也加  
川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用參敗  
毒散 頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹加參芪  
體倦頭痛或眩暉中氣虛也去三味加柴胡升  
麻如不應暫用補中益氣湯加蔓荊子 日晡頭  
痛或眩暉陰血虛也去三味加熟地黃如不應佐

以六味丸 夢泄遺精頭暉頭痛或痰喘氣促腎虛不能納氣也去三味併川芎佐以六味丸如不應大虛寒也用八味丸

○煩躁

托裏消毒散加減法 面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去三味加黃芪當歸如不應暫用當歸補血湯 身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣脫發躁也去三味加肉桂附子如不應暫用附子子理中湯

○自汗盜汗

托裏消毒散加減法

善思體痛無寐盜汗脾血虛

也去三味加茯苓遠志酸棗仁圓眼肉如不應暫

用歸脾湯

寢寐而汗出腎氣虛也去三味加五

味子煎送六味丸

飲食而汗出胃氣虛也去三

味加參芪歸朮五味子如不應暫用六君子湯

睡覺飽而出盜汗宿食也去三味加參朮半夏如  
不應暫用六君子湯

○多痰

托裏消毒散加減法

胸滿多痰脾氣虛也去三味

加桔梗半夏如不應暫用六君子湯加桔梗枳殼

晡熱多痰脾血虛也去三味加歸地參末如不應暫用六君子湯加芎歸熟地 咳嗽唾痰腎虧津液泛上也去三味加山茱萸山藥熟地如不應佐以六味丸

○喘急

癰疽喘急恍惚嗜卧此心火刑肺金宜用人參平肺

散

人參平肺散

桑白皮

炒

知母 茶分炒

杏仁

去皮尖炒

地骨皮

氣蘇

橘紅

半夏  
薑製

茯苓

青皮

人參  
各壹錢

五味子

貳拾粒  
炒幹

甘艸

炙伍分

作一劑水貳鍾薑參片煎捌分食遠服

薛按此方理氣清肺化痰之劑若肺脉洪數無力者宜用若兼發熱作渴脈洪數有力者宜用如金解毒散此證火尅金爲惡候而亦者亦不治

○胸痞

托裏消毒散加減法 忿怒胸痞肝氣滯也去三味  
加桔梗山梔如不應暫用補中益氣湯加桔梗枳殼 倦怠胸痞中氣虛也去三味加參术茯苓如

不應暫用八珍湯加柴胡

○目斜視上

癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤肝挾火邪宜用

瀉青丸

瀉青丸方

當歸

酒拌

川芎

山梔仁

炒

羌活

草龍膽

酒炒

防風

大黃

酒拌炒各等分

右爲細末煉蜜丸鷄頭實大每服壹丸煎淡竹葉湯化下日進二三服如瀉去大黃加荆芥或用黃

連瀉心湯一二劑亦可

醉按前症七惡中之三惡也若肝脉弦緊洪數者最當亦有目視不正睛不瞭暸脉微或浮者乃真氣虛也宜用大補之劑夫瀉青者瀉肝經之火邪也肝屬木其色青故耳

○四肢沉重

胃苓湯

蒼朮

米泔浸  
炒貳錢

厚朴

薑製

陳皮

甘草

炙

白术

炒各  
壹錢

茯苓

壹錢  
柒分

白芍藥

炒各  
壹錢

澤瀉

木香

白芍藥

炒各  
壹錢

官桂

伍分

淡竹葉

貳拾片

作一劑水貳鍾薑參片棗貳枚煎八分食前服  
按前證七惡中之五惡也服而若脾氣醒濕氣除  
宜用參苓白朮散之類多服恐導損津液  
參苓白朮散

人參

茯苓

白朮

炒

蓮肉

去心

縮砂仁

炒杵

薏苡仁

炒

山藥

各貳兩

桔梗

炒

甘艸

炙

白扁豆

去皮薑汁浸  
炒各壹兩

右爲細末每服貳錢用石菖蒲煎湯調下

○寒熱往來

托裏消毒散加減法 口苦寒熱往來肝火血虛也  
去三味加柴胡熟地 因怒寒熱往來肝火氣虛  
也加柴胡黃芩如不應暫用八珍湯加炒山梔炒  
酸棗仁酒炒黑龍膽草 體倦寒熱往來肝脾氣  
滯也去三味加參芪歸朮如不應暫用補中益氣  
湯 內熱晡熱或寒熱往來陰血虛也去三味加  
芎歸牡丹皮柴胡如不應暫用八珍湯加牡丹皮  
畏寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參苓白  
朮升麻如不應暫用補中益氣湯 腸痛痞滿或

寒熱往來肝氣滯也去三味加青皮木香如不應  
屬氣血虛也更加芍歸參术 若婦人勞役恚怒  
或適經行發熱譫語或夜間熱甚乃熱入血室也  
去三味加生地丹皮柴胡如不應暫用加味四物  
湯

○厥逆

如減托裏消毒散 治四肢逆冷乃腎氣虛寒也去  
三味加桂附仍佐以八味丸

○面目浮腫

癰疽聲嘶色敗唇鼻青赤面目浮腫宜調胃白术散

調胃白朮散方

白朮炒

茯苓

各貳錢

陳皮

白芍藥炒

檳榔

澤瀉

各三錢

木香五分

作一劑水貳鍾薑參片煎捌分食後服如腫不退  
加白朮炒枳實薺炒各壹錢

薛按前症乃七惡也用此方若濕除氣少退用六

君子湯參苓白朮散之類大便不實尤効再用檳  
榔木香恐傷真氣也亦有真氣虛而致前症者尤  
不宜用二藥

○陽氣脫陷

薛瘡癆陽氣脫陷或因尅伐之劑或因膿血太泄或因吐瀉之後或因誤而入房若發熱頭痛小便淋漓或滑數便血目赤煩喘自汗發熱氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水惡寒憎寒身熱惡衣揚手擲足汗出如水腰背反張鄭聲不絕此無根虛火之假熱症若畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聵目朦小便遺難瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮冷汗時出齒牙浮動肢體麻痺或厥冷身痛或咬舌齒唇舌根強硬此陽氣脫陷之真寒證皆勿論其瘡但見一二急用參

附湯補之多有復生者大凡潰後勞役元氣虧損或  
夢遺精脫或滑數便血或外邪乘之或誤用寒涼氣  
血脫陷而致斯症治以前藥亦有復生者內翰楊  
臯湖孟夏患背疽服丸散之劑二旬餘矣漫腫堅硬  
重如負石隔蒜灸五十餘壯背遂輕以六君加砂仁  
二劑涎沫涌出飲食愈少此脾虛陽氣脫陷劑用溫  
補反嘔不食仍用前藥作大劑加附子薑桂又不應  
遂以參芪各壹斤歸朮陳皮各半斤附子壹兩煎服  
三日而盡流涎頓止腐肉頓漬飲食頓進再用薑桂  
等藥托裏健脾腐脫而瘡愈矣少參史南湖之內

夏患疽不起發腫大而無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不寬喘促時嘔脈微細按之如無惟太衝不絕仍以參芪白朮當歸茯苓陳皮計斤許加附子五錢水煎兩鍾作一服諸證頓退脉息頓復翌日瘡起而潰仍用前藥四劑後日用托裏藥調理兩月餘而清 一婦卧牀十三年矣遭回祿益加憂鬱明年三月右肩下發一塊焮腫如甌中赤外白先用涼藥一劑不解次用十宣散四劑加痛略紅迎醫視之連投參芪丁桂防芷之劑膿潰云無恙矣鮮去眩暈亟逆惡寒戰慄項陷膿清偶

檢外科發揮發背門云若初起一頭如黍不腫不赤  
煩躁便祕四五日間生頭不計其數瘡口各如合一  
粟名曰連房發云云始駭爲惡症治法雖詳不諳於  
行迎薛至診云辛涼解散氣血兩虛者忌之連授參  
芪歸木地黃薑附大劑腫高臘稠兼紅烏金膏數日  
果腐落筋如脂膜者數片人參每服至捌錢日進二  
服逾兩月平復

附子理中湯 治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足  
厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

茯苓

白芍藥

各參錢

白术

每錢

右水煎服

薑附湯

治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或體血出  
多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暉

人參

半錢

附子

炮去皮臍各壹兩

乾薑

炮

白术

各伍錢

右作二劑水煎服

參附湯

治失血過多或腹瘀大泄少寒涼汗下真

陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暉等症急服  
以救元氣緩則不治

人參

壹兩

附子

炮去皮臍伍錢

右薑五片水煎服不應倍之