



63





Toan from Courtway Lib

OCT 31 1999

予堂嫂程氏喉間有物如嚙略之不出嚙之不下
梗梗不安腹中痛且瀉年五十有八矣迺梅核
氣症也腹痛迺新疾以二陳湯加旋覆花白朮
香附紫蘓桂皮厚朴澤瀉四劑腹痛仍在瀉亦
不止迺用胃苓湯加麦芽砂仁香附二帖痛止
瀉瘳仍用二陳湯加厚朴桂皮紫蘓旋覆花細
辛人參煎服四帖而喉中病去如失六十二
一婦先傷風發熱咳嗽二日迺分娩熱尚未退又
食鷄汁肉等太蚤咳嗽發熱愈盛已八日矣胸

高脹痛。頭痛。口渴。大便秘。咳出之痰。色黑而臭。小水短少。脇下扯痛。氣逆而喘。不得卧。左脇不能着席。汗出不止。症甚危急。予以瓜蒌五錢。紫蘊子一錢。枳壳酒苓各六分。前胡桔梗各五分。粉草三分。生姜三片。水煎飲之。胸膈之痛減半。氣喘稍定。次日再進前藥。大便秘導之。熱盡退。痛盡減。諸症尋愈。六十三

表嫂孀居二十年矣。右癱不能舉動。不出門者三年。今則神情恍惚。口亂言。常悲泣。詰其故。答曰。

自亦知為何故也。脗之。兩寸脉短。瀉以石菖蒲。

當歸茯苓人參黃耆白朮大附子晚蠶

皮粉草。服四帖。精神較好於前。但悲泣如

昨夜更泣。予思仲景大棗小麦湯。正與此對。即與服之。兩帖而瘳。方用大棗十二枚。小麦

大甘草炙過三寸。水煎飲之。此憂傷肺臟。臟寒。故多泣也。六十四

桂亭大兄。原因墜轎跌傷。腰脇脹痛。不能轉側。咳嗽。弔痛。用三製大黃二錢。桃仁一錢。五分。杏仁

紅蒼天蒼粉各一錢。穿山甲八分。甘草五分水煎服之。兩帖而大便行。繼以五加皮紅蒼川芎當歸生地黃白芍藥丹參甘草桃仁穿山甲柴胡煎四劑飲之而痛大定。後因過食葷腥。喘嗽腰痛。右肩背墜痛。素有濕熱痰積。以葶靈儂紫蘇子枳實酒苓半夏麴瓜萋仁甘草陳皮姜黃防風羌活。服後腸鳴。坐則重墜。此痰積已動。欲行而不可得也。與穿山甲當歸尾紅蒼杏仁枳壳大黃羅蔔子川芎莪朮青皮。服後大便所下。

稠積穢痰甚多。痛隨減去。以保和丸調理而安。
六十五

堂嫂王氏。兩寸脉洪大。右關滑大。五六月間。必吐紫黑血塊。足跟焮腫。痒痛。時流黃水。與牡丹皮山梔子玄參甘草白芍藥當歸陳皮滑石桃仁四劑而愈。六十六

族弟婦程氏。姪已五月。痢下膿血。裏急後重。腰重墜難當。以白芍當歸木香砂仁條苓酒連艾葉陳皮煎服。夜仍痛。痢三次。次日大便所下如爛。

魚。腸者甚多。夜半忽兩足脚底前半節紅腫疼
痛難安。此厥陰肝經虛胎氣下墜也。當補氣血。
以川芎當歸人參白朮熟蘓茯苓甘草枳即服
下。夜半痛止。即得睡矣。左脚略痛。再以人參熟
蘓川芎當歸白芍甘草陳皮茯苓大腹皮紫胡
服後左脚痛亦全減。後以補中益氣湯加白芍
黃芩茯苓調補而胎亦無恙。六十七
族嫂汪氏發寒發熱頭疼遍身痛眼珠疼小腹痛
裡急後重赤白膿血。日夜三十餘度口渴。此瘧

五竹也。以

書根甘草青蒿枳壳酒芍酒

向歸白芍桂枝防風羌活川芎水煎服之外
神授香連丸其收痢減十之九。但遍身尚疼
惡寒不發熱頭略暈而已。改以川芎川歸白
朮香桂皮陳皮酒連酒芍調理三日全安。六

姪孫赴府考試。過食牛麵。且勞苦。因而發瘧。
中醫瘧半月。形神俱瘦。瘧愈而腹大如箕矣。
健所黃夫人。仲閻岳母也。凡名家逆為延至。率

急瘡後腹脹。其中必有瘡。毋為祟也。諸消瘡藥。嘗之不効。又以五皮飲利之。不應將議攻下。而予適至。觀其色黃。口渴。小水短澀。腹脹不可言。足膝之下。腫大不能行。兩腿腫連陰囊。氣壅。不能卧。飲食絕少。脉纒四至。大而不可。予曰。此真氣虛中滿症也。法當溫補下元。而無埋脾。病猶可愈。若攻下。是殺之也。渠父與予厚。今宦河。予得不為渠仁其重。甚。顧歙友所用之劑。

獲義木差

木通枳實

皮厚朴山梔大黃牽牛黃連等。皆破敵有餘之品。見之且駭然。但黃夫人薦來之醫。又不能拒。止躄。踰間。幸渠迺伯溪亭公。知予心。卒謝歙醫。而一任予治。予即以人參白朮各三錢。炙甘草五分。大附子炮乾。姜桂心各一錢。破故紙二錢。桑白皮砂仁茯苓澤瀉各八分。水煎飲之。其夜小水稍利。喘急稍緩。連飲五日。腹稍寬。皮作縞。因食猪肚子太蚤。依舊作脹。前方人參白朮加作五錢。再加陳皮八分。又二十劑。而腹消其大。

半。迺能伏枕而卧。始能移步行動。改以參苓白
朮散加破故紙肉桂調養而安。溪亭公問曰。腹
脹如此。口渴如此。小便短瀆如此。諸人悉認爲
熱。爲有餘。迺今以溫補收功。何也。予曰。公不觀
古人以氣虛中滿名鼓脹耶。由氣虛所以成中
滿。設氣不虛。何中滿之有哉。且鼓者外皮堅緊。
而內空無物。若復瀉之。真元脫矣。安能復生。故
惟有利而已。口渴小水少者。皆元氣虛弱。不能
轉運清氣。不上升。故口渴瀆氣。

便通天地不交之否。茲特補其下元。俾水火克
實。陽氣上騰。濁氣下降。中氣運動。而諸疾皆瘳
也。六十九

朱懷竹。壯年客外。不謹。而生楊梅瘡。恐人知之。又
欲回家。迺求速愈。每日用藥外燻。燻而不効。用
藥水頻洗。洗而不瘳。迺以末藥點之。一日凡服
煎藥三帖。如斯兩月。不惟瘡不能瘳。毒且趕入
內。在下則肛脫二寸餘。周匝瘡滿如葷。弗克收
入。因而不能行坐。在上則毒入於肺。喘咳氣湧。

胸高脹悶。不能仰臥。內熱而外惡寒。寢食俱廢。合目即譫語。陰囊疔瘡。紅腫脹痛。兩足瘡。延腫大。精神恍惚。軟床昇歸。適兄少竹。逆予為盼。六脉俱洪大。而數語。少竹曰。病至重。幸壯年。猶可治也。今予尚未可付藥。俟彼胸中瘀血毒物出後。適可服。否則彼以予藥動血。而反致疑。顧城中諸友。鮮有識此病者。一誤則大事去矣。慎之。慎之。少竹素信予。固請予藥。而不與其服。懷竹見予不發藥。適延張程二公為治。晌午服藥。晡

刻大發喘咳。吐出紫黑血塊。如膿之類。梳餘油。房腥穢不可近。懷竹心慌。少竹憫之曰。毋恐。孫君先已預言。汝胸中脹悶者。由燻藥逼毒入內。上迫於肺。痰與瘀血壅遏肺竅。將欲成膿。故喘咳不能伏枕。顧脉洪大而數。從可知也。必俟吐後。乘而消之。極易為力。今果如孫君言。孫君藥具在。急煎飲之。藥用牡丹皮。桑白皮。白蘚皮。木通。前胡。枳殼。桔梗。甘草。杏仁。以仁葶藶子。服後大便裏急後重者。二十餘次。所下黑紫膿血甚。

多喘咳稍定。痰紅稍淡。二三劑。迺能伏枕而睡。改用白芍當歸白蘇皮甘草貝母黃連金銀朮。阜角子以仁。麥冬木通連飲二帖。足上跟踝瘡腫漸消。其夜陰囊出臭膿血二碗許。次早診之。兩尺脉不洪大矣。仍用前劑加丹參。又二帖。陰囊結靨甚厚。橫裂一縫。三日後。隨縫連皮落下。約重五六兩。厚可半寸。色如猪肝。洞見兩陰子系。一光薄白胞。令人駭然。此亦亘古稀見者。舉家謂陰囊。迺致命之所。且未有子。今爛去。即

使復好。亦不能育子矣。環哭甚悲。予諭之曰。此毒去也。而真元不傷。吾能使其生肉如故。亦不妨於生育。毋過慮焉。舉家將信。將疑。予即用紅粉霜加生肌末藥敷上。一日三次。並不作痛。膿水立乾。外以人參當歸酒炒白芍白芷甘草白蘇皮阜角子以仁。何首烏調理一月。囊肌全生。諸症悉愈。迺令日用土茯苓猪肉各半。勛同煮極爛。將肉入醬。蓋如常灑食之。湯當茶飲。脫然全瘳。次年生女。七十

查良本兄令眷。怒後偶食魚頭。骨梗於喉中。即以
饅頭粽肉等壓之。骨雖下。便覺胸膈不快。又服
消骨藥兩日。迄今迺七日矣。胸膈脹痛殊甚。飲
食悉從背後而下。惡寒發熱六脉絃數。予思骨
梗之後。用硬物壓之。傷其胃脘。必有瘀血停蓄。
膈間將食管逼在背後。故飲食覺從背後下也。
今但消去瘀血。使食管復原。胸膈之痛可瘳矣。
藥以五靈脂為君。山查玄胡索桃仁枳壳為臣。
赤芍藥牡丹皮香附山梔仁為佐。柴胡石菖蒲

為使。水煎。臨服。韭菜汁一酒杯飲之。其夜胸
膈寬快。大便瀉一次。痛減大半。飲食迺從右邊
而下。右邊胸喉稍痛。吞物甚艱苦。吐出痰皆血
腥氣。改以山梔赤芍藥歸尾桃仁劉寄奴五靈
脂牡丹皮穿山甲煎入韭菜汁服之。兩帖全瘳。
七十一

後溪大兄孺人戴氏。勤篤嚴謹人也。秋患痢。所下
皆血。及屋漏水。內有血。予如赤小豆者。不可計
數。晝夜五六十行。裏急後重。噦惡不住。嚴者五

新編四書
日。予以劉守真芍藥湯與三劑而病無進退。適後溪兄在浙。姪女輩素信醫博黃氏為女科專門。延而治之。投以芩連枳壳換郎山梔地榆黃柏滑石之類。服已五日。始雖噦惡。一日尚有枕粥。今則粒米不能進。腹痛轉加。必用重物壓之。迺稍定。神思昏弱。卧不能起。下午發熱。女科仍以前劑加青皮枳實。姪孫爾嘉持藥見予曰。家姑酷信黃醫為專門。今已任事五日。較前精神大瘳。叔翁為祖父至交。寧無一語啟愚乎。予曰。

吾非不言。欲詆黃。恐為妬婦之口。今子來。予可盼之。六脉滑大無力。盼畢。慌語爾嘉曰。事急。可速令人促迺祖歸。否則令姑女流。不諳醫藥。吾安能施其巧。比有西席汪帶川聞之。決爾嘉曰。此事極要調停。留黃醫以安女流心。黃發之劑。閣而不進。以東宿之劑作黃劑進之。內外無猜。則安矣。予然其言。以人參白朮酒炒。白芍各三錢。炙甘草一錢。半炮姜肉桂各一錢。白茯苓陳皮各八分。砂仁五分。大棗二枚。水煎飲之。噦惡

減半。其夜痢減十之五。惟腹痛不甚。減次早診之。脈稍歛。黃醫以為渠功。大言自矜。藥仍以苓連之類。予仍以前劑。再加黃耆。其日下午始納粥。一茶盞。腹痛漸減。又次晨。黃醫診視。見夜來代。但與大病亦不多見。自以為非彼。亦無能治也。爾嘉詰曰。瘡痢亦尋常耳。何以為大。黃曰。丹溪云。下痢身涼者生。身熱者死。下痢純血者死。腫脹大者死。如屋漏水者半死。半生。今皆犯之。

故云云也。爾嘉曰。然則今日當用何劑。黃曰。劑已投病。仍當確守前方。何敢輕改。爾嘉咲而點首。復向予求劑。予以理中湯。倍加酒炒白芍藥。以肉桂佐之。腹痛身熱悉愈。痢十去九矣。後溪兄亦浙回。爾嘉述病源以黃方。予方呈看。後溪唏噓嘆息。迺辭謝黃。而詰予曰。人言下赤痢者熱。噦惡者熱。又身熱脈大。吾弟何獨認為寒。而用此大熱之劑。成功。曷故哉。予曰。此虛虛實實之處。極能誤人。尊嫂之熱。非真有餘之熱。迺內

有虛寒逼其虛火上。行故噦惡潮熱耳。脉大而無力。仍作虛看。且向服寒涼不効。當自知警也。後溪兄曰。微弟幾敗。廼事矣。七十二

邵敬園令眷常胃脘痛。由氣鬱而起。近以產後下痢紅白。而胃脘之疼不止。汗多。六脉滑大無力。法當收斂。以小建中湯為主。白芍藥酒炒四錢。炙甘草一錢半。桂皮五靈脂醋炒各一錢。香附糖毬子各八分。水煎飲之。痛減。汗未全斂。次日前方加御米壳醋炒過一錢。兩帖全止。七十三

蘓文學望臺患瘧。一日一發。先寒後熱。熱多寒少。胸膈痞悶。口渴。小便溷濁。腥臊不可近。醫五越月不効。面黃肌瘦。飲食減少。喘息呻吟。精神疲憊。起須人扶。廼敦予治。脉得沉絃而數。公問曰。是瘧否。予曰。是公曰。吾聞之。真病不治。治之無功。蓋真者死候也。瘧殆常病。不過寒熱虛實表裏。諸名家曾認為表症者。麻黃羌活柴胡等汗之矣。有認為裏症者。大柴胡湯輩下之矣。有認為痰飲者。常山訊石吐之矣。有認虛寒者。附子

理中湯。人參服過三觔矣。有認為實熱。用白虎湯。枳實。青皮。枳。即草菓消之矣。盡法備嘗。絕無一應。瘡豈亦有真而卒至於死耶。言訖。淚潛潛下。予曰。觀公色。脉。瘡將發矣。不暇辯。第飲予藥。不死也。以柴胡。滑石各五錢為君。鱉甲三錢為臣。黃連。知母各一錢為佐。枳實。甘草各五分。黑豆四十九粒為使。水煎。送下。昆布。鱉甲丸。申刻瘡至。戌初便止。公喜曰。向者瘡發未申。夜半尚不能止。即止。猶倦。怠嬾言。適飲先生藥。不兩時

而止。止便能言。先生之功也。予曰。偶耳。今日服藥已晏。明日五更。幸早服之。服訖。竟日不發。又次日。前方加入人參。白朮。小水腥臊之氣已無。精神陡長。公又喜曰。兩日無苦。先生之功也。予曰。偶然耳。公曰。嘻。吾瘡幾半載。休歎之名。公莫不歷試。卒無影響。先生一舉奏奇。有而不居。益元所養。不審湯名何劑。乞指示之。以詔將來。予曰。公何以名為哉。老子曰。無名天地之始。矧醫亦道也。即道亦是強名。醫貴識病。苟識病。一二三

品便能成劑立功。經云約方如約囊。又曰方以
類聚。方憑病立。苟不識病即盡本草一千六百
五十六品併而服之。未見其益也。瘡固常疾。治
亦不易。仲景有言曰。治瘡當分六經。予謂即六
經之中。又各有寒熱虛實陰陽在焉。是六六而
三十六也。即三十六之中。又有挾痰挾食挾氣
者。稟弱者。曷能枚舉。人與天地陰陽一致。天地
變化無窮。人身災患不一。豈拘拘一百一十三
方。三百九十七瀉所能繁哉。王節齋曰。古人因

病以立方。非立方以待病也。斯言深得軒岐立
方大意。然予今日所用之劑。和劑也。仲景謂汗
吐下後而邪熱不減者。是為壞症。以小柴胡湯
加鱉甲治之。予特倣仲景小柴胡例。加益元散
徹邪熱。從小便中出。鱉甲雖治壞症。又能截瘡。
公曰。噫嘻。前此諸公看病。不過曰寒曰熱曰虛
實而已。未嘗有此眇論。誠空谷足音也。吾聞先
生從祝令君潘去華。葦六邑會中討究理致。又
曾覽先生序大易。毅序翼飛。廼知先生融三教

而萃於醫。先生之醫。得之於性命竅中。故能全
之性命也。有如此。七十四

一汪氏。寒痰壅滯於背。胸脇腹皆脹痛。小水頻
數。先與女金丹以治胸脇之痛。以二陳湯加益
智仁香附白芥子青皮柴胡蒼朮桂枝一帖而
小水減半。次日以白豆仁易益智仁。以枳壳易
青皮。再加川芎桔梗。開提清氣。諸脹痛悉減。七
十五

大塘徐公諱容者。其子弱冠。肌肉瘦削。尻膝腫大。
手肘肩顛皆腫。腫處皆痛。而發熱。時醫有作風
治者。有作濕痰治者。有作鶴膝鼓椎風治者。愈
治愈重。伏床蓐。奄奄一息耳。舉家倉皇而決之。
著。據者釋策曰。易象可不死。天醫上卦。第遠在
東方。相法百里而遙。迎而治之。無恙也。因訪予。
而迎之治。予診其脉。六部皆絃。觀其色青而白。
飲食少。時當長至。予曰。此筋痿症也。書云。諸痿
皆不可作風治。病勢幾危者。以前藥皆風劑耳。
風能傷血。血枯則筋愈失養。况絃脉。迺肝木所

主攬前而至。是肝有餘而脾土受敵。脾為所傷。宜飲食少。肌肉削而執將危也。內經曰。諸痿獨取於陽明為治。陽明者。腸與胃也。法當滋補腸胃。俾飲食日加。五臟六腑有所稟受。營衛流行。氣煦血濡。調養至春。淑氣司令。君火主事之時。宗筋潤而機關可利也。病者年雖少。而能聞言相信。懇予為治。予立方五加皮以仁甘草蒼耳子枸杞子四陽人參杜仲黃柏黃芪防風服二十劑而精神壯。腰脊健。飲食加。惟間或夢遺則為減去杜仲。而加遠志當歸三十帖而全安矣。此余初發之治也。七十六

邵都諫老封君思翁。年過古稀。右手足麻而無力。不為運用。足不良於行。以六君子湯加川芎當歸以仁大附子鹿角膠黃耆桂枝兩劑便能步履。四劑手足強健。每隆冬必服十數劑。則精神加。飲食美。睡卧亦安。翁喜語曰。吾得君方。服之可不杖。君劑當我几杖乎。嘻。七十七

太塘程巢父文學廼郎。諱萬里者。年十五。夏月患

痢族醫為治彌月。痢止而筋骨腫痛。痛處發熱。晝輕夜重。肌肉消。飲食少。煩躁。醫者以白虎歷節風治之。病劇而形削骨立矣。又有作鶴膝鼓槌風治者。法愈更。而病愈甚。其家有程松谷者。博洽嘉聞君子也。為巢父族大父。以余在西吳。治多奇中。命巢父迎予。予至。診之。脉皆細濡。曰。此痢後風也。蓋由治痢不善。以致寒濕穢痰。凝滯經絡。日久氣血為痛所傷。此症虛虛實實。極難認。而措藥不易。欲補虛。則腫愈劇。欲疎通。則痛愈甚。惟局方大防風湯可愈此疾也。防風熟地黃。著人參。白芍。當歸。杜仲。各一錢。白朮一錢五分。羌活。牛膝。甘草。回陽。各五分。川芎七分。加姜三片。水煎服。服三十帖而愈。

按局方云。痢後脚緩。痛不良於行者。名曰痢風。或兩脚腫痛。足脛枯槁者。名曰鶴膝風。併一切麻痺痿軟。風濕挾虛之候。服之其效如神。余故用之。亦謂治氣血兩虛。挾風氣而成痿。屢是者爾。非謂可併治初起有餘之疾也。

葉潤。至年近四十。心曠嘈雜。好啖肉。尤好鷄。一日不能缺。缺即身浮力倦。神魂無措。必急得肉。迺已。見則大嚼。及入腹。腹又大痛。痛極則吐酸水。稠涎。然後定。稍定又思肉。啖也。其痛苦之態。喊叫之厲。難狀。見者酸鼻。而潤。至則其心焉。市人咸以為祟。或有諭之者曰。古云與其好肉而受痛。孰若絕肉以無楚也。此病脾虛。肉入難化。故使作痛。此婦人女子且知之。汝丈夫獨不慎。何哉。

潤。至曰。吾豈不知絕肉之為愈也。蓋痛雖苦。尚能噉。若嘈雜則遍身。法淫蘊蘊。左右無可柰何。手足無所把握。頃刻不能自存。有近於死。不能熬。急需肉少甦。吾豈欲求痛哉。不得已也。迺翁延予為診。六脉大小不等。觀其色。唇紅。臉黃。予曰。據色脉。迺虫症。非祟也。予能拯之。先與雄黃丸。一服不瘳。改以賦粉五分。史君子未一錢。用鷄子打餅。五更空心。飼之。辰刻下。長。繞十條。內有二大者。長尺有咫。自首貫尾。皆紅。下午。

又下小虫百餘。自此丹不喜肉而嗜雜良愈。
十九

程相如文令政鄭氏。孕踰七月。因食冷患痢。所下皆白膿。腹痛後重。小水不利。兩關脉滑數。以艾葉砂仁白芍藥白朮厚朴澤瀉滑石甘草與之。痢如舊。小水仍不通利。夜更痢頻。改用當歸白芍藥各二錢。益母草酒連酒各一錢。滑石三錢。枳壳七分。木香甘草各三分。艾葉二分。兩帖而安。八十

太塘程曉山。程松谷從弟也。客湖州。年四十。懸弧之日。湖中親友舉賀。徵妓行酒。宴樂月餘。一日忽言曰。近覺兩手小指及無名指掉硬不舒。亦不為用。口角一。邊常牽扯引動。幸為診之。六脉皆滑大而數。浮而不斂。其體肥。其面色蒼紫。予曰。據脉滑大為痰。數為熱。浮為風。蓋濕生痰。痰生熱。熱生風也。君善飲。故多濕。近又荒於色。故真陰竭而脉浮。此手指不舒。口角牽扯。中風之症已兆也。所喜面色蒼紫。其神藏雖病猶可治。

切宜戒酒色以自保愛為立一方以二陳湯加
 滑石為君苓連為臣健脾胃消痰徹濕熱從小便
 出加胆星天麻以定其風用竹瀝姜汁三拌三
 曬仍以竹瀝打糊為丸取竹瀝引諸藥入經絡
 化痰外又以天麻丸滋補其筋骨標本兩治服
 二料幾半年不惟病痊且至十年無恙迨行年
 五十湖之賀者如舊召妓宴樂者亦如舊其酒
 嗜音荒淫而忘其舊之致疾也手指口角牽引
 掉硬尤甚月餘中風右體癱瘓矣癱瘓俗所謂半身不遂也

歸而逆予胗之脉皆洪大不斂汗多不收呼吸
 氣促予曰此下虛上竭之候蓋腎虛不能納氣
 歸原故汗出如油喘而不休雖和緩無能為矣
 閱二十日而卒八十一

程曉山中風歸而逆予胗時其子僅七歲中麻西

呼為瘖子姑 蘓呼為沙子子 一月餘矣發熱如故咳嗽聲啞肌

削骨立頭髮盡禿衆醫束手舉家亦墮泪而已
 余以胗曉山見之曰舉家驚惶謂此兒不保耶
 此痺症痺因麻後虛熱而發以大薑會丸治之

可獲萬全。君家初不問予者。謂予非幼科專門也。不知此特大方家餘事爾。為製藥服之。藥未盡而病瘳。松谷君語其鄉人曰。東宿公見病而決死生。治病而隨俗為變。一秦越人也。孫真人後身非耶。予聞之而三謝不敏。八十二

去予舍二里許。地名曰前坑口。一婦人。清明前十日發熱。頭痛。醫者以丸味羌活湯。十神湯。進之不効。而又加口渴。舌黑如煤。更一醫。以如神白虎湯。竹葉石膏湯。進之。亦不効。而加洩瀉不止。

人事昏沉。四肢厥冷。呼吸氣微。米粒不進者十
四日。其家為具含歛。而待斃。適予掃祖墓。而近其家。其子聞之。即告急於予。懇為一診。其脉細如蛛絲。予曰。此疫症也。合理中生脉。二湯飲之。連進二服。夜半神氣稍甦。飲粥湯半盞。次早六脉漸見。予喜語其子曰。可保無事。書云。脉絕微續者生。仍以前藥與之。至晚瀉止。口不渴。舌心焦燥退。精神清爽。駸駸向安矣。再用人參白朮各五錢。炮姜炙甘草各二錢半。麥門冬三錢。五

味子十五粒。水煎。不拘時服。不數日而全愈。八
十三

族太學從獻長郎。七歲時。患痢紅白稠粘。而紅更多。飲食少。形氣弱。予時太學應南都試。其兄從明。雅知予。因逆予視。視畢。予曰。此不可以尋常治。治也。法當補。從明曰。語云。無積不成痢。故法先推。今不下。而遽用補。積何從去。予曰。足下論者。常也。治病貴先察症。古人有先攻後補。有先補後攻者。因症投劑。不膠於常也。今形瘦體弱。

面色青。稟受大不足者。飲食又少。予故用補。欲使寧有餘。即不如意。猶可措手。若拘常法下之。倘有變。將柰之何。從明是予而索藥。即以四君子湯加歸芍黃連山查與服三帖。而病無進退。婦道間有議予非幼科專門。令更請夏氏。夏至即語予。先不下。而用補。以致遷延如是。夏曰。幸不下。若下。今不可為。叩其故。曰。丹溪云。大孔如竹筒者。不治。今肛門有竹筒狀。豈可下。然亦不必補。香連丸六一散。可愈。其三服而痢愈。頻其

痛愈甚。又加惡心而神氣憊。又更請汪恒春。汪至亦以香連丸黃芩芍藥湯與之。痢下日夜不可以數計。飲食不入口。婦道信耳。謂二氏有時名。故迓迎之。獨從明持議。復逆予。予往觀其形神。大非昔比。知中氣虛極。非理中湯不可。用人參白朮各二錢五分。酒炒白芍藥白茯苓錢。炙甘草炮姜各八分。肉桂三分。四分。半。前方減其半料。又六帖而飲食進。粘雖無而血水日夜仍三五行。肌肉

思其故。必瘵疾從虛而動。用如聖丸以治瘵病。則全瘳矣。八十四

族姪孫子忠。患痢於湖之東雙林。腹大疼。日夜行百餘次。下皆紅膿。狀若腐爛魚腸。絕無糞。疼而喊叫。聲震中外。由孟穉飢飽後。倡家縱慾而得也。一病即伏枕。已十日餘矣。予時寓雒城。相去百里外。渠叔少喏。邀予往視。診其脉皆緩大無力。始用芎歸各五錢。加人參白芍藥桂心木香黃連服四日不効。改用膠艾湯亦不効。大孔狀

如竹筒物食而下不變色猶原物予思之此脾經為寒濕所傷脾不果血故也非附子理中湯加肉桂肉菓不可進五六帖痢始減半飲食稍進但所下穢惡仍若前狀亦無糞渠父仲珪家居聞報即徧訪徽之名家僉囑以切勿用補兼程而抵茗城做虞畱款因詢近用何劑做虞曰聞用附子理中湯人參每帖三錢仲珪駭而墮筮亟馳見予潛然泪下言曰姪五旬僅此一子症危如此倘不測後將何望予曰郎君險過金

復何憂亦以侄只此子故殫心力相扶也仲

曰離家而徽之名公俱囑以勿輕用補侄改兼程而來竟以補收功非叔幾於誤事吾見自今以往之年皆叔之賜侄父子何以報功予曰治疾如救焚醫家分內事矧屬在宗部且無德我之望又何望報第雉城之約不可失若免李鍾泉邀兵葦齋代視數日俾予得踐雉城之約庶兩盡矣而吳子疑而辭曰病者危在旦夕何孫公欲自脫手而愚我被惡聲也予聞而哂之曰

見何鄙哉。丹溪有言。虛回而痢自止。病者再五日。可脫然矣。予亦暫留。即以東垣和中勝濕湯與之。服七日。即衣冠出市。報謝四鄰。吳見之而悔。李鍾泉斬之曰。孫公欲成爾名。爾欲自沒沒也。悔之何補。吳繇是改容相敬。令其弟遊予門。彼亦納交予。而稱莫逆。子忠之始病也。其友李鍾泉重交誼。日夕省候。督其僕事湯藥。毋許離蛙步。所下穢物。腥臭不可聞。皆用漆布拭之。晝夜用數十觔。悉其湔浣了無難色。兩月如一日。

也。此友亦今時所希覲者。因併記之。以著其高。
八十五

余侄元素內人。季直以難產。夜過半。亟叩予門。起而問之。為產者急矣。曰。然作何狀。曰。產已及戶。不能下。用力則胸膈間有物上衝。痛不可忍。予思少頃曰。此必雙胎。胞已分。而一上一下也。及戶者在下欲產。在上者以用力而上衝。惟上衝胸膈故痛也。執亦陰天。迺諸書如產寶良方。胎產須知。與各大方家。俱未論及。將何以處。因詳思

其治法。偶悟必安。上而下始用力。產也。即取益
 元散一兩與之。令以紫蘓湯送下。囑必如法。飲
 藥入腹。而胸高痛止。不逾時產二女。母亦無恙。
 予仲子泰來問曰。益元散非產科急劑。何能取
 効如是。予曰。紫蘓安胎下氣。滑石滑以利竅。亦
 催生之良品。蓋醫者善也。予亦以意裁處之耳。
 此法方書無載。故記之以備專女科者采而用
 焉。八十六

有邵光而諱馬者。年五十。患嘔吐吐物如爛猪

狀。胸背脹。市上諸醫皆以翻胃治之。不効。而反
 加潮熱煩躁。飲食不入口。歛醫謂肺壞。辭去不
 治。延予治之。診其脉。兩寸滑數。左關尺澁。予曰。
 此痰血痰飲症也。非肺壞。果若肺壞。聲音當啞。
 今聲啞。而獨胸背作脹。痰血痰飲明矣。此症殆
 繇酒後怒發所致。蓋肝藏血。脾統血。酒傷脾。怒
 傷肝。以故不能藏。不能統。血隨氣上。積於胸高。
 必吐出。而脹斯寬也。法當消痰血。調氣化痰氣。
 調痰消。則新血始得歸經。大本端。而病根可除。

矣。迺為立方。滑石三錢。甘草五分。茜根二錢。小
蓳一錢五分。桃仁貝母歸尾香附各一錢。山梔
仁枳壳桑白皮各八分。服十帖而全安。八十七
許卓峰者。多酒多怒人也。上吐血。下洩血。咳嗽聲
啞。族醫皆以為瘵。辭去不治。迎予診之。其脉左
關絃大。右寸下平。指壘壘如薏。以予狀。予曰。此
有餘症也。作瘵治者非。客有辨之者。謂此症人
皆認為瘵。而先生獨謂非瘵。然何以失血而聲
啞也。予曰。其為人也。好酒。酒屬濕熱。而助火生

痰。火性炎上。迫肺不降。積而生痰。壅於肺竅。肺
屬金。主聲。書曰。金空則鳴。金壅塞而不通。故啞。
此痰壅之啞。非肺痿之啞也。其性又多怒。內經
曰。怒則傷肝。甚則嘔血。并下洩。蓋血隨氣行。氣
妄動。血隨之。亦妄動。而不歸原。故上吐而下洩。
法宜清熱開鬱。化痰導血。歸原。不半月而病可
瘳也。若認為瘵。而以地黃天麥門冬牛膝山茱
萸之類。將其甚其塞。而益其熱。聲音何由而開。血
隨氣行。氣不清。血又何得歸原哉。諸君試觀之。

予用滑石青蒿鮮酒熱為君。貝母鬱金山梔仁
香附開鬱為臣。杏仁桔梗同貝母化痰為佐。丹
皮丹參小蘗其草導血歸原為使。服十帖。血果
歸原。又以貝母一兩。童便浸一日為末。柿霜等
分。時時抄舌上化下。五日而聲音開。噤矣。計期
不出半月。八十八

族嫂鈞孺人。年六旬。孀居已十餘年。患痢赤白俱
下。腹微痛。晝夜二十餘次。嘔吐痰涎。粒米不入
口者兩月。日惟用薄白酒打鷄蛋茶飲之。肌肉

盡削。諸藥不效。予歸診之。六脉滑數。知濕熱痰
火所致。以二陳湯加益元散姜汁炒黃連黃芩。
服幾四十帖。而嘔止痢瘳。其病亦幾危矣。予為
治者。恃其神存。惟神存。雖形氣不足。不食。猶可
不死。此亦醫者當察也。八十九

邵來儀夫。令眷。咳吐紅痰。或如桃荅膿色。前後心
稍脹疼。兩寸脉洪滑。此痰血痰火鬱滯肺之氣
道。而欲成肺癰也。治當調氣化痰。兼消痰血。清
利肺金。以山梔子牡丹皮貝母桑白皮赤芍藥

麥門冬各一錢。白滑石三錢。茅草根五錢。小薊二錢。甘草五分。枳壳八分。四帖而瘳。九十。程玄祖兄。春瘟食復。人事昏沉。內熱口渴。舌如焦煤。脇痛耳聾。身熱如火。僵硬不能轉動。死寢者十日。口中喃喃。蓋夢語也。城中時疫正盛。親友咸不弔慶。予為脉之。左絃數。右洪大而數。以紫胡石膏各五錢。黃芩知母葛根各二錢。山梔子枳實各三錢。甘草五分。連飲三劑。額上微汗。腹中雷鳴。其夜大便瀉三次。皆清水。熱仍不退。次

早脉之。右寸稍軟。前方加人參七分。又二帖而汗出熱退。身仍僵。口仍渴。耳仍聾。瀉亦不止。汗亦不收。四肢如冰。勺粒不進者已十三日。人皆以為死矣。予獨不忍棄。以人參麥門冬白芍藥石斛各一錢。五味子十一粒。當歸八分。桂枝三分。黃栢甘草各五分。後再診之。左脉已弱。咳嗽人事漸爽。粥飲稍進。迺能開目發聲。瀉已止。頗可轉身。總有生氣。後以四物湯加以仁茸草陳皮白朮石斛百合貝母。調理一月全瘳。九十一

汪郎元腹痛嘔吐不止。城中諸友畢力醫治不痊。予為脉之。早晚大小緩急不一。知其為虫痛也。以乾姜枳實各一錢。五靈脂三錢。烏梅三個。川椒三分。水煎飲之。痛吐立止。九十二

查景川元。遍身癩瘡。紅而掀痒。諸君以白芨藜荆芥升麻葛根玄參其草石斛酒苓其草與之不愈。又謂為風熱。以玄參蟬退赤芍藥羌活防風其草生地當歸升麻蒼耳子連翹服之。飲食頓減。遍身發瘡。痛痒不可言。予脉之。兩手俱緩弱。

以六君子湯減去半夏。加白扁豆砂仁以仁山藥藿香黃耆。一飲而飲食進。四帖而痛痒除。十帖瘡疥如蛻。九十三

程玉吾內人。姪已七月。乳忽紅腫而痛。洒浙惡寒。發熱而成內吹。以大瓜萋四錢為君。當歸尾二錢為臣。其草節蒲公英貝母連翹各一錢二分。為佐。青皮柴胡各八分。橘葉五片為使。水煎飲之。兩劑而瘳。此方治驗不可勝數。緣婦女怒鬱肝經為多。故瓜萋其草為緩肝之劑。貝母開鬱。

連翹蒲公英解毒紫胡青皮調氣橘等。經當
歸活血。血活氣調。毒解熱散。而腫痛消釋也。若
將成膿。可加白芷。九十四

一黃氏婦。青年初姪。已及彌月。忽午夜口中啾奴
目作上視。角弓反張。裸裎不暇。羞耻。口眼偏邪。
昏憤不知人事。問之不能言對。舉家悚駭。予曰。
此風痰為怒所動。而成子癇。當從雲箕。子葛根
湯。加大腹皮。一兩。劑可愈也。方以葛根貝母丹
皮防風川芎當歸茯苓桂心澤瀉甘草各二錢

獨活石膏人參各四錢。水煎飲之。而甦。

按貝母令人易產。未臨月者。用升麻代之。九十五

吳州南令郎。心脾痛。因勞倦而致。每痛必得可口
之物壓之立止。兩腿生瘡。右脉滑。左脉弱。以白
芍藥三錢。甘草一錢五分。白芍藜。碧胡麻各一
錢。當歸黃柏各八分。石菖蒲白茯苓各六分。四
劑而痛止。仍用小建中湯。減去桂枝。加黃柏蒼
耳子白芍藜何首烏煉蜜為丸。服之瘡亦尋愈。

又令郎八歲原有疳積虫痛。因幼科攻剋太過。脾氣不足。面色青。以啟脾丸為主。藥用人參白朮茯苓甘草白芍藥山查澤瀉薏以仁白扁豆史君子薑會雞腕皮。以神麩糊為丸。一料而瘳。九十七

族侄女年甫八歲。腹高於胸。發熱面紅。咳嗽嘔吐。甚則連血噴出。右關脉滑大有力。此風熱羈絆於脾肺之間。而然。以滑石二錢。枇杷葉一錢。麥

芽天麻半夏麩各八分。枳實枳壳防風青皮各五分。水煎服之。熱退嗽定。吐亦良瘳。九十八

從兄鎬年近五十。左脇痛。手足抽搐。不能步履。兩手脉俱軟弱。用當歸白芍藥木瓜石斛菴耳子枸杞子各一錢。薏以仁二錢。人參牛膝各七分。陳皮白芥子各六分。紅苓三分。水煎飲之。其夜大便下。黑血二升。迺得睡。痛搐俱緩。改用人參當歸白芍藥各一錢。二錢。薏以仁四錢。牛膝木瓜石斛各八分。紅苓酒苓各五分。其夜大便仍

有黑物。從此精神和好。寢食俱安。後五日。因為
怒忤。且加食傷。右手左足大搐。左足大搐。疼痛
縮而難伸。伸則痛甚。左脇極痛。小水短。用山查
青皮防已人參半夏麴陳皮以仁川芎蒼耳子
杜仲石斛以瓜蒌為君。服下左脇痛止。右手亦
不搐矣。惟左大腿內股筋痛。一搐則膝抵於口。
此亦事之異者。因改以人參當歸薏仁甘草
黃柏白芍藥鈎藤牛膝木通山梔子。諸痛搐悉
愈。口亦不渴。後只以此法調理五日。隨能縱步

出戶。九十九

小童上達。年十六。忽面大腫。足亦微腫。喘息不
安。此脾虛濕氣壅盛所致。酒苓桑白皮防風葶
藶子陳皮羌活升麻甘草澤瀉白朮。此上下分
消法也。服後腫熱稍退。但正氣甚虛。以六君子
湯加麥芽澤瀉調理而安。一日因多飲食。且感
風寒。痰涌吐逆。見鬼。面掉。手足角弓反張。唇口
色黑。熱極危急。此癰症也。以胆星半夏天麻僵
蚕橘紅炙甘草枳實麥芽白朮紫蘊子杏仁前

胡白茯苓。姜三片。水煎飲之。一劑而愈。此後再
不復發。一百

族侄良詮。患血痢腹痛。裏急後重。時師治以香連
丸。黃芩芍藥湯不愈。腹反增痛。面赤唇紅。有侶
塗硃。喊叫之聲。四舍悚駭。比有太學寧宇者。仁
心為質人也。憐其家貧莫砥。拉予為診。六脉洪
大。伏於床間。而眼泪而不能言。太學會其意。語
之曰。症誠急。彼以後事無措。而難於言。予曰。諾。
吾能起之。以生熟白芍藥六錢。生熟甘草二錢。

乾姜肉桂各一錢。木香五分。東二枚。水煎飲之。
飲竟。嗒焉而卧。太學心疑。歸囑家奴曰。倘有急
扣門。可即報我。及明。見無動靜。迺令人覘病者。
何若。復曰。夜來痢減十之五。痛減十之七。早間
已啜粥半盞矣。太學喜而叩予曰。渠面赤唇紅。
脉大。所下皆血。症皆屬熱。叔迺復投熱劑。吾甚
恐。一夜不能寐。迺今疾已減半。生有望焉。不卜
今日用何劑。予曰。比昨劑差小耳。方仍昨也。太
學曰。吾惑矣。何視熱為寒耶。予曰。君知脉大為

熱不知大而無力。迺虛寒也。面赤唇紅。由中寒而火不能下。陰盛格陽之症。設是真熱腹痛。其人體仰而舒。寒則引而伏。所下血色帶晦。均是假熱寒症。明矣。前劑果再進而全瘳。太學復書報予曰。昨聞虛實真假之論。非飲上池水者不能道也。幸註之以詔後世。一百一

一婦年三十二。大發寒熱。胸膈有痰。大便洩瀉。以二陳湯加白朮。桂枝白芍藥。紫胡酒苓。一帖而止。後因怒。早晨又復發熱吐血。一盞。口渴汗久。

脉甚數。陳皮知母。此丹皮酒必白。

參烏梅青皮枳。即水煎服之。用此調理。數脉漸

退。惟左脉尚絃。寒熱已止。喉中痰聲已定。後又

因將息失宜。而脇疼痰多。嗽不易出。脉較前不

甚。數以瓜蒌仁一錢半。貝母白芥子各一錢。羅

蔔子菔仁滑石。牡丹皮香附山梔子各七分。青

皮赤芍藥甘草。各四分。煎服。血絕不來。嗽熱寤

息而安。一百一

從弟婦程氏。右脇痛不能睡。背心疼。下午潮熱。胸

高作梗。痰中右血。大便秘。用大黃以韭菜汁蒸
薑汁芎根汁夕和勻。將大黃拌濕炒乾。再拌再
炒。如此三次。以黑為度。三錢。瓜蒌仁二錢。貝母
當歸山梔子心丹皮各一錢。青皮前胡川山甲
各六分。甘草一分。水煎飲之。凡三帖而瘳。丹亦
不發。一百三

黃懷虛咳嗽嘔。不知饒餓。氣逆不調。不得
左脇亦不能。有席。石曾吐紅。近又
溪保和丸進。繼以穀芽燻

麴其草與。子茯苓杏仁桑白皮將養而安。一
百四

一族姊年近六十。咳嗽口渴。常吐魷魚。用前胡知
母天荅粉白。藥當歸甘草陳皮桔梗烏梅
白皮煎服。諸症悉止。後半年。膝灣紅腫作痛。上
便秘。黃柏當歸生地紅荅葳靈僂羌活蒼耳子
五加皮防風以仁。四劑全瘳。一百五

族侄婦戴氏。兩寸脈滑大。兩尺沉微。心痛徹背。背
痛徹心。甚則必探吐其食。迺已。近來每一痛必

七日。僅進白水。粒食不能進。進則吐而痛更加。七日後痛漸已。如此者。十七年所矣。始則一年兩發。又一年六七發。今則一月一發。以積氣丸治之。不終劑而斷根。一百六

老僕來興咳嗽胸膈背心脹痛如刀及所刺發熱口渴諸治不瘳。林浮而數。此風寒鼓激痰火上湧而然。以前胡山蘇黃紫蘊子散風邪為臣。以瓜蒌仁治痰。而工心。紅半夏旋覆杏仁為佐。枳壳桔梗。平。百七

婦生女不生子。多思多鬱。小便秘而不通。

不安者二日。歎醫汪氏。以備急丸進之。謂大便

行。小水自利也。詎意大便行後。而小水點滴不

通。脹悶益急。時刻不能存。將欲自盡。家人急予

為治。予詢之曰。近來經水行否。荅曰。行過十日

矣。小腹腫大。如一大西瓜之硬。自大便瀉後。疲

困。不足以息。執若燃眉。予曰。此轉脬病也。不急

治。則危矣。以補中益氣湯。臨服入韭菜汁一小

酒杯。服訖。選有力婦人進房。令患者橫卧床間。

力婦以患者兩脚膝灣架於肩上。將患者下身
虛空提起。搖擺數四。俾尿脬倒上。徐徐放下。息
者去衣不及。小便箭射而出。熱如湯。黑如墨。頃
刻盈盆。小腹立消而愈。後遇數人。不拘男婦。皆
以此法治之而安。一百八

竟池太學內人。患牙痛。一晚暈厥三次。次日西
紅腫痛不可支。且洒新惡寒。寢食廢。以清
加石膏為君。白芷為臣。連翹為佐。北細
飲下。痛頓釋。然如風滅燈之速。外以明

夫五倍子一枚。將礬裝入。以湍為率。炭
焦。以礬紅枯為末。不時擦牙痛處。牙痛
方多効。百九

一僕婦因產難。而子宮墜出戶外。半月不收。艱
坐卧。家貧不能求藥。憂恐成痼。鄰姬為訪之。車
門黃醫博氏教之曰。此易事也。只須補中三
湯一百帖。每帖要人參三錢。計二勛。可收也。
夫聞言。即大伸舌謝之曰。僕家朝傭暮食。無隔
宿之儲。既生珠網者。半越月矣。安有人參二勛

可服也。惟命是俟耳。媪復向予言之。且告以醫
博氏之治。予咲語媪曰。審如彼言。貧家則盡俟
命矣。又奚醫為。此必產時受寒。血凝滯。不能歛
而收入。症雖名陰脫。未必盡由氣虛下脫也。觀
其善食。而大小便如常可知矣。予有一法。價廉
而功捷。三五日可瘳也。用未經水石灰。斡一塊。
重二三觔者。又以韭菜二三觔煎。置盆中。將
灰斡投入。灰開湯沸。看沸聲盡。廼去灰。帶熱
坐於盆上。先薰後洗。即以熱韭菜患處。

立石。必能散寒消。

并。

一。

一次如法洗之。初極爽快。洗三日。果消軟收。

此予臆度之方。初不期捷效如是。里中聞之。咸

謂此方合命。名曰賽百帖人參湯云。一百十

江孫媳程氏。雙桂翁女也。年甫三旬。產曾五胎。

今則經閉不行者八年。肌肉則豐肥於昔。飲食

又倍加於昔。精采則艷羨於昔。腹柔不堅。略無

所謂病者。獨經閉不行。不生育耳。專科率用四

物湯。玄胡索。牡丹皮。諸通調之劑。計服千餘帖。

矣。又如三稜、蓬朮、乾漆、桃仁、蘓木之類，莫不藥
 嘗。罔有一應。訪予為診。六脉緩大有力。予曰：此
 脾濕生痰。脂滿子宮。徒行血活血破血無益也。
 法宜調氣消痰。燥濕容脂。俾使清瘦。庶新飲食
 不復生痰。不助肥脂。復為經水。經不期行而自
 行矣。若彼專科者。流局局然。養血活血破血。而
 欲望其經行。不亦難乎。蓋前劑皆滋濕生痰之
 味。非有濕痰者所宜。而肥人尤不宜用也。迺為
 訂一方。以平胃散加滑石、桃仁、黃連、姜、黃、丹、參。

南星、半夏作丸劑服之。半年而經行。次年生一
 子。後又連生一子一女。一百一十一

熊成八官。江右南昌人也。早起行路。忽見邪火二
 團。滾滾而來。大驚駭。次日腹中膨滿。漸成脹。泄
 面白皮薄。兩手瘦削。兩足皆有浮氣。按之窅然
 不起。行動氣促。形神俱弱。醫謂神弱氣促。面白
 肌瘦。胸腹青筋。縷縷如貫索。小水清長。形症如
 此。脾虛所致。以參苓白朮散投之。十日。堵然如
 鼓中有一塊。巍巍突出。堅若鉄石。臍已平滿。

粒不入。醫者復診。與渠決曰。若疾法在不治。去
 早圖歸。毋作異鄉鬼也。病者聞言。泪簌簌下。熊
 東溪憐而懇予為診。脉沉絃有力。診竟。語渠曰。
 審脉驗症。非氣虛中滿候也。前補太驟。適有助
 長。頃今霽雨途遙。即歸。恐未能時刻可到。即到
 又未必遇良手。治稍異。則大事去矣。予有一藥
 尚可異生。東溪力為之請。以琥珀調中丸。日
 進之。一進甚其。再進稱快。十日腹漸寬。塊
 片塊盡消。七有筋俱無。改以胃散。

予姜黃以仁砂仁木香調養一月。飲食大加。熱

然安寢。兩足之浮亦并消釋。一百一

從侄中叔太學。以暑月赴南雍。一日轉班出。索茶

飲。飲輒逆流。左鼻出。茶入腹者十之三。當牙白

下。名家調理者盡其人。幾一月。不惟飲茶水為

然。食粥與飯亦多從鼻出。太學生平喜精潔。日

與交游皆縉紳。逢掖遂以疾自慚。因告假圖治。

聞京口多名醫。買舟訪之。如何。如張如團。無不

謁治。然愈服藥愈病。漸加惡心頭暈。肌肉削。四

肢無力。心益喘喘。亟歸就予治。予診畢。因叩所見。諸名公認何症。投何劑。守叔曰。諸君皆謂此疾。板籍無載。治法無稽。徒揣度為胃火。謂諸逆上衝。皆屬於火。故投劑非黃連解毒。即三黃石膏。梔子黃柏。知母天冬粉葛根之屬。臣亦以初到白下。苦酒因酒動火。理或為然。聽其治而不違。它計也。予曰。治病貴辨明經絡。與經絡之出入。納虛實。以歲象察經度。究竟夫病機病能。此扁鵲之變也。何常拘拘守方。而哉。內經

本之口叩者。穀之道路也。喉嚨者。氣之所以下者也。頤頰者。分氣之所洩也。人之鼻淵涕出不收者。頤頰不開也。子之症亦頤頰不開之類爾。頤頰不開。故氣上而不下。會厭弱而不能揜其氣。喉夫鼻與氣喉相通。惟不揜。故飲食逆從鼻竅而出。不見常人偶氣逆而飲食自噴嚏出乎。即其例也。且右脉緩弱無力。氣虛明矣。內經云。形寒飲冷則傷肺。又曰。脾胃喜溫而惡寒。又云。視聰明而清涼。香臭辨而溫暖。子多服寒

涼此所以惡心頭暈肌消也。予但為溫補。蓋肺屬金而主氣。金氣旺則收斂下降。氣下降則飲食從氣下矣。以六君子湯加葶藶桑白皮以仁沉香。一進而執緩。三進而止大半。七劑而全安。以此症舊無載。故筆之以俟後人采焉。一百一十三

程達庵四媳戴氏產半月而腿疼。迎專科診視曰。虛。投以八珍湯。服十日。疼益甚。予赴邑侯之召。道經其廬。達庵趨問產後半月而腿疼何症也。予曰。兩腿皆疼。獨一疼也。達庵曰。右腿疼。予謂

疼處熱否。曰熱。予謂切不可認虛認風。此產後敗血凝滯。血海流於經絡。不急治則血無從出。必化膿成毒。或為腸癰。今腿痛是其徵也。達庵默然而別。復迎專科。又曰風也。但丹溪有云。產後須當大補氣血。雖有它症。以未治之。投以十全大補湯。痛轉劇。大發寒熱。小腹近髀果紅腫出膿。外科又為生肌收口。大蚤致腰俞復發。一毒腫痛寒熱如初。十日後大潰膿而不收口。精神委頓。肌肉陡削。飲食不進。惡心怯寒。奄奄

一息爾。外科曰：不可為也。專科曰：余但治胎前產後。今為腫毒所壞，皆辭去而不下藥。達庵始悔不聽予言，以致悞事。因急予，予往視六脉濡太無力，瘡口流清水而無膿。予曰：熱棘矣，不暇治疾，速為保脾。蓋五臟六腑皆藉脾土以為養，然非大劑人參附子不可。始以人參白朮各五錢，甘草乾姜大附子各一錢，黃耆三錢，白芷桂心各五分，以其能排膿止痛也。外科猶然阻曰：白朮作膿，恐不可服。予曰：膿不死人，飲食不入。

口則死人也。急進之，四帖而神氣回，飲食進，諸症悉減。瘡口成膿，予語之曰：生矣。改用參苓白朮散調理一月而安。達庵叩予曰：公何預知必為腫毒當急治也？予曰：內經所謂臟象，又云現症，腿疼而熱，症已現矣。生於產後，非敗血所致，而何於時急為疎通，不畱經絡，何毒之有？專科不察而補，是益其毒而助之潰也。外科不審虛實強弱，槩以毒治之，柰何不使患者幾危哉？達庵曰：專科之不足恃也如此。夫雖然，不如是無

以見公之高矣。一百一十四

