

漢書門		一	二	三	四
類	號	九	〇	九	一
架	冊	三	四	三	四

內閣文庫		漢書
函	冊	架
三〇	二	二
二	四	九

內閣文庫	
番號	漢 12409
冊數	4 (2)
函號	301 15



痰者乃津液所化濕熱薰蒸而成也隨氣升降無所不至夫痰之為病不可勝數百病多中於痰而痰多中於病者有矣故云諸病尋痰火而治亦謂此也痰脉多應於滑


主方

○若因房勞過度此為虛痰宜用四物湯加馬兜

鈴瓜蒌仁五味子阿膠貝母知母竹瀝姜汁類之

○若素有火而生痰者此為熱痰宜用二陳湯加

黃芩貝母天花粉玄參知母桔梗連翹山梔竹



瀝童便姜汁之類

○若因內外受濕而生痰者此為濕痰宜用二陳湯加蒼朮黃芩香附之類

○若因內傷飲食餘積不化而生痰者此為食積痰宜用二陳湯加山查子大麥芽神麩枳實類之

○若因外感風寒而生痰者此為風痰宜用參蘇飲

○若因血少氣盛熱鬱在裏吐咯難出或成塊者此為老痰宜用二陳湯加海石瓜蒌香附五倍子竹瀝姜汁之類

○若因精血虧少不能制火熱極似水凝結清冷此為寒痰實非寒也宜用二陳湯加蒼朮川芎香附黃芩桔梗之類

○若因脾胃虛損不能運化精微而生痰涎似桐油狀切不可用攻痰之劑宜用二陳湯倍加白朮麥芽之類

○若因火氣炎上痰結喉嚨之間如梅核狀咯不能出嚥不能下宜用四物湯加瓜蒌仁海石黃芩桔梗甘草連翹少佐以朴硝之類節齋化痰

九可用

○若因痰在膈上元氣實而脉浮者宜吐膠固稠粘者亦宜吐在經絡者亦宜吐吐中就有發散之義吐時先以布帛勒腰於無風處行之

○痰在脇下非白芥子不能達痰在四肢非竹瀝不行痰在皮裏膜外非竹瀝不除氣虛之人有痰非竹瀝不開

○痰因火盛逆上治火為先白朮黃芩石膏之類久病陰火上升津液生痰不生血宜補血制相火其痰自除

○痰成塊咯吐不出氣鬱滯者難治

○枳實瀉痰能衝墻壁黃芩假其下火也天花粉大能降上膈熱痰海粉熱痰能降濕痰能燥頑痰能消

○人中黃飯丸葶藶大每服十丸白湯下能降陰火消痰治食積

附方

二陳湯 治痰飲為患嘔吐惡心頭眩心悸中脘

不快或食生冷飲酒過度或脾胃不和並宜服

半夏湯泡六兩橘紅三兩白茯苓三兩甘草炙一兩

右剉每服一兩姜七片水一鍾煎服

潤下丸 降痰最妙

陳皮半斤去白以鹽水拌煮乾炒燥甘草炙一兩

右末蒸餅丸葦豈大每服三五十九溫湯下

青礞石丸 化痰 半夏湯泡黃芩

風化硝三錢提淨者冬月袋盛風中化之白茯苓去皮

南星狗青礞石敲碎煇硝等分同煇金色另研前藥俱等分

右為末神麩糊丸如梧桐子大每服三五十九

此藥重在風化硝

節齋化痰丸 治熱痰吐咯難出及虛痰勞嗽酒

痰頑痰諸般咳嗽並皆治之

黃芩酒炒一兩海粉一兩橘紅去白一兩天門冬去心一兩

連翹去梗五錢桔梗去芦五錢芒硝二錢香附去毛鹽水炒五錢

青黛五錢瓜蒌仁去壳取肉另研一兩

右為極細末煉蜜為丸如小龍眼大每服一丸

放口內噙化不拘時服

瓜蒂散

吐痰

瓜蒂炒

赤小豆

等分

右末香鼓一合水二鍾煮作稀粥去渣取三分之一和末一錢頓服不吐少加得快吐乃止

稀涎散

吐痰

白礬

一两

猪牙皂角

四條去皮

右為末每服七八錢白湯灌下以吐乃止

咳嗽

咳嗽者脾有濕肺受傷也節齋言咳謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰此論咳嗽之本原未必不由脾肺而作也殊不知咳嗽之為病有許

多證候復具于後以俟應病便處

主方

○或因內損精血陽火偏勝水不制火而咳嗽者脉當洪數而無力治宜滋腎清肺四物湯加黃栢知母黃芩瓜蒌仁貝母甘草之屬可與痰條虛損類互相參用

○或着氣惱及奔力諸般動火而咳嗽脉洪滑而瀉者宜順氣清肺香附桔梗連翹黃芩貝母天花粉馬兜鈴橘紅甘草之屬

○或因飲食傷積生痰而咳嗽脉緊盛而滑者宜用二陳湯加山查大麥芽枳實貝母神麴生姜之類

○或因外感傷寒傷風而咳嗽者宜參蘇飲加天花粉貝母知母之屬此是外感風邪初時只宜發散得汗而咳嗽自止矣

○喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱自除枳壳桔梗麻黃防風陳皮紫蘇木通黃芩嚴寒嗽甚加杏仁去黃芩

○感冷則嗽膈上有痰二陳湯加炒枳壳黃芩桔梗蒼朮麻黃木通之屬

○風寒鬱熱於肺夜嗽者二拗湯加知母脉大而浮有熱加黃芩生姜

○火者戴氏謂有聲痰少面赤者是也主降火清金化痰黃芩海石瓜蒌青黛桔梗半夏香附訶子青皮之類

○乾咳嗽者係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在肺中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成癆

須行倒倉法此證多是不得志者有之

○有痰因火逆上者必先治其火然亦看痰火孰急若痰急則先治痰也

○咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服

○痰者戴氏謂嗽動有痰聲痰出嗽止者是也宜

治痰節齋化痰丸可用

見痰門

○肺脹者戴氏謂動則喘滿氣急息重者是也主收斂肺因火傷極遂成鬱遏脹滿用訶子為主佐以海粉香附青黛杏仁之類不得眠者難治

○早晨嗽多者此胃中有食積至此時火氣流入肺中以知母地骨皮降肺火上半日嗽多者胃中有火貝母石膏降之午後嗽多者屬陰虛四物加知母黃柏降其火黃昏嗽多者火氣浮於肺不宜用涼劑以五味子五倍子斂而降之

○嗽而脇痛者宜以青皮疎肝氣後以二陳湯加香附青黛姜汁之類

○嗽而心煩六一散加辰砂

○嗽而失聲閏肺散訶子五倍子五味子黃芩甘

草等分爲末蜜丸嚙化

○寒熱交作而痰嗽者小柴胡湯加知母貝母之類一方加芍藥五味桑白皮

○凡嗽春是春升之氣夏是火炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外束

○治嗽用訶子味酸苦有收斂降火之功五味收肺氣乃火熱必用之劑杏仁散肺氣風熱然性實有熱因於寒者爲宜桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者當戒馬兜鈴去肺熱補肺生薑辛能發散瓜蒌甘能補肺潤能下氣胸有痰者以肺受火迫失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其爲治痰之要藥也

附方

瓊玉膏

生地黄四斤白蜜一兩人參六兩白茯苓十三兩

右以地黄搗汁和蜜以參苓爲末拌入蜜汁用瓶貯以紙箬包其口用柴桑火熬煮三晝夜取出再換蠟紙包封十數重沉井底一晝夜取起

再如前蒸煮一日白湯點服須於鷄犬不聞處製之

三拗湯 麻黃不去根節甘草生杏仁不去皮尖

右剉每服五錢姜五棗一水煎取痰清乃止

五拗湯 見喘門二陳湯 見痰門四物湯 見婦人門

六一散 見暑門參蘇飲 華蓋散 俱見傷寒門

○第十

哮喘

哮喘者竅隙氣聲之名也此病多感於幼稚之時呼吸急促客犯鹽醋滲透氣腕津液不清鬱積成痰窒塞

道路不得舒暢所以作聲也故名曰哮喘用藥專主於痰多用吐法愚以施於初起之時稟受壯者可行而愈恐久者或不能取効也雖用吐法暫得一時之快復來依然如舊矣必須淡食薄味行氣消痰庶或効

主方

陳皮法白甘草五分白茯苓一錢半夏湯泡去皮

枳殼炒八分桔梗去苦七分貝母去心一錢海粉一錢

細辛二分香附炒鹽水六分右剉一服姜水煎

○一法用吐者細葉馬蹄香一握姜一小片杵碎

用米飲湯調和絞去渣溫服用鵝翎探吐

○一方以訶子為末白芥子蒸熟搗丸服之

○一方青金丸治哮喘遇厚味發者用蘿蔔子淘
淨蒸熟晒乾為末姜汁浸蒸餅為細丸每服三
十粒津下

○第十一 喘

夫喘急者肺氣為火所迫也此病多起於哮喘夫哮喘
則傷肺肺既受傷不能統攝諸氣腠理開泄而風邪
易入則為氣急而奔喘者有之又有陰火炎上而喘
者惟少痰聲不甚太急又有氣虛者短氣不足以息
又有平素痰火在胃鬱遏肺氣不能升降當分痰火
多少而治痰多則聲響而滿悶火多則氣逆而乍退
大抵痰火者得食則已食后則喘又有胃虛而喘者
擡肩擷肚喘而不休已上諸證當審察明白則庶無
差誤矣

主方

陳皮一錢 甘草五分 白茯苓一錢 半夏湯泡一錢

枳壳炒八分 桔梗去芦八分

○哮喘者加杏仁去皮尖研一錢麻黃去節六分乾葛六分

○陰虛者去半夏加四物貝母去心一錢瓜蒌仁去壳一錢

杵黃芩酒炒一錢

○氣虛者加人參去芦八分蘇子炒杵六分北五味六分阿膠六分

麩炒一錢

○痰盛者加杏仁去皮尖研一錢天花粉八分連翹六分

○火盛者且温劫之干縉湯可用

○胃虛者加人參去芦一錢白朮一錢黃芪蜜炙一錢

○痰多倍痰藥火多則從治蓋火盛者不可驟用

寒涼故也

○凡久喘未發時以扶正為主已發攻邪為主

○喘急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜温劫之後因痰治痰因火治火

後因痰治痰因火治火

○所用阿膠宜分虛實若久病發喘必是肺虛故

用阿膠人參五味之類補之若新病氣喘而實

者宜用桑白皮葶藶瀉之

○氣實人因服黃芪過多而喘者宜用三拗湯瀉之

附方

治川炮天

治百方的說卷三

三六

千緡湯 治痰喘不能卧人扶而坐數日一服而

安 半夏七箇炮製每箇破四片 南星一箇炮製破四片

甘草寸多一 皂角一寸炙去皮弦子

右剉加生姜一指大水一鍾煎半鍾温服

導痰湯 治一切痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

氣喘不息 白茯苓錢一 南星炮二錢

枳壳錢炒二 甘草分多五 半夏錢炮二 陳皮去白一分

右剉一貼姜五片水一鍾煎服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛

痰涎壅盛 川歸去芦 陳皮

半夏麩 肉桂 前胡去芦 紫蘇子微炒

甘草炙各二錢 厚朴去皮姜汁炒一錢五分

右剉一貼姜三片棗一枚水煎服

五拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽

喘急 荆芥穗二錢 桔梗去芦一錢 麻黃去根節二錢

甘草六分 杏仁去皮尖研二錢五分

右剉一貼姜三片水煎熱服

四磨飲 治七情鬱結上氣喘急

沉香 烏藥 枳壳 檳榔 等分

右前藥用白滾湯各磨湯內飲之

二陳湯 見痰門

○第十七 瘧

節齋論瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡 去苗 白朮 各一錢半 蒼朮 淋浸一錢已上三味

乾葛 一錢五分 陳皮 七分 甘草 炙五分

○若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩 茯苓半夏 各一錢 熱甚頭痛再加川芎軟石膏 各一錢 口渴加石膏

○若間日或三日發午後或夜發者邪入陰分加

川芎當歸芍藥酒炒熟地黄知母酒炒各一錢紅花酒洗

黃栢酒炒升麻各四分提起陽分方可截之

○若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病
加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎當歸
白芍藥地黄各一錢以補血

○陽瘡多汗用黃芪人參白朮以飲之無汗柴胡
蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

○若陰瘡多汗用當歸白芍藥熟地黄黃芪黃栢
以飲之無汗柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之

故曰有汗者要無汗扶正為主無汗者要有汗
散邪為主

○若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少
食者加人參一錢半芍藥酒炒大麥芽各一錢

○若傷食痞悶或有食積者加神麩麥芽枳實各一錢
黃連一錢炒五分

○若欲截之加楨柳黃芩青皮常山各一錢烏梅肉
三箇

○若痰盛加姜製半夏南星枳實各一錢黃芩炒黃

連各六分

○若日久虛癯寒熱不多無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

附方

人參養胃湯 治癯疾外感風寒內傷生冷增寒

肚熱

厚朴去皮製蒼朮米泔浸炒

橘紅七錢藿香葉去土草菓去壳人參去芦各五錢

甘草二錢半夏湯泡

右剉每服四錢水一鍾半姜七片烏梅一箇煎

六分執服

四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結

聚涎飲與衛氣相搏發為癯疾

人參去芦白朮 茯苓去皮橘紅

半夏湯洗草菓仁 烏梅各等分甘草炙減半

生姜 棗子

右剉以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二鍾煎六

分未發前併進數服

清脾飲 治脾瘕脾脹來弦數但熱不寒或熱多

寒少口苦咽乾小便赤濕 甘草 炙

青皮 去穢 厚朴 姜製 白朮 半夏 湯泡

黃芩 草薹仁 柴胡 去芦 茯苓 去皮各等分

右剉每服四錢水一鍾姜五片煎服

七寶飲 治一切瘕疾無問寒熱多少及山嵐瘴

氣寒熱如瘕

厚朴 姜製 陳皮 甘草 炙 草薹

常山 枳榔 青皮 各等分

右每服五錢水一鍾酒一盞煎半鍾露宿空下

小柴胡湯 見傷寒門

○第十四 瘕亂

瘕亂者吐瀉不寧之謂也脉當沉伏或絕蓋因內有所積外有所感陰不升陽不降乖格而成先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹齊痛吐瀉並作甚則轉筋皆因飲食所傷治宜溫煖亦有可吐者又有乾瘕亂一種忽然心腹絞痛欲吐不吐欲瀉不瀉俗謂之絞

腸沙是也宜探吐之吐中就有發散之義此二證治法大同小異耳但即愈之後切勿與穀食雖米飲食之立死須待一二時辰許飢甚方可與稀粥此冊谿之至論也

主方

陳皮 二錢 半夏 湯泡一錢 白茯苓 一錢 甘草 五分

蒼朮 八分 厚朴 姜製八分 藿香 六分 砂仁 五分

生姜 三片 香附 鹽水炒八分

○轉筋加紅花 酒洗五厘 川芎 八分

○飲食傷積即時猝痛急用淡鹽湯探吐之吐後

照前主方加山查 一錢 麥芽 炒杵一錢 枳實 八分 木香 另磨

二分和藥汁

○外感風寒加乾葛 八分 川芎 八分 白芷 八分

乾癰亂難治死在須臾升降不通故也鹽湯探吐

提其氣刺少商委中出血最要前方加 木香二分 另磨

○前證癰亂亦刺二穴出血尤妙

○轉筋男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩

旁此千金妙法也

○洗法 治癰亂轉筋蓼一把水煮薰洗無蓼湯漬亦妙

附方

姜附湯見傷寒門 六和湯見暑門

○第十五 瀉

內經論有五泄之證胃泄者飲食不化色黃脾泄者腹脹滿泄注食即嘔逆大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸泄者溺而便膿血小腹痛大瘕泄者裏急後重數至圍不能便莖中痛卅谿論泄瀉屬濕屬氣虛有火有痰有食積戴氏又從而分辨之凡

瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不住完穀不化者氣虛也腹痛瀉水腸鳴瀉一陣痛一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而瀉後痛減者食積也大抵泄瀉多主於脾治宜分利為要然後當參諸證兼而治之罔不効矣

主方

猪苓八分澤瀉一錢茯苓八分蒼朮米泔浸炒

陳皮八分甘草五分

○胃泄完穀不化者加白朮陳壁土炒八分川厚朴姜汁炒八分

分人參六升麻三分○濕瀉者加白朮煨厚朴製木香各六分

○脾泄及瀉水腹不痛者加白朮陳壁上一錢蓮子去心

七箇白扁豆炒杵八分山查子一錢大麥芽炒一錢神麴炒八分

分半夏湯泡姜汁炒八分川芎六分白芍藥酒炒八分

○大腸泄者即謂之痢疾濕熱傷氣分其色白也當從痢疾條治之

○小腸泄者亦謂之痢疾濕熱傷血分其色赤也亦當從痢疾條治之

○或云溺血者則莖中痛當從溺血治之與赤痢

無干也既云小腹痛便膿血則為內實痢疾之

證明矣○食積加山查大麥芽炒杵各一錢木香另磨砂仁研各六分

○大瘕泄者古書謂之腎經受邪即今之痢疾是也亦有本證方治臨宜裁處

○火瀉者宜加黃芩八分木通八分

○痰瀉者加海石八分青黛八分神麴炒八分

○有氣虛下陷者宜升提之加升麻三分防風去芦六分

人參三分白朮八分

○有純瀉水者加香薷一錢白扁豆炒杵一錢木瓜八分木

告一抱氏
五十四

通去皮八分砂仁六分木香八分

○夏月水瀉者宜用六和湯或五苓散

附方

五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛癰亂吐瀉小便

赤瀉淋 澤瀉三錢肉桂五分白朮八分

猪苓二錢茯苓二錢右剉作一貼水一鍾煎服

清六丸 治瀉 六一散七兩紅麴五錢

右炊餅丸

六和湯見暑門

○第十六 痢疾

節齋論痢是濕熱及食積三者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨證調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩炒一錢半 黃連炒一錢半 白芍藥炒二錢已上三味痢疾必用之

木香 檳榔一錢 枳壳炒各一錢半

甘草炙三分

○若腹痛加當歸一錢半 縮砂一錢 再加木香芍藥各五分

○若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢半 初欲

下之再加大黃一錢 兼食積加山查子枳實各一錢

○若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢半以理血滑石陳皮蒼朮各一錢 以理氣有食積加山查枳實

○若白痢又胃弱氣虛或下後未愈減黃連芍藥各七分 加白朮一錢半 黃芪茯苓陳皮各一錢 砂仁五分

去檳榔枳壳加炙乾姜三分

○若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減芍藥各五分

加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢 白朮一錢

○若色赤黑相雜此濕勝也及小便赤澹短小加

木通澤瀉茯苓各一錢 山梔仁炒五分 以分利之

○若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢

久不愈減芍藥各七分 去檳榔枳壳再加阿膠珠

側栢葉各一錢半炒黑乾姜一錢白木陳皮各一錢

○若痢已久而後重不去此大腸墜下去換柳枳

壳用條實黃芩加升麻錢以升提之

○若嘔吐食不得下加軟石膏半錢陳皮錢山梔

仁炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

○有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮

陳皮黃連黃芩阿膠之類以補之而痢自止

○若得痢而誤服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦宜

前法以下之下後方調之

○若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理

法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛

補寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂鶯宿壳烏

梅肉等收瀉之藥

○若痢欬逆者從欬逆門治

附方

木香導氣湯 治一切紅白黑痢裏急後重欲去

不去等證 白芍藥八分黃芩一分錢五

黃連一錢五分木香另研六分大黃一錢五分川歸三分

枳壳

分炒八

滑石

研一錢

砂仁

研三分

檳榔

六分

右侲一貼姜一小片水一鍾半煎至八分熱服

黃芩芍藥湯 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈

及下利膿血

黃芩

一兩

芍藥

一兩

甘草

五錢

右剉每服五錢水煎服如痛則加桂少許

香連丸 治久痢赤白膿血不止裏急後重

木香

四兩

黃連

二十兩用吳茱萸同炒去萸

右爲末醋糊丸梧桐子大每服三十九丸白湯下

丹谿謂噤口痢胃口熱甚故也用黃連三錢人參

一錢煎汁終日呷之如吐再喫但得一口下咽

便好又用田螺搗碎臍中以引下其熱胃口熱

結當開以降之人不知此多用溫藥甘味以火

濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者

當推明而祛其毒

不治證 下痢純血者如塵腐色者如屋漏者大

孔如竹筒者唇如朱紅者俱死如魚腦者身熱

脉大者俱半死半生

○ 嘔吐 并噦

嘔吐 并噦

嘔謂有聲屬氣病吐謂有物屬血病嘔吐者有聲有物氣血俱病也嘔則有聲噦謂欲嘔不嘔之為噦也病出一體皆因胃氣不行假令食在氣上氣升則食自降當和中行氣隨所見之證治之

主方

陳皮 一錢 茯苓 一錢 半夏 一錢姜炒 香附 一分鹽水炒

藿香 六分 甘草 三分 神麩 八分炒 生姜 五片

○ 若因痰隔中焦而嘔吐者脉當沉滑加貝母去心

枳壳 八分炒 桔梗 八分去芦 蒼朮 八分酒浸炒 川芎 八分亦

當探吐以提其氣

○ 若因胃中有熱而嘔吐者脉當洪實加黃連梔

子俱姜汁炒 砂仁 八分

○ 若因怒氣相干而嘔吐者脉當弦濇加川芎芍

藥酒炒各 吳茱萸 六分酒炒 倍生姜

○ 若因久病胃弱而嘔吐者脉當弦緩加藜蘆炒

山查子 一錢八分 紅苳 六分白朮 四分

○ 若因飲食過傷而嘔吐者脉當氣口緊盛加川

芎八分大麥芽炒八分山查肉一錢砂仁八分或可探吐

○若飲酒之人早晨作嘔者脉當洪滑加乾葛八分

吳茱萸六分蒼朮六分澤瀉六分

○若因夏月感暑熱作嘔者宜用六和湯

附方

回生湯 治嘔吐 陳皮 藿香各等分

右剉每服六錢姜五片水一鍾煎半鍾頻服

不換金正氣散 治嘔吐不止

藿香葉一兩陳皮去白一兩厚朴姜製二兩蒼朮米泔浸炒二兩

甘草炙二兩半夏湯泡三兩

右剉每服五錢姜五片棗一枚水一鍾煎服

生姜橘皮湯 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮四兩生姜半斤右剉水煎服

○第十八 噎膈

冊谿論噎病生於血乾血液俱耗胃脘乾稿其稿在上近咽之下水飲可行食物難入或可少食名之曰噎其稿在下與胃相近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈又曰反胃名雖不同病出一體蓋因病

之初起內傷七情外感風寒而致痞滿噯酸糟雜等證醫用局方辛香燥熱之劑投之暫得一時之快殊不知病本日深遂成斯證矣此病屬血虛氣虛有熱有痰各從其類而治之愚謂氣血虛者則胃脘乾稿治之尤難若夫痰熱者治之庶或見效

主方

白朮

一錢五分

陳皮

八分

甘草

炙五分

半夏

湯泡姜汁炒八分

白茯苓

一錢

川芎

六分

山查子

一錢

大麥芽

炒杵八分

○血虛者脉數而無力加當歸

四分

白芍藥

酒炒六分

紅花

酒洗五厘

○氣虛者脉大而無力加人參

去芦八分

○熱者脉洪而緊加黃連

酒炒八分

童便

一盞

○痰者寸關脉沉或滑加貝母

八分

桔梗

六分

竹瀝

一盞

姜汁

少許

○氣結滯者寸關脉沉而澹加香附米

童便浸炒六分

胡去芦六分

青橘葉

四片

紅花

酒洗二厘

沉香

降氣散可用

○有飲酒人痰火在胃者加瓜蒌

去壳八分

乾葛

六分

蔗汁

一盞

竹瀝

一盞

姜汁

少許

○有積血者當消息去之加葶汁半盞棗仁去皮尖研一錢

○有陰火炎上作陰虛條治

張鷟峯曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治

之此言深中病情

不治證 糞如羊屎者不治大腸無血故也戴氏

又謂氣血俱虛者口中多出沫但見沫大出者必死

附方

五膈寬中散 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽

不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病一切

冷氣並治之

丁香 五錢

香附米 童便浸炒二兩

甘草

炙五兩

砂仁

研二兩

木香

二兩

青皮 去白三兩

陳皮

去白二兩

厚朴

姜製一斤

右為末每服一錢

鹽湯

調服

沉香降氣散

治七情噎膈

見諸氣門

第十九

欬逆

冊谿謂欬逆者氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也人之陰氣依胃為養胃土傷損則木侮之陰為火所乘不得內守木挾相火故直衝清道而上乃陰虛之甚也有痰有氣虛有陰火宜分辨而治

主方

蓮子

去心七箇

白朮

連翹

六分

香附米

鹽水浸炒八分

陳皮

一錢

甘草

炙六分

川芎

白芍藥

酒炒各八分

○痰者加半夏

姜炒八分

白茯苓

八分

貝母

去心八分

○氣虛者加人參

去芦八分

白朮

去芦一錢

白茯苓

八分

○陰火者加黃連

酒炒八分

黃柏

酒炒六分

滑石

研一錢

○若痢欬逆者加滑石

研一錢

棗仁

去皮研一錢

枳壳

○久痢欬逆者加黃連

姜炒一錢

木香

另磨三分

枳壳

○飲食後欬逆者加山查

一錢

大麥芽

炒一錢

茯苓

附方

橘皮乾姜湯

治嘔噦欬逆

人參

去芦一兩

通草

橘皮

乾姜

官桂

甘草

各等分

右剉每服一兩水

一鍾前半鍾溫服

灸法

婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及

乳小者以一指為率正男左女右與乳相直間

陷中動脈處是穴艾炷如赤菴荳大灸三壯

第二十

暖氣

暖氣者胃中有痰有火也用二陳湯加香附梔子黃

告川炮氏

卷之九

八十三

連枳壳或丸或湯服之

○**第廿四**

吞酸 附吐清水

夫酸者食物鬱積而成也蓋吞酸與吐酸不同吐酸是濕熱鬱於肝出於胃隨氣上升而吐出酸水也其有積久不能自湧伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內鬱愈甚而酸味刺心肌表得溫煖則腠理開發而暫解或有投以香熱湯丸而暫愈殊不知本熱而標寒世人誤認以為寒愈劫而愈甚遂成噎膈不救者多矣然雖有二者之分而病本則一也治宜開其鬱熱少佐熱藥為何導則氣和而愈矣

主方

陳皮 一錢 蒼朮 八分泔炒 白茯苓 半夏 湯泡各一錢

山梔仁 姜炒 黃連 姜炒 黃芩 酒炒 神麩 炒各一錢

甘草 六分 吳茱萸 八分 香附米 童便浸炒八分

○吐酸者加山查子 一錢 杵一 白篇苳 八分 炒杵 木香 三分 另磨

○挾食者加山查肉 一錢 大麥芽 一錢 炒杵 砂仁 一分 研八

○食鬱有痰者加南星 一錢 炮一

○治吞酸或宿食不化用生料平胃散 蒼朮厚朴 俱不製

加神麩麥芽俱炒姜水煎服

○治酸必用茱萸順其性而折之

○治酸宜節厚味必蔬食自養則病易安

吐清水用蒼木陳壁土炒茯苓滑石研炒白朮陳皮煎服

附方

茱萸丸 治吞酸吐酸

黃連 陳壁土炒 一兩

陳皮 五錢 蒼木 半七錢 茱萸 去梗 五錢 黃芩 陳壁土炒 五錢

右末神麩糊丸茱萸大每服三五十九津嚥下

參萸丸 上治吞酸下治自利 又云治濕滯氣濕熱甚者用為向導

六一散 七兩方見暑 茱萸 製一兩 右為末飯丸

○第廿二 曾雜

曾雜者痰因火動食鬱有熱也炒梔子姜汁黃連乃

必用之藥○大法用黃連梔子黃芩南星半夏橘紅

熱多加青黛○肥人宜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮

梔子○若濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍附香

附方 二陳湯 見痰門 三補丸 見火熱門

○第廿三 傷飲食

傷食必惡食胸膈痞塞聞食氣則嘔乃胸中有物也

亦有頭痛發熱者但身不痛耳類傷寒氣口脉必緊盛

主方

陳皮 一錢 甘草 五分 白茯苓 八分 半夏 湯泡 一錢

川芎 八分 砂仁 研一錢 山查肉 一錢 大麥芽 炒 一錢

○頭痛發熱者加蒼朮 八分 柴胡 八分 黃芩 八分 倍

○飽悶者倍山查加枳實 八分 神麩 八分

○暴死暴病多有傷於食者故經云上部有脉下部

部無脉其人當吐不吐者死正謂此也類中風條參看

附方

瓜蒂散 見痰門 吐食物用之如吐不止用甘草煎

按此方大能損傷胃氣其病勢甚重吐不出者

不得已而用之否則不可輕用也莫如淡鹽湯

吐之尤穩

淡鹽湯吐法 煎滾湯十數碗投鹽在內嘗之勿

使太鹹令病人任意喫之滿腹以手指或鵝翎

探吐之以吐為度此法最好不損胃氣

保和丸 治食積脾胃虛者以補藥下之

山查 取肉二兩 神麩 炒 半夏 湯泡 白茯苓 各一兩

蘿蔔子炒

陳皮

連翹各五錢

右末粥丸或神麩糊丸加白朮二兩名大安丸

平胃散 治脾胃不和不進飲食

蒼朮

泔炒

陳皮

五兩

甘草炙三兩

厚朴

去皮姜汁炒五兩

右末每服三四錢姜棗煎湯調服或鹽湯點服

葛花解醒湯 治酒客病令上下分消其濕

砂仁

白荳蔻

葛花各五分

乾生姜

神麩炒

白朮

各二錢

木香五分

青皮

去穢三分

陳皮

去白

猪苓

去皮

人參

去芦

白茯苓各一錢五分

右末每服三錢白湯調下但得微汗則病去矣

備急丸

見秘結門

治食積

○第廿四

痞滿

痞滿者謂不通泰而聚悶也有傷寒下早邪氣攻上而痞者有雜病下過脾陰亡血而痞者有中氣虛弱不能運化精微而痞者有飲食痰積壅塞而痞者有濕熱太甚而痞者各依類而治之

主方

陳皮

一錢

甘草

炙五分

白茯苓

八分

半夏

湯泡姜汁炒一錢

枳實炒一錢 厚朴姜製三分 黃連姜汁炒一錢

○傷寒痞者依仲景法治

○脾虛亡血痞者加歸身三分 川芎六分 芍藥酒炒一錢

神麴炒六分 香附米童便炒六分 白木八分

○中氣虛弱痞者加人參八分 白木一錢 蒼朮米泔浸炒六分

○痰積痞者加山查子一錢 大麥芽炒一錢 貝母八分

○濕熱痞者加黃芩酒炒一錢 山梔仁酒炒一錢 蒼朮泔炒八分

○肥人多是濕飲宜蒼朮半夏茯苓滑石之類

○瘦人多是鬱熱宜枳實黃連葛根升麻之類

○痰挾血成窠囊者用莢仁紅花香附大黃之類

○若痞全用氣藥導之則痞益甚甚而復下之氣

愈下降必變中滿鼓脹又有虛實之分實痞大

便閉能食厚朴枳實湯主之虛痞大便利者芍

藥陳皮湯主之

附方

消痞丸 治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生姜二錢 神麴炒二錢 甘草炙二錢 猪苓二錢五分

澤瀉三錢 厚朴姜製三錢 砂仁三錢 半夏湯泡四錢

陳皮 四錢 人參 四錢 枳實 炒五錢 姜黃 一兩

白朮 去芦 右末蒸餅丸梧子大 每服五十九至

失笑丸 一名枳實 治右関脉弦心下虛痞惡食懶

倦開胃進飲食 乾生姜 一錢 麥蘖麩 二錢

甘草 炙二錢 白茯苓 二錢 半夏 麩

人參 各三錢 枳實 黃連 各五錢

右末蒸餅丸梧子大每服七十九食遠白湯下

消痞湯 一名木香 治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微

痛心下痞滿不思飲食

歸稍 四分 枳實 炒 陳皮 六分 乾生姜 六分

木香 六分 柴胡 去芦 七分 草薺 各一錢

半夏 一錢 紅花 少許 右剉一貼姜水煎服

左金丸 見火熱門 治痞滿

○第七十五 腫脹

腫脹者胃有濕脾受傷也胃雖受穀脾不能運化鬱而成濕濕熱相生遂成腫滿丹谿論治之詳其曰補中行濕利小便固治之常法愚謂補中二字恐未合病情雖曰塞因塞用施於風證無形之邪殊為切當

此則濕熱有形之證而施之未免反助病邪不若和中兩無背馳矣若果氣虛濕熱已行審其真的方可補中學宜圓變處治不可執泥腴當浮大者順沉細者逆

主方

陳皮 茯苓各一錢 川芎 白芍藥 酒炒各八分

蒼朮 米泔浸炒 澤瀉 黃連 姜汁炒 半夏 姜汁炒

木通 各八分 甘草 炙三分 猪苓 六分 大腹皮 豈湯洗炙六分

○腫病又有虛實之辯以手按之有凹不起者屬

虛加篇豈八分 白朮 五分 當歸 五分 厚朴 姜製三分 木香 另磨

三分按之隨手凸起者屬實加大黃 酒蒸一錢五分 枳實一錢

○若元氣實可下者加牽牛末一錢

○先脹而后喘者治在脾加篇豈五分 大麥芽 炒八分

枳實八分 厚朴 姜汁炒四分 木香 另磨三分

○先喘而后脹者治在肺前方去黃連加黃芩 酒炒

八分麥門冬 去心六分 厚朴 姜汁炒四分 木香 另磨三分

○有熱當清金加黃芩 酒炒八分 麥冬 去心六分 厚朴 姜製三分

○氣下陷加升麻 二分 柴胡 去苦五分

○氣不運加木香 另磨三分 厚朴 姜汁炒二分

○朝寬暮急屬血虛加當歸身三分紅花酒洗少許

○暮寬朝急屬氣虛加人參二分白朮錢一厚朴二分

○腰以上腫宜發汗加蘇葉八分乾葛八分枳殼八分炒

白芷六分或參蘇飲十神湯俱可用

○腰以下腫宜利小便加猪苓八分滑石錢一梔仁八分

○腹如蜘蛛手足瘦者加人參八分白朮錢一當歸四分

厚朴姜汁炒四分

○凡腫病視其虛實若初病元氣未傷速當下之以去其邪久則恐正氣傷而邪氣固殆不可為

矣下後即當理脾進食斷厚味遠音樂燮養數年庶免再復

○水腫脉多沉病陽水兼陽證脉必沉數病陰水

兼陰證脉必沉遲煩渴小便赤色大便閉此為陽水不煩渴大便溏小便少

不赤濇此為陰水也

○水腫用山梔仁炒為末米飲下胃腕熱病在上帶皮用

不治證大便滑泄唇黑缺盤平臍突足背平肉

硬手掌平無紋男自下腫上女自上腫下不治

附方

醫方類聚卷之十一

舟車神祐丸 治腫脹服此藥後忌甘草

大黃 大戟去心 芫花製 青皮去白

陳皮去白 黃栢去皮 檳榔各一兩 甘遂製

木香各五錢 牽牛頭末四兩

右為末水丸梧子大每服六七十丸白湯送下

香薷膏 治水腫甚捷有徹上徹下之功肺得之

則清化行而水自下 大葉香薷 一斤

右水煎汁成膏丸服白湯下

四炒丸 治氣血凝滯腹內蠱脹

枳壳去穰四兩切細一兩用蒼朮一兩同炒黃

子一兩用茴香一兩同炒黃去茴香一兩用牛膝一兩同炒黃去牛膝止枳壳為末

右用原炒蒼朮四味水二碗煎一碗去渣打麵糊丸梧子大每服五十九丸米湯下

○ 第六 積塊 附茶癖

古書有積聚癥瘕立名而丹谿以積塊稱夫積聚者物滯曰積成塊而有常處氣滯曰聚或散而來往無常也癥瘕者則積塊之別名也內經論有五積之證曰肥氣曰伏梁曰痞氣曰息賁曰奔豚丹谿列有方治而又謂在中為痰積在左為血積在右為食積此

亦論積塊有常處之大槩也治法方冊班班要之養
正其積自除尤為穩當

主方

陳皮

白茯苓

川芎

各八分

香附末

童便浸炒一錢

半夏

湯泡一錢

甘草

五分

蒼朮

泔炒六分

山查子

杵一錢五分

連翹

六分

枳實

一錢

菴仁

去皮一錢

厚朴

姜炒三分

○痰積加天花粉

八分

貝母

八分

海粉

一錢

大麥芽

炒八分

○血積加紅花

酒洗一分

當歸尾

八分

莪朮

八分

昆布

八分

○食積加大麥芽

炒杵一錢

神麩

炒一錢

木香

三分

另磨

和藥

○塊是有形之物大法鹹以軟之堅以削之行氣

開痰為主

○治塊用海石山稜莪朮香附俱醋炒菴仁紅花

五靈脂之類為丸白朮湯下

○蜀葵煎湯入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝

煎成膏入細研菴仁玄明粉各少許熱飲之二

服當見塊下病重須補藥接之後再行加減

○石醵去痰積食積洗滌垢膩同功

○瓦壘子能消血塊次能消痰

○積塊不可專用下藥徒損真氣病亦不去當消導使鎔化行死血塊塊去須大補

○痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之蕪二陳湯先須斷厚味

○積塊必須斷厚味蔬食飲食內觀自養遠去帷幙則病易愈矣

茶癖用石膏黃芩升麻爲末砂糖水調服

倒倉法 用肥嫩黃牝牛肉三十斤切成小塊去筋膜長流水煮糜爛以布瀝去渣滓取淨汁丹

入鍋中慢火熬至琥珀色則成矣令病人預先

斷慾食淡前一日不食晚飯設密室令明快而

不通風置穢桶及木瓦盤貯吐下之物置一甕

盤盛所出之溺至日病者入室以汁飲一鍾少

時又飲一鍾積數十鍾寒月則重湯溫而飲之

任其吐利病在上者欲其吐多病在下者欲其

利多病在中及在上又在下者欲其吐利俱多

全在活法而爲之緩急多寡也連飲之急則逆上而吐多緩則

順下而視所出之物必盡病根乃止吐利後必

渴不得與湯以所出之溺飲之名輪迴酒非惟
可以止渴抑且可以濯滌餘垢行後倦睡覺飢
先與稠米飲次與淡稀粥三日後方與少菜羹
次與厚粥軟飯調養半月或一月覺精神煥發
形體輕健沉痾悉去矣其後須忌牛肉數年夫
牛坤土也黃土之色也以順爲性而效法乎乾
以爲功者牡之用也肉者胃之樂也熟而爲液
無形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌膚
毛竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸

回薄曲折處以爲棲泊之窠白阻礙津液氣血
薰蒸燔灼成病自非剖腸刮骨之神妙可以銖
兩丸散窺犯其藩牆戶牖哉肉液之散濫腸胃
受之其厚皆倍於前有似乎腫其回薄曲折處
肉液充滿流行有如洪水之泛漲浮槎陳朽皆
推逐蕩漾順流而行不可停留表者因吐而汗
清道者自吐而涌濁道者自泄而去凡屬滯礙
一洗而盡牛肉全重厚和順之性盎然渙然潤
澤枯槁補益虛損寧無精神煥發之樂乎正似

武王克商散財發粟以賑殷民之仰望也其方
出於西域之至人凡人於中年後行一二次亦
却疾養壽之一助也

倒倉法全賴自飲輪迴酒十數盃以祛逐餘垢迎
接調勻新布榮衛使臟氣育膜生意敷暢有脫
垢換骨之功也多嫌其穢因致中輟而功虧一
簣若非明物理通造化者其肯視為美醞良味
乎

冊谿與人
書簡所論

附方

琥珀膏 貼積塊

用大黃朴硝各一两為末用大蒜搗膏和勻貼之

阿魏丸 治肉積

阿魏 山查各一两 連翹五錢 黃連六錢半

右三味為末阿魏醋煮為糊丸如梧子大每服
六十九丸脾胃虛者用白朮三錢陳皮茯苓各一
錢煎湯送下

肥氣丸 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足久
不愈令人發欬逆瘖瘡連歲不已

厚朴 五錢 黃連 七錢 柴胡 二兩 巴莖霜 五分

椒 四錢 乾姜 炮五分 廣木 炮二錢半 白茯苓 一錢五分

人參 二錢 甘草 炙三錢 昆布 二錢半 烏頭 炮去皮一錢二分

皂角 去皮子弦煨 一錢五分

右除茯苓皂角莖霜另末外為細末和勻煉蜜為丸梧子大初服二九一日加一丸漸加至大便微澹丹從二九加服周而復始積減太半

伏梁丸 治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃連 一兩 厚朴 製 五錢 人參 各五錢 黃芩 三錢

桂 一錢 乾姜 莖蒲 各五分 巴莖霜 各五分

紅莖 二分 茯苓 丹參 炒各一錢 川烏頭 五分 炮

右為極細末另研莖霜旋旋入末煉蜜為丸如梧子大服如上法淡黃連湯下

痞氣丸 治脾之積在胃腕覆大如盤久不愈令人四肢不收發臆飲食不為肌膚

厚朴 四錢半 黃連 八錢 茱萸 二錢 黃芩 二錢

白茯苓 澤瀉 人參 各一錢 川烏頭 炮五分

川椒炒五分茵陳酒炒乾姜炮破仁各一錢半

白朮二分巴菝霜桂各四分

右除菝霜另研茯苓另末旋入外同為細末煉

蜜丸梧子大用淡甘草湯下服如上法

息賁丸治肺之積在右脇下覆大如杯久不已令

人泚洒寒熱喘欬發肺癰

白茯苓川椒炒乾姜炮紫苑各一錢半

烏頭炮天門冬京三稜白菝蕪

陳皮桔梗桂各一錢黃連一兩三錢

厚朴製八錢人參三錢青皮五分巴菝霜四分

右除茯苓巴菝霜旋入外為細末煉蜜丸梧子

大以淡姜湯送下服如上法已上四方秋冬加

厚朴減黃連四分之一

奔豚丸 治腎之積發於小腹上至心下若豚狀

或下或上無時久不已令人喘逆骨痠少氣及

治男子內結七疝女人瘕聚滯下

厚朴製七錢黃連五錢白茯苓澤瀉

菝蒲各二錢川烏頭丁香各五分苦練酒煮三錢

玄胡半錢 全蝎 附子 獨滑各一錢

桂二分 巴苳霜四分

右除苳霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜丸
如梧子大淡鹽湯下服如上法

保和丸 治食積見傷飲食門

○**第廿七** 注夏

人稟元氣有不足者多於春夏之間患頭疼脚軟食
少體熱仲景謂春夏劇秋冬瘥而脉大者世俗所謂
注夏病也宜補中益氣湯加炒黃柏芍藥茯苓挾痰
加半夏陳皮之類或用生脉散

附方 補中益氣湯見內傷門 生脉散見暑門

○**第廿八** 胃風

丹谿論初飲食訖乘風涼而致其證食飲不下形瘦
腹大惡風頭多汗膈塞不通右關弦而緩帶浮胃風
湯正治此證或看所挾加減

附方

胃風湯

人參 茯苓 川芎 當歸

桂

白朮

白芍藥

各等分

右剉每服七八錢粟米百餘粒煎服腹痛加香

○第廿九

虛損

夫虛損者氣血消耗之謂也蓋人之情慾縱恣以傷其內人之勞役過度以傷其外日損月虧而病斯作矣丹谿謂多屬陰虛而發陰不足陽有餘之論備矣然亦有氣虛者當從東垣法治

主方

○情慾縱恣者屬血虛四物湯加黃柏知母之類

○勞役過度者屬氣虛四君子湯加黃芪附子少許之類

○氣血兩虛者八物湯主之

○人年老或虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽

幾於飛越天生胃氣尚爾留連又籍水穀之陰

故羈縻而定耳局方用溫劑劫虛蓋脾得溫則

食進故亦暫可質有厚薄病有淺深設或失手

何以收救吾寧稍遲計出萬全溫劑決不可用

○人年老虛損但覺小水短小即是病進宜以人

參白朮為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐春

加川芎夏加黃芩麥門冬冬加當歸身倍生姜
一日或一貼或二貼小水之長若舊乃止此却
病之捷法也

○補氣用人參然蒼黑人多服之恐反助火邪而
燥真陰可以白朮代之若肥白人多服最好又
必加陳皮同用

○大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田

臍下三寸針
八分灸任多

○竹瀝本草云大寒泛觀之似與石膏連等同
類而諸方治胎產及金瘡口噤與血虛自汗消

渴尿多皆是陰虛之病無不用之產後不得虛
胎前不損子何世俗因大寒二字棄而不用經
曰陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有
大熱者寒而能補正與病對大寒言其功非獨
言其氣也人終世食筍未有因其寒而病者瀝
即筍之液也假於火而成何寒如此之甚
不治證 虛勞不受補者不治

附方

四君子湯 治氣虛

人參去芦五錢白朮去芦一兩白茯苓一兩甘草三錢

右剉每服四五錢水煎服

十全大補湯治氣血虛人參去芦黃芪蜜炙

白茯苓 甘草炙 白芍藥 熟地黄

肉桂 當歸去芦 川芎 白朮去芦各等分

右剉每服一兩加姜枣水煎服

大補陰丸降陰火補腎水 黃柏酒炒 知母去皮毛酒炒各二兩

熟地酒洗六兩 龜板酥多六兩 右末猪脊髓和煉蜜丸空

心鹽湯下

節齋補陰丸治陰虛 黃柏酒炒 知母去皮毛酒炒

龜板各三兩 瑣陽酥炙 枸杞各二兩 熟地黄五兩

五味子一兩 天冬去心二兩 芍藥酒炒二兩 乾姜炒三錢 寒

右爲末煉蜜入猪脊髓三條和藥末杵勻丸梧

子大每服七八十九早晨鹽湯下寒月酒下

○若夢遺精滑加牡蠣便白朮各一兩 山萸去核一兩

○赤白濁加白朮一兩 白茯苓一兩 梔仁黃連炒各五錢

○若脚無力加牛膝一兩 虎脛骨酥炙一兩 防己木瓜各五錢

○若疝氣加蒼朮一兩 黃連姜炒一兩 山梔仁炒六錢

古川繪元 醫方類聚卷之十一

川芎六錢 吳茱萸炒五錢 青皮五錢

○若脾胃虛弱畏寒易泄加白朮三兩 陳皮一兩 乾姜七錢

○若目昏暗加歸芍菊花各一兩 柴胡黃連酒炒 烏犀

角各五錢 蔓荊子防風各三錢

○兼氣虛之人加人參黃芪蜜炙各二兩

○天脉虛微火衰陽不舉加桂附沉香各五錢

滋陰大補丸即寶鑑還少丹無 肉蓯蓉酥炙一兩

牛膝酒浸一兩 山藥五錢 巴戟去心一兩 杜仲酒炒斷絲一兩

山萸去核一兩 五味子一兩 白茯苓一兩 遠志去心甘草汁煮一兩

茴香炒一兩 石菖蒲五錢 枸杞子五錢 熟地黄二兩

右為末紅棗煮取肉和煉蜜丸梧子大每服八

十九丸淡鹽湯或酒空心服此藥補陰和陽益生血

補腎丸 黃柏酒炒三兩 龜板酥炙三兩 杜仲酒炒斷絲二兩

牛膝去芦二兩 乾姜五錢 五味一兩 陳皮一兩

補天丸 治氣血俱虛者

紫河車一具 紫河車即胎衣本草及古方不分男女世傳男用女胎者女用男胎者俱

以初胎為佳似為有理若不可必得只壯盛婦人者俱可用

右以補腎丸藥為末河車水洗淨布絞乾入藥

末搗勻焙乾再為末酒米糊丸或河車蒸熟搗藥末就丸亦可

虛勞者當以骨蒸藥佐之又云氣虛加補氣藥而虛加補而藥又

方用側柏葉烏藥葉首葉首葉未詳俱酒浸九蒸九

曝為丸亦名補腎丸同紫河車為丸

六味地黄丸 治腎氣久新憔悴寢汗發熱五臟

齊損瘦弱虛煩骨蒸萎弱下血

乾山藥 山茱萸去核各四兩 牡丹皮去心

澤瀉 白茯苓各三錢 熟地黄八錢

右為末煉蜜為丸梧子大每服五十九清湯空心下

人參固本丸 治虛勞 人參去芦二兩

天門冬去心 生地黄 麥門冬去心 熟地黄各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下

人參膏 人參去芦剉細如煎常藥法量水於銀石器內煎至一半去渣再煎三度通以所煎汁文武火熬稠而

止諸藥煎膏故此

八物湯四君子湯合四物湯 六君子湯四君子湯合二陳湯

四物湯見婦人門

勞瘵

節齋論男子二十前後色慾過度損傷精血必生陰

虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人愛命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消燥沉困着床尺脉沉取細數則難為矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治今製一方于後治色慾證先見潮熱盜汗咳嗽倦怠趁早服之

方

川芎 一錢 熟地黄 一錢 當歸 一錢 白芍藥 一錢

黃柏 七分 蜜水浸火 知母 一錢 蜜水浸炒

生地黄 五分 酒洗 天門冬 一錢 去心及皮

白朮 一錢 陳皮 七分 甘草 五分 乾姜 炒 色三

○若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蒌仁 各七分 五味

子 十粒

○若痰盛加姜製半夏貝母瓜蒌仁 各一錢

○若盜汗加牡蠣酸棗仁 各七分 浮小麥 一撮

○若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮 各七分

○若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸 各七分

○若赤白濁加白茯苓 一錢 黃連 三分炒

○若兼衄血欬血出於肺也加桑白皮 一錢 黃芩山

梔各五分炒

○若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母瓜蒌

仁黃連 各七分

○若兼嘔吐血出於胃也加山梔黃連乾葛蒲黃

炒各一錢 薤汁 半銀 姜汁 少許

○若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉 各一錢

○若先見血證或吐衄盛大者宜先治血治法輕

少者涼血止血盛大者先消瘀血次止血涼血

蓋血來多必有瘀於胸膈不先消化之則涼之

止之不應也葛可久十藥神書方可次第檢用

方內惟獨參湯止可用於大吐血後昏倦脉微

細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬 五錢 若

如前所云陰虛火動潮熱盜汗咳嗽脉數不可

用也說見本草集要人參條下明白

○此病屬火大便多燥然須節調飲食勿令泄瀉
若胃氣復壞泄瀉稀澹則前項寒涼之藥難用
矣急宜服藥理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神
麩麥芽甘草等藥俟胃氣復然後用前本病藥
○收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方
○丹谿云勞瘵之病乃陰虛之極痰與血病亦有
重者俗謂之傳尸大法用四物湯加人尿竹瀝
姜汁青蒿一方可用

○氣血虛甚發熱成癆補天丸加治骨蒸藥佐之
○身瘦屬火因火燒燉也肉脫甚者難治

附方

犀角紫河車丸 治傳尸癆神効

紫河車 一具又名混沌皮即男胎胞衣米泔浸一宿焙乾用

龜甲 酥炙 桔梗 胡黃連 芍藥

大黃 貝母 去心 草龍膽 黃藥子

知母 敗鼓皮心 醋炙各二錢五分 犀角 鱗末

蓬朮 芒硝 各一錢半 硃砂 二錢 飛

右為末煉蜜丸梧子大硃砂為衣每服二十九
空心食前溫酒下如膈熱食後服之三月必平
復其餘癆證只數服便愈重病不過一料

柴前梅連散 治骨蒸癆熱三服而除

柴胡 前胡 烏梅 胡黃連 等分

右剉每服三錢入猪膽一枚猪春髓一條韭白
童便水煎服

青蒿膏 治勞瘵

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減

二斗去蒿再煎至一升入猪膽廿七箇或又加辰砂核

柳末熬數沸甘草末收之用湯調服極妙

補天丸 治癆瘵見虛損門 節齋化痰丸見咳嗽門

○第三 蟲

濕熱生蟲丹谿謂臟腑虛則侵蝕又謂腹內熱腸胃
虛蟲行求食上唇有瘡曰惑蟲食其臟下唇有瘡曰
狐蟲食其肛

○蠶蝕陰疔脉虛小者生緊急者死尺脉沉滑者
寸白蟲

○上半月蟲頭向上易治下半月向下難治先以肉汁或糖蜜引蟲頭向上然後用藥

附方

棟樹根湯

治蟲

棟樹根

去心取皮一兩洗淨用東南者向西

北及露根者殺入勿用

右剉一貼水一碗入沙糖少許煎

至半碗服之又方二陳湯加棟樹根煎服亦妙

寶鑑化蟲丸

治蟲

鶴虱

去土 檳榔

苦棟根

去心 胡粉

炒各一兩

白礬

枯者二錢五分

右為末米糊丸如麻子大一歲兒服五丸溫漿

水入香油一二點打勻溫米飲亦得不拘時候

其蟲細小者皆化為水大者自下

○第三二

惡寒

冊谿謂惡寒非寒明是熱證亦有久服熱藥而得者

河間謂火極似水陽亢陰微熱極在裏甚而外反覺

自冷實非寒也有用熱藥而少愈者以其辛能發散

鬱結暫開耳殊不知以火濟火則病本日深而寒愈

逆矣

○大率有痰有火有氣虛有血虛有外感

主方

○痰者三陳湯加芩連俱酒炒之類或有可吐者

○火者黃連解毒湯之類甚者加從治藥乾姜或
生姜汁之類亦有可升散者

○氣虛者四君子湯加參芪之類甚者少加附子

○血虛者四物湯加黃柏知母俱酒炒之類甚者加

黃芩梔子俱酒炒

○外感者發散之十神湯或參蘇飲之類

○久病者惡寒可解鬱香附蒼朮撫芎山梔之類

○第三三 惡熱

丹谿謂惡熱非熱明是虛證經曰陰虛則發熱陽在
外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節
陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱
也當作陰虛治之

○節齋補陰丸可用見虛損門

○第三四 眩暈

眩暈者目花黑而頭旋轉也丹谿謂痰在上火在下
火炎上而動其痰也經曰諸風掉眩皆屬肝木蓋木

中有火得風則焰火中有痰得風則運所以旋轉也

主方

陳皮 一錢 甘草 五分 白茯苓 一錢 半夏 湯泡一錢

黃芩 一錢 酒炒 黃連 一錢 酒炒 蒼朮 八分 天麻 一錢

白朮 一錢 羌活 三分 川芎 六分

○左手脉数熱多者倍黃連加山梔仁酒炒八分脉朮

渣有死血加菔仁去皮尖一錢紅花少許

○右手脉實有痰積加南星湯泡八分香附鹽水炒八分

○久病之人氣血虛而脉大者痰濁不降倍白朮

加枳實炒六分

○去血過多而眩運者去芩連蒼朮羌活加大麥

芽炒一錢枳實炒一錢倍白朮

○傷飲食作運者去芩連加山查肉一錢半大麥芽

炒枳殼一錢 炒枳殼八分 砂仁八分 ○亦有可吐者宜探

吐之

○眩運不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下

附方

荊黃湯 治頭目眩運 大黃

荆芥穗

防風

各等分

右剉水煎服

芎朮湯

治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎

半夏

湯泡

白朮

各一兩

甘草

炙五錢

右剉每服四錢姜七片水一鍾煎半鍾溫服

○第三五

頭痛

附眉稜骨痛

夫頭痛之病丹谿專主於痰而痛甚者屬火多東垣論治頭痛甚詳謂太陽頭痛惡風寒脉浮緊少陽頭痛往來寒熱脉弦細陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實太陰頭痛體重有痰或腹痛脉沉緩少陰頭痛足寒氣逆脉沉細厥陰頭痛或吐痰沫厥冷脉浮緩然亦有真頭痛者手足寒至節不治又有勞役氣虛頭痛似傷寒發熱汗出兩大陽作痛此相火自下衝上又有血虛午後發熱而頭痛者又有偏頭風在右屬痰熱在左屬風與血虛又有少陽偏頭痛者則大便閉大率肥人頭痛多屬濕痰瘦人頭痛是熱愚謂頭痛多感於風蓋頭面為諸陽之會故經云東風生於春諸陽屬火風火相搏無風則不能作痛也

主方

○太陽頭痛參蘇飲十神湯主之

○少陽頭痛小柴胡湯加川芎乾葛之類

○陽明頭痛升麻葛根湯加石膏白芷之類

○太陰頭痛二陳湯加南星蒼朮川芎之類

○少陰頭痛五積散加細辛附子之類

○厥陰頭痛吳茱萸湯主之

○氣虛頭痛四君子湯加黃芪少加川芎蔓荊子

細辛之類

○血虛頭痛四物湯倍川芎加黃栢知母少加蔓

荊子羌滑之類

○偏頭風在右頭痛二陳湯加酒炒芩連川芎白

芷蔓荊子之類

○偏頭風在左頭痛二陳湯加川歸川芎芍藥白

芷羌滑荊芥防風芩連之類

○少陽偏頭痛大柴胡湯加川芎之類

○肥人頭痛二陳湯加蒼朮南星川芎羌滑之類

○瘦人頭痛四物合二陳湯去地黃加酒黃栢酒

黃芩天麻蔓荊子之類

○諸經氣滯亦能頭痛

○頭痛須用川芎如不應各加引經藥

○空青膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治

○壯實人氣實有痰或頭重或運用大黃三次酒

炒為末茶調三錢服立効

附方

空青膏 治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕

熱頭上壅損及腦痛不止

川芎 五錢 羌胡 七錢 黃連 炒 防風 去芦

羌活 已上各 甘草 二兩 細梃子 黃芩 三兩對半 酒製手炒 右為末服三錢煎

蓋內入茶少許調如膏臨臥抹口中內少用白湯送下如苦痛

每服加細辛二分寒陰脈緩有痰各痰厥頭痛減羌活防風

漢林川芎其草加半量煨高五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活

防風川芎一半加羌胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只服白

虎湯加好吳白芷

一粒金

薑搗 以猪膽汁拌勻復入 青黛 玄胡索 白芷 川芎 各一

右為末 無根水為丸每用一丸無根水化開搗鼻內以銅錢

二更交鼓定出涎

白木半夏天麻湯

治痰厥頭痛

黃蘗二分 乾姜三分 澤瀉 白茯苓 天麻 黃芪 人參 蒼木各

神曲水 白木各一錢 茯苓子 麩半 夏 橘皮各一錢

右剉每服五錢水煎熱服食前一服而愈此頭痛甚其謂之足

太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻

不能除黃芪其溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參其溫瀉火補中

益氣木俱苦其溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便厚溫桔

史蒼溫益氣調中升陽神曲消食瀉胃中滯氣麥蘗子

寬中助胃氣乾姜辛熱以燥中寒黃柏大苦寒酒洗以療冬

天少火在泉發燥也

天香散 治遠年頭風甚者二服除根

香白芷 南星 川鶴 半夏 右為末夏年無炭酒調送下婦

人加其草

羌活附子湯 治寒犯腦痛及齒痛名曰腦風

麻黃去 黑附子 防風 白芷 白僵蚕 黃柏各二 羌活

蒼木各五 升麻二 黃芪分 其草分 佛耳草三分無寒

右剉水煎

玉壺丸 治風濕頭痛亦治痰患

南星半夏 天麻 白麩 右末酒調付下即泉湯送下奇

安神湯 治頭痛頭眩眼黑

其單 四錢半 防風 二錢 羌活 二錢 升麻 生地 酒製 每黃柏 俱酒製

蔓荊子 五兩 分 再煎至一盞去粗臨臥熱服

選奇湯 治眉角痛不可忍大有神効

羌活 防風 羌活 二錢 羌活 二錢 升麻 生地 酒製 每黃柏 俱酒製


右到每服三錢水一盞煎一盞食後时时服之

新刊醫方約說卷之上

代山戎 林夜 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎 治山戎

二丹 白鳳 桂枝 芍藥 甘草 熟地 白朮 茯苓 澤瀉 丹皮 黃芩 知母 貝母 杏仁 薏苡仁 滑石 石膏 芒硝 大黃 枳實 厚朴 木香 砂仁 豆蔻 胡椒 丁香 肉桂 附子 干姜 白朮 茯苓 澤瀉 丹皮 黃芩 知母 貝母 杏仁 薏苡仁 滑石 石膏 芒硝 大黃 枳實 厚朴 木香 砂仁 豆蔻 胡椒 丁香 肉桂 附子 干姜

海狗 鹿茸 虎骨 狗寶 熊膽 猴棗 蛇膽 蜈蚣 蟻卵 蜂房 鼠屎 鴉膽 雞內金 狗寶 熊膽 猴棗 蛇膽 蜈蚣 蟻卵 蜂房 鼠屎 鴉膽 雞內金



踐土 五安 刑丘

履現執功中自失而知伯之於功之也
安是傳中言出只四待三改做首末至我捷

踐土 滅甲氏

每記伯國之執功而皆多其內也
或去城下同

踐土 晉文執

執根分功中於伯之執執內之功也
或去城下同

踐土 晉文執 甲文 執亦捷
或去城下同



重本逐異之功看而重失体多者
只是躬來誘示其真來執也傳末
以世事臣之也最明白

伐出我 執捷

書伯之有因勤兵於遠而說之也
有因於功于內而柳之也

執捷 踐土 五安 重本股以下二此作比
加刑丘同

履現執捷現之也執而自失見之

執捷 踐土

記伯之根分有於功而味乎礼也
有執功而合乎礼也

