

女  
科  
切  
要

上

中國醫學大成第九集

婦科類

女科切要上

上海大東書局印行

# 女科切要提要

清、吳本立纂輯。本立字道源。海虞人。是書乾隆癸巳刻成。先生究心岐黃術。歷數十年上採前賢之著述。旁錄時人之議論。窮源竟委。鉅細無遺。先成痢證匯參一書。風行海內。已採入本集第六類中。復念女病難醫。將平時所輯前哲要語。分門別類。彙集一書。其第一卷。列調經。第二卷。列血崩、便濁、白溼、淋帶、血膨、血癬、經準不孕。卷三。列廣嗣、受孕、脈法、十月胎形、論妊娠調護法、小產、正產、安胎。卷四。列妊娠諸病。卷五。列臨產諸病。卷六、七、八。皆列產後諸病。及絕產不育、婦女雜症等類。皆本實驗。方全法備。簡明切要。苟能將此書熟讀揣摩。然後臨證治病。不難著手成春也。

# 自序

古云。寧醫十男子。莫醫一婦人。誠以女病倍於男子。而更多不可名言之隱也。其居富貴之地者。更面藏帳幙。臂蓋綺紈。醫者望聞既難。切脈亦無從仔細。故女科益難從事焉。余幼殫精舉業。亦究心岐黃。緣歷試不遇。遂以方藥應世。數十年來。窮源竟委。上採前賢之著述。旁錄時人之議論。成痼症匯參一書。旣爲四方君子稱評。勸授梓人。茲復念女病難醫。卽平日所輯前哲要語。分門別類。彙爲一帙。顏曰女科切要。質諸二三同志。具云語簡而明。此書一出。將臨症者。俱可唾手取驗。而至難醫者。從此不難。亟當傳世。以爲普濟之資。因不揣固陋。勉付剞劂云。時乾隆癸巳小春梅溪吳道源題年七十有五。

# 女科切要目錄

## 卷一

調經門	一
經水先期而來	七
經水過期而來	八
經行腹痛	一〇
血風	一一
白溼	一六
便濁	一
血崩	一
白溼	九

## 卷二

淋證	一
白帶	一三
血膨	一五
血癬	一六
經准不孕	一八
熱入血室	二〇
廣嗣論	一
胎前門	一
受妊娠法	七
男女脈法	七
一	一

女科切要 目錄

二

雙胎脈法.....

五

死胎脈法.....

六

鬼胎脈法.....

七

逐月胎形論.....

七

妊娠調護法.....

一三

小產.....

一六

安胎.....

一八

妊娠中風.....

一

妊娠傷寒.....

二

妊娠跌蹼.....

三

妊娠心腹痛.....

四

脇肋痛.....

五

卷五

子腫.....

五

胎漏.....

六

胎前雜症.....

七

難產.....

一

臨產.....

三

兒捧母心.....

五

胞衣不下.....

六

交骨不開.....

六

難產縮胎法.....

九

婁氏十產論.....

一

卷六

產後門	一
產後血暈	五
敗血衝心	五
產後鬱冒	六
產後如狂喘滿	六
血虛發熱	九
氣血大損病	一〇
產後脈法	一
產後蓐勞	一
產後胞衣不下	一
努力傷胎	四
胞衣先破	四

產後虛渴	一
產後浮腫	二
產後發熱	三
初產作乳	三
產後風癩	四
產後怔忡	五
產後中風	六
血暈氣脫	七
產後陰虛	八
產後瘧疾	九
產後傷風	一〇
產後泄瀉	一〇
產後心腹痛	一
產後咳嗽	二

## 卷七

女科切要 目錄

四

產後腳氣	一
產後遍身疼痛	一
產後氣喘	一
產後呃忒	一
產後嘔吐	一
產後吞酸	一
產後不語	一
產後頭痛	一
產後胞損	一
產後小便不利	二
產後衄血	二
產後崩淋帶下	二
產後陰脫	三
產後玉門腫痛	四
產後脇痛	四
產後陰癢	五
產後下血成片	五
產後尿胞墜下	六
絕產不育	六
產婦乳裂	七
產後陰戶翻出	八
附婦人雜病諸方	八
附婦人修飾	一四

卷八

產後無乳	一
------	---

# 女科切要

清 海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

## 卷一

### 調經門

經閉爲女人病者。蓋因女子以血爲主也。使其經脈調和。往來有準。有以應水道潮汐之期。舊血既盡。新血復生。有以合造化盈虧之數。則周身百脈無不融液而和暢。夫何病之有。設或閉焉。則新血滯而不流。舊血凝而日積。諸病叢生。凡血癥血風。與夫熱入血室之證。多自此而始矣。然要其經閉之由。必有所因。或月事適至之時。因渴飲水。并食生冷之物。及坐冷水中洗浴。寒氣內入。血即凝滯。遂令經閉。又或因墮胎多產而傷其血。或因久患潮熱而銷其血。或因久發盜汗而耗其血。或脾胃不和。飲食減少。而不能生血。凡此類。皆能令人經閉。其肥白婦人。經閉

而不通者。必是濕痰與脂膜壅塞之故也。宜以枳實爲君。佐以蒼朮、半夏、香附、烏藥、厚朴、牛膝、桃仁之類。則濕痰去而脂膜開。其經自通矣。黑瘦之婦經閉者。血枯氣滯也。治宜補血理氣。君以歸身、白芍、人參、廣皮、香附之類。或因墮胎多產而傷其血。或久患潮熱而銷其血者。不可用行血之劑。宜以四物爲主。佐以木香、香附、厚朴、甘草之類。兼調其氣。久而自通矣。有因感暴怒而經閉者。治宜開鬱活血。君以鬱金。佐以官桂、香附、木香、桃仁、牛膝之類。煮酒煎服。或因食生冷而經閉者。君以官桂。佐以乾薑、木香、厚朴、香附、紅花、歸尾之類。因坐冷水而經閉者。君以附子。佐以官桂、木香、山楂、桃仁、當歸、乾薑、川芎之類。室女及笄而天癸不至。而飲食如常者。只是氣血未足。人間往往有之。必服藥療其雜病。時至經自流通。亦有年長大而經竟不來者。仍能受孕。名曰暗經。每月至期必作腰痛。此前人之所未發也。有至期而經水不行。上逆而嘔血者。名曰倒經。治宜當歸大黃湯。有室女經水既通。而至期復又不來者。必須視其有證無證。驗其似疾非疾。若面色不改。飲食如常。身無內熱。名曰歇經。非疾也。乃血不足也。若面黃肌瘦。內熱。是爲童癆。診其肝脈。弦出寸口上魚際。非藥所能治也。急與之成婚。則陰陽和。自然經行而疾去矣。

否則十死八九。亦有氣血不足者。必面黃肌瘦。常帶微熱。雖歇幾年。服藥亦可通之。但不可用破血剛猛之藥。如蟲蟲、山甲、三稜、蓬朮之類。只宜用補血、生血之藥。以四物歸脾加減可也。至寡婦尼姑經閉。乃因有懷不遂。法當開鬱而理其經爲妥。

大凡婦人經閉。氣不調和。因而血不流轉故也。故調經須以理氣爲先。亦有血海虛寒。小腹冷痛者是。宜服大溫經湯。有氣血虛損者。外發潮熱。頭痛昏重。肢體倦怠。五心煩熱。心忡面赤。口燥神焦。腰背酸疼。盜汗出者是也。宜服丹皮散。有氣血凝滯。腹中結塊。腰腿重疼者是也。宜服通經六合湯。或紅花當歸散。以逐其瘀。通其經絡也。亦有胃氣不調者。貌本壯實。飲食漸減者是也。蓋胃氣不調。亦能令人經水不通。當以異功散。逍遙散之類間服。一以消食健脾。使飲食加而元氣復。一以和其氣血。使氣血調而經自行矣。凡婦人女子骨蒸潮熱痰嗽。經水不行。診其脈七八至。視其骨肉消瘦。必死之症。不必用藥。大抵男子與婦人同。

### 四物湯

熟地 當歸 白芍 川芎

水煎服。

歸脾湯

大溫經湯

人黃灸  
薑草  
錢半五分

白當歸  
龍眼肉  
土炒

丹皮散牛丹膝皮陳川元胡芎皮茸

赤肉芍桂人參熟地附吳茱萸

三歸稜尾甘草茴茴沉香

蓬元朮胡白芍芩芍朮

棗仁志一錢

木香神

水煎服。

通經六合湯

熟地

半夏

白朮

水煎服。

紅花當歸散

當歸

川芎

水煎服。

如聖散 治崩漏不止。

棕灰

水煎服。

逍遙散 解鬱調經。

白芍 茯苓

小茴花

知母 茶芍

薑灰

桃鬱金仁

益母歸紅

烏梅錢各五

元胡

貝母川芎

當歸  
甘草  
山梔

白芍  
柴胡

茯苓  
薄荷

白朮  
丹皮

化氣丸

大凡女子。稟性偏執。若欲治病。先戒性急。或因怒氣。或因憂鬱。憂鬱生痰。怒氣傷血。或爲疼痛。或爲淋疾。淋有五種。變爲五色。若欲無病。經水要正。月應乎天。水應乎地。一月一來。如期潮信。懷孕安胎。坐草理順。經或不准。前後當訊。參前屬熱。落後屬寒。熱當清涼。寒宜助溫。血熱血虛。或清或補。有孕得疾。先保其胎。次調其疾。宜無後災。延及產後。疇能救哉。新產之後。醫法有餘。先去惡露。後當補虛。補虛太早。穢不能除。惡心氣喘。瀉利汗珠。此爲四惡。扁鵲難醫。症見一惡。病亦難起。小心醫治。免死而已。十月懷胎。一朝坐草。瓜熟蒂落。慎勿起早。無知婦女。昏愚嫗老。非理催逼。反成煩惱。叮嚀戒爾。守此正道。孕婦之脈。堅強最妙。細而微濡。命恐難保。新產之脈。沉遲細小。倘遇洪大。其症必倒。敗血衝心。語言亂道。或笑或歌。佛名神號。痰犯心包。同是狀貌。敗血攻心。始終煩惱。龍齒參歸。十神湯效。痰犯心包。昏而

有覺重加芩連導痰湯較或夾疾病先慎風寒灸燙油膩萬勿加餐病久危困先喻其難醫爲仁術細審病端子懸子冒子煩子癟治各有條不容遺漏已經懷孕月水仍來血有餘也名曰胎漏生子不實腹中有塊血氣之鬱溫血益氣削除其積元氣若虛且從姑息虛弱之證自汗骨蒸參耆胡連治之量情神仙妙術起死回生悉心體之用無不靈

### 經水先期而來

室女婦人經先期而來其故有二有熱甚者有氣血多而傷血海者血熱者腹多不痛乃火也身必熱其色必紫其脈必洪宜涼血地黃湯虛熱者逍遙散或補中益氣加黃柏知母或四物加陳皮香附黃柏知母醋糊丸服如腹中冷痛禁用寒涼而用五積散若瀉者先理脾胃咳嗽者逍遙散加川貝若氣血多而傷血海者其腹必痛以補血行氣爲主亦慎用涼藥宜歸附丸及霍香正氣散若婦人四十外月經或二三日一至者日久必成淋症王肯堂曰月事先期而來血熱必帶紫色或先或後血色淡而稠粘者痰也將來而先腰腹痛者血海空虛而氣不收

攝也。或止或來無定期者。因氣不調。故血亦隨之爲行止也。或一月兩至。或數日一至。乃氣虛而血熱也。或經年之後。累數日而不能止者。乃血海脫滑。兼有火以動之也。既止之後。隔兩三日而復見微血者。以舊血未盡。爲新生之血所催。故不能容而復出也。明理者觀之。即可以施治矣。

### 經水過期而來

凡婦人女子。月事過期而來。其說有三。有血虛者。有血寒者。有澀滯者。血虛腹不痛。身微熱。然亦有腹痛者。乃空痛也。宜服生氣補血之藥。八物湯加香附。血寒者。歸附丸。以脈辨之。若浮大而無力。微濡芤細。皆虛也。沉遲弦緊。皆寒也。王肯堂云。經水過期而至。血虛也。其色必淡。治宜補血爲主。以四物加香附、艾葉、五味、麥冬之類。倍加當歸、熟地。血淡而稠粘者。以化痰爲主。二陳湯加香附、生薑、砂仁。如經水將來而腰腹痛者。以行氣爲主。宜君以木香佐以枳殼、香附。同四物煎服。如經水止而復腰腹痛者。以補血爲主。君以熟地佐以歸芍、參朮、芎、芩、香附、陳皮、甘草之類。或一月兩至。數日一至者。以補血涼血爲主。宜八物湯加黃連、山梔、龜板炒。

蒲黃之類。或止或來無定期者。以調氣爲主。君以香附。佐以陳皮、烏藥、砂仁、艾葉之類。與四物同煎服。經數日不止者。以涼血爲主。君以炒黑山梔。佐以炒蒲黃、地榆炭、牡蠣、側柏。香附之類。經正後。過二三四日復見微血者。以四物湯爲主。加香附、陳皮、甘草之類煎服。然此不足爲病。卽不服藥亦無害也。

八物湯

熟地  
白芍  
五積散  
白芷  
官桂

人參

川芎  
廣皮

當歸  
半夏

陳皮  
桔梗  
黃芩

厚朴  
川芎  
甘草

當歸  
白芍

水煎服。

二陳湯

半夏

茯苓

陳皮

甘草

水煎服。

醋煎散

赤芍

三稜

烏梅

甘草

加醋半杯水煎。血多加當歸、紅花、青皮。

蓬朮

官桂

艾煎丸

白芍

當歸

熟地

艾葉

石菖蒲

川芎

香附

各等分爲末。醋糊丸。

人參

歸附丸  
當歸  
附子

石菖蒲

逍遙散  
見調經

經行腹痛

婦人經水適行。小腹作痛者。氣血澀滯也。用四烏湯。經行而腹痛者。或屬虛寒。然氣亦能作痛。恐有血瘀氣滯。不必驟補。先用四物加陳皮、香附。次用八物湯加香附。如瀉者。先止其瀉。而痛自止矣。有每遇經行。輒頭痛心悶。飲食減少。肌膚不潤澤者。宜加減吳茱萸湯。亦有衝任虛衰。小腹有寒。月水過期。不能受孕者。大溫經湯主之。有經水過而作痛者。血虛有寒也。法當溫經養血。宜四物加桃仁、香附、肉桂。有經行著氣。心腹腰脇疼痛者。血瘀氣滯也。當順氣消瘀。青皮、歸芍、桃仁、紅花、川芎、烏藥。水煎服。有經水過期而來作痛者。血虛有熱也。宜生血清熱。四物加桃仁、香附、丹皮、甘草、元胡。有經水行後而作痛者。氣血虛而空痛也。法當調養氣血。宜八珍湯加薑棗。有經水過多。久不止而腹痛者。乃脾經血虛也。治宜補血健脾。四物加白朮、茯苓、木香、厚朴、香附、陳皮、乾薑、甘草。水煎。

## 血風

血風者。經水逆行。上攻於腦。頭目旋悶。不省人事。甚至滿頭滿面。皆發赤斑者。此因經水適臨。感冒風邪所致。蓋風善行而數變。其勢易上而難下。經水爲風邪所

激以故倒流而上行也。血風乃血證中之最急者。宜以四物爲主。加山梔、桃仁、紅花、荆芥、防風、天麻、薄荷、白朮之類。其所以用白朮者。以其能去面上遊風。及利腰臍間血故也。

四烏湯

烏藥  
赤芍  
吳萸  
益母

吳茱萸湯

吳萸  
熟地

八珍湯

熟地  
人參

白芍  
白朮

當歸  
紅花  
香附

三稜  
桃仁

大棗

文朮  
官桂  
老薑

川芎  
茯苓

當歸  
甘草

大溫經湯  
見調  
八物湯  
見過期經水

四物湯

熟地

白芍

當歸

川芎

女科切要卷一 血風

# 女科切要

清

海虞

吳道源本立纂輯

鄞縣

曹赤電炳章圈點

## 卷二

### 血崩

崩淋之病。相似而實不同。崩者如土之崩。其勢大下而不禁。乃血熱而兼氣虛。不能收攝也。淋者如水淋漓。難澀而不通快。乃內鬱熱而氣亦滯也。然崩則純血。淋則有赤白沙石之異。赤者屬血。白者屬氣。沙石者氣血之尤濁者也。治此病者。惟調其氣血。清其內熱而已。

鄭文康曰。婦人暴崩下血。此因腎水陰虛。不鎮制胞絡相火。故血走而崩也。涼血地黃湯主之。然此症多起於內傷。若小腹不痛。只宜此藥。或入物湯加芩連。若痛者。先宜大劑四物湯歸身白芍川芎倍之。加醋製香附。若用補藥。宜補宮湯加芩

連。又血崩證有二說。瘀血也。空痛也。瘀血者。體必作寒熱。空痛者。不作寒熱也。瘀血則當去。空痛則當補。亦有血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。血氣成塊而得之。宜神仙聚寶丹。又有血氣損而得之者。凝聚成塊。七癥八瘕。上則氣逆嘔吐。下則瀉痢五血。宜內炙散。血崩之人。如服煎藥不效者。火也。三黃湯主之。去大黃。加黃柏。如婦人血崩不止。乃衝任虛弱。藏府虛冷所致也。亦有小腹急痛。兼下赤白帶。宜加減吳萸湯。或艾煎丸。若去血過多。氣血不足。四肢倦怠。宜增損四物湯。蓋婦人血漏血脫。則宜固氣。此古聖之心法也。先補胃氣。以助生發之源。諸甘藥爲之先務。益胃升陽湯是也。此藥人皆認以爲補氣。殊不知甘能生血。此亦陽生陰長之理也。又人身以穀爲寶。藥料須視其食之多寡而輕重之。毋令藥氣勝於穀氣。乃妙耳。如腹痛。加烏藥三分。官桂少許。口渴者。加葛根三分。如婦人年老血崩。八物湯加芩連。此一時急救之藥也。必先顧其胃氣爲妙。如血崩服煎劑不止。易用散子之藥。如棕灰鍋底墨。炒黑山梔。槐花。側柏。人參。黃耆。甘草之類爲末。童便送下。若以爲丸更妙。或用小薊汁。藕汁調服。經曰。帶下血崩。脈多浮動虛遲者。生寶數者重訣曰。生地合蒲黃。黃芩黃柏涼。人參兼五味。解毒細煎湯。水煮空心服。崩中

帶下良。暴者屬血熱。宜養血清火。治宜溫清散。血崩月久屬虛寒。又宜溫補。宜益母湯。其寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。此名曰革。

溫清散

歸身

熟地

白芍

黃連

山梔炒

黃柏鹽炒各一錢

水煎服。

芩

川芎

香附

阿膠

益母湯涼血補血。

熟地

陳皮

蒲黃

甘草

黃芩錢一錢

水煎空心服。

五灰散涼血止血。

蓮房灰

黃絹灰

血餘

百草霜

棕灰 白芨

爲末。蜜丸。米飲下。

張三錫曰。崩有五種。青崩如藍色。黃崩如爛瓜。赤崩如絳澤。白崩如涕液。黑崩如汙血。崩漏不止。四物加炒白朮、參耆、香附、炒地榆、炒蒲黃、棕灰、升麻、血餘。水煎。頭昏項強者。四物湯加柴胡、防風。虛冷清瀉者。四物湯加官桂、附子、薑棗。水煎。胃虛嘔吐者。四物加人參。白朮虛煩不眠者。四物加人參、淡竹葉。發寒熱者。四物加柴胡。崩中漏下五色者。用赤石脂禹餘糧湯。

槐芩散 治崩中不止。

炒槐米三兩 黃芩二兩

炒研爲末。每服五錢。霹靂酒調服。

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂 煅

禹餘糧 煅

牡蠣

蠣殼

烏鵲骨 去甲

伏龍肝

上肉桂 各等

爲細末。酒調服。

鳩柴散 專治婦女血崩。

地栗每歲用一箇燒灰存性研服。溫酒送下。

補宮湯 治血崩。身發寒熱。

熟地 艾葉 川芎 白芍

水煎服。

又方 亦名補陽湯 治崩淋。衝任虛損。

赤石脂 地榆 石菖蒲

甘草

蒲黃 炒 熟地

水煎。冲熱酒半盃服。

益胃升陽湯

人參 陳皮 黃芩 白朮

歸身 阿膠

小白芍 归身

升麻耆 黃耆

川艾 莪 葉 地榆

柴當 胡歸

甘草

神麆

薑

棗

水煎服。

三黃湯

黃芩

黃連

黃柏  
鹽水炒

百補湯 治血淋。

大熟地

當歸

川芎

白芍

新會皮

地榆  
炭炒

水煎服。

便濁

婦人便濁。或赤如血。或白如泔。不痛者是。痛則淋矣。屬濕熱。分虛實而治。肥白之脈沉滑。胸膈不利。小便白濁。屬濕痰。宜燥中之濕。如面色不澤。身倦無力者。屬氣虛。宜補氣。黑瘦之婦。脈洪數。五心煩熱。頰赤唇乾。小便赤濁。或白。屬相火。宜滋陰。肝脈弦數有力。火盛者。龍膽瀉肝湯。治法分滲清熱。燥濕健脾。滋陰降火。實下。

固陽。

濁氣下流爲赤白濁。赤者升柴、二朮、二陳最妙。白者黃柏、當歸、知母、白芍、丹溪謂二朮、二陳能使大便潤而小便長。如兩尺脈沉弱。白濁頻數。凝白如油。光彩不定。漩腳澄下。凝如膏糊。古方悉指爲陽虛。亦有虛而挾相火者。不可不辨。宜草薢分清飲。專主陽虛白濁。內經曰。中氣不足。小便爲之色變。必先補氣升舉之。而後分其臟府氣血。赤白虛實治之。有邪熱者瀉熱。虛者補虛。設使腎氣虛甚。或火熱亢極者。則不宜純用涼藥。必反佐治之。要在權衡輕重而已。赤者熱傷血。宜滋陰。白者濕熱傷氣。又宜燥濕。白濁不止。宜服珍珠粉丸。用之屢驗。氣虛四君子湯。血虛四物湯。氣血兩虛。八珍湯下珍珠粉丸。

珍珠粉丸

樗

皮炒黃

黃

柏炒

鹽水

青

黛

蛤

粉

滑

石

珍

珠

等分爲末。神龜糊丸。無火者加炮薑。方用樗皮、黃柏。能燥濕清熱。青黛能解鬱熱。蛤粉鹹寒引下。滑石利竅。珍珠寧神定志。

女科切要 卷二 便濁

人

如上盛下虛。心火上炎。口苦燥渴。五心煩熱。小便赤澀。或下白濁。宜清心蓮子飲。

清心蓮子飲

石蓮子即建蓮中擇有黑殼者

人參

赤苓

麥冬

黃耆

地骨皮

黃芩

車前子

生甘草

白濁經年不愈者。形神衰瘦。心神不安。當作心虛治。珍珠粉丸。合定志丸間服。

定志丸

遠志

石菖蒲兩各一

人參

白茯苓兩各三

共爲末。蜜丸。硃砂爲衣。每服七丸。空心米湯下。

龍膽瀉肝湯

膽草

黃芩

山梔

澤瀉

木通

車前

當歸

生地

柴胡

甘草

草薢分清飲

智仁

茯苓

草薢

石菖蒲

烏藥等分

加鹽少許。

分清飲

芡實

茯苓

黃蠟

蜜丸。如桐子大。每服百丸。淡鹽湯下。

二朮二陳湯

白朮

蒼朮

廣皮

茯苓

甘草

升麻

水煎服。

白溼

經曰。思慮無窮。所願不遂。意溼妄想。入房不能。帶脈不引。則爲白溼。夫腎臟以慳用事。志意內治。則精全而濶。若眠思夢想。欲溼不能。則溼泆不守。輒隨溲便而下。

也。尼姑寡婦。最多此症。

白溼責於陽虛。當益火之源。鹿茸、肉蓯蓉、人參之類。治宜內補丸。要在臨症斟酌。有火無火而用之。庶無誤矣。

內補丸

鹿 茸

絲 子

沙 蕤 藜

紫苑 草

黃 耆

肉 桂

桑 蠶 藜

肉 蓯 蓉

附 子  
製

茯 神

白 蕤 藜

右爲末蜜丸。如菉豆大。每服二十九。食遠酒服。有火者忌用。宜服清心蓮子飲。  
獨見便

婦人之白帶、白淋、白溼、白濁。其形相似。病實不同。有虛、實、寒、濕、鬱、火。不可混治。前賢議論。通作濕熱。不無偏僻。細攷內經治法。不一。白淋者。淋瀝而不止也。多起於鬱。大抵虛寒者居多。小腹不痛。亦有去多空痛者。俱用養榮湯加香附。補宮湯亦可。若用熱劑。艾煎丸加白芍。痛者。四烏湯加白芍。歸身。亦有白淋。久則漸變黃色者。此將成血淋也。艾煎丸、歸附丸皆可服。又有變爲沙淋者。溺器中下沉白積一

層如沙。小便出時澀痛者是也。白淋赤淋而無沙者須分其氣血而治之。白帶者婦人之常病。俗云十婦九帶。甚者腰痛如折。頭暈眼花。腰間重滯不斷。此是氣虛。治宜內補湯加續斷。或養榮湯。再以車前草陰乾煅灰。頻頻服之。其效甚捷。屢驗。若五色帶下。紫金丸主之。白溼乃思想無窮。有欲不遂。一時放白。寡婦尼姑。此疾居多。乃鬱火也。治宜開鬱降火。越鞠丸加鬱金、膽草。白濁甚者膀胱積熱。渾濁如膿。不治必生癰。宜服蓮子清心飲。

蓮子清心飲

見白濁

艾煎丸

見經水過期

四烏湯

見血風

內補丸

見白溼

補宮湯

見血崩

越鞠丸

川芎附

山梔

半夏

神麆

鬱金

膽草

白朮

人參養榮湯

治脾肺氣虛。榮血不足。

人參

當歸

熟地

黃耆

茯苓

遠志

白芍

五味

廣皮

肉桂

甘草

加薑棗水煎服。

淋證

經曰。白者屬氣。赤者屬血。但有氣血之分。而無寒熱之辨。凡治此者。皆云濕熱。然乎否乎。今之治白淋者。不分寒熱。多用芩連。亦一偏之見耳。婦人之疾。寒多熱少。故用養榮湯治白淋而效。以其有桂也。艾煎丸服一二料而卽愈。亦此義也。總在臨證時審白而治之。至赤淋。則爲熱證。不服熱藥。內補艾煎禁用。宜服八味加芩連。而香附尤不可少。此女科之聖藥也。張景岳論崩淋之證甚悉。已載在血崩一條。其云治此病者。惟調其氣血。清其內熱。最允。又血淋者。月水三五日一至。積數月而止者是也。若腹痛。四烏湯恐有瘀血。未可止也。去多不痛。善飲食者。八物湯加芩連。如飲食少進。用內補湯去參可也。或補中益氣。加黃柏。凡治血淋。審其小腹痛與不痛。脾胃之實與不實。如小腹不痛。脾胃實也。可用八物湯加芩連。脾胃

不實者禁用。宜補宮湯。大抵淋證先以治脾爲主。

養榮湯

見白

八物湯

見經水過期

四烏湯

見血風

補中益氣湯

黃耆歸身

白朮升麻

人參柴胡

陳皮甘草

白帶

婦人帶下一證。從腰間帶脈而來。故名曰帶。雖有赤白二色。終屬腎虛。其病與淋相似。然淋之所下者多散而薄。必覺腥氣臭穢。帶之所下者多滑。稠粘無腥穢之氣。以此爲辨耳。保命集曰。赤者熱入小腸。白者熱入大腸。原其本。皆濕熱結於脈。故津液湧溢。是爲赤白帶下。本不病結。緣五經脈虛結熱。屈滯於帶。故臍下痛。陰中綿綿而下也。內經云。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下癥瘕。王註云。任脈自胞上過。帶脈貫於臍上。故男子內結七疝。女子帶下崩中。帶脈起於季脇、章門。似

束帶狀。今濕熱冤結不散。故爲病也。經曰。脾傳於腎。名曰疝瘕。小腸冤結而痛出白。名曰蠭。所以爲帶下冤結也。冤屈也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之。後服苦練丸。再以大元胡索散調之。熱去濕除。病自愈矣。趙仁安問用升提之法。更以二陳加白朮、蒼朮。健脾燥濕。亦是一法。診婦人漏下赤白。日去血數升。其脈急疾者死。遲者生。如赤白帶不止。脈小虛滑者死。大緊實數者死。羅先生所用十棗湯、神祐丸、玉燭散之類。虛者不可峻攻。實者亦當酌用。血虛加減四物。氣虛參朮。陳皮補之。甚者固腸丸。相火動者。加黃柏滑者。加龍骨、赤石脂。滯者。加葵花。性燥者。加黃連。冬月少加桂附。惟在臨證時隨機應變。丹溪治赤白帶下。與夢遺同法。肥人有帶。多是濕痰。用海石二陳。加南星、黃柏、青黛、川芎。瘦人帶下。俱是鬱熱。宜香附、砂仁、黃柏、青黛。如結痰白帶。以小胃丹半飢半飽時。津液下數丸。候鬱積行。即服補藥調理。

苦練丸

苦練子酌碎

茴 香炒

當 歸

等分爲末。酒糊丸。每服三十丸。空心酒下。如腰痛。四物羌活防風湯下。

十棗湯

芫花炒黑

甘遂

大戟各等

加大棗十枚。

小胃丹

芫花

炒醋黑不可宿瓦器

製大黃各一兩半

大戟

水煮一時水洗晒乾五錢

共爲末。白朮膏丸。如菔子大。臨臥時津液吞下。

神祐丸

甘遂

芫花

大戟各一兩

大黃

白丑

青皮

陳皮

木香

檳榔各五錢

輕粉一錢

水法丸。

血脹

婦人血膨之證。雖有因於氣食而成者。然成於血者居多焉。若成於氣食。腹雖脹而經不閉。成於血者。其經必閉也。婦人血恆有餘。故每月見其血而不以爲病。若閉而不通。則日積充滿。其始發之時。小腹先脹。久則上連中脘。緊脹如鼓。青筋綻露。而血膨之證成矣。其有因產後惡血不下。逆而上升。滲入肌膚。充滿於中宮。甚至上騰於面。而成充色者。是必死之證也。

### 血癬

又有癩塊一證。雖因痰與血食三者而成。然成於血者居多。因痰與食而成塊者。雖成而不礙其經水。成於血者。亦有經雖來不時而斷也。此必經水既來之後。尚有舊血未盡。或偶感於寒氣。或觸於怒氣。留滯於兩脇小腹之間。則成血癩也。有經水月久不行。腹脇有塊作痛。是經血作癩瘕。法當調經止痛。桃仁、厚朴、當歸、紅花、香附、元胡、肉桂、丹皮、乳香、木香、牛膝、小茴、砂仁之類。有經行腹痛。麻痺頭疼寒熱。乃觸經感冒也。宜加減五積散。若經行時遍身疼痛。手足麻痺。寒熱目眩。照前方去乾薑。加羌活、獨活、白芷、當歸、官桂、麻黃、川芎、白芍、陳皮、蒼朮之類。又有經水

不調。小腹時痛。赤白帶下。乃子宮虛寒。治宜艾附暖宮丸。亦有行時氣血虛弱。血海寒冷。經水不調。心腹疼痛。帶下如魚腦。或如泔。錯雜不分。信期淋漓不止。面黃肌瘦。四肢無力。頭暈眼花者。宜補經湯。

艾附暖宮丸

艾葉

附四製

元胡

熟地

甘草

香附

川芎

共爲末。醋糊丸。如桐子大。每服八十九丸。米湯下。

補經湯

人參

白朮

熟地

吳萸膠

砂仁

川元胡

芍藥

熟地

小茴茴

肉桂沉附

水煎服。

### 經准不孕

婦人月信准而不受胎者。其故有三。有因痰閉子宮者。有因氣食生冷者。有因男子陽傷易洩者。如痰閉子宮者。其婦必肥白。經來腹不痛。宜導痰湯。或人參半夏丸之類。或二陳合四物湯。如氣食生冷所致者。其腹多痛。宜溫之。千金吉祥丸之類。如咳嗽又不宜服。以四物加陳皮、香附、山楂。如氣作瀉。用枳實丸。如男子精寒易洩。不能受孕者。與婦無干。只宜男子服藥。或謂經水正而子宮寒者。萬無是理也。蓋子宮若寒。經水必過期矣。或又云。子宮寒者。因產時陰戶着寒所致。第產後陰戶着寒。產婦卽便不語。豈能語者。尙謂着寒乎。

薛古蒙曰。婦人經行不正。每不受胎。然參前而受胎者亦有之。其血熱故也。女科書云。先期爲血熱。後期爲血氣。第有參前落後互兼者。何也。大抵婦人性執多惱。着氣則氣不調矣。夫氣爲血之母。氣亂則經期亦亂矣。故調經以理氣爲先。宜以歸附丸、四物丸之類。又有衝任寒損。胎孕不成。或成而後多墮者。詫詫丸主之。

乾 蓋 肉 桂

白 芍

白 沈

澤 蘭

當 歸

導痰湯  
右爲末。  
醋糊丸。

煮酒送下。

半 夏 茯 苓

人 參 南 星

加 薑 煎。

一

千 金 吉 祥 九

天 麻 一  
兩 煙

熟 地 荚 苓

川 芎 白 朮

覆 柳 肉 盆 納

枳 五 丹 實 味 皮

橘 菖 蒲 紅

竹 枳 茄 實

石 熟 丹 斧 地 皮

川 元 芎 胡

桃 花 片 一  
兩 各

右爲末蜜丸。如豆大。每服五丸。空心。煮酒送下。

### 熱入血室

婦人感冒。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除脈遲。身涼。胸脇滿。譫語。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。

凡發熱惡寒。七八日。熱除脈遲。身涼。當自愈矣。今反胸脇滿。如結胸狀。譫語。此因經水適來。血海正開。熱邪乘虛入于厥陰藏血之室。肝主魂。熱邪內擾神明。是以胸滿譫語。如見鬼狀。故刺期門厥陰所注之腧。瀉其熱以外泄。

婦人感冒。七八日。續發寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。或晝明夜甚。譫語如見鬼狀。無犯胃氣。及上中二焦。必自愈。

上條言脈遲身涼。但刺期門。此條言七八日。續發寒熱。發作有時。經水適斷。血室未閉。其血必結。忌用苦寒凝滯之藥。今有大壩呂天祥媳。經水適斷。醫以大劑黃連投之。少腹結塊而殞。

婦人熱入血室。但頭汗出。仲景以小柴胡湯和之。家秘倍加柴芩。重加歸芍。其功

最專。再加丹皮、地骨皮。則身熱易退。

熱入血室發熱。晝靜夜甚者。亦有虛實不同。血虛發熱者。皆因營血不足。如陰虛內熱之證。脈必細數。宜補血涼血。血熱發熱。邪熱入于血分。脈必數大。不必補血。歸芍柴胡湯。或導赤各半湯之類。

導赤各半湯。病後心下不硬。腹不滿。二便如常。身無熱。神昏不語。或獨語。目赤口乾。不飲水。與食則嘸。不與不思。形如醉人。

黃連

黃芩

犀角

知母

人參

茯神

滑石

麥冬

犀角

知母

加燈心薑棗煎。

女科切要 卷二 热入血室

# 女科切要

清

海虞

吳道源本立纂輯

鄞縣

曹赤電炳章圈點

## 卷二

### 廣嗣論

夫陰陽交媾。當經盡之後。無有不成胎者。惟男氣不足。女血虛寒。故二氣不交。徒施不聚。世之無子者。曾不問自己臟府之虧。但以瀝清壯陽之劑。誤爲生子之良方。傷天地之和。卽或有孕者。無非熱藥偶成。因貽毒於子女。故雖得而不實也。醫之上工。因人無子。著論立方。男以補腎爲要。女以調經爲先。而又參之補氣行氣之說。究其盈虧。審而治之。夫然後一舉可孕。天下之男無不父。女無不母矣。余攷之上古男子三十而娶。女子二十而嫁。故所生子多壽。今人未滿十六歲而御女。女子未滿十四歲而嫁。增。陰氣早洩。未全而傷。未實而動。所以今人不如古人壽。

設或用藥不可混治。必察實男子所虧。女人經候。或有崩漏帶下。必難受孕。男子不育。必有陽脫痿弱。精冷而清淡。或陽痿不射。故女以調經爲先。男以補腎爲主也。服藥之後。又宜清心寡慾。使我之本原先壯。然後識日之奇偶。施之而不孕者。未之有也。

褚澄氏曰。男女交合。陰血先至。陽精後衝而成男。陽精先洩。陰血後衝而成女。此一說也。東垣云。經水纔斷一二日。血海始淨。交合者成男。四五日後。血脉已旺。交合者成女。此又一說也。顧或有經始斷而交合生女。經久斷而交合生男者。亦有三四五日以交合無孕。八九日以後。交合有孕者。獨何歟。俞子本選廣嗣要略云。實陽能入虛陰。實陰不能受虛陽。卽東垣之見也。又謂陽微不能射陰。弱陰不能攝陽。信斯言也。世有尪羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。雖欲止而不止者。亦有壯年精力過人。乃艱於育嗣者。獨何歟。丹溪論治婦人。以經水爲主。然富貴之家。侍妾已多。其中寧無月水當期者乎。已經前夫頻頻生育娶之。以圖其易者。顧亦不能得胎。更遣與他人。轉盼生男矣。豈不能受孕於此。而能受孕於彼乎。愚以爲父母之生子。如天之生物。易曰。坤道其順乎。承天而時行。夫知地之生物。不過順承乎。

天則知母之生子亦不過順承乎父而已。知母之順承乎父則種子者當以男子爲主。男子爲主而交媾之時又以百脈齊到爲善。交媾而百脈齊到雖老弱易洩亦可以成胎。若交媾而百脈參差雖少壯康寧難洩亦不能成胎。婦人所搆之血固由於百脈合聚較之男子之精不能無輕重之分也。若男女之辨又不以精血先後爲拘。不以月經盡幾日爲拘。不以夜半前後交媾爲拘。只以男女精血各由百脈齊到者別勝負耳。是故精之百脈齊到有以勝乎血則成男矣。血之百脈齊到有以勝乎精則成女矣。至有產而不育者有育而不能壽者有壽而黃耆無疆者則亦以精之堅脆分爲修短耳。世人不察精之堅脆而定於稟受之初此論其常也有少年斲喪而夭者此論其變也。乃以不育轉付之兒以壽夭專諉之數不甚謬乎。

宋遂真先生曰。男女交合有丟洩前後之分。男曰泄。女曰丢。蓋婦人月事已淨。其樂慾之時。細緻之候。氣蒸而熱。昏而若悶。有不可明言之狀。此的候也。交接之候。意合情濃。相持不舍。則百脈齊到而成胎矣。若男情已淡。女意未休。則男先泄而成女。如女先丢。而男後泄者。則成男矣。則知男女各有精。非獨男也。易曰。男女媾

精萬物化生而交合之後。卽以宗筋驗其有血無血立見矣。則知男女各有精也明矣。蓋月水初淨。新血始生。藏而不露。故交合之後。毫無血痕也。經云。陰精所奉其人壽。陽精所降其人夭。信斯言也。苟能清心寡慾。待時而動。亦何所求而不得子歟。

巢氏論婦人妊娠。一月懷胎似露珠。名曰胎胚。足厥陰脈養之。二月大如桃花痕。名曰始膏。足少陽脈養之。三月始分男共女。名曰始胎。手心經脈養之。四月形像俱分明。始受水精。以行血脉。手少陽脈養之。五月五藏俱生足。始受火精。以成其氣。足太陰脈養之。六月方纔六府成。始受金精。以成其筋。足陽明經養之。七月髮生通關竅。始受木精。以成其骨。手太陰脈養之。八月動手游其魂。始受土精。以成其膚革。手陽明經養之。十月受孕足。方生臟腑關節。人神俱備矣。

女科地黃丸 治婦人經水不調。

熟

地四兩

山

萸二兩

山

藥二兩

丹

皮兩半

茯

苓兩半

艾

葉五錢

香

附三兩童便製炒

阿

膠一兩

共爲末。蜜丸滾湯下。

正元丹

調經種子。

香

附一分開製。斷艾三兩先以醋同浸一宿。

枳

附半兩半沙。

白芍

芍

川芎

芎

茯苓

苓各四兩

阿膠

膠粉炒一兩蛤

歸身

琥珀二兩

千金種子丸

令人多子。并治虛損夢遺。

沙蒺藜四兩

白蓮鬚四兩

萸肉三兩

芡實四兩

覆盆子二兩

龍骨五錢

肉桂三兩

桂皮四兩

共爲末。蜜丸。空心淡鹽湯下。忌房事一月。

聚精丸

魚膠一斤蛤粉炒成珠。

右爲末。蜜丸。如桐子大。每服八十九丸。空心溫酒下。

五子衍宗丸

添精補髓。

枸杞子

菟絲子各八兩

五味子一兩

覆盆子四兩酒洗。

車前子 一兩

右爲末。蜜丸。空心淡鹽湯送下。

壯陽丸 治陽痿氣餒不振。老年無子。此藥允宜。

肉蓯蓉

仙茅

蛇牀子

山藥

五味子

補骨脂

茯神

紫稍花

杜仲

韭菜子

雄雞肝

鱉肝

海狗腎

如無海狗腎以  
黃狗腎代之

右藥共爲末。先將雞肝、鱉肝用鹽酒椒蒸熟。搗爛。和前藥晒乾。再將前末藥磨細。用酒拌山藥末。醋調糊爲丸。空心淡鹽湯下百丸。如陽痿精冷。加肉桂附子。石燕各一兩。

金鎖思仙丹 治男子慾勞過度。精神不繼。

蓮蕊

蓮子

芡實各等

茯神

三兩

共爲末。用金櫻子一斤去毛煎膏爲丸。每服三十九。空心淡鹽湯送下。服過一月後。即不走泄。遇種子期。用車前子湯送下。

# 胎前門

## 受妊脈法

兩尺脈微而帶數。兩寸浮大兩關滑。身中無熱脈亦洪。此是婦女胎脈法。

## 男女脈法

左手滑大而疾男。右手滑大而疾女。更參乳核孰先生。右女左男信無差。

## 雙胎脈法

雙胎脈法問如何。兩手俱洪斷不誣。欲識是男併是女。縱橫詳見叔和歌。

## 死胎脈法

脈來沉細腹腰疼。胎伏多寒冷是冰。再看舌色青紋起。胎死何須問鬼神。

## 鬼胎脈法

脈來亂點如風雨。忽去移時又復來。此是夜叉人不識。卽時診斷勿疑猜。

## 逐月胎形論

初月胎形似珠露。

未入宮羅在昆戶。

猶如秉燭在風前。

風急此時難庇護。

初月胎形。如草上珠露。未有宮羅也。在昆戶之所。未入腹內也。其形欲聚欲散。未得堅強也。如月信報之。當時頭暈惡心。不喜飲食。六脈浮緊者是也。多有畏羞隱諱。而醫者不識。作歇經者亦有之。宜服安胎和氣飲。或病後受胎。或稟氣虛。服罩胎散。

安胎和氣飲

白芍

木香

益智仁

砂仁

香附

紫蘇

甘草

砂仁

加葱水煎服。

罩胎散

當歸

川芎

白芍

砂仁

甘草

枳殼

白芍

砂仁

二月胎形北極中。

如花初綻蕊珠紅。

分枝未入宮羅內。

氣受陰陽血脉同。

二月胎形受血近陰。在母北極之中。陰戶內六寸是也。其胎入腹。未有衣裹。或負重觸傷胎氣。必致頭暈目眩。恶心嘔吐。不思飲食。宜服保胎和氣飲。

霍香

厚朴

廣皮

枳殼

砂仁

黃芩

桔梗

蒼朮

小茴

紫蘇

柏子仁

三月胎形似血英。

有宮血室未經經。

母憎飲食諸般愛。

苦辣酸鹹並納成。

三月胎形與二月相等。不問虛弱。胎氣不和。恶心嘔吐。兼秋風時氣。寒熱頭疼。悉照前安胎和氣飲加減。如寒熱不退。加柴胡。黃芩。咳嗽加杏仁。喘急加沉香。

四月胎形入宮室。

在母臍脅內相遇。

免獐熱物諸般忌。

免兒脣缺及瘋麻。

四月胎形入宮羅之室。河車衣裹。漸至丹田。忌食一切毒物。如無鱗魚鱉之類。以免胎毒小兒。如身體疲倦。氣急發熱。飲食無味。嗜臥頭暈。四肢酸軟。宜服活胎和

氣飲。

陳皮  
蘇葉  
甘草

香附  
厚朴

砂仁  
蒼朮

小茴  
枳殼

五月胎形男女分。

四肢胞穩不須憂。

男酸女淡思食味。

此定陰陽造化云。

五月胎形。男女已定。令胞母前行。使人後喚之。左回頭是男。右回頭是女。男思酸。女思淡。已入宮室之內。其胎安穩。胎母喜嗜臥。飲食無味。肚腹脹悶。宜服瘦胎飲。

當歸

益母草

砂仁

益智仁

枳殼

香附

白芍

水煎服。

六月胎形在腹遊。

左手男胎似線抽。

女魂右手輕搖動。

却在臍中漸漸浮。

六月胎形。男動於左。女動於右。在母臍中漸漸浮動。若胎母虛弱。用瘦胎飲。使胎

氣調和。易於產育。

七月胎形身覺邪。

男將左手動擎擎。

女能右手時時動。

行步艱難母嘆嗟。

七月胎形。男向左脅動。女向右脅動。胎重如石。行步艱難。脾胃虛弱。氣急上沖胸臆。以致腹滿喘咳。卒然頭暈。勿以中風治之。此乃胎氣熱邪不安。否則令兒沖心。名曰子懸。宜服知母安胎飲。

知母

蘇葉

黃芩

香附

枳殼

滑石

甘草

益母草

水煎服。

八月胎形具備身。

毛髮生長定精神。

窮思飲食吞難下。

困弱憂愁耽悶因。

八月胎形。毛髮俱生。胎母心悶煩躁。味美不甘。胎氣困弱。以致脾胃不和。宜服和氣平胃散。

和氣平胃散 治胎氣不和。熱毒瀉痢。

蒼朮  
柴胡  
澤瀉

厚朴  
白芍

陳皮  
地榆

升麻  
肉果

水煎服。

九月胎形重若山。

七情開竅一般般。

每夜一升三合血。

待時生育暫時難。

九月胎形眼有光。鼻有氣。耳聞強。口知味。身舒縮。人道俱全。出世將轉身大動。胎母左右脇知覺。宜服保胎如聖散。

保胎如聖散 治產忽然腹痛。先行其水。嬰兒降下。忽誤吞熱物傷胎者。

當歸

紅花

益智

白芍

益母草

甘草

益智

白芍

如兒不下。取鯉魚一尾。同藥再煎。入醋一杯。服烏金丸。

烏金丸

阿膠四兩

艾葉二兩

穀芽二兩

麥芽二兩

蛇 殼 一條

五 味 一 両

右爲末。醋糊丸。如彈子大。每服一丸。

十月胎形已完足。

四肢罅縫骨精開。

坐產卽宜加謹慎。

莫教兒下客氣來。

十月胎形完足。四肢罅縫俱開。至期產下。莫令久臥地下。莫被賊風吹犯。急令包裹滿月之後。始得平安。宜服活水無憂散。因兒未下。恐穩婆動手。

活水無憂散

急性子

當 歸

益 母

紫 蘆

艾 葉

秦 茁

陳 皮

肉 桂

枳 殼

白 芍

生 地

鯉 魚 一 條

水煎加醋

一盃。服烏金丸。

如兒死腹中不下。急取無根水再煎服。此急救之法。

## 妊娠調護法

保元論云。婦人妊娠。常令樂意。運動氣血。安養胎元。早當絕慾。節調飲食。內遠七

情外避六淫。性宜靜而不宜躁。體宜動而不宜逸。味宜涼而不宜熱。食宜暖而不宜寒。毋久立久坐。毋久行久臥。又宜却除一切肥甘。以及煎炒炙燂。油膩辛辣。水果魚鱉。兔鵠牛馬之肉。以及鰻魚鰐鱠無鱗等魚。一切避忌。便無胎漏下血。子腫子癟。子懸等症。以及橫生逆產。胎傷腹中之患。生後亦無胎熱。胎寒。胎肥。胎怯。以及胎驚。胎毒之證。遺累小兒。前賢胎教云。婦人妊娠。寢不側。坐不偏。立不蹕。不食異味。目不視惡色。耳不聽淫聲。口不出惡言。非義之物不取。非理之財不收。宜聽誦讀詩書。講論致知格物道理。則生子形容端正。才器過人。嘗見稟性溫良之婦。有妊而少嗜慾。生子少病。而痘瘡亦稀。此其驗也。指掌訣云。胎前衆集要須知。惡險當從痰火推。胎上湊心胸脹滿。子懸芩朮炒山梔。妊娠下血名胎漏。血熱而成或氣虛。胎動芎歸與膠艾。安胎順氣勿教遲。子淋須覓安榮散。胎不還當用鯉魚。腫滿遍身如水氣。但煎防己自寬舒。足趺浮腫身無恙。皴腳安胎大腹皮。五月以來煩躁甚。子煩知母麥冬醫。妊娠腹疼分虛實。寒熱溫清可辨之。子癟急服羚羊角。兒暈芎歸荆芥奇。瀉痢蒼砂加二白。熱須芩朮信爲宜。風寒感冒參蘇飲。不解黃龍湯。勿疑胸滿本方加枳殼。熱而無汗葛根驅。裏熱甚時罩胎散。熱極諳語五。

苓施。脈遲四逆理中治。熱泄柴芩半夏除。汗吐下溫須仔細。安胎爲主勿差池。清脾療瘧須除半。四獸驅邪更補脾。痢疾香連丸有驗。胃風主痢補其虛。傷風咳嗽芎蘇飲半貝杏芩桑白皮。祕結不通蔬子飲。小水不利麥冬葵。怔忡恍忽心驚悸。氣悶喧呼大聖祛。心痛火龍湯可定。腰疼通氣更難知。達生散可將胎束。欲服須當九月時。又云孕婦之脈陰搏於下。陽別於上。血氣調和。有子之象。手足少陰。其脈動甚。尺按不絕。此爲有孕。少陰屬心。心主血脉。腎爲胞門。脈應於尺。或尺脈微。關滑尺數。往來流利。脈微帶數。身中無熱。脈帶洪滑。當詰月事。仔細參酌。婦人似病而無邪脈。是孕非病。所以不應。欲別男女。左右取之。左疾爲男。右疾爲女。沉實在左。浮大在右。右女左男。可以預剖。離經六至。沉細而滑。陣痛連腰。胎即時脫。半產漏下。革脈主之。弱卽血耗。立見傾危。瑣言識之。概可類推。

大凡婦人妊娠。貴乎衝任脈旺。元氣充足。飲食如常。身體壯健。色澤不衰。而無雜病相侵。則十月滿足。分娩定然無虞。若氣血不充。衝任之脈虛弱。經必愆期。而不受孕。即使得孕。胞門子戶虛寒。受胎終歸不實。李南宮曰。胎前諸病。惟當順氣安胎。若外感四時之氣。或內傷七情。以成他病。治法與男子無異。當以各證類求之。

動胎之藥。切不可用。

聖濟總錄云。安胎有二法。有因母病以致胎動者。但治其母。胎自安。若胎氣不固。觸動以致母病者。宜安胎而母自愈矣。

先師天錫陳先生曰。妊娠之婦。身體康健。飲食如常。可保平安。勿生顧慮。勿妄服藥。勿過飲酒。勿舉重。登高。勿多睡臥。閒則步於庭。勿犯房事。擾亂子宮不安。難免產子艱難。且生後多子胎疾。慎之慎之。

凡孕婦墮胎有二故。一爲跌蹠負重。軋傷。一爲氣血不足。蓋腰膝繫胎之處。如瓜果之蒂。花卉之根。不得露不長。受熱亦易傷。故一月厥陰用事。臟腑不能輸精於肝。而致疏泄者有之。二月少陽用事。臟腑不能輸精於膽。而致萎瘁者有之。三月手心經脈用事。臟腑不能輸精於心。而致朽腐者有之。四五七月墮者。莫不皆然。是故安胎之法。當視其虛實寒熱而藥之。則無不安矣。

## 小產

小產者。言非大產。在四五六月之間而墮者。所謂半產是也。若二三月。人像未全。

還是血塊。苟有所傷而墮者。非曰墮胎。二者皆屬根蒂不固。衝任經虛。須分是火是寒治之。有火者清之。白朮、黃芩之屬。而益以養血也。寒者溫之。膠艾桂附之屬。而加六味。然桂附辛熱。尚宜酌用。切勿輕投。實者清之。虛者補之。尤當顧脾胃以生新血。蓋胃爲水穀之海。脾爲萬物之母。人身之有脾胃。猶萬物之有土也。有土乃生金。金生水。水生木。木生火。故培土而五行有相生之妙。扶脾胃而五臟有遞受之益。在孕婦永保無虞。何有墮胎小產之虞哉。

宋遂真先生曰。前哲云。初受胎而即墮者。肝血虛也。胎以血爲本。肝臟虛。則生發之機困。如春初多冷。草木不芽可知也。治宜益肝血。胎斯固矣。二月墮者亦然。實者反是。三月墮者。心血虛也。胎以血爲根本。心臟虛。則長茂之氣消。如夏初天氣暴寒。而花果不實可知也。治宜養心補血。胎斯固矣。四月墮者亦然。五六七八月而墮者。責在氣血之並虛也。蓋氣爲血之衛。血爲氣之配。氣不能衛血。則血無所統。血不能配氣。則氣無所歸。兒在母腹中。所賴母之氣血充和耳。苟有所傷。安所賴乎。是以調氣先必養血。蓋血尤須補氣。養血而血不生。補血之源腎水是也。補氣而氣不足。補氣之根命門火也。故五六月間而有墮胎者。六味去丹皮加人參。

麥冬、杜仲、續斷爲要藥。寒痛者加附子少許。百無一失也。有胎亂動而不休者。胎熱也。不可用燥熱之劑。此外胎動者或因衝任經虛。或因七情六欲。或因過服熱藥。須各審清病源而治之。如四五月間。心中昏悶。四肢沉重。不能移動。惡聞穀食。喜吞酸味。胎動不安。安胎飲主之。或紫蘇飲加半夏、茯苓、枳殼。

安胎

安胎飲 治孕婦三四月胎動不安。

熟地川芎地榆

當歸白朮芍

加薑三片水煎服。

半夏茯苓

阿甘草膠

紫蘇  
川芎

陳皮  
人參

當歸  
甘草

白芍  
腹皮

紫蘇飲

安胎和氣飲又名達散

白朮

陳倉米

薑水煎。

膠艾湯

治半產下血。

阿甘草膠

安榮散治子淋。

人參

麥冬各二錢。每服二錢。

各二錢。

燈當歸草五錢

川芎

白芍

當歸

桃仁

甘草通草五分

熟地歸

白芍

羌活

滑石

炮艾葉

木香

大黃子

麻子潤腸湯

治風結血結。

香連丸

黃連

吳萸湯拌炒

木香

研乾

末之醋糊爲丸。

五苓散

猪苓

肉桂

附子

四逆湯

加燈心煎。

茯苓

桂

乾薑

附子

甘草

桂

白朮

澤瀉

理中湯

腹痛加白芍。

白朮

人參

乾薑

桂

甘草

鯉魚湯

當歸錢半

白朮

白芍錢各一

茯苓錢半

赤小豆八分

木通八分

車前八分

鯉魚一條

七情湯

八分

肉桂

陳皮

人參

甘草

二白丸

石灰一兩

茯苓

荳二兩

化氣湯

爲末。

用蕎麥麵雞子清調糊爲丸。每服三十九。空心白滾湯下。

砂仁

香附

廣皮

蘇梗

川芎

枳殼

當歸

胃風湯

人參

白朮

茯苓

川芎

芍藥

肉桂

加粟米百粒。

清脾飲

青皮半夏草果

羚羊角散

治子癇風症。

厚茯苓

羚羊角

米仁茯苓

木防風活血

朴茶

四獸飲  
生薑橘半夏紅薑

烏人參

獨活

火龍湯  
斬艾

治孕婦心痛。因寒邪犯胃。  
五錢鹽水炒。

茴苗  
五錢炒。

香薷

川練子  
五錢炒。

甘草當歸棗仁

柴胡

草果茯苓

甘白杏仁

黃芩

草朮

荳皮杏仁

黃龍湯 治孕婦新產傷寒。

柴 胡二錢 黃芩一錢

人參一錢 甘草五分

薑三片。水煎服。

防己飲 治足胫腫痛。

川芎 防己 木通

檳榔 蒼朮 黃柏 生地

半夏茯苓湯 治惡阻嘔吐心煩。惡聞食氣。多臥。

半夏一兩

赤苓 熟地

白芍 人參

桔梗 陳皮

旋覆 甘草

千金方無旋覆花。有細莘、蘇葉。右藥共爲粗末。薑七片。水煎服。

驗胎方 經水不行。疑似未明者。

川芎爲末。每服一錢。試之。艾葉湯調服。覺腹中微痛。則有孕矣。

大全方論。半夏動胎不用。仲景用之。取其辛以散結氣。瀉逆氣。故惡阻用之。而非專爲痰設也。婁全善治妊娠惡阻。累用半夏。未嘗動胎。而鄭氏專門女科亦嘗用之。經云。有故無殞者是也。不必拘泥。

# 女科切要

清 海虞 吳道源本立纂輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

## 卷四

### 妊娠中風

〔妊娠中風歌〕中風惡候告君知。眼合肝兮手撒脾。心絕口開肺鼻鼾。腎家將絕定遺尿。

妊娠手足搐搦。忽然不省人事。角弓反張。狀如中風者。子癇也。宜服砂仁湯。倘胎前無故卒然悶到在地。或有不識。誤以中風斷之。謬矣。此兒暈也。名曰子懸。須以安胎調氣治之。紫蘇飲加砂仁、川貝、茯神。雖至將產仍服。紫蘇飲爲妙。有胎前發喘。乃胎不安而冒風也。用帶鬚葱白廿莖。煎湯服之。卽愈。蓋葱能發散。而又安胎也。若因傷食而喘者。紫蘇飲沖入童便。加砂仁煎服。舍此無別藥也。若胎氣不和。

湊上心腹。以致胸膈飽悶。喘急疼痛。此子懸也。宜紫蘇飲。此藥有安胎止墮之功。如胎前偏正頭風。川芎調茶服主之。妊娠感冒。四時風寒霍亂。吐瀉者。藿香正氣散主之。凡胎前傷暑。與霍亂治法同。如胎前瘧疾。惟養榮湯一方。孕婦發呃。氣逆者。用紫蘇飲。亦有胎死腹中。以致氣侵上而呃者。下死胎而呃自止矣。不可不知。孕婦傷食。以紫蘇飲加神麴、查肉、砂仁、麥芽。如兼吐瀉。用養胃湯。有孕無故悲泣不止。如有鬼物以憑之。此名臟燥。非大棗湯不愈。有妊娠忽然耳聾昏曠者。氣血不足也。用十全大補湯。目赤腫者。四物湯加黃連。遍身拘急痛無定處。夜不得臥。眼花昏黑者。胎氣使然。宜服紫蘇飲。

### 妊娠傷寒

〔妊娠傷寒歌〕傷寒頭痛連百節。氣急衝心溺如血。身熱發點紫黑青。壯熱不止致胎滅。嘔惡不止與心煩。腰背項強腦痛裂。六七日來燒腹中。小便不通大便結。妊娠染表症傷寒者。當用帶鬚葱頭湯服之。出汗即愈。不可輕用發表藥。若誤用之。其胎必墮。且母命難保。戒之慎之。胎前瘟疫。與傷寒同。孕婦傷寒咳嗽。宜二陳

加薄荷、白朮、川貝。泄瀉者。胃苓湯去參。俟脾胃實後治嗽可也。卽參蘇飲亦可服。蓋風藥最易動胎。反爲不美。故胎前傷寒。身熱咳嗽者。惟以帶鬚葱白煎湯服之。大能安胎順氣。若胎不安。煎砂仁湯服。汗多。服參蘇飲。乾嘔。紫蘇飲去參加茯苓。吐血止血丸。或二陳加黃柏、知母、查炭、白朮。如氣血兩虛。八物加黃柏、知母。

### 妊娠跌蹣

〔妊娠跌蹣歌〕懷胎跌蹣無輕重。遂致傷胎在腹中。已損包胎血上逆。衝心悶痛。母魂傾。

妊娠跌蹣。或受傷重者。服活血藥。又恐傷胎。不服則傷不能去。當何法以治之。曰。必先辨其胎之死生。如腹冷舌青者。子死也。以香桂散下之。若未甚分明。以佛手散探之。如胎傷者。立卽墮下。胎無恙者。其痛立止。但痛止之後。尤須視傷之輕重。下藥輕者。童便酒入活血藥飲之。血活則傷去。隨以紫蘇飲加童便、砂仁緩緩服之。重者只治其傷。勿顧其胎也。血行胎下。母命保矣。服紫蘇飲加枳殼、童便、砂仁。尤妙。有孕婦胎前衄血。產後多不吉。血以養胎。不宜走泄故也。服紫蘇飲加黃芩。

自愈。更有口中見血。及大便下血者尤忌。

### 妊娠心腹痛

〔叔和心腹急痛歌〕心腹急痛面目青。冷汗氣促命必傾。下血不止胎沖上。心腹冷悶定傷身。

妊娠腹痛而見血者。名曰胎漏。至產卽愈。生子不實也。紫蘇飲加陳皮、砂仁。若胃口痛甚。用指迷湯。或養胃湯。亦有孕癰者。何以辨之。服安胎飲。消食理氣之藥。俱不效。但臍近下處腫痛發光者。卽腹癰也。因孕婦生之。名之曰孕癰。宜十補托裏散。此藥補而不礙胎。其次千金托裏散亦可。有臍下冷痛腹脹。小便頻數。大便滑泄。緣正氣虛弱。遇吞生冷所致。宜安胎飲加枳殼。及和氣之藥。如小腹痛。須察其脈。若可安。紫蘇飲安之。不能安。則用活血行氣之藥。其內傷甚者。下之。若血結不下。必腹中疼痛。服金屑散。或宿食煥癖氣血瘀痛。葱白散主之。一切血痛。肉炙散、白朮煎。腰痛甚者。腎虛也。其胎多墮。宜急服安胎飲。以固其胎。復不寒。紫蘇飲可加黃芩。若胎不時轉動。如腰腹痛者。亦宜安胎飲。

## 脅肋痛

孕婦脇痛甚者。其說有三。或因哭泣。或因忿痛。或因內傷。如內傷者。現有胎。不可用行傷藥。只宜童便酒。或紫蘇飲加白芍。當歸。砂仁。人參。童便煎服。亦足以固胎。或曰。脇痛非芥子不能達。柴胡。枳殼亦可用。如背痛者。氣滯而不運也。宜紫蘇飲。妊娠口乾煩悶。不得臥者。名曰子煩。紫蘇飲主之。又有口舌生瘡。咽喉腫痛者。切不可用防風通聖散。有孕婦未產而乳汁先下者。名曰乳泣。生子多不育。有兒在母腹中啼哭。不須服藥。用黃豆打番。招孕婦細細拾之。其哭自止。

## 子腫

〔子腫危殆歌〕子腫傷肝唇定黑。缺盆平也必心傷。背平傷肺脾臍凸。脚背平時腎病深。

姪娠浮腫。其說有二。蓋胎前患水腫者少。而患胎氣者多。乃氣病也。名曰子腫。紫蘇飲主之。若小便不利。腹脹者。水腫也。紫蘇飲加澤瀉。車前。白朮治之。三焦無病。

者。加山梔、黃芩利小便甚捷。如孕婦浮腫。上半身者。宜發汗。下半身者。宜利小便。上下俱腫。汗利兼施。服藥腫退而脫身者。不必再藥。

凡婦人懷孕。宜別室安睡。常使身心清淨。不得再犯房事。夜睡須左右轉換。使小兒左舒右安。肢體活動。臨產自然快便。生子亦聰明少疾。背有一醫宿店。值店婦生產。數日不下。下體甚冷。急以椒橘茱萸乾薑良薑等。煎濃湯熏洗臍腹產門等處。氣溫血行而遂產。

### 胎漏

〔胎漏歌〕血下如同月水來。漏乾胞血必傷胎。胎傷妊娠須憂慮。急賜靈丹救得回。只緣慾火房勞損。非是尋常虛漏胎。

蓋胎之漏者。必有因而來。或誤吞動胎物。被熱毒所侵。或房勞而傷損。損輕則漏亦輕。損重則漏亦重。血盡而胎死。或因母病而胎動者。病治而胎自安。或胎不堅固而母病者。胎安而母自愈矣。又有值經期而見血。每月一至。名曰漏胎。宜服安胎飲。或紫蘇飲。加黃芩、白朮、阿膠、砂仁。自然無事。亦有傷胎氣而下血不止。宜奪

命丹。胎未損者服之可安。已損者服之即下。

### 胎前雜證

孕婦卒然不語。名曰啞胎。不須服藥。產則能言矣。蓋聲出於腎。胞絡貫腎。故不能言也。經曰。九月而瘻。十月當復便是。妊娠譫語。用四物湯倍加白芍。當歸。去生地。合二陳加山楂。薄荷。薑汁治之。

孕婦舌青者。子死腹中也。用麝香五分。肉桂三分。爲末。煮酒調服。如雙胎一生一死。亦宜此方。因母患症。熏蒸其胎。致兒灼死。死兒着冷。不能自出。或用黑神散之類。以暖其胎。胎自下矣。

孕婦小便頻數。名曰子淋。服內補湯立效。小便不通者。乃胎下墜而壓膀胱。名曰轉胞。宜補中益氣加車前。有內傷者。乃血鬱不去。今之梗痛是也。

妊娠大便祕結。乃血枯氣閉也。四物湯加枳殼。桃仁。孕婦水瀉。宜分別而治之。忌理中五積散。因有乾薑、玉桂也。傷食瀉者。養胃湯加消食藥。有傷生冷而瀉者。亦用養胃湯加木香。火瀉者。香薷飲。夏月暴注下迫者是也。暑瀉者。胃苓湯加香薷。

氣虛作瀉者。腸鳴而不痛。水穀不化者是也。補中益氣湯。或四君子湯。胎前血瀉。胃苓湯加木香。砂仁。或紫蘇飲。加神麌。澤瀉。黃連。胃口發飽。夾痰嘔逆者。忌用參連。胎前產後痢。載痢證匯參。故不贅。

懷孕五六個月。或七八月。胎忽亂動。兩三日間或痛。或有水下。但腰不甚痛。是胎未離經。名弄胎。又曰試胎。胎水有無俱不妨。但直身坐臥行立。不可驚憂逼迫。以致誤事。二者俱非正產。必因觸犯所致。凡孕婦五六個月。或三四個月。常要緊束其身。勿令胎放肆。又不可飲酒常沐浴。

達生編云。小產當慎。三五月而墮者。謂之小產。此因臟府損傷。胞繫腐爛。以致墮胎。此比之大產更甚。大產瓜熟蒂落。本無足慮。尙有多少艱難。何況損傷胞繫而墮乎。輕視小產。每致殞命。須倍加將息。宜服補血養氣去瘀生新之藥。世有服落胎之藥者。害莫大焉。此丐戶穩婆所爲。醫者斷無此事也。

催生之說。自古相傳。然瓜熟蒂落。何必催生也。催之非但無益。轉或有害。有用兔腦丸者。有用千年蕡者。有用催生石者。有急性子者。有筆頭灰者。有草麻子搗爛塗足心者。用之多有不驗。徒增繁擾。嘻。平時失於調護。任意行房。以致難產。頻以催

之。又何濟乎。此愚夫愚婦之所爲也。

兒在母腹。男女有別。男子負陽背陰。女子負陰背陽。在腹中亦然。男向於內。雙手傾捧母心。女向於外。居母心下。兩手自捧頭面。而背母足居下。至臨盆時。倒轉而順出矣。若產母側臥。致兒倒運不轉。即有橫生逆產之患。故坐草切不可太早。須再三令人扶掖運動。方免前禍。不知此理。徒歸產母之氣血不足。豈不誤哉。然亦有臥而產者。必令仰臥平正。使產門虛而不礙可也。臥而能產。惟血氣充實者能之。若不坐不臥。無故頓住而難澀也。力可委罪於氣血不足耳。醫者宜鑒諸。

孕婦臨產之月。胞水未破而血先下者。此乃胎傷非產也。宜入物湯與安胎飲治之。若胞水已破。此欲產也。用紫蘇飲以生其血。滑胎之藥。須胞水破痛陣急。十月滿足者。方可服。若胞水未破。腹痛未甚者。雖十月滿足。恐未坐草。只服安胎飲。或紫蘇飲。白芍換赤芍。當歸用尾。去人參。加薑。慈。水煎入童便一盃。忌用桃仁活血之藥。胞水已破。兒卽墮地。謂之鋪蓐。生產最快利。如胞水已破。兒不下者。謂之試水。此產反遲。有停一二日而產。有服安胎飲而水止痛定。至五六日而方產者。切不可於破水時。卽用穩婆動手。令胎婦費力痛苦。多致受累。胎累日不下者。宜先

氣血助其胞水。佛手散或紫蘇飲。臨蓐先放紅水。致兒乾擱。與行船無水同。宜紫蘇飲以生其氣血。如臨蓐腰腹俱痛。不可用穩婆輕易探候。卽胞水已破。腰痛已極。止當令孕婦扶掖走動。則生育自然順也。至於橫生逆產之患。皆因先動手故也。其臍帶繫於命門。兒將育時。兩手洗蕩。使臍帶脫落。然後得出。安得不痛。卽所謂瓜熟蒂落是也。

