

聖王濟總錄纂要

一

國立中央圖書館台灣分館



3 1111 008723619

414.6  
18250  
26  
v.1



國立臺灣圖書館典藏  
由國家圖書館數位化

18250  
26

聖濟總錄纂要提要

宋政和中奉敕編。清程林刪定。林字雲來。休寧人。因廬全書提要云。初徽宗御製聖濟經十卷四十二章。又詔集海內名醫。出御府所藏禁方祕論。纂輯成編。凡二百卷。以其原書繁重難行。且類似方重出者甚多。雲來就經驗所得。撮其概要。精選實驗證方。重為纂輯。門類悉依其舊。所闕小兒方五卷。則備其友項睿補之。仍冠以徽宗原序。大德四年。集賢學士焦惠校上序。及校刊諸臣銜名。考晁陳二氏書目。但有徽宗聖濟經。不載是書。觀焦惠序。稱始成於政和。重刊於大定。殆汴京破後。隨內府圖籍北行。南渡諸人未睹其本歟。清乾隆時。汪瑤圃有大德本校勘重印。惟原闕二卷。無從補刊。日本有元大德刊足本。全二百卷。上海文瑞樓石印本。即日本之原刻本也。蓋宋代崇尚醫學。搜羅至富。就所採錄。古來專門授受之方。尚可以見其大略。其每類冠論一篇。亦皆詞簡理明。均足以資考訂。原本之末。有神仙服餌三卷。或言烹砂煉石。或言嚼柏咀松。或言吐納清和。或言斬除三尸。蓋是時道教方興。故有是妄語。林病其荒誕。一概汰除。惟約取其尋常頤養之藥。

三十餘方。其別擇具有條例。故所錄諸方。多可通用。與墨守古法者異焉。

# 吳序

醫者意也。古人多不肯著書。然肘後禁方。又無不神驗者。書果可盡廢乎哉。歷攷載籍以來。藝文所志。軒岐家言。無慮數十百種。要皆通人畸士。卓然有傳世之識。而後發爲文章。按部就班。處方立案。嘉惠來學。其道與六經相表裏。近世學者。狃於所聞。守師承執一之見。其言固陋而不能以相通。自誤誤人。弊至莫可紀極。無他。讀書不博。見道不真。用心不廣。坐是三者。而醫道或幾於熄。余戚友程雲來氏。鄞山世胄也。少從其叔祖敬通先生。講越人之術。先生道高望重。名滿天壤。雲來與之遊處者十餘年。盡得其真傳秘授。又其先明初有松厓公者。以名進士起家。一代偉人。精星象奇門岐黃術。著有醫案等書。雲來皆宗法之。故於方書。無所不讀。研窮考究。殫精竭思。以與古遇。出而仁民利物。稱國工鉅手焉。歲辛酉。余遊維揚。邂逅雲來於廿四橋頭。蓋方以校訂聖濟總錄一書。留此者幾一載矣。旣而向余曰。是書始末甚異。幸爲我序而傳之。余覽其發凡而觀其用心。雲來之不朽無疑也。夫雲來以名家子。負才倜儻。博奧多奇。間以餘情。溢爲圖篆繪事。得異人授

內養。粹穆。顏如渥丹。至生平醫道所入。輒梓所著。諸書不名一種。散布人間。藏之者若寶籙。然挾此才技。安往不足以垂名立教。而顧以是書爲斤斤其立心。誠欲利濟天下。如范文正所云。不爲良相。卽爲良醫。是宜不朽者一。雲來得讀是書。刻本於敬通先生所。又三十餘年之久。始從友人江子郢上再覩抄本。遂慨然有剞劂之志。而不欲自專其美。推原究極。詳著師友之淵源。是宜不朽者二。且是書自宋徽宗政和年間。詔集海內名醫。出御府所藏禁方祕論。纂輯成編。非人世所恆見。閱年既久。漶漫隨之。雖再刻於金大定。三刻於元大德。重以耶律楚材之論定。頒行。終無解於若滅若沒之數。非雲來孰能表章及之者。是宜不朽者三。雲來以三不朽之盛心。又慮卷帙之繁重。於是刪訂收束。以便行笈之可攜。知古今之一其宜也。於是酌損裁成。以定規條於可守。鴻編鉅典。恃有雲來爲之發皇矣。雖然。醫者意也。書不可盡廢。而亦不可徒泥陳言。顧用之何如耳。如或守一偏之見。而不知變通。雖日誦是書。復將奚益。又當進求雲來自著之心。傳而後可也。

康熙辛酉年八月既望同邑年家眷弟吳山濤頓首拜題

# 洪序

醫之道在隱顯。而功侔造化。始於神農黃帝之世。其後學者。相師延其術。無成書。歷唐虞三代二千有餘歲。大和保合。民不殀札。物無妍傷。及乎春秋戰國。王迹寢衰。人與天地正氣隔閔。而風寒暑濕燥熱。相運行於營衛經絡之中。乘情欲食飲。居起罷勞而爲之疾。於是秦越人、倉公、扁鵲、淳於意者。各以其術顯。而素問、靈樞、甲乙之書因以出。然其高者。猶爲導引吐納。治之於未始有病之先。蓋人之身。陰陽合象而爲氣。清者曰氣。濁者曰血。血之大隧。謂之經。經之首曰衝。其次曰督。曰任。其次曰躄。皆先天隧道。知而通之。可以長生。左右手足三陰三陽諸經。皆後天隧道。知而調之。可以已病。平臍居腰而約束一周者。帶也。是爲兼統。先後天之隧道。知而行之。可以出入生死。故帶、衝、督、任、躄五經者。不病。其病則手足經病。經病乃移注五經。而陰陽十二經。又有系絡之數。三百六十有五。其隧穴六百四十有七。能通其道而治之。則醫之神秘盡矣。宋政和間。有聖濟總錄。彙勘禁方秘論。凡二百卷。再刻於金元。實醫學之河海。爲時方所掩者。迄今湮沒四百餘年矣。吾鄉

程子雲來。從其從祖敬通先生。繙閱是書有年。因思全書浩瀚。有不切於治者。遂纂其精要。得二十六卷。詳在凡例中。刻之廣陵以行世。而問序於余。乃作而歎曰。是其道在隱見而功侔造化者乎。昔者黃帝與浮丘公鍊丹黃山。其處卽名鍊丹臺。雲來之先。有松厓先生讀書其上。獲遇至人。洞抉道奧。用之醫藥。人皆謂神。丘文莊公嘗以異人稱之。今雲來生長黃山。而僑居武林。又嘗從敬通先生遊。其有得於古今之書。與夫至人之所口授而闕之於世者。無不動見於發用之機。其倅然面背。類有道者。著釋甚多。此其一也。雖然。醫之道有要焉。逆與順是也。升降浮沉。則順之。寒熱溫涼。則逆之。如操舟者。知江河之險易。與風水之動靜。而順逆其道。尠不克濟。余故以前人之所著書。如李時珍之本草綱目。王肯堂之證治準繩。張景岳之類經素問。與是書皆有功於天地人物。真醫學之河海也。顧世之能用。變而通其方者。鮮矣。方也者。方舟也。並舟謂之方。所以濟川者也。然則雲來氏之所以纂聖濟總錄之要者。其不亦爲醫學之方舟。以濟人於河海也哉。是爲序。

康熙辛酉孟冬上浣同里年家眷弟洪琮拜撰



# 焦序

臣聞天地以溥生爲大德。所以曲成萬物而不遺。聖人贊天地之化育。故斂時五福。以敷錫於庶民。夫民之爲物也。知者寡。愚者衆。起居失常。食飲無節。外爲寒暑燥濕風以賊其形。內爲喜怒思憂恐以亂其氣。形氣乃傷。疾所由作。聖人有憂之。謂祝由不可以盡已也。遂制藥石鍼艾。以攻八風六氣之邪。爲湯液醪醴。以佐四時五行之正。防其未然。救其已病。然後物各遂其生。民不夭其命矣。又謂非立憲言。不可以福萬世也。於是上法天道。下因地宜。究陰陽之本。明生死之由。考於古而驗之。今取諸己而施之人。定爲成書。著之玉版。藏之金匱。宣之於布政之堂。秘之於靈蘭之室。以俟來哲。以施無窮。其爲仁民愛物之心。斯可謂極矣。然其言至簡。其論至要。其理至深。後世學者。雖有上智。非研精覈慮。則亦未易窺其奧也。故曠代之中。能以斯術鳴世者。時固有之。若夫神聖工巧。獨得先世不傳之秘。如和緩越人。亦不過十餘人而已。况去聖已遠。支分派別。析而爲衆科。業而爲專門。所以人各拘其偏。而莫肯究其全。則益不逮於古矣。積習成常。流弊茲甚。懼大道將

遂於湮微。故聖濟總錄。由是而作焉。上下凡二百餘卷。始終幾二百萬言。逐病分門。門各有方。據經立論。論皆有統。蓋將使讀之者。觀論以求病。因方以命藥。則世無不識之病。病無妄投之藥。唯法有逆從。治有先後。在乎智者。擇其所當。從其所宜而已。究而言之。實醫經之會要。學者之指南。生民之司命也。惜其始成於政和。重刊於大定。既綿歷百年之久。不能無三豕之訛。今主上神極御天。修節制度。治具畢張。以謂是書所載。雖先聖之緒餘。其所以康濟斯民。亦致治之一助也。迺詔江浙行省。刊於有司。布之天下。其或繆戾。隨加釐正。復降德音。俾下臣爲之序引。臣誠愚陋。竊不自量。仰惟聖德如天。甄陶萬類。爰自卽位以來。于年七年。恩浹飛沈。仁及草木。然猶夙夜孜孜。廣求民瘼。或一物不得其所。則必爲之惻然。臣謂此書復出。則上可以輔相天地之宜。下可以永底蒸民之生。物無疵癘。咸躋於仁壽之域矣。

大德四年二月一日集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦養直謹序

方技之書。尚之久矣。聖人治世。亦所不能後者也。若夫黃帝內經。神農本草。秦越人之八十一難經。仲景之三百九十七法。王叔和之脈訣。朱奉議之活人。固在所

# 江序

士君子不能得志於當時。而欲以有用之才。建無窮之業。不得已著書立言。以傳後世。然披藻雕蟲。無關物命。猶之宋人楮葉。終歸無益已耳。范文正公有言。不能作良相。濟天下。亦須作良醫。濟生民。醫固有相之道哉。雖然。投之餌。施之砭。起彼疴羸。厝之康強。而東西朔南。勢難徧及。故活人之術。莫如集古人遺編。公之天下。爲用力勤而施濟溥也。此聖濟總錄一書。余於是不敢棄。且不忍秘也。書故爲先君子鶴誠公增纂。手錄先君子生平著書。不下數十萬言。如纂序四書。說約春秋。宗旨。學者咸津逮焉。然負才未遇。齋志長逝。當時亦必以天下爲己任。而因感於范公之言。不作良相。須作良醫。以岐黃術救諸疾痛患。苦於天下。於是殫精畢智。搜微索隱。參考是書。且集近代驗方。以補其所闕。猶謂襁褓提攜。口不能宣。手不能筆。其急切較倍。而醫治尤難。故幼科五卷。葺遺增略。不惜餘力。先君子之志。可謂切矣。豈意棗梨未登。而松楸隕泣也。嗚呼。先君子之志。不亦可悲哉。余因是益不敢棄。且不忍秘也。於今三十餘年矣。鴛湖程雲來先生見而惜之。惜其書久秘。

而恐終於棄置也。乃爲刪繁撮要。得二十六卷。剗削之工。計一載而成。此先君子志哉。余何幸遇之。粵稽是書。輯於宋政和間。歷金至元。耶律楚材復加纂訂。元以後久無刻本。計元至今已四百年。余因思是書之傳。得先君子而世守之。先君子之志。得程先生而闡發之。由是仲景外感。東垣內傷。河間表熱。丹溪陰虛。諸家之言。莫不咸備。九州千載。按形證以尋病源。察脈候以酌治方。雖人俞跗而家華扁可也。又奚事於隔垣之見。剗腹破臂之詭乎。至原本有鍼灸。有符禁。有乳石發動。有食治。概從刪削。謂素問可以養生。古法不盡掌錄。奇隱之證少。而食性或未宜。勾漏之砂亦不易得也。然是書傳亦可以見先君子之志悲且切。而程先生之功。真足與醫國等也。若余什襲有年。保守無斁。實不敢墜先君子遺緒云爾。詎敢貪天之功以爲世業也與。

康熙二十年歲次辛酉長至日古歛江湘郢上氏謹書於貊其堂中

宋徽宗御製聖濟總錄序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方術者治病之大法。昔者神農氏、黃帝氏、獨觀太初。旁燭妙有。味百藥以辨物。審百疾以全生。其制名其取類。其正君臣。其立佐使。其見於太素玉冊之書。雷公、岐伯之問。蓋皆開神明之蘊。窮陰陽之變。原性命之理。而與天地同其覆載。中古以還。鏤之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠澤被牛馬。所以遺天下後世甚厚。歷年既久。流弊滋甚。糟粕具在。而精意不傳。內經有病名而莫之究。有治法而莫之習。極其妙。至於通仙而莫之悟。人之生也。其位參於天地。其靈貴於萬物。形不盈仞。而心侔造化。崑崙尺宅。修之可以長生。寸田神牖。閑之可以反照。天關神廬。息之可以召和。去土符書金格。鍊丹却粒。御氣凌虛。不假於物。而裕然自足。嗟夫。達士可以神解。昧者且不能養其形。而况於了其心乎。內之五臟六腑。外之九竅四關。著之於色。發之於聲。寓之於三部九候。一失其平。則疾病隨。神聖治於未兆。工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至蹟。非天下之至粗。孰能祐天下之至神。朕憫大道之鬱滯。流俗之積習。斯民之沈痼。

庸醫之妄作。學非精博。識非悟解。五行之數。六氣之化。莫索其隱。莫擬其遠。曰寒曰熱。曰寒熱之相搏。差之毫釐。失以千里。而有餘者益之。不足者損之。率意用法。草石雜進。天枉者半。可勝嘆哉。萬幾之餘。著書四十二章。發明內經之妙。曰聖濟經。其意精微。其旨邁遠。其所言在理。所以探天下之至蹟。又詔天下以方術來上。并御府所藏。頒之。爲補遺一卷。治法一卷。卷凡二百。方幾二萬。以病分門。門各有論。而序統附焉。首之以風疾之變動。終之以神仙之服餌。詳至於俞穴。經絡。祝由。符禁。無不悉備。名之曰政和聖濟總錄。其所載在事。所以祐天下之至神。蓋聖人之誠。世本在於上。末在於下。無見於上。則治之道不立。無見於下。則治之具不行。經之所言者道也。醫得之而窮神。總錄之所載者具也。醫用之而已疾。漢張仲景作傷寒論。而雜之以方。唐孫思邈作千金方。而繼之以翼。以謂不如是。則世莫能用其術。然之二人者。游於方術之內者也。彼超然獨見於方術之外。下顧岐伯之流。而與之議。始可謂知道。朕作總錄。於以急世用。而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下後世。宜致思於忘筌蹄而自得者。俯仰之間。嘖笑之度。御五行之數。運六氣之化。以相天地。以育萬物。至於反營魂而起當生者。豈細事哉。蓋將有來者焉。

勿論其餘千方萬論。歷世所傳。誠不爲不多。然得其全者或寡矣。故近代諸書。獨不若聖濟總錄之詳且備也。聖主以至仁爲心。勤卹民隱。所以首命板行之於天下。非惟重下民今日之命。蓋將有開於先而覺於後也。書曰贊贊襄哉。夫是書之行也。雖本於上意之所注。其所以始而終之者。亦近臣有以贊襄之也。故凡與斯議者。并附於左。

醫愈郎諸路醫學副提舉臣申甫

醫効郎御藥院副使臣王希逸

承直郎太醫院判官臣和思誠

奉訓大夫太醫院判官臣隋有

朝列大夫太醫院副使臣王佐

集賢直學士朝列大夫太醫院副使臣歐陽懋孫

中順大夫太醫院使臣韓公麟

少中大夫同提點太醫院事臣汪斌

嘉議大夫提點太醫院事臣麻惟繇

正議大夫同簽樞密院事左衛親軍都指揮使提點太醫院事臣鄭忙古仄  
昭文館大學士正奉大夫提點太醫院事臣李邦寧  
榮祿大夫平章政事大都護提點太醫院事臣脫因納



# 凡例

一、是書宋徽宗政和。詔集海內名醫。併出御府所藏。彙成共二百卷。禁方祕論。所未聞。按病治療。無不奇驗。厥後再刻於金大定。三刻於元大德。自耶律楚材精較。奉詔頒行天下。越今四百餘年。無有剽削。此書幾幾泯滅矣。余昔從先叔祖敬通夫子。繙閱刻本。今經三十餘年。又從友人江郢上。再觀抄本。撫今追昔。不勝愉快。郢上請余刪繁纂要。以便梓行濟世。因留淮揚一載。纂其精粹。去其繁蕪。共得二十六卷。誠醫家之雲笈瓊函。方藥中之赤文綠字也。博覽者知之。

一、大德重較聖濟總錄。元朝奉詔頒行者。大板大字。每卷首篇署元耶律楚材五字。明朝武林高相國家抄本。用綿紙硃格。繕寫精工。亦依內府式大板大字。今刻小板密字。以便行笈可攜。檢方療病也。

一、是書方法深奧。博學究心者。方能領會。如虛勞紫雪方。有追攝義。霍亂青金散。有劫奪義。熱痢黃連湯。有反佐義。用之皆取效如神。至若調七傷。平五志。攻六氣。理三因。方中有參附。而用硝黃者。有桂附。而用芩連者。必須熟諳古人方經。

庶幾領會方法之妙也。

一、書中婦人門。選其胎前產後。帶漏崩中。小兒門。選其急慢諸風。五疳吐瀉。若一切雜症。與大人治法不殊。於大人方中。推類酌量用之。

一、書中運氣集定六十年。每年可按素問稽查。茲不刻。

一、書中鍼灸四卷。符禁三卷。古法不易行。乳石發動二卷。今人罕此患。又食治三卷。藥食不合宜。俱不刻。

一、方中難得藥品。如金牙、銀牙、礬石、莽草之類。不刻。難合之方。廢時日而不能應。倉卒急需者。亦不刻。

一、方中藥名。仍從原本。如天麻為赤箭。牛旁為惡實。又為鼠粘。甜桔梗為薺芩。山梔為越桃。柴胡為茆胡。土茯苓為接契。香附為莎草根。薄荷為鷄蘇。砂仁為縮砂。蜜花粉為栝樓根。輕粉為膩粉。如此之類。不能更改。

一、方中分兩。古法難用。今欲更改。又失古人之意。大約方中一兩。今用一錢。方中一分。法係二錢五分。今用一字。二分一匕有半錢至五錢者。在人以意消息加

減可也。

一、是書成於北宋。其時四大家未生。劉河間李東垣張子和朱丹溪無一切活套應時方法。補中益氣  
道遙歸脾二陳醫家遇沉痾痼疾疑難奇異等證。用時方而不奏效。良工亦束手者。是書有神方也。

一、聖濟經四十二章。發明靈素精微。鉤玄索隱。補聖經之未備。家有藏本。嗣刻行世。

康熙辛酉桂月靜觀居士程林雲來氏識於淮陰翕順堂中

聖濟總錄纂要 凡例

聖濟總錄纂要目錄

卷一

諸風門

諸風統論

中風

卒中風

肝中風

心中風

脾中風

肺中風

腎中風

攤緩俗名癱瘓

一  
一  
二  
五  
九  
〇  
二  
四  
五  
七

風痺曳

中風四肢拘攣不得屈

伸

風瘳

角弓反張

中風失音

風口噤

風口喎

破傷風

偏風

風偏枯

肉苛

二一  
二二  
二二  
二五  
二六  
二八  
三一  
三一  
三五  
三八  
四一  
四二

歷節風.....四五

中風百節疼痛.....四六

風走注疼痛.....四八

白虎風.....五〇

風不仁.....五二

風瘙癢.....五三

風痞癩.....五五

風瘙癢癭.....五七

卷二

諸風門.....一

蠱風.....一

肌肉瞤動.....三

風癩.....四

風癩.....六

風狂.....一〇

腦風.....一一

風頭眩.....一四

風頭痛.....一七

偏頭痛.....二〇

漏風.....二一

勞風.....二二

風頭旋.....二四

風痰.....二六

胃風.....二八

風秘.....二九

癰瘍風.....三二

白駁.....三三

白癩風……………三五

紫癩風……………三六

惡風……………三八

大風眉鬚墮落……………四〇

大風出蟲……………四二

大風癩病……………四三

烏癩……………四八

白癩……………四九

諸痺門……………五一

諸痺統論……………五一

痛痺……………五二

著痺……………五二

行痺……………五五

皮痺……………五六

肌痺……………五八

血痺……………五九

脈痺……………六〇

筋痺……………六一

骨痺……………六三

腸痺……………六五

周痺……………六六

痺氣……………六八

熱痺……………六九

卷二

傷寒門……………一

傷寒統論……………一

傷寒可汗……………三

傷寒可下	八
傷寒可吐	一一
傷寒可溫	一三
傷寒過經不解	一七
中風傷寒	一九
傷寒濕溫	二二
傷寒時氣	二五
傷寒疫癘	二八
傷寒結胸	二九
傷寒譫語	三二
傷寒潮熱	三五
傷寒煩渴	三七
傷寒煩躁	四〇
傷寒厥逆	四二

卷四

傷寒頭痛	四四
傷寒喘	四七
傷寒上氣	四九
傷寒咳嗽	五〇
傷寒門	一
傷寒乾嘔	一
傷寒嘔噦	三
傷寒心悸	四
傷寒痞滿	六
傷寒霍亂	九
傷寒小便不通	一一
傷寒大便不通	一二



傷寒下利	一四
傷寒陰毒	一七
傷寒陽毒	一九
傷寒發斑	二一
傷寒發黃	二二
傷寒發豌豆瘡	二六
傷寒發狂	二七
傷寒剛瘧	二九
傷寒柔瘧	三〇
傷寒壞病	三二
傷寒狐惑	三三
傷寒百合	三六
傷寒陰陽易	三八
傷寒衄血	四〇

傷寒吐血	四三
傷寒瘀血	四四
傷寒口舌生瘡	四六
傷寒舌腫脹	四七
傷寒咽喉痛	四八
傷寒毒攻手足	四九
傷寒後夾勞	五一
傷寒後勞復	五三
傷寒後骨節煩疼	五四
傷寒後虛煩	五五
傷寒後盜汗	五八
傷寒後驚悸	五九
傷寒後失音不語	六〇
傷寒後咽喉閉塞不通	六二

卷五

傷寒後變成瘧	六四
傷寒後脚氣	六五
傷寒後利下膿血	六七
傷寒後蠱瘡	六八
辟瘟疫令不相傳染	七一
瘧疾門	一
諸瘧統論	一
寒瘧	二
溫瘧	五
寒熱往來瘧	六
瘧瘧	七
間日瘧	九

痰瘧	一一
痰瘧	一一
勞瘧	一三
久瘧	一七
鬼瘧	一八
瘧母	一九
瘧疾發熱身黃小便不利	二一
瘧痢	二三
瘧氣	二四
瘧瘧	二七
中喝門	二九
中喝統論	二九
中熱喝	三〇

中噎悶絕……………三二

霍亂門……………三四

霍亂統論……………三四

霍亂吐利……………三五

霍亂嘔吐不止……………三七

霍亂四逆……………三九

霍亂心腹痛……………四〇

乾霍亂……………四一

中惡霍亂……………四三

霍亂乾嘔……………四四

霍亂轉筋……………四五

### 卷六

泄痢門……………一

泄痢統論……………一

水瀉……………二

濡瀉……………四

飧泄……………五

洞泄寒中……………六

鶩溏……………七

白滯痢……………八

冷痢……………九

熱痢……………一一

赤痢……………一二

血痢……………一三

膿血痢……………一五

赤白痢……………一七

氣痢……………二一

休息痢……………二四

蠱痢……………二六

久痢……………二七

下痢裏急後重……………二九

痢後脫肛……………三〇

疝蠱……………三二

濕蠱……………三三

### 卷七

咳嗽門……………一

咳嗽……………一

暴嗽……………三

久嗽……………四

冷嗽……………六

熱嗽……………八

呷嗽……………九

五臟諸咳嗽……………一

咳嗽上氣……………一四

咳嗽唾膿血……………一七

咳嗽失聲……………二〇

風冷聲嘶……………二二

諸氣門……………二三

諸氣統論……………二三

上氣……………二五

上氣喉中如水雞聲……………二六

短氣……………二七

陽厥……………二八

積聚門……………三〇

積聚統論……………三〇

積聚……………三〇

肥氣……………三三

伏梁……………三五

痞氣……………三六

息貫……………三八

貫豚……………三九

諸癥……………四二

結瘕……………四三

疝氣……………四四

酒癖……………四六

### 卷八

吐血門……………一

吐血統論……………一

吐血不止……………四

嘔血……………六

唾血……………七

舌上出血……………八

汗血……………九

鼻衄……………一

衄不止……………一三

大衄……………一六

衄蟻汗血……………一七

脚氣門……………一九

脚氣統論……………一九

風毒脚氣……………一九

脚氣痺攣……………二三

脚氣疼痛不仁……………二二五

脚氣上氣……………二二七

脚氣腫滿……………二二九

脚氣心腹脹滿……………三一

脚氣衝心……………三二

脚氣語言蹇澀……………三七

乾濕脚氣……………三八

脚氣變成水腫……………四〇

脚氣大小便不通……………四二

江東嶺南瘴毒脚氣……………四三

脚氣雜治膏藥淋瀝等……………四五

卷九

膈氣門……………一

膈氣統論……………一

五種膈氣……………二

膈氣嘔逆不下食……………五

膈氣痰結……………六

嘔吐門……………七

嘔吐統論……………七

嘔吐……………八

乾嘔……………一〇

痰飲門……………一

痰飲統論……………二

痰癖……………三

支飲……………四

留飲……………五

冷痰……………七

熱痰……………一九

膈痰積實……………二一

膈痰風厥頭痛……………二二

消渴門……………二四

三消統論……………二四

消渴……………二五

消渴煩躁……………三〇

消渴小便白濁……………三一

久渴……………三三

消渴後成水……………三四

消渴後成癰疽……………三五

消中……………三七

消腎……………三九

卷十

水病門……………一

水病統論……………一

水腫……………二

十水……………三

風水……………六

石水……………七

大腹水腫……………九

水腫欬逆上氣……………一〇

水氣徧身腫滿……………一二

水蠱……………一四

膜外氣……………一六

卷十一

黃疸門……………一

黃疸統論……………一

黃疸……………二

急黃……………五

陰黃……………七

酒疸……………八

穀疸……………一〇

胃疸……………一一

黑疸……………一二

女勞疸……………一三

黃汗……………一四

三十六黃……………一六

胸痺門……………一七

胸痺統論……………一七

胸痺……………一七

胸痺噎塞……………一九

胸痺心下堅痞急……………一九

胸痛……………二一

卷十一

心痛門……………一

心痛統論……………一

心痛……………二

卒心痛……………五

久心痛……………七

肝心痛……………九

脾心痛……………一〇

胃心痛……………一一

腎心痛……………一二



厥心痛……………一三

九種心痛……………一四

停飲心痛……………一七

蟲心痛……………一八

冷氣心痛……………二〇

中惡心痛……………二一

惡注心痛……………二二

心掣……………二三

心腹門……………二四

心腹痛……………二四

腹痛……………二六

久腹脹……………二八

腹脹腸鳴切痛……………二九

腹內結強……………三〇

膜脹……………三二

臑脹……………三三

脅肋痛……………三四

息積……………三五

腰痛門……………三七

腰痛統論……………三七

腰痛……………三七

卒腰痛……………三八

風濕腰痛……………三九

腰痛強直不能俛仰……………四〇

腰脚冷痺痛……………四二

卷十二

虛勞門……………一

✓ 虛勞統論

一

✓ 肝勞

二

心勞

四

✓ 脾勞

六

肺勞

八

腎勞

〇

冷勞

一

熱勞

二

氣勞

四

急勞

六

風勞

七

✓ 虛勞咳嗽

九

✓ 虛勞痰飲

〇

✓ 虛勞寒熱

一

✓ 虛勞潮熱

二二

虛勞盜汗

二四

虛勞咳嗽膿血

二五

虛勞嘔吐血

二七

✓ 虛勞不得眠

二八

虛勞失精

三〇

虛勞小便白濁

三二

白淫

三四

筋極

三六

氣極

三七

脈極

三七

肉極

三八

骨極

三九

精極

四〇

卷十四

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

骨蒸肺痿

傳尸骨蒸

傳尸勞

諸疝門

寒疝

心疝

厥疝

寒疝心腹痛

七疝

蠱病

..... 一

..... 一

..... 七

..... 九

..... 三

..... 四

..... 四

..... 六

..... 七

..... 八

..... 〇

..... 二

卷十五

陰疝門

陰疝統論

陰疝

陰疝腫縮

陰疝卒腫痛

控鞞

大小便門

大小便統論

大小便關格不通

小便不通

小便不禁

小便利多

..... 二二

..... 三三

..... 三三

..... 二六

..... 二七

..... 二八

..... 一

..... 一

..... 二

..... 四

..... 六

..... 九

小便出血.....一一

大便祕澀.....一四

結陰.....一八

諸淋門.....二〇

諸淋統論.....二〇

卒淋.....二〇

冷淋.....二二

熱淋.....二四

氣淋.....二五

血淋.....二六

膏淋.....二八

石淋.....二九

勞淋.....三一

九蟲門.....三二

九蟲統論.....三二

九蟲.....三三

虻蟲.....三四

寸白蟲.....三六

蟯蟲.....三八

五臟蟲.....三九

三蟲.....四三

諸尸門.....四五

諸尸統論.....四五

諸尸.....四五

遁尸.....四七

飛尸.....四七

尸注.....四八

諸注門.....四九

卷十六

諸注統論	五〇
諸注	五一
風注	五一
走注	五三
鬼注	五三
氣注	五五
卒魘不寤	五六
中惡	五八
卒死	五九
尸厥	六〇
鬼魅	六一
鬼擊	六二

臟腑虛實門 ..... 一

肝脹 ..... 一

肝氣逆面青多怒 ..... 二

膽腑門 ..... 四

膽虛 ..... 四

膽實 ..... 五

膽虛不得眠 ..... 六

膽熱多睡 ..... 八

膽瘰 ..... 九

心臟門 ..... 一〇

心中寒 ..... 一〇

心健忘 ..... 一一

善笑 ..... 一三

小腸腑門 ..... 一五

小腸虛 ..... 一五

小腸實 ..... 一六

脾臟門 ..... 一七

脾瘰 ..... 一七

穀勞 ..... 一九

胃腑門 ..... 二〇

食飢 ..... 二一

胃反 ..... 二二

噦 ..... 二五

噫醋吞酸 ..... 二六

胃寒腸熱 ..... 二八

胃熱腸寒 ..... 二九

肺臟門 ..... 三一

肺消 ..... 三一

膈消 ..... 三二

肺痿 ..... 三三

肺痿咽燥 ..... 三五

肺痿小便數 ..... 三七

肺癰 ..... 三八

肺癰喘急肱滿 ..... 四〇

大腸腑門 ..... 四一

腸垢 ..... 四二

虛癢 ..... 四二

腎臟門 ..... 四三

腎虛 ..... 四三

腎實 ..... 四七

腎脹 ..... 四八

解飢 ..... 四九

瘡俳……………五〇

腎虛陽痿……………五一

腎虛多唾……………五三

骨虛實……………五四

髓虛實……………五五

膀胱腑門……………五六

胞痺……………五六

胞轉……………五七

### 卷十七

面體門……………一

面黧黯……………一

面疝炮……………三

面皴皯……………四

面皴……………五

面體疣目……………六

狐癩……………七

滅癩痕……………九

髭髮門……………一一

眉鬚髭髮統論……………一一

烏髭髮……………一二

鬚髮黃白……………一三

白禿……………一四

赤禿……………一四

眼目門……………一六

眼目統論……………一六

肝虛眼……………一七

肝實眼……………一八

目胎赤……………二〇

目赤痛……………二二

目熱礮痛赤腫……………二四

目赤爛……………二五

目血灌瞳人……………二七

赤脈衝貫黑睛……………二八

墜睛……………二九

蟹目……………三〇

目珠子突出……………三二

目見黑花飛蠅……………三三

息肉淫膚……………三五

目生贅肉……………三七

目內生瘡……………三九

目膿漏……………四〇

目生珠管……………四一

雀目……………四二

目瞼垂緩……………四四

目瞼腫靨……………四六

倒睫拳攣……………四七

卷十八

眼目門……………一

目生膚翳……………一

目生花翳……………三

目青盲……………四

將變內障眼……………六

目眇膜……………八

眯目……………一〇



鍼眼	.....	一一
耳病門	.....	一一
耳病統論	.....	一三
耳聾	.....	一三
風聾	.....	一七
勞聾	.....	一八
五聾	.....	二〇
耳聾有膿	.....	二〇
✓耳虛鳴	.....	二二
耳聾	.....	二五
聾耳	.....	二六
百蟲入耳	.....	二七
鼻病門	.....	三〇
鼻病統論	.....	三〇

卷十九

鼻塞氣息不通	.....	三一
✓鼻塞不聞香臭	.....	三二
艷鼻	.....	三四
✓鼻中生息肉	.....	三五
✓鼻淵	.....	三六
鼻流清涕	.....	三七
鼻中生瘡	.....	三九
疳蟲蝕鼻生瘡	.....	四〇
口齒門	.....	一
口齒統論	.....	一
口瘡	.....	二
口糜	.....	五

口吻瘡……………六

口舌生瘡……………七

口瘡……………八

唇瘡……………一〇

唇生核……………一一

重舌……………一三

舌腫強……………一三

牙齒歷蠱……………一五

牙齒疼痛……………一六

齒齲……………一七

蟲蝕牙齒……………一九

腎虛齒風痛……………二一

齒風腫痛……………二二

齒斷腫骨附……………二三

風疳……………二四

齒間出血……………二五

齒齲……………二六

牙齒動搖……………二七

咽喉門……………二八

咽喉統論……………二八

喉痺……………二九

馬喉痺……………三一

咽喉生癰……………三二

尸咽喉……………三四

咽喉中如有物妨悶……………三五

骨鯁……………三七

誤吞諸物……………四〇

癭瘤門……………四一

卷二十一

五癭……………四一

諸瘤……………四二

瘰癧門……………四三

瘰癧結核……………四三

瘰癧寒熱……………四五

瘰癧久不差……………四六

癰疽門……………一

癰疽統論……………一

附骨癰……………四

乳癰……………五

腸癰……………八

胃脘癰……………一〇

附骨疽……………一一

瘡腫門……………一三

諸瘡……………一三

諸惡瘡……………一六

反花瘡……………一七

浸淫瘡……………一八

下注瘡……………二〇

冷瘡……………二二

月蝕瘡……………二三

凍爛腫瘡……………二四

癩瘡今之膿瘡……………二六

漆瘡……………二七

湯火瘡……………二九

卷二十一

瘡腫門……………一

丁腫……………一

諸疥……………三

諸癬……………六

代指即天蛇頭……………七

諸丹毒……………九

癩瘡……………一

肉刺……………二

金瘡門……………三

金瘡血不止……………三

金刀傷中筋骨……………五

金瘡中風水及瘰……………六

金瘡腸出……………八

毒箭所傷……………九

箭鏃金刃入肉……………二〇

狐尿刺……………二二

惡刺……………二三

竹木刺傷肌肉不出……………二四

痔瘻門……………二六

諸痔……………二六

牡痔……………二七

牝痔……………二八

脈痔……………二九

血痔……………三〇

腸痔……………三二

氣痔……………三四

痔瘻……………三四

腸風下血……………三五

傷折門	三
傷折統論	三八
▽從高墜下傷損腫痛	三八
▽傷折惡血不散	四〇
▽筋骨傷折疼痛	四一
▽傷折風腫	四四

卷二十一

傷折門	一
打撲損傷	一
被傷絕筋	三
諸骨蹉跌	四
傷損止痛生肌	四
傷折貼燻并膏藥	六

雜療門	一
中藥毒	一〇
食毒	一〇
食諸菜蕈菌中毒	一一
飲酒中毒及大醉不解	一二
食牛馬猪犬魚蟹中毒	一四
解金銀銅鐵石毒	一七
蠱毒	一九
獺犬齧	二二
蛇螫	二三
諸蟲齧	二五
溺水死 <small>附自縊死</small>	二七

卷二十二



婦人門……………一

氣血統論……………一

婦人月水不通……………一

婦人月水不斷……………二

婦人月水來腹痛……………四

室女月水不通……………六

帶下……………八

漏下……………一一

經血暴下脚血……………一三

經血暴下兼帶下……………一六

婦人血分……………二〇

婦人水分……………二一

婦人無子……………二二

妊娠門……………二四

妊娠惡阻……………二四

妊娠漏胎……………二六

妊娠胎動下血……………二八

妊娠胎萎燥……………三〇

妊娠胎不長養……………三二

妊娠嘔逆不下食……………三三

妊娠咳嗽……………三四

妊娠傷寒……………三五

妊娠下痢……………三七

妊娠子淋……………三九

妊娠浮腫……………四〇

妊娠小便不通……………四二

妊娠大小便不通……………四三

妊娠半產……………四四

妊娠數墮胎……………四五

卷二十一 四

產難門……………一

逆產……………一

難產……………四

子死腹中……………七

息胞即胞衣不出……………一

產後門……………一四

產後血暈……………一四

產後語言妄亂……………一五

產後中風……………一七

產後中風口喎……………一九

產後中風角弓反張……………二一

產後蓐勞……………二二

產後大便不通……………二四

產後乳汁不下……………二七

產後妬乳……………二九

產後乳結核……………三〇

產後乳結癰……………三一

卷二十二 五

小兒門……………一

小兒初受氣法……………一

小兒相法……………二

浴兒法……………二

口噤……………二

撮口……………三

✓ 鵝口	.....	四
重睛	.....	五
臍風	.....	六
解顛	.....	七
顛陷	.....	八
急驚風	.....	九
慢驚風	.....	一一
天癆	.....	一三
諸疔	.....	一四
無辜疔	.....	一七
哺露丁奚	.....	一九
嘔吐	.....	二〇
噦吐塊	.....	二三
泄瀉	.....	二四

卷二十六

洞泄注下	.....	二五
燕口瘡	.....	二七
語遲	.....	二八
齒不生	.....	二九
涎液不收	.....	三〇
神仙服餌門	.....	一
神仙服草木藥石	.....	一
補益門	.....	七
平補	.....	七
峻補	.....	〇
補虛益氣	.....	一
補虛益精髓	.....	一三



# 聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

## 卷一

### 諸風門

#### 諸風統論

論曰。易曰。撓萬物者。莫疾乎風。夫以吹噓鼓舞。異而易入。枯者榮者。成物之功。實在於是。然而分四時。位八方。適應其時。則爲正。弗循其方。則爲邪。人惟萬物之靈。能察諸此。觀冬至之日。有從南方來。必曰賊風。其他可類推矣。感之淺者。留於肌膚。感之深者。達於骨髓。而况倉卒頃刻之間。大可畏懼。因有治療所不迨者。蓋禍患之機。藏於細微。非常人所豫見。及其著也。雖智者不能善其後。是以上古聖人

之教下。皆謂之虛邪賊風。避之有時。不然。何以言風者。百病之始。風者百病之長。風者善行而數變。先聖之言。可深思之。

### 中風

論曰。風邪中人。以春甲乙得之爲肝風。以夏丙丁得之爲心風。以季夏戊己得之爲脾風。以秋庚辛得之爲肺風。以冬壬癸得之爲腎風。若中其五臟六腑之俞。則各隨其證而治之。人生自幼穉。至於老耄。率多因風而致疾。或嗜食傷飽。或不食失飢。或渴而失飲。或飲而過量。或因五味之傷。或冒熱衝風。或大寒近火。或暴露寒溼。或刺損肌膚。撲傷肢體。或失節宜。或多嗜慾。緣此風趨諸竅。或留一偏。遂使手足不隨。言語蹇澀。或痛連骨髓。或痺襲皮膚。瘙癢如蟲行。癢痺如錢石。或多痰好睡。或健忘多嗔。血脈不行。肉色乾瘦。久在牀枕。起便須人。語澀面浮。精神困耗。皆其證也。

附子湯方 治中風欲死。身體緩急。目不得開。舌強語澀。

附

子

破去皮臍  
製一枚

芍

藥

甘

草

麻

黃

去根節  
先煎  
去沫焙

白朮雨各一

防風去又

防己雨各半

人參

黃芩去心

桂去皮

獨活去蘆

芎藭雨各一

天雄炮製去皮  
臍一枚

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生薑半分切。煎至八分去滓。空心日午夜臥各溫服。如人行五里。以熱生薑粥投之。微汗出。慎外風。

麻黃湯方 治中風肢體弛緩。言語蹇澀。精神昏愦。

麻黃去根節先煎掠  
去沫焙三兩

桂皮去粗

獨活去蘆

羚羊角鎊各三分

姜蕤切焙一兩

葛根剉三兩

升麻

防風去叉各半

石膏碎六兩

甘草炙剉三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。如人行五里。再服。用熱生薑稀粥投。汗出。慎外風。

薏苡仁湯方 治中風肢體緩縱。精神恍惚。言語蹇澀。

薏苡仁炒五兩

姜蕤切焙

茯神去木各三兩

犀角鎊二兩

烏梅七枚

麥門冬去心焙三合

右六味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生薑半分切。煎至八分去滓。入竹瀝。白蜜各少許。再煎三五沸。食後日午夜臥各一服。  
吐痰白礬散湯。治初中風。失音不語。昏昧不知人。先宜吐風痰。令省覺。次可服諸湯散。

白礬二兩

生薑一兩連皮搗碎水二升煎取一升二合

右二味。先細研白礬如末。入濃煎生薑湯。研濾分三服。旋旋灌。須臾吐出痰毒。眼開風退。方可救治。若氣衰力弱。不宜猛性藥吐之。

防風湯方。治中風不語。兩目不開。手足抽掣。發歇往來。昏塞涎潮。

防風去叉

羚羊角鑄

獨活去蘆

赤箭即天麻苗無

當歸切焙

麻黃去根

杏仁湯浸去

桂去皮各

前胡去蘆

秦艽去苗

甘草各半

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一大盞。生薑半分切。煎至七分去滓。不計時溫服。

取涎丸方。治中風不語。喉中如拽鋸。口中沫出。

天南星

大者一枚去浮皮剉中作坑入醋令入分滿四面用火逼醋乾黃色剉

藜蘆一分

右二味搗研為末用麵糊丸如桐子大每服三丸溫酒下良久吐出痰涎為效吐不止用冷葱湯呷即止

羚羊角丸方 治中風手足瘡痺行履艱難

羚羊角屑

桂皮去粗

白檳榔煨剉

五加皮剉

杏仁去皮尖炒黃

人參

丹參

柏子仁

枳殼去瓢炒

附子製炮去皮半茯苓各兩

神去木

防風去叉

熟乾地黄焙

麥門冬去心焙各二兩

南木香

牛膝酒浸切焙各一兩

薏苡仁二兩半

右一十七味搗羅極細鍊蜜為丸梧桐子大每服空心溫酒下三十丸日二服

### 卒中風

論曰內經謂邪風之至疾如風雨言邪之迅速如此卒中風之人由陰陽不調腑臟大虛氣血衰弱榮衛乏竭故風之毒邪尤易乘間致仆倒悶亂語言蹇澀痰涎

壅塞。肢體癱痺。不識人事者此證也。

奪命散方。法中風卒倒。不省人事。口面喎斜。失音不語。但吐涎沫。或口噤不開。目膜垂死。一切風疾。

黑豆一合

烏雞糞

馬牙硝研

龍

膽去蘆頭剉碎一分

共四味。先將雞糞及豆同炒熟。次入龍膽馬牙硝拌勻。以酒三盞煎二盞去滓。分三服。不拘時候溫服。

救生散方 治卒中風。

白礬

半夏

天南星三分

同為細散。每服以好酒一鍾。藥末二錢匕。生薑三片煎七分。通溫灌之。當吐涎。扶令正坐。經一復時。不得令臥。如臥則涎難出。良久再依法煎藥一錢。後常服。只半錢。

箠竹瀝飲方 治卒中風倒悶。口噤不能語。昏不知人。鍼不知痛。

箠竹瀝五合

防風

甘草

桂各一兩

防己

麻黃

白朮

人參

黃芩

細辛

茵芋

秦艽去土

附子去皮臍各二兩

生薑焙乾三兩

除竹瀝外。剉麻豆。每服五錢匕。水一鍾半。竹瀝一合。同煎至一盞。去滓。溫服。不拘時。

羌活湯方。治卒中風悶亂。語言蹇澀。牙關緊急。

羌活

桑根白皮

麻黃

天雄去皮臍

當歸各二兩

桂

旋復花炒

遠志各一兩

大腹皮

甘草

芎藭

威靈儂

枳殼去瓢炒

菖蒲各一兩

杏仁湯浸去皮二十一枚

剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生薑三片。煎至八分。去滓。溫服。不拘時。

阿膠丸方。治腑臟久虛。氣血衰弱。卒中風邪。及攤緩等疾。

阿膠炙令燥

蟬殼去土

犀角屑

麝香三錢

白花蛇三分

桂一兩

白鮮皮

白僵蠶炒

天南星

半夏酒浸三日炒

天麻

桔梗

黃 蓆

當 歸

羌 活

虎頭骨酥炙

海桐皮

白 芷

白 茯苓

附 子去皮

防 風

芎 藭

麻 黃各一兩

乾 蠍去尾用糯米炒四十二枚

人 參

沒 藥各半兩

木 香一兩

羚羊角屑半兩

乾 薑四錢

烏 蛇酒浸去皮骨三分

共細剉。焙乾搗為末。鍊蜜為丸。如彈子大。每服一丸。生薑酒嚙下。中風甚者。拗開口。或先以嚏化藥。灌下一丸立省。

牛黃丸方

治卒中風仆倒悶亂。語言蹇澀。涎痰壅盛。

牛 黃

盧 會

天竺黃

血 竭

沒 藥

丹 砂俱研

續隨子

皂莢灰各半兩

丁 香

木 香

乾 蠍去土炒

粉 霜

雄 黃

甘 遂各一分

麝 香二錢

肉豆蔻二枚

檳 榔二枚

龍 腦一字

共搗研為末。每抄藥末四錢。入輕粉三錢。再研勻。麵糊為丸。如黍米大。每服五



丸。金銀薄荷湯下。隨大小加減。一方添天麻一兩。酒浸炙為末。研勻丸如小彈子大。凡中風用冷水化下一丸立效。些小風寒。每服半丸。小兒驚風一丸。分作六服。並用冷水化下。旗後牛黃丸并局牛黃丸不同。

### 肝中風

論曰。內經謂以春甲乙中風為肝風。肝風之狀。多汗惡風。善悲噉乾。善怒。時憎女子者。有頭目暈。兩脅痛。行常僂僂。嗜甘。如阻婦狀者。有但踞坐。不得低頭。兩目連額色微青。唇青面黃者。治法宜灸肝膈。後以藥治之。

排風羌活散方。肝藏中風。筋脈拘攣疼痛。

羌活 去蘆頭 一兩半

天麻 二兩

芎藭 一兩

酸棗仁 兩半 炒

薏苡仁 一兩

鹿角膠 兩 炙

蔓荊實 三分 去皮

羚羊角 兩半 銹

桂枝 一兩

人參 一兩

白附子 兩 製

牛膝 兩 酒浸焙

烏蛇 炙用 肉三寸 酒浸

犀角 分 銹三

白鮮皮 兩 剉

地骨皮 兩 剉

柏子仁 一兩 生用

右一十七味。搗羅爲散。以豆淋酒調下一錢匕。漸加至二錢匕。日三夜一。升麻湯方。治肝虛中風。頭痛目眩。胸中客熱。氣壅衝心煩悶。

升麻

前

胡

去蘆頭各一兩五錢

玄

參

地骨皮

各一兩

羚羊角

屑

葛

根

各二兩

酸棗仁

一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓。入竹瀝半合。重煎三兩。沸放溫。食後服。如人行五六里。更進一服。

### 心中風

論曰。心中風之狀。多汗惡風。焦燥善怒。嚇赤色。病甚則言不快。診在口。其色赤。夫心受風。風盛則生熱。熱甚則汗不止。心之液爲汗故也。汗多則腠理疎。疎則真邪相薄。是以惡風。又心惡熱。熱極則脣焦。內燥多怒。心之聲爲言。病甚則言不快。心氣通於舌故也。又其證胸背拘急。不可傾側。面赤頭痛。翕翕發熱。不能安臥。以心主血脈。其風日久。隨榮衛行。內外相搏。蘊積而然也。辰砂天麻丸方。鎮養心神。擒截諸風。和流榮衛。滋潤筋絡。開通關膈。肥密表腠。

丹 砂半兩

天 麻一兩

半 夏湯煑乾

天南星各半兩

蠍 梢一分炒

白附子半兩

白僵蠶炒

牛 黃研各半兩

蓬 砂一分研入

麝 香一分研入

共為末。水煎麵糊為丸。如梧桐子大。每服三十九。荆芥湯下。不計時候。

烏犀散方 治心中風。精神冒悶。語聲錯誤。恍惚多驚。

烏犀角二兩

丹 砂研

獨 活去蘆頭

丹 參

遠 志去心

人 參

蔓荆子

防 風

共搗羅為散。每服二錢匕。食後酒調下。日三服。

人參丹砂丸方 治中風恍惚驚悸。安神志化痰涎。

人 參

丹 砂研各二兩

紫石英研

白石英

龍 腦

細 辛去枝

赤 箭

天門冬去心

遠 志去心

生乾地黃焙

菖 蒲九節者米泔浸切焙各一分

白茯苓去皮

犀 角鑿

沙 參

防 風去叉各半兩

麝 香研半

共搗研為末。鍊蜜丸如小鷄頭大。每服一丸。溫酒嚙下。不拘時候。

### 脾中風

論曰。脾風之狀。多汗惡風。身體怠惰。四肢不欲舉。色薄微黃。不嗜食。診在鼻上。其色黃。又曰踞而腹滿。身通黃。吐鹹汁。又曰翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮肉間動。短氣。脾裨諸臟。灌四旁者也。所主四肢。故脾中風。則身體怠惰。四肢不欲動。脾者倉廩之官。故病則不嗜食。診在鼻中央之位也。其色黃。黃土之色也。煩重發熱。脾風之候也。形如醉人者。邪氣之甚也。

獨活

治脾臟中風。肢體緩弱。言語不利。翕翕發熱。

麻

黃去節先煎掠

防

風去一兩又各

白茯苓去皮

人參

羚羊角鎊

前

胡去蘆

沙參去蘆

旋復花

黃

半

夏湯洗七

附子炮製去皮

甘草炙半

共剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。入生薑汁半分切。同煎取七分。去滓溫

服不拘時。日三服。

秦芫湯方 治脾臟中風。身體拘急。舌強不能語。

秦芫去苗土

麻黃去根節沸湯掠去沫焙乾

石膏各一兩

獨活

赤茯苓去皮

山萸

芎藭

防風

桂

白朮

人參

防己

附子炮製去皮

杏仁去皮尖熬各三分乾

薑

甘草炙

細辛去苗葉各半兩

共剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓溫服。不拘時候。

羚羊角丸方 治脾臟中風。口面偏斜。語言蹇澀。虛煩。手臂腰脚不隨。

羚羊角屑

防己

白芍藥

獨活去蘆頭

白茯苓去黑皮

防風

酸棗仁微炒

杏仁去皮尖雙仁炒黃

麥門冬去心焙各三分

人參

芎藭

柏子仁炒

檳榔剉

桂皮去粗

當歸切焙各半兩

附子

薏苡仁

熟乾地黄焙各一兩

共搗羅爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下三十丸。

### 肺中風

論曰。肺中風之狀。多汗惡風。色皎然白。時效短氣。晝日則差。暮則甚。診在眉上。其色白。又曰燥而喘。身運而重。冒而腫脹。偃臥則胸滿短氣。冒悶汗出。夫熱生風。風盛則熱。腠理開多汗者。熱甚故也。風薄於內。所以惡風。皎然而白金之色也。在變動爲效。又肺主氣。故時效短氣也。風陽也。陽晝則在表。暮在裏。陽裏而風應之。故暮則甚也。診在眉上。其色白。肺之色也。身運而重。風使然也。喘而腫脹。偃臥而胸滿短氣。以肺主氣故也。

羚羊角丸方 治肺中風氣急。背項強鞭。語聲嘶敗。

羚羊角二兩

白鮮皮五錢

升麻

蔓荊實

惡實炒

枳殼一兩

天麻白者

秦芫

共搗羅爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。食後煎桑白皮湯下十五丸。日三服。  
薺芫湯方 治肺中風。項強鼻塞。語聲不出。喘鳴肩息。胸滿短氣。

薺 芩二兩

防 風

人 參各一兩

獨 活

細 辛

赤 箭

芎 藭

羚羊角各五錢

麻 黃二兩

桔 梗剉炙

前 胡去蘆

蔓 荆實

白 鮮皮各五錢

甘 草

石 膏各一兩

共細搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓溫服。食後臨臥服。

### 腎中風

論曰。腎風之狀。多汗惡風脊痛。不能正立。其色黃。隱曲不利。診在肌上。其色黑。夫身之本在腎。受五臟六腑之精氣。以養百骸九竅。腎受風。則諸陽之氣不上。至於頭面。故有面癢然浮腫之證。陽氣虛者。則多汗惡風。腎主骨。骨不強。則脊痛不能立。精神衰弱。則隱曲之事不利。肌上黑如皂色。又踞而腰疼。不可俛仰。或為冷痺。或為偏枯。耳鳴聲濁。志意昏沉。善恐多忘。皆腎風證也。

海桐皮散方。治腎中風。踞而腰痛。脚腫疼重。耳鳴面黑。志意不樂。

海桐皮剉

五加皮去粗剉

草 薺炒

薏苡仁各一兩

虎骨真酥炙

枳殼

赤芍藥

牛膝去苗酒浸切

惡實炒半

防風

續斷

杜仲去皮炒

郁李仁湯退去皮尖雙仁炒熟 乾地黄一兩

共搗羅為散。每服二錢匕。溫酒調下。漸加至三錢匕。空腹。食前各一服。

杜仲丸方 治腎中風。腰脚不隨。骨節痠疼。筋脈拘急。行履艱難。兩脅牽痛。

杜仲去皮剉

牛膝去苗酒浸切 薺半

酸棗仁一兩

當歸三分

防風一兩

丹參三分

赤芍藥半兩

桂半兩

肉蓯蓉酒浸切

石斛三分

附子五錢

郁李仁湯浸去皮三分

檳榔煨一兩

共搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服空腹用溫酒下三十九。

防風湯方 治腎中風。腰脚痠痺不仁。骨髓痠疼。不能久立。漸覺消瘦。

防風五錢

羌活一兩

黃芪二兩

五加皮五錢

牛膝去苗酒浸切

丹參一分

酸棗仁一合

桂五錢

赤芍藥五錢

麻黃去節煎掠

檳榔煨一兩



當歸一切焙一兩

木通五錢

共粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。至七分去滓。空心服。及晚食前服。

石斛浸酒方。治腎中風注。腰脚痺弱。利關節。堅筋骨。除頭面遊風。補虛勞。益氣

力。

石斛去根廿四兩

黃芪五錢

丹參二兩

牛膝去苗二兩

人參五錢

杜仲去粗皮炒

五加皮

白茯苓二兩

枸杞子升炒半

山茱萸

山藥

萹藨炒二兩

防風五錢

天門冬去心焙三兩

生薑三兩

細辛去苗葉輕炒一兩

薏苡仁半升

共細剉如麻豆。用生絹囊盛。以酒五斗。於淨瓷器中浸七宿。初溫服三合。日三夜一。漸加至六七合一升許。令常有酒氣。不至大醉。

攤緩俗名癱瘓

論曰。攤緩之辨。攤則懈惰而不能收攝。緩則弛縱而不能制物。故其證四肢不舉。

筋脈關節無力。不可收攝者。謂之攤。其四肢雖能舉動。而肢節緩弱。憑物不能運用者。謂之緩。或以左為攤。右為緩。則非也。但以左得之病在左。右得之病在右耳。推其所自。皆由氣血內耗。肝腎經虛。陽陰偏廢而得之。或有始因他病。服吐下之藥過度。亦使真氣內動。榮衛失守。一身無所稟養而致然也。

紫金天麻丸方 治中風攤緩手足躄曳。

天麻

沒藥研

乳香研

牛膝酒浸

白朮

當歸各半兩

牛黃研三分

犀角一兩

附子去皮臍三分

五靈脂二兩

共十味為末。取三家井華水。丸如櫻桃大。每服一丸。先用生薑汁化開。次用酒調下。如中風攤緩。手足躄曳。寒澀。口眼喎斜。不省人事。口吐涎沫。或手足搐掉。骨筋疼痛。皮肉麻痺。並宜服之。

天麻浸酒方 治攤緩風。不計深淺。久在牀枕。

天麻半兩

松節剉一兩

龍骨

虎骨酒浸

骨碎補半兩

敗龜醋炙一兩

烏蛇酒浸去皮骨

白花蛇酒浸去皮骨

惡實根各半

附子去皮臍一枚

羌活

獨活去頭

牛膝酒浸各半

當歸

芎藭各一兩

大麻仁二兩

熟乾地黄浸半兩

茄子根二兩

原蠶沙炒二兩

共十九味。哎咀如麻豆。用酒二斗浸。密封。春夏三日。秋冬七日。每服一盞。不拘時候溫服。

虎骨丸方 治攤緩風。手足不隨。口眼喎斜。頭目昏重。腰膝少力。及風氣凝滯。筋

骨疼痛。

虎脛骨酥炙半兩

當歸一兩

赤箭半兩

安息香酒浸半兩

海桐皮

獨活

牛膝酒浸各一兩

肉蓯蓉酒浸一兩

金毛狗脊去皮

續斷各半兩

草薢

烏頭去臍

芎藭各一兩

甜瓜子

仙靈脾

乳香研各半兩

防風

天麻

石斛去根各一兩

酸棗仁去皮

黃松節酒炒

細辛各半兩

共二十二味。除別研外。為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。酒下。或荆

芥湯不拘時。

天麻丸方 治風氣攤緩等疾。

天麻二兩

玄參

防風

地榆

乾浮萍紫背者洗焙

薄荷

烏頭去皮

牛膝酒浸各一兩

不艸肥皂莢五挺就地坑內燒成黑及糞碗合定候冷用半兩細研入諸藥

牛黃

龍腦各一錢別研

共十一味除別研外為細末和勻鍊蜜和杵百餘下丸如雞頭大每服一丸溫

酒下。

牛黃丸方 治一切風及攤緩言語蹇澁搜風鎮心。

牛黃一分

龍腦一錢

麝香一錢

雄黃一分

丹砂味同研五分五

天麻

烏犀

乾蠍去土炒

羚羊角鎊

羌活

獨活

防風

細辛

白芷

赤茯苓

蟬蛻

麻黃去根節

牛膝酒浸

芎藭

五加皮各半兩

白附子炮一

烏蛇酒浸去皮

共二十二味。研為末。鍊蜜和。杵一千下。丸如雞頭大。每一丸嚼破。溫酒或荊芥茶下。日三服。

沉香煎丸方。治攤緩不收。體重無力。肢節緩弱。運動不能。

沉香

丁香

葫蘆巴炒

附子去皮

牛膝去苗剉

補骨脂炒

藿香子

石斛剉酒

芎藭

木香

青橘皮湯浸

桂皮去粗

肉苁蓉酒炒各

可。共十三味。搗羅為細末。鍊蜜為丸。如梧桐子大。每服二十九丸。生薑鹽湯下。酒亦可。

### 風痺曳

論曰。人假水穀之精。化為血氣。周流一身。使四肢相隨。筋脈相續。猶挈裘領。無所不從。若脾胃虛弱。水穀不化。筋脈無所稟養。復遇風邪外搏。膚腠流傳。筋脈縱緩。

則肢體痺曳。其痺則偏而不舉。曳則弛而不隨。是皆不能收攝也。

獨活湯方 治中風。手足痺曳。不能言。

獨活 二兩

甘草 炙

桂

生葛根

芍藥

栝樓根 實 各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢。生薑三片。同煎溫服。日三夜一。

敗龜丸方 治中風。手脚顫掉。痺曳。

敗龜 塗酥 炙 五兩

右一味。為細末。研飯為丸。如梧桐子大。每服二十九丸。酒下。

附子湯方 治風痺曳。手足不隨。身體不能俛仰。

附子 去皮 炙

乾薑

甘草 炙

防風

獨活 各一兩 半

石膏 碎

白茯苓

白朮

芎藭

柴胡

當歸 酒浸

人參 各一兩

杏仁 去皮尖 雙仁 炒研 二十枚

細辛 一兩

共十四味。剉如麻豆。每服五錢。水酒共煎。溫服。日三。人羸弱者。只用水煎服。

羚羊角丸方 治中風。手顫。譫。曳語。澀。

羚羊角 一兩

犀角 三分

羌活

防風 各半

薏苡仁

秦芫 各二兩

右六味為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。服十丸。煎竹葉湯下。加至三十丸。

### 中風四肢拘攣不得屈伸

論曰。臟真散於肝。肝藏筋。膜之氣。筋為肝所養。筋得所養。則俯仰屈伸。莫或乖戾。若經絡偏虛。風邪乘虛客於機關。則筋脈縮急。干於陽絡。則肩背從而拘攣。此皆邪氣內盛。正氣不能榮養諸筋。故為四肢拘攣。不得屈伸。夜合枝醞酒方 治中風手足不隨。攣縮屈伸艱難。

夜合枝

桑枝

槐枝

柏枝

石榴枝 各生用 荆五兩

羌活 別片 二兩

糯米 五升

細麴 七升

防風 別片 五兩

黑豆 用緊小者 生用 五升

共十味。以水五斗。浸五枝。同煎取二斗五升。去渣。浸米黑豆二宿。蒸熟。與麴。防

風、羌活二味拌和。造酒依常醞法。封三七日。壓去糟滓。取清酒三合至五合。時飲之。常令有酒氣。勿令過醉。恐至吐悖亂正氣。

乳香丸方 治中風四肢拘攣筋骨疼痛。

乳香細研一兩

烏頭去皮臍半兩

羌活一兩

雄黃細研水飛半兩

白附子

羚羊角各一兩

附子去皮臍半兩

原蠶蛾炒

防風

烏蛇酒浸去皮骨炙

白僵蠶炒

虎脛骨各一兩

膩粉

麝香各三分

赤箭

牛膝酒浸

沒藥研各半兩

右十七味為末。再同和勻。鍊蜜丸。梧桐子大。每服用豆淋酒下十丸。如人行十里。再服。

地龍餅子方 治中風手足筋急攣疼痛。

地龍炒

海蛤

硫黃研

烏頭去皮臍各半兩

鱗鯉甲各一兩

五味同研為末。醋煮麵糊為丸。如雞頭。捏作餅子暴乾。每用一餅以葱白裹。安



手足節上。以手帛繫住。閣在一朽木桶上。用熱湯淋之。候覺骨中熱極。方解去。帛子後看手足未得舒展時。再用熱湯淋之。每一餅可用三次。如用藥畢。且着衣服蓋之。不得透風。

酸棗仁煎方。治筋骨拘急及輭疼痛。行履不得。

酸棗仁三兩半生兩半炒

虎骨酒炙一兩半

海桐皮

羌

活各二兩

仙靈脾

赤箭

草解

杜

仲去粗皮炙斷絲

敗龜酒炙

蒺藜子

石斛

牛

膝酒浸

巴戟天

附子去皮

木香

熟乾地黄

酥各一兩

桑枝一握一尺長

白蜜四兩

共十九味。搗羅十七味爲末。再研勻。用清酒七升。先煎桑枝令黃色。去桑枝。後下藥末。更煎一二十沸。次下酥。蜜煎成膏。看香氣得所。用瓷盒盛。每服一匙頭。溫酒調下。日三服。

# 風痲

論曰。風痙者。以風傷太陽之經。復遇寒濕故也。其狀口噤不開。腰背強直如發痙。蓋風邪內薄於經。則榮衛凝泣。筋脈緊急。故令口噤不開。卒然倒仆。不知所以。凡發極則復甦。甦則復作。其或耳中策策而痛。身背直而不屈者。不治也。

天麻湯方 治風痙身如板直。徧身鞭強。

天麻 半兩

羌活

人參

桂

去粗皮

白朮

麻黃

去根節煎掠去銖焙乾

杏仁

去皮尖分炒各一分

附子 一枚 去皮臍

八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生薑一棗大。拍碎同煎。再入酒半盞。煎熱

服。後以生薑稀粥投之取汗。日三。

甘草湯方 治風痙。口噤不語。肢體強直。神識不明。

甘草 灸

羌活 一分

人參 半兩

防風 一兩

附子 半兩

每服四錢。入地黃汁一合煎。再入荆瀝。竹瀝各半合。同煎溫服。日夜各一。

角弓反張

論曰。風角弓反張之狀。腰背反折。不能俛也。中風邪客於諸陽之經。邪正相搏。風氣勝則筋脈縮急。腰背反折。如弓之形也。

麻黃飲方。治中風。身如角弓反張。四肢不隨。煩亂口噤。

麻黃去根節三兩

防風

桂

白朮

人參

芎藭

當歸

甘草炙

乾薑各一兩

附子一兩

杏仁去皮尖雙仁三十枚

每服五錢。水煎溫服。不拘時。

當歸湯方。治中風。身如角弓反張。口噤不開。

當歸

細辛各三分

防風

獨活各半兩

麻黃去根節一分

附子一枚

每服三錢。水酒同煎。溫服。如汗出。慎外風。若口噤。即斡開口灌之。

急風散方。治中風。身如角弓反張狀。

附子一枚去皮臍

烏頭二枚去皮臍

天南星一枚

藿香去梗

防風

白芷各半兩

乾蠍全者去土炒

白附子各一分

共八味為散。每服半錢。豆淋溫酒調下。併二服。未愈再服。

### 中風失音

論曰。喉嚨者。氣之所上下也。會厭者。聲音之門戶。其氣宣通。則聲音無所阻礙。若風邪搏於會厭。則氣道上宣。故令人失音。入臟則不能言語也。

羌活湯方 治中風失音不語。

羌活去蘆頭 活雨半

甘草炙剉

人參各半

附子去皮臍一枚

荆瀝

竹瀝

生乾地黄

共七味。先將四味剉如麻豆。每服五錢。入三件汁瀝。同煎溫服。日三夜一。地黄湯方 治中風失音不語。

生地黄汁

淡竹瀝各半

獨活去蘆頭

附子去皮臍

一。四味。將二味剉如麻豆。每服三錢。入竹瀝地黄汁同煎。溫服。空心日。午夜臥各

羚羊角湯方 治中風失音。手足不隨。

羚羊角 鎊

芎 藭

細 辛 去苗

木 香

防 風

麻 黃

獨 活

羌 活

當 歸 酒浸

附 子 去皮

桂 皮 去粗

天 麻 各一

每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

竹瀝湯方 治中風。失音不語。昏沉不識人。

竹 瀝

荆 瀝

梨 汁 各二

陳 醬 汁 半合

四味相和。微煎一二沸。再濾一徧令溫。細細灌入口中。口噤。斡開口灌之。

竹豆湯方 治中風。失音不語。

新青竹 碎如篾子 烏 豆 二升

二味。以水八升相和。煮令豆爛去滓。再煎取一升。每服二合灌之。或口噤不開

者。即斡口灌。

羌活湯方 治中風。舌強不得語。手足舉動不得。

羌 活 一兩

羚羊角 半兩

麻 黃 去根節 一兩

防 風 半兩

旋覆花 炒一

獨 活 半兩

龍 腦 研半

人 參

白茯苓

當歸

麥門冬各半

杏

仁湯浸去皮尖

每服一兩。水煎溫服。空心日、夜臥各一服。

竹瀝湯方 治中風舌強不得語。心神煩悶。

淡竹瀝五合

人乳汁二合

三年醬汁半合

三味相和調勻。分三服。口噤。幹灌之立差。

陳醋方 治中風不得語。舌根澀。鞭。

陳醋二合

三年醬汁

人乳汁各五

三味相和研。以生絹濾絞取汁。分爲三服。日夜服之。服盡能語。

三聖散方 治中風舌強不語。

沒藥研

琥珀研各一分

乾蠍七枚全者炒

三味研爲末。每服三錢。用鵝梨汁半盞。皂莢末半錢。濃煎湯一合。與梨汁相和。

調下。須臾吐出涎毒。便能語。

雄黃丸方 治心脾中風。舌強不語。涎潮昏塞。不省人事。

雄黃研

丹砂研

牛黃研

天南星牛膽內製者

白僵蠶 生用

天

麻半兩 生用各

麝

香一分

金

箔

銀

箔 各十五片與麝香同研

九味。研為細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服十丸。溫薄荷汁化下。不拘時。

### 風口噤示

論曰。風口噤者。風寒客於三陽之筋。使筋脈拘急。口噤不開。牙關緊急。若不速治。恐致他病。以風者善行而數變也。

開關散方。治中風目瞑口噤。不能下藥者。用此散以中指點散子。揩齒三二十次。在大牙左右其口自開。始得下藥。

天南星 生搗為末

龍腦 別研

各等分。研細。五月五日午時合。患者共使一字。若不搗。端午亦

烏梅飲方。治中風不語口噤。吐痰。頸項筋急。

烏梅

井子 二十七枚

葵 碎剉

白礬 生用

先以水一升。煎菴蓰根取三合。去滓別盛。又別以水一升。煎烏梅至三合。去滓

別盛。又以水五合煎白礬。取三合別盛。以物幹開口。先灌菝葜湯。次下烏梅湯。又次下白礬湯。旋消停。服之良久。久即吐惡疾毒涎。如不吐。以鵝毛攪喉口取吐。

附子散方 治中風牙關緊急。徧身強鞭。

附子一枚一兩者慢火炮製去皮臍 白附子

共末為細散。每服一錢匕。溫酒調下。三服效。

海帶散方 治風口噤。牙關不開。

海帶兩半 烏梅肉 天南星生各一兩 麝香研後入

為細末。入瓷盒內。勿令透氣。如患急。以半錢匕。於頤裏牙關上搯。便自開口。立效。

治牙關緊急方

甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上炙候油入甘草用

以物幹開牙關。令咬定甘草。可如人行五里時候。又換甘草一截。後灌藥極效。

白神散方 治中風或吐瀉。牙關緊急。下藥不能。



白梅末不拘多少

將揩牙立開。蓋酸能收斂。自然牙骨易開也。

### 風口喎

論曰。足陽明脈循頰車。手太陽脈循頸上頰。二經俱受風寒。筋急引頰。令人口喎。僻。言語不正。目不能平視。又云。風入耳中。亦令口喎。蓋經絡所繫然也。診其脈浮而遲者可治。

治中風口面喎斜。葛根湯方。

葛根

防風

附子

麻

黃

炙各兩

獨活三兩

杏

仁

湯浸去皮四十枚

松

實

去殼兩半

共剉如麻豆。每用藥十錢匕。以水二盞。酒一盞。入生薑二片。煎一盞半。去滓。分三服。日二夜一。

防風湯方。治中風口面喎斜。淚出失音。

防風

防己

升麻

桂

麻黃

芎

藜各一兩

羚羊角半兩

剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞煎取六分。去滓入竹瀝半合。更煎三二沸。熱服。空心日午及臨臥各一服。

治賊風吸著。口眼喎斜。一字散方。

烏頭生用

青

礬各半兩

共爲散。每用一字。搗入鼻內。取出涕吐涎。

治風口喎方

蓖麻油

巴豆油

二味等分並相和。如右喎卽點左口角。如左喎卽點右口角。仍急覷纔正。當急措去藥。

治中風口面喎斜。青松葉浸酒方。

青松葉一觔

細剉如大豆。木石臼中杵令汁出。用生絹囊貯。以清酒一斗。浸二宿。近火煨一宿。初服半升。加至一升。頭汗出卽正。

治中偏風口面喎斜石灰塗方。

石 灰半升  
炒

乘熱以醋調似泥塗於一邊緩處纔正急用溫水洗去。

人參丸方 治中風口眼喎斜手足無事語不謇澀止緣坐臥處對耳有竅為風所中筋牽過一邊連眼皆緊睡著一眼不合者服此藥二十日內眼口皆正矣。

人參

草 烏生皮尖

牛

膝去苗酒浸焙乾各一兩按牛膝入腦虛人口喎眼斜用之

搗羅為細末水煎麵糊丸如梧桐子大每服十丸炒黑豆淋酒下一日二服。

生假蘇去梗

生薄荷用葉一斤

右二味並沙盆內研生絹綾取汁瓷碟內看厚薄日煎成膏餘滓三分去一分粗滓不用將二分滓曬乾杵為末將膏和為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下。

### 破傷風

論曰。破傷風者。因卒暴傷損。風邪襲之。傳播經絡。致使寒熱更作。身體反張。口噤不開。甚者邪氣入臟。則不可治。諸瘡久不差。榮衛虛弱。肌肉不生。瘡眼不合者。風邪亦能外入。為破傷風之候。

羌活湯方 治破傷風身如鐵石。或如角弓反張。口噤不開。宜斡齒灌藥。

羌活

防己

羚羊角

升麻

黃芩

蔓荊實

去皮各一兩半

犀角

二兩

茯苓

神去木

葛根

甘草

各一分

防風

三分

麻黃

一兩

粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入地黃汁半合。薤白二寸。煎至八分。去滓空心日午臥溫服。如病急不拘時服。蓋覆出汗即愈。

羚羊角散方 治打擊破瘡。或洗頭挑齒灸瘡狗咬等中風。

羚羊角

石斛

芎藭

白芷

知母

山萸

薏苡仁

白芷

曲棘鍼

生用

甘草炙

芍藥

紫苑

去土

天雄

防風

牛膝

枳實

去殼炒

蔓荊實

石南葉酒醋炒

杏仁皮尖去

麻黃

龍骨去土

黃芩

防己

白朮

草薺

乾蔓菁花

葛根

赤茯苓

羌活

蒼耳心

車前子

桑白皮

菊花不開者

酸棗仁

當歸

丹參

烏蛇酒浸去皮骨炙各三分

陳橘皮湯浸去白

共四十味。搗羅為散。每服一錢半至二錢匕。空心午時夜臥溫酒調下。要丸即

鍊蜜丸。如梧子大。每服十丸。豆淋酒下。

治破傷風獨聖散方。

蘇枋木不拘多少

共為細散。每服三錢匕。酒調服之。立效。一方用鱧膠白色。炙令黃色。為末。熱酒

調六錢。

治破傷風。身腫牙關不開。白殭蠶散方。

白殭蠶直者不拘多少

生研爲末。每用生薑自然汁調以雞翎於瘡口掃之。勿令乾。斯須腫塌皮皺爲效。仍用生薑汁調半錢匕服。

治破傷風打撲內損。飲銀花散方。

天南星大者半生半炮

白附子半生半炮

防風去叉等分

爲細末。每服二錢匕。重者童子小便調。稍輕熱酒調下。如外傷用此藥貼瘡口。仍依法服之。如破傷風。先以小便溫洗瘡口。次用藥乾貼。追出風毒立愈。勢稍惡口噤者。以童子小便調。幹開口灌之。如鬪打至死。但心頭微煖者。併灌三服。卽活。常須合下。以備急用。一方無白附子

### 偏風

論曰。人身所養者。惟血與氣。血氣均等。則無過不及之害。稍至衰微。則所運不周。遂至體有偏復。因風客身一邊者。謂之偏風。其狀半體不知痛癢。或癢痺不仁。或縱緩。或痺痛是也。

荆瀝湯方 治偏風不隨。心中煩悶。言語蹇澀。

荆 瀝五合

竹 瀝五合

生薑汁三合

三味相和煮煖。每服三合。以酒調下。

防己湯方 治偏風半身不隨。口眼喎斜。不能言語。筋脈拘攣。不得轉側。

防己

芎藭

桂

黃芩

芍藥

人參

甘草炙

麻

黃節去根

附子去皮

防風各一兩

杏仁去皮尖四十枚

每服十錢。生薑十片。同煎分溫三服。日二夜一。

生地黃湯方 治偏風手足一邊不收。口目喎戾。言語蹇澀。其藥不拘虛人老少。

並可服之。

生地黃汁

竹瀝

荆瀝各一合

三味別作羌活。防風各一兩。去蘆頭并叉剉。附子一枚。重半兩者。去皮臍生用。

作八九片。入煎三汁中。慢火煎取一升半。每用醇酒三合。調化藥汁二合。煖服。

之日二夜一。無問冬夏。並得服之。

麻子仁湯方 治偏風手足不隨。口面喎斜。

麻子仁合炒二

黑豆二合緊小者炒

鴿糞炒二合

垂柳枝二握剉半寸長

四味。先以酒七升。煮柳枝及五升。炒鴿糞麻仁黑豆等令黃。乘熱便投柳枝酒內。須臾去滓。令淨。每服旋取。溫服二合至三合。空心臨臥各一服。

續命獨活湯方 治偏風半身不隨。熱悶語澀。

獨活

防風

人參

芍藥各二兩

防己半兩

桂一兩

羚羊角銹三

咬咀如麻豆。每服五錢。入竹瀝半合。同煎溫服。

安息香丸方 治偏風半體不仁。縱緩不收。或時痺痛。

安息香研一兩

乳香研一兩

麻黃去根節二兩

胡桃仁湯浸去皮研一兩半

乾浮萍草去土一兩半

右五味。先搗麻黃浮萍草為末。與研藥拌勻。鍊蜜和丸。如彈子大。每服一丸。溫酒化下。以汗出為效。

擬金丸方 治偏風半身不隨。不知痛癢。

草烏頭生去皮臍二兩半

骨碎補去毛一兩

狗脊去毛一兩

五靈脂一兩



馬蘭花半兩

地龍去土兩

乳香研一

楓香脂研一

草薢一兩

九味。搗羅為末。入研者二味和勻。醋煑麵糊和丸。如小豆大。每三九至五九。荆芥湯下。空心臨臥各一服。

### 風偏枯

論曰。氣血不足。腠理開疎。風溼客於分肉之間。久而不差。真氣去。邪氣獨留。乃為偏枯之疾。其狀肢體不隨。肌肉偏枯。細小而痛。言語不變。神智不亂。乃可治也。宜溫臥取汗。益不足而損有餘。診其胃脈沉而大。心脈小而牢急。皆偏枯之脈也。當歸湯方。治中風手足偏枯。口面喎斜。疼痛。一目不能合。

當歸

白芷

防風

白鮮皮

白朮

芎藭

杏仁去皮

甘草炙

甘菊花

天雄去皮臍

人參半兩

每服五錢。生薑半分。同煎溫服。日三夜一。與食相間服之。

磁石湯方 治中風偏枯。骨瘦無力。

磁石燒赤醋碎七兩三兩防

風三兩

五味子二兩

甘草一兩

玄參二兩

附子

去皮臍一兩

牡丹去心二兩

每服五錢。入黑豆三十五粒同煎。空心日午夜臥服。

沒藥丸方 治中風偏枯。手足不隨。言語謇澀。口眼喎斜。

沒藥研半兩

天麻

酒浸一宿二兩

烏頭去皮臍一兩

地龍去土炒一兩

羚羊角鎊屑一分

犀角

鎊屑一分

丁香香一分

木香香一分

乳香研半兩

丹砂

研半兩

龍腦研一分

麝香研一分

玄參一分

人參

半兩

十四味。搗研為末。鍊蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。溫酒下。食前服。重病者服一月。差初患五七服即愈。

肉苴

論曰。內經謂人之肉苴者。雖近衣絮猶尚苴也。以榮氣虛。衛氣實。夫血為榮。氣為

衛氣血均得通流。則肌肉無不仁之疾。及榮氣虛。衛氣實。則血脈凝澀。肉雖如故。而其證癘重為苛也。

苦參丸方 治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

苦參 二兩搗取粉

丹參 炙

沙參 去粗皮

人參 一兩

五加皮

防風 去叉剉

蒺藜子 炒去角黃

烏蛇 酒浸用肉

蔓荊實 去白皮

敗龜 塗酥炙

虎骨 塗酥炙黃

玄參 堅者各一兩

右十二味。搗羅為末。別以不艸皂莢一觔。以水三升。掇取汁去滓。於無油鐵器內煎成膏。鍊蜜四兩。拌和為丸。如梧桐子大。每食後良久及夜臥。共三服。各用

荊芥薄荷酒下十五丸至二十九丸。

天麻丸方 治榮虛衛實。肌肉不仁。徧身癘重。

牛膝 酒浸切焙一兩

天麻 酒浸切焙兩半

麝香 研

桂 各一分

乾蠍 炒去土

白花蛇肉 酒炙各半兩

檳榔 剉

獨活 各三分

防風 一兩

共九味。鍊蜜和丸。如桐子大。每服十九丸。薄荷酒、荊芥湯下。不拘時。

防風酒方 治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

防風 去叉二兩 白朮 半兩 山茱萸 并子用一兩半 山藥 乾者一兩半

附子 去皮臍炙一兩 天雄 去皮臍一兩半 細辛 去葉鬚輕炒一兩半 獨活 去蘆頭一兩半

秦艽 去土半兩 茵芋 去粗莖一兩半 杏仁 去皮尖雙炒兩半 紫巴戟 去心一兩

桂 二兩 麻黃 去根節煎去沫焙乾二兩 薏苡仁 炒三兩 生薑 二兩切焙

磁石 生鐵碎如大豆粒浸去汁半斤 薏苡仁 炒三兩 生地黄 淨洗細切焙二兩半

共十八味。剉如麻豆。生絹袋盛。以無灰酒三斗。浸六七日。空心溫飲四合至五

合。以知為度。

五味子酒方 治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

五味子 防風 牛膝 黃芩

白朮 當歸 澤瀉 知母

白芷 五加皮 枸杞子 用根白剉 牡丹 去心

肉蓯蓉 炒 丹參 炙 甘草 炙 枳殼 麩炒

厚朴 去粗皮薑炙五遍 細辛 去鬚葉輕炒 桂 各一兩

共十九味。剉如麻豆。生絹囊盛。用好酒二斗。密封浸經七日。每空心日。午夜臥。各溫服五合。久服加至七合及一升。勿令醉吐。

### 歷節風

論曰。歷節風由氣血衰弱。為風寒所侵。血氣凝澀。不得流通關節。諸筋無以滋養。真邪相薄。所歷之節。悉皆疼痛。故謂歷節風也。病甚則使人短氣汗出。肢節不可屈伸。

防風湯方。治歷節風。周身百節疼痛。脚痿弱。

防風 二兩

白朮 一兩

白鮮皮 二兩

桂 一兩  
三分

黃芩 二兩

薏苡仁 二兩  
炒

右六味。研篩。每服四錢。生薑三片。同煎溫服。日三夜一。

沒藥散方。治歷節風。百骨節疼痛。晝夜不可忍。

沒藥 藥 研半

虎脛骨 酒炙  
三兩

二味。搗研為末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

透關散方 治歷節風。四肢攣急。疼痛難忍。短氣汗出。

麻黃根 五兩 天南星 炮 威靈僊 各半

當歸 人參 天麻 各一

草薺 赤小豆 煨去皮 兩

共八味。搗羅為末。每服半錢。溫酒調下。

獨活散方 治歷節風。

獨活 去蘆頭 一兩半 玄參 一兩 生犀角 兩 層二 升麻 三兩

惡實根 半兩 豉 二合 生乾地黃 半兩

共七味。搗羅為散。每服三錢。空腹米飲調下。

乳香大丸方 治血氣衰弱。風毒攻注。歷節疼痛。

乳香 研 沒藥 研各 一兩 五靈脂 去沙石 四兩 烏頭 去皮 一兩半

共四味。搗為末。再和勻。滴水。和丸。如小彈子大。以丹砂為衣。每服一丸。薄荷酒

化下。日三服。

中風百節疼痛

論曰。中風百節疼痛者。由體虛受風。風邪中於關節。故令百節筋脈拘急疼痛。寒熱更作。不可屈伸。此皆真氣怯弱。不勝風邪。真邪相薄。所以痛也。

白花蛇散方 治中風肢節疼痛。言語謇澀。

白花蛇 酒浸去皮 骨二兩 何首烏 去黑皮 牛膝 三味用酒浸 半日焙乾

蔓荊實 去白皮 各四兩 威靈仙 荆芥穗 旋復花 各二兩

共七味。搗羅為末。每服一錢。溫酒調下。空心臨臥服。

羌活散方 治中風百節疼痛。寒熱更作。不可俛仰。

羌活 去蘆頭 一兩 天麻 去蒂生 用一兩 芎藭 半兩 酸棗仁 炒 三分

鹿角膠 炒 兩 蔓荊實 揉去肉 皮一分 羚羊角 鎊屑 三分 人參 半兩

白附子 半兩 牛膝 三分 桂 半兩 薏苡仁 炒 一分

烏蛇 酒炙用 肉半兩 犀角 鎊屑 一分 白鮮皮 炙 半兩 地骨皮

柏子仁 生用 三分

右十七味。搗羅為細末。每日空心及夜臥。各以豆淋酒調下一錢至錢半。

白頭翁酒方 治諸風痛。攻四肢百節。

白頭翁草一握

一味爛研。以醇酒投之頓服。

又方

生惡實根摩酒服。痛止即住。

又方

黑豆炒去皮

威靈仙二兩

桑根白皮一兩

三味用醇酒一升半煎取八合去滓頓服之。

又方

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃研半兩

虎骨以酒塗酥炙黃取半兩爲末

二味用醇酒一升熱調頓服。

### 風走注疼痛

論曰。風走注疼痛之病。其痛無常處是也。氣血流通。筋脈和同。則骨肉滑利。一有不調。風邪乘虛與血氣偕行。使榮衛凝澀。隨所注處。悉爲疼痛。故謂走注痛也。



虎骨散方 治風毒走注。疼痛不定。

虎脰骨 酥炙 敗龜 酥炙各二兩

麒麟竭 研碎

赤芍藥

當歸 沒藥 研

防風

白附子

桂枝 去粗 白芷

骨碎 補去毛

蒼耳 炒

自然銅 火煨醋淬研各三分 牛膝 酒浸切焙去苗

天麻

檳榔

五加皮 羌活 去苗頭各一兩

共十八味為散。每服二錢。溫酒調下。

芸薑散方 治風毒走注。疼痛如虎噬。

芸薑子 天南星 草烏頭 並生用各一兩

三味為散。五錢量入生麵。以醖醋、生薑汁、生油各少許。調成膏。攤紙上。厚一分。

貼痛處即止。

消毒膏方 治風毒走注疼痛。筋脈拘急。

馬牙硝 赤研一兩燒 烏頭 大者二枚燒存性三分研

二味同研令勻。每用三錢。白麵三錢。生薑汁一盞。同熬成膏。攤於帛子上。熱貼。

日二換之。

乾地黄丸方 治走注疼痛。

生乾地黄

白芷

當歸

沒藥

烏頭去皮

防風

木香

赤小豆

共八味等分。搗研為末。水浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五丸。冷酒下。空心食前服。日二。

### 白虎風

論曰。白虎風之狀。或在骨節。或在四肢。其肉色不變。晝靜而夜發。發則痛徹骨髓。或妄言妄有所見者是也。蓋風寒暑溼之毒。乘虛而感。播在經脈。留於血氣。畜聚不散。遇陽氣虛弱。陰氣隆盛。則痛如虎嚙。故以虎名焉。

羌活湯方 治白虎風痛甚如嚙。

羌活

防風

秦艽

芎藭

當歸各半

牛膝酒浸一兩

附子去皮臍三分

大腹連皮用三枚

桃 仁湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚

九味。剉如麻豆。每服五錢。入生薑一棗大。同煎溫服。日二夜一。

牛膝散方 治白虎風疼痛難忍。

牛 膝酒浸

當 歸各一兩

虎 骨酥炙令黃二兩

赤芍藥 一兩

芒 硝別研半兩

桃 仁去皮尖雙仁三兩

芍 藥 半兩

七味為散。每服空心用溫酒調下。一錢至二錢。

抵聖散方 治白虎風。骨髓疼痛。至夜轉甚。

虎脛骨不計多少打破酒浸蘸酒旋炙令黃脆為度

一味為散。每服半錢。入薄荷末一錢。人參末半錢。煎乳香酒調下。

一神散方 治白虎風。晝靜夜發。痛徹骨髓。狂言妄見。

防 風

羌 活

桂 皮去粗

地骨皮

芎 藭

細 辛

虎 骨酒浸一宿酥炙黃

共七味。等分為散。每服一錢。溫酒調下。

烏頭散方 治白虎風。走注疼痛。

烏頭去皮

地龍

羌活

虎骨酒炙

延胡索

當歸

沒藥研

防風各一雨

八味為散。每服二錢。冷酒調下。空心食前日二服。

### 風不仁

論曰。風不仁之狀。皮膚搔之如隔靴是也。由榮氣虛。衛氣實。寒風入於肌肉。血氣不相與。凝痺結滯。皮膚癢痺。厚無所覺。知內經曰。皮膚不榮。故為不仁。此之謂也。烏鷄丸方。治風虛皮膚不仁。頭目昏痛。利咽膈。解昏倦。

烏鷄一隻燒為灰

麝香別研一分

虎骨酥炙

白僵蠶炒

乾蠍去土炒

防風去叉

白附子

烏蛇酒浸去皮骨炙

藿香葉各半兩

除別研外。搗羅為末。入研者拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十九丸至十五丸。溫酒下。茶清亦得。

羌活湯方。治風不仁。手足癢麻疼痛。

羌活

獨活俱去蘆頭

防風

蔓荊實

人參

蒺藜子炒去角

芍藥

白茯苓

枳殼

芎藭

天蓼木

阿膠炙令燥

威靈仙去苗土各半兩

每服二錢。空心豆淋酒調下。或鍊蜜丸。如梧桐子大豆淋。薄荷酒下十五丸至

二十九。

五參散方 治風不仁。皮膚癢麻繞膝。偏身似蛇皮黑癩。旋生旋沒。通身癢痺。

人參

丹參

沙參

苦參

玄參堅者各一兩

白花蛇酒浸去皮骨一兩半

右六味為細散。每服二錢。食後溫酒調下。加至三錢。

### 風瘙癢

論曰。風瘙癢者。表虛衛氣不足。風邪乘之。血脈留滯。中外鼓作。變而生熱。熱即瘙癢。久不差。淫邪散溢。搔之則成瘡。

五白散方 治皮膚風癢。晝夜不止。

白附子

白僵蠶炒

白蒺藜炒

白鮮皮各一

白花蛇酒浸去皮  
骨炙三兩

右五味為散。每服一錢。空心臨臥溫酒調下。

枳殼散方 治風皮膚瘙癢麻痺。

枳殼去瓢煨  
炒二兩

苦參

蒺藜子炒去  
角

蔓荆實各一  
兩

荆芥穗

麻黃去根  
節

羌活去蘆  
頭

獨活各等  
分

每服二錢。臘茶溫酒調下。食後臨臥各一服。

天麻散方 治熱毒風攻偏體。瘙癢癰癩。皮膚癢痺。肢節疼痛。四肢大腸不利。

天麻

防風

羌活

甘菊花

杏仁去皮尖雙仁  
炒黃各二兩

甘草一兩  
炙

每服三錢。空心蜜酒調下。日再服。

天門冬丸方 治風熱皮膚癢疹癢生瘡。如水疥。或如粟粒。

天門冬去心焙  
二兩

枳殼去瓢煨  
炒三兩

白朮

人參各一  
兩半

獨活

苦

參各一分

為末。蜜為丸。如梧桐子大。每食後米飲下三十丸。日二服。

八味散塗傅方。治徧身瘡疥。皮破肉痛。或瘙癢膿水。

蜀椒去目

吳茱萸湯洗焙

青鹽研

石硫黃研

膩粉研

白殭蠶炒

麩皮各一兩

麝香少許

八味搗研為散。猪膽汁調塗之。溼則乾傅。

防風湯淋洗方。治瘙癢如蟲行。或癢痺不仁。

防風

益母草

苦參各三分

蒺藜子炒五兩

荊芥穗

蔓荊實

枳殼去瓢炒

每用三兩水一斗。煎至八升。乘熱淋洗患處。

### 風痞癩

論曰。風痞癩者。由腠理不密。三陽氣外泄。發而為汗。汗出未已。為風邪所搏。風熱相併。不得流行。故結為痞癩。狀如麻豆。甚者漸長。搔之成瘡。

獨活丸方 治風癱瘳痞癩。腫起。時癢時痛。

獨活頭去蘆

天門冬

防風

蒺藜子炒去角

桔梗炒各一分

薏苡仁炒

黃連去鬚各一兩

桂半兩

枳實半一兩

為細末。鍊密丸。如梧桐子大。每服二十九。空心臨臥菊花湯下。

景天花散方 治脾肺風毒。徧身發痞癩。癢癢煩躁。

景天花慢火焙乾一錢 俗謂慎火草

紅麴半兩

同研為細末。每服二錢。食後臨臥服。溫水下。

胡麻散方 治肺脾風毒攻注。皮膚瘙癢。手足生瘡。及徧身痞癩。發赤黑靨子。肌

熱疼痛。

胡麻炒令香熟

枳殼各二兩

防風

蔓荊實

威靈仙

苦參

何首烏米泔浸透去黑皮炒乾

芎藭

荊芥穗

甘草炙各二兩

薄荷用葉半兩

為散。每服二錢。溫酒下。或鍊蜜丸如梧桐子大。每服三十九。溫酒下。



枳殼酒方 治風瘙癢癩。皮膚生痞癩。或如蟲行。

枳殼炒二

秦艽

獨活

肉蓯蓉各四兩

丹參

蒴藋各五兩

松葉切三斗

剉如麻豆。用生絹袋貯。以清酒二斗。浸六宿。每服半盞。日三夜四。

蒺藜浴湯方 治風毒瘙癢癩。漸成痞癩。

蒺藜子炒

芫蔚子

羊桃

蒴藋根苗

漏蘆去蘆頭

苦參各半斤

鹽四兩

每全料。用水三石。煮取二石五斗。去滓。溫室中淋浴。仍先飽食。即入浴。久浸最

良。可隔夜一浴。乾衣蓋取汗。慎外風。

桃仁塗方 治風毒赤癩。浮腫成痞癩。

桃仁去皮尖雙

杏仁去皮尖雙

麻生研

凝水石研如粉各二兩

右四味。各研細。別研芸薹菜絞汁。和以白蜜。入前研藥。攪為稀膏。用塗患處。乾

則易之。

### 風瘙癢癩

論曰。風瘙癢癩。其狀有二。皆緣肌中有熱。若涼溼之氣折之。熱結不散。則成赤癩。若因風邪所折。風熱相搏。則成白癩。赤癩得熱則劇。得冷則滅。蓋熱氣鬱結於內。故惡熱宜冷。白癩得陰雨則甚。得晴暄則消。蓋熱氣散釋於外。故惡冷宜熱。冷熱之證異。其為癩癧則一。蓋身體風瘙而癢。搔之隱隱而起是也。

秦艽

防己

松

脂鍊成者各兩半

枳

殼

蒺藜子炒去角各二兩半

苦參

白朮

芎藭

防風

附子

蒟藳

乾薑炮各兩

共研末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。酒下。加至三十九。早食前各一服。

蔓荊實散方 治風瘙癢癧。手足麻木。

蔓荊實

何首烏各二兩

羌活

威靈仙

荊芥穗

防風各一兩

苦參一分

為散。每服二錢。溫酒調下。日三。

茵陳蒿散方 治風瘙癢癧。皮膚腫癢。

茵陳蒿一兩

荷葉半兩

為散。每服一錢。蜜水下。食後服。

羨藜子散方 治風瘙皮膚癢癰癢痛。或有細瘡。

羨藜子二兩炒去角

枳殼 荊芥穗

防風一兩 蒼朮泔水浸一宿四兩

羌活

共為散。每服一錢。溫酒或茶調下。

石南酒方 治風瘙癢癰經旬不解。

石南葉去粗莖生用三兩

一味搗羅為末。每服半錢至一錢。用酒三合。煎一沸。空心溫服。

白蜜酒方 治風癢癰瘙癢不止。

白蜜一合 酒二合

二味相和煎溫。食前服。一方用松葉一斤酒一斗煮三升日夜服出汗

枳實丸方 治風熱頭面身體瘙癢癰。

枳實去瓢炒兩半

天門冬 獨活

黃連

防風

蒺藜子炒去

桔梗炒各一分

薏苡仁一兩

桂一分

共為末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。空腹米飲下。日二。

塗藥方

慎火草大葉青厚生薑和皮不洗鹽重少

三味塗摩癢處。如偏身癢癰。塗發處自消。

芎藭粉摩方 治風癢癰癢痛難止。

芎藭 白芷 麻黃根各二兩 藿香一兩

米粉二升

五味搗羅為粉。摩病處立效。

枳實熨方 治風白癰。

枳實生用

一味搗碎。以醋浸令啞啞炒熟。用熟帛包裹熨癰上。冷即易。分作二包子。更相

炒熨尤佳。

聖濟總錄纂要

清新安程林雲來纂輯

鄞縣曹炳章赤電校點

卷二

諸風門

蠱風

論曰。蠱風之狀。在皮膚間。一身盡痛。若割若刺。淫淫躍躍。如中蠱毒。故名蠱風。皆由體虛受風。侵傷正氣也。  
天麻丸方 治蠱風如皮膚刺割。

天麻

躑躅花

獨活

附子

白附子

原蠶蛾炒

防風

蒼耳

蒺藜子

烏

頭去皮膚  
各一兩

麻

黃去根  
節

烏蛇肉

麝香

除研者外。搗羅為末。入麝香再研勻。煉蜜和搗三二百下。丸如梧桐子大。每服二十九丸。溫酒下。不拘時候。如有汗出。即宜避風。

石南湯方 治六十四種風。注走皮膚中。如蟲行。痛如刺割。狀似蠱毒。及卒風面

目腫起。手不及頭。口噤不能言。

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參

各一兩

桂

麻

黃去根  
節

當歸

芍藥

各一兩

乾地黄三分

甘

草炙二  
兩

食茱萸一分  
兩

咬咀如麻大。每服六錢。水酒同煎。溫服。得汗為度。

何首烏散方 治蠱風。

何首烏

威靈仙各一  
兩

苦

參半兩

麒麟竭一分

並生搗為散。入乳鉢內。研三五百遍。每服一錢。用荊芥湯調下。每日三服。酒服

尤妙。

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛苦若刀割狀及頭目不利風痰等疾。

薄荷葉 一觔 天麻 四兩 威靈仙 三兩 羌活 四兩

山梔子仁 二兩 蔓荊實 三兩 白芷 桔梗 炒

防風 各二兩 大黃 各二兩 紙裹煨令 人參

赤茯苓 各三兩 龍腦 研半

搗研為末再和勻煉蜜丸如鷄頭實大每服一丸食後細嚼茶酒任下。

### 肌肉瞤動

論曰。肌肉瞤動。命曰微風。蓋邪搏分肉。衛氣不通。陽氣內鼓。故肌肉瞤動。然風之入脈。善行數變。亦為口眼瞤動偏喎之病也。

虎骨丸方 治風虛肌肉瞤動手足顫掉。

虎脛骨 酥炙 松節 剉酒 天麻 牛膝 酒浸

赤箭 海桐皮 獨活 石斛 去根

防風 烏蛇 酒浸去 酸棗仁 當歸

仙靈脾

甜瓜子 洗焙

乳香 研

五加皮 各一兩

一十六味。先以十五味搗羅為細末。入研者乳香再和勻。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十九。荊芥酒或茶酒任下。不拘時候。

天麻丸方 治循經絡肌肉掣動。頭目昏眩。手足麻痺。

天麻

芎藭 各一兩

荊芥穗

雞蘇葉 各三兩

白附子

甘草 各半兩

右六味為末。煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸。茶酒任下。

荊芥湯方 治風氣肌肉掣動。頭目昏眩。四肢煩疼。

荊芥穗

旋復花 各四兩

前胡

甘草 炙

麻黃 去根節

芍藥

芎藭

半夏 洗七遍 各一兩

每服三錢。葱白三寸。雞蘇二葉同煎。溫服。

風癩

論曰。風癩之狀。發無常時。每發則仆地吐涎沫。無所覺知。蓋由血氣皆虛。精神離



散。魂魄失守。風邪入於陰經故也。又以胞胎之初。其母卒大驚。精氣併居。能令子發癲。其證與風癲大率相似。

丹砂煎方 治風癲疾。時發時省。涉歷年月。

丹砂 細研水飛濾過後

石膏 五兩 研細

黃連 去鬚搗

生地黃 研取自然汁二升

共四味。以清水一斗。先煮石膏、黃連。取五升。淨去滓。次下生地黃汁。又煎之。如稠餈。始下火。取丹砂粉投入。勻攪百餘遍。貯於不津器中。更攪待冷。即住手。每日兩度。以溫水調服。約如半彈丸大。服藥後。只吃淡飯、蔓菁菜等。

雄黃丸方 治五癲各有聲。牛癲若牛鳴。馬癲若馬鳴。狗癲若狗鳴。羊癲若羊鳴。

雞癲若雞鳴。凡此五癲。皆宜服之。

雄黃 丹砂

雌黃 三味各二兩 碎同用生絹袋貯

色滴如珠引若線為度取藥囊出河水洗條淘漉 黑鉛 二兩大火化

去塵垢者用精者一兩將無油淨器中下水銀及鉛同銷鑪攪令勻

水銀 一兩

共五味。各如前修製畢。便將前煮丹砂、雄黃、雌黃餘蜜。再重湯煮散。少少點入藥中。漸漸和勻。為丸如大麻粒。每用桃、柳、柏、桑木嫩條各長七寸。寸剉。以水一升。煎至六合。去滓分溫下丸藥。空心午時臨臥下三丸至五丸。小兒一九至二丸。

羚羊角丸方 治風癩癩。

羚羊角 犀角 遠志 人參

山藥 茯苓 防風 生地黄

金箔 銀箔 麥冬 鐵粉

天冬 龍齒 水銀 龍齒 鐵粉

共十五味。先將十味搗羅為末。入別研者相拌令勻。鍊蜜和丸。如菘豆大。用桃柳枝湯下二十九。日二夜一。或人參茯苓湯亦可。

風癩

論曰。風癩病者。由心氣不足。胸中煩熱。而又風邪乘之。病間作也。其候多驚。目瞳

子大。手足顫掉。夢中叫呼。身熱。瘕。搖頭。口噤。多吐涎沫。無所覺知是也。然病發於陽者易差。發於陰者難治。故經曰。臟病難治。腑病易治。又曰。大人曰癲。小兒曰癇。靈烏散方。治風癇多驚。手足顫掉。口吐涎沫。

烏

一雙臘月取於葦瓶內。或以鹽泥固濟。令乾。用炭火煨。存性。候冷。取出。去肚腸。研。

丹

砂研一

細

辛二兩

乾

蠍全者十枚炒

共四味。將二味研末。與別研二味同羅。每服半錢匕。午前溫酒調下。

安息香丸方

治男婦暗風癇病。

安息香

通明無砂石者

鉛

丹

二味爲細末。入白羊心中血。研勻。丸如梧桐子大。每服十丸。空心溫水下。

神聖丸方

治風癇涎潮等疾。

雌黃

鉛

丹各一兩

細研。以醋一觔熬稠。丸如梧桐子大。與惡實末同收。每服十丸。臨臥煎惡實末

湯下。

丹砂丸方

治風邪諸癇。狂言妄走。精神恍惚。思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。疾

發仆地。口吐白沫。口噤戴眼。魂魄不守。年歲深遠者。

丹 砂光明者一兩 酸棗仁 微炒 乳香 光瑩者研各半兩

合研令勻。先令病人盡量飲酒沉醉。次取藥五錢匕。酒一盞調下。於靜室中安睡。勿令驚動。候其自覺則愈。

鐵粉烏鴉散方 治風癩。

烏鴉 一隻去腸肚及嘴足腸 丹 黑鉛 鐵粉 研各二兩

丹砂 一兩研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子

秤煨令同赤取出搗為末次入丹砂更研如粉入後七味 天麻 羌活

獨活 防風 芎藭 乾蠍

天南星 各二兩

共研為細末。入麝香少許。再研令勻。每服半錢匕。臨臥冷酒調下。

五生丸方 治癩疾。

乾薑 不炮 烏頭 生去 半夏 生用 附子 生去皮臍

大豆末 生用

共五味。除大豆末外。細剉爲末。以豆末糞糊爲丸。如梧桐子大。每服三丸。冷酒下。

半夏丸方 治風癩痰盛瘰癧。口吐涎沫。

半 夏 湯浸去滑生 爲末五兩

白 礬 生爲末 二兩

丹 砂 研

鉛 丹 研各 一兩

同研勻。以粟飯爲丸。如梧桐子大。每服食後生薑湯下二十九。

五枝煎方 治風癩多驚。手足顫掉。身熱瘰癧。

桃 枝

柳 枝

桑 枝

夜合枝

槐 枝 並剉如豆 大各一斗大 豆陶一升 過

共六味。用水一石。慢火煎。候豆爛。及嚼諸枝無味。卽濾汁於銀石器內煎。令得所。不可熬過。以瓷器盛。每服一匙頭許。入蘆薈末少許。溫酒化破。空心徐徐服。治風癩瘰癧不省方。

虎 糞 曝乾

野猪骨并蹄 炙各不 拘多少

共研爲散。每日空心以酒調下二錢。忌一切有足之物。

水銀丸方 治風癩。

水 銀半兩

雄 黃研

龍 腦研

牛 黃研各分

丹 砂研一錢

再同研勻。用糯米飲和丸。如菉豆大。每服五丸至七丸。熟水下。空心臨臥日再服。

### 風狂

論曰。風狂之狀。始發則少臥不飢。自高自賢。自辯自貴。蓋人之榮衛周身循環。晝夜不窮。一失其平。則有血并於陰。而氣并於陽者。有血并於陽。而氣并於陰者。陰陽二氣。虛實不調。風邪乘虛而入。并於陽。則謂之重陽。故其病妄笑好樂。妄行不休。甚則棄衣而走。登高而歌。或至數日不食。故曰狂也。又肝藏魂。魂則隨神往來。悲哀動中。有傷於魂。則為狂妄。是亦血氣俱虛。風邪乘之。陰陽相并也。

真珠散方 治風狂妄語。心熱狂走不知人。

真 珠 研

牛 黃 研

丹 砂研各半兩

金 箔 研

銀箔研各五片

麝香研一錢

鐵粉研

天竺黃

人參

龍腦研各三分

黃芩一兩

防風

犀角鎊各半兩

茯神三錢

麥門冬半兩

遠志

白鮮皮

羚羊角鎊各半兩

甘草炙

胡黃連

甘菊花

白附子各三分

除研外。搗羅為末。入研藥拌勻。每服一錢。加至二錢。薄荷溫水或梨汁調下。

茯神湯方。治風狂失神。少臥不飢。笑樂無節。棄衣登高。

茯神去木

杏仁湯去皮尖雙仁各三兩

龍齒六兩

凝水石一斤

升麻二兩

石膏碎二兩

沙參

白茯苓

白鮮皮各二兩

生麥門冬四兩

剉如麻豆。每服五錢。水煎溫服。如病甚煎成。入竹瀝半合。再煎服。

### 腦風

論曰。內經謂風氣循風府而上。則為腦寒。夫風生高遠。始自陽經。然督脈陽維之

會。自風府而上至腦戶。腦戶者督脈足太陽之會也。又太陽之脈起於目內眥。上額交巔。上入絡腦。今風邪客搏其經。稽而不行。則腦髓內弱。故項背怯寒。而腦戶多風冷也。

石膏散方 治腦風邪氣留連。頭痛不已。

石膏 研火煨

天南星 炮

白僵蠶 炒

三味等分。搗研為散。每服二錢匕。葱白二寸。臘茶一錢。同連鬚葱煎湯頓服。良久再服。

穀精草散方 治腦風頭痛吹鼻。

穀精草 末

銅 綠研各一錢

硝 石半錢研

共研和勻。每用一匙。吹入鼻內。或偏頭疼。隨病左右吹鼻中。通關散方 治腦風鼻息不通。不聞香臭。或鼻流清涕多嚏。肩項拘急。頭目昏痛。

風府怯寒。

原蠶蛾 瓦上炒令黃

白附子 炮

苦 參

益 智去皮

蒺藜子 炒去角

乾薄荷 兩各一



共為散。每服一錢匕。溫酒調下。日三服。

點頭散方 治腦風頭痛吹鼻。

細辛

高良薑

瓜蒂各一分

硝

石半兩

共研為細散。用新水滿含一口。搯藥半匙入鼻中。良久即定。

遠志散方 治腦風頭痛不可忍。

遠志去心不少

為細散。每用半匙。先含水滿口。即搯藥入鼻中。仍揉痛處。

羌活丸方 治腦風氣鼓。或膈痰氣逆。上衝於頭。令頭旋運。

羌活去蘆頭米泔浸一宿切焙乾二兩半

白蒺藜炒去

芎藭

乾雞蘇各二兩 白僵蠶去頭角炒一兩

共為細末。鍊蜜和丸。如彈子大。荆芥茶嚼下一粒。不拘時候。入龍腦麝香尤炒。

何首烏丸方 治腦風鼻息不通。清涕流出。及諸風疾。

何首烏去黑皮三兩

芍藥一兩

桂枝去粗皮

烏頭

芎藭

甘草炙

薑本

甘松

羌活

天麻

陳橘皮湯浸去白

縮沙蜜去皮各

墨煨存性一分

右一十三味。共為末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。薄荷葱酒嚼下。不計時候。

芎藭湯方 治腦風鼻息不通。或流清涕多嚏。

芎藭二兩

細辛去苗

黃芩去黑心各一兩

荊芥穗二兩

甘草炙剉半兩

每服三錢。水一盞。入薄荷七葉。同煎至七分。去滓溫服。

吹鼻散方 治腦壅頭痛。

蘆薈

龍腦研

瓜蒂搗

硝石研

四味等分為末。每用一豆許吹之。

勝金散方 治腦風頭痛。鼻塞不通。或流清涕。多嚏不已。

荊芥穗

薄荷葉各四兩

木賊去節二兩

蛇蛻二條

四味搗羅為散。每服二錢。清茶調下。食後日三服。

風頭眩

論曰。風頭眩之狀。頭與目俱運是也。五臟六腑之精華。皆見於目。上注於頭。風邪鼓於上。腦轉而目系急。使真氣不能上達。故虛則眩而心悶。甚則眩而倒仆也。枳實湯方。治風頭運倒。眼旋腦項急痛。

枳實去麩炒

防風

麻黃去皮節先煎去沫焙乾

芎藭各一兩

杏仁去皮尖雙炒一兩半

夏和為末生薑汁作餅曝乾

細辛各二兩

粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓。入竹瀝半合。更煎沸。早晚食

前溫服。

人參湯方。治頭風眩。但覺地屋俱轉。目閉不開。

人參

防風

白朮

當歸酒灑切焙

麥門冬去心焙各一兩

獨活

黃芩

桂皮去粗

芍藥各一兩半

粗搗篩。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。食前溫服。日再夜一。

獨活湯方。治風頭眩。仆地屋轉。嘔吐痰涎。惡聞人聲。

獨活去頭

茯神去木各半兩

甘草炙

當歸酒洗焙切

牡蠣煨

白朮

附子

肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

黃芩兩半

防風一兩

遠志去心

人參半兩

剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生薑三片。棗一枚去核。煎至一盞。去滓溫服。

不拘時。

菊花湯方 治風頭眩悶。起卽欲倒。頭痛眼疼。視屋轉動。

甘菊花

細辛去苗葉各半兩

防風

前胡

茯神

白朮

麻黃去根節各一兩

芎藭

杏仁湯浸去皮尖雙仁各三分

每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。入竹瀝半合。更煎沸。食前溫服。

山藥散方 治風頭目眩。眼痛耳聾。

山藥

甘草

五味子

甘菊花擇各半兩

細辛

山茱萸

升麻

蔓荊實各三分

防風一兩

為細散。每服三錢匕。空心溫酒下。

附子膏方 治風頭眩摩頭。

附子去皮 鹽花各半

為細末。以麻油和如稀錫。洗頭摩之。日三。

守中丸方 治風頭眩。腦轉目系急。忽然倒仆。

白茯苓去黑皮 麥門冬去心 白朮 人參

甘菊花釋去 山藥 枸杞子各二兩 生地黄取汁

共八味。將七味搗羅為末。先用生地汁於銀器內。入酥三兩。白蜜三兩。同煎。逐旋掠取汁。上金花令盡。得五升許。於銀器內。拌炒前七味藥。漸漸令盡。候乾。入白蜜同搗數千杵。丸如梧桐子大。每日空心或食後清酒下五十丸。服百日後。五臟充滿。肌膚潤滑。修合須擇四季旺相日。或甲子日。此藥亦名五芝地僊金髓丸。

### 風頭痛

論曰。風頭痛之病。由風邪客於陽經。循風府而上。至於頭腦。令人頭重疼痛。心膈煩熱。上焦壅滯。頭面虛汗。診其脈。左手寸口浮緊者是也。

石膏研

芎藭

旋復花各一兩

白附子炮

細辛去苗葉

甘草炙各一兩

共搗羅為散。每服半錢匕。臘茶調下。不拘時候。

清氣香芎湯方 治頭痛。

芎藭五兩

細辛去苗葉二兩半

人參一分半

甘草炙三分

半夏麴一分用生薑和半夏末作麴用

右五味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生薑三片。薄荷五葉。同煎七分溫服。不拘時候。

芎藭散方 治風頭痛。

芎藭

莎草根炒去毛一兩

藿香葉

荊芥穗各一兩

石膏研半

共為散。每服三錢匕。荊芥湯調下。食後服。

丹砂丸方 治諸風頭痛不可忍者。

丹砂別研水飛

石膏燒通赤地出火毒

白附子炮為末各一兩

龍腦少許

共同研令勻。粟米飯丸。如菘豆大。更以丹砂為衣。每服五丸。食後薄荷茶嚼下。

六神散方 治頭痛眼睛痛。

雞蘇

芎藭

馬牙硝研各二錢

石膏研

乳香研各一錢

龍腦研一匙

共研為細末。每用一匙。含水搐於鼻中。

吹鼻麝香散方 治頭痛不可忍。

藜蘆和州者一莖

一味。暴乾研為散。入麝香麻子許。研勻吹鼻中。

通頂散方 治鼻塞及頭痛。

馬牙硝研細半兩

地黃汁一合

二味相和。於銅器內。用慢火煎乾。取出研細。每挑少許。入鼻搐上。吐痰即差。

### 偏頭痛

論曰。偏頭痛之狀。由風邪客於陽經。其經偏虛者。邪氣湊於一邊。痛連額角。故謂之偏頭痛也。

至靈散方 治偏頭痛。

雄黃研

細

辛

去苗葉為末等分

二味再同研。每用一匙。左邊痛搯入右邊鼻。右邊痛亦然。

乳香散方 治偏頭痛不可忍。

乳香如皂子大

高良薑如指頭大

二味於火上燒。迎烟熏鼻。隨痛左右用之。

天南星散方 治偏頭痛。

天南星酸漿水煮透心硬切曝乾一兩

菊花三分

自然銅燒赤醋淬一兩

防風半兩用水一挑同菊自然銅防風三味煮水盡為度去防風自然銅不用只單用菊花

芎藭一兩

五味除二味不用外。搗羅為細散。每服半錢匕。臘茶清少許調。只作一口呷盡。



分作三嚥。每嚥點頭一點。  
葶撥散方。治偏頭痛。

葶撥

一味爲細末。每用一匙。先令病人含滿口溫水。隨病左右搐入鼻中。

### 漏風

論曰。內經曰。飲酒中風。則爲漏風。漏風之狀。或多汗不可單衣。食則汗出。甚則身寒喘息。惡風。衣裳濡。口乾善渴。不能勞事。又曰。身熱解惰。汗出如浴。惡風少氣。亦名漏風。夫酒以養陽。酒入於胃。與穀氣相薄。熱盛於中。其氣慄悍。與陽氣俱泄。使人腠理虛而中風。故其證多汗。惡風。不可單衣。其喘息而少氣者。熱熏於肺。風客於皮毛也。其口乾善渴者。汗出多而亡津液也。其解惰而不能勞事者。精氣耗。不能營其四肢也。謂之漏風。以汗出不止。若器之漏。久而不治。轉爲消渴。

澤瀉散方

治漏風身熱解惰。汗出如浴。惡風少氣。

澤瀉

白朮

各二兩半

麩

銜一兩

為散。每服二錢。沸湯調。食後服。

黃耆湯方 治風虛多汗。夜臥尤甚。牀席衣被並溼。

黃耆

人參各二兩

麻黃根

牡

蠣服赤各三兩

地骨皮二兩半

龍骨四兩

每服三錢。大棗二枚。同煎空心服。日二。

防風散方 治風虛多汗惡風。

防風一分

澤瀉

牡

蠣服赤

桂各三分

為細散。每服二錢。溫酒調下。空心服。日再。

杜仲散方 治風虛多汗。夜臥尤甚。

杜仲炙炒二兩

黃耆

牡

蠣服赤各三兩

麻黃根五兩

為細散。每服二錢。煎敗扇湯調下。食後服。日二。

### 勞風

論曰。內經曰。勞風發在肺下。其為病也。使人強上冥視。唾出若涕。惡風振寒。夫勞

風之病。腎勞則根勞於下。經所謂根弱則莖葉枯矣。故目視不明。而背反強。腎之脈入肺中。故因皮毛感風而振慄也。腎主唾。故津液凝結。唾如涎涕。治之以救其俛仰者。戒其勞動也。

麻黃湯方。治勞風胸膈不利。涕唾稠黏。上焦壅滯。喉中不快。

麻黃去根

荊芥穗

杏仁去皮尖

木香

當歸

黃芩去心

羌活

芍藥

苜蓿

大黃炮熟各一分

半夏湯洗七遍去滑 牽牛子半兩

每服二錢。生薑一片。同煎。食後溫服。

芎藭圓方。治勞風強上冥視。

芎藭一兩

枳殼去瓢

爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食後溫水下。

萎蕤飲方。治勞風項強急痛。四肢煩熱。

萎蕤三兩

人參

羚羊角鎊各二兩

每半兩。入豆豉三合。葱白一握。以水煎。分溫空腹二服。

# 風頭旋

論曰。風頭旋者。以氣虛怯。所稟不充。陽氣不能上。至於腦。風邪易入。與氣相鼓。致頭運而旋也。又有膈胸之上。痰水結聚。復犯大寒。陰氣逆上。風痰相結。上衝於頭。亦令頭旋。

松香散方 治風頭旋。

松 實去殼

白 芷

當 歸

芎 藭

甘 草炙各三兩

甜 瓜子洗一升

同擣羅為細散。每服二錢。食後以荆芥薄荷清茶調下。

荆芥丸方 治風頭旋。目眩眩。肢體拘急。手足少力。

荆芥穗四兩

細 辛

芎 藭

白 僵 蠶炒一兩各

天 麻半兩

羌 活

防 風

蒺 藜 子炒去角各一兩

同為末。煉蜜丸如鷄頭大。每服一丸。食後細嚼荆芥湯下。茶酒亦得。

人參丸方 治風頭旋。目眩眩逆惡心。胸膈痞滯。欬嗽痰涎。喘滿嘔逆。不欲飲食。

人參

甘草

白朮

旋復花各二兩

麥門冬

前胡

枳殼各二兩

木香半兩

同搗羅為細末。以湯浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服二十九。食後生薑湯下。

祛痰丸方 治風頭旋。痰逆惡心。咽膈不利。

天南星生

半夏生

赤茯苓

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白 焙各等分

稀麵糊丸。如梧桐子大。每服三十九。加至四十九。溫米飲下。

羚羊角湯方 治熱毒風。上攻頭面。目旋暈。耳內虛鳴。身體癢疹。痲痺。

羚羊角二兩

菊花三兩

防風去叉

羌活

前胡

藁本

玄參

黃芩

杏仁去皮尖 雙仁

菖蒲

甘草炙各一兩

每服五錢。水煎。食後溫服。

治頭旋腦悶。鼻塞眼運。貼膏頂方。

蓖麻子去殼

杏仁去皮

食鹽

芎藭搗末



松脂研各等分

先搗食鹽次下四味杵勻即塗於蠟紙上有病者先灸百會三壯訖將蠟紙藥於灸處貼之日一易得膿血出效

### 風痰

論曰風痰之病得於氣脈閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至於心胸痞隔飲食不化則一也蓋風壅氣滯三焦不和則水飲易至停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目不利神思昏濁之候其或嘔逆不納飲食者則因於胃冷而得之其治固不可一概也

半夏飲方 治風痰心腹煩滿嘔逆不欲飲食

半夏湯浸去滑

大腹皮

麥冬

赤茯苓

白朮

桔梗

前胡各三分

青橘皮去白

厚朴薑汁一兩

防風

枇杷葉拭去毛各半兩

每服三錢入生薑一棗大同煎稍熱服

澤瀉湯方 治風痰壅滯。胸膈不利。頭目昏眩。不思飲食。

澤瀉

前胡

白朮

赤茯苓

甘草

人參

半

夏湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩

檳榔

陳橘皮湯浸去白枳殼炒半兩

每服二錢半。生薑半分。同煎溫服。不拘時候。

鐵刷湯方

治風痰胃中有寒。嘔吐痰涎。胸滿氣逆。

附子

五枚炮令微拆地上以盞子覆冷取去皮臍

半

夏湯洗七遍去滑殼炒一兩

木香半兩

剉如麻豆。每服二錢。入生薑一棗大。大棗三枚同煎。空心食前溫服。

天南星丸方

治風痰胸膈煩滿。頭目昏眩。

天南星重一觔每枚一兩者

用湯浸洗刮去浮皮并虛軟處。令淨。用法酒浸一宿。以桑柴蒸。不住添熱湯。令釜滿甑內氣旺。更不住灑酒。常令藥潤。七箇時滿取出。用銅刀切開。揀大者微嚼。看不麻人口。即是熟。未熟即便蒸。候熟。用銅刀子細切。入石臼內。木杵爛擣。

如泥。入丹砂一兩。水飛過者。麝香一兩。細研羅過。丁香末一兩。龍腦一兩。同擣令勻。丸如鷄頭大。又用丹砂末一兩為衣。每服一丸。嚼破用薄荷茶或酒任下。小兒驚風半丸。合時忌鷄犬婦人見。

前胡丸方 治風痰不散。食逆嘔吐。

前胡

白朮

枳

殼去瓢

半

夏湯洗七遍去滑

赤茯苓

人參各三分

白

礬半兩

丁

香一分

為末。棗肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎生薑竹茹湯下。食後服。

逐痰丸方 治風痰壅盛。每日早時多喜嘔吐。

人參

赤茯苓

乾

薑

半

夏湯洗七遍去滑各一兩

為末。以粟米飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心生薑湯下。日午再服。

胃風

論曰。胃風之狀。頸多汗。惡風。飲食不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則腹脹。食寒則泄注。形瘦而腹大。蓋胃者水穀之海。五臟六腑之大源。因而食寒失衣。則風邪入易。



感。故證頸多汗。惡風者。以人迎胃脈之所動也。食飲不下。膈塞不通。腹善滿者。其經循腹裏。其病在中焦也。失衣則臍脹者。重感於風邪。傷肌肉也。食寒則泄者。風寒交傷於胃。故泄注也。形瘦者。精不營也。腹大者。氣不通也。豆蔻丸方。治胃風。頸項多汗。惡風。飲食不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則臍脹。食

寒則泄。形瘦而腹大。

肉豆蔻去殼半兩

羌活

防風

桔梗炒各分

陳橘皮湯浸去白

獨活去蘆頭

薏苡仁

人參

草豆蔻去皮

芎藭各半兩

甘草

木香各等分

為細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十九丸至四十九丸。米飲下。日三夜一。

厚朴煮散方。治胃風冷氣攻心。腹脹滿疼痛。飲食不消。四肢羸瘦。

厚朴薑汁炙

訶梨勒煨去核各一兩

木香

蒼朮米泔浸一宿切焙

枳殼

當歸

桔梗炒各一兩

陳橘皮湯浸去白二兩

為散。每服三錢。棗一枚。同煎溫服。

### 風祕

論曰。風秘之病。以大腸祕澀不通。大腸者。肺之腑。通行水穀。傳導所出。若三焦不和。風熱所搏。則腸胃乾燥。津液虛少。糟粕結聚。傳導不行。令人心煩腹滿。便秘不通也。

前胡丸方 治風氣潤利腸胃。

前胡 二兩

大黃

黃芩

木通

麻子仁

芍藥

各一分

共為末。煉蜜為丸。如豌豆大。每服十五丸。溫水食前下。

調中丸方 治大腸風熱。祕澀不通。

大黃

鼈甲

醋炙黃去裙襴

朴硝

皂莢

桃仁

湯浸去皮尖雙仁。麩炒各四兩。

皂莢

五挺。去皮椎碎。用水一升。投取汁。濾過。

萊菔

一筋。椎碎。取汁。

共六味。將前四味為末。以陳醋一升半。同萊菔。皂莢煎五七沸。後入藥末。同熬

得所。丸如梧桐子大。每服二十九。米飲下。

木香丸方 治腸胃風熱。津液燥少。大便秘澀。

木 香半兩

檳榔

大黃煨

麻子仁各二兩

牽牛子末

郁李仁湯浸去皮

枳殼去穢炒各一兩

為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。溫米飲下。食前服。

威靈仙散方。治老人風氣壅盛。大腸祕澀。五六日方大便一次。頭旋目暗。發作

無時。

威靈仙一兩酒浸焙乾

羌活去蘆頭

芎藭各半兩

為散。每服二錢。空心葱湯調下。

香枳散方。治大腸祕。祛風順氣。

枳殼去穢炒

防風各一兩

甘草炙半兩

三味。搗羅為散。每服二錢。沸湯點服。

引飲導祕丸方。治風熱。大腸祕澀不通。心煩腹滿。體熱。

檳榔

木香

芎藭

羌活

桂各二兩

大黃溼紙裹煨

郁李仁浸去皮尖各四兩

為細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。漿水下。茶湯亦可。

### 癰瘍風

論曰。癰瘍風之病。其狀斑駁。點點相連而大圓。概似白駁而稍微也。皆由風邪熱氣搏於脾肺二經。流散肌肉使然也。

烏蛇散方 治癰瘍風頸面斑駁。

烏蛇酒浸去皮炙二兩秦艸

芎藭各半兩

桂

羌活 人參

山梔子

枳殼

丹參 沙參

玄參

犀角各一兩

升麻 防風

木通

白鮮皮

黃芩 蒺藜子炒去角一兩

苦參二兩

共為散。每日溫酒調下三錢。食後臨臥服。

雄黃散塗方 治癰瘍風。面頰頸忽生斑駁。其狀如癬。

雄黃 硫黃 白礬並研如粉各一分

三味合研勻。以鍊成豬脂調和塗上。

附子散塗方。治癰瘍風身體斑駁。

附子一枚大者。硫黃研半。

蒼耳苗乾者。

三味搗研為末。以米醋調。先以布巾揩瘍上。即以藥塗之。乾再塗。

巴豆塗方。治癰瘍風。面頰頸項忽生斑駁如癬。

巴豆去皮生。醃醋一合。

先以新布措令赤。於故沙盆內。用醋磨巴豆如稀膏。塗於患上。

### 白駁

論曰。白駁之病。其狀斑駁如癬。過於癰瘍。但不成瘡爾。皆由風熱搏於膚腠。脾肺

二經不和也。

治白駁傅方

雌黃

石硫黃各一兩

蛇蛻皮一條大者

同研細。用醋調成膏。先以巴豆一粒中截。以平處磨令皮起。然後傅藥三兩遍

即瘥。

治頭項及面上白駮。漸長如癬。但不成瘡。宜用此傳方。

桂去粗皮一兩

研為末。每用半錢或一錢。以津唾和傅於白駮上。日三。

治面項身體白駮傳方

鮎魚一頭約重半斤去腸肚淨洗後一依鮮法用鹽椒蔥粳米飯拌勻即用青荷葉裹作三包各用蒲片繫

更用荷葉裹裹令大臭爛。先以布拭白駮令赤。次炙鮎包熱熨令汗出。以綿衣包。無令風冷所傷。

蛇蛻皮方 治周身白駮。漸長似癬。但不成瘡。

蛇蛻皮大者一條

炒熱按摩白駮。時時喫唾數百遍。棄之田野草中。

鰻鱺魚塗方 治頸項及面上白駮。浸淫漸長如癬狀。但不成瘡。

鰻鱺魚肥一條

炙令脂出。先將白駮用物揩拭之。令小痛。然後用魚脂塗。

大蛇皮塗方 治面項身體白駮風。

蛇蛻皮大者燒作灰 石硫黃研 樹皮燒作灰二錢  
 三味令研極細。以清熟漆調和。勿令稠鞭。薄塗白駁處。欲塗藥時。先以巴豆中截。用平處摩令皮微起。然後傳藥。

### 白癩風

論曰。白癩風之狀。皮膚皴起。生白斑點是也。由肺臟壅熱。風邪乘之。風熱相并。傳流榮衛。壅滯肌肉。久不消散。故成此疾也。  
 烏蛇散方 治白癩風身體癢麻。

烏蛇酒浸去皮炙三兩 白僵蠶炒

胡麻子

獨活

天麻各二兩 烏頭去皮

細辛

防風去叉

桂 枳實

蟬蛻

白附子炮各半兩

天南星 一分

為散。每服溫酒調二錢。不計時候。

### 治白癩風方

杏

仁去雙仁不去皮尖生用

每日早晨爛嚼二七粒。於白點處措。夜臥再用。

治白癩風方

鷄

子二枚和殼以米醋三升浸七日取白

石硫黃

研半兩

附

子去皮臍生用一枚重半兩者

粟

米二錢

共四味。將後三味搗羅為末。以前鷄子白調如稀糊。臨用藥。先以葛布措患處令赤塗之。

苦參膏方 治白癩風。

苦參

鹽各一分

研為末。先以酒一升。煎至四合。入藥二味攪勻。慢火再煎成膏。每用先以生布措患處令赤塗之。

紫癩風

論曰。紫癩風之狀。皮膚生紫點。搔之皮起。而不癢痛是也。此由風邪挾溼。客在腠



理。榮衛壅滯。不得宣流。蘊瘀皮膚。致令色紫。故名紫癩風。

烏蛇散方。治癩麻紫癩風。

烏蛇酒浸去皮骨

防風

羌活

人參

玄參

沙參

苦參

丹參

白附子

蒺藜子炒去角各一兩

為散。每服一錢。溫酒調下。

附子硫黃散方。治紫癩風斑點。

附子生用一枚去皮 硫黃別研半兩

共研為細散。入胡粉一分。膩粉少許。同繁柳汁和勻。臨臥搽三五遍。早晨溫漿

水洗。不三五夜瘥。

牡蠣散方。治紫癩風。

牡蠣

膽礬各半兩

二味生用為散。釅醋調摩患處。

胡桃塗方。治紫癩風并白癩風。

初結青胡桃一顆取外皮用

石硫黃研一皂子大如粉

二味先取胡桃皮切研如膏。入硫黃末和勻塗之。

羊蹄根塗方治紫癩風

羊蹄根絞自然汁半合生

薑絞自然汁半合

石硫黃四錢研如粉

三味將二汁與硫黃末同研令粘塗患處。一日不得洗。不過兩上瘡。

### 惡風

論曰。惡風者。皆五風厲氣所致也。風有青白赤黑黃之異。其毒中人五臟。則生蟲。亦有五種蟲。生息滋蔓。入於骨髓。五臟內傷。形貌外應。故食肝則眉睫墮落。食肺則鼻柱倒塌。食脾則語聲變散。食腎則耳鳴如雷鼓之聲。心不受食。食心則為不可治。是故謂之惡風。

五參散方治惡風

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

木通

蒺藜子

烏

蛇骨浸去

乾 蠍

天 麻

赤 箭

何首烏

陳橘皮各一兩

黃 芩半兩

原蠶蛾一分

並生用為散。每服三錢。熱茶調下。服及半料。即減服二錢。初服三日後。先覺頭

項脊脊身上疼痛。乃藥力與病相擊也。當安臥兩復時許。即無事。如或身上有

瘡腫。服藥一日後。便覺漸減。

何首烏丸方 治脾肺風并惡風等疾。

何首烏

石菖蒲

荊芥穗

蒼 耳

胡 麻炒各一兩

玄 參

沙 參

苦 參

白花蛇酒浸去皮骨

烏 蛇酒浸去皮骨各半兩

共搗碎為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十九。茶酒任下。如要作散。每服二錢。

溫酒調下。不計時候。

威靈仙散方 治惡風。

威靈仙二兩

丹 參六兩

羌 活一兩

獨 活一兩

蒼 耳四兩

仙靈脾

玄 參

人 參

沙參各二 紫參一兩 甘草生用 黃芩二兩  
為散。食後臨臥。溫水調下三錢。若身體無瘡。眼瞳人不斷。鼻梁不塌。服之一丹可差。

蔓荊實方 治肺臟風毒。發作如癩。變成惡風證。

蔓荊實去白皮生用四兩 胡椒研為末炒 天麻二兩 菊花未開者良

天南星 枸杞生用 苦參研取粉

為散。每服溫酒調下二錢。日三夜一。每服宜去食稍遠。恐藥食相犯。

### 大風眉鬚墮落

論曰。大風眉鬚墮落者。蓋癩病也。皆由惡風染著。榮衛不清。風溼毒氣浸漬肌肉。致淫邪散溢。癢瘙成瘡。皮膚瘍潰。鼻柱倒塌。鬚眉墮落。

枳殼散方 治大風癩病。眉鬚墮落。熱毒風入五臟。身體頭面生瘡。

枳殼去穢炒 黃耆 蒼耳 白朮

蒺藜 白蒺藜炒 防風生用 升麻生用

梔子仁研三

漏蘆

黃連

人參

天門冬

防己

乾薑

芎藭

丹參

麻黃去根節  
去沫

白芷

甘草

葛根各半

玄參堅者  
三兩

烏蛇酒浸去骨  
炙一兩

共為末散。每服溫酒調下二錢至三錢。空心夜臥服。

梔子散方。治大風癩疾。眉鬚墮落。偏身癢麻。手攣縮。

山梔子二兩

芎藭一兩

藁本三分

當歸

蔓荊實各一兩

桔梗三兩

羌活

白蒺藜

白茯苓

防風各一分

側子

天麻各半兩

每日空心溫酒調下二錢。加至三錢。夜臥時再服。服至一料。眉鬚再生。

羚羊角飲方。治大風癩身上生瘡。并面部浮腫。眉鬚墮落。四肢癢痺。

羚羊角鎊

甘草炙各

獨活

山梔子仁各一兩

防風一兩

枳殼

黃耆

蒺藜子

丹參去苗  
少炒

玄參

木通各一分

每服五錢。水煎溫服。每日早、食後、及夜臥各一服。

### 大風出蟲

論曰。蟲、動物也。皆風之所化。風入五臟。化生五蟲。則成五癩。入肝其蟲青。入心其蟲赤。入脾其蟲黃。入肺其蟲白。入腎其蟲黑。四蟲皆可治。惟黑蟲為難療。或所傷未深。專意治之亦差者。

熟艾方 治大風癩。熏出蟲。

艾葉別揉令熟

砒霜研

水銀與雄黃同研

膩粉

硫黃

丹砂研

阿魏酒化去沙石和作餅

附子

雄黃研細入水銀點醋再研令星子盡始入膩粉砒霜硫黃丹砂同研各一兩

麝香研半兩

豬牙皂角研一斤去皮

共十一味。除艾葉、皂角。別搗為末。外並合細研。用紙四張先布。次艾、糝、皂、莢末。次糝、諸藥末。卷刀切如餅。著碗內燒。以小木甌子籠碗。以衣襯四邊。坐於上。熏。以衣被遮壅定。不令透出氣。熱悶即俯伏。

獨活散方 治大風癩出五蟲。

獨活 三分 雄黃 研半 青黛 研一 麻黃 去根節黃

水 銀 研一分與丹砂雄黃點醋同 阿魏 生研 雷丸

丹砂 滑石 研各 石膽 牛黃

紫石英 研各 斑蝥 四十枚與糯米同

芫青 四十枚與糯米同

共一十四味。研為散。每服一錢。空心溫酒調下。不得飽食。晚更服。當有蟲從小便中出。或當日。或三四日至十日方出。若瀉出赤蟲如爛櫻桃。或如豆麥。或瀉出黃蟲似黃涕。青蟲似青涕。茶汁。白蟲似馬尾蟲。遇藥氣即死。或隨大便下。唯黑蟲如豆豉汁。此為難治。

### 大風癩病

論曰。癩者內經為癘。癘者榮氣熱。其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。其證不同。其始則乍寒乍熱。腠理壅塞。血氣精髓耗竭。久而不治。令人癢痺。汗不流泄。

手足痠疼。面目習習奕奕。胸頸間狀如蟲行。身體徧癢。搔之成瘡。或身體錐刺不痛。青赤黃黑如腐木形。或痛無常處。流移非一。或似繩縛拘急。不可俛仰。眼目浮腫。小便黃赤餘瀝。心神恍惚而善噫也。日月浸久。其風化生毒蟲。蟲既變動。外先食氣血。膚革不澤。其內則食五臟。食肝則眉睫墮落。食肺則鼻柱損壞。食脾則語聲散亂。食腎則耳聞雷鼓之音。食心則死。推是癩病。率皆風與蟲之為害也。

羚羊角散方 治大風癩疾。

羚羊角鎊

犀角鎊

吳茱萸湯洗焙炒

羌活

獨活各半

麻黃去根

烏蛇酒浸去皮骨

蔓荊實去白皮

當歸

黃耆

防風

附子

杏仁去皮尖

蒺藜子炒去角各半兩

為散。每服一錢。空心服。食前溫酒調下。

烏蛇丸方 治大風癩疾。若眼脈斷。指節冷落。脚下有瘡。語聲喎。為不可治。如未

有此證。宜服。

烏蛇一條酒浸去皮骨首尾三兩

檀香

丁香



苦根

紫葛

防風

苦參

獨活

沙參

梔子仁

酸棗仁生用

槐子

白芷

附子

藁本

防己

羚羊角

蒼朮醋炒

犀角

草薺

秦艽

桃膠生用

蕪荑仁炒

栝蒌根

烏藥各三

桑根白皮剉三兩

木通半兩

共搗羅為末。鍊蜜為丸。如赤小豆大。每服空心溫酒下十九至十五丸。日二。如不飲酒。薄荷槐白皮湯下。如要速差。宜用後湯藥下。

桑枝湯方 治大風癩疾下藥。

桑枝

柳枝

槐枝

枸杞根

黃荊根

羚羊角一兩各

六味並生用。剉如麻豆大。每服用藥五錢。以水一盞半。煎七分。下前丸藥。服一月。必覺四體皮膚癢痛不可忍。但宜飲酒。不得搔抓。仍頻飲食。避外風。如有汗。必腥臭。及有蟲從皮膚中出如麵塵。或如馬尾頭髮尖。或如線絲尖。或如麩皮。

片。頭黑身白。形色不定。但癢之後。仔細看之。或從小便中出。或從泄瀉中出者。大效。此疾稍退。終身禁房室。又忌動風物。時以苦參湯洗浴。須換新衣。其舊衣并牀薦等並焚之。

艾蒿醞酒方 治大風癩病。身體面目俱有瘡癢。惡汗自出。

白艾蒿

十束每束如升許  
大淨擇水洗細剉

一味。煮取濃汁。拌麩米。一如常醞法酒熟。去糟。取清稍溫飲之。令常醺醺然。

天門冬丸方 治大風癩病。

天門冬

去心生用五  
斗研絞取汁

一味。內瓷器中密蓋口。以蠟封。勿失藥氣。於淨室中經一年取開。其色赤如沙糖。卽入苦沙參粉及乾地黃末。爲丸如梧桐子大。每服十丸。溫水下。食後服。

百花煎方 治大風癩疾。

白

蜜二十

石

榴七顆甜者  
皮用

生

薑切去皮細  
入兩

三味。先研生薑石榴。絞取自然汁。更濾令淨。入蜜盛於瓷瓶。以蠟紙封口。勿令通氣。垂繫於釜中。勿到底。以重湯煎。一復時。成煎。空心酒調二錢。加至三錢。日

二夜一旬日內有惡物隨便而出。是病根散矣。

黃精丸煎方 治大風癩疾。面赤疹起。手足攣急。身發瘡癢。指節落。

黃精生者十斤 白蜜五斤 生地黄肥者五斤

三味。先將黃精。生地黄洗淨。細剉。以木石杵白搗熟。復研爛。入水三斗。絞取汁。置銀銅器中。和蜜攪勻。煎之。成稠為度。每用溫酒調化。二錢至三錢。日三夜一。

久服風癩瘡平。面如童子。延年不老。

婁金丸方 治大風癩病。

金箔五十 牛黃研 麝香研 龍腦研

白附子炮 天竺黃各半 人參 白芷

細辛 芎藭 天南星生用各三分 天麻

白花蛇酒浸肉炙 防風各半 黃耆 藁本

白僵蠶 羌活 麻黃 白茯苓

犀角鎊 羚羊角鎊 芍藥 甘草炙各一兩

甘菊三兩

共研為細末。別用生地黄汁二升。蜜半觔。酒一觔。酥三分。慢火同煎成。放冷。和藥末勻丸。如鷄頭大。每服三丸。細嚼茶酒任下。

黃耆丸方 治大風癩疾。

黃耆

防風

丹參

白朮

白茯苓

芎藭

山梔子

赤芍藥

枳殼

細辛各半

大腹皮三分

升麻

秦艽各二

蒺藜子

獨活

苦參各三

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。空腹煎枳殼湯下二十九。日再服。

烏癩

論曰。烏癩初覺。皮膚變異。肌腠之間。淫淫躍躍。如蟲行動。眼前有物。如系懸布。時發驚恐。言語錯亂。皮肉癢疹。如桃李實。或赤或黑。手足癢痺。不知痛所。或脚下痛。不可踐地。身體生瘡。兩肘如縛。此名黑癩。皆由惡風日漸傷損。血氣不榮所致也。馬先蒿散方 治烏癩。

馬先蒿不計多少一名馬禾蒿一名爛石草細切焙乾用

搗羅爲散。每服一錢。荆芥薄荷湯下。

治烏癩浸酒方

苦參根白皮 五斤

細剉如麻豆。生絹袋貯。好酒三斗。冬浸七日。夏浸四日。每溫飲二合至三合。日二夜一。漸加五七合。

露蜂房酒方 治烏癩。

露蜂房 五兩 苦參 四斤

二味剉細。用水三斗。煮取一斗五升。去滓。浸麩四觔半。炊黍米二斗。如常醞法。酒熟。每服三合至五合。日二夜一。稍增無妨。

雌黃散塗方 治烏癩。

雌黃 半兩

以米醋和鷄子清如膏塗瘡上。乾卽便塗。

白癩

論曰。白癩之狀。語聲嘶啞。目視不明。四肢瘠痺。關節熱痛。如火燔灼。脊脊拘急。肉如刀劈。手足緩弱。身體癢疹。鼻生息肉。目生白珠。肉色斑白。故謂之白癩也。

烏蛇散方 治白癩語聲嘶敗。四肢瘠痺。瘙癢生瘡。

烏蛇酒浸去皮骨炙 葛根各一分 苦參 芎藭 天麻

黃芩 木通 地骨皮 防風

防己 白朮 蒺藜 黃連

莽草葉 木蘭皮 附子炮去皮 烏頭炮去皮

牛膝 萎蕤 檳榔煨 熟乾地黄

芍藥 桂 玄參 龍骨研

石膏研 升麻 菊花未開者妙 蒺藜子妙去角

秦艽 細辛去苗 天雄炮去皮 當歸切焙

甘草 遠志 巴戟天 蒼耳花三分

吳茱萸湯洗 麝香各半兩

右四十二味。搗羅爲散。每服二錢。空心溫酒調下。加至三錢。晡時服。  
白花蛇散方。治白癩。語聲嘶嘎。目視不明。四肢癱痺。關節熱痛。身體癩疹。鼻生  
息肉。

白花蛇酒浸去皮骨

天麻

槐子

羌活

防風

晚蠶沙炒

蔓荊實

白鮮皮

威靈仙

枳殼各一

甘草炙半兩

搗羅爲散。每服一錢。溫酒調下。不拘時候。

### 諸痺門

#### 諸痺統論

論曰。飲天和。食地德。皆陰陽也。然陽爲氣。陰爲血。氣爲衛。血爲榮。氣衛血榮。通貫  
一身。週而復會。如環無端。豈鬱閉而不流哉。夫惟動靜居處失其常。邪氣乘間。曾  
不知覺。此風寒溼三氣所以雜至。合而爲痺。淺則客於肌膚。深則留於骨髓。陽多  
者行流散徙而靡常。陰多者凝泣滯礙而有著。雖異狀殊態。然卽三氣以客之。則

所謂痺者。可得而察矣。且痺害於身。其為疾也。初若無足治。至其蔓而難圖。則偏廢弗舉。四體不隨。皆自詒伊戚者也。可不慎哉。

### 痛痺

論曰。寒氣勝者為痛痺。夫宜通而塞則為痛。痺之有痛。以寒氣入經而稽遲。泣而不行也。痛本于寒氣偏勝。則陽氣少。陰氣多。與病相益。治宜通引榮衛。溫潤經絡。血氣得溫則宣流。自無壅闕矣。

茯苓湯方 治風溼痺四肢痛痺。拘攣浮腫。

赤茯苓

桑根白皮各二兩

防己

桂

芎藭

芍藥

麻

黃去才節各一兩半

甘草炙一兩

每服五錢。棗一枚去核。水煎溫服。連三服。後以薑粥投之。汗出為度。

天雄丸方 治風溼痺。皮肉不仁。骨髓疼痛。不可忍者。

天雄去皮

附子去皮臍各一兩

桂半兩

乾

薑炮三兩

防風三錢



爲細末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。溫酒下。日三夜一。

當歸摩膏方 治諸風寒溼。骨肉痺痛。

當歸 二兩 細辛 半兩 桂 一兩 生地黄 二斤切研

天雄 十枚生去皮 芎藭 半兩 白芷 三分 丹砂 兩研一

乾薑 三分 烏頭 生用三分 松脂 四兩 豬脂 四兩別

共十二味。先將八味剉如大豆粒。以生地汁浸一宿。與豬脂、松脂同慢火煎。候

煎白芷黃色。以厚綿濾去滓。瓷盆盛。入丹砂末。不住攪。至凝即止。每用藥用火

炙手。摩病處千徧。

### 著痺

論曰。內經謂溼氣勝者爲著痺。地之溼氣感。則害人皮肉筋脈。蓋溼土也。土性重。緩榮衛之與溼俱留。并以溼勝則著而不移也。其證多汗而濡者。以陰氣勝也。治

宜除寒溼。通行經絡即差。

天雄酒方 治寒溼著痺。皮肉不仁。至骨髓疼痛。

天雄

附子去皮

防風

獨活

當歸

白朮

五加皮

芎藭

桂

乾薑各二兩

劉如麻豆。以夾絹囊盛。用無灰清酒一斗浸。秋夏五日。春冬七日。溫飲。任性加減。以醉為度。

茯苓湯方 治風溼痺。自著不去。四肢癢麻。拘攣浮腫。

赤茯苓

桑根白皮各二兩

防己

桂

芎藭各半兩

甘草三兩

芍藥

當歸

麻黃去根節。各一兩半。

每服六錢。棗三枚。劈破。同水煎。溫服。如欲出汗。以生薑熱粥投之。汗出慎外風。治風溼著痺。服藥雖多。肌肉猶癢痺。摩風膏摩之方。

防風

羌活

芎藭

細辛

蜀椒去目。并閉口。

當歸

白斂

躑躅花各半兩

白朮

丹參

黑參

桂

附子

烏頭

皂莢

莽

草各一

杏仁半兩

苦參

細剉如麻豆。以米二升拌勻。浸三宿。熬乾。同臘月豬脂二觔。以文武火煎一日。綿濾去滓。瓷餅貯。每用少許。點摩癩痺處。兼治一切風毒。其膏年歲深久者尤佳。

龍虎膏方 治風溼著痺。肌肉癢痺。不知痛癢。

龍骨二兩

虎骨三兩酥炙

當歸

桂各一

皂莢半斤肥者去子

共為末。先別用好肥皂莢十挺。以苦酒三升。掇取汁。去滓。入鐺中煎。減半即入前藥同煎。如稀錫。入瓷盒盛。每用少許。揩摩癩痺處。

### 行痺

論曰。經謂風寒溼三氣雜至。合而為痺。其風氣勝者為行痺。夫氣之在人。本自流通。所以痺者。風寒溼三氣合而為病。然三氣之中。各有陰陽。風為氣。善行數變。故

風氣勝則為行痺。其證上下左右無所留止。隨其所至。氣血不通是也。治法雖通

行血氣。宜多以治風之劑。防風湯方。治行痺行走無定。

防風

甘草各一兩

黃芩三分

當歸

赤茯苓各一兩

秦艸

葛根三分

桂皮去粗

杏仁炒各一兩

麻黃去根節煎去沫半兩

每服五錢。棗二枚。生薑五片。酒一鍾。水一鍾。同煎溫服。

山茱萸丸方。治風痺遊走無常處。亦治血痺。

山茱萸炒一分一兩

生乾地黄二兩

山藥

牛膝

澤瀉

萆薢各一分

天雄

鱗蠟

車前子

乾漆

狗脊去毛

白朮

地膚子各三分

茵芋半兩

共為細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服溫酒下二十九。加至三十九。

皮痺

論曰。風寒溼三氣雜至。合而為痺。以秋遇此者為皮痺。蓋肺主皮毛。於五行為金。於四時為秋。當秋之時。感於三氣。遂為皮痺。蓋正言其時之所感者爾。固有非秋時而得之者。皮膚不營而為不仁。則其證然也。

防風湯方。治肺中風寒溼。項強頭昏。胸滿短氣。噓吸顫掉。言語聲嘶。四肢緩弱。皮膚癢痺。

防風

芎藭

麻黃各一兩

獨活

桂

前胡

五味子

附子

杏仁

人參

茯苓三分

甘菊花

黃耆

甘草各半兩

每服四錢。生薑五片。水煎溫服。

蔓荊實丸方。治皮痺不仁。

蔓荊實

去浮皮三錢

防風

羌活

桔梗

白附子

枳殼

蒺藜子炒去角各半兩

皂

半斤新水浸一宿絹濾去莢滓入麪少許固煎成膏

七味為末。入膏中和搗丸。梧桐子大。每服二十九。食後熱水下。

天麻丸方 治皮膚癢痺。

天麻 二兩

玄參

沒藥 研

地榆

烏頭 各一兩

麝香 研一

四味為末。與二味研者和勻。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。空心食前溫酒下。

### 肌痺

論曰。風寒溼三氣雜至。合而為痺。以至陰遇此者。則為肌痺。其狀皮膚弗營肌肉。癢痺而不仁是也。

西州續命湯方 治肌痺。津液開泄。時復不仁。或四肢急痛。

麻黃 去根節煎

歸 切焙

石膏 研各

芎藭

桂

甘草

黃芩

防風

芍藥 各二兩

杏仁 湯浸去皮尖炒四十枚

每服四錢。生薑一片。棗二枚。水煎溫服。不計時候。

細辛湯方。治肌痺淫淫如蟲行。或腠理開疎。汗出皮膚。肉色不澤。脣鼻黃。

細辛

防風

白朮

附子

桂各一兩

石膏

黃耆

麻黃去皮節煎掠去沫焙乾各二兩

枳實去蘊炒

甘草各半兩

當歸一兩

每服四錢。生薑五片。水煎溫服。

### 血痺

論曰。血痺之狀。形體肌膚如被微風所吹者是也。蓋血為陰。邪入於血而痺。故謂之血痺。宜先鍼引陽氣。後以藥之。

芍藥湯方。治風血痺。身體不仁肉冷。

赤芍

側子

桂

麻黃

草薺

當歸

丹參各一兩

細辛

甘草各半

每服三錢。生薑五片。水煎溫服。

黃耆湯方 治風血痺。陰陽俱微。寸口關上微。或尺中小緊。其狀身體不仁。如賊風所中。

黃耆

芍藥各一

桂三分

每服五錢。棗二枚。生薑三片。水煎。早晨日午晚每各一服。

草薺丸方 治風邪遊走無定處。名曰血痺。

草薺

山藥

牛膝

澤瀉各一

白朮三分

地膚子半兩

山萸炒一

狗脊三分

茵芋一分

熟乾地黄三兩

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。溫酒下。不拘時。稍加至五十丸。

### 脈痺

論曰。血性得溫則宣流。得寒則凝澀。凝澀不行。則皮毛萎悴。肌肉癢痺。內經謂風



寒溼三氣雜至。合而為痺。又曰夏遇此者為脈痺。痺則血凝不流可知也。  
人參丸方 治脈痺通行血脈。

人參

麥門冬

茯苓

龍齒

遠志

黃耆

菖蒲

赤石脂各一

熟乾地黄二兩

為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服食後良久。以清粥飲下三十丸。

防風湯方 治脈痺。

防風

當歸

秦艽

赤茯苓

茵芋去莖

甘草炙

桂皮去粗

杏仁去皮尖雙

獨活各一

每服五錢。以酒水各半。生薑半分。同煎服。

### 筋痺

論曰。經曰風寒溼三氣雜至。合而為痺。又曰以春遇此者為筋痺。其狀拘急。屈而

不伸是也。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。是為肝痺。其狀夜臥則驚。飲多小便數。上為引如懷。蓋津氣乏竭。痺聚在肝。治法以筋痺為先。筋痺既平。則邪弗入於肝矣。

天麻丸方 治筋風四肢攣痺。

天麻

細辛

菖蒲

赤箭

地榆

人參各二兩

附子

芎藭

木香各一兩

桂半兩

苦參三兩

牛膝酒浸二兩

陳橘皮湯浸去白焙乾

白當歸切焙

赤芍

酸棗仁

威靈仙

藁本

防風

獨活各二兩

共為細末。鍊蜜和杵為丸。如梧桐子大。每服溫酒下二十九至三十九。

牛膝湯方 治筋痺。以筋虛為風所傷。故筋攣縮。腰背不伸。強直時痛。

牛膝酒浸

防風

丹參

前胡各二兩

石斛二兩

桂陸蘇

秦艸去苗土

續斷各一兩

陳橘皮去白一兩

大麻仁一合

除大麻仁外。搗篩。每服五錢。煎熟。別下麻仁末一錢。再煎。空心服。日二。  
防風湯方。治肝痺。頭目昏塞。四肢不利。胸腹虛煩。

防風一兩

芎藭

黃耆

五味子

人參

茯苓

獨活

羚羊角銹屑

前胡

各三分

細辛

酸棗仁

甘草各半兩

每服三錢。大棗三枚。水煎溫服。

### 骨痺

論曰。經謂人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄。是人者。腎氣素勝。以水為事。太陽氣衰。腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也。而生於骨。腎不榮。則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以不能凍慄。肝一陽也。心二陽也。腎孤藏也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名曰骨痺。是人當攣節也。夫骨者。腎之餘。髓者。精之所充也。腎水流行。則髓滿而骨強。迨夫天癸虧而凝澀。則腎脂不長。腎脂不長。則髓涸而氣不行。骨乃痺。而其證內寒也。雖寒不為凍慄。則以肝心二氣為陽火。一水不

能勝之。特為骨寒而已。外證當攣節。則以髓少而筋燥。故攣縮而急也。

石斛九方

治腎虛骨痺。肌體羸瘦。腰脚痠疼。飲食無味。小便滑數。

石 斛去根 續斷各三

兔絲子酒浸別研

石龍芮炒

桂各一

肉蓯蓉酒浸三分

鹿 茸去毛酥炙一兩

杜 仲

白茯苓

熟乾地黄各三分

附 子一兩

巴戟天半兩

防 風三分

桑螵蛸

芎 藭各半兩

山茱萸三分

覆盆子半兩

補骨脂

萆 澄各三分

五味子半兩

澤 瀉一兩

沉 香

藿 香各三分

薏苡仁一兩

共為末。鍊蜜和杵數百下。丸如梧桐子大。每服空心以溫酒下三十九。日二服。熟乾地黄丸方。治腎虛骨痺。面色萎黑。足冷耳鳴。四肢羸瘦。脚膝緩弱。小便滑數。補腎。

熟乾地黄

肉蓯蓉酒浸

磁 石煨醋碎二兩

山茱萸三分

桂去粗皮

附 子各半兩

山 藥三分

牛 膝酒浸切焙一兩

石南

白茯苓

澤瀉

黃耆各三分

鹿茸去毛酥

五味子三分

石斛一兩

覆盆子

遠志三分

補骨脂炒一兩

草薺

巴戟天各三分

杜仲一兩

兔絲子二兩酒浸別研

白龍骨一兩

共為末。鍊蜜和杵數百下。丸如梧桐子大。每服空心。以溫酒下三十九。日三服。

### 腸痺

論曰。內經曰。腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。夫大腸者。傳導之官。其所以傳導者。皆冲和之氣。今風寒溼三氣。乘虛客於腸間。則邪留而和氣閉矣。故其證數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。大小腸氣痺。水道不通。故雖多飲而不得洩便。并氣於大腸。使糟粕不化。故中氣喘爭。時發飧泄也。

草豆蔻散方 治腸虛寒溼內攻。腹痛飧泄。

草豆蔻

陳橘皮湯浸去白各一兩

木香

白朮

當歸切焙

白豆蔻仁

丁香

肉豆蔻仁

良薑各半

為散。每服一錢。生薑棗湯調下。食前服。

訶梨勒丸方 治腸痺飧泄腹脇脹滿。

訶梨勒煨用一兩

乾薑三分

當歸炒一兩

黃連去鬚一兩

白朮一兩

木香三分

厚朴生薑汁炙一兩

為末。鍊蜜和杵二三百下。丸如梧桐子大。每服三十九丸。粥飲下。不拘時候。

### 周痺

論曰。黃帝鍼經謂周痺者。在於血脈之中。隨脈以上。隨脈以下。不能左右。各當其所。夫風溼寒之為痺。本痺而不通。今乃能周身上下者。以其邪中於血脈之間。與脈流通。隨氣上下升降無礙也。

黃芩湯方 治周痺身體不仁。

黃芩

甘草

防風各半

秦艽

葛根

杏仁數炒各一分

桂

當歸

赤茯苓各半兩

為散。每服六錢。水酒各半。棗二枚。生薑一片。同煎溫服。日二夜一。

續命湯方 治八風十二痺。

羌活三分

茯苓神

薏苡仁炒各一兩

每服六錢。別入竹瀝一匙。更煎數沸。溫服。日二夜一。

醍醐方 治寒溼周痺。

醍醐一兩

每日空心以溫酒五合和一匙服之。

大豆蘖方 治周痺。除五臟留滯。胸中結聚。益氣止毒。潤皮毛。補腎。

大豆蘖一升炒令香熟

為末。每空心溫酒調下半匙。再加至一匙。

野駝脂方 治周痺。

野駝脂鍊了瀉過一斤

別入好酥四兩。同鍊攪勻。每服半匙。以熱酒半盞。和化服之。加至一匙。空心食。

前各一服。

### 痺氣

論曰。內經謂人身非衣寒也。中非有寒氣也。寒從中生者何。是人多痺氣也。陽氣少。陰氣多。故寒如從水中出。夫陽虛生外寒。陰盛生內寒。人身陰陽偏勝。則自然生寒熱。不必外傷於邪氣也。痺氣內寒者。以氣痺而血不能運。陽虛而陰自勝也。血凝泣而脈不通。故其證身寒如從水中出也。

溫補鹿茸丸方 治陽氣虛。陰氣盛。痺氣內寒。如從水中出。

鹿茸酥炙四兩

人參

天雄

五加皮

五味子

牛膝酒浸

防風

遠志

石斛

山藥

狗脊各一兩

肉蓯蓉酒浸切焙

熟乾地黄各三兩

草薢

石南

蛇床子

白朮各三兩

巴戟天

天門冬

杜仲各一兩半

乾薑

吳茱萸炒

桂

附子去皮



細辛

蜀椒

去目并各三分

白茯苓

兔絲子

酒浸別搗一兩一分

覆盆子

石龍芮

各二

除兔絲子別搗外。搗羅為末。再拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服溫酒下二十九。

加至三十九丸。空心食前日三。

補益黃耆丸方。治陰盛陽虛。痺氣身寒。如水中出。

黃耆

鹿茸

酥

白茯苓

烏頭

去皮

乾薑

桂

芎藭

當歸

熟乾地黄

白朮

兔絲子

五味子

柏子仁

枸杞根

大棗

去核

共十五味。除兔絲子別搗外。同搗羅。再拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下十五丸。日三。

酒下十五丸。日三。

### 熱痺

論曰。內經於痺論有云。其熱者陽氣多。陰氣少。陽遭陰。故為熱痺。蓋腑臟壅熱。復



3 1111 008723619

遇風寒溼之雜至。客搏經絡。留而不行。陽遭其陰。故癢痺燠熱而悶也。

升麻湯 治熱痺。

升麻

射干

甘草

芎藭

人參 各二兩

赤小豆 炒三

麥門冬

生薑

姜 蕤 各三兩

每服四錢。生地黃汁半合。青竹葉十五片。水同煎。溫服。不拘時候。

犀角升麻湯 治熱痺。

升麻 二兩

茯苓

人參

防風

犀角 鎊

羚羊角

羌活 去蘆頭 各二兩

桂 半兩

每服四錢。生薑一塊。竹瀝少許。水同煎。溫服。

