

增補壽世保元

太乙神鍼附後  
錦章書局出版



頭痛  
大醫院史目金路雲林集賢子才編

腰頭痛短者應頸而浮滑風氣必定除寸口緊急或短或深或疾皆主頭痛。

夫頭痛諸陽所聚之處也。諸陰至頭而遇推足厥陰有絳上頭主厥頭其脉浮紫絡長洪大者屬風熱溫大而熱者寒而溫者屬氣血兩虛必汗田渴而髓海空虛為難治也。其有真頭痛者脈無神而腦中勞勞病春有虛有火其心神煩而有身此痛也。且發夕死夕發旦死益頭痛暮起者如鼻塞發熱惡寒乃感冒所致也。其曰頭痛者有虛有火有疾厥頭痛者有偏有正蓋左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荆子酒芩其肩頸處痛者二陳湯加酒炒片芩羌活薄荷其腦項痛者宜人參敗毒散加川芎黃芩本酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃。

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效。

清上蠲痛湯 當歸酒洗一錢 小川芎錢白芷錢細辛二錢活魚獨活一錢防風錢菊花五分葛根荆子錢生地黃一錢麥冬一錢生甘草八分片芩酒炒

五分右剉一酌生姜煎服。

○一在邊痛者加紅花分柴胡一錢龍胆草七分生地黃一錢○一右邊痛者加黃芪一錢葛根一錢○一正額上眉棱骨痛甚者食橘皮鹽用

天麻桂半夏一錢山楂錢枳實錢一錢○一當頭項痛者加藁本一錢大黃一錢○一風入腦髓而痛者加麥門冬一錢蒼朮子一錢木瓜荆芥各

一分○一氣血兩虛常有自汗加黃芪五分人參白芍生地黃各一錢

○一論年深日久偏正頭痛又治肝腫久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭腦而痛頭眩目暎怔忡煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘡癩面上遊風狀若虫行及一切頭風熱治婦人血風攻注頭目皆痛皆治之。

追風散 防風去芦荆芥穗一錢活五分川芎兩白芷五分石膏兩全蝎五分白僵蚕一錢附子錢五分天南星一錢天麻五錢地龍錢川

烏蛇去頭草烏一錢去皮雄黃五分乳香二錢沒藥五分甘草一錢右為細末每服五分茶湯調食後臨卧服清頭目利咽喉化痰

○一論瘦脹頭痛其症眼黑頭癱惡心煩悶氣短促上帶無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安此乃胃氣虛損停痰而致也。

半夏白朮天麻湯 黃柏酒洗一錢白芷錢天麻一錢人參一錢蒼朮三分半神曲炒白朮半夏錢陳皮

洛神一錢右剉生薑三片水煎熱服可一劑而愈。

○一論頭痛偏左者屬血虛大盛也。

○加味四物湯 當歸 川芎 生地黃 黃柏酒知母炒薑荆子 黃芩炒黃連炒梔子炒各等分右剉一劑水煎溫服(風盛加防風荆茶)

○一論頭痛偏右尋屬痰與氣虛也  
黃芩益氣湯 黃芩炒人參 白朮 炙陳皮 半夏炮  
半夏炮許當歸川芎 莪本 甘草

五分升麻 黃柏酒細辛各一 右剉一劑

一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

○調中益氣湯 黃芪炒人參 甘草 炙蘇木炒川芎 姜炙六升麻 茶胡 陳皮 黃柏酒

荳蔻子

三當歸六細辛各一

右剉水煎

○一論偏正頭風一切頭痛諸風眩晕頭目昏重

都梁丸 香白芷切碎晒乾為細末蜜丸為丸如榧子大每服一丸荆芥熟臘茶細嚼下

○一論肩枝骨痛春風熱并發也  
還奇湯 羌活 防風各二酒片芩

一錢五分冬月不生夏月生用者炒用 不生夏月甘草一錢

腹痛

右剉一劑水煎後服

○一論偏頭風者頭痛而起核塊也頭面疔瘡寒發熱均急狀如傷寒

升麻湯 升麻 蒼朮

水酒薄荷葉各等

右剉水煎服

○一證侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏昨暮便止已三年每冬作中氣虛寒用六君子加當歸黃芩木香炮姜而瘥

○一論頭項癢急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風 羌活 細辛 白芷 川芎 蓖薢子 薄荷 防風 甘草各等 右為細末每服二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰壅盛盛小便短赤口乾引飲過舌生黏縮如荔枝核下唇黑紫面目俱赤煩躁不寐或時喉間如烟大上衝急飲涼茶少解已至於心脉洪大而無倫且有力捫其身烙手此督經虛火過行於外投以十全大補如山茱萸澤瀉牡丹

山藥

苓冬五味附子一錢熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後畏冷物而痛

○一論半邊頭痛

祛痛膏 防風 羌活藁本細辛 菊花梢五 南星 草烏 白芷各一 右為細末用連翹莖一把洗淨同前藥搗成膏飼

頓無量痛大小以油紙捲藥貼處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止○一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

醫者所論人頭髮屬腎而所主五臟各異故有老而白者曰肾水不足而髮白者腎氣有所偏故也大率髮屬於心系火氣故上生髮屬於腎系水氣故下生眉屬於肝故側生男子腎氣外行上為鬚下為髮故女子宜人無髮則亦無髮而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

婦人無髮無血氣子岐伯曰今婦人之生有餘熱氣不足於血衝任之脈不榮目故鬚不生

宦者其頭倒去其故何也曰宦者傷其宗筋血泄皮膚故鬚不生夫宦未嘗被傷其頭不生其故何也曰夫宦累賦不足宗筋不成故鬚不生

天下第一烏髮方聞老高中立傳 五倍子一斤擇整個者個個搘破去虫土擇粗者如黃豆大次者如赤豆大分三樣入新罐內炒如粟殼色以青濕布包之以脚踏成餅晒乾為末錫罐盛貯實封口勿令泄氣應用 紅銅末半斤淘去皮見清水令乾入鐵鍋內炒大熱傾入醜醋少半碗拌勻濕透再燒入鍋七次研為末羅過以棉紙另包聽用 白礬末<sub>雨為</sub>白芨<sub>片切</sub>細切為細末紙包右每遇染頭時量頭之多少用藥加五倍子九錢銅末一錢八分白礬白芨皂礬各九分再加食鹽九分共入於碗內再研極細入小銅杓內以濃茶油調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勿熬成稠糊為度預先以肥皂水洗淨剪髮待乾以紙子挑藥末敷頭髮上用油紙兒在外用烏帕包裹至頭解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾以手搜去殘藥如乾甚用茶油潤滑去藥至天明洗面略洗頭髮如面皮上有黑處以指蘸香油塗摩即用軟紙擦去油迹染櫛仍以香油少許潤之即明黑可撲先一月染上四次半月染一次永不露白

野狐倒上樹 尚書劉三川傳 黑鉛膏永經 先將鉛化成汁後入和凝成葉子剪成錢樣外用鐵絲穿作二三串懸用再用大磁罐一箇入無鹽好醋三碗將鉛錢入罐內懸於罐上離罐二指內泡卷柏二箇鳴嘴胆碧四錢用磁罐封固夏月日中晒七日冬月裸火燉七日出罐底搗一孔出罐不用揭起罐來拂下藥用脂皮包伍收之臨用藥時將頭髮以溫水洗净就濕再用脂皮包手指拈藥霜沾在頭髮上自然黑到根神妙切忌膏肥皂水洗

烏發方 刺史周如梅傳 宮粉五兩二錢白箬<sub>二</sub>白石灰<sub>一</sub>樟腦<sub>一</sub>麝香<sub>半</sub>麝香<sub>半</sub>白草霜<sub>半</sub>水銀<sub>一錢</sub>先將銀一錢先研成粉入水瓶結成砂子用碱水和熟蜜蜜漿上約半炷香即洗去

清雲獨步丹 乌髮黑髮延年益壽 赤白何首烏<sub>共一斤黑豆二升半水煎汁浸何首烏</sub>黑豆去皮石楠枝<sub>五</sub>甘草<sub>一</sub>水煎浸五次當歸身<sub>酒洗</sub>赤茯苓<sub>半斤</sub>白茯苓<sub>半斤</sub>人乳浸<sub>一</sub>補骨脂<sub>四兩</sub>桑椹<sub>甘杞子</sub>酒浸<sub>一</sub>甘草<sub>水煎浸</sub>艾<sub>一</sub>懷牛膝<sub>甘草水煎浸</sub>地黃<sub>酒浸入砂仁</sub>同黃柏<sub>一</sub>真沒藥<sub>一</sub>砂仁<sub>一</sub>右爲末忌鐵器晒乾為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空心酒下午間薑湯下臨卧鹽湯下忌三白

造酒烏發方 本府參推傅傳 懷生地黃<sub>四</sub>太常歸<sub>二</sub>小紅棗肉<sub>三</sub>赤白何首烏<sub>各一斤</sub>水製過生薑汁<sub>四</sub>麥門冬<sub>二</sub>胡桃

肉桂甘枸杞二錢肉桂土蜜三錢。右先用酒洗淨地黃，將何首烏水去渣入地黃煮，俟熟再用薑汁水煨乾為度。便將地黃搗爛以一官斗糯米水十二斤作酒麯藥如常。候酒漿米方以水調勻地黃入酒糟內，過三日去糟，將前藥切片入絹袋中，懸酒樽內，簞穀包封，勿令出氣。放鍋內煮三炷香為度。後以酒燶埋土中三宿，去大毒。任意飲三五杯。

烏鬚秘方 用馬蝗蟬半起數條紙包要用時，將雞血或猪血將蟬蟬入血內，令食飽針出血同龜尿同研，灌進頭髮上可烏一月。

乃烏首第一方也。

烏鬚神妙方 本府蘇通府傳 五倍子炒黑，飼木炭白芨末，食鹽忙何子末三分，沒石子末分，白芷三錢，細辛末三錢。右為細末，熱茶酒燶，重湯煮入黑磬再煮，面上生光搽頭上油紙裹立黑。

烏髮狐狸倒上樹 周賓紫傳自蜀中得來 山茹要選頭黑者收約有八九升，去蕊以夏布包洗去藥水，將山茹扭自然汁四五碗，入上好好墨四五錢打碎黑磬四五錢，二味俱入山茹汁內，貼新瓦罐中。每用將竹片蘸藥汁於頭髮上自尾倒上，切莫粘肉上，則洗不去矣。

○一論烏鬚生髮良方 蒲公英四兩切，血餘四兩切，青鹽四錢。右用磁罐一箇，盛蒲公英一層，血餘一層，青鹽一層，塗泥封固。春秋五月夏三日，冬七月桑柴大根令煙盡為度。候冷取出，研為末，每服一錢，有辰酒調下。

○一傷者因飲食勞役及憤怒，鬚髮脱落，余以為勞傷精血，陰火上炎所致。用補中益氣加參門冬五味及六味地黃丸加五味頭髮頓生如故。

○一男子年二十，頭髮脫盡，用六味地黃丸不數日，髮生寸許，兩月復初。

○一史萬湖云：有男女偶合，眉髮脱落，無藥調治，至後數月復生。

面病

華經云：人面獨能耐寒者，何也？蓋人頭者，諸陽之會也；諸陰脉皆至頭項中而還，猶諸陽脉皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交頸中，入齒中，俠口環唇，倚頰車上耳。若遇客主人穴，其或胃中風熱或風熱乘之，令人面癱或面白鼻色青，風刺癰瘍或面熱面皰，隨其經症而治之。

○一論面寒春陽明經虛寒也。

升麻附子湯 升麻葛根白芷黃芩各一錢，大附子炮大半錢，人參草豆蔻各五分，益智仁三分，炙甘草五分，右剉一劑，連根葱白二根，水煎溫服。

○論面赤而明經風熱也

升麻黃連湯 升麻 葛根各一錢 白芍川芎各二錢 薄荷 荆芥各三錢 木香八分 黃連五錢 酒芩六錢 山角四分 白芷加甘草兩 右剉水煎食後服

○論面上瘡毒上焦火也

清上防風湯 防風一錢 刺茶五錢 連翹松山梔子黃連五錢 黃芩七分 薄荷五錢 川芎五錢 白芷加桔梗各一錢 桔梗加枳殼五錢 甘草一錢 右剉水煎入竹漚同服

○論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯 升麻 防風 白芷各一錢 柴胡一錢 蒼朮三錢 茵陳人參各五錢 葛根半錢 甘草一錢 右剉一劑 煎服取天氣上升於中 便陽達於面也

○論面上粉刺者肺火也

清肺散 連翹 川芎 白芷 黃連 黃芩 荊芥 桑皮 苦參 山梔 貝母 甘草 右剉水煎臨臥服

○一粒瘡方 以巴豆七箇石灰等分為末 以鹽水浸在盞內 藏糯米於巴豆石灰內 俟米爛時 慢用針撥動以米齊爛之 約三日不洗自然脱落

○一起字出青方 磷石灰 紫草灰各一錢 人參五錢 加百草灰 煉葵灰各一錢 右為末水調寫字上有泡起佈去耳上

○一出刺青方 馬肉不拘多少 儘令蒼蠅飽食作墻生蛆出晒乾為末 以針挑動青處擦藥其青自出

○一破破面皮 用生薑自然汁調輕粉擦患處更無痕跡

○一洗面方 每早以漱口之水 吐在手掌中 洗面 久久自潤 粉刺自消

○一治赤紅爛臉 水銀 柏油蠟各一錢 共搗塗之

○一治面上瘡瘍酒利方 雄黃一錢 硫黃五錢 鉛粉一錢 右共為末 乳汁調塗晚上敷次日溫水洗之 如此三次去矣

耳病

肺雨寸脈浮洪上魚為溢雨足脉短而微或大而鈍皆屬陰虛法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精等與鬼交兩耳聾鳴或聾

耳者屬肝而開竅於少陽之部 通會於手三陽之間 坎離交則聚氣以司聽以善聽也 關於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通。其耳聾耳聾者皆屬脾虛水不上清氣不升所致也 從補益門治之 其壯年及小兒耳聾耳聾乃三陽風熱壅遏所

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不暢故耳鳴耳重不適及耳內痒。

安神復元湯 黃芩錢五分 人參一錢 當歸酒洗一錢 柴胡一錢 升麻五分 黃連酒炒一錢 黃芩酒炒一錢 黃柏三錢 知母一錢 防風一錢 蓼荆子七分 麥門冬

○一論夢魘氣鬱風動虛驚久聾耳鳴勞聲者勞火故其聽戶也氣鬱者經氣滯塞於聽戶也風革去耳熱閉其聽戶也虛驚者

氣血虛耗而神不用也毒襲脊根血燥礙妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣壅塞也凡是聲勢必耳鳴故總保其耳鳴也

千金補腎丸 當歸酒洗一錢 白芍炒僵熱地黃酒浸一錢 黃芪蜜炙一錢 人參一錢 白茯神一錢 大附子炮去皮脐巴戟去皮 法遠志去核一錢 細辛一錢 甘草一錢 石菖蒲二錢 防風一錢 羊腎去核一錢 共二十三味西園公加山藥二兩

桂心一錢 大附子炮去皮脐巴戟去皮 法遠志去核一錢 細辛一錢 甘草一錢 石菖蒲二錢 防風一錢 羊腎去核一錢 共二十三味西園公加山藥二兩

○一論虛本上升痰氣鬱於耳中或聞或鳴發大瘡盛或憂鬱居渴喉不利煩躁不寧

通利氣湯 蒼朮生水炒一錢 白朮去皮炒一錢 川芎分陳皮一錢 香附一錢 黃柏酒炒一錢 桑子仁炒一錢 母丹生地黃一錢 黃連半錢 汗方酒洗一錢 木香五分 桂榔一錢 甘草四分 黃芩一錢 生地黃一錢 黃連半錢 汗方酒洗一錢 右剉二兩生薑水煎入竹瀝同服

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者

六味地黃丸錢五分 依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心腎鹽

○一治耳鳴主方 黃連 黃芩 桔梗 甘草 當歸 陳皮 膽星略一龍膽草 香附八分 元參 紫草 木香 桔梗 乾薑三分 右

剉一劑生薑三片煎七分入元明粉於痰盂加伍食後脣如作丸子加蘆薈紅腐者外為末神龜糊為丸每服五十丸淡鹽湯送下如腎虛耳鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳聾作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也

射干散 苦竹葉紹源傳 升麻 桔梗 射干 檉布 連翹 甘草 右對水煎熱服汗出立愈並治面腫牙痛咽喉瘡神效

○一治耳鳴如流水聲耳聾及風聲不治久成聾 生烏頭一味搗得乘溫煎如棗核大塞耳中旦易一次夜易一次不三日愈

○一論塞銀治耳聾殊效 石菖蒲子一錢 巴豆去壳一錢 全蠅一錢去尾 右為末葱汁為丸如棗核大綿裹塞耳即通

○一論塞氣熏治耳聾或因病因氣及感風邪而聾者若年老而聾者不治

蚯蚓去土陰乾為末七分麝香三分明慈切寸許塞藥於內左聾塞右耳右聾塞左耳左右俱聾兩耳俱塞即通

○一治耳聾

通靈丹如急瘡五分茶水送服。五分水煎研分半。每服半個巴豆仁細研。右薑絲末入二仁與面同研。並如前法。

○一論停耳生瘻并黃水

紅棉散  
桔白礬加乾胭脂粉半分  
麝香少許  
片腦分熟  
盧甘石分  
右為末先以棉杖子吸乾體水另將鵝翎管子送藥入耳底○一  
方用蛭竹粉易楚甘石亦效

○一治耳卒腫出膿水 用枯碧為末以筆管吹耳內日三四次或以棉裏塞耳中

○一治上熱耳出濃汁 甘草炙升麻 木通 赤芍 桑白皮炒 生地黃 前胡 赤伏苓 蓼刺子 甘菊花等 右剉薑葉煎服

○一治人耳如蟬鳴服四物湯耳鳴甚此元氣虛損之症五更服六味丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有火用八珍湯加山梔柴胡氣虛而有火四君子湯加山梔柴胡若因怒即嘔或鳴定用小柴胡加芎歸山梔虛用補中益氣湯加山梔午前甚用四物加白朮茯苓久用補中益氣午後甚用地黃丸

○一論治人因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脛痛用小柴胡合四物加山梔茯苓陳皮而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動心神不寧以益氣湯去升麻參葛加半夏茯苓川芎白芍竹茹黃柏黃連天麻蔓荆子細辛

○一論耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以瘥為度○一法以紙裹灰火中煨之用良

○一治耳中肺火盛腎氣虛以四物湯四錢黃柏三錢童便煎空心服

○一寡婦耳內外作痛不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黃以抑其血而愈又項間結核如寢珠寒熱用加味歸脾湯加味道遙散○八珍湯方見婦人病加味歸脾湯方俱見婦人病

六味丸歸補中益氣湯方觀四君子湯補益小柴胡湯○加味道遙散○八珍湯方見婦人病加味歸脾湯方俱見婦人病

○一專治耳內常鳴耳聾

獨勝丸 川黃柏去皮八兩人乳汗拌均貼右為細末水糊為丸如梧子大每服百丸空心益湯送下

○一治耳內腫痛膿血出 桔白礬末入麝香少許吹耳中日三四度或棉裏塞耳中立癒

○一治耳聾 細辛為末鎔黃蠟為丸如粟糰大棉裏塞耳中立癒又以灸耳前陷中七壯

○一治氣道壅塞而耳聾聰 用甘遂如棗核大棉裏塞耳中却以甘草放口內隨嚼又宜生葱白塞耳內頻換即通

然右手脈浮洪而數為鼻頭疏。左手脉浮緩為陽風鼻塞。鼻流清涕。

大鼻者肺之經。時常和利。吸飲香臭矣。若七情內鬱。六淫外傷。飲食勞役之過。則真氣不能宣調。清道壅塞矣。寒則溫之。熱則清之。塞則通之。壅則散之。可也。

寒為瘡瘍。為室塞不通。為漏泄不聞香臭。此皆臟腑不調邪氣鬱於裏。而清道壅塞矣。寒則溫之。熱則清之。塞則通之。壅則散之。可也。

○一論肺熱鼻流濁涕。室塞不通。又治鼻不聞香臭。  
細辛散。細辛白芷與防風。羌活當歸。半夏姜。桔梗茯苓陳皮草。十味等分。剉和同。三錢薄荷葉。煎服。氣急調匀。鼻室通。

○一治腦漏。防風。荆芥。獨活。連翹。藁本。辛夷。甘草。細辛。牙皂。石菖蒲。右對水煎服。未效。可將俊藥三味。為末。棉裹塞鼻內。即效。

○一論鼻流濁涕不止者。名曰鼻漏。乃風熱在腦傷。其腦弱。腦氣不固。而液自滲泄也。

蒼耳散。白芷。雨辛夷仁。蒼耳子。薄荷。右剉水煎服。

○一論鼻中流出臭樣水。名曰腦漏。

不善散。辛夷仁。黃芪。人參。五味。當歸。白芍。川芎。白芷。細辛。白黃芩。酒炒甘草。右剉一對燈心三十根。水煎食。追風。

○一治鼻頭或鼻瘻。乳香。沒藥。紅花。各一錢。研末。右為末。擦患處。

○一老人鼻中流涕不乾。獨蒜四五箇。搗如泥。貼脚底心下。用紙貼之。其涕再不發。

○一男子酒醉鼻塞。雄猪胆每日早以好酒調服一盞。不過半月如舊。

○一治糟鼻驗方。用硫黃為細末。甚者加草烏同為末。以酥油調稀塗患處。如覺痛苦。用旋子。煎湯服之。或洗鼻處。即愈。

○一論鼻赤久不瘥。用大黃芒硝。僵蠅等分。為末。水調敷患處。三四次洗淨。以新銀杏去殼。嘴嚼敷於鼻上。不過五七次。即復舊。

○一治赤鼻。僵蠅為末。將茄汁浸晒一二次。為末。面上紅疊。硫磺以人乳浸滿碗。傾入湯鍋煮乾。先須用唾濕鼻方抹藥末。

○一論鼻頭頭眩。

消泥丸。飲神湯。人參。防風。麥門冬。去苦。當歸頭。枯芩。炒小草。黃連。酒炒各蔓荆子。升麻。於生甘草。於明天麻。製半夏。各七

右剉水煎食。追風。腦漏者。加蒼耳子。二錢。黃芪。一錢。

○一論鼻流清涕。人而不愈。乃成瘧漏。必因虧損元陽。以致外寒內熱。甚則有滴下腥臭之惡者。也知保養。服藥方可漸次許痊。

加味防風湯。防風。一錢。芩。酒炒。去皮。五分。人參。一錢。白芨。炒。麥門冬。去苦。生甘草。去皮。知母。錢。白芍。炒。錢。懷生地。一錢。黃柏。一錢。黃芪。一錢。黃連。酒炒。

當歸頭。百合。一錢。

右剉水煎食。追風服。

○一論鼻涕長流。名翼漏也。當歸。川芎。白芷。人參。白茯苓。蒼耳子。香附子。各一錢。天竹黃。仁。防風。秦艽。荆芥。薄荷。

當歸頭。各一錢。

卷之三  
麥門冬  
○一男子鼻流清涕不聞聲三年矣用補中藥加麥門冬山梔而愈

○一論色慄大過虛損白滑漱出清涕如冰涷者

補中益氣湯方見前依本方加黃柏知母白芷細辛荳本五味子白芍半錢杏仁水溫煎服

○一論肺虛為四氣所干裏內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞杳臭川芎白芷細辛荳本防風木通辛夷仁甘草右對水煎服

○一治鼻中肉腫臭不可近補不可搖以白礬末加硼砂少許吹其上項之化水而消與勝瀉湯合漏勺散二劑此味厚壅濕熱等於肺門如雨霽之地天生芝菌也

○一治鼻中向晝周萬節有七處一頭燒灰存性為末吹患處即瘥

○一治血熱入肺名曰酒瘡此方主之苦參四兩當歸二兩

右和匀酒糊丸九如梧子大每服七八十粒食後熱茶送下

○一治鼻瘡辨通鼻孔余治久都憲夫人患此得城鹿角一白箬一把置在瓦上隔火煅過人頭髮在燈火上燒過右為

辰先用花椒湯洗淨捲綿於鼻上三四次即愈如瘡不收口用瓦松燒灰存性研末乾掺之即快

○一人酒瘡鼻紅赤余用此方晚服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦參四兩空心服不兩月而愈

口古

金花丸黃連白桔芩白芍柏子仁黃柏白梔子白大黃二兩酒桔梗二兩白粉葛根二兩右為細末水法為丸如桐子大每服七八十粒白溫水送下

脉左寸洪數心熱口苦○右寸浮數肺熱口辛○左關弦數而虛鳴虛口苦洪甚而實肝熱口酸○右關沉微脾胃有寒熱口甘苦洪數者口瘡或為重舌木舌或為癰瘍生瘡之類經云肝熱則口酸心熱則口苦腎熱則口咸有口淡者

天口舌之為病或為重舌木舌或為癰瘍生瘡之類蘊積於胸膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯加之風熱而然也治宜以清胃瀉火湯

主之此正治之法也如服涼藥不已者乃上焦虛熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴欲水口瘡者上焦虛熱也補中益氣湯主之如手足冷壯腹作痛大便不通飲食少渴口瘡者中焦虛寒也附子理中湯主之如晡熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數口瘡者下焦陰火也六味地黃丸主之如食少便滑面黃肢冷大便土虛也八味丸主之若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處若從脚起乃無根之火也亦用八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽涌泉穴若極用涼藥損傷生瘡為害非輕

○一論心肺虛熱口瘡咽痛胸悶小便淋漓不利

清金導赤散 黃連茶黃芩紅棗子芩木通生地黃細麥門冬甘草竹澤瀉二右剉一劑生薑三片水煎食後頻服之

○一論上焦寒熱心胃二經之火而作口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齒耳面腫痛皆效

消胃湯 大湯 連翹 桔梗 黃連 黃芩 柴子 薑葛各七元參 升麻 生地絡一薄荷竹甘草於 右對水煎煖煖溫服

○一論飲酒過度舌本強腫言語不清此脾虛濕熱以益氣湯加神龜參芽葛澤瀉

○一論上焦虛熱餘熱作渴飲食勞別體憊此內傷氣血而作口舌生瘡者宜

補中益氣湯加味依本方加麥冬五味子

附子理中湯方

附子依本方

○一論晡熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以

六味地黃丸加味依本方

○一論如食少便渴而黃微冷而作口舌生瘡者此大衰上虛也以

八味丸

依本方

○一論若熱未復去晝見夜伏夜見晝復不時而熱或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以  
八味丸及十全大補湯加味依本方加麥門冬五味子

○一論口瘡臭氣繚久而不瘥者用黃柏五錢青黛一錢五分為末每用一錢於舌上津嚥下

○一論口瘡用黃連川椒等分為末每以少許噙舌上嚼漱良久以涼水漱喉有蟲加孩兒茶

○一治口舌生瘡

加味陰陽散 黃連 乾姜 青黛 孩兒茶各等份右為末每用少許噙舌上即愈

○一治口瘡良方 徐杏庄老師傳 生白芍 砂仁

砂仁 右共為末敷上立愈

○一論口瘡連年不愈者此虛火也

土清丸 黃瀆江傳 百藥煎加薄荷砂仁阿司匹林桂枝甘松葉寒水石元明粉五硼砂冰片麝香右為末甘草熟石膏

○一論口瘡連年不愈者此虛火也

天門冬桂枝參等

右為細和煉蜜為丸細碎子大每服一丸噙化下

○人口內如無皮狀或咽喉作痛。喜惡飲食。此中氣真寒。而外虛熱也。用加減八味丸而愈。

○一人舌脣舒出口外者心之苗。又脾之經絡。連舌本。散舌下。其熱當責於心脾二經。經所謂熱勝則腫也。用草麻子去殼紙裹燒出油透紙作撲燒烟薰之而愈。本草云草麻主浮腫。惡氣。取油塗之。葉主風腫。不仁。搗葉敷之。則其能解風腫內熱也。可知矣。

○一人胃弱寒盛。口舌生瘡。被服涼藥。尤愈盛。反渴不止。惡食倦怠。此胃氣被傷也。予以香砂六君子湯數劑少可。再以補中益氣湯加茯苓半夏而愈。夫胃氣不足。飲食不化。亦能為瘡。補中益氣乃治瘡之法也。若虛症而用峻利之劑。鮮不危哉。

○一人脾胃虛弱。養胃湯枳术丸。初有效。而久反虛。口舌生瘡。勞則愈。更以補中益氣湯加半夏茯苓而安。夫養胃湯。香燥之劑也。若飲食停滯。或寒滞中熱。服則燥開胃。寒滞消化。最為近理。使人服則津液愈燥。胃氣愈虛。況胃氣本虛。而用之。豈不反甚其病哉。亦有房勞過度。真氣耗敗。或元氣不足。不能上蒸。中州不運。致飲食不進者。以補真丸治之。若丹田之火上蒸。脾土脾土一紀中焦。自治飲食自進。何口瘡之不愈哉。

○一人舌青黑有刺。乃熱劇也。良由思慮過度。怒氣所得。病者要將舌來。土壁上貼之方好。予製此方。即效。

清心散 赤茯苓去皮。酸棗仁。麥門冬。去心。遠志。甘草水泡黃連。胡麻仁。枳壳。去殼。小木通。沙小甘草。右剉水煎溫服。

○一男子口臭。牙齦赤爛。腹脹。渴。或用黃柏等藥。益甚。時或口鹹。此督經虛熱。以六味丸治之。悉愈。

○一治口瘡。喉痛。牙疼。妙藥。陳上余傳。硼砂。冰片。兒茶。雄黃。分青黛。胡黃連。冰片。右共研末。搽上。

○一香茹治口氣甚捷。蓋口臭是脾有鬱火。溢入肺中。失其清和甘美之意。而濁氣上干故也。涼水調合貼之。即不覺痛。可用刀取如流血。以陳石灰塗之。愈後。舌硬。用白雞冠血點之。即軟。

○一生舌方。以活賢一箇。炙乾為末。收之。如遇此患。敷上合口即已。

○一治舌上腫硬。以百草霜。海螵等分。為末。井花水調敷患處。○又宜真蒲黃。細研。撒舌上。內以黃連一味。煎湯服之。以渴心火。

○一治舌長過寸。研冰片數之。即短。○一治舌無血。出如泉。槐花炒為末。挿之立止。○一治舌急。服出口外。俗云是蜈蚣毒。用雄黃。冠血一小盃。浸之。即縮入。○一舌吐不收。名曰陽痿。○一舌縮不能言。名曰陰強。○一男子舌常破。而無皮狀。或咽喉作痛。服清咽利膈散。益甚。予以理中湯治之。乃愈。

### 萬卷

內經云。牌氣通於口。又云。牌之榮在食。益燥則熱。則風渴。則渴。若唇腫起白處。皺裂如齧。名曰萬卷。有各種。重出如萬卷。

有本細末大如蔥如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳於脾經或因厚味積熱傷脾大要審本病察兼症補脾利生脾血則燥自潤大自潤風自息腫自消若患者急略治者不醫專用清熱消毒之藥或用朱砂揭去處反為翻花敗症矣

○一論肝經怒火風熱傳脾唇脾熱或患者滿脣

舉胡清肝散 柴胡 黃芩 炒各一錢 黃連 一錢 五味子 五分 山梔子 當歸五錢 川芎 三分 生地黃 一錢 升麻 二錢 甘草 三錢 牡丹皮 五錢 右剉一斛水煎食後頻服若脾胃弱去芩連白朮茯苓

○一論陰虛火熱唇燥裂如縫

濟陰地黃丸 熟地黃四錢 茄黃 二錢酒 乾山藥 三錢 五味子 四錢 沙參門冬 三錢 當歸 三錢 肉蓴草 二錢 甘枸杞子 三錢 白菊花 三錢 川芎 四錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○一論中氣傷掛唇口生瘡或齒牙作瘡惡寒發熱肢體倦怠食少自汗或頭痛身熱煩燥作渴氣喘脉大而盛或微細軟弱補中益氣湯 人參 黃芪 一錢 水甘草 五分 銀白木槿 當歸一錢 桔紅絡 一錢 柴胡 升麻 五分 右剉一劑薑棗煎服

○一論唇齦生瘡用橄欖燒灰為末以猪油調塗患處立已

○一論冬月唇乾血出用桃仁搗爛豬油調塗唇上即效

### 牙齒

脉右寸關脈洪數或弦而澀腸胃中有風熱齒痛儿脉洪大而虛者肺虛主虛動搖虛相火上炎而痛

夫牙齒者乃骨之華也骨乃腎主之則諸經血脉津液皆潤澤清涼矣。蓋血旺則涼涼即骨堅固血虛則熱熱則齒浮動人之上唇人之下牙屬腎肺下前齒屬任脈其兩頭上下及環口皆屬於陽明二經故牙床屬土牙齒猶如樹木根土上土涼則根固土熱則齒搖牙即骨也骨不能痛其痛者牙無肉也人食梅多者牙即蛀麻痺而不能力嚼者非酸木制土耶其牙斷肉膿火也牙疏脫者腎之相火也經曰諸痛痒癢癩皆屬心火終心火之下陰精承之若承之者不缺何痛之有其牙患之名有風牙蟲牙牙疳牙齦蓋由於火之不齊也故熱則生風風字有虫又曰血遇火則沸而出牙宣也熱兼外邪則腫痛真陰未盛而熱燔毒曰疳乃漬燭之速凡為治者保腎水者知其本清胃大者知其標疏風和者知其樞益風药善通經間腠則是大藥宜發之義耳。修養家常食淡些則血不凝成積厚味甘辛香殊則不積如治牙至熱不效時熱之積也蓋因緩遠而陰虛嗜味以為補而益增其大其目下嗜慾之益深為成之戒之其小兒牙疳牙痛者以其甘嗜以味而不知茹厚其和重其補而不知攝乳兒作疳者母之道熱也烘培地棉夜被圍於腰痛況臟腑真陰未虧所以為害甚也固不可不留心究明於斯矣。經云腎衰則齒落精固則齒堅

○一論一切牙齒腫痛者皆屬胃熱大盛多子故厚味及服溫燥之藥過多以致胃熱上下牙齦牽引頭心而熱其齒喜冷惡熱者  
味清胃散 寶歸尼氏生地黃錢牡丹皮錢升麻錢黃連分加防風五錢荆芥錢軟石羔三錢 右剉一劑水煎服若牙齦爛半邊痛  
每加防風羌活白芷細辛

若牙齦破而出血者加扁柏葉黃芩荆芥燒末○若虛損人牙痛者加黃柏知母參甘草○若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹  
元參芍药○小兒牙疳者乳母膚加天花粉元參白芷○鴟酒厚喫唇齒作痛或牙齦潰爛頭面頸項作痛者並加犀角連翹甘草  
胃氣齒痛加草豆蔻細辛防風羊脣骨灰去牡丹處

○一論胃有寒熱齒痛或上片痛尤甚者

涼膈散 連翹燒赤子錢大黃四錢芒硝一錢黃芩錢薄荷分如意母五錢升麻酒石膏三錢黃連分甘草八分 右剉一劑水煎服

○一論風牙疼痛 草烏二錢米泔水細辛一錢全蝎稍五錢白僵蚕五錢炒冰片 右研匀搽患處間口流涎內服清胃散 一

○一治風牙腫痛

保才散 軟石羔川烏錢草烏錢花椒三錢右俱生用為末擦牙漱山吐之立已

○一陳布齊遇一道人治牙痛如神 巴豆去壳三錢真川椒七錢右先將川椒略焙為末次入巴豆同研極細入紅米飯世稱搗研為丸  
如黍米大每用一丸貼痛處

○一陳怒軒治牙痛不可忍者 花椒炒 胡椒炒 白礬半錢食鹽炒 右各為末合和同研每少許擦痛處吐涎即止

○一治風冷齒痛 白芷細辛 良姜 薑辦 川椒 香附 蜂房炒 右各等加為細末擦牙搗鼻

○一治牙痛方 黑豆炒 盐炒花椒炒生姜六錢連翹葛根六錢

○一論牙屬腫者牙之餘不作痛作痛者陽明經之大沸血壅牙根齒龈浮起作痛也宜清胃火為主其牙齒肿脣利尿漸覺齒痛才蛀

去乃屬唇之真陰虧久牙不堅是宜服六味地黃丸

滋陰清胃固齒丸 善治牙疼自能固齒 山藥末一斤牡丹皮末一斤黃柏酒炒為黃連酒炒為升麻末一斤當歸末一斤元參末一斤乾葛  
末一斤右用知母一兩山楂肉二兩煎濃湯去滓淨汁煮葛粉為糊又用籼米飯一盞研糊和葛粉同火研匀調已上八味末為丸  
如葵豆大以水飛過研碎為衣嚼乾每服三錢食後白湯送下要忌一切厚味姜蒜椒辣諸般等物

○一治胃經虛熱齒牙作痛者

補中益氣湯附見本方加熟地黃牡丹皮白茯苓白芍

○一論齒動作浮屬脾胃虛熱陰大盛者

○一論虛浮作虛，面白黑色。口乾作渴，日晡則劇。此脾虛也。用益氣湯加減八味丸而愈。

○補中益氣湯內附依本方。

○一論虛浮作虛，面白黑色。口乾作渴，日晡則劇。此脾虛也。用益氣湯加減八味丸而愈。

○一木工部午後有熱，遇勞還精其齒即渴，即海此脾腎虛熱先用補中益氣湯六味丸更以十全大補湯而愈。

○一男子齒浮作痛，耳面紫紅。口乾作渴，日晡則劇。此脾虛弱也。用補中益氣湯加減八味丸而愈。

○一男子口臭牙齦赤爛，腳膝癱軟。或用黃柏等藥益陰時或口鹹此腎經虛熱余用六味地黃丸而痊。

○一男子每遇發熱牙即浮腫，此足三陰虛火，用加減八味丸而不復作。

○一論腎氣虛寒，牙齒作痛，面色黧黑，精神憔悴，脚膝無力。欲食少思，或痰氣上升，小便頻數，齒不堅固，或口舌麻悶畏飲冷水以八味丸散服而安。

○一治胃中客熱，牙疳去血，口臭齒齦腫痛，腐肉。

○甘露散：桔梗葉三石斛根三黃柏二枳殼三天門冬三麥門冬三生地黃三山萸肉三熟地黃三甘草八右剉水煎服。

○一李小園患滿口牙齒疼痛，清煙動搖，飲食不下，乃牙疳也。請醫不效，忽遇一道人傳方，一擦即愈。

○右三味為末，每少許，擦患處，流涎立止。

○一治牙疳根內臭爛黑色，有蟲作痛，鷄內金三錢，白芷二錢，青皮一錢，右為細末，以溫鹽水漱口貼患處即效。

○一治牙疳久不愈，白硼砂二錢，白枯碧一錢，青黛三分，輕粉三分，雄黃一分，冰片一分，右為細末，候睡去時以竹管引藥吹在牙疳上，或以雞翎掃散之。

○一論牙痛或齧風，牙齒動牙，長痛不可忍。宋知府傳：馬蜂膏、白蒺藜、花椒、芥菜、薑頭、荆芥、細辛、白芷、白芍等。

○右剉散，醋罈口噙良久，吐出即瘥。

○一治牙痛，蟲蛀不凹，諸藥不效者。

○拔苦丹：蟾酥少許，朱砂少許，雄黃一分，細辛一分，冰片一分。右將酥乳調和，細細在蛀牙孔內，或痛牙齦縫中，口中涎漬任流出之。內服加味清胃湯。

○一方治虫牙腫痛，用雄黃二分，射干少許，搽於虫孔中。虫死痛止。

○一方治風牙虫牙作痛，用黃芩一箇，以花椒填滿其蕊，以白蜜一錢封口燒存，入白芷、羊脣骨屑各一錢，同研為末，先以清

茶散口噙然後以約擦之及敷痛處如有虫蛀孔作痈以少許塞孔中立驗

固齒明目烏頭裏髮良方 牙痛胃火 颤味所起

齒腫腎虛 房勞過矣 補腎牙牢 清火痛止

節慾甘淡何疾不除 緩

驗良方 擦牙固齒 明目烏頭 香口潤體 久而用之 其妙無比

何首烏黑豆伴熟一大半牛膝草附米酒煎一兩五錢 青盐二錢石子公母城右共為細末每早擦牙滾水漱下能用於鬚髮未白之先

可免添髮之勞 乌頭裏髮百歲不白 固齒牙水世不落真仙方也

牢牙固齒烏頭裏髮秘方 没石子青鹽研細辛二錢地骨皮半錢熟地黃半錢故紙炒四錢右共為細末每早擦牙滾水漱下

擦牙烏頭方 本孫子侯傳 白茯苓炮細辛牙足熟地黃灰五倍子炒右各等分為細末煑糊擦牙曰人覺白者轉黑

○一擦牙固齒牙宜口臭 乌頭烏頭 杖部吳壁林試效 旱蓮草炒研細末香附米四錢右二味入砂鍋炒黑存性為末擦牙

○一固齒烏頭 王斗岳傳 青鹽研一錢角子研一牡丹皮一錢破故紙研七錢細辛研五錢熟地黃研一兩沒石子研百藥煎二錢

右共為末每早擦牙嚥下

○一擦牙防齒患 取青槐枝梗半斤水四碗煎二碗去渣入好鹽一斤煮乾更將鹽炒研細擦牙溫水漱口吐水洗目明日固

齒○修合日期 五月五日 六月六日

眼目

脉左寸脉洪數心火炎上也。間弦而洪肝火盛也。○右寸閼俱弦洪肝木火相火之勢而朱侮所不勝之金而制己所勝之土也。

夫天運拂經則雨暉薄缺人身運和則雨暉滿是眼目之在人猶日月之在天。天明則其晉而昏則其變也。一身之中。惟目最為貴重。春藏臍之精華耳。馬血脉之宗會繫焉。東垣曰。按陰陽應象論云。諸脉皆屬於目。又曰。目得血而能視。五臟六腑之精氣皆上注於目。而為之精。精之窠為眼。骨之精為瞳子。筋之精為目。目之經絡氣之精為白睛。肌肉之精則為約。朱襄曰。筋骨血氣之精而與之併而為系。上屬於腦。後出於項。是故瞳子里。眼法於陰。白眼亦目法於陽。故陰陽合德而為精明也。是以五臟六腑十二經脈三百六十五絡。其血氣皆稟受於脾。上會於目。而為肺。故目者心之使也。心者神之舍也。若精神亂而不守。卒然見非常之色。邪中其精則精弱。則視歧昏。一物為兩也。因事煩擾。欲食失節。勞役過度。致肝肾虛弱。心火太盛。則百脉沸騰。血脉並行。經云。天明日月不明邪害。空氣是也。董說使云。目之有尾赤睛屬心。其滿眼白睛屬肺。其烏睛屬大屬肝。其上下肉胞屬脾。而中間黑睛。一黑如漆者。肾受主之。是隨五臟各有證。然論其所主。則瞳子之間。保重焉。何以言之。目者肝腎外候也。肝取木。腎取水。水能生木。子肝腎而有子母。而能相輔者。是故肝腎之氣充則精形光明。肝腎之氣乏則昏蒙。世稱烏輪亦名利。痛浮翳此肝熱也。腎生清液枯黃繞睛此肝虛也。瞳人闊大淡白偏斜此腎虛也。瞳人焦小或帶微黃此腎熱也。又曰。白睛帶赤或紅筋者。其熱在肺。上胞下

胞或目昏暗如痴者其熱在脾人目眼者輕膜裏水照微四方遯源反和非天一之水而目孰為之主宰乎折而論之則拘急牽  
瞼瞳青胞白痒而清汎不赤不疼是之謂風瞼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕翳裏熱利痛是之謂熱瞼渾而流胞腫而動上壅瞼瞼  
酸澀微赤是之謂氣瞼其或風與熱并則腫而浮赤風與氣搏則瞼浮昏澁血熱交驟故生溼膚東面紅縷倫針之類氣血不至故  
有炒視胞垂在眼盲障之形凌榮而隱紅者為虛熱鮮紅而兼赤者為實熱兩時互露生勢向毒此心熱血旺白睛紅膜如紙拿者  
此氣滞血凝熱證瞳人內湧白睛帶濁色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱已必復為風冷所乘則赤烟眼中  
不赤但為痰飲所濁則作痴肝氣不順而失熱所以羞明熱氣蓄聚而傷胞所以胞合劉河問曰在臟則為趣當除風散熱在臟則  
為裏當養血安神如暴失明者溫翳膜移澣班入眼此風熱也一云班入眼此肝氣盛而發在標也宜表散以祛之如昏弱不欲視  
物內障見黑花瞳子散大皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之觀在前諸公所論治療之法大抵以涼肝清心調血  
順氣為先不可固執水能生木之說而偏補養益腎水恐燥設遇虛證亦不過以當歸地黃等藥潤養之輕則溫補也可也况夫脾  
能發燥肝亦好澇古方專用杏仁乾柿鵝鴨沙蜜為佐果非潤益之意乎抑且脾者諸陰之首目者血脉之宰也故脾虛則五臟之  
精氣皆失所司不得歸明於目矣心者君火也主臟神明宜靜而安相火化行其令相火乃胞絡之火主百脉皆榮於目既嘗侵妄  
動又因和氣所傷而損血脈是故諸病生焉翳目者雖宜養血安神又當兼理脾胃乃良法也至於退翳一疏尤闡利害化翳起於  
肺脾家火熱經則瞼瞼重則生翳有曰真珠異狀如碎米者易龍有曰梅花者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後  
退熱春謂熱極生翳若失去亦熱則血為之凝而翳不能去其有赤眼與之涼藥過多又自滌之以水不反掌而水秘眼特一圓水  
耳水性清澑尤不可規規於點沈緣其喜怒失疏情慾無度勞役眼力注涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火吹喫諸如此皆患  
生於臟腑者也專事點沈可乎哉卒卒受病之因究標本之理也明運氣以調之斟酌藥飲以平之患者又能靜坐閉目澄神息  
慮節飲食戒色慳專內施簡外能愛情目力則無有不安者矣

○一論暴發眼腫如桃井赤眼痛不可忍者

祛風清熱散 當歸尾二錢川芎三錢生地黃三錢連翹黃芩二錢桔梗三錢薄荷一錢防風頭茶一錢羌活一錢桔梗八錢葛根一錢  
草白芷梢一錢右剉一劑燈草七根水煎食後服○眼痛甚加大黃芒硝○風熱加蔓荆子牛蒡子○烏珠痛加大麻子川芎三分用○  
犯眼加蒼朮砂砂○眼生翳障加白蒺藜○眼目被人打傷青痛加大黃○如枝癰腫痛未破作增寒壯熱打重血氣攻心加大黃  
桃仁如打壞傷損內重瘀血不能加桃仁大黃服之立愈

○一論治眼暴發赤腫高苦痛不可忍者

救苦湯 連翹桔梗紅花細辛各二錢歸身或川甘草一錢蒼朮末酒龍胆草梢一錢羌活陳升麻柴胡芍藥防風藁本

黃連 生地黃 黃柏 黃芩 知母 各三 川芎 半錢 右剉一劑水煎服

立消

二治大眼赤眼。暴發腫痛不可忍者。黃連 黃柏 生白芍各一錢。煎水半盞洗之立消。

二沈暴瘡瘍風眼。用皂莢不拘多少。文器盛於三伏內晒之至白色。煩暑十餘日方好。再入黃連末十分之一。每用少許。水和紙

隔洗眼立效。

一治眼暴發腫痛。用白芷枯過為末。每用三錢。將生薑去皮取自然汁調如膏。抹紙上令患人閉目。將藥貼眼上燒一炷香盡痛即止。用溫水輕輕洗去神效。

一外治火眼腫痛。用青碧少三錢。黃土六錢。皆為細末。井花水調作兩篋。如眼睛大。先將眼用水洗淨。次用紙貼紙上。令病人仰卧。用水潤解如乾。再潤兩三時即已。

一治眼暴發赤腫痛。波隱在華門。用大黃末。新汲水調。塗兩眉正上頭兩鬚水潤之。煩更腫消痛止。

一治法如前。用黃連末五錢。薄荷二錢半。為末。用雞蛋清和陽紙塗眼上。良久乾則以水潤之。即消。

一論凡眼疾。暴發新久。腫痛不可忍者。皆緣心火大起所致也。並治一應障翳等疾。

明丸 李中山傳 生地黃 白芷 羌活 獨活 百草 薄荷 防風 荆芥 木柴 甘菊花 草決明 黃連 黃芩  
黃柏 大黃 連翹 桔梗 鳥歸尾 川芎 銅三 右藥十九味為末。煉蜜為丸。如茶葉大。每服三五十丸。白湯送下。清早晚

上各進一服。

一論暴發眼

火升陽湯 黃芩。人參。沙甘草。五味子。葛根花。二積炭。六錢。甘枸杞子。三錢。當歸。川芎。黃芩。此升麻心識薄荷。降氣

本。生地黃。三龍胆草。共。右剉一劑。用水一盞。酒一錢。煎至一錢。臨卧服。次用溫水三錢。煎至一錢。溫服。即愈。如未全愈。將第三

次。濱用水一盞。煎至一錢。溫服。忌魚葷。

一論內障。眼得之脾胃元氣虛弱。心火與三焦皆盛。飲食失節。形體勞役。不得休息。故上為此症也。

和養胃湯 黃芩。五味子。人參。炙甘草。五錢。當歸。酒。白朮。去芦。白芍。橘紅。白茯苓。分。柴胡。升麻。小一錢。葛根。羌活。五錢。防風。桔梗。黃連。黃芩。分。乾薑。加。五味子。共。右剉一劑。水煎。稍熱服。

一論肝主目。肝受熱則不能制血。而肝氣無以榮養。肝氣有熱則有火。又視擊溢大。皆赤色。毒此血不足。肝之失養也。迎風有

瘡。腎之虛也。黑睛者。翳不散。此亦因勞受風。血弱不能行也。宜服此藥。補肝血。滋腎水。益腎氣。大有殊功。

不傳養肝丸 經羊角研。生地黃。熟地黃。肉蓯蓉。酒。甘枸杞子。防風。桂。草。決明。菊花。羌活。當歸。川芎。沙苑蒺藜。炒各

楮定子炒五分 羊子肝小肝盐水 右為細和煉蜜為丸如梧桐子大每服五十四加至七十丸至百丸早鹽湯下午茶下。臨卧酒下。

不飲酒人當歸湯下即補肝重明丸去赤芍甘草。

○一論素面虛弱勤勞眼目昏暗當歸酒洗酒五分 白芍酒炒川芎 黃柏火來汁 生地黃錢龍胆草酒洗 蔴黎杞白朮去皮人參酒

知母乳汁 茄子皮 黃芩酒炒 右剉一斛水煎服。

○一論病日用涼藥過多以致隱症難除防風炒 黃芪炒 炙甘草酒洗 菖蒲荆子去皮 當歸白芷升麻炒 桑胡椒右剉一斛水煎服

補中益氣湯方見內傷依本方倍參。

○一論腎水枯竭神光不足眼目皆暗此壯水之主以制陽光

壯水明目丸熟地黃二兩 淫蕪山茱萸酒蒸取肉一兩三錢 仁蔴苓去皮一兩 川芎二錢 牡丹皮八分 當歸酒洗 山藥二兩 生地黃錢 菖蒲荆子去皮 甘菊花

茲黃連五分 柴胡三錢 五味子五分 右為細和煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十粒用好酒調服。

○一論達年近山爛淫風眼翳障青盲腫痛百病

點眼仙方臨州馬伏所傳  
蕤仁三錢半 青皮去皮梢竹節研去油 方入藥  
珍珠三分五厘生用 琥珀三分生用 熬熊膽一分五厘 牛黃

一分麝香半分 片脑一分五厘生用 蜂蜜三錢五分用浸 大僵化炮去毒 右先秤眼藥罐次加蜜拌後入藥搗合已上八味調匀點眼。

○一論暴發風熱時行火眼神驗

紫金鉢陳有齊秘傳方 川黃連四兩剉為粗末將井花水十錢浸兩三日入鍋煎至三錢去渣再煎至半錢下水膠一錢二分溶

化調後約為細糰銀錢輕粉二宮粉三 右共為細末將黃連汁調為銀陰乾用時將井水磨加熊膽五分冰片二分尤妙。

○一論雨日翳障瘡風熱昏暗色眼皆治。

光明散葛子炒 珍珠共 右二味用竹紙包定將新領銀紫泥罐為篩色石珠在內為丸外用熊胆一錢硼砂二錢大硝三錢研末為衣再用紫泥罐包裹晒乾用炭灰煅煉以七根線穿為度燻四炷香用童便卒之浸黑色為妙又燻根半脊以好醋淬之再燻根半脊大匙用前燻過末藥一錢加熊胆一分為極細末點眼其效如神。

○一論達年近日內障青盲害翳難捱人眼暴發迎風冷淚怕日羞暎肝腎虛損等疾無之悉愈能治七十二種眼疾能醫二十年目

不明者惟有瞳人反背而驚散者不治。

仙傳珊瑚紫金膏薛巡兵秘傳 白蘆甘石砂 内燒後入童便內共十分半瓶加細研一兩麝香研五分 丹丹黃蜜 過三次細研細末

再煉根半脊大匙用前燻過末藥一錢加熊胆一分為極細末點眼其效如神。

○一論達年近日內障青盲害翳難捱人眼暴發迎風冷淚怕日羞暎肝腎虛損等疾無之悉愈能治七十二種眼疾能醫二十年目

右將前七味合研末，稱足合人一處，入缺內再研細，無碎，後入麝片一粒，再研細，勿將麝安用紅袋包過，蜜酒水煎。

珠夏老冬，春秋的老嫩之間，用金調藥令稠稀得所，破器內封固，不可泄氣，照此神效。

○一人兩目作痛，服降火祛風之藥，兩目如紺，熱倦，甚余用十全大補湯數劑，諸症悉退，服補中益氣湯兼六味丸而愈，復因勞傷。

午後目澆熱倦，再服十全大補而痊。

○一人年二十，素嗜酒色，兩目赤痛，或作或止，兩尺洪大，按之微弱，余謂全大補而

余將六味丸，加麥門五味一劑，頓明。

○一人目赤不勝，服去風散熱藥，反畏明，重趨肺大而虛，此因勞心過度，飲食失節，用補中益氣加茯神酸參山藥石斛五味，愈又

營役復甚，用十全大補湯以前藥漸愈，却用補中益氣湯加前藥而痊。

○一論者曰：晴雨目蒙，不能暗視，此元氣下陷，用補中益氣，倍加參葛。

○一論眼病之後，微有上熱，白眼紅多眵淚，每疼痛而隱澁難開，此苦寒太過，而真氣不能通九竅也，故眼目昏花，不勝以補中益氣，

添去參木，陳加防風，白芷，蔓荆子。

○一論內障眼得之元氣，脾胃虛弱，心火與三焦俱盛，飲食失節，形體勞倦，不得休息，故上為此症也，以益氣達黃芩乾薑五味去陳皮。

○一論諸般翳障，舉睛努肉，內障青盲等症。

益府秘傳，搬雲龍光散，蕤仁五分，去核取二分，用溫水浸去核皮，搗實，用牛黃二分，白附子一粒，研末，即好白細羅，四五錢，直用珊瑚砂燒紅，先放一瓣，又燒紅，投入以七次為度，又用童便一粒，燒紅，研末，內以七次為度，又將珊瑚砂以水澄淨，用中的麝氣五分，好珍珠華，取制少，二錢，出珠局，並麝氣，同五分，研砂三分，琥珀五分，雄黃三分，以磁石水研冰水，大煮乾為度，用一方，當門子一白丁香一海螵蛸，每次二分，冰片一分，人龍膽子口，河水洗，剝令淨，乾乾二分。

右精製一處，細研，任意點眼，高者復研，古今天下第一仙方，不可妄傳，匪人秘之秘之。

○一治氣血虛損，眼目昏暗，此壯水以制陽光，有誤服寒涼之過，黑暗全不通路，以十全大補湯加沉香、大附子、白芷、龍膽草主之，又曰：不能近視，而不能遠視，而不能近視，大盛而水虧也，法當補，定志丸加茯苓，又曰：不能近視，良服地黃丸，不能遠視，卧服定志丸，是以通乎足少陰經也，是以知不能近視者，腎水虧大盛也，不能遠視者，心血不足也。

定志丸 遠志去石，菖蒲各二分，人参一白茯神三克，白茯苓二分，右為細末，煉蜜為丸，每服二十粒，米湯下。

六味地黃丸 方見補益。

脉雨寸脉浮洪而溢者喉痺也 脉散而伏毒死

內經曰一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二脉並絡於喉竅氣熱則內結甚即腫脹脰脹甚則瘡瘍甚則不通而死矣夫推原十二經惟足太陽則下歸其餘皆奉於喉雖然內經何獨言一陰一陽經為喉痺蓋君相二火獨勝則熱中絡故痛者速也余謂一言可了者火也故十二經中言喉痺者皆君火為之也惟喉痺急速相大所腫為也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢速內經之言喉痺則與咽舌其兩胃耳然其病同與大故不分也後之醫者各詳其狀強立八名曰單孔城雙乳城子古脈不舌脈喉閉走馬喉閉熱氣上行故搏與喉之兩旁近外腫作以其形似是謂孔城一則為單二則為雙其比孔城差小者名謂之喉閉熱於舌下復生以小舌子名曰子古脈熱結於舌中舌為之腫名曰木古強而不柔也熱結於咽喉腫速於外且麻且痺腫而大者名曰喉瘻風喉瘻舉發暴死者名之曰走馬喉瘻此八種之名確詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以鹹藥之若其大者以辛散之今之醫者皆有其藥也如薄荷烏頭鹽金白蜜樸硝銅綠之類至於走馬喉瘻何恃此乎生死人反掌之間耳其最不誤人者藥如砭針出血血出則病已易曰血去渴止良以此乎昔余治一婦人木古脈其舌滿口諸醫不愈今以瓶針小而鋒者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗余昔又治一男子風喉風腫表裡皆作藥不能下余將涼藥置於罩中下十餘行外用拔毒散敷之陽起石燒研與伏龍肝各等分細末之以新水掃百遍三日始退腫始消又嘗治一貴婦喉連蓋龍火也雖用涼劑而不可使冷服為龍火宜用火逐之人大毒煮之大是也乃使曝於烈日之中登於高堂之上令侍婢搘火爐坐藥鍼於上使藥常極熱不至太沸通口時時呻之百餘次其火自然而散此法以熱行寒不為熱而扞格故也大抵治喉瘻用針出血最為上策但人畏針委曲求全憚息喪命凡用針而有針刺者宜搗生薑塊調以熟白湯時刺之則利口易含銅人亦有失法然痛微者可用速者恐逼刺殺人故治喉瘻之人與救人固不容少待內經大發之欲謂發汗喫中豆能有汗故出血者乃發汗之一端也後之君子母教小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血若幸遇小疾而獲效不幸遇大病而死矣毋遺後悔可也

○論喉痺危急死在須臾牙關緊閉 病人大指外邊指甲下根不問男左女右用布針針之令血出即效如大陵危急兩手大指俱針之其功尤捷

○一論治不測急慢喉痺腫塞不通

開闢神應散 盆硝白僵蠶白僵蠶金丹青黃粉甘草冰黃芩馬勃三分膾一錢半以新汲水小半盞調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散若是諸般舌脣用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下然後津唾如是小兒一錢作爲四五帖亦如前法用並不計時候馬勃一名馬光菌也虛軟如紫蘇葉之葉皮

出狀如狗脾生濕地圖中久病虛生寒症。馬外傳消癰良以宣肺排調而治喉脾咽痛。

○一論喉腫瘡痛苦延至數初起或壯盛人上焦有寒熱者可服。

清咽抑火湯 連翹一錢片芩皮薄荷頭防風一錢桔梗二錢硝黃連一錢黃柏伍分知母一錢梔子一錢玄參一錢牛蒡子一錢大黃一錢甘草五分

右剉一劑水煎頻服。聞生過楊梅瘡者加防風山芍根二兩。

○一論虛火上升喉內生瘡喉閉惡毒最能降火滋陰。

滋陰降火湯 當歸一錢川芎一錢白芍二分

川黃柏一錢生知母一錢懷地黃一錢天花粉一錢生甘草一錢加玄參一錢白桔梗三錢

右剉一劑水煎入竹港一盞溫服。

○一論喉脾腫瘡聲啞不出飲食不下陰虛相火上炎喉微瘡喘潮熱虛勞等症內服此藥外用神仙通膈散吹之即愈。

滋陰清火湯 桑葉地黃一錢山茱萸一錢白芍一錢白茯苓一錢山藥一錢橘紅一錢桔梗一錢玄參一錢牡丹皮一錢黃柏一錢黃芩一錢天門冬一錢甘草一錢

右剉一劑水煎服外用硼砂一味噙化噙下降痰清毒如神。

○一論喉瘡腫痛屬弱者或服涼藥過多而作渴者皆可服。

消上養中湯 小甘草一錢桔梗一錢玄參一錢當歸一錢黃芩一錢陳皮一錢白芷一錢白茯苓一錢麥門冬一錢連翹一錢人參一錢防風一錢金銀花一錢

各八分

右剉一劑水煎食後頻服有度加貝母。

○一論喉瘡腫痛不能言語或吐或渴或不食或四肢冷痺但可進藥無不愈者此從治之法也。

通關散

芙蓉草一錢人參一錢

白芷一錢

桔梗一錢

防風一錢薄荷一錢

荆芥一錢

五制首烏一錢

乾薑一錢或加大附子一錢

右剉水煎頻服與服

○一論喉瘡變單乳頭風腫吐噬不下死在頸項治一匙喉瘡之總司也山豆根為末用熊胆和為丸用雞脂皮陰孔研末為膏如承

豆太每用一丸放舌上徐徐嚥下即愈。

○一治喉風等症。

起死回生散 蟬蠅一錢地膽石一錢全蝎一錢沙蟬退一錢僵蚕一錢穿山甲一錢炒僵酥一錢乳香紅川烏各一錢右為細末每服

一錢五分或二錢小兒每服一分或六七厘用急頭搗爛和華酒送下出汗為度如口不開在脣脰項搗服

○一論單乳頭風喉瘡喉瘡水漿不入死在頸項賓榮周密家試驗

胆石一錢硼砂八分雞內金一錢枯白芷一錢白草

霜三錢

黑豆皮一錢

右各為細末用竹罐過用中指盛藥按上患處入嚥令瘦多去後用華蕣湯漱口如其將愈則削去刺破用華按上

或用鉛毛繩帶禁利上滿口利擗引痰出盡即愈一方加熊胆五分更妙。

○一論喉風腫疼痛癰瘍雙橋周密家屢驗 茶子霜梅醣醋右三味研細去渣將藥汁醣掃喉即時吐痰而愈。

○一論喉痺腫渴水不下死在頸更用此一吹即活 牛黃一錢砂一錢黃芩 右為細末每用一分五厘吹入喉內即愈

○一論喉痺腫痛 車在源傳效 鑄金一錢黃芩巴豆肉桂各四個生用雨用 右為末三味混和每用一分二厘入竹筒

內吹患處小兒用六厘

○一治喉閉風閼難治者 猪子皂角一条用蜜調和水煎如急立服緩則愈一宿尤妙倘如口噤者擎開准之須將危者即愈

○一治喉風危急 用木黃為末竹筒盛之安青魚胆火個入未待乾研末匙服遇患喉痺吹入鼻中或喉中立效

○一論時氣綿蠶入喉瘞塞水飲不下子細紫桑葉

神鷹散 雄黃 桔若 藥盤生半夏  
用生半夏者 右各等分為細末每用豆大一極吹入鼻內吐痰神效

○一論喉瘞乳瘻咽喉腫痛渴水不入死在水火之危已豆去壳搗為末入細辛木少許同研勻捲在布內中間剪斷如左患瘞右

舉如右患瘞左鼻孔中雙腫左右相皆塞之咽喉立開如神

○一論喉瘞腫痛水漿不入死在頸更以蜜扶滿劉仲宣傳先用皂角細辛為末擦牙次用陳醋松葉燒成霜梅肉生艾葉搗爛同扎

於快酒上蘸喉數次吐痰盡即食百沸湯食後用米粥調服

○一論咽喉腫痛 百藥煎 破砂 甘草 生白芍各等份右四味為細末每服一錢食後用米湯調細細嚥下

○一論喉瘞腫痛 宜用大用增潤膏外腫上乾則易其乳頭即破而愈

○一論喉瘞風腫痛不可忍者 霜梅五錢或七錢去核白砂一兩研爛用好醋一碟入藥同煮以柴化為度為溫用銀九錦繩山土

至傷光嫩牙肉自外而破至舌下自舌下又繩至舌上繩至喉其瘻自然消此疾希疎者即愈無殊者終斷不治

○一論喉瘞瘻塞不通者 用紅藍花搗絞取汁一小鍾服之以瘥為度如冬月無濕花可浸者濃縮取其汁如前服效

○一論咽喉腫痛

吹喉散 周印池傳 牙硝五錢硼砂五錢雄黃二錢金銀冰片二分 右為細末每用少許吹喉立效

○一論咽喉腫痛水吞不下 用青鹽白硼砂各等分為末吹患處有痰吐出而愈

○一論咽喉腫痛水服不入死在頸處 用真麻藥為末用姜頭點入針管上即時消散其效速如風

○一論久嗽喉痛 小太平丸 人參五味子三天門冬五味子麥門冬五味子熟地黃三錢生地黃三錢川芎一錢

○一論勞役過傷忍咽喉腫閉不省人事喘促痰涎汗出如水肢體痿軟脉浮大而緩此飲食勞役無根虛大上促也

補中益氣湯方見內傷依本加向極補之

○一論咽喉腫痛口舌生瘡勢則愈甚此脾胃虛弱將脫有熱也  
補中益氣湯方視依本方加玄參酒炒黃柏知母稍愈去知柏加山藥山茱萸

○一論咽喉腫痛脈浮約過急又過勞病愈甚此中氣虛熱也  
補中益氣湯內視依本方加炒芩連

○一論積熱上攻痰延壅喉嚨痛聲嘶腫痛雜品

上宮清化丸內閣秘傳 黃連去毛桔梗去芦山豆根去毛粉草去毛蓬荷葉去毛白硼砂去火右為細末煉蜜為丸如艾實大時常噙化

○一論喉痛有痰聲嘶薄荷去毛細茶去毛白硼砂去火烏梅肉去核貝母去心冰片去火孩兒茶去火右為細末煉為丸如豆角子大每噙化下

○一論聲嘶甘草 烏梅 桔梗 烏藥 右剉水煎溫服

○一論出聲音方 詞子去皮木香去毛甘草研右剉水煎入生地黃汁一合再煎數沸放溫分六服每食後日進半料

○一論聲嘶失音

鐵笛丸 當歸懷牛膝去毛懷地黃去毛懷生地黃去毛天門冬去心甘草去毛麥門冬去心黃柏去心知母去心參去毛白茯苓去皮阿膠去火五味子去核人乳去毛牛乳去毛烏梅肉去核甘草去毛白芍去皮白芷去皮桔梗去毛右為細末煉蜜為丸如黃豆大每服八十九丸訶子湯下蘿蔔湯亦可

○一治失音 用槐花新枝上炒熟懷之隨處細嚼一二粒久久自愈

○一治失音 用生白芷 煉蜜為丸服效

○一治聲嘶失音不出 用蜜入猪板油切爛入蜜內重湯煮熟食之

○一論痄腮腫痛 防風 刺芥 羌活 連翹 牛蒡子 甘草梢等 右剉水煎服外用赤小豆和醋調敷恐毒氣入喉難治

一亦用石炭不拘多少炒七次地下放七次醋潤塗腫處立愈

○一論痄腮疼痛及吹乳 南薄荷去毛班貓去毛三錢 右為細末每服一分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散一服

○一治痄腮中生肉以綿裹浸頭蘸藍指肉上日六七度易愈

○一人患痄腮以防風通聖散治之腫不能消此症須針之或無奈牙閼已開遂刺少商穴出血口即開更以胆管入患處吐痰一二碗許仍投薦乃愈嘗見患此疾者畏針不利多挑少商穴在手大指內側去爪角如葷雀許

○一人喉間腫痛寒熱脉為此少陰心火少陽相火二經為病其症最惡惟刺患處出血為上因彼畏針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃順針則牙關已塞不可針遂刺少商二穴以手勒去黑血口開仍刺喉間治以前药及前吹喉散吹之頓愈又以人參敗毒加芩連牛蒡子玄參四劑而平。經曰大藥發之謂發汗出血乃發汗之一端也河間云治喉之火與救火同不容少怠當是喉閉不去

血寒風不去疾以致不救者多矣每咽喉腫痛或生瘡毒以利防收毒就加芩連重者用防風通聖散

○一男子口舌常瘍如無皮狀或咽喉作痛服諸藥愈甚余以理中湯一劑乃可

○一人脚發熱刺咽喉作痛內熱口乾痰涎上壅此腎經虧弱火不歸經用補中益氣湯又加參門五味及用加減八味丸而愈

○一人患喉瘍日晡益甚此血氣虛而有熱用八珍湯而愈後每入房發熱頭痛用補中益氣湯又加參門五味及六味丸常服後不復作

○一丹溪先生云咽痛屬血虛用四物湯加竹瀝陰虛大上火者必加玄參氣虛加人參竹瀝又云咽喉腫痛有陰虛陽乘者起疾結在上者脉必浮大重取少陰去死為近宜人參一味濃煎細細飲之如作寢症治之福如反掌此發前人之未發妙無窮之大旨

但此一方不可斟酌用之  
青州附子不可無熟水

○一人因怒氣大呼將下臍脫落任便不上深視指手余以烏梅桂圓蜜於兩腮生牙盡頭挖處乘口流涎須臾隨手撮上

補遺

○一治喉瘍如生毒物并單蛾喉嚨並治

巴豆半夏各等分將此兩味用項好繩放小罐內煎熟取巴豆半夏一起研末用藤布包做數粒如豆子大以前醋浸之取一粒含在喉痛處至熱又換別粒含之直至吐渴而後已既以稀粥補之而愈忌冷水諸油

○一利膈生津止渴清音常用之藥也 烏梅一蘇州薄荷葉四右為細末白糖霜四兩蜜為丸如艾葉大每用一丸噙化

○一治喉風咽痛雙單乳蛾 姜師周傳 乌梅去核竹签插在蛭蝶身上陰乾取燒灰存性為末點患處立愈

○一治咽喉腫痛生瘡聲嘶危急之甚及治虛營聲嘶喉痛神仙通監散 費蘭華秘方 白硼砂二錢兒茶一錢蒲黃一錢青黛一錢牙硝一錢桔梗一錢白滑石一錢寒水石一片膚升黃連末五錢柏木炭右為細末吹喉中立效

○一治喉中熱甚腹痛喉間乳蛾等症

清上丸 熊胆加雄黃五硼砂一薄荷葉五青鹽五胆碧少 右為細末煉化白糖為丸如艾葉大卧時含一丸自化人喉神效

○一治聲音不出 真珠子一錢杏仁三十百華蕊二錢右為末每服二三錢熱酒調下

○一治欲好聲音 用杏仁一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧桐子大空心米湯送下十五丸

○一治失音 皂角一條去皮子蓮蕊三個切片水煎服之不過三服能語聲

結核

熱氣核核自消。大法宜二陳湯加竹瀝多服為效。

梅核氣者室礙於咽喉之間，塞之不出，噫之不下。如梅核之狀者是也。始因喜怒太過，積熱鬱腫而成。病發勞致有斯疾乎？治宜導痰開竅，清熱順氣。加陳皮半夏川芎香附山梔黃芩枳壳蘇子之類是也。如老痰凝結不解，以威能軟堅之藥海石是也。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。  
○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。  
○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

○一論咽喉結核成塊，如核桃者，腫硬疼痛，四腋下俱有，及頭項腫硬，頭不能轉。

等處大如升斗。或破如菌燭。不問大小俱治。以前法必多敗以愈為度。

補遺

神故治瘻瘍妙方 陳姑所傳 天花粉三  
昆布酒洗貝母半炒鹽發一兩全蝎五個炒黃連頭知母一兩蒲公英二錢陳皮一青皮  
一炒胡蘿蔔尾頭黃芩酒洗桔子一兩紅花五 土木蔻桂川山甲一兩連翹去心一海藻酒洗一夏枯草五錢右將前十九味君臣  
共分為十劑。其蒲公英夏枯草每服各照數用白水煎。臨服時加濃酒一杯同服。

○一治瘻瘍金星膏 蘇九寧傳 金星鳳尾草一兩塞竹葉半盞白三寸剝柏葉一兩黃為底用綿布袋捲去渣仍入鍋內熬無油一斤淨入項好鉛粉三兩用竹管分三式火熱看烟起黑色再入鉛粉四兩着四十五下鍋。仍用竹不住手搅匀滴水成珠取起放在地上再攏去大毒。

○一治瘻核氣核 陳出宣傳 黃芩五錢枳壳一錢貝母一錢子芩海藻分香附七錢連翹白桔梗白芥子甘草三錢到水煎食後服。夏枯草分右剝白水煎食後服。

○一治瘻氣核頭大 黃雷門傳牛蒡子五錢連翹防風白桔梗白芥子甘草一錢金銀花一錢桔梗一錢連翹白芥子甘草一錢白水煎食後服。

○一治瘻氣核 心泉經傳 用黃泥作窩入生白箬四兩鹿角蛇一條在窩內陰乾火煅化為末。每服一分溫酒調服立消。

○一治項後側少陽經中癰瘍肉子不空不圓大小及日月深淺或有赤硬腫痛 生山藥去皮草麻子一錢右二味研勻摊帛上貼之如神。

○一治梅核氣

加減四七湯 蘇梗白陳皮五錢厚朴三分南星二錢杏仁三生夏枯草一錢青皮二錢砂仁八錢智仁一錢白芷葛根分神曲炒二錢柳枝一錢

右剝生薑煎服

癰瘤

夫瘻瘤者多因氣血所傷而作斯疾也。大抵人之氣血循環無礙壅積之患。如調攝失宜。血凝結皮肉之中。忽然腫起狀如梅子。久則滋長。復有五種曰石肉筋血氣是也。瘤有六種曰骨指石肉膿血是也。治法燒瘤二者切不可針破。針破則膿慢漏則殺人。惟脂瘤可破去脂粉即為異。不可輕易。余將癰瘤之分子。僕醫者宜審辨之。則不悞也。

消癰湯 海藻洗龍胆草海蛤粉硝二通草昆布性存枯白箬松蘿硝一半夏二兩零細一兩白芷兩右為末每服五錢酒煎。

烏甘草蟬魚諸肉五辛諸毒等物。要吞碧城丸。

○一論治癰瘍癰疽便毒惡癰久漏不愈者。

經驗碧城丸 白芷研末為末黃蠅再溶化眾手為丸如梧桐子。每服三十丸空心白湯下。

○一論內府秘傳方 治癰氣 海螺(海螺昆布)海帶海螺蛸 海粉融海螺湘甘草砂右如項下搘者用長螺旋不搘用圓螺各等分為末。煉蜜為丸。每夜臨臥口中噙化一丸。功效不可言也。

○一論聚瘡神方 兼去鼠奶奶及癰同。用芫花根洗淨帶漏不可犯鐵器須於木石器中搗取汁。用線一條浸半日或一宿。將線繫瘡敷瘡口即合。如經有則落如未落再換一線。不過三次自落。用龍骨阿子赤石脂各等分為末。無根用芫花泡水浸銀紫鼠奶奶依法用之無一不效。

○一論洗瘤秘方 用茶指草名金風花一科煎水頻洗。夏用鮮。秋冬春用乾煎水洗。

○一治療驗方 沉香 乳香 丁香 木香 霍香五分各一錢 右用臘月母猪屎七箇同藥研細。酒煮三炷香露一宿連藥焙乾為末。煉蜜為丸如白果大。每臨臥噙化一料效。

○一治頭下卒結氣成瘻者 海藻一斤洗去鹹酒浸飲之。加昆布等分為末。煉蜜為丸如杏核大含口中。稍相噙下。

○一治療消塊

神效開結散 沉香 木香各一橘紅四玲珠四十粒和入炒鹽內以猪胰子肉四寸九吸研細。每服一錢。臨臥酒調徐徐噙下。患小三五脹大者一劑愈。忌酸鹹油膾滑氣之物須用除白於淨室修合。

### 肺癰

肺寸口脉數而寢者肺癰也。其脉短而滑者。自產。脉浮大者雖治。

夫肺癰者由寒熱之氣內含於肺。其氣結聚之所成也。蓋因調理失宜。勞傷血氣。風寒得以乘之。寒生熱。風亦生熱。壅積不能遂成。肺癰吸而膈滿。右胸隱痛。二脚腫。渴。咽乾。多渴。時出黃噦。腥臭狀如糯米粥。難治。有熱而噦者不可治。噦。脾虛而止。自愈若。嘔。氣吐。腹黃色。腹臭。或帶粉紅色者。即肺癰也。大抵脉細而沉裏虛而受症矣。

○一論咳嗽吐膿血腥臭不可聞者肺癰也。黃芩水防風 金銀花 忍冬藤 金沸草 牛膝 桔梗絡等 右用鴨一隻。鑑匙破開入前七味。蒸於鴨肚內。用好酒煮盡為底。吃鴨藥渣。酒為末。酒調服後服淨膿湯。

淨膿湯 此湯吃鴨後宜服。甘草四兩。剉作大帖。用水煎頓服。如納不得。吐出之服後化痰止咳丸 白芷桔梗百草霜各一兩。右二味為末。清水為丸。每服三五十丸。人參五味各三錢。煎湯送下。作三日用。

○一論治肺虛用白鳴一隻去內臟用薏仁杏仁各一兩入鴨腹中飯上蒸熟去藥則吃鴨肉大能補脾。

○一論肺癰吐膿腥臭用黃豆一粒於病人口唾不覺豆之氣味是肺癰也。

○一論肺癰將薏苡仁畧炒為末糯米飲調服入粥煮吃亦可或水煎服當下膿血而安。劍歸丹方見癰瘍凡治肺癰必將此藥間而服之以護膈肺不致潰透心肺最為切當即蠟君如意水送下。

肺癰

肺寸口脉數而虛者肺癰也。

肺癰之後久咳不已汗下過度重亡津液便如爛瓜下承脂水便數而不渴渴者自愈欲飲者欲癰此由肺多壅沫而無腫者肺癰也。

○一論肺癰咳嗽其証辟辟燥咳胃中隱隱而痛肺弱無力。

薏苡仁散 當歸 白芍 黃芪 人參 五味子 麥門冬 桑白皮 黃芩 百部 薏苡仁 右剉生薑煎服

心漏

○一論胷前心有孔常出血水春謂心漏也。

鹿子丸 嫩鹿耳去毛脂及頭黃 大附子去皮鹽 薑花粉等 右為末蜜為丸每服三十丸空心酒送下。

○一論脣下生漏瘻如牛眼之狀膿水不止用鹽少許安牛乳內然後取耳中垢以敷瘻上即瘻如不用鹽即牛耳不痒難取其垢耳諸漏瘻外用蒜切片放瘻上將艾灸之不論數次即愈。

○一論漏瘻血水出不止蛇皮燒灰 五倍子 龍骨粉五三錢 川續斷鱗乳香三分右為末津唾調敷患處立止。

婦人科

婦人之病有可治者皆由其心性善惡所閑也。所有德性柔良舉止端重克盡婦道孝敬翁姑相夫教子凡內助理家女工井汎桑麻之事無不盡善者必無災病雖或有之亦易為治也。有等逆婦險惡固難攻早惟其衣食自私全無宗祀之念犯有七法助無一能大教病入膏肓難堪扁亦難治療。予因病識此病借立醫方以為勸戒其真胎前產後等病各自有方開具於後。

婦人總論

夫婦人乃采陰所集當與溫居榮衛和平諸病無由而生榮衛虛弱則百病生焉經云二七而天癸至任脈通太衝脉盛月事以時上下交感則有子矣其天癸者天一生水也任脉通春陰用之道泰也太衝脉盛者血氣俱盛也何謂之月經月有陰也經者腫絡也過期而行經者血寒也未明而先行者血熱也經行作疼者氣之虛也其氣榮者為風寒者多熱凝者多痰如烟塵水者血不足余致古方耗其氣以調其經則以為人之正氣不宜耗也夫衝者氣也任脈者血也氣升則升氣降則降血隨氣行無暫息若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝故曰病生焉其經安得調乎况心生血脾統之脉為之元也養其心則血生寧其脾則血足氣勝則血行矣安得獨耗其氣哉此調經之要法也行經之時除如產母一失其宜為病不淺當戒暴怒莫損於衝任違色慾莫損於血海一有抑制宿血必停走於腰脅注於腿筋遇新血更搏則疼痛不已散於四肢則麻木不仁入於血室則寒熱不處或証仲而煩悶或入室而狂言或渴上出或歸大腸皆因氣火情之所致也余致產後一科胎前血羸用薑溫暖於理最當法治至於子和論產後出血數年世人皆以血氣兩虛妄用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然故有快者殊不知妊娠如天地之孕物陰陽和合人物俱全陰陽偏勝宜得孕乎譬猶瓜果值水旱花寃萎落故立秋後十八日寸草不結乃寒不發生也今婦人終於十月而產者反為寒治則非理矣若子和之法當行溫涼溫熱之劑實所禁也以余常用和暖之劑使血得暖以流通其惡露自盡故無後患耳況生產有難易血氣有盛衰宜可偏執一法能盡產後無窮之變焉余每經歷新產月裡用溫暖治效者十多人九用溫涼治效者百無二三當效子和之法施於月外滋熱自是陰虛潮熱往來當行溫涼之劑故無禁耳其月裡可不慎哉人子受胎雖係陽精所得實賴母血而成亦若瓜果賴枝葉所蔭也今婦人終於十月而產者即瓜熟蒂落脫枝之意雖冒寒善傷食調理不宜急追則隨手而愈間有失珍重不滿十月而動胎產者猶若枝蔓瓜果有所傷也胞係崩漏胎始墮落故此得病則誰愈矣昔人所謂小產傷如大產者此也。凡婦人新產榮衛俱虛陰陽不協或因風寒或傷飲食或惡露不通或血行過度如此四者俱能發寒熱身疼腹痛又不可相類而用藥也。又如產後脾胃既虛或多食雜子冷物所傷脾胃遂成傷食以致身熱氣口脣盛

當行消食之藥。世人多因身熱便為外感，無行溫涼之藥。發汗退熱，冒寒轉傷，豈無死者？產後半月之前，難去内外之邪，當兼行血氣，如過半月已後，若有雜症，不可偏執。產後一門治療，又當各類中求之，庶無耽誤病體矣。

### 調經諸方

○一論此方，調益榮衛，滋養氣血。治衝任虛損，月水不調，腹脹，腹痛，崩漏下血，瘕塊，硬癰，癩瘍，癰疽，宿冷，將理失宜，胎動不安，血下不止。及產後乘虛，風寒內搏，惡露不下，結生癰聚，小腹堅痛，時作寒熱。婦人百病宜。

四物湯 當歸身酒川芎 白芍炮懷熟地黃熟酒 右剉一劑，水煎溫服，看病加減。

一經候將來，腹中陣陣作痛，乍作乍止者，血氣實也。用生地加黃連、香附、桃仁、紅花、元胡、紫牡丹皮、黃芩。○一經水當不及期而行者，血熱也。用生地加黃連、黃芩、白芷。○一經水當過期而來者，瘦人多是血少，倍當歸地黃加黃芩、甘草，少佐以紅花、桃仁。泥以為生血之引用也。肥人大概是氣虛，扶癥阻滯升降，然也。去地黃加參、甘草、茯苓、夏陳皮、香附。○一常過期而葉黑成塊者，血熱也。多作腹痛，用生地加香附、黃連、元胡索、五靈脂、乳香、沒藥。○一過期而血淡色者，瘦多血少也。用生地黃合二陳湯煎服。○一肥盛婦人經水或二三個月一行者，瘦盛而經閉塞，經脉以道疾，湯加芎、歸、芍、附、香、木、白、朮。○一經水適來適斷，往來寒熱，如瘧者，合小柴胡湯煎服。○一經行過二五日，腹中綿綿走痛者，此血行而帶氣未盡行也。加木香、枳榔煎服。○一經水行後而作疼者，氣血俱虛也。加四君子湯煎服。○一經事欲行，腹股疼痛，臨經者血澀也。加川綠子、小茴木香、枳榔、玄胡索。○一行經時，忽着氣惱，後得心臟腰腹痛，不可忍，脈弦急不和，乃瘀血作痛也。加桃仁、紅花、玄胡索、赤芍、青皮、行血即愈。○一經行不止，加炒阿膠、地榆、荆芥、芥穗。○一婦人固經血過多，五心煩熱，日晡潮熱，加胡黃連二三服。○一婦人筋骨肢節痛，及遍身頭疼，兩手脉澀，增寒如瘧，每以散風止痛之劑，固效。加羌活、防風、秦艽、官桂、立效。○一血崩初起，不問虛實，加荆芥穗，燒上燒過升麻，如不止，加蒲黃、白朮、炒升麻。○一治血崩，加荆芥、黃芩、香附。○一治崩漏，加沙參、益母草、香附、炒阿膠、炒蒲黃、炒陳皮、白朮、甘草，去當歸不用。○一赤白帶下，加柴胡、升麻、酒。各半夏、桑寄生、白茯苓、蒼朮。○一腹中氣塊，加木香、枳榔。○一血積塊，加三棱、莪术、官桂。○一口乾煩渴，加麥門冬、葛根、烏梅。○一骨蒸勞熱，加知母、地骨皮、柴胡。○一小便閑澀，加澤鴻木通。○一大便不通，加桃仁、大黃。○一虛煩不眠，加竹葉人參、酸棗仁、炒白朮、砂仁、香附、糯米。○一胎死腹中，加官桂、白芷、麝香。○一產後惡露不行，加益母草、桃仁、蘇木。○一產後血虛，晝夜不眠，加人參、白朮、白茯苓、桑寄生、甘草。○一腹中氣塊，加木香、枳榔。○一血積塊，加三棱、莪术、官桂。○一口乾煩渴，加麥門冬、葛根、烏梅。○一婦人血塊，經水先期而至，血紫有塊，腹痛手足冷，蟬口乾，頭眩，胸痞。本方加紫芩、荆芥、香附、小茴、玄胡索、續斷、杜仲、地榆、甘草。○一婦人血塊，作痛不可忍，加三棱、莪术、皮陳皮、小茴、香附、朱萸、玄胡索、木香、甘草、姜炭、煎服。○一婦人經不下行，逆經吐血不止，本方加川

大黃酒浸炒一兩水煎入童便同服立效。

○一婦人女子。經信愆期以致累日錯雜妄行本方去地黃加桃仁山楂加黃芩

草共七味水煎服入童便同服。

○一婦人經行三日後來多不止本方加伏龍肝地榆蒲黃柏葉黃連白茯苓甘草梔子十三味。

○因氣懶加香附檳榔少食加木。○一論婦人經不調或腹痛白帶或淋漓不止或肌瘦者頭目眩暈面色痿黃四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠況香小茴香姜等莫

○一論室女十四歲經脉初動名曰天癸水至失於調理心腹脹滿惡寒發熱頭身過度此感寒血氣不順宜服小溫經湯利氣散主之。

小溫經湯 桂枝加白芷加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

桂枝加白朮

川芎

芍藥當歸

熟地黃

枳殼去殼

白芍酒炒

羌活

川芎明火砂仁加黃芩加香附

甘草

湯送下。

○一論婦人二十歲後遇經脈動來滿身疼痛手足麻痺寒熱頭痛目眩可服

加減五積散 厚朴去皮姜木末酒

川芎 白茯苓去皮當歸洗獨活

羌活 牛膝去根皮

玄胡 砂仁 三棱醋浸

義木 牛膝去根皮白芷 粉草各兩

右為細末醋打米糊為丸如桐子大每服百丸空心米

皮各等甘草三

分付

右剉散

姜至煎熱服

○一論婦人二十三四歲經水不調或赤白帶下或如梅汁淋漓或成片有血三月者此乃氣血虛弱漸生潮熱嘔噦飲食少進四肢倦惰日必夢生骨蒸即成勞瘵急當調治可服前加八物湯四劑方可服大溫經湯

大溫經湯 香附六分當歸酒洗去熟地黃 鹿茸入分各白芍八分人參白茯苓白木 莪菜莖五分川芎五分砂仁四分陳皮四分小茴粉炒沉香三分黃芩五分阿膠炒肉桂甘草各三

右剉一劑生姜三片水煎空心熱服如汗不止加酸棗仁炒黃芪錢味微加杏仁五味半夏桔梗各五分潮熱加柴胡黃芩

○一論婦人二十四五歲所服藥餅加味四物六君湯

加味四物六君湯 厚朴炒半夏姜汁當歸酒洗香附六分五枳實炒白茯苓去川芎赤芍蘇葉枳榔枯梗白木味各砂仁紅花各三黃連三分全胡三分陳皮四分甘草二分

右剉散生姜三片水煎空心熱服

○一論婦人二十五六歲血海虛冷經水不調或時小腹疼痛或下白帶如魚脂稠或以米泔不分信期每日淋漓不止面色萎黃四肢無力頭暈眼花目眩宜服四物補經湯兼服烏雞丸調理

四物補經湯 香附當歸白芍六分各熟地黃川芎各五黃芪炒白茯苓去川芎赤芍蘇葉枳榔枯梗白木味各砂

人參阿膠炒各沉香

另研吳茱萸二分粉草三分

右剉生姜三片水煎空心熱服

烏雞丸

海金沙側柏葉各分取香附砂一厚朴三兩當歸三兩白木去川芎各二

另研白芍二兩

熟地黃三兩防風各一

人参

砂仁白粉草各一

右剉用白毛烏肉膳雜一隻不間三五年者俱好殺淨去腸屎毛將藥一半入雞肚中放銅鍋內好酒五盞水

二瓶文武火煮至乾取雞去骨取肉切細同藥晒乾為末用粳米粉酒水煮糊為丸如梧桐子大每服百丸空心米湯吞下酒亦可

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不時淋漓或成片或下黑水面色青黃虛掌眼花四肢困倦宜服此四五劑後服前大溫經湯十餘帖

止經湯 當歸酒洗去川芎 白朮去芦白芍炒川芎熟地黃香附阿膠炒黃芩蒲黃炒側柏葉砂仁各七分甘草各三右剉生姜

煎空心熱服

○一論婦人三十一二歲年年生育數血過多以致經水不均不時腹中疼痛結塊飲食少進則倦怠吃五心煩躁此血虛

胃熱宜服

紅花當歸散當歸酒洗去川芎赤芍熟地黃黃芩香附六分枳殼各一

另研胡麻酒五分小茴香柴胡陳皮三錢

○一論婦人二十三四歲年年生育數血過多以致經水不均不時腹中疼痛結塊飲食少進則倦怠吃五心煩躁此血虛

胃熱宜服紅花當歸散兼用入物湯

○一論婦人三十四五歲因經水來時當風坐卧失於迴避腰痺空虛外邪乘入遍身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰盛宜服五積交加散二四劑又服八物湯十餘劑。

五積交加散只可服一二劑勿多服 茄治一當歸川芎 獨活 白芷 半夏川芎麻黃 桔梗 白茯苓厚朴姜半夏桂附防風桂枝細頭陳皮 柴胡梢入桂皮分甘草各一錢 右剉姜葱煎熱服再服去柴胡加烏藥鹽發各一錢酒煎熱服

○一論婦人三十六七歲經行太過血氣虛耗腎氣不足故經水妄來可進八珍湯同烏雞丸治之

八珍湯當歸白朮去甘草各一錢白茯苓人參 川芎 熟地黃 白芍酒炒各一錢甘草分加香附各一錢右剉生姜水煎熱服

一論婦人三十八九歲經脈不行腹中有塊疼頭暈眼花不思飲食乃血斷早年血未盡不時攻痛成疾宜莪朮散逐去餘血

莪朮散香附三當歸洗莪朮元胡索赤芍藥枳殼炮熟地黃 青皮細頭白朮桂黃芩酒一三錢細頭小茴香炒砂仁各八乾漆炭紅花酒五川芎甘草各一錢右為細末每服二錢空心好米酒調服

○一治婦人腹中常常作痛上下不定經年積血也 青皮 陳皮 三稜 藥术 香附 烏藥 乾姜 右各等分醋煮焙乾為末空心陳皮湯調下

○一論婦人四十二三歲經水斷絕五十一二復來或淋漓或成片條酒下不止宜服和經湯兼四物補經湯烏雞丸相間服之可好和經湯若三帖即去氣藥乃香附陳皮小茴是也

和經湯白芍酒炒各一錢當歸熟地黃 白茯苓 黃芩 香附 白朮川芎 酸棗仁炒蒲黃炒阿膠 白芷細頭陳皮 小茴酒

右剉每服一兩姜棗煎熱服四物補經湯烏雞丸方俱見前

○一凡婦人經水不調或前或後或多或少時常頭暈眼黑耳鳴赤白帶下腰腹疼痛丘心煩熱四肢沉重胸膈痞悶不思飲食肌膚減削一切百病皆治宜此

調經減補丸 香附米酒醞熟地黃略取懷生地黃酒炒黑二兩當歸酒洗川芎 白芍酒炒各一錢白朮去甘草細頭陳皮白芍元胡索山藥肉桂各一錢右為細末酒醋打麪糊為丸如桐子大每服百丸空心米湯送下

○一論婦人五十歲以外經水猶不斷顛倒不準而來當預防恐成敗血症也此丸甚妙

十全丹當歸頭白芍酒洗山藥三白朮三人参二黃芩二兩細頭地榆二鹿角霜三黃柏酒浸黑山藥禹白朮皮禹小茴酒炒元胡索禹阿膠一兩山藥肉桂一兩右為細末用艾葉三兩水二觔煎至一觔去渣入浮小夢粉六兩攪勻煮熟糊和藥為丸每日空心服一百五十丸扁柏葉煎湯送下

○一治婦人因怒吐處胸膈作痛服四物二陳芩連枳殼之類不應近加祛風之劑半身不遂筋脈痺急四肢痿軟日晡益甚口乾形體倦怠子以為勞怒傷脾肝氣復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味九調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健。

○一治婦人崩熱肢體瘦倦飲食無味月經不行或算數或血崩久矣或用順氣清熱等劑不應更加寒熱且時微心作嘔此乃鬱怒損傷脾胃虛大錯經妄行而然耳以補中益氣湯兼進六味丸。

湯加夜神達志丹門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉追逼散方加歸脾中益氣湯加減十全大補湯加益

追逼散方加歸脾中益氣湯加減十全大補湯加益

### 斷產方總論

婦人欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有生產難堪或生育不已或不正之屬為尼為禪不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗眾且多有用水銀玉壁水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異具於後

○一婦人斷產驗方 故蠶紙方圓一尺燒為末酒調服終身不復懷孕也。

○一千金斷產方 油煎水銀一日分早晚空心服如米大一圓水斷不孕且不損人。

○一斷子法○用白芷一升無灰酒三斗打作糊煮至二升半搗袋滤去渣分作三服月經來日晚吃一服五更吃一服大明吃一服經事即行終身無子。

### 經閉

婦女人足脉常勝而右手脉大皆其常也若腎脉微澀或浮或滑而斷絕不勻或肝脉沉而急皆經閉不調之候也。

升溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因血熱消渴或因人發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因崩漏失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因火消傷心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使生血而經自行矣。

○一治婦女經閉不論虛實寒熱新久即服此方有殊效

○消熱通經湯 當歸一錢生地黃一錢大黃欽官桂四分厚朴姜力枳殼一錢川芎一錢白芍一錢蘇木炭枳實一錢黃芩一錢紅花五

錢桃仁七個半右剉生姜三片水流空心溫服不數劑而奏效

歸尾赤芍白芍青皮絡一錢附鈿炒烏藥欽官桂蘇木紅花各五右剉一剉水煎入

酒一盞空心服。

○一論婦女經閉二年不適腰左下一塊如碗口大閉或吐血或便血發熱咳嗽吐痰盜汗等症宜

食血調經丸 當歸川芎白芍熟地黃山茱萸桂枝去皮懷山藥仁生地黃酒炒蘇母草白芍酒炒牡丹皮一兩白茯苓研末一

梔子仁納香附木澤潤半兩陳皮一兩右為木棗蜜為丸如梧子大每服三錢空心淡姜湯送下

○一治婦人血瘕作痛臍下胀滿或月經不行發熱體倦當歸川桂心六元胡索炒白芍酒炒血竭細蒲黃炒大右為末每服

二錢空心酒調下。

消積通經丸 香附米十兩艾葉二兩當歸二兩川芎一兩赤芍一兩生地黃二兩桃仁一兩破紅花酒炒三錢細炒枳壳一兩乾漆炒一右為細朱醋糊為丸如梧子大每服八十丸臨卧淡鹽湯送下

○一治婦女月經不通鼻吸出血不止侍郎張玉陽傳當歸半錢川芎幾白芍半錢生地黃半錢知母錢黃柏酒炒一桃仁去

○一治室女經水不行翰林張明宇傳當歸川芎赤芍生地黃荆芥穗枳殼細炒各馬鞭草半錢牡丹皮川牛膝

生蒲黃各五桂心仁烏梅六分右剉一劑水煎服日二劑過期不行加澤蘭煎

○一治室女經閉咳嗽發熱屬虛弱毒宜

養血通經湯牡丹皮當歸七錢白芍生地黃陳皮白朮香附錢一川芎細黃芩細柴胡炒甘草石斛剉一劑水煎空心溫服

通經調氣湯 治症同前 當歸川芎白芍炒生地黃香附米錢牡丹皮八分柴胡錢黃柏酒炒知母錢甘草八分牛膝酒炒桃仁去皮紅花二味

○一治婦人經閉不通不論新久下取良法右剉十劑水煎空心一服食道一服

○一治婦人經閉不通不論新久下取良法。

下取通經丸 乳香沒药孩兒茶巴豆粉血竭葱白各五班蝥粉右為末共搗為丸，錠裹三層繫故筒口上，將線繫住

送入陰戶內三四寸許俟一炷香經水即下。

○一治婦人胃氣素弱為火母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行此乃悲則傷肺以補益氣湯加桔梗贝母兼進六味丸。

○一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰面青脹滿寒瘞在來肝經脉病也此勞怒傷脾肝之極非胎也不信仍用治胎散不應。余用加味歸脾逍遙之藥各二十餘劑諸症稍愈後改速效利脈通經丸藥一服下血奇快自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食。余用人參炮姜二劑漸愈又用十全大補湯五十劑而愈。

○一婦人久患癰形體怯弱內熱補熱自汗益汗飲食少思月事不行或用通經丸虛症悉具此因虛而致癰固癰以閉經也用補中益氣湯及六味地黃丸兼愈經行。

○一婦人性況多虛月經不行胸滿食少或作脹或吞酸子以為中氣虛寒用補中益氣湯加砂仁香附煨姜一劑而胸滿和飲食進更加六君加川芎歸身桔梗生姜大棗散利脾胃健而經自行矣。

○一婦人素有胃火或用清胃散而安後因勞傷燥渴內熱火消虛月經不行此胃火消虛陰血用通遜散加牡丹皮炒梔子以清胃熱用八珍湯加後苓連志以養脾血而經自行矣。

補中益氣湯方見前六味丸全大補湯方見前益氣通遜散人血營歸脾湯方見前六君子湯 八珍湯洪氏補益

### 崩漏

肺婦人漏血下赤白日下數升脉急疾者死連者生○又曰肺小虛滑者生大緊實數者死○又云尺寸脈虛者漏血漏血脉浮不可治也。

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脈任脈為經脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脈虛則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而下淋漓而不斷謂之漏下也致五臟傷損五臟之色隨變不同若五臟皆虛損者則其色隨血下於其脉寸口弦而大強則為誠大則為芤微則為虛虛相搏其脉為牢婦人即半產而漏下又云尺脉急而弦如風邪入少陰之經女子漏血下赤又漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者死也又漏下亦白日下血數升脉急疾者死連者生也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治也若經候過多其色瘀黑甚者崩下浸沒少氣肢體冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風寒客乘胞中氣不能固可灸關元百壯在脐下當中三寸是其四也

○一論女人漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必急情嗜卧固倦之力氣短氣急脾土滋榮周身者也脾胃虛而心火乘之故漏下月水不調也況脾胃為血氣陰陽之根帝如當除濕去熱抑咸氣上伸以勝其溫又云大勞則發之宜用

升陽除濕湯當歸酒黃芩大柴胡一錢升麻一錢葛根一錢防風一錢羌活一錢獨活五錢荆芥子秋甘草錢一錢右剉作

一劑水煎空心溫服少時以早飯壓之可一服而愈又足太陰脾經血海穴二七壯此药乃從權之法固風勝溼為胃氣下降而氣迫於下以收其血之暴崩也往復必須服黃芪人參當歸大甘草之類數服以補之。

○一治婦人崩漏多因氣所傷而下者黃芩參白木土當歸身川芎五白芍酒炒熟地黃芩香附一錢蒲黃妙

分地榆合升麻三  
右剉一制水頭宣心服

一治婦人經水過多不止者 桃根皮  
桔梗白芍酒一黃芩破一通便散一宿

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心溫酒白湯任下

○一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者 當歸酒洗川芎炒人參一黃芩防風白芍酒一荆芥炒艾葉炒真阿膠各一錢蒲黃

當炒黃連酒炒黃芩酒炒白木去脚地榆各生地黃一錢半山梔子一錢甘草各三右剉一劑水煎空心溫服或姜棗煎服

○一治婦人血崩或作壯腹利痛者 蒲黃炒五靈脂官桂雄黃甘草各一右為細末每服一錢姜湯調下

○一治血崩惡血去多心神恍惚戰慄虛章者宜

復元養榮湯 遠志肉桂人參一錢酸棗仁炒一黃芪蜜炒利朴炒白芍一錢當歸頭一錢地榆一錢白木去脚甘草各三

煎溫服如虛極發寒不省人事口噤急以麝熏其面又將鐵鏈燒通紅浸入醋碗內沸起醋氣薰本婦鼻過此虛後通用法也

○一治婦人經候凝結黑血成塊左胸有血瘀水泄不止食有時不化從血塊塞下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日三四行全體煩心飲食減少人形瘦弱血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務也甘能生陽陽生陰女之理人生以較氣為寶故先理胃氣為要

益胃升陽湯 黃芪蜜炒一人參二錢甘草炒一陳皮錢一白木去脚當歸身紫胡蘿丹麻伍神曲炒一生黃芩心右剉一劑水煎

服 腹痛加白芍三分中桂半如口乾作渴加葛根令

○一異人傳授秘方治血崩如神

至風膏 白毛烏肉雞雞一隻吊死水泡去毛去腸雜不用將金櫻子之根洗淨切片裝入肚內酒煮令熟去藥時雜酒任意食之

○一治血崩效方 云來弟傳 墓生地黃酒洗去皮頭牡丹皮六分石菖蒲六分懷山藥伍條芩酒炒蒲黃六分阿膠炒八香附

白芍八分白朮六分去脚炒黃連姜汁炒陳皮五分甘草分右合一劑坐姜三片乘一枕不拘時服

○一治婦人五十以上經脉暴行內經曰大主遠不可以冷病治之如下峻藥即死止可用黃連鮮毒湯以清其上加梅灰連炭灰以參其下然後用四物湯導血和經可也

○一方治血崩用槐花一兩百草霜半兩為末每服二錢燒紅秤鍊淬酒下○一方治風熱血崩利本穗燈大燒焦為末每服三錢童便調服○一方血虛內熱血不歸元而崩桂心燒存性為末每服一二錢未飲調下○一方治血崩枯柏為末麵糊為丸指頂大每丸好酒下○一方治血崩梓燒灰一錢好酒調空心一服立止○一方治血崩用益智仁為末每服二錢以燒紅秤鍊淬黃酒調服○一方治血崩用精肉四兩百草霜二兩節過蘸吃即止○一方用乾鹽蜜為粗末入磚內燒烟令崩婦坐其上烟薰久久自止

○一方用腥腥草剉一劑水煎服立止。○一方用雞子一個去黃入銀珠三錢搗勻燒存性溫酒下。○一方露沙撈淨為末每服三錢空心溫調下。○一方五靈脂炒黑煙為末每錢溫酒調下。又方半生半炒。○一方香附米炒黑為末每服三錢空心熱酒調服米飲亦可。○一婦人崩漏面色黃或赤時覺腰間脣下痛四肢困倦煩熱不安其經行先發寒熱兩屬如東此脾胃虛損元氣下陷與相大濕熱下迫所致以益氣湯加防風白芍黃柏炒。○一女子渴下惡血月經不調或崩漏不止多下水漿之物或曰帶脫漏不止皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必急停嗜卧困倦之力氣短氣急脾主溢榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云大溼則發之以益氣湯去參木陳皮加蒼朮姜半防風羌活荳蔻子。○一婦人經行太過血氣虛耗胃氣不足故經水妄來可以十全大補湯去桂枝加香附。一婦人患崩漏服寒涼之劑其症益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱煩躁脉洪大而虛此脾經氣血虛而發燥也急用八珍湯加炮姜以溫補之緩則不移不信乃服正血降火之劑虛症蜂起始信予言緩不及治矣。

## 帶下

脈婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中痛數則為陰中痽痛則生瘧淫則陰中帶下者不治婦女下白而不甚稠者曰白淫與男子白濁同也係出於相火如龍雷之擾而不澄清然而屬於足少陰太陽治當清補為主其下赤白稠粘者謂之帶下屬於心胞乎厥陰少陽即若男子自遺之精甚即如砂石之淋原乎心胞係於春絡於帶脉通於任脉下抵膀胱上至泥丸王叔和云崩中白久為白帶漏下多時骨肉枯槁言之切矣治宜血肉之劑以培之此乃窮源探本之論百世不易之法時人皆泥於常套作濕痰以治及以牡蠣龍骨地榆膠艾之類治之和以四物兼以提丹殊不知根本損傷以致腐敗而未被塞滌不消之物則益加其帶升提不正之氣則增劇其嚙噙或非醫者之過抑求治之者不賢也凡遇是病必以六龍內固丸十六味保元湯主之。

## 十六味保元湯

黃芪

白朮

白茯苓

升麻

桔梗

眼肉

三寶丸

人參

山藥

川獨活

高麗参

蓮子

黃

柏油炒生甘草

三

杜仲

小茴

桂枝

澤漆

淡

骨碎補

炒

葛根

平

桂枝

白芍

右剉一劑水煎空心溫服

○一論此药能生血固真補心血肾脏不滿則經水自調月經調準則有孕男婦元氣充足產子少疾而且壽矣此方不特赤白帶下有致凡小產後虛者血出崩漏者五勞七情女勞怯者一切不足之症并故水調得宜婦女諸虛皆有殊效者半夜熱服之帶下久不能止眼晴不能見效者宜六龍固本丸大效。

八龍固本丸 檜山鈎四巴 載肉山茱萸肉黃芪  
人參二道肉仁木瓜二 用水三碗煎至一鐘半上三味同微炒乾為度。當歸身仁生地黃仁白芍川芎各四味用童便二錢。好酒一鐘拌浸一日。烘又浸又烘乾。右為細末用斑龍膠一料和丸如梧子大每服百丸空心淡鹽湯下。

延龍膠方見補益人多難得子常用煉蜜為丸服之亦效。

○一治婦人經水不調。肚腹冷痛。赤白帶下。子宮虛冷久無子息。先宜服五積散。加香附吳茱萸小茴入米糊一塊煎服。減麻黃後服此丸藥。

四庫丹 磁黃武水人參桂川芎 白茯苓去皮當歸川乾姜炒大附子去皮研小茴香炒熟白芍酒炒肉桂白术去皮微炒胡椒艾葉炒破故紙炒烏藥記肚甘草研一香附米研炒白蒼朮米研吳茱萸炒一右剉片用白毛烏向雞一隻重二斤半死水泡去毛屎并頭足不用鐵鍋內將薑片蓋上入好酒煮爛為度。取去骨同約在鍋焙乾為末。將雞酒汁打稀米糊為丸如梧子大每服五十丸空心好酒送下。

○一治婦人赤白帶下。宜用

補中益氣湯 加黃柏知母香附半夏川草薢川綠子肉荳蔻先服此湯未後進丸藥。

歸附地黃丸 當歸川芎白芍酒研熟地黃酒研香附子鹽便反陳皮半黃柏去皮鹽研半知母去皮研半五味子半柏根皮酒研二方有白芨花。○一方有山茱萸無五味。梧子大每服五十丸空心淡鹽湯下。後用乾物壓之。當歸白蘿蔔胡椒頭炒發熱之物。

○一治婦人赤白帶下。宜用

四源丹 當歸酒熟地黃研各香附酒研各川芎蘇油人參各一兩白芍酒研河膠粉白米糊茅根各六錢椿根皮酒研黃柏酒各一地榆頭白芨茶去皮白石脂研右為細末。木脂糊為丸。如梧子大每服五六十九丸空心米湯送下。

○一治婦人赤白帶下。上熱下寒口出惡毒或咽乾或牙痛或耳鳴或鼻流注疼痛發熱增寒或口吐酸水或心腹氣痛或下五色腥臭用

消玉散 當歸酒先生地黃 川芎 牡丹皮 陳皮 黃連 升麻 甘草 半夏鮮白茯苓 赤芍 蒼朮 香附 黃芩 柴胡去  
右剉一劑生姜煎服。

胡去

○一治婦人白帶其效如神。心傳怪傳 硫黃不拘多少。將豆腐刷去中一塊入硫黃居中。上仍用豆腐蓋住砂鍋底放稻草鋪之。放豆腐於內上仍用草蓋。入水煮一日。頻頻添水煮至豆腐黑為度。取出硫黃研為末。將白芍紙色水溫火燒切片為末。各等分合

一處和。水打麪糊為丸如梧桐子大。每早空心用五分好燒酒一錢送下。服五日後即愈。如未愈。每早服一錢。服到五日全愈。

○一治婦人白帶下。不論年月深久不瘥。乾姜炮一百草霜研二分。為末。每服一錢。溫酒調下。

○每服三錢。空心酒調下。亦帶用赤雞冠花。○又方。用鹿角燒灰存性。為末。好酒調下。空心服二匙。

○又方。雞子開頂入破黃末三分。溫紙裹煨嚼吃。好燒酒下。○又方。蒼朮米泔水浸乾姜炮各為末。每服三錢。空心酒調服。○又方。硫黃研胡椒研四十粒。為末。好酒調服。○又方。硫黃研桃仁炒去皮壳右各等分。為末。每服二錢。空心燒酒調服。

○一治赤白帶。五倍子炒桃仁炒去皮壳右各等分。為末。每服二錢。空心燒酒調服。

○一治婦人久患白帶。瘦則無力。倦怠欲睡。腰酸腿痛。飲食無味。面黃目晡煩熱。小水淋漓。以用參术。杏仁。桂。加車前子。地骨皮。鹿角膠。大腹金散。

○一婦人帶下四肢無力。蓋四肢者土也。此脾胃虛弱。濕痰下注。以補中益氣湯。兼歸脾湯二藥治之愈。

○一婦人年逾六旬。內熱口乾。旁則頭暈。吐痰帶下。或用化痰行氣。前症益甚。飲食愈少。肢體或麻木。服祛風化痰。肢體常麻。手足或冷或熱。日漸消削。此症屬脾氣虛亂。而不能生腎。祛風之劑。復損諸經也。當滋化源。以補中益氣湯。加白茯苓。牛蒡。炮乾姜。如聖丹。白朮。蛇床子。橘等。右為末。醋糊為丸。如彈子大。胸脂為衣。薄綿包。留繩線二尺。詣藥房九深入玉戶中。定坐半日。熱極再換。大抵此疾多因于宮不潔。服藥難於取效。

○一治婦人帶下。腸有敗膜。淋露不已。經微殊甚。遂至膀胱更增冷痛。此蓋敗膜所致。卒無已期。須以排膿乃已。白芷。單葉紅葵根。芍藥。白朮。各五錢研為末。同以蠶丸梧子大。空心飯前米飲下十九或五十九。陰虛盜火。仍用他物補之。五積散。防風。補中益氣湯。方見歸脾湯。人虛勞

虛勞

夫人之生。以血氣為本人之病。未有不先傷其氣血者。世有室女童男。積想在心。慮過當。多致勞損。男子則神色先散。女子則月水先閉。何以致然。蓋憂愁思慮。刺傷心。心陽則血通。竭則神色先散。而月水尤閉也。大既受病。不能營養其子。故不嗜食。脾既虛寒。氣血虧耗。故發吸吸。既作水氣絕。故四肢乾水氣不充。故多愁憂。心弱。健忘。五臟至。此成勞。最為難治。或有以為血熱。用涼药解。殊不知血得熱。則行。冷則凝。足經水少。漸至不通。手足骨肉煩疼。漸至羸瘦。新生潮熱。脉來微數。此陰虛血熱。陽往來之水不能。減。大火逼水。蓄養陰血。慎勿以药通之。

○一論治婦人以血旺氣衰為本。心生血肝藏血。今血衰而氣盛者。由心氣虛耗。又不能生血。又不能制乎肺金。使肺氣得以乘乎肝。

木肝之虧損。則不能藏血。漸至枯涸。不榮經絡。則月信不調矣。此药專補心元之虛。抑其肺金之盛。調和榮衛。滋養血脉。其疾自愈。兼治血氣過多。虛勞發熱。及吐血衄血。咳嗽痰喘。上壅胸膈不利。虛勞熱嗽。痰喘無汗者。可用。

茯苓補心湯 當歸九川芎 白芍芍藥懷熟地黃 陳皮 半夏姜汁炒白茯苓去皮  
甘草分量加桂枝桂枝去桂皮前胡去芦各乾葛 柴胡各七

人參 木香各五 甘草分量加桂枝桂枝去桂皮前胡去芦各乾葛 柴胡各七

右剝一劑。生姜末子煎服。

○一論婦人諸虛百損。五勞七傷。經脉不調。肢體羸瘦。此药專調經水。和血脉。補虛勞。扶元氣。健脾胃。養心肺。潤咽喉。清頭目。定心神。

安神體。退潮熱。除骨蒸。止渴。收斂。緩急。除瘧。止盜汗。任泄渴。開音華。利胸膈。療腹痛。解煩渴。散寒熱。祛體疼。大有奇效。不能盡述。

濟陰至寶丹 當歸去芦白木去芦白芍酒炒白茯苓去皮生知母去毛生貝母去心香附去毛地骨皮 麥門冬去皮薄荷 陳皮 薄荷 柴胡

甘草各三

右剝一劑。煨生姜三片。水煎溫服。

○一論婦人脾緩失血。少寐。發熱。盜汗。或因惡傷脾。不能攝血。以致妄行。或健忘。怔忡。怪不寧。或心脾傷。嗜卧少食。或面傷脾。血虛發熱。或肢體作痛。大便不調。或經候不齊。暗熱內熱。或癰癰流注。不能消散者。宜。

歸脾湯 黃芪 墓參 白朮 姜白芍去白茯苓去皮當歸去尾志泡去心甘草水酸棗仁炒龍眼肉各一木香 甘草各一

右剝一劑。姜煎服。

加味歸脾湯 治產血已去。或脾經失血。小腹作痛。無寐。發熱。盜汗。或脾傷不能攝血。或心脾傷。嗜卧少食。或面傷脾。血虛發熱。或肢體痠痛。大便不調。或經候不准。補熱內熱等症。依前方加柴胡。桔子是也。

○一論婦人血虛勞倦。五心煩熱。肢體瘦弱。頭目昏沉。心忪煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。食嗜固。及血熱相傳。月水不調。臍腹脹滿。寒熱如廬。又治室女血多。弱陰虛寒。不和。痰涎熱。肢體羸瘦。以致膏蒸勞熱。宜。

逍遙散 當歸 白芍酒炒白朮 姜白茯苓去皮柴胡 甘草各一錢 右剝一塊。入薄荷少許。水煎溫服。加牡丹皮山梔仁炒右

加味逍遙散。

○一婦人發熱。面赤。日晡益甚。月水不調。此脾經血虛。加升麻。柴胡。後因起復病。仍以前药加川芎而痊。

○一論婦人虛勞血弱。四肢虛損之極。發熱。瘦。咳。渴。急。之甚。相火妄動。肌肉消削。四肢沉困。夜出盜汗。精神短少。或大便稀瀉。或腹中

積塊。或瘧母發癥。面黃肌瘦。百藥罔效。宜。

五仙散 嫩黃芩水揀參法白朮去皮當歸二錢 甘草一錢 右剝一劑。龍眼五個。連肉七分水煎溫服。有熱加地骨皮知母。

○散加五味子桑白皮。○痰加貝母半夏。○渴加五味子參。門冬。○吐血加生地黃。犀角。玄參。朱根。去皮。○血虛加熱地黃白芍藥。

○一論婦人血氣兩虛五心虛熱或白帶頻頻注下。尤賢有云婦人性悍必多煙火且少有不如意處心中燥急成池之火上燔五心如烈炭是也宜

十珍散子 懷山藥半錢 杜仲一錢 人參一錢 白米一錢 懷生地黃一錢 白茯苓去皮大當歸一錢 川芎一錢 白芍酒炒一錢 甘草三錢 右剉棗二枚 煮心七莖水煎空心服。

○一治肝膽經虛寒熱往來時熱潮熱身熱默然不敢食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱或胸滿脚滿轉側不便兩脣舌悶或渴利或嘔吐酸水宜

小柴胡湯 柴胡二錢 黃芩一錢 人參半錢 大夏一錢 甘草半錢 右剉一劑 煎服。

加味小柴胡湯 肝膽經風熱耳前後腫痛或結核酸痛或寒熱喘熱或經候不調等症即小柴胡湯加桔子牡丹皮。

○一論腎虛發熱作渴吐痰小便淋漓頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅固腰腿酸軟自汗盜汗便血諸血失音水逆為痰之聖藥血虛發熱之神藥。

六味丸 懷生地酒製八兩用山茱萸酒製一兩 乾山藥酒製四錢 牡丹皮 白茯苓去皮澤鴻臚三錢 右為末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心白滾水下。

○一論婦人經水不調或不通虛勞吐血衄血咳血便血發熱咳嗽盜汗瘦嘴心慌一切虛損勞法骨蒸危篤等症並皆治之此方作湯服亦可

滋陰地黃丸 懷熟地黃姜汁炮炙半錢 懷山藥二兩 山茱萸酒製一兩 白茯苓去皮牡丹皮 混湯去毛半錢 天門冬去心生地黃酒製知母

去毛貝母去心當歸酒製白芍酒製香附米各一錢半炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心淡盞湯送下吐痰發渴送下

○一論婦女五勞七情所傷骨蒸五心煩躁心虛怕驚經水或崩或後或泄白或紫色時常注帶下或因煩勞性氣惱怒產後失調致

赤白帶參及夜卧身體上下疼痛反午後神疲腰腿酸軟或心嘈久時飽調及夢寐不清或衝任二脉結脈隱隱久服大有功效

白鳳丹 真正白絲毛鳥骨粉雞一隻先以黃芪木一兩當歸木一兩當歸木一兩甘草木五錢三味和米粉七合分作七分搘成小塊單食之約

有六七日平危不出血去毛腸不用當歸身川芎二兩白芍酒製懷生地黃酒製山藥三兩鹿角霜酒製天門冬去心人參二丹

參水洗淨山茱萸炮炙去木瓜一兩 胡黃連白知母去心三兩 小茴二兩 麻子仁一兩 泰光二兩 銀柴胡白芍甲醋製

生甘草半錢右俱製如法剉勻將雞切作小塊盛於磁罐內用水二分好酒二分米醋一分嚼口用棉捲紙封固置大鍋內棄柴火煮三下直燒取出日晒夜烘一乾又入汁并又烘晒以汁盡為度為細末煉蜜和杵千錠下丸如梧桐子大每服百丸空心淡盞湯送下。

一婦人患失母胎血凝寒犯於溼汗水不行此非傷脾以補中益氣湯加桔梗貝母知母多服歸脾湯送下六味子。一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚溼汗口乾而渴如火遍身皆熱晝憤如醉良人熱止方甦或寐然至旦方止此乃陰虛而陽氣弱也朝用六味丸料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈。

求嗣

易曰天地網繩萬物化福男女媾精萬物化生則經綱者升降凝聚之謂也媾精者配合交感之謂也必二氣合則生且生矣合則稱陰不成孤陽不生理有必然者知此則人之不成孕育者豈無由哉抑豈夫婦克無一交媾之遇哉遇而不遇其害是亦猶陰孤陽之謂也不知諭於天命則泥矣問雖有當為資藥餌以養經血候月經以種孕育之說又多岐補以求說遇則求利未得而害已隨之子之痛惜也久矣夫種子之道有四一曰擇地二曰養種三曰乘時四曰投虛是也蓋地則母之血也種則父之精也時則精血交感之會也虛則士舊生新之初也予嘗聞之師曰母不受胎柔感血衰故也衰則傷於寒寒感於七情氣凝血堵榮衛不利則經水先後不一多寡不均謂之陰失其道何以能受人不種子氣虛血弱故也弱則原於色慾過度陽損五臟五臟皆有精而藏於腎精既弱體之射者力微天弱安能中的謂之陽失其道何以能施尤斯二者皆由己之不能自實以至真元耗散陰涸陽枯遂成不孕者多矣動輒歸咎天命不亦誤哉故必地勝別種可投又必時與虛俱得焉則未有不成孕而生子者矣雖無空難養者精與血至難遇者時與虛苟不憑以药餌之力示以調攝之宜候以如則之法則養與遇者竟茫然矣是知種子之法以調經養精為首而用藥須審平和夫婦尤必各相保守旬日之間可使精與血俱為所待者時也當夫月經初來即記其時而冥以三十時長乃兩日半也至此精微蕩滌既盡新血初生所謂時與虛者俱會矣當此時而有人道之感雖平生不孕者亦孕焉何疑哉是乃歷試歷驗百發百中者也嗚呼是說也豈畔道云乎哉蓋培植元氣順養天真特資药力以佐助之所謂人定亦可以勝天者是也及其既孕將欲要定生男女先以父生年一爻在上母生年一爻在下以受胎月始中是乾坎艮震陽爻也是巽離坤兌陰爻也是可預立某年某月為生男某年某月為生女可預定焉子敢統為圖後嗣者告。

五卦算生男女歌 父母之年上下舉坐胎之月為中主乾坎艮震定是男巽離坤兌定是女算男却生女三五九歲死。兌三己上是女胎。

丁金種子方 進火之時至陰而止不爾則過一宮矣蓋深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則微陰之方故能發生所以受胎之處在庚不在癸也非經後不可用事經後一日男二日女三日男此外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕

皆不可交接。生子者其癥在四體不完，且自損毒。

○一論凡婦人無子，多因七情所傷，致使血衰氣盛，經水不調或前或後，或多或少，或淡色如水，或紫如血塊，或崩漏帶下，或肚腹疼

痛，或子宮虛冷，不能受孕，宜進此药而效可通神。

調經種玉湯 少參桃苑川傳

當歸身

川芎

白芍

熟地黃

六錢

白茯苓

去皮

陳皮

三錢

香附末

沙六

吳茱萸

炒四

元胡索

錢

牡丹皮

三錢

若先則三五日色紫者，血虛有熱也，加條芩錢

錢

若過期經水色淡者，血虛有寒也，加官桂乾姜炒，艾葉兩錢各三

錢

右剗作四劑，每一劑作生姜三片，水一碗半煎至一碗空心溫服，渣再煎，臨卧服，待經至之日服起一日服一副，藥盡經止，則

當交媾即成孕矣，若未成孕，經當對期，俟經來再服四劑，必孕無疑矣。

○一論此方常服，順氣養血，調經脉，益子宮，療腹痛，除帶下，種子壅塞，不可盡述。

種子濟陰丹 香附米四兩

一兩酒浸

一兩蜜浸

各浸三日，烘乾為末，益母草二兩已上

二兩阿膠

蛤粉炒成

艾葉一兩研末

當

歸

酒洗一兩研末

懷熟生黃二兩

川芎一兩陳皮一兩

法鹽半夏白芍一兩

湯泡姜汁炒研白茯苓去皮

一兩研末

牡丹皮一兩

酒洗吳

茱萸

酒洗一兩

胡索四小茴香

益酒炒研川續斷一兩

酒浸薑五味子參門冬去心甘草

三石斛一兩為細末

酒糊丸如梧子大每服百丸空心米

湯送下，溫酒溪水俱可。

氣虛加人參一兩

一方加山藥石斛各一

○一論孕育子嗣，全在調經理脾，血氣充旺，調其經候，去其姪忌，再服孕方，自然有子。

調經育子湯 當歸

川芎分白芍一兩

熟地黃七錢

川芎分白芍一兩

陳皮分白朮去皮

香附酒炒砂仁二丹參五錢

條芩一錢甘草一錢水煎空

心臟○先期者，熱加黃連

姜汁炒倍黃芩

後期者，血虛加黃芪一錢倍黃芩

歸身一錢倍黃芩○腹痛有塊，加玄胡索炒牡丹皮各一

○發熱加枳柴胡地骨皮各七錢

升火散

○腰痛加桑寄生，肉桂一錢，炮姜五分，荆芥穗一錢，地榆一錢

柴胡地骨皮

赤白帶下，加柴胡升麻各七錢

升陽降溫也

○肥盛者，淡脂湯子宮加南星半夏，杏木枝芩，瘦怯者，血少不能濡精，倍芍藥，經血過多，加炮姜五分，荆芥穗一錢，地榆一錢

花蘇木

○氣盛喜懶，加烏藥香附柴胡陳皮

○一治婦人陰血不足，無子者，能使胎孕。

六味地黃丸

方見虛勞，依本方全料，加童便炒香附二兩，煉蜜為丸服下。

○一治婦人無子仙方

烏雞丸 香附米

一斤酒製酒糟，白茯苓去皮當歸仁一錢，熟地黃七錢，白芍一兩，白朮一兩，川芎一兩，白芍一兩

陳皮一兩，香附一兩，甘草一錢，水煎空

心臟○先期者，熱加黃連，姜汁炒倍黃芩

後期者，血虛加黃芪一錢倍黃芩

歸身一錢倍黃芩○腹痛有塊，加玄胡索炒牡丹皮各一

○發熱加枳柴胡地骨皮各七錢

柴胡地骨皮

赤白帶下，加柴胡升麻各七錢

升陽降溫也

○肥盛者，淡脂湯子宮加南星半夏，杏木枝芩，瘦怯者，血少不能濡精，倍芍藥，經血過多，加炮姜五分，荆芥穗一錢，地榆一錢

花蘇木

○氣盛喜懶，加烏藥香附柴胡陳皮

○一治婦人陰血不足，無子者，能使胎孕。

補天育嗣丹 大方伯王如水傳 使生地黃法酒摩者不用酒者八兩好酒  
三收龜板 鹿角 懷山藥 番山茱萸 白牡丹 皮法酒 天門冬去皮澤瀉去醃當歸身酒  
忘銀器為細末用朱紫河車一具此乃混沌皮也又名混元衣取首男胎者佳先用米泔水浸洗此乃切結之真氣也再入長流水浸一刻以取生氣取回入碗內放砂鍋內蒸一日極爛如糊取出先傾自然汁在藥末內畧和匀此天元正氣汁也將河車放石臼內杵如泥却將藥末同杵勻為丸如乾加些煉蜜杵勻為丸如梧子大每服三錢空心溫酒送下忌三白此全天元真氣以人補人玄妙不可言也

續嗣壯元丹

種子天下第一方 嫩鹿耳

而真沉香而肉蓯蓉一酒洗去心火天門冬去心甘枸杞子一參門冬去心  
雨巴戟去心山藥四柏子仁去心白茯苓去皮邊五味子當歸酒洗山茱萸桂枝一雨川杜仲一雨牛膝去苦酒一小茴香一雨甘草一雨  
雨破故紙糊一何首烏米泔洗石菖蒲去毛珠少五味子酒洗令中和花根  
如空心蓮子湯下忘燒酒胡椒姜鹽炒之切碎治虛損陽事不舉少弱多情酒冷心腎不交難成子嗣遺精白濁五勞七傷一切  
虧損之疾無不應驗臨卧再服一服

魯府遇仙傳種子藥酒方

白茯苓一兩浮大紅棗煮法酒微胡桃肉去壳炮去白蜂蜜六斤入研末  
酒十斤共綿黃芪蜜人參白木槿當歸川芎白芍生地黃熟地黃小茴  
子官桂砂仁甘草乳香沒藥追五味子右為細末共入蜜罐內和勻蜜葉封口  
外固入鍋內大柴火煮二炷香

取出埋於土中三日去火毒每曰早午晚三時男女各飲數杯勿令大醉安魂定魄改易食鹽恭體駐精神虛益氣滋陰降火保元調經壯筋骨消肌膚髮白再點齒落更生目視有光心力無倦行步如飛窮者不能能除百病支撑而後生子也神祕不可傳與非人實之寶之

○一治婦人子宮虛冷垂下白淫面色萎黃四肢酸痛倦怠無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥宜戒氣  
懶晝夜生冷其效如神

艾附暖宮丸

香附米泔水白茯神去酸陳皮法酒甘草酸一右為末每服二錢空心添水調下

○一論婦人妊娠慢夫無子蓋正士入朝小人忌之美色入室少婦姑之戚宜此可免如忌之病也

姪娘

經云陰搏陽別謂之有子此是氣血調和陽氣陰化也。許其子少陰肺動甚者姪子也少陰心脉也心主血脉。又腎名胞門子戶。火中腎脉也。尺中之脉接之不絕者姪脈也。三部沉浮正等接之無斷絕者有娠也。又左手沉實為男右手浮大為女。左右俱沉實生二男。左右俱浮生二女。火尺脉左偏大為男右偏大為女。左右俱大生二子。又左右手尺脉俱浮為女。二男不爾女作男生俱沉為產二女。不爾男作女生。又左手火中脉浮大者男右手尺脉沉細者女。又得太陰脉為男得太陽脉為女。太陰脉沉太陽脉浮故知男女道面男行還復呼之左迴首是男右迴首是女。又看上闥時大從後急呼之左迴首是男右迴首是女婦人姪娘其夫左邊乳房有核是男右邊乳房有核是女。

姪娘一月名曰始形飲食精熟酸姜受御宜食大麥無食腥辛之物。是謂才足處陰養之足處陰者肝之脉也。肝主血。一月之時血塊凝如不出故足厥陰養之足厥陰者肝之脉也。肝主血。一月之時血塊凝如不出故足厥陰養之足厥陰者肝之脉也。

姪娘二月名曰始育無食腥辛之物居必靜處步子勿勞百節皆痛是謂始破也。足少陽養之足少陽者胆之脉也。肝主於精。二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足少陽者胆之脉也。肝主血。一月之時血塊凝如不出故足厥陰養之足厥陰者肝之脉也。

姪娘三月胎始當此之時血不流形像始化未有定儀地物而變故令見者武公王好人。端士莊嚴不欲令見偃健侏儒醜惡形人及猿猴之類無食姜鬼無懷刀劍欲得男者擇弓矢射雉雞來肥鳥於田野獵虎豹及走犬其欲得女者則著帶呵環珥弄珠璣欲令子美好端正者。數視白壁美玉有孔雀食鯉魚故令兒多智有力則取牛心食大麥及欲令子賢良盛德則端正心正坐清虛和一坐無和席立無偏倚行無邪僻目無邪視耳無邪聽口無邪言心無邪念無喜怒無得失處食無到厭無憊足無憊欲瓜果噉味醞趙好芬芳。恐鬼械臭是謂外恭而變者也。子心主養之手心主肺中精神內屬於心能混神故手心主養之手心穴在掌後橫文處診其姪脈滑疾重以手按之散者胎已三月也。

姪娘四月之時如受水精以成血脉其食宜稻穀其羹宜魚雁是謂咸榮以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑。足手少陽養之手少陽者三陽之脉也內屬於府四月之時兒心府順成此手少陽養之手少陽穴在手小指間本節後二寸是也。許其姪娘四月欲知男女左脉疾為男。右脉疾為女。左右俱疾為生二女。當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂也是乎少陽三焦之脉內屬於心能混神故足太陰養之足太陰脾之脉主四季五月之時兒四肢皆成故足太陰養之足形體壯心志節飲食。

姪娘五月始受太精以成其氣。卧少安起浣浣衣牕深其室厚其衣裳朝吸天光以避寒暑其食宜稻穀其羹宜羊羹。和以米葛調以丹味。是謂養氣以定五臟者也。一本云宜食魚鹽。足太陰養之足太陰脾之脉主四季五月之時兒四肢皆成故足太陰養之足。

太陰穴在足內踝上三十度。其脉直手摸之不滿，但疾不消者五月也。又其脉躁者必細，脉遲者必緩，滿

而滿。

喘脈搏者必水懷為腎。

妊娠六月始受全精以成其筋微微勞無待靜皮出海於野數裡走人及視走馬宜食熟鴨肉是謂變脛膏膩以養其筋以牢其骨筋是陽明養之足陽明者胃之脉主其口目六月之時兒口目皆成故足陽明養之足陽明穴在太衝上二寸是也。

妊娠七月始受木精以成體勞弱搖曳無便定止動作屈伸居處必端正食避寒常宜食橘橘以密腠理是謂養骨旁齒者也。手太陰養之手太陰者肺脉主皮毛七月之時兒皮毛已成故手太陰養之手太陰穴在手大指本節後白肉際陷中是診其妊娠七月脉寔大牢强者生沉細者死懷胎七月而不可知時時舉而轉筋者此為驅血時噦而動者非胎也懷胎七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤榮預下故也。

妊娠八月始受土精以成肩革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色手陽明養之手陽明者大腸脉大腸主九竅八月之時兒九竅皆成故手明養之手陽明穴在大指本節後宛中是診其妊娠八月脉寔大牢強弦緊者生沉細者死。

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食日緩帶自持而待之謂養毛髮多才力足少陰養之足少陰者腎之脉腎主績繆九月之時兒脉績繆皆成故足少陰養之足少陰穴在足內踝後微近下前動脈是也。

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地於丹田故使關節人神咸備然可預修滑胎方法也。

○一論婦人經脉不行已經三月者尺脉不止則是胎也。

毓胎散 川芎為末每服一錢空心艾葉煎湯調下。覺腹內微動則有胎也若服後一日不動非胎必是經間。

○一治婦人經水過月不來難明有無胎孕。

又醋湯 用好醋炒艾服半盞後腹中痛大痛是有孕不為痛是無孕。

○一論婦女經候不行身無病似病脉滑大而六脉俱匀乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嘔一物或大嘔時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此药如覺恶心嘔吐加丁香生姜煎。

不參湯 人參二錢白朮五錢橘紅五錢香附子錢烏藥五錢甘草錢 每剉一兩水一盞半生姜五片水煎五分去渣溫服不拘時候或為春姜湯亦可。

○一論惡阻 謂婦人有孕惡心阻其飲食也宜服。

食胃湯 當歸酒 白芍酒 白朮去芦 白茯苓 醉陳皮 霍香 砂仁 神曲炒半夏 仁炒過不傷胎氣香附炒各甘草錢 右剉生姜三片東二枝。

○一婦人有孕嘔吐不止子用半夏姜汁炒用一半陳皮後芩甘草用一半生姜七度煎服立止。

○一婦人妊娠三月其經月來三五次但不多飲食精神如故此血盛有餘兒大能飲自不來矣後果然。

○一論子煩謂妊娠煩躁而閑亂心神也宜進

竹葉湯 白茯苓去皮一錢半 防風去根一錢半 參門冬去皮一錢半 黃芩錢半

○一論子煩謂妊娠疫癥潮搐目弔口禁不省人事也。

羚羊散當歸酒泡川芎 防風 獨活 白茯苓去皮五加皮 薑苡仁 酸棗仁 姜杏仁桂木香 甘草 羚羊角

右剉剤生姜五片水煎溫服。

○一論兒在腹中久用空方下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止。

○一論子癇謂妊娠心脾肝腎並治胎氣不和心腹脹滿疼痛或臨產驚恐氣結連日不下及胎前一切諸疾者宜此方加減治之。

紫蘇和氣散當歸酒泡川芎 白芍炒熟地黃 人參 紫蘇 陳皮 大腹皮 甘草 右剉剤生姜五片葱白七十片水煎溫服。○順煩加香附木查咳嗽加枳壳桑白皮 ○熱加黃芩○嘔吐加砂仁 ○泄濁加白朮白朮去皮 ○感冒加羌活麻黃傷食加山楂

香附氣惱加香附烏藥

○一論子暉謂妊娠七八月前後面目虛浮肢體腫滿也宜

伏苓湯當歸川芎白芍炒熟地黃 白朮炒熟地黃 白朮 姜白茯苓 濤瀉 僵芩 桔子炒厚朴炒甘草 參門冬法

右剉劑水煎溫服。

○一論子氣謂妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以至喘悶似水氣之狀至於脚指間有黃水出者謂之子氣。天仙藤當歸川芎白芍炒熟地黃 紫蘇 陳皮 香附炒烏藥 木瓜 甘草 右剉剤生姜煎服加蒼朮尤妙。

○一論子淋謂妊娠小便澀痛頻數也宜從方

丁淋散參門冬法赤茯苓大腹皮木通甘草 右剉剤竹葉十片水煎空心服。

○一論轉胞謂妊娠卒不得小便也因胎長逼迫於胞胞為所通而側令人數擗胞即膀胱也然子淋與轉胞相類但小便頻數熱渴而痛為子淋頻數出少而不痛為轉胞間有微痛終是與淋不同並宜五苓散加炒阿膠又宜冬葵散治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆效。

冬葵散冬葵子研山梔子末木通滑石末 通利此藥滑胎此月可服右剉一剤水一盞半煎八分溫服外以冬葵子滑石梔子為末田螺內搗膏或生葱汁調膏貼臍下立通。

○一論胎漏下 謂妊娠有胎而血漏下。屬氣血虛而有熱也。

引歸湯 當歸尾 川芎 各五錢 右剉一劑好酒煎入童便一盞同服。一服立止如神。

膠艾四物湯 治症同前。當歸一錢 壓熟熟地黃一錢 降芩半錢 白朮去芦炒一錢 川芎分白芍一錢 砂仁炒一錢 附子一錢 艾葉炒真阿膠

炒成珠

八分

梗米一撮

水煎服

一方加蒲黃

一錢

陳皮炒杜仲一錢

鹽水炒

續斷錢

甘草一錢

去皮

甘草四錢

去父葉不用

只用水煎服

○一治胎動出血產門痛。黃連為末。酒調二錢日三服。

○一論胎動 謂妊娠因事跌仆。子元腹中。走落妄下。腹痛不已。口噤欲死。用此藥探之。若子元腹中。立便逐下。若腹痛隨止。子母俱安。又治臨產難生。胞衣不下。及產後血草不省。人嘔狀似中風。血崩惡露。不山腹中。血利疼痛。血滞浮腫。血入心經。語言顛倒。如見鬼神。血風相搏。身熱頭疼。或似癇。非癇。一切胎前產後。假須垂死等症。並治之宜。

佛手散 當歸酒洗川芎七分 右剉一劑。水煎將熟。再入酒煎溫服。○如口噤捕閑灌之。如人行五里許。再灌之便醒立產。○如胎漏

下血不止。以酒煎入童便一盞溫服。

○一方治胎氣動用鯉魚一个。水煮熟。并湯食立效。

○一因事動胎不安。動撞不已。及下血欲墮者。四物湯合四君子湯。加降芩阿膠砂仁白芷桑寄生。

○一論安胎。謂安胎有二。有因病而胎動者。但療母病。其胎自安。有胎不因妄觸母病。但安胎氣。母病自無。

○一論孕成之後。覺氣不寧。或腹微痛。或腰間作疼。或飲食不美。或胎動五六個月。常服散劑甚妙。

安胎散 當歸身酒洗川芎一分白芍一錢熟地黃酒洗條芩一錢白朮去芦砂仁酒炒陳皮一錢蘇梗炒甘草四錢右剉一劑水煎溫

服。下血不止。加蒲黃炒阿膠一錢腹痛加香附炒枳壳炒各一錢。

○一論半產。謂婦人懷孕。血氣虛弱。不能營養。以致數月而墮也。

芎歸補中湯 黃芪蜜水 人參 白朮去芦 當歸 川芎 白芍炒乾姜炒阿膠炒五味子 木香 杜仲鹽汁甘草炙水煎溫服。

○一論陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不足營養。其胎則墮。又有勞逸傷情。內火使動。亦能墮胎。大能消物。造化自然。予見一婦。但有孕至三個月左右必墮。診其脉。左手大而無力。重按則濤。知其血少。以其壯年。只補中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白朮湯。下黃芩末一錢。與數十劑。得全而生一子也。蓋孕至三月上屬相火。所以易墮。

安胎丸 婦娠宜常服之。當歸酒洗川芎 白芍炒條芩各一錢 白朮去芦炒右為細末。酒糊為丸。如梧子大。每服五十丸。茶湯任下。空心日服。養血清熱之劑也。瘦人血少。有熱。胎動不安。素懷半產者。皆宜服。予以清其源而後無患也。○一婦人小產。常服此以保

胎孕十月完足。潮蓮肉去心四兩。砂仁炒二兩。共為末。每服二三匙。米飲調下。日服三四次。

○一論婦人常懷小產。久而不肯愈。可服過七个月不必服。

十全保孕丹 當歸一錢熟地黃一兩半 人參一兩 白朮一錢炒條芩一兩陳皮一錢附子一兩便後續斷硝桂一錢 杜仲一錢酒炒半 杞子一錢

桔梗為丸。如梧子大。每服七十九粒。白湯下。

○一方去人參加砂仁川芎阿膠艾葉益母草裹固為丸。

○一論婦人曾經小產。今有孕預先培補為妙。大凡婦人墮胎只是奇經脈逆衝任帶脉受虧而然。宜服此湯。人有益也。

加味八珍湯 黃芪二錢人參二錢白朮一錢去苦甘草一錢防風一錢熟地黃一錢川芎一錢白芍一錢知母一錢當歸一錢山藥一錢益智仁研八升

麻子黃柏酒炒浸已上剉一劑。水煎溫服。

○一治婦人每懷胎至三四月必墮。不肯服药。用四年老母雞煮湯。入紅棗小黃米煮粥食之。不數日胎竟固全。至月滿而生。

○一論妊娠身居富貴。口厭甘肥。憂樂不常。食物不節。耽飽便卧。致令胞胎肥厚。根蒂堅牢。行動艱難。因致臨產必是難生。八月可服此药。日進二服。補其血而順其氣。使子易生而胎易落也。又治小產瘀血腹痛。及胎衣不下。

保生無變散 當歸一錢川芎一錢白芍一錢七乳香一錢乳香一錢枳壳一錢木香一錢甘草梢五錢餘細右剉一劑。水煎溫服。

○一治胎肥壅隘。動止舉手。臨月服之。縮胎易產。

瘦胎散 枳殼五錢桑附子三錢甘草半錢右為末。每服二錢。百沸湯調服。

○一論妊娠至八九个月。服散剤甚好。今易產後亦少痛。

達生散 當歸身酒白芍一錢白朮去油芦炒一錢人參一錢陳皮一錢紫蘇一錢大腹皮一錢甘草錢三或加砂仁五錢枳殼八錢尤妙 右剉一劑

薑五根水煎服。

如胎肥氣喘。加黃楊榔七个。此黃楊樹梢兒也。此物能瘦。○夏加黃芩。春加川芎。冬加砂仁。○氣虛倍加參鹿。氣寒倍加陳皮香附。

○血虛倍當歸加地黃。○性急多怒加柴胡。有熱加黃芩。食少加砂仁神曲。渴加麥門冬。○食易識多加黃楊榔。有痰加半夏姜湯泡切片。香油炒黃芩。○胎痛加木香。

○一論妊娠七八月間服此胎氣散。令人易產。凡患產難者。多由內熱。灼其胎液。以致臨產之際。乾枯而無氣。或脾氣怯弱。不能運化。精微而令胞液不足。亦產難之道也。故用白朮茯苓益其脾土。而培萬物之母。用黃芩清其胎熱。潤火。而存胞液。乃陳皮者。取其辛利。能流動中氣化其肥甘。使胎氣不滯。胎身不犯耳。此求胎之義也。

東胎丸 茯苓一錢陳皮五錢黃芩一錢桑寄生一錢白朮二錢右為末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。米湯送下。

○治婦人胎痛

當歸 川芎 附子 阿膠 炒當歸水煎

五分甘草一錢 水煎溫服

右剉水煎溫服

○治孕婦心痛 玄胡索

五分當歸 乳香 分半甘草一錢

右為末每服三錢，紫蘇湯調下。

○孕婦腹痛或胎動不安

砂仁一錢

一條芩

炒砂仁白芍

白朮去皮炒

右為末每服三錢，紫蘇湯調下。

○治孕婦腰痛狀不可思

補骨脂不拘多少

瓦上炒令香熟為末

搗核桃肉半个空心酒溫調下二錢。

○治妊娠偶因所觸或墜高傷折致胎動不安

腹中痛不可忍者

砂仁不拘多少熨斗內盛慢火炒

令熱透去皮搗碎為末每服

二錢用熱酒酒下。酒火覺腹中胎動極熱即胎已安神効。

○治妊娠大便閉結難排

當歸 川芎 白芍

生地黃 枳殼

黃連

右剉水煎溫服。

○一論妊娠下利赤白腹中疼痛

當歸紅白芍

白朮五分

白茯苓

木香三分

枳榔三分

黃連三錢

○一論妊娠腹痛下利腹血不止

黃連八分

厚朴姜阿膠

當歸各六分

艾葉 黃柏

乾姜

五分

右剉作一根

人飲下方可七日三

服。

○一論妊娠泄瀉腸間腹冷痛手足厥逆

人參 白朮

炒乾姜炮甘草炙加肉蔻砂仁右切生姜三片

二枚水煎空心溫服。

○一論孕婦瘧疾寒熱相半并產後瘧疾

當歸 川芎 白芍

青皮 陳皮

半夏 白茯苓

枳榔 草果

良姜 紫蘇

右剉水煎溫服。

○一論妊娠咳嗽喉滿悶

百合

貝母 紫菀

白芍 前胡

赤茯苓 桔梗

甘草 生姜五片水煎

○一論孕婦咳嗽用貝母麪炒爲末研沙糖拌勻丸如雞頭定大口含化效。

○一論妊娠忽無口噤吐沫不省人事言語錯亂

三石湯

當歸 白芍

生地黃 陳皮

白茯苓桂枝

桂枝志甘草水

麥門冬竹茹 石菖蒲 甘草 半夏

右剉

生姜水煎服。

○一論妊娠不語非病也聞有此者不煩服藥臨產日但服四物湯之類產後便語。

○一論妊娠懷鬼胎如抱一塊

經脉云設令宮中人若寡婦無夫常夜夢寐交通邪氣或懷似胎而成瘕癥之疾急當治下宜用

斬鬼丹 吳茱萸川烏頭

秦艽柴胡

白芍

白朮

炒巴戟

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸

蜜酒送下出惡物即愈

○一論妊娠癥瘕痞塊及三者疑似之間有久服安養胎氣消散瘡瘍調經進食

消補丸

枳殼 桔梗

黃連 黃柏

黃芩

當歸 阿膠

木香各一錢

右為末水糊丸梧子大不飽時溫水飲下三十九日退

○一論妊娠或時有白漏白帶而下。四物湯合二陳湯加荳木牡蠣龍骨等藥。

○一論妊娠產屎失禁。白薇 白芍 韶附 右為細末酒調方七日三服。

○一論妊娠痰嗽見紅。當歸身 熟地黃 天門冬(去心)麥門冬(去心)紫苑(去梗)桑白皮 薑仁(去皮)甘草(去梗)桔梗 片芩五味子 阿膠

炒各一 右剉加竹茹一圍水煎臨服入小剉汁同服。

○一婦人每孕不數月而墮。忽又孕三月。患嘔吐吞酸噯氣。嘔雜胸鳴泄瀉。胃脘疼痛。陳皮(半夏炒)白茯苓(白朮茶)白木法歸蒼

川芎(酒浸)神曲(五薑香)香附(炒各一)甘草(淡)黃連(姜炒) 右剉姜蜜煎服。

○一治胎孕及九個月將產消息用猪肚一個依常法著盐五味煮熟食之。不盡再服。不與別人食。

○一妊娠嘔腹草药及諸般毒病。白扁豆生去皮為細末。清米飲調方七日神效。

○一妊娠下血腹涼血之藥下血益甚。食少體倦。比脾氣虛而不能攝血以補中益氣湯治下之乃愈。

○一治婦人墮胎音憤不時吐痰。自用養血化痰之劑音憤不知。自汗發搐。疫延壅出以為中風。故用祛風化痰。子曰此屬脾氣虛

寒所致。遂用十全大補湯去桂加知母防風山藥升麻黃柏益智仁。

○一妊娠氣喘痰盛諸藥不應。問治於余。謂之云素有白帶。始於目下浮兩月餘。其面亦然。此陰虛有痰飲也。用六味丸科數劑而愈。

○一妊娠每至五月。肢體倦怠。飲食無味。先兩足膝漸至遍身。後及頭面。此是脾肺氣虛。朝用補中益氣湯。夕用六君子加蘇梗而愈。凡

○治妊娠母汎其月數。但見其經症候。便用某藥為善。

### 妊娠傷寒治法

○一治妊娠傷寒護胎法。井底泥 青黛 伏龍肝 右為末。調勻塗於孕婦臍中二十許。如乾再塗上以保胎乎也。

○一治妊娠傷寒傷風。分輕服藥。發熱頭疼。惡風身痛。紫蘇 陳皮 香附 川芎 白芷 右剉一劑姜蜜煎服。

○加味四物湯 專治妊娠傷寒諸症。當歸身 川芎 白芍 熟地黃(去梗) 右剉。每服五六錢水煎溫服。如妊娠傷寒頭痛身熱

無汗。脉浮緊。加麻黃細辛。○如妊娠傷寒中風表裡自汗。頭痛項強。身熱惡寒。脈浮而弱。加黃芪地骨皮。○如妊娠中風濕之氣。肢

節煩疼。脈浮而熱。頭痛加防風蒼朮。○如妊娠傷寒胸膈滿痛。脉弦。加柴胡黃芩。○如妊娠傷寒大便硬。小便赤利。氣渴而脉沉數。加大黃生桃仁去皮尖。○如妊娠傷寒小便赤

如血狀者。加琥珀茯苓。○如妊娠傷寒四肢拘急。身涼微汗。腹中痛。脉沉而遲。加附子桂枝少用。

○如妊娠傷寒蓄血症。加生地黃大黃酒浸。○如妊娠傷寒身熱大渴。蒸熱如然。脉長而大者。加石膏知母。○如妊娠傷寒下後。渴解。

枳實丸○如妊娠傷寒不得眠者加梔子黃芩○如妊娠傷寒下後嘔吐不止者加人參五味子○如妊娠傷寒下後虛寒加厚朴湯○如妊娠傷寒汗後血漏不止者胎氣渴者加阿膠父甘草黃芩○如妊娠傷寒利腹中痛飲食不下脉沉者去地黃川芎加白朮吳甘草茯苓黃芩○如妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾胸膈疼用生地黃加柴胡前胡人參甘草。

### 姪娠食忌

○一受孕之後不可食之物切宜忌食。非惟有感動胎氣之戒。然於物理亦有嚴忌者。故或不能戒忌。非特延月難產。亦能令兒破形母死可不戒哉。

食雞肉糯米合食令子生寸白蟲○食羊肝令子生多厄○食裡魚膾魚及雞子令兒成痘多癰○食大肉令子無聲音○食兔肉令子缺唇○藍色乃不交而生子○食鷄令子項短及損胎○鴨子共宰椹同食令子倒生心寒○食豆嘴合蜜食之墮胎○雀肉合豆醬食之令子而生野黑子○食水漿絕產○食山羊肉令子多病○食雀肉令子不耻多淫○食蟻蠅令子橫生○食子姜令子芻指生瘡○食驥驥馬肉延月難生○食蠍蒸鱈魚令兒瘡疾○如此之類無不驗者。則知聖人胎教之法豈非處有其自然乎。

### 產育

○一產母面赤舌青母活子死母面青舌赤口沫出子活母死母唇皆青口兩邊沫出身重寒熱舌下青黑及舌上冷遇此症者子母俱死不可治也。

○一胎產橫逆○因坐草太平努力過多。起身未轉或已破水。必耗致胎難轉若先露脚謂之逆。先露手謂之橫。當以小細針於兒手足心針入一二分三四刺之以塗塗其上。輕輕送入兒得痛驚轉一縮即當回順而生矣。

○一論產難或橫或倒死胎橫臍於腹中者。婦覺腹痛或腰重欲坐草時。將神祚散即溫飲一盞便覺心下開始如渴又飲一盞。覺下重便產更無諸苦。橫生倒逆不過三服即正。子死腹中不過三服即下。能保母子兩全。最為神驗。有一婦人橫產手出至脾腫脹。但欲截其手。不保其生。屢服催生藥不效。以此藥濃煎一碗與服少頃甦醒再與一碗。困睡少時忽云我骨節都折斷了。快扶起我。血水俱下拔出死胎全不費力。可謂更生。以此救人百發百中。

催生神祚散 生柏樹枝根一小撮大椿根一小撮甘草根一錢半。右剉一大劑。新汲水一碗半。入新瓦罐內用紙三重密封之。文武火煎八分溫服。

○一治胎婦臨產難產或一二日不下者。服此自然轉動下生。

三合濟生湯

當歸二錢川芎二錢桂枝一錢生薑蘇子香附一錢半大腹皮一錢半甘草一錢半

右剉水煎待腹痛甚服之。

催生如意散 暈產腰痛方可服之。人參或乳香或辰砂研。右為末。臨產之時急用。子清一个調藥。用生姜自然汁搗。開冷服。

○如橫生倒產即時順正。子母俱安。

○一論知娘子死。或未產胎已動。言歸加蘇葉酒水煎服。死者即下。未死者即安。

○一論胞衣既破。其血已涸。或元氣困憊。用八珍湯斤許。再加益母草半斤。水數碗煎熟。時時飲之。飲盡再煎。

○一孕婦臨月。預製此藥。日進二服。則子易生而胞易落也。

○一論橫生通產。須臾不救。子母俱亡。蛇退散。蛇退散。四胎變一散。並

○一治產難。湊心不下者。蛇退燒灰同麝香少許研細。溫酒調下。立產。

○一論臨產破水。三五日不下。將死未絕者。江月池傳魚鱗用大者三寸。香油浸過。燈上燒之。滴下油入酒內。其灰研末。酒調服立下。

○一論難產。憑繫胞乾胎不得下。香油蜂蜜各二碗。和勻。入銅鉢內。慢火煎一二沸。掠去沫。調白滑石末一兩。搅勻。頓服。外以油蜜摩母腹上。胎即下。

○一婦人分娩難產。子已死。元氣勞傷。用油紙捲燒斷臍帶。取其陽氣以補之。然聞兒啼作聲。若以刀物如常斷之。其母亦難保生夫子死腹中者。多因驚動太早。或觸犯禁。或抱腰太重。或頻探拭水。胞衣先破。血水先盡。而胞乾涸故耳。其後產母唇舌皆青者。子母俱死。若古黑或脹悶甚者。然其子已死矣。先以平胃散一兩。酒水各半煎。却收朴硝半兩。即驗服。或用硝一兩。以童便調下亦妙。

○一治胎衣不下。雞子清三個。去黃。以酸醋一合。和之。咽入口中即下。

○一方治胎衣不下。即嚼生葱白數根即下。

○一治胞衣不下。紅花二兩。炒清酒五爵。沃之溫服。此乃氣弱。而寒血盈於胞也。故用清酒壯其氣。紅花以散其血。

○一胞衣不下。因產母元氣虛薄者。用芎歸湯。倍桂以溫之。自下。

○一治婦人難產。及橫生通產如神。用蛇退炒焦為末。每五分酒調下。

○一方用麝香五分。木加桂末二錢。酒和服。

○一治產後胎衣不下。惡血冲心。腹中血塊。錦紋大黃一兩。為末。以好醋半升。熬成膏丸。如梧子大。以醋化五丸。服之。須臾即下。治月經不通。

○一治懷生逆產。胎死腹中不下。公老鼠腰子一付。輕粉沉松香共搗作三四丸。長砂為衣。溫酒下。

○一治胎衣不下。令產婦自己裹尾於口中令咽。衣即下此方可用。

○一論婦人分娩交骨不開或五七日不下。垂死者。

活命芎歸湯 川芎 當歸各一錢

生男女婦人處死身性者一兩。自煎服。一個如無枯過者亦可服之。

○一論妊娠十月滿足。或因恣情內傷。或患熱病之症。又兼產前多吃熱毒之物。瘀血相搏。七情怒氣所傷。臨產橫逆之厄。惶忙不謹。

輒用移婆下手取胎。觸死胎兒在腹。不能施治。今備妙方。防此之患。但服一二帖。加烏金丸二顆。

活水無骨散 益母草兩大根。川芎一錢。白芍二錢。生地黃三錢。魚腥草一錢。桂枝一錢。急性的子一枚。陳皮錢。甘草八分。右各剉分二服。

每用水三碗煎至二碗。臨服之時。加好醋一匙。每一碗加烏金丸一顆。如其死胎不下。急取無根水再煎藥渣。連進二服。即救其性命。奧妙不可輕傳。

○一論臨產難。橫生逆產。胎死不下。及產後諸病。

烏金丸 真阿膠一兩。炒蘇木一錢。艾葉去梗半錢。生地黃二兩。龍衣

即歸心要全者一條。桂枝一錢。白芍二錢。各一錢。各研末。右共爲細末。煉蜜為丸。如芡實大。每用一丸。童便和酒化下。

凡修合此藥。揀天月二德。天醫生氣吉日。凝神安處。酒掃淨室。畫太極而生兩儀。九宮而分八卦。所忌婦人難大聲喊音。要在夜間寂靜。戒戒至誠。先念淨口淨心淨身淨天地神咒。又念咒曰。天精地靈。靈精盡盡。左朝北斗。右朝北辰。人逢此藥。各保安寧。急如律令。

○一治橫生逆產。并三五日不下。死在頸丸。姜師師周傳 用從往下蛇腿一條。長尺餘者。燒灰存性。搗碎。等分。爲末。黃芩爲丸。一个。皮硝化水吞下。

○一治婦人交骨不開。產門不開。皆由元氣虛弱。胎正則失於調拂。以致血氣不能運達而然也。又骨不開。陰氣虛也。用活命芎歸湯。補中益氣。燉產門不閉者。取血虛也。用十全大補湯。活命芎歸湯。方見前。

○一治難產。兼胞衣不下。死胎不下。巴三草七胞衣散。細研如泥。入麝香。捏作餅兒。臍下貼。須臾子母便分。

○一方用草腐子十粒。剝去壳。研空。兩脚心。衣即下。可即洗去。如不去。則勝出。如此時就以此藥貼項心。縮回其腸。又用此藥。如勝入。則洗之。神效。

○一治難產。或積以逆。或血海乾涸。或胎死不下。惶惶無措。死在頸丸。藏存愚傳 皮硝二錢。附子一枚。去心者。或寒天。可。右用好酒半鐘。量重半鐘。入硝煎一二沸。溫酒服立下。百發百中。

○一治胎死腹中。或產母氣乏。委頓。產道乾澀。或手足冷。腹痛。即五積散。凡中寒。依本方去麻黃。加川芎。附子。南星。阿膠。炒木香。杏

## 補中益氣湯 方是內傷十全大補湯 方見補益

○治女人出生腸用脚本盛貼其腰取芋煎水洗過蓋子水甚滑洗過則腸滑後用冷水噴胸前使患者因咳嗽氣則腸收又用人以手托之使腸入內後用馬哈蒙水洗用渣搭於門口上女人眠倒腳高起些過一時即愈。

## 產後

肺產後扶虛消瘀血脉却宜虛散和云新產之脉緩滑吉。是大經急危。未侵寸口濡疾不調死沉細附骨不絕生。

凡產事。不問腹痛不痛。有病無病。以童子小便和酒共一錘溫服則百病不生。少坐上床倚高立膝仰卧不時喚醒。及以醋塗鼻或用醋燒皮及燒漆點。更以手從心捋至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血暈血迷。酒難行血亦不可多。恐引血入四肢。且能昏暈。宜頻食白粥少許。一月之後宜食猪蹄少許。仍慎言語。止情寒。善梳頭洗足。以百日為度。若氣血數弱者。不計日月。否則患手足僵腿。酸疼等症。名曰牛癆。最難治療。初產時不可問是男是女。恐因言語而泄漏。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷牙。恐致血迷。須血氣平復方可治。事犯時微若秋毫。成病重如山岳。可不戒哉。

夫產後血暈。其由有三。有用心使力而暈者。有下血多而暈者。其暈雖同。其治特異。若下血多而暈者。當補血。以芎歸湯為主。或急露不止者。倍炒黑乾姜止之。若去血少而暈者。黑神散主之。但凡血暈。不省人事。用大炭置產母旁。以醋沃之。使醋氣薰入產人口鼻。輕者亦甦。重者亦省人事矣。○一法用韭菜細切。盛於有嘴瓶中。以熱醋沃之。急封瓶口。以瓶嘴納產婦鼻孔中。痛之即醒。○一法用舊漆器燒煙薰之即醒。○一法用荆芥穗研末用一分吹鼻即醒。○一法用鹿角燒存性。每一线酒灌下即醒。夫產後發熱。有去血過多者。有勞力過勞者。有惡露不盡者。有飲食失節者。有感冒風寒者。有夾食傷寒者。有內傷。扶外感者。有三日蒸乳者。俱能發熱增熱。并身疼腹痛。不可相類而用藥也。

○一論去血過多發熱者。脉必虛大無力。內無痛楚。此非有餘之熱。乃陰虛生內熱耳。以歸木保產湯主之。

○一論有傷力發熱。或早起勞熱者。亦用歸木保產湯主之。

○一論惡露不盡。有發熱。惡寒。必屬胎膜。服滿連大小腹有塊作痛者。宜黑神散主之。

○一論脾胃虛弱。飲食必難消化。以致停滯發熱。並有噫氣作酸。惡聞臭食。而口中無味。胸膈飽悶。氣口脉必紫暗。發熱惡寒。腹痛。宜血調和榮衛。滋養臟腑。使陰陽不相勝。寒熱不能相干。則無寒熱之患。並加米醋同煎。本方去歸黃。方見中寒。理脾湯主之。

論傷寒天食必惡食煩惱口幹寒氣口慄寒厥宜行氣散消一發而治之方見微言

一論內傷元氣外感風寒其脉洪大而虛其症身熱而頭疼寒而渴自汗氣高而喘宜補中益氣湯加減治之方見內陽

一論產後熱惡寒或口眼喎斜等症皆是血氣虛甚當以大補氣血為主若左手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣

藥多於補血藥

一論產後中風切不可便作風治不可服小續命湯之類宜大補氣血若中風口噤乃血虛而風入夾口筋得風則急故口噤也若角弓反張乃體虛而風入於諸陽之經故獨腰背掣急如角弓反張之狀也以歸木保產湯去香附乾姜加秦艽羌活又宜當歸荆芥各等分水一盞酒少許煎七分灌之如口噤用匙挖開微灌下但下咽即效又宜荆芥略炒為末每服三錢黑豆淋酒調下重便亦可

一論產後虛羸諸病惟宜十全大補湯此藥性溫平補養血氣壯健脾胃乃補虛百損第一方也

一產後血量者乃下血過多而眩暈也不省人事者氣血大脫而神不周也故用人參剉兩劑水煎溫服蓋人參甘溫益元氣之品可以回氣可以生而身熱氣急者加重便一爵身寒氣弱者加大附子三錢外以炭火以醋燉沃之使醋氣薰蒸入鼻則能收效神效

○

一論產後諸疾以未治之大補氣血為主此方治一切諸病氣血虛損脾胃怯弱或惡露不行或去血過多或飲食失節或怒氣相沖以致發熱惡寒自汗口乾心煩急心腹疼痛頭眩眼黑耳鳴等症不語昏憤不省人事並皆治

歸木保產湯 當歸酒洗一川芎一白芍一酒熟地黃一錢白朮去芦炒甘草一錢陳皮一分乾姜三分香附米一錢砂仁一錢山楂一錢雨膈胸痛加青皮橘肉桂一小腹陣痛加玄胡索桃仁紅花蘇木甚者加三棱莪术俱煨醋燒有汗加黃芩燈心酸棗仁二錢口乾苦加麥門冬一錢身不發熱小腹痛不可忍用桃仁燉皮鵝韭菜汁和酒送下立效○惡露不行加益母草牡丹皮桃仁入童便酒同服○吐痰加半夏貝母一錢嗽嗽不止加五味桑白皮一錢氣悶加烏藥一錢音憤口噤不語加荊芥穗

一論婦人產後二十八症服之如神

神散 桂皮灰 玄胡索 當歸酒 赤芍 白芍 生地黃 五靈脂各一蒲黃一熟地黃一香附米研一乾姜燒沉香細乳膏五粒大黑豆五錢莪术細紅花五錢石為細末每服二錢溫酒送下

一胞衣不下敗血攻心眩暈欲絕服此即甦○一將產血多丸食不盡餘血裹胎難產服此棄子救母○一臨產用力太早兒不及

轉橫生倒出非當急救母命。○一子死腹中。母必肢體冷痛口角出沫指甲青黑服此即出。○一惡寒未盡。乃失而不治。又過食酸鹹收斂之物。因而得崩漏。○一血晕眼花起坐不得。○一血迷心竅不能言語。○一敗血乘虛散流四肢浮腫。○一敗血為害。口渴舌燥。乍寒乍熱似瘧。○一敗血入心煩躁發狂。言語錯亂。或見鬼神似癲。○一敗血停留肢節間。遍身疼痛。○一月中飲冷。敗血凝結腹痛難忍。或致渴利。○一脯乾鼻中氣黑。○一敗血結聚小便閉塞。大便壅滯。○一敗血冲心喉中氣喘發喘。○一敗血滯脾胃。中心腹脹滿。嘔吐以翻胃。○一座後諸般怪症難以名狀者。多是敗血所致。服此立臻真仙方也。

○一座後心腹癰癥。血不行。或冗軟作疼。危急之甚。當歸羌川芎。白芷。官桂。玄胡索。牡丹皮。蒲黃。五靈脂。沒藥。各

白芍。三錢右剉一劑。水煎入童便空心服。

○一治產後小腹作痛。有塊脉芤而濡。以四物湯加玄胡索。紅花。桃仁。牛膝。木香。

○一論產後停食胸膈飽悶。身發寒熱。不思飲食。

理脾湯。蒼朮。陳皮。厚朴。半夏。砂仁。枳神曲。一錢山楂。去核參芽。乾姜。甘草。各三錢。右剉一劑。生姜三片。水煎服。

○一治產後三日。牙關緊急。眼目直視。四肢厥冷。乾姜炒東五錢。水煎入童便。溫服立效。

○一論產後暈迷。不省人事。眼黑耳鳴等症。并治中風。不省人事。口吐涎沫。手足癱瘓。

加味佛手散。當歸。川芎。荆芥。各等分。右剉一劑。水煎入童便。溫服。

○一論產後惡寒不快。腰疼。小腹痛。時作寒熱頭痛。不思飲食。亦治久積惡血。月水不調。久癆心痛。小腸氣痛。虛氣痛欲死者。又治心

腹疼痛。及兒枕痛。不可忍。大或血迷。心竅不省人事。又治北人青筋症。用三錢酒調下。

失笑散。五靈脂。

水調去

真蒲黃。

等分

右剉水煎溫服。

一法為細末。每服三錢。釀糊成膏。白湯化下。痛甚加川芎。肉桂。玄胡索。

各一錢。

○一論產婦小腹作痛。忍牙關緊急。惟以失笑散良久即甦。又用四物湯加炮姜。白朮。陳皮。

○一論產後血瘀。督脈不順。以四物湯加人參。白朮。芩。炮姜。各附。

○一論產後瘀血。心腹疼痛。或發熱。或寒。或寒者。以四物湯加玄胡索。青皮。澤蘭。牡丹皮。水煎入童便。酒各一盞。溫服。若以手按順應痛。此是瘀血為患。宜服此藥。或失笑散消之。○若按之反不痛。是血虛。宜四物湯加參。木萸。若痛而作噦。是胃虛。宜六君子湯。若痛如作渴者。宜六君子湯。加乾姜。炒白芍。各一錢。

○一論產勞者。產中之名也。產中虛羸喘乏。乍寒乍熱。病如瘡狀。名曰瘡勞。此是虛乏。血氣不相順接。虛故乍寒。實故乍熱。無時休。

自經似癰疰非癰也治宜大補氣血使其氣血順則病愈矣故用人參補氣當歸補血橘木善保之以醒脾而和胃者取其以類相從能補保胞之區也

○猪腎湯 治產後蓐勞發熱盜汗 人參 當歸各等 猪腰子二片白橘木絲葱白根淡豆豉合

以水煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

○一方治產後蓐勞發熱 猪腰子一對去白膜切作柳葉片用豉酒拌先用梗米一合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作盒之狀空心服

○一治產後發熱目汗肢體疼痛名曰蓐勞

○當歸羊肉湯 當歸九人參各七黃芪五錢生姜五錢右剉用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎至四盞去渣作六服早晚頻進

○一論產婦才閑緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛宜

○十全大補湯 方見補益加炮姜一劑而甦又數劑而安

○一論產婦筋掣背急肌肉掣動此氣血俱虛用十全大補湯而安

○一論產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安宜

○後仲散

白茯苓去皮

人參 龍齒研成粉細辛研成粉赤芍 黃芪 牛膝去梢各生地黃桂心五錢右剉每服用水煎服

○一論產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神智不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故今不語如此但服此藥

○八珍湯 人參 石菖蒲 桂心生地黃 川芎研成粉細辛研成粉防風五錢砂仁甘草各一錢右薑末每錢薄荷湯調下不拘時服

○一論產後嘔逆不止 用乾柿一個切碎以水一盞煎至六分熱飲之即止

○一論產後汗出不止 嫩黃芪水煎地黃 牡蠣粉 白朮研成粉參門冬法防風桂當歸白茯苓桂右剉紅棗二枚水煎溫服

○一論產後消渴饮水不止 當歸川芎 白芍研成粉白朮研成粉白朮芩桂陳皮 半夏研成粉砂仁 香附炒厚朴研成粉甘草 生姜煎服

○一論產後瘧疾 當歸川芎白芍研成粉白朮研成粉白朮芩桂陳皮半夏研成粉砂仁 香附炒厚朴研成粉甘草 生姜煎服

○一論產婦血崩小便不通腹脹疼痛以生馬齒莖搗爛取汁三大合煎湯下蜜一合調頤服即愈

○一治產後痢疾不問赤白主方。當歸  
洗川芎 白芍炒白木炭白茯苓 陳皮 木香 香附炒神曲炒乾姜炒甘草炙右剉水煎溫服。不思飲食加砂仁 小便不利加澤鴻。

○一論產後利疾久不止者以四君子湯加黃芪米飯。

○一治產後泄濁 人參 白朮去芦炒白茯苓炮陳皮 白芍炒乾姜炒澤瀉 厚朴姜汁砂仁 當歸炮甘草炙 右剉 姜棗煎服。

○一治產後嘔吐 陳皮 半夏泡白朮炮芦白茯苓炮砂仁 薑香人參 神曲炒當歸炮甘草炙 右剉 生姜五片水煎溫服。

○一治產後頭痛 黃芪水人參 白朮炮 陳皮 當歸 升麻 柴胡 細辛 蓼荆子 川芎 茛本 甘草 右剉 生姜三片水煎服。

○一治產後咳嗽瘦弱喘鳴發熱 當歸酒白芍炮川芎 熟地黃 陳皮 半夏炮白茯苓去皮枳殼去核桔梗炮前胡蘇梗 乾葛

人參 木香 甘草 右剉散姜末水煎服。

○一產婦咳嗽瘦弱面赤口乾內熱補無微作入內此陰火上炎當補脾胃遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈。

○一論產婦真後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣湯加吳茱萸炒黃連五分四劑頓止但征仲少寐盪汗未止用歸脾湯治之而愈。

○一論產後大便不通因去血過多大腸乾涸或血虛大燥乾涸可不計其日明飲食數多用導通之藥之必待腹滿覺脹欲去下不能者乃結在直腸宜用猪胆汁潤之若服苦寒藥反逼傷中焦元氣或寒加難通或通而泻不能止必成敗症若屬血虛大燥用加味逍遙散氣血俱虛人珍濟濟不可用麻子仁枳殼之類。

○一產前產後大便不通 當歸酒川芎 防風去枳殼去芦各甘草炭二兩 右剉 姜棗煎服心動風之物用蜜燬之亦妙。

○一產後五七日不大便切不宜妄服丸藥用大麥芽炒為末每服三錢沸湯調下與病間服。

○一論產後胞損小便淋漓不止 人參半錢白朮去皮白茯苓去皮黃芪炮半錢皮炮桃仁去皮尖甘草炭五兩 右剉水煎清羊胞後入藥煎服。

○一論婦人子宮腫大日日墮落一片殊類猪肝已而面黃體倦飲食無味內熱煩熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育。

○一論產後陰門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數副而寒熱退又用補中益氣湯加五味子數副若初產腫脹或破痛而不閉者用加味逍遙散去腰炮消而不閉者補中益氣湯切忌寒涼之劑陰門不閉用石灰煎湯先薰後洗一方用荆芥於產香

一論產後陰門痛經不可少 桃仁泡去皮尖研如泥塗之即已

一論產後陰戶極痒不可忍 食鹽一兩塗之即止

○一論產後生腸不收皆由氣虛血弱所以腰下但養氣和血其物自收 人參 白朮 去苦 黃芩 當歸 川芎 甘草 紫 茄 右制

水煎服若懸二日則入升麻拈升提之日用熱手心常摩腰壯但腰壯氣暖其物亦收

○一治產後生腸不收 草麻子去殼研成膏貼頭項心即收內服補中益氣湯倍升麻去紫草加益母草

桃仁去皮 紅花 大黃 三稜 柴柳 濚澀 香附 玄胡索 血竭 水煎空心服

○一論產後有種疾癥留則多汗汗則大便閉故難於用藥唯此華貴蟲二子飲 蘇子 大麻子去皮二味各半合淨洗研極細用水

再研取汁一盞分三次煮粥食之此粥不惟產後可服大抵老人諸虛人風閉皆得效

○一論產後陰戶腫大用吳茱萸煎湯洗之

○一產後惡寒發熱余欲用八珍加炮姜治之其家知醫以為風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛不穩仍服一劑汗出不止

謙語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補二劑益其脉洪大重按如無仍以前湯加附子四劑而安

○一產婦漏利年餘形體骨立內熱肺熱每汗溢汗口舌糜爛口吐痰三碗許脉洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然痰者乃脾虛不能統攝歸元也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而健其脾胃

小產

○小產重於大產蓋大產如粟熱自脫小產如生採破其皮筋斷其根蒂豈不重於大產但人輕忽致死者多矣治法宜補形氣生新血去瘀血若未足月痛而欲產可歸補中湯倍加知母止之若產而血不止人參黃芩湯補之若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎氣弱而小產者八珍湯固之若出血過多而發熱聖愈湯汗不止急用獨參湯發熱燒燙肉僵筋惕八珍湯大渴面赤脉洪而虛當歸補血湯即黃芪一兩當歸三錢是也身熱面赤脉沉而微四君姜附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自壯於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰分如晝夜俱發熱者是重陽而無陰當峻補其陰王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱未復去晝夜伏疫發盡此時節而動是無火也如熱大而甚寒之不寒是無水也然動復止後勿往來時動時止是無水也若陽氣自旺者

○一論小產氣虛血下不止宜補中益氣湯陽氣陷於陰者四物二連湯即四物加胡連川連是也重陽無陰有四物湯無火者八味丸無水者六味丸

人參黃芩湯 人參 黃芪連翹歸 白朮炒 芒硝各阿膠炒 右剉一劑水煎服。

弓歸補中湯 方見妙經

一論小產氣血虛宜

○

論

小產後

瘀血

心痛

疼痛

或發熱惡寒

○

論

小產後

氣血虛

宜

白歸川芎湯 當歸 川芎 白芍 熟地黃 玄胡索 桃仁 紅花 香附 青皮 淳蘭 牡丹皮 右水煎入童便好酒各半盞同服。右小產腹痛以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥或失笑散消之若按之反不痛此是血虛宜用四物參芩白朮若痛如作嘔此是胃虛宜用六君子。若痛而作嘔此是脾虛宜用六君子送二神丸。

一姪娘五月服煎紅丸而隨腹中胀痛服破血之藥益甚以手按之益痛余曰此峻藥重傷脾胃受虛用八珍倍人參黃芪加半夏乳香沒藥二副而痛止數劑而全愈。

一婦人年二十餘疫疾當胎時剖腹清肺解熱喘急不寐請治余以為脾土虛不能生肺金華損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味泡姜四副漸愈往視之又與八珍加五味及十全大補湯全愈。

一小產下血不止血虛之甚也以補中益氣湯去升麻加白芍川芎香附砂仁艾葉阿膠。

乳病

七房陽明所經乳頭厥陰所屬孔子之母不知調養忽怒所逆鬱鬱所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不出陽明之血沸脣故熱甚而化膿亦有所乳之子脣有帶疾口氣微熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便頑忍痛搘令稍軟吮令汁自透可消散矣此不治必成癰瘍治法疏厥陰之滞以青皮清陽明之熱細研石膏行汗濁之血以生甘草之露清腫道毒以瓜薑子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消食熱項以少酒佐之若加以火大兩三壯於腫處其效尤捷不可執用針刀必至危困若不得於火不得於結毋憂愁恐悵悵朝夕精果脾氣消傷肝氣橫逆遂成隱核如大棗子不痛不痒數十年後方為癰核名曰訥岩以其瘡形峻曲似岩穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根便心清神安然後施之治法亦有可安之理。

一論有犯者名為外吹乳有孕者名為內吹乳可以急治宜服

止散

白芷

貝母

各等分

為末

每服一錢

好酒調服

若無乳行加漏芦酒煎調服

仰敷瓜萎散 大瓜萎黃連大黃白芷子鹽巴半個白芷一錢玄參二錢升麻伍錢尾風桔梗錢連翹錢柴胡一錢青皮一錢天花粉半錢

穿山甲一川芎人知母木通葛木藍子个玄胡索水右剉一瓣水煎溫服。

○一治婦人患吹乳腫痛未成瘍者用生半夏一个為末將葱白半寸搗和為丸綿裹塞鼻一夜即愈左乳塞石乳塞左鼻神效。

○一外敷吹乳方。

葱一大把搗爛作餅厚擦乳上將瓦罐盛炭火接在葱上蒸出汗即消腫痛甚妙或因將紫蘇煎湯頻服。

○一治婦人吹乳 韭菜地中蚯蚓糞研細末醋調厚敷於上乾則再易三次即愈。

○一治吹乳用益元散五錢用豆豉薑白湯調下頻服即愈。

○一治吹乳法。患人家門房上或牆頭地上插草四指長以手搔薰令我佛面前一科連唱下子來獻西方金頭娘子害吹奶奶問明左邊右邊患者應人定告再說吹口氣來醫即出不可回顧將草手心紫蘇出放在牆壁以上厚蓋不可透風即能止痛消腫妙哉。

○一法治吹乳用黃紙寫 山田火大人 五字貼乳上立效。

○一論婦人年五十外乳癰初已而又致穿破不得收功者宜

衝脈飲子 黃芪

每兩用桂枝一錢

芍藥

一錢

甘草

一錢

白朮

一錢

生地黃

一錢

茯苓

一錢

當歸身

一錢

白芍

一錢

川芎

一錢

木通

一錢

連翹

一錢

漏芦

一錢

天花粉

一錢

青皮

一錢

橘紅

一錢

桔梗

一錢

防風

○一治內外吹乳及清脣服之立效。黃芪人參當歸 川芎 白芷 木通 連翹 漏芦 天花粉 青皮 橘紅 防風  
白芍 貝母 瓜蔞 乳香 甘草 穿山甲 鳖角刺 水煎食後臨卧服。

○一治乳癰乳癰已膿化爛為水未成即消治乳之方甚多獨此神效療癰瘍毒尤妙無比。名神效瓜蔞散。瓜蔞大諸肉當歸酒  
甘草諸丘乳香酒浸藥一方研各 右作二劑用酒三碗煎至二碗分三次飲之更以渣敷之患處一切癰疽腫毒皆效。

補遺

○一切吹乳腫痛不可忍者。升麻 甘草節 白芷稍 青皮 歸尾 金銀花 瓜蔞仁 橘葉 心連翹 貝母 右剉水煎入  
酒半碗同服不拘時服。  
○一治乳痛風神方。北細辛羌白芷稍分歸尾一錢赤芍分防風頭一錢東沙桔梗分烏藥一錢黃芩小甘草三錢右剉一劑水煎加熱  
酒同服以渣搭患處出汗為度。

婦人乳岩。始有核種，如圓碁子大，不痛不痒，五七年方成瘡。初便宜多服疏氣行血之藥，隨情思如意制可愈。如成瘡之後，則如岩穴之形，或如人口，有唇赤汗，腹水浸淫，胸膈氣攻疼痛，用五灰石膏去其盡肉，生新肉，漸漸收斂。此症多生於是鬱積處。中年婦人未破者尚可治，成瘡者必不可治。宜服。

十六味流氣飲 當歸 川芎 白芍酒炒 人參 烏藥 檀榔 防風 黃芪蜜炙 水官桂 厚朴 檉梗 枳殼姜炒 檉木香 白芷 蜜

蘇 甘草 右剉生姜煎服。乳癰加青皮，亦治痘疹後餘毒作癰癧。

○一治婦人乳岩久不愈者。樟皮 油櫟梗天存山分枝 枯柏 輻粉加生地 共為細末。香油調敷。

○一治婦人乳癰或乳岩初起先服荆防散，毒散一劑以收其毒。次進蒲公英連根葉洗淨，搗汁入酒飲之，將渣敷患處，立消。其收毒散即人參散毒散。

○一婦人年滿三十，每惡後乳內作痛或腫，此肝火所致。與小柴胡合四物湯加青皮桔梗杏附枳殼而愈。便欲絕去病根，卽服流氣飲達致朝寒暮熱，益加腫毒。此血氣被損而然乎，與八珍湯三十餘劑，其年壯元氣易復而得瘳矣。脾少退，再服人珍湯，倍加香附夏枯草蒲公英，仍間服前散，月餘而消亦有乳疽一症，其狀腫硬，不凹，雖破而不清，腫亦不消。尤當急服此散，及用蒜灸。斯二症乃七情所傷，氣血所損，亦勞極也。宜戒怒，節飲食，慎起居，否則不治。

○一婦人患乳癰，或血頭癰，但瘡口不合，百法不應。予與瓜萎神效散四劑，更隔日，瘡口合，又一婦人患此未清，亦與此藥三劑而消。良由云：如有乳癰，便服此藥，可杜絕病根。如每旦成能化膿為水，毒未死者，則從大小便中散之。神效瓜萎散 方見前小柴胡湯 方見婦人虛勞四物八珍湯俱見補益。

### 通乳

○一論婦人素羸怯弱，血氣虛耗，產後無乳，宜補養之，則用

當歸補血湯 當歸身酒洗 黄芪蜜炙 人参 右剉一劑，薑白十根煎服。

○一論產後乳脈不行，身體壯熱，疼痛，頭目昏暈，此涼膈散，熱下乳。

王露散 富歸二錢，川芎五分，桑白皮半錢，人參一錢，白茯苓一錢，甘草各二錢，白芷五分，桔梗四錢，右剉水煎，臨卧溫服。如煩熱甚，大便結，加大黃二錢，金銀花、甘草各二錢，水煎入酒半鐘，食後溫服。

○一方下乳

三母散 牡蠣 知母 貝母 炙細末以猪蹄湯調下。

○一論產後乳汁絕少。用豬蹄一隻，通草四兩，水煎肉汁後同通草再煎去渣食之服之。又用木梳頭上梳垢取下，男梳者九如梧桐子大，每服七八丸，空心順流水下。

○一論產後血不足，經血衰弱，乳汁減少。猪蹄四隻，通草五錢，穿山甲半兩，甘草一錢，右用水五升煮汁飲之。忌生冷避風寒，夏月不宜失血，更以葱湯頻洗乳房。

○一治乳汁不通。通草分量參，柴胡、天花粉、鰣一桔梗、青皮、白芷、木通、赤芍、連翹、甘草各五錢，水煎食後服。更摩乳房。

○一治乳婦患癰結，乳汁不行。宜

湖羊散 王不留行、白丁香、漏蘆、天花粉、白僵蚕、穿山甲、白芷、黃酒調服。

○一治乳汁不行。此方不可用。

核桃仁

十個去皮

穿山甲

一錢

黃酒調服。

○一治產婦少乳。此方不可用。

穿山甲

一錢

天花粉

各五錢

入猪蹄水煮令爛，去渣服之立愈。

○一婦人產次子而無乳服下乳藥，但作帳子，謂人乳皆氣血所化，今服而無乳，是血氣竭而津液亡也。當補其氣血，自然有乳矣。乃與人珍湯，倍加白朮，少加肉桂，十數副奏效。

### 斷乳

○一論小兒三四歲或五六歲當斷乳不肯斷者，宜用

斷乳散 山梔子三個、雄黃二錢、辰砂半錢。右三味為末，入生麻油、輕粉各少許，調勻，候兒睡了，抹於兩眉上，醒來便不食。未效

再抹。

○一論婦人欲斷乳方。歸尾、赤芍、紅花、牛膝、水煎臨卧服。

○一論婦人血氣方盛，乳房作脹，或無兒吃，乳脹痛，增寒熱。麥芽一二兩炒水煎服，立消其耗散血氣如此。和脾胃虛弱，飲食不消，方中多用之一。云麥芽最消腫，若氣血虛而乳汁自出者，宜十全大補湯服送，其子多不育。

### 婦人通治

○夫通治方者，蓋胎前產後一切難症皆可治也。或一方而治數十症，不可入於專門。皆是素試之有驗者，雖曰通治，亦不可膠柱而鼓瑟也。

○一論婦人胎前產後諸病，三十六種，冷血風、八十二種風，疝氣、中風、淋、癓、血聚、胎孕不安、死胎不下、胞衣不落、一服立效。產後腹內

臍下如刀割赤白帶下噃逆填塞心氣煩滿懷胎近產一日一丸臨產不覺痛苦經脈不通或來頻併飲食無味而赤唇焦手足顫麻遍身生黑點血斑者產後中風陽寒體如板者麻黃湯研化服。

神祕萬靈丹 向首烏生用里豆拌九味熟水煎服當歸先兩頭尖葛五川烏大茴香大茴香 草烏水煮過川芎人參防風桂枝白芷荆芥穗 桔梗甘草去心天麻各二兩白朮去皮水煎服木香不見道細辛 血竭另研各末水酒浸一宿水煎服麻黃水煮去節

右共二十味俱為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼黃酒送下。

○一論婦人胎前產後一切之症功效甚大。

濟陰返魂丹 益母草五月端午六月六株根葉并子陰乾不拘多少

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼米飲吞下。

○一胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽米湯或當歸湯亦可。○一胎前產後臍腹作痛作癢或寒熱往來狀如瘧疾者俱

溫米湯下。○一臨產並產後各用一丸童便酒化下安神定魄血氣自然調和諸病不生又能破血養脉急調經絡功效不能盡述。○一產後胎衣不下落在胞中及產前一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下。○一產後中風牙關

緊急半身不遂失音不語童便酒各半送下。○一產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心口中吐酸水面目浮腫兩脅疼痛舉動失力者溫酒下。○一產後兩太陽痛呵欠心忪氣短脈脣脹滿不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫米湯送下。○一產後眼前黑曬昏暈血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事導引自然汗下如無生者濃煎乾薄荷湯下。○一產後面垢頰赤

五心煩熱或結成血塊腹脅疼痛時發寒熱有冷汗者童便酒各半送下。○一產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力頭暉自汗

不止月水不調久而不治者則為骨蒸之疾童便酒下。○一產後鼻衄口乾舌燥童便酒各半送下。○一產後大小便不通煩躁口苦者薄荷自然汗下如無生者濃煎乾薄荷湯下。○一產後利疾米湯下。○一產後漏血水煎桑葉湯下。

○一產後赤白帶下前襟又湯下。○一血崩漏下糯米湯下。○一勒奶痛或腰為末水調塗乳上一宿自消或生搗爛敷上亦可。○一婦人久無子息溫酒下。服至一月決有功效。

○一論此方治產前產後腹痛體熱頭痛及諸疾緩產子未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血。○一治諸般失血傷胎去血產後去血。血崩去血拔牙去血不止。

佛手散 一名芳歸湯 川芎當歸酒各三錢右剉水酒各半煎溫服。

○一切去血過多心煩眩暎絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒不能治之一產後或眩暎宜加酒炒芍藥治之。○一產後腸痛不可忍者加桂心等分酒與蜜便煎服立效名桂香散。○一妊娠子死或未死胎動不安酒水同煎連服數服若已死服之便下木丸其胎即安此經累效萬不失。○一妊娠臨月服之則縮胎易產兼治產後諸疾。

○治虛損脉中寒痛來寒熱呼吸少氣不能支持頭暈目汗腹內拘急。每服用精肉一兩姜十片水煎服。

○一婦人室女心腹疼痛經脈不調用小煎服。○一妊娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服。○一婦人血氣上喘下腫一味等分為細末。

每二錢空心又湯調下。○一座後虛損敗血衝心腹脹氣絕者神效。○一難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童便一盞藥末四錢煎至一盞分為二服未效再作。○一座後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生姜自然汁半合煎服。

○一藏毒下血每服一錢半拌入槐花末半錢水煎服三日取下血塊即愈。○一座後頭痛加荆芥煎服。一吐血亦宜服。

女聖丸 香附末乃女中之聖藥以其氣香則氣無滿氣也味苦能降無道之火其性勇敢發暢可解婦女勞結多愁之偏本草只言益氣世俗多言耗氣男子不敢服非也先春去皮毛用一斤淨分作四製一用益水加姜汁浸透蒸畧炒主降火調下部血一用水醋浸透者熟透客炒主散氣補血一用山梔仁四兩同炒去梔子不用主降驚火一用童便洗過不炒為末一方加芍藥各二兩共為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每五十粒隨引子送下。經水不調酒送下。○胎前諸病父湯下。○產後諸病皆歸治下。胸脇脹滿用姜湯下。頭暈亦荷荳芥湯入姜汁下。白帶非冷乃自庚辛金來主分心氣所致用小茴香湯或木香湯吞下。其餘病者與男子同症隨意用引不能者以用白湯下。

始人雜病

○一論室女寡婦師尼患風寒在乍寒乍熱而赤心煩或時自汗症類時疫但肝脾弦長欲男子而不可得者。

斷慾丸 一名抑陰丸 生地黃二兩酒浸黃芩五錢知母五錢胡蘿蔔五錢赤芍一錢秦艽五錢右為末加煉蜜少許丸如梧桐子大每服二十九丸烏梅一粒水煎服。

煎湯下。

○一論春夏居獨陰無陽感心萌而多不遂是以惡寒發熱全癆瘍者。

柴胡益肝散 茵木一錢柴胡一錢香附一錢神曲一錢山梔一錢牡丹皮一錢連翹五錢青皮一錢川芎一錢赤芍一錢生地黃五錢地骨皮

右剉水煎服。

○一論婦人與鬼交通者臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對晤時獨言笑或時悲疾是也脉息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脉來縮縮不知度數而顏色不變亦是此候也宜安神散 白茯神一錢半白茯苓一錢半人參一錢半石菖蒲一錢半赤小豆一錢半右剉水煎溫服。

○一論婦人心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交通語言錯亂或驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補養氣血安神鎮心宜此。

妙香散 黃芪一錢半白茯苓一錢半白芍一錢半桔梗一錢半甘草一錢半五虧肝膽砂三錢遠志一錢半甘草湯泡

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服。

○一論婦人陰腫者是虛損受風邪所為胞絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與氣相搏。令氣不塞腠理壅閉不泄越故令腫宜菖蒲散 石菖蒲 菖蒲 奉光 吴茱萸 右剉薑白五寸水煎空心服。

○一治婦人陰中腫痛不可忍洗法 茶葉五錢風雨大戰而右剉水煎熱洗切宜避風冷。

○一洗法 小麥 朴硝 白礬 五倍子 右剉同薑白煮熟水洗之。

○一論婦人陰痒者是蟲蝕所謂三蟲在於陽胃之間因臟虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為痒重乃痛也宜

將軍散 大黃附黃芩 黃芪 甘草 赤芍 玄參 升參 山茱萸附蛇床子各五分 右為細末每服二錢食前溫酒調下。

○一治陰痒以小藥不拘多少水煮湯熱洗日三次用之。裸煮湯亦可。

○一方用杏仁燒作灰乘熱糊裏納陰中日二易之。

○一治婦人陰冷痒方 遠志紅乾姜生連花三分蛇床子 五味子各四 右為細末先以免屎塗陰門中然後糊裏一錢納陰中。

熱即為效。

一方以硫黃末煎湯洗。

○一治陰門下脫先以淡竹根煎水洗次用 五倍子 白礬 為末掺之

又方 用溫鹽湯洗候用五靈脂燒煙薰之次用草麻子研爛塗頂上吸入即洗去。

○一治婦人陰中生癰 杏仁細雄黃 塔石 膜香附 右四味研細末和敷陰中。

○一治婦人陰戶作痒 用猪肝炙燥納入陰戶刺蟲俱引出而痒自止。

○一治女人生門硬如石衣捲着痛不可忍用 青魚胆似或鯉魚胆似亦好用絲綿二三錢燒灰存性同魚胆調政鳴毛搽上立效其硬不過半個時即軟。

○一治女人生門毒出流黃臭水作痛取絲綿二三錢燒灰存性酒調鳴毛搽上其毒即收一時即愈。

○一婦人交腸病者莫從小便出尿從大便出混濁不分必是夏月伏暑而致須用五苓散加牛膝海金沙木通通草但令大小便各歸本職即安西園公治歸類徐少川母服此藥固愈加車前子。

○一凡婦人淫亂思色久之必有狐鬼相侵情意相通似睡不睡交接昏迷淫精漏陰而不說日見容色衣冠用鹿角眉搘細末以水調方寸匕服之即言是也。

○一治女人陰中生瘻如蟲咬痛用

扶葉搗爛裹裏藥陰中三四次易即痊

茄病

一治女人生門上茄病取茄蒂剉爛煎水洗。若力出者用巴豆將絲線二人牽住用巴豆持之用絲線繩其毒上過一晚即落推生門邊繩上亦用茄蒂煎水洗如在內用枯碧與茄蒂同煎水洗。

一論婦人茄病原因生產月未滿足因取重物膀胱當下若是紅茄紫茄可治白者不治。人參三錢白芍一錢甘草二錢陳皮三錢懷熟地黃半錢沉香一錢肉桂一錢川芎一錢甘草一錢吳茱萸湯泡枳殼炒半錢右剉二副除沉香磨水生姜一片水煎空心服。

再服白薇散。白薇散白芍一錢大黃半錢蒼朮三錢當歸三錢懷熟地黃三錢川芎三錢牡丹皮一錢澤蘭三十錢青花粉一錢右剉一劑澤蘭每剝十片水煎空心服後薰洗之藥具物自上。

薰洗方。宣黃連金毛狗脊八錢加藜水楊柳根七錢五倍子八錢瞿草一錢枯碧七錢右為散每帖要如數大罐貼藥前湯放桶內去罐上紙蓋薰候藥水客溫傾小半在盆內洗次日再將前藥煎滾薑如前洗其物自收次服三茶九斷根。

三茶九。吳茱萸水泡七次家菜莖泡者佳泡水白芷去粗者白蒺藜炒去刺海藻去鹽水泡入玄胡索半錢牙桔梗半錢白茯苓半錢川芎子去粗七錢花青皮去粗七錢右十二味俱要足秤不可短少為極細末用真正頭酒調單米粉打糊而丸如梧桐子大空心白湯加酒化下。

## 新秤藥量表

本書所載用藥量均為老秤。現在藥店均用新秤，但以市新秤合老秤一兩，應升為一兩一錢七分三厘。因老秤八錢五分二厘半即市秤一兩。恐閱者誤會，故將新老比較表附列如下：

老 秤	新 秤
五 分	合五分八厘強可用六分
一 錢	合一錢一分七厘強可用一錢二分
一錢五分	合一錢七分五厘強可用一錢八分
二 錢	合二錢三分四厘強可用二錢四分
二錢五分	合二錢九分三厘強可用三錢
三 錢	合三錢五分一厘強可用三錢五分
四 錢	合四錢六分九厘強可用四錢七分
五 錢	合五錢八分六厘強可用六錢
六 錢	合七錢零三厘強可用七錢
七 錢	合八錢二分強可用八錢二分
八 錢	合九錢三分八厘強可用九錢五分
九 錢	合一兩零五分五厘強可用一兩零五分
一 兩	合一兩一錢七分三厘可用一兩二錢
一兩以上	照前類推