

新刊
西醫
學集
成

九

醫學集成卷之九

後學 義烏 傅滋 續註

○怔忡八十八

脉法

寸動而弱動為驚弱為悸跌陽脉微而浮上為

胃氣虛微則不能食如恐怖之脉憂迫所作也寸口
緊跌陽浮滑氣盛是以悸

丹溪云屬血虛有痰有慮便動屬虛特作時止者痰因

火動瘦人是血少肥人多是痰尋常者亦是痰時覺

心跳者是血少戴氏怔忡者心中不安易上然如人
特捕是也又云怔者心動不定驚貌

仲憂也東垣謂心神煩亂怔忡元火發上心中氣亂
而熱有似懊濃之狀皆南上血中伏火然上然不安

百用權術法以鎮陰火之浮行以
養上焦之元氣也治以安神丸

大法四物湯安神丸之類痰用痰藥

勞役大虛心跳 朱砂 白芍藥 歸身

側柏葉各三升 川芎 甘草 陳皮各一

炒連半為末猪心血丸

一人形質俱實因大怒患心不自安如人將捕之夜

卧亦不安耳後火光炎上食雖進而不知味口乾而

不欲飲以人參白朮歸身為君炒陳皮為佐炒柏玄

參煎服半月而安

一人虛損心中如常有官事不了之狀以四君了加

參朮黃芪茯苓多服愈

附

治一人病怔忡善忘口澹舌燥多汗四肢更軟發

熱小便白而渴寒豎以內傷不足欲延并附等藥未
決請視脈虛大而數曰是由思慮過度厥陽之火為
患耳夫君火以名相火以位相火代君火行事者也
相火一擾能為百病况厥陽乎百病之起皆自心生
故憂愁思慮則傷心其入平生志大心高所謀不遂
鬱遏積久致內傷也然抱薪救火望安寧能以補中
益氣湯朱砂安神丸空心進坎離丸月餘而安
一人胸膈脹痛心怔忡嘔逆煩悶不食情思惘惘上

暫安日曉七六脉皆結澁不調甚怪徐而察之因其
機深憂思太過加之脾胃內傷積為痰涎鬱於上膈
然也經云思則氣結又云陰氣者靜則神藏躁則消
亡飲食自信腸胃乃傷此之謂也以祛順丸服之即
安

一人因事恐怖心常惕上如畏人捕之狀脉豁然虛
大而浮休熱多汗曰凡病得之從高墜下驚仆擊搏
留滯惡血皆從中風論終歸厥陰此海藏之說也蓋
厥陰多血其化風木故也有形當從血論無形當從
風論今疾是走無形也從風家治之薰化痰散結佐

以鐵粉朱砂丸愈

驚悸

丹溪云因血虛

肝主血無血
虛則木盛

易驚心神忤亂氣與痰結

遂使驚悸血虛者朱砂安神丸氣痰相結者溫膽湯

在心膽經有痰迷心竅用治痰藥

夫心為一身之主
神明系焉其所恃

以養者惟血而已血虛則神無所養而不能自守故
驚悸生焉驚者恐怖之意悸者心築然而動也或曰
悸有三驚悸忪悸痰涎閉於中腕亦悸其症短氣而
自汗四肢浮重飲食無味心虛煩悶坐卧不安是也
若心虛而痰滯之則耳聞大言目擊異物遇險倍危
獨事喪志心為之忤使人有惕上之狀是則為驚心
虛而水停之則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火
惡之心不自安使人有恍惚之狀是則為悸驚者宜
以豁痰定驚之藥悸者與之逐水消
飲之劑使氣血充足而神自寧矣

或曰忪悸因失志氣鬱涎潮聚在心脾經宜定志丸失
者為事不隨 意又思所致 少陰心忪乃邪熱入于腎水乘心惟腎
欺心七惧水也治在於木以茯苓湯導濕四逆散調
之枳實芍藥甘草芫胡是也與驚惧不同宜審之

附方

雜著治勞心思慮損傷精神驚悸煩熱方見煩熱

朱砂安神丸 治因血虛 黃連炒一分 朱砂飛一分

生地酒洗 歸身酒洗 炙甘草各五分 湯浸鈺餅丸如

黍米大每服二十九津下一本無地黃川 歸用生甘草

或論心虛驚悸恍惚用茯神者當用人參遠志石菖蒲

交門冬為末甘草膏丸以牛黃朱砂為衣治之

溫膽湯

治心膽怯易驚

二陳去茯苓加竹茹枳實姜水煎服

養心湯

治心虛血少驚悸不寧

黃芪

白茯苓

茯神

半夏

川歸

川芎

各半

遠志

辣桂

栝子仁

酸棗仁

五味

人參

二升甘草

四升右每服三錢姜棗煎

服行水怔忡加楨榔茯苓

寧志丸

治心虛血虛多驚若有痰者吐之

白茯苓

茯神

人參

栝子仁

琥珀

川歸

酸棗仁

温酒浸半日去壳焙炒

遠志肉

各半

乳香

石菖蒲

朱砂

二系煉蜜丸桐子大棗湯

下三十九

朱雀丸

治怔忡

白茯苓

二

沉香

半

蜜丸小豆

大參湯下三十九

加味四七湯

治心氣鬱滯豁痰散驚

石菖蒲

十一

半夏

一兩

白茯苓

厚朴

各半茯神

紫蘇

各一兩

遠志

炙甘草

各半兩

每服四錢姜水

前服

八物定志丸

平補心氣安神鎮驚除膈熱痰實

遠志

石菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓

各二

白朮

半兩

人參

半兩

牛黃

二銖

蜜丸桐子大朱砂為衣湯下二十九

○不寐八十九

不寐有二

有病後虛弱者有年高血氣者有痰在膽

經神不歸舍者

雖經云老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道澁故不寐也

少吐血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故

不寤也

虛者六君子湯加酸棗仁黃芪

痰者溫膽湯加南星酸棗仁煎下青靈丹

傷寒不寐者當求之本門

因驚而致亦用溫膽湯加減用金銀煎竹茹或道痰湯
加菖蒲九妙隨病處方可也

驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆是膽涎沃心以致心
氣不足若用涼劑太過則心火愈微痰涎愈盛而病
益深宜理痰氣

滄州翁治一人不睡上則心悸神憊上如處孤壘而四
面受敵兵狀達旦日眩上無所視瞶上無所聞雖堅
臥密室膠未嘗交也諸醫罔効予視之左關之陽浮

而虛察其色少陽之支外溢於目皆曰此乃膽虛而
風諸公獨治其心而不祛其膽之風遂以烏梅湯泡
膽丸日再服數服病如脫

健忘九十

丹溪云精神短少者多亦有痰者或曰健忘者皆由憂
思過度損其心胞其

致神昏不清遇事多忘而致此疾非生成愚頑者也
又云思慮脾亦令人轉弱遺忘宜歸脾湯頑兼理心
脾寧神定志
其症自愈也

附方

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

甘草炙二白朮

茯苓

黃芪

圓眼肉

酸棗仁 各一升

人參

木香 各半 每服四錢

姜棗煎服

定生丸

治心氣不足恍惚多忘

遠志 二兩

人參

菖蒲 各一兩

白茯苓 三兩

兩蜜丸如梧桐子大朱砂為衣末飲下二十九丸

砂為衣末飲下二十九丸

二丹丸

治健忘

方見中風門但此多見中風門但此多

人參定志丸

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

酸棗仁

遠志

人參

黃芪 各半

桔梗

丹砂

官桂 各半

天門冬

白茯苓

菖蒲 各七

右為末蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九丸用朱

飲下

○消渴九十

脉法

心脉滑為渴

滑者陽氣勝

心脉微小為消瘵濡散者氣實

血虛洪大者陽餘陰虧寸浮而遲

遲為虛氣弱

跌

陽浮數

浮則為氣數為消長

消瘵脉實大痼久可治小堅急病

久不可治脉數大沉小者可治實堅大者細浮短者

皆難治

丹溪云東垣有法

效採東垣論分註於下

上消者肺也多飲水而水食大小便如常

東垣云高消者古上

醫書五集卷九
七

五裂大渴引飲
是也 以白虎加人參湯主之 或曰上焦渴是心火刑

鍊肺金所致 宜降火清金 以蘭香葉白葵花白
互蒸平澄加升麻黃柏引清氣升而渴自止矣

中消者胃也多飲食而小便赤黃
東垣曰中消者善食而瘦自汗大便

硬小便數反和所謂口干飲水多食肌虛癯成消中
是也以調脾承氣湯三黃丸治之 或曰中焦渴飲食

入胃傳送太急不生津液已則肌食
胃中有熱宜用黃芩石膏治之

下消者腎也小便濁淋如膏之狀
東垣曰下焦者頰

小便如膏焦頰水易虧也此為腎消宜六味黃丸
總錄所謂末傳能食者必發瘡疽皆腎不能食者必

傳中滿鼓脹皆為不治之證 奪占分而治之能食而
渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍

加干葛治之上中
既平不復傳下矣

因膏梁甘肥 變則陽盛矣陽味大盛則陰氣不得營

也津液不足結而不潤皆燥熱為病經曰二陽結謂

之消東陽云二陽者陽明也手陽明大腸主津病則消受善飢血中伏火而血不足此皆津血不足然也

雖有三者之分因於火二也蓋心火甚於上為肺膜

之消病則舌赤裂大渴引飲論之心後熱於肺傳為

煩渴小便頻論云卅成為消中火腎於下為腎消病則

三消之疾本濕寒之陰氣旺衰燥熱之湯火太甚皆

因於飲食腸胃失節腸胃干涸而氣溢不能宣平或

耗精神過違其病或因大病陰血衰陽氣怫而燥

積久實熱結於下焦虛熱血氣不能制濕熱燥甚於

腎而致又有心肺氣厥而渴者有肝痺而渴者有脾

痺而渴者有腎熱而渴者有肝熱而渴者有脾

食而渴者有醉飽入房而渴者有胃乾而渴者有病

風而渴者雖五藏之部不同而病

之所遇各異其為燥熱仁液則一也

或曰末傳瘡疽者何也東垣曰此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更之然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其所至為故如過與不及皆誅伐無過之地也如高消中消制之太急速過病所及成中滿之病正謂上消未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之製也處方之際宜加意焉

治法

卷肺降火生血為主經云熱淫所勝治以甘苦以甘
瀝之熱傷氣傷則無潤折補氣非甘寒不治

秘冊

生血為上總治三消

黃連

天花粉 二味為末

藕汁 人乳汁

生地黄汁

佐以蜜姜汁為膏和二末徐上留舌

上白湯下能食加石膏

消渴瀉者

先用白朮炒芍藥為末服

消渴血虛口乾咽乾腸燥大便難汁過者俱忌半夏不

已必以姜鹽製之

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺經可用參芪

甘草少許姜汁調服虛者參湯

猪肚丸

黃連五兩麥門冬知母蔓根各四兩入雄

猪肚中縫之蒸熟棄熱於石臼中杵爛如乾加煉蜜

丸桐子大米飲下每服百丸清心止渴一云治消中

綠絲湯

飲之此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火

引氣上潮於口如無綠絲湯以繭殼絲綿煮湯代之

消

治一人消渴衆以腎虛水竭津不上升以附子服

之甚曰陰湯之道相為損益水不足則濟以水火不

足則濟以火永聞水不足而以火濟之不焦則枯乃

以寒劑湯去火毒繼以苦寒清潤之劑月餘而安

附方

發玉膏

治三消

方見嗽門

珍珠丸

見濁門

治消上焦渴食少

人參半兩

知母

六錢

甘草

三錢

水煎

一本有寒水石滑石

天花粉 芦根 麥門冬 知母 竹葉牛乳 治消渴 斐藥也

東垣法

六經分治

太陽渴脉浮無汗五苓散加滑

石。陽明渴脉長有汗白虎涼膈散。少陽渴脉弦

而嘔小茈胡加瓜蒌。太陰脉細不欲飲縱飲不思

水。少陰渴脉沉自利者猪苓三黃湯。厥陰渴脉

微飲水少與之。滑石治渴本為竅不利而用之以其燥而能亡津液也。天令溫氣太過者用之。不然是為犯禁。

生津甘露飲

石膏

甘草

黃連

梔子

知母

黃柏

瀉熱

杏仁

麥門冬

全蝎

連翹

白葵

白芷

歸身

蘭香

和溫

升麻

柴胡

行經

木香

藿香

反佐

桔梗

為極細末熇之

酒煮黃連丸

治中暑熱渴

假令小便不利或渴或不渴知內有溫也小便自利而

渴知內有燥也溫宜溼泄之燥以潤之則可矣雜症
有汗而渴以辛潤之無汗而渴以苦堅之德寒食少
而渴以和胃之藥止之忌涼藥恐損胃不食也白朮
茯苓太陽無汗而渴不宜白朮若汗後脈洪大而渴
宜與之陽明有汗而渴不宜五苓若小便汗少脈浮
而渴宜與之病者心肺熱而不渴知不在太陰少陰
之本只在標也在標則高矣竭者是在下也

甘露

治消渴飲水善食而瘦自汗大便結燥小便

類數

半夏

二分

炙甘草

白豆仁

人參

蘭香葉

升麻

連翹

桔梗

各五分

生甘草

防風各一知母一錢半酒炒

石膏三錢

石為細末湯浸文餅和勻成劑捻作薄片子日中晒

乾一半擦杵如米食後姜湯下二錢

生藕節汁浚竹葉生地黃汁相間服以潤之

寒水石甘草葛粉末麥門冬葉湯下二錢

茯苓丸

治三消渴亦治白濁

五味七兩

白茯苓五兩元絲子十兩酒浸

石蓮肉三兩山藥糊丸

桐子大湯下五十九

麥門冬飲子

治膈與胸滿心煩津液乾少而渴

炙甘草 知母 瓜蒌根 五味 人參

膏根

茯苓

麥門冬

生地

竹葉水煎

錢氏白朮散

治消渴食少

方見小兒但加木散
此胡五味也

川蓮丸

治渴

川黃連

天花粉

麥門冬

右為末生地黄汁和牛乳杵丸桐子大粳米湯下三

十丸

玉泉丸

治煩渴口乾

麥門冬

人參

茯苓

黃芪

半生

烏梅肉

炙甘草

各一兩

瓜蒌根

葛根

各一兩

蜜為丸如梧桐子大溫湯化下

每服一丸

補陰丸

地黄飲子為滋陰之劑

紫背浮萍 搗汁每頓服半盞

灸法

百會一穴

一炷發火

中指尖二穴

以手指甲剪去以灸

炷如大豆大今二人吹夫其火必爆

太衝

脉上亦依前法吹爆各高五寸穴處有小

孔比真驗也

● 便溺九十二

(附) 帶下

脉法

洪大而濇按之無力或微細或沉緊而澁為元

氣不足若尺脉虛或浮者急疾者皆難治遲者易治

弦細者白帶洪數疾者赤帶

丹溪云屬溫熱有痰有虛赤屬血由小腸白屬氣申大

腸屬金故也麻帶同法寒則堅凝熱則流通

戴氏曰

濕張有赤白之異然無寒熱之分何問云天氣一則
水溼濁寒則浴清而此翻之濕熱明矣何疑之有昔
酒因濕瘳流注宜燥宮中之濕胃中濁氣下流添
入膀胱用青黛蛤粉又方炒栢一兩生栢二錢半滑
石三兩神曲半兩水丸服之

浴法 宜燥濕降火甚者上必用吐以提其氣下用二

陳加二朮仍用瓦壅子即珙赤者溫傷血也加白芍

藥煎服丸藥樽根黃栢青黛乾姜滑石蛤粉神曲糊

丸服戴氏曰黃栢治溫熱青代解熱蛤粉賦宗入腎
活石利發干姜味苦欬肺氣下降使陰血生且

能監

二陳加升提之藥能使大便潤而小便長

肥白人必多痰以二陳去其濕

珍珠粉丸

黃柏炒赤

蛤粉 一斤 珍珠 三兩

右為末水丸酒下每服一百丸或加滑石青皮 一本

無亦珠

半苓丸

治白濁

神曲

半夏

燥濕

猪苓

分水

姜汁糊丸服

虛勞者用補陰藥大槩不宜涼藥胃弱者兼用人參

燥溫痰

南星

半夏

蛤粉

或海石代

神曲

糊丸

青黛為衣有熱者青代滑石黃柏之類

肥人方

滑石

源濕

半夏

南星

治痰

黃柏

給濕

蒼朮

治濕海石

川芎 升之牛膝 氣痛加之

瘦人方

利熱

黃栢

滑石

椿皮

川芎

黃連

滑加龍骨石脂滯加葵花血虛加

四物

二

肝脉弦者用青黛以瀉肝

帶下

丹溪云：崩帶同法，是溫熱為病，白屬氣，赤屬血，治溫為

主氣虛入參，木血虛入芎歸。哉要云：赤者熱入小腸，白者熱入大腸，其木實

熱寒結於脈不散，故為赤白帶下也。寬服也。經也。須

胡散調下之熱去。○帶病須斷孕味。溫除病自愈也。

胃中濁氣下流滲入膀胱宜升之少二陳加二朮升
麻苈胡甚者上必用吐以提其氣下服此與上下同

而小

肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃栢蒼朮川

芎香附樗皮冬加乾姜

瘦人必此病如有是熱滑石樗皮川芎海石清代丸

服之即愈

結痰帶下小胃丹津下數服候精下後以補藥治

一本用白木紅白藥然黃
寒白芍藥一錢半丸服

白帶 樗根皮 山茱萸 苦參 香附冬半

龜板各二兩 枳子各二兩 黃栢一兩 乾姜具母錢半

白芍藥七錢半 右為末酒糊丸服

又方 白芷四兩以石炭半斤淹三宿去灰用 右將白芷炒焦為

末服

又方 黃荊子炒黃 為末酒下

葵花白者治帶赤者治赤帶一云性燥者加黃連

羅先生治帶用十 漿湯神佑丸玉燭散實者可用

此法虛者不可峻用

血盛者四物加減氣盛者參朮陳皮間与之溫勝者固

腸丸相火動者諸藥中少加黃栢滑者龍石脂滯者

加葵乾痰氣帶下蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓寒
月少加乾姜

白帶 良姜 黃栢 二錢各炒成灰

椿根皮半一兩 右為末粥丸每服五十九

又方 治赤白帶或時腹痛 龜板 二兩 黃栢 炒一

乾姜 枳子半二錢 酒糊丸桐子大每服七十丸日

二服

孕婦白帶 蒼朮 黃芩各三錢 黃連 炒 白芍藥

山茱萸各二錢半 椿皮炒 炒栢各一錢半 白芷 三錢

糊丸酒下

固腸丸

治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之痰

用此以燥其濕不可單用者病作湯使

方見利門

又方

椿皮

活石

右為末粥丸桐子大

湯下一百丸

又方治崩中白帶

椒目為末服或白芷末粥丸服

又方

生狗頭骨燒灰調服或入藥服

東垣論有三陽真氣俱欲竭血海將枯滑物下流其有

一切虛寒之證脉洪大而瀉按之全無宜溫以養之

以酒煮當歸丸治之血盡多加四物氣虛加參朮滑

甚者以龍石脂澀之

陳氏論帶起於風氣寒熱之所傷或產後起早風邪入

於胞門或中經脈流轉臟腑而發下血名為帶下若

傷於肝經則色青如泥傷心經色如紅津傷肺色白

如涕傷脾黃如爛瓜傷腎則黑如衄血也玉機論云

氣寒熱之所傷諸藏殊證似言外邪大抵以症多有

本於陰虛陽竭榮氣不升經脈凝滯衛氣下陷精氣

累帶於下焦奇經之分蘊積而成其病或醉飽房勞

服食燥劑所致也白物如涕之狀故言帶者亦病形

也經云帶脈為病而得名白者為氣赤者為血言崩

中者始病血崩久則血少復亡其陽故曰滑之物下

流不止此可見未得拘於帶脈矣詳病亦有溫痰流

注於下焦或有腎肝陰虛之濕勝或因驚恐而未乘

土位濁液下流或思慕為筋痿內經所謂二陽之病

發於脾是也或餘經溫熱屈帶於小腹之下而病本

殊則昔為氣血虛損榮衛之精氣累滯而成其病標

下得二寸，脈俱滑大而有方，乃上用宣法去痰飲，下
用導水丸，帶濕熱，繼以淡劑，澀之，此為瀉實也。如其
諸脈微細，或沉緊而滿，按之空虛，或洪大而遊，按之
無力，正為元氣不足，陰虛筋痿，虛極中寒等症。東垣
有補陽調經固真等例，乃兼責虛也。川溪先王治因
濕痰下注，用海石、南星、椿皮等類，較之前人下之而
復吐，以提其氣，或發中兼補，上中類例，燥中兼升，發
潤中益氣，溫而兼收，疏之類不同，蓋病有輕重，效深
之異耳。

丹溪治一婦人氣血二虛，有痰痛風，時作陰火，間起小
便白濁，或赤帶下，以青代蛤粉、樗皮、活石、甘姜、黃柏
、曲糊丸，仍用燥藥。一人便濁半年，或時夢遺，形瘦
、作心虛，治以珍珠粉丸，合定志丸。一人年近六十
、形肥味厚，中焦不清，濁氣流入膀胱，下注白濁，上氣

即過痰以二陳加二朮升麻芫胡四貼濁減半覺胸
滿因升動胃氣痰阻滿悶用二陳加炒曲素無痰者
升動不悶。一人便濁而精不禁用倒倉法効。一
人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩辛夷
川芎炒栢滑石半夏牡礪粉

東垣治一婦人常漏久矣諸藥不効診得心胞尺脈微
其白帶下流不止崩中者始病血崩久則血少復亡
其陽故白滑之物下流不止如本經血海將枯津液
復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經益津液以辛
熱之氣味補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺

而救上熱傷氣以仁參二錢白葵花四分橘紅五分
生黃芩細研郁李仁去皮尖研炙甘草此胡各一錢
乾姜細末二錢除黃芩外水煎將乾入芩熱服而愈

(呂)

治一壯年嗜酒善食忽疾作肌肉頓消骨立六脈
皆洪數而右口尤躁疾曰此三陽病由一水不勝五
火乃移熱於小腸不瀝則淋曰前澀如脂者已數日
如飢釜置烈火煬沸不少休以虎杖滑石上膏黃栢
等剉清之痛稍減而湧沸猶存以龍腦辰砂末之蘸
以裨柿食方寸匕沸亦愈

附方

苦煉丸調之

苦練酒浸 川歸 等分 酒糊丸酒

下腰腿痛加四物羌活防風虛加參芪甘草芍藥

治白帶因七情所傷而脉數者

炒連 扁豆 炒栝 半兩 香附 酒炒 白芍藥

白朮 椿皮 一兩 白芷 二錢 右為末粥丸桐子大

飲下七九

治赤白帶溫勝者 蒼朮 鹽炒 白芍藥 滑石 一兩

枳殼 甘草 椿皮 各一兩 乾姜 一錢 地榆 半兩

右為末粥丸空心飲下一百丸

東垣酒蒸當歸丸 治癩疔白帶下疰脚氣腰已下

如冰冷湯火不能溫寒之極也面如枯魚肉如刀割
小便不止与白帶常流不禁面白目青如菜目眦
無所見身重如山腰腿枯細大便秘難口不能言飲
食不下煩懊懷面停垢皆惡寒噦嘔此上中下三陽
真氣欲竭脉沉緊而濇按之空虛此虛之極也

茴香子兩附子炮去皮良姜各七錢川歸一兩四味劉以

好酒一盞半煮酒尽焙乾炙甘草苦練主

丁香各五分水香升麻各錢柴胡二錢炒鹽

全蝎各三錢玄胡四錢石共為細末酒煮面糊丸桐子

大每服五七十九醋湯下

固真丸

治白帶久下不止膝腹冷痛陰中亦然目中
溜火視物眩暈然無所見齒惡湯飲惟喜乾食此寒
濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標
故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢致目眩暈無
所見齒惡熱飲者足陽明經伏火也當大瀉寒濕以
九藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製
白石脂一錢龍骨二錢以枯其濕炮乾姜四錢辛熱
瀉寒水黃芩五分大寒為因用又為白導又瀉齒中
惡熱飲也柴胡為本經之使以為藥五分導之恐辛
熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身二錢辛

温和其血 缺此用藥之法 備矣 右除龍骨石脂水飛

外同為細末 面糊丸雞頭仁大空心白湯下

一方治濁 草薢 大割 蓮肉 黃芩 益智

地骨皮 黃芪 車前子 石菖蒲 人參

茯苓 烏藥 甘草

固本丸 治白濁 蓮須 黃連 炒二兩 白茯苓

宿砂 益智 半夏 炒栝 各一兩 炙甘草 三兩

猪苓 二兩 右為餅丸如豆大 溫酒下

秘真丸 治濁 宿砂 龍骨 五倍 各一兩

白茯苓 辰砂 各半兩 為末 糕糊丸辰砂為衣

定志丸

治濁

見日門

清心蓮子飲

治赤濁沙瀉

見火門

遺精丸十三

脉法

氣動微緊者男子失精女子夢交弦而大者女子漏

下男子失精

丹溪云夢遺主熱精滑主溫熱帶下与脫精同治法

若自覺者為精滑因夢交者為夢遺谷云夜夢鬼交是也

大法

青黛海石黃柏

內傷氣血不能固守以八物湯加減吞嚥振丸

忘想而得其病在心治宜安心神帶補去竹茹加人參

連肉附棗仁仲容五分○精滑用黃柏知母降火牡蠣蛤粉

燥溫又方良姜錢二檉根皮半一兩粥丸服

雜著云夢遺精滑世人多作腎虛用補腎澁精之藥不

効此乃脾胃飲酒厚味燻火溫熱者有之蓋腎藏精

之所生由脾胃飲食化生而輸歸於腎今脾胃傷於

濃厚溫熱內鬱中氣濁而不清則所生之精亦得濁

氣腎主閉藏陰靜則寧人所輸之精既有濁氣則邪

火動於腎中而水不得寧靜故遺而滑也此症與白

濁同丹溪論白濁為胃中濁氣下流滲入膀胱而云

無人知此也其有色心太重妄想過用而致者自從
心腎治但薰脾胃者多當審察之

或論遺精有四有用心過度心不攝腎而致者有因色
慾不遂精氣失位輸精而出者有色慾太過滑泄不
禁者有年壯氣盛久無色慾精氣滿溢者有小便出
多不禁者或不出小便而自出或莖中出而痒痛常
如欲小便者宜辰砂妙香散或威喜丸或分清飲加
龍骨或加五倍牡蠣白茯苓五味子煎服

丹溪治一人便濁而精不禁用倒倉愈

一人虛損盜汗遺精白濁用四物加參朮黃芪知每

黃栢牡礪牛膝杜仲五味煎服而愈

一人虛損小便中常出精血以四物加山梔參朮麥

門冬黃栢木通車前子茯苓宅舍

一人年六十五精滑常流以黃栢知母蛤粉山藥牡

礪飯九桐子大鹽湯下八十九

一人湖熱精滑八物加黃栢知母牡礪蛤粉又見濁

東垣治一人年三十二病脚膝痿弱膝下尻髻皆冷陰

汗臊臭滑不固諸醫以茸附熱藥治不効予脉之沉

數有力曰此因醇酒膏粱滋火于內逼陰于外又投

熱藥反瀉其陰而補其陽真所謂實上虛下也

腎丸方見小便閉門大苦寒之劑製之以急寒因熱用引入下焦適其病所以瀉命門相火再服而愈

附方

王氏以補陰丸加牡蠣白朮山茱萸椿根皮方見虛

固真丸固精丸俱治精滑方見虛損門

珍珠丸方見濁門

大便秘結而夢泄者瑣陽煮粥食之

大便溏而夢泄者牡蠣醋煨醋丸服之

瑣金丹治遺精鬼交便濁
牡蠣
龍骨

茯苓遠志
右末酒糊丸服
一方有茯苓

○淋證九十四

淋法

細而數少陰脉數婦人則陰中生瘡男子氣

淋脉盛大而實者生澁小而澁者死下焦氣血乾者

死鼻頭色黃者小便難

丹溪云淋有五皆傷於熱

小便滴淋痛者為淋急滿不痛者溺之閉也

膀胱有熱則淋

因內熱如赤煎澀而成九

有腎虛

極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利藥有死

血作淋者牛膝膏

一云四物加杜仲牛膝亦效

老人氣虛而淋參

木帶木通山桅

一云八物湯加黃芪原枝甘草諸藥中可加牛膝

痰熱臍滯

中焦淋澁不通用二陳湯服大椀調其氣而吐之。

淋川益原散加山梔木通或用梔子一合白湯煮之
夏月以茴香煎湯調益原散。澁數有血因火燥下
焦無血氣不得降而滲泄之冷不行也若下焦無血
小便澁數而黃四物加黃柏知母牛膝甘草梢。小
便黃用黃柏澁數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便
黃赤用山梔澤泄切當溫多者宜滑石利之

牛膝膏

牛膝合一剉以水五鍾煎至一鍾入射香少

計空心服只單以酒煮亦可

舟溪治一老人因疝疼多服烏附患淋十餘年又服消
黃諸淋藥不効頌發一大疝淋痛愈甚叫號困憊淋

短滑左微似弦皆毒所致凝積滯血滿膀胱淋瀝為
敗血短為血耗忍痛傷血叫號傷氣知其溺後有如
敗膿者詢驗果然多取牡牛膝濃煎湯并四物湯大
劑與三日後痛與敗膿漸減淋止瘡勢亦定蓋四物
能生陰血也。一少年自生七箇月患淋五七日一
發大痛下如漆如粟者一盞乃定脉輕潘重弦形瘦
長色萎意其父必多服下部藥道熱在胎流於子之
命門而然以紫雪和黃佰末元脬極乾與二百丸湯
下經二日又與三百丸以食壓之又半日大痛連腰
腹下如漆粟者一大碗病減八分又以陳皮一兩桔

瘦木通冬半兩等一服與之又下如漆粟者一合愈
一產婦因收生者不謹損破胞胎而致淋瀝因思
肉傷後尚可補完脉之虛甚差難產是氣血虛產後
虛試與峻補以參朮為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪
茯苓為佐煎羊胞湯令極飢飲之一月而安蓋是
氣血驟長其胞恐稍遲亦難成功。一人年四十一
口乾渴數春未得之夏求治脉俱濡右畧數而不弦
重取似大而稍有力左秒沈畧弱而不強然濡却多
於右喜二尺皆不甚起當作飲食厚味生熱此謂之
痰熱禁其厚味降火以清金抑用而補脾三補二十

一立陽明五粒阿魏五粒姜湯吞下一日六次又以
四物湯加參朮陳皮生甘草五味麥門冬煎服一日
三次與丸藥間服之一二日自覺清快小便減三之
二口不乾止是消未消頭運眼花久坐則腰疼遂以
摩腰丹治腰疼仍以四物減芍加參芪朮牛膝五味
炒柏麥門冬煎調六一散反覺便多遂去六一散仍
服丸藥

附方

治淋方

五苓散

牛膝

葵子

滑石

瞿麥

附子

冷加

黃芩

熱加

梔子

血加

秋石

膏加

石草石加沉香氣火木香腹滿閉加

小蘗湯 治下焦結熱血淋 生地 小蘗根

通草 活石 梔子 蒲黃 淡竹葉

當歸 藕節 甘草等分 每服五升水煎服

又方 人參 三白根 黑豆 麥門冬

菝頭帶根 濃煎服

立効散 治小便黃赤淋閉痛或血從大小俱出

耳草三分 山梔半刀 瞿麥一刀 加燈心菝白七寸姜

水煎服

琥珀散 治五種淋瀝疼痛或有膿血

琥珀

沒藥

海金砂

蒲黃

各等分

為末甘草

湯下三錢

葵花散

治淋瀝

葵花根水煎服

參苓琥珀湯

治淋莖痛不可忍

人參

茯苓

各五錢

川練肉

生甘草

琥珀

芫胡

歸梢

各三分

玄胡索

七分

右劉水煎服

淋閉服血藥不効者

炒栢

牡蠣煨

右為末調服或小茴香湯下亦可

○小便閉九十五

煎法

與上參看

丹溪云小便閉有氣虛虛則氣不利氣不利則有血虛血

則氣不升有痰多痰多則氣不運有尖熱熱結下焦有氣結氣結則帶

而不溫易脾上溫不運而精氣有痰氣閉塞皆

宜吐以提其氣七升則水自降蓋氣乘載其水也前

滴水之悉必上竅通而下竅之水出焉氣不利故不通經云小便為氣

不通也

治法 宜清宜燥宜升有肺二滿三之治如固肺燥不

能生水則清金以隔二如不因肺燥但膀胱有熱宜

瀉膀胱此正治如因脾溫不運而精不升故肺不能

生水當燥胃健脾此隔三清肺用車前子茯苓之類

瀉勝臍用黃柏知母之類健脾胃用蒼朮白朮之

類。氣虛用參朮升麻等先服後吐或就參芪藥中

探吐又云益氣補氣。血虛用四物先服後吐或芎

歸湯探吐。痰多者二陳湯先服後吐痰氣閉塞導

痰或二陳加木通香附探吐。實熱者利之八正散

大便動則小便自通。因熱鬱不通用赤茯苓黃芩

澤瀉車前子麥門冬桂滑石木通甘草稍氣加木香

黃芪淋痛加黃柏生地夏月調益原散。氣血二虛

中有熱者八物加黃柏知母

東垣論小便不通皆邪熱為病分在氣在血而治之

渴與不渴而辨之如渴而不利考熱在上焦肺分故也夫小便者是足太陽膀胱經所主也肺合生水若肺熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而資其化源故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如霧如霜皆從天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而小便不通也熱閉於下焦者腎也勝

膀胱也乃陰中之陰上受熱邪閉塞其流易上乾云寒
在胸中遏塞不入熱在下焦填塞不便須用感此方
寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經
云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之
藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何以補
重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感
天之寒氣而生大寒之藥此氣味俱陰乃陰中之陰
也大寒之氣人感之生膀胱寒水之運人感之生腎
此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其
下焦使小便不通也夫用大若寒之藥治法當寒因

熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也如熱在上焦以梔子黃芩熱在中焦以黃連芍藥熱在下焦以黃柏

丹溪治一婦轉胞小便閉胎婦稟受弱憂悶多性急躑食味厚皆能致之古方用清利疎導藥鮮効因思胞為胎墮在一邊胞系了矣不通胎若舉起胎系得踈水道自行然胎墮必有其由一婦患此脉似瀉重取則弦左稍和此得之憂患瀉為血少氣多弦為有飲血少則胞不舉氣多有飲中焦不清而澁則胞之所避而熱下故墜以四物湯加參朮半夏陳皮生甘

草生姜空心飲探吐出蕪俟氣定又與至八貼而安
此恐偶中後又治數人皆効○又一婦孕九月轉胞
小便閉脚腫形瘁膝左稍和而右澁此必胞氣傷胎
系弱不能牽而壓膀胱偏一途氣急為其所閉當補
血養氣以參朮歸芍陳皮炙甘草半夏服四貼次早
以渣煎頓飲探吐之小便大便皆黑水

一孕婦小便不通脉細弱乃氣血虛弱胎壓膀胱下
口用補藥升起恐恐逆反加急滿令濕婆以香油抹
手入產戶托起其胎溺出如注却以參朮升麻大劑
服之或少有急帶如前再托

要云一法俾孕婦倒
豎起胎自運其弱處也

勝於手
長遠矣

一婦脾疼後大小便不通且痰膈中焦氣聚下焦以
二陳加木通煎服再服探吐之

又一入小便不通醫用利藥益甚脉右寸弦滑此積
痰在肺口為上焦膀胱為下焦上焦閉則下焦塞如
滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉以藥大吐
之病如失

東垣先生治一人病小便不利目睛突出腹脹如鼓膝
已上堅硬皮膚欲裂飲食不下服甘淡滌泄之藥皆
不効予曰疾急矣非精思不能處思之半夜曰吾得

之矣經云膀胱者津液之府必氣化而能化焉多服
淡緣之藥而病益甚是氣不化也啓玄子云無陽則
陰無以生無陰則陽無以化甘淡氣薄皆陽藥獨陽
無陰欲化得乎遂以滋腎丸群陰之劑投之再服愈

附方

清肺飲子

東垣

治渴而小便閉塞不通邪熱在上焦氣

分

燈心一分

通草二分

澤瀉

瞿麥

琥珀

各五分

扁蓄

木通

各七分

車前子

炒一分

茯苓

二分

猪苓

三分

右為末每五錢水煎服或八正

散五苓散皆可服

專氣除燥陽 治小便不通乃血澁致氣不通而竅澁

也 茯苓 滑石 知母 宅舍

黃柏 水煎服

滋腎丸 治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃柏 知母 各酒洗 焙一兩 肉桂 五分 水丸桐子

大湯下一百丸

八正散 甘草 大黃 瞿麥 木通

滑石 栝石 車前子 山梔 等分 加燈心水

煎服

髮灰散 治飲食忍小便走馬身旁皆致轉胞下急

滿不通

裝灰

二合

醋調服

一本和葵子

一方治小便不通

甘遂和大蒜杵餅置臍心令實以艾灸三十壯

○小便不禁九十六

丹溪云屬熱與虛赤者有熱白者是氣虛○膀胱不約

為遺溺

小便不禁者出而不止也遺尿者膀胱中遺也內裡曰弱膀胱為脾之有水注內之然

足二焦脈實約三焦而不通則不得小便足三焦脈虛不約下焦則遺溺也

雜著云小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫繼之

藥殊不知屬熱者為多蓋膀胱火邪妄動水不得寧

故不能禁而頻數來也故老人多頻數者是膀胱血

少陽火偏旺也治宜補膀胱陰以瀉火為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味之類不可用溫藥也病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益盛矣故宜補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

東垣論治一人立夏前誤服白虎湯過多致遺溺者以溫藥升陽以解之

或曰小便不禁有虛熱虛寒之分虛寒自汗者秘元者三因韭子丸或大炆子先猪胞煎湯下內虛溫蒸者六味地黃丸或八味丸加杜仲石脂五味減澤瀉

附方

或曰虛者五苓散加四物湯熱者五苓加解毒散

茯苓丸

治心腎俱虛神志不守寐寤不禁

赤白茯苓

分等為末酒煮地黄膏丸鹽湯送下

阿膠散

治失

阿膠

炒二兩牡蠣

鹿茸

炙四兩

煎散任用

三因韭子丸

韭子

炒六兩

鹿茸

菴蓂

牛膝

桂

芫戟

兔絲

石斛

杜仲

川歸

地黃

佐之

暖腎丸

治腎虛多溺或不禁而濁

胡芦巴

炒

破故紙

炒

川練

川練子 炒

熟地

益智

鹿茸

酒炙

山茱萸

代赭

醋炒

赤石脂

各七錢半

龍骨

海螵蛸

熟艾

醋拌

丁香

沉香

乳香

兩各半

高良薑

醋炒

糯米粥

九桐子

大空心

首烏

湯下五十九

秘元丹助陽消陰正氣溫中自汗時出小便不禁陽衰

足冷真氣不足盪寒

砂仁

靈砂

各一兩

龍骨

各三兩

呵子

各一兩

糯米粥丸麻

子六酒下二九或三九

○小便多九十七

附或論小便多乃下元虛也宜八味丸兔絲子丸

小兒絲子丸

兔絲子五兩石蓮肉 白茯苓

山藥

五味各二兩山藥糊丸桐子大酒下五十九

五苓散

臧澤瀉之半加阿膠吞八味丸方見虛損門

有盛喜致小便多日夜無度乃喜極傷心卜與小腸為表裏宜分清飲四七湯各半服和煎仍以辰砂妙

香散吞兔絲子丸

分清飲

益智各八錢草薢 石葛蒲 烏藥水煎

妙香散

射香一錢人參 桔梗 甘草各半兩

木香二錢

茯苓 茯神 黃芪 遠志

山藥各一辰砂三錢為末每二錢溫酒下

交腸九十八交腸者大小便易位而出也

丹溪治一人著酒痛次不醉忽糟粕出前窠屎溺出後

窠脉沉滿數四物湯加海金砂木香檳榔木通桃仁

八貼安又一條見腸瘕

又一婦患此破漆帽燒灰米飲下愈

或曰因氣不循故道清濁混淆宜五苓散調氣散各一

錢阿膠五分湯下或黃連阿膠木香末亦用前藥送

下然于

調氣散 白豆蔻 丁香 檀香 木香各一

藿香

甘草

各四兩

宿砂

二兩

為末二錢湯下

黃連阿膠丸

阿膠

一兩

黃連

三兩

茯苓

二兩

右為末阿膠膏丸桐子大米飲下二十九

○關格九十九

脉法

兩寸俱盛四倍已上

經曰人迎大四倍於氣口各曰格氣口大四倍

於人迎各口閉此謂俱盛四倍蓋以其病而致於上則過絕下則閉塞關格俱病者言也古人治一婦吐

逆大小便不通煩亂四支冷無脉凡一日半與大承氣二劑至夜半漸得大便通脉漸生翌日乃安此為

關格之病

丹溪云

此證多死寒在上熱在下

易上若云寒在胃中

故曰格熱在下魚鱗塞不通無此之理故曰關格則吐逆則不得小便難經云邪在六府則陽脉不和

陽脉不和則氣滯之氣喘之用陽脉盛矣邪在五藏
則陰脉不和則陰脉不和則血罷之血罷之則陰脉盛
矣陰氣不得相營故曰關陰陽俱盛不得相營故曰關
格其命如此矣

法當吐以提其氣之橫格戴氏曰陽中窵有所碍欲升

格不必在出痰也有痰二陳湯探吐上中便有降有
氣虛不運者補氣藥中升降

○秘結一百

脉法 胖脉沉數下連於尺為熱結二尺脉虛或沉細

而暹者為陰結右尺浮為風結。多面黃可候

丹溪云有虛有風有溫有火有津液不足有寒有氣結

者切不可一例用芒硝大黃色豆牽牛等利藥

言論云北方黑色入通于腎開竅于二陰

又云腎主大便難取足火陰而東西惟廣其意

曰腎主五液津液潤則大便如常若飢飽勞逸損傷

胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散

真陰津液虧少故大便結燥切詳燥之為病不一有

熱燥有以燥有陽結有陰結若吐瀉後腸胃虛服熱

多者為熱結宜承氣下之肺受風邪傳入腸中為風

結宜麻仁九宜老氣弱津液不足或產後內亡津液

而結為氣虛也宜地黃丸大便秘小便數則為脾約

脾約者脾血耗散肺金受火無所攝脾津液故渴宜

養血潤燥若能飲小食清為秘為實秘麻仁七宣等藥

主之不能飲食小腸為密秘為氣秘也厚朴湯主

俗小腸後熱於大腸為密秘為氣秘也厚朴湯主

液燥結愈甚復下復結極則以致引導於

下而不能通者遂成不救之症可不董哉

治法

五

腎惡燥急食辛以潤之結者散之如火陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦瀉之如食腹滿響是也陽結者散之陰結者熱之有物結者下之久病腹中有實熱者大便秘者以潤腸丸慎勿峻利

大腸壅秘而熱

白芍藥半兩

陳皮生地黃歸身

一兩甘草二錢為末粥九白湯下八十九

古方有脾約證制脾約丸謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結化津液入胃而愈然既曰脾約必陰枯槁內火熾灼熱傷元氣故肺金受火而津

竭必竊母氣以自救金耗則土受木傷脾失轉輸肺
失傳送宜大便難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰
血使陽火不熾金行清化脾土清健津液入胃腸潤
而通矣今此丸用之熱甚而氣實與西北方人稟性
實者服無不安若用之於東南方人與執雖盛而氣
血不實者雖得暫安將見脾愈弱而腸愈燥矣須知
在西北以開結為主東南以潤燥為主

一老人因內傷挾外感自誤汗後以補藥治愈脉尚洪
數予謂洪當作大論年高誤汗後必有虛症乃與參
朮歸芪陳皮甘草等自言從病不曾更衣今虛勞併

痛不堪欲用利藥予謂非實秘為氣因誤汗而虛不
 得充虛無力可勞仍用前藥間以肉汁粥及瑣陽粥
 與之濃煎荔枝湯浸下鉢下軟塊五六枚脉大未飲
 此血氣未復又與前藥小便不通小腹滿悶苦仰卧
 則點滴而出予曰補藥未至倍參芪服二日小便通
 至半月而愈。一婦產後秘結脉沉細服黃柏知母
 附子愈

附方

麻仁丸

治大便秘風秘脾約

郁李仁

麻子仁

仁 每升

大黃

煨 兩半

山藥

防風

枳殼

炒 七錢半

欒榔

菟活各五錢

煉蜜為丸如梧桐子大湯下五

七十丸

實熱結者大承氣湯。胃中停滯寒冷之物大便不通

心腹作痛者備急丸。食傷太陰氣滯不通者木香

檳榔丸。大便秘服承氣不利者四物加枳殼檳榔

桃仁紅花即利

潤腸湯

治大便結燥不通

熟地黄

歸梢

升麻

桃仁

麻仁

大黃各一錢

紅花三分

生地

生甘草各二錢

水煎溫服

潤腸丸 治胃中伏火大便秘澁不食風結血秘

桃仁去尖 麻仁 歸梢 大黃煨各一兩 葱活一兩

右除二仁另研餘為末蜜丸白湯下風濕加皂角皮去

服 秦兗脈澁覺氣塞加郁李仁

通幽湯 治大便難幽門不通上冲吸門噎塞氣不

得下治在幽門以辛潤之 炙甘草 紅花各一分

斗地 熟地 并麻 桃仁 歸身各一分

右水煎調檳榔末五分稍熱服

潤身丸 治血燥大便不通 麻仁

常歸 生地 桃仁 枳殼等分 蜜丸服

脾約丸

麻仁一兩 三錢 枳實

厚朴

芍藥各二

大黃

蒸四

杏仁

去尖二

蜜丸 桐子大 每服三十九

活立潤燥丸

治風秘血秘常燥結

歸梢

一錢

防風

二錢

羌活

大黃

各一兩

麻仁

半一

皂角

一兩

右除

二仁另研外餘為末 蜜

丸 桐子大 湯下 五十九 二三服後以麻子蘇子粥食

元戎治臟結秘澁加四物煨大黃 桃仁煎丸任用

六味地黃丸

治下焦燥熱秘澁

大補丸

並見玉黃門

黃疸一百一

脉多沉渴欲飲水小便不利皆發黃也凡黃候寸口近掌無脉口鼻冷並不治

附論云不必分五種同是溫熱如食麪相似

脉沉渴欲飲水小便不利皆發黃沉乃陽明蓄熱喜

自汗七出入水熱鬱身腫發熱不渴各黃汗脉浮緊

乃因暴熱浴冷水熱伏胸中身目面悉如金色名黃

疸脉緊數乃飢發熱大食傷胃食則腹滿名疸數為

熱大則大食緊為寒大則小食陽明病脉遲者食難用飽則發

煩頭眩者小便難欲作足疸。脉沉弦或茶細因酒

百脉熱當風入水懊憹心煩足熱名酒疸。其脉浮

或欲嘔者先吐之。沉弦者先下之。脉浮緊乃大熱。交接入水腎氣虛澀。濕於脾額黑。日晡熱小腹急。足下熱大便黑。時澹名女勞瘵。腹如水狀不治。

諸黃家但利其小便。愈假令脉浮以汗解之。如便通白汗當下。愈當以十八日為期。治之十日已上為差。及劇者為難治。因內熱入水。溫熱內鬱。沖發胃氣。病雖有五皆溫熱也。病則身熱。一身盡痛。發黃便澀。治宜流溫清熱。五苓加茵陳黃連之類。

輕者小溫中丸。重者大溫中丸。熱多加連溫多者茵

陳五苓散加食積藥

八温中丸

治黃疸與食積又可制肝燥脾虛者以

白朮作湯下

白朮五兩

苦參夏加冬減

山查各二兩

萊萸

冬加夏去針砂

十兩炒紅醋碎蒼朮

川芎夏減

神曲

各半斤

香便一斤

右為末醋糊丸桐子大食前鹽

湯下一方有梳子無木山查苦參萊萸

大温中丸

針砂

十兩制

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴

三棱

莪朮

黃連

苦參

白朮

各五兩

生甘草

三兩

香附

一斤製同上

無黃連苦參白朮

附方

蘇合香丸 蘇合香 白朮 香附 蘇合香 白朮 香附 蘇合香 白朮 香附

或曰黃疸倦怠脾胃不和食少胃苓湯小便赤加滑石或苓連山梔茵陳猪苓澤瀉蒼朮青皮草龍膽女勞疸加三稜莪朮宿砂陳皮神曲又曰氣實人心痛

五苓散加茵陳山梔黃連治諸疸隨證加減方見第八

茵陳梔子湯 治疸 茵陳去一兩 大黃半兩 山梔十斤

豆豉 煎下五苓散熱加苦參渴加瓜蒌根便澀

加停蘼素熱加黃連

滑石石膏丸 治女勞疸

白滑石 石膏 右末為丸米飲下便利即止

茯苓滲濕湯

治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身躰面

目俱黃小便不利食少

白茯苓

五分

澤瀉

三分

茵陳

三分

黃芩

梔子

青皮

陳皮

防已

白朮

蒼朮

枳實

各二分

猪苓

二錢

黃連

二分

右剉水煎服

如神散

治酒毒不散發黃久

浸漬流入清氣道

中宜此藥鼻中取黃水

苦瓠

音胡

瓠子

去皮三七分

苦瓠子

去皮

黃黍米

三百粒

安息香

二皂子大

右為末以一字搗入鼻中滴出黃水一升忌勿吹

或過多即以黍攘燒灰射香黍各少許吹鼻內立止

針砂丸

芍藥

川歸

陳皮

川芎

青皮

各一兩半

針砂

半斤 服滓三次

蒼朮

四兩 泔浸一宿

茵陳

厚朴製

麥芽

各一兩半

義術

三稜

生地

姜汁炒各二兩

姜黃

山梔

炒

升麻

乾漆

炒各五錢

右為末

醋調神曲糊丸

綠礬丸

治黃胖

針砂

二兩

醋滓

綠礬

四兩 姜汁

五倍

半斤

神曲

半斤

右末大棗半斤

取肉為丸

忌蕎

麥諸母肉毒物

退黃胖

以平胃散料一分香附一分加神曲麥芽

白朮丸服

○ 癰疹一百二

丹溪云班豆疹瘡皆惡毒血熱蘊蓄於命門遇相火合

起則發也戴氏云有色點而無頭粒者為班蓋瘡發

而不出頭粒隨身即沒上而又出有小紅靨行皮膚之

中不傷陰陽不同有傷寒發班有時氣發班有熱病發

班有溫毒發班有內傷發班有班上如錦文或發面

部或發背皆或發四末色班亦者胃熱紫黑者胃爛

充則害承乃制故也此外感熱病而發治以玄參升

麻白亮等藥有陰症發班亦出背并手足亦掃少

而微紅若作熱治摸之涼藥誤矣此無根失守之火

聚於胸中上獨熏肺傳於皮膚而為班點但如蚊蚋

蚤風所咬之狀而非錦文也治宜調中溫胃加苗香

芍藥或大建中之類其火自下班自退如胃例治一

病寒熱間作有班三五點鼻中微血出脉背沉瀉

胃萬四支按無大熱此內傷寒也問之因時發關瀉

風又渴飲水酪冰此外感者輕而內傷者重從內病

者俱為陰也故先班而後显內陰其熱間作脾亦有
之有傷寒病不當下而下之熱則乘虛入胃常下而
夫下則胃熱不得泄而成班此醫之誤也凡显班症
若自吐瀉者慎勿妄治而多吉謂和氣上下皆出也
班疹首尾俱不可大下大抵安表之藥多而發表之
藥少大便閉者微踈之令邪氣內踈也身温者順身
涼者逆也

發班屬氣

一作

熱挾痰而作自裡而發于外

一云發班

發熱之病

通聖散中消息當微汗以散之下之非理

有傷裡者因胃熱助手少陰火入手太陰肺也故紅

點如班生於皮毛間耳白虎瀉心調胃承氣從長用

之

內傷發班胃氣極虛一身之火遊行於外所致宜補以

降之 其為寒發時者當求之本門曾以
之參升麻白虎等藥治之亦効

疹屈熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦可下

者 一云七乎解散汗
之則愈通聖散

冷輝 為血風 熱用通聖散消風散有痰血搗碎用

蟬退姜蚕荆芥南星治之又用吐法

凡癰從四肢入腹者難治

外有赤遊風天蛇漢州疹癰斑其狀不同因則一也

一乳核因胎毒二腋生瘡後腹脹發赤疹如霞片以剪

刀草汁調原蚕砂什之愈

滑 治一人病傷寒衆以為瘧以用附子未決請視之

肘二手俱沉實而滑四肢覺微清以燈燭之偏躄皆
 赤斑舌黑而燥如芒刺身大熱神恍惚譫妄予以小
 柴胡加知母石膏服之朝夕三進次以大承氣下之
 而愈

附方

消風散

荆芥

甘草

陳皮

厚朴

各半

薄荷

蟬退

人參

茯苓

防風

芎藭

藿香

羌活

為末荆芥湯下二錢

消毒湯

甘黃根

羌活

川芎

藜蘆

細辛

柴胡

升麻

葛根

黃芩

地黄 黃連 黃柏 連翹 紅花

蘇木 川歸 蒼木 白木 吳茱萸

陳皮 甘草 防風 石劉水煎

又方 紫草 胡荽 紅花子 芍藥

川歸

調中湯 治內傷外感而發陰斑 蒼木半一

陳皮 砂仁 藿香 芍藥 甘草炙

桔梗 半夏 白芷 羌活 秋彭各一

川芎半錢 麻黃 桂枝各一 赤芩水煎服

小毒犀角飲子 治斑及癰疹 大丹 荆芥

防風 終二 茸 草 一錢 石劉水煎服

陽毒升麻湯 治陽毒發狂妄語面赤咽痛身斑如錦

下利赤黃吐膿血陽毒者內外結熱舌卷焦黑如烟

煤狂言見鬼面赤發斑五日可治七日不可治

六參升麻湯 化斑湯 黑膏 皆治毒與傷寒門參膏

升麻牛旁子散 治特毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於

頭面胸膈之際 升麻 牛旁子 甘草

桔梗 葛根 玄參 麻黃 連翹 各一錢

水煎服

中和湯 治特毒脉弦洪在半表半裡者

荆芥 菖蒲 牛旁午 鬼滑 川芎

防風 漏兜 甘草 麥門冬 前胡

水煎服

羌滑散 治感四時所傳肌膚發為癰疹增寒壯熱

羌滑 前胡 人參 桔梗 甘草

枳殼 川芎 天麻 茯苓 各一 蟬退

薄荷 各三 方為粗末每三錢姜水煎服

冷瘡驗方 蟬澄泡湯洗之或無名異晚蚕砂錢草煎

湯洗

○癭氣一百三 或曰癭有五多者眉項若堅或下 或者各不癭皮色不實名肉皮

筋脉露結名筋痠筋脉交結
各片膠隨憂怒消長名氣瘕

丹溪云先須斷羣味

海藻

一作

黃栢

一作健

二升

為末置掌中將心火之連咽下如消之二止藥

○結核一百四

丹溪云在項在背在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿

者是痰注不散

耳後項門各一塊

僵蚕炒

大黃

酒炒

青黛

膽星

為末蜜丸含化

頸頰下生核萬痰

二陳湯加大黃炒連起括梗柴胡

臂核作痛

二陳湯加連翹防川芎皂角刺酒芥蒼朮

一身俱是塊 塊即痰也

二陳加白芥子 研 姜炒黃連

。溜一百五

或曰瘰有六筋血肉雞冠番花粉瘤也

神應丹

蕎麥摺灰一斗如無以荆柴灰亦可內入好新礬灰

罌過一大升和前灰勻以烏盆一箇底下透一筋頭

許孔用簍器一箇會其盆內孔將前二灰放在上面

沸湯十五六椀流下灰汁下亦用瓦盆接之篋林三
次或一次忌木器乘汁復用鐵鍋於避風靜處文武
火將熬至一燈盞許再用羅過細罈灰於汁內用鐵
刀攪和如硬麪相似液入小口罐內紙封其口如乾
以小酒潤之再打結方上患處

一瘡根若根小只上根頭若根大滿身上待一日或
用刀剪去一層如肉痛或有血再上藥平即止

一粉瘤血瘤亦看根大小者止上根待一日後用刀
剪去齊根去之如頭根一般大滿身上藥待一日安
黑自若不破用針刺破擠去粉血即好

一鷄冠番花等瘡滿瘡上藥待一飯時用竹片輕刮
連藥刮下未盡再上藥量瘡存根頭好肉若筋肉留
須好肉一指遠上藥若粉瘡須存肉一韭葉許上藥
其番花等瘡不要存肉一懸上藥凡上藥上許一錢
厚如血粉番花等瘡止上一次其筋肉上三次少止
上次可量瘡大小仔細用之

十六味流氣飲

十宣散加烏藥按柳考藥
紫蘇葉三倍治瘡其境

○癘風一百六 癘音類

丹溪云大風是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風
者以其酷烈暴悍可畏耳得之須分上下氣受之則

在上血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明胃與大腸也無物不受治之者須致意者其疣瘡與瘡若上淋先見者多者在上也下淋先見者多者在下也在上者以醉仙散取血於齒縫中出在下者以再造散取惡物壅積於其道中出後用通散聖三稜針刺痠中出血夫上下同得者甚重自非醫者伸手病者鐵心罕能免此或從上或從下以漸而來者皆是可治之證人見其病勢之緩多忽之雖按法治之已愈若不絕味斷慾皆不免再發再發則終於不救也予嘗治五人其不舉者

准一婦人因貧甚無物可吃也餘皆三四年後再發

孫真人云嘗治四五百人終無一人免於舉非真人

不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦本病外又是百

餘貼加減四物湯半年之上方經行十分安愈王澐論云

三因以病風為大風惡疾者以其瘞腫左添茶毒膿

汁淋傷肩髮墮落手足指脫頭痺痛鼻翳肉爛病

勢之可畏耳故內經云骨節重攣眉墮名曰大風由

風氣與太陽行諸脈輸散於分肉之間與衛氣相干

其肉有不仁故使肌膚臃腫而為瘍衛氣緩而不行故

大而為瘻俗呼肺風乃血隨氣化也氣既不施則血

為之聚血既聚則肉爛而生虫又厥陰風木主生五

虫蓋三焦相火熱甚而刺金上衰故木來克海軍先

海火熱利氣之刺清之虫自不生也官井府湯下其

邪然亦有傳染所致者不可知用風藥必吃其所

以治之而內經用刺法使出汗涼散以瀉邪衛之
辭蓋針同發汗之義靈樞以發針刺腫上使出汗惡氣
惡血腫及乃止手和用汗出下出血之法昔用疎風
世熱之劑皆不分病之所因大抵古人治法相為參
用而不可倫發若專以房勞者慾飲食積毒所致何
由遷至於是在故州溪先生亦謂也而受得殺物之風
其治法分在上在下血氣受病多而施治用桑之
詳殆無餘蘊矣若夫用藥之外守禁忌謹調養清心
絕慾獨淡內觀又在乎人而
不在乎醫也前人戒之深矣

外科精要為諸瘡立法而不及癘風 5 為百病之長以

其殘壞膚軀去死為近比之瘡瘍治法為難乃不言

及夫八方之風因起於八方應其時則生物違其時

則殺物入之稟受素有殺氣者則感而受之如持虛

受物後又因起居飲食男女洩誠鬱氣二氣積於厥

躬脾先受之乃為溫病溫積之又火氣出焉火氣滋
蔓氣濁血汚化生諸虫以次傳歷臟腑必死之病而
有可生之理其始也胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩
傳變而漸或可藉醫之功而免謂之必死非惟醫不
知藥悉是不守禁忌可哀也

近見粗上用大風子油不知此藥性熱有燥痰之功而
傷血至病將愈而先失明矣

醉仙散

須量病人大小虛實與之證候重而急者須
先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷鹽醬
醋諸魚椒料果子煨燒炙燻等物止可淡粥及淡煮

時菜雖茄亦不可吃惟烏稍蛇菜花蛇淡酒蒸熟食

之以助藥力

胡麻子 牛旁子 蔓荊子

枸杞子 同炒紫色各一兩

山萸藥 苦參 瓜蒌根

防風 各五斤一本有大戟五斤

右為末每一兩五斤入輕粉二

斤拌勻大人每服一匙淡酒調下晨午夕各一服後

五七日先於牙縫內出臭黃涎水渾身覺痛昏悶如

醉後利下膿血惡臭殊為度

非造嚴

服之當日必利下惡物或異物或臭或膿或

虫如虫口黑色乃是多年赤色者近數日又服無虫

乃止

爵金

五才

皂角刺

黑者

大黃

包各

白牽牛

六分半

生半

為末每服半兩早晨無灰酒面東送下

牽牛

一本無爵金

丹溪治一士人因脚弱求診二手脈俱洪浮稍鼓飲食

如常懶語肌上起白屑如麩片時冬月予作極虛處

治詢之於半年前背脊腿節次生疽率用五香連翹

十宣等與之今結茄久矣令急作參芪歸朮膏以二

陳涉飲之三日後盡藥一斤半白屑未大半呼吸有

力其家反怨劫遲自作風治服青蒙石等藥子諫不

聽因致不救故書以為戒云。一人虛損身蒙刺以

四物加紫浮萍蒺藜當歸

李

治一人癘風滿面連鬚極痒眉毛脫落須用熱水
沃之稍緩或砭刺亦緩風論中癘者榮衛熱肘氣不
清故鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去
名曰癘風當刺其腫上以銳針刺出惡氣腫盡乃止
宜疎食癘飯以破血去熱升陽去痒瀉榮逆辛溫散
之并溫升之行陽明經心火補肺氣乃治之正也升
麻運翹各六分當歸全蝎地龍黃芪各三分甘草五
分人參二分生地四分桃仁三枚桔梗五分射香少
許胡桐淚一分蚕蛭去翅足微炒水蛭二箇炒令烟
盡右剉除連翹另剉胡桐淚研白豆蔻二分為細

末二味另放射蠶垂水蛭三味為細末另放外都作
一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入
白豆蔻二味并射等三味再煎一二沸服忌生冷硬
物

張

治一人癘風十餘年曰足有汗尚可治當發汗真
汗當臭涎當腥以三聖散吐之汗大吐果臭痰腥如
魚涎次以舟車丸瀦川散下五七次數服乃安。一
人病風爬搔不已眉毛脫落刺其面大出血如墨刺
三次血變色每刺自額至頤銼針上下俱刺間日一
刺至二十餘日方已

呂

治一女子病癘診其脈來疾去遲上重下實蓋得
之醉酒接內而風毒乘之今髮雖禿眉墮然鼻根幸
未陷肌肉幸未死遂以防風通聖散加以下藥下瘀
血數升及虫穢青黑等物并斲蛇長松等湯丸佐以
雄黃大風子油作膏摩之逾月差

宋洞盛云大風有丑黑色不治餘皆可治虫食肝眉落

食肺鼻崩食脾声啞食心足底穿膝胻腫食腎耳鳴

嗽耳治生瘡或痺或痛如針刺食身則皮痒如虫

行自頭面耒為順風自足起為逆風多因感寒熱與

穢濁雜氣而成治法先用雷公散

即再
達散

五錢下去惡

物積虫以稀粥養半月勿妄動作勞後以醉仙散中
間或吐或利不必怕怯但腮喉頭面腫吞不得出旋
出惡水或齒縫出臭水血絲或言不得或悶如死難
以飲食只稀粥以管吸入或一旬半月一月面漸白
而安重者又與換肌散

附方

一法桃柳桑槐猪五枝濃煎湯一大缸浸坐沒頸一日
候湯如油安矣本草治惡疾遍身生瘡濃煎萍湯浴
浸半日大効又以荆芥穗大黃拖子鬱金地黃杜仲
防風羌活獨活白蒺藜等分細末以大風子油入熱

蜜丸梧桐子大茶清下四十九日三次須守戒三
五年

一法苦參五斤好酒三斗浸一月每服一合日三次當
與不絕覺痺既安細末服之亦良丸治癰疹隱居以
酒浸飲治惡瘡久服輕身日華子以為殺虫本草除
伏熱養肝膽氣予曾以蒼茸葉為君以此為佐煮烏
蠱補蛇之或缺糊丸桐子大每服五六十丸加至七
八十九茶清下一二月而安入紫萍尤捷萍多蛭寒
月於山池取之擇淨洗泥畧蒸乾用

一法治手指挛曲節間痛甚漸至斬落用葶麻去殼黃

連劉如豆大每一兩水一升小瓶浸水漸添春夏三
日秋冬五日取草麻拍破平旦時面東以浸藥水服
一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉茹淡神効
一法治癘疾必忌鹽醬房室先刺癢中出血後服

宣風散

下出毒穢消核餅

黑丑

頭末

黃栢

二錢

巴豆肉

三錢同黃栢炒取出各一兩

右和作

一處每用一字空心姜湯下虫并惡血後服換肌片

次服此

防風

荆芥

全蝎

蒺藜

川芎

川歸

黃栢

菊花

乳香

花蕊石

醋

何首烏

蟬退

去土

雷丸

蒼朮

茯苓

各一蛇肉

酒浸去

大風子

六兩

射一字

飯丸茶清下六十丸

活血丹

第三服此藥

大風子

十斤去殼

木香

乳香

各一

射香

皂角

錢

右末加大風子加飯又搗丸如鷄頭子茶

清下五丸加至七丸至十五丸

通天再造散

比前再造散有木香朴消以酒下當利

黑頭虫出輕者小如魚腸臭穢之物忌毒食半月上

食白粥漸至眉毛皮膚如常甚者不過三二次須依

法將理不可妄有勞動終身忌牛馬驢騾雉鷄野味

糟熾化者再舉不治

芥珠丸

服此藥風毒從中出

土珠

水飛去其土分細膜晒干

青萍

七月半收晒乾

荆芥

苦參

各四兩

以皂角熬

膏丸

一分留三分粥丸桐子大茶清下六十九

一方如地

兩四

奪命丹

此藥除根

草烏

去皮尖生用

何首烏

沒藥

黃芩

禹餘糧

白羨藥

威靈仙

石菖蒲

天麻

雷丸

水浸切

草麻

去殼各一兩

牛旁子

二兩

川烏

去毛生用

荆芥穗

二兩

胡麻子

炒

赤芍藥

二兩

乳香

麻仁

大粒者二兩

全蝎

去毒

玄參

各半兩

蒼耳

四兩

射香 一錢 輕粉 三錢 白花蛇 一條 去頭尾酒浸

烏梢蛇 制同上 赤脚蜈蚣 十條去毒 右除乳香

沒藥射香石草另研外餘并同為末前六味及輕粉
并水煮麩糊為丸如桐子大每服三十九茶清下日

三服上此藥後自面至足皆痒而退色白如故

換肌散 治大風年深不差眉毛脫落鼻梁崩壞不踰

月助効 白花蛇 黑花蛇 製同 地龍 各二

當歸 細辛 白芷 天麻 蔓荊子

靈仙 荊芥 甘菊 苦參 紫參

沙參 木賊 不灰木 炙甘草 沙苑蒺藜

天門

赤芍

定風草

何首烏

菖蒲

胡麻子

草烏去皮齊

蒼木

川芎

木鱉子各兩

右為末每服五錢以酒盪量送下

愈風丹

治萬疾手麻木毛落肩脫遍身瘡疹皮膚痒

爬之成瘡及一切疥癬風疾

苦參

頭未四兩土桃蛇朱

酒浸三日

取淨晒干鳥稍蛇

白花蛇

製同上

右為末以皂角

一斤剉寸許無灰酒浸一宿去酒以新水一椀掇取

濃汁去渣良石器內熬膏和末丸桐子大煎選聖散

下七十九以粥飯壓之日三次三日浴以大汗出為

應再三日又浴大汗三浴乃安浴法用前五枝湯并

苦參丸

治大風瘡眉毛脫落子心起瘡

苦參

兩

荆芥

十六

飯丸桐子大茶清下三十九

癘風脉大而虛

苦參

七

蒼耳

大力子

酒蒸栢

各三

黃精

浮萍

各一

為末用蛇

肉酒煮如無以黑鯉魚亦可糊丸

四神丹

治大風

羌活

玄參

當歸

熟地黄分煉蜜丸桐子大湯下七十九

一法

治癘風

香藥

射至辰砂五味另研極細其木草亦另研

名曰紫花丸

各研細和勻

木香

沉香

各半

人參

一兩

當歸半斤 天麻五斤 皂角五斤 射香一斤 乳香一斤

沒藥一斤 雄黃五斤 辰砂五分 肉豆蔻一枚 定風草一斤

還童子一兩 右另為細末作一包

蛇藥

白花蛇一具去頭尾黑背白文新鱗者好 何首烏

荆芥穗 靈仙 蛇床子 紅麻黃留根節

胡麻子和 右六味什蛇浸一宿以蛇去皮骨通晒乾

仍還原酒浸曝酒乾為度研細末作一處包之

什藥 防風 羌活 甘草 細辛

川芎 獨活 蒼朮 枇杷葉 白芍藥

赤芍

白疾梨

金銀花

五加皮

白芷

苦參

絡五

胡麻子

白附子

麻黃

川牛膝

草烏

川烏川浸

石菖蒲

各二

右為細末作一處

另包

總合法

以大風三斤去殼新鮮者佳發油黃色者

不堪用磁器盛之封其口頓滾湯中蓋鍋密封之勿

令透氣文武火煎候黑爛為度杵無渣如油入上香

藥八錢蛇藥六錢什藥一兩五錢拌勻加糯米飯杵

膏粘丸如桐子大晒乾不見火每五十九雞鳴午時

臨卧各進一服茶湯送下輕者一料可愈重者三五

料斷根為度止吃時菜白粥餘物忌服免再舉

瀉藥 服前藥須先服此藥瀉出毒物惡氣又用三

稜針望肉黑處針出死血不可令出大過要損人

連翹 一糸 防風 川芎 荆芥 桔梗

柴胡 羌活 各五 芍藥 川歸 薄荷

麻黃 去根節湯泡 山柰 甘草 黃柏

黃芩 黃連 生地 熟地 各三 枳殼

石膏 滑石 各二 大黃 六兩 芒硝 一兩

右作八貼水煎空心熱服日進二服查再煎五六日

再服

○破傷風一百七

凡發痧病或損傷唇口不合風濕之為破傷風濕蘖之為破傷風也

丹溪云破傷風即生熱也風襲於痧傳播經絡病如痊

狀治同傷寒脈之無力表之太陽也汗之而愈脈長

有力陽明也下之而愈脈緊而弦少陽也和解之愈

大便秘小便赤汗不止病在裡可速下之脈沉在裡

承氣下之背後搖者羌活獨活防風甘草向前搖者

升麻白芷獨活防風甘草二傍搖者柴胡防風甘草

右搖加滑石按此傷風在考之諸書甚文豈非以此疾與中風同論故不另立篇目也惟河

間論與傷寒表裏中三法同治甚詳其言病固有因外傷於風有因灸及內熱所作者然與中風畧相似

但中風尚可淹延歲月而此症犯之多發不披蓋中
風或在經在府在藏之具惟入藏者最難治其破傷
受病血屬陰五藏之所主故風所傷始雖在表即傳
入裏故多死也又或瘡口垣露不避風寒而無所傷
或瘡口閉合密避風邪而反病此或病已安全而忽
病此者皆由氣虛而有鬱熱者得之若氣旺而無鬱
熱者雖傷而無害也而其治法與傷寒無異分別陰
陽表裏以施汗下和解之法故脈浮而無力者太陽
也長而有力者陽明也浮而弦少者少陽也宜審之

河間云破傷風者因瘡熱甚鬱結而營衛不得宣通佛
熱因之遍射故多白痧是時瘡口閉塞氣難通泄熱
甚則生風也不已則表傳於裡但有風熱微甚之殊
若風熱佛鬱在表而裡尚平者善伸數欠筋脈拘急
或時惡寒或筋惕而指脈浮數而弦宜以辛熱治風

之藥開沖結滯而愈猶傷寒表熱拂鬱而以麻黃湯
辛熱發散者也凡用辛熱開沖風熱結滯宜以寒藥
佐之則良免致藥不中病而風熱轉甚也如治傷寒
發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也若世
以甘草滑石荔頭寒藥發散之類若表不已漸邪入
內裡大甚而脈在肌肉者宜以退風熱開結滯之寒
藥調之猶傷寒半在表半在裡而以小柴胡和解之
也若裡勢已甚而古強口噤項背及張驚搐惕溺涎
唾稠粘胸腹滿塞或便溺秘結或時汗出其脈洪數
而弦也然汗出者由風熱鬱甚于裡而表熱稍罷則

脈理疎泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒藥調之熱退結散則風自愈矣凡治此證宜按摩導引及以物幹閉勿令口噤使粥藥可進也

附方

羌活防風湯

治邪初在表

防風

羌活

甘草

川芎

藥本

當歸

芍藥

各四兩

地榆

細辛

各二兩

水煎熱服加大黃七苓

防風湯

治破傷風表證未入於裡急宜服之

防風

羌活

獨活

川芎

煎調蜈蚣散

蜈蚣散

蜈蚣 一對 漂三寸 為細末煎湯下

防風散

治風入瘡口項強牙關緊急欲死者

防風

天南星 為末每三錢童便煎服

羌活湯

治半表半裡 羌活 菊花

麻黃

川芎 石膏 防風 前胡

黃芩

細辛 甘草 枳殼 白茯苓

蔓荊子

分寺 薄荷 生姜 咸半 右咬咀姜水煎服

地榆防風散

治半表半裡頭微汗身無汗禁發汗

地榆

防風 地燈草 馬齒莧 為末湯下

大芎黃湯

治破傷風小便赤自汗不止

川芎

羌活

黃芩

大黃 等分 水煎服

江鱧丸

治破傷風驚而發搐臟腑秘塞知病在裡

以此下之

江鱧 剉燒 野鴿糞 炒半兩

雄黃 一分

姜蚕 半兩

蜈蚣 一對

天麻 一分

只用前四

味名左龍丸

右為細末分作三分將二分燒

飯為丸桐子大朱砂為衣將一分入巴豆霜一錢同

和亦燒飯為丸不用朱砂為衣每服為衣者二十九

入巴豆者一九第二服二九加至利為度其為衣藥

服至病愈止

白木防風湯

治服發表藥過有汗者

白朮

黃芪

各一兩

防風

二兩

右用水煎溫服若臟

腑和而自汗者可服若大便秘小便赤宜大芎黃湯急下之

白朮湯

治破傷風又汗不止筋脈為掣

白朮

葛根

各二兩

升麻

黃芩

各半兩

芍藥

三兩

甘草

二錢

右剉每服一錢水煎服之

養血當歸地黃散

治病日久氣血虛邪氣入胃宜養

血

四物湯加防風白芷藁本細辛水煎服

○百藥中傷一百八

脉法

脉微瀯而疾者或洪大而遲者可治微細者不

治

解毒丸

治食毒物救人於必死

拳藍根

四兩貫衆去土

青代

甘草

蜜丸青代

為衣

又方

解諸藥毒及山嵐瘴氣米肉魚麩菜毒水腫熱

毒傷寒遺毒小兒班疹并一切執毒喉痺急證壅腫

等毒

黃柏

貫衆

茯苓

板藍根

乾葛

生地

雄黑豆

甘草

活石

宿砂

陰地厥

消荷各二兩

益智

大黃

寒水石

紫河車

馬勃

龍膽草

白姜蚕

百藥煎 山施各一 蜜丸每兩作十九細餅一丸新

水下一云宜加黃連白芷

又解毒丸 解一切毒 蠱毒鼠毒河豚魚毒菌毒後死

牛馬肉毒 喉痺骨腴 蜈蚣蜂蝎螫刀斧湯花傷并花

水磨下并塗傷處 婦人鬼胎氣積塊虫積心胸痞悶

腹肚彭滿並好酒磨下 射乾 石膏

文蛤 杏仁 續隨子去虫油 金線重樓

土朱 大戟 山豆根 山茨菰 白藥子

大黃蒸 射香二錢 青代 滑石 百草霜

蘿蔔子醋浸 木香 灵仙 白芷各一 黃連

風化硝

各半

糯米糊丸彈子大青黛滑石為衣

此方

續隨子 甘草

五倍子為末茶清下

一按

治諸毒

五倍子二細末酒下在上則吐在下則泄

地漿水

解諸毒煩悶山中有毒荷誤食之令人笑

不依此不效

治中毒

白礬末 芽茶末 冷水調下

解附子毒

新汲水飲之

預防蠱毒

白養荷為俎常服之並不過毒

香油解一切毒河豚魚毒尤妙

砒毒

漢椒九立 黑豆十四 烏梅二千 甘草節二

水一椀煎七分溫服

又方

白扁豆青代甘草巴豆去殼不去油為末

以砂糖一大塊水化開調一大盞飲之毒隨利去却

服五苓散

又方

新刺羊鷄鴨血熱

又方

地漿調鉛粉末服之

又方

早未釋灰汁冷服一盞利下即安

又方

藍根砂糖搗水服

解諸毒

黃連甘草節水煎服

鼠莽草毒

大黑豆煮汁食之

解諸毒

玉簪花根研水服或生甘草黑豆淡竹葉

煎服

烏頭天雄附子毒

大豆汁遠志防風棗肉飴糖並

解

巴豆毒

黃連火豆萹蒲汁並解

河豚魚毒

清油灌之吐為效

○犬咬一百九

春冰夏初犬多發紅者其尾必直下不卷起口滿涎古黑色也狂

犬也傷之若不急治必死

獾犬咬

急於無風處啣去瘡口血或孔乾則針刺

去血小便洗令淨以胡桃殼十片裡空人糞實之搗
瘡上文灸三七壯急用蝦蟇乾一枚班毛二十一个
去頭翹足同糯米炒黃去米為末酒調或水調服之
分四服瀉下惡物為度未下惡物再服又宜常服韭
汁一盞或生地黄地榆取汁皆可常服敷藥以虎骨
末石灰臘猪脂調付禁酒猪肉魚曰肥膩終身忌大
肉蚕蛹

治法

無出於炭七日當一發過三七日不發可免百
日可全兔如見痛定瘡合便為好而不治必死

一方

防風 二斤

地榆 六斤

甘草 二斤

杏仁 三斤

雷天

分為三服水煎

風犬咬

香白芷

蝉腿各五兩

為末酒調盡飲之服

後尚有黃水從瘡口中出如未再服以水出為度咬

處白頭蛆蚋搗盪上外使火炙之口乾

凡風犬咬者頂上必有紅毛可拔了服後藥

班毛

去翅足

糯米一拌

右同炒以糯米半黃為度出火

毒去米為末作二服用韭葉根姜汁調空心服當利

下惡物如葡萄肉壯為驗

一云利後腹痛急用水調

水亦可忌食熱物

顛大傷或經久復發無藥可療者

雄黃五子

射香 五分 研勻酒下二錢如不能服則熱其鼻而嚏
之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利惡物
再進前藥

治狗咬 杏仁去皮尖 馬蘭根杵細盪之先極湯洗

常大咬 急於無風處嚼去瘡孔血如乾用針刺出

血小便洗淨以熟牛糞付之或猪 調嵐糞末付之

或韭汁和石灰杵成餅子陰乾為末付或杏仁熬黑

研付更以生地黃地榆生 云各取汁服虎骨灰付亦

可

○蜈蚣咬一百十

