

卷貳

卷叁

卷肆

卷伍

肩部 手部 腋部 乳部 胸部 肋部

心部 肺部 氣痛 咳嗽 吐血 哮喘

脾胃 痰疾 三消 積滯 噎膈 嘔吐 呃逆

肚腹 痞疾 蟲疾 鼓脹 脇部 背部 腰部

驗方新編

貳

驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癰癤

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疔

甲疽

又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手丫枝痛不可忍

手指觸着衣物痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鉄

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛
手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部 肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下癭瘤

乳部

乳頭破裂

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰多至二三百頭者

乳癰日久腫痛不愈

手足生瘡久不收口

腋下疔瘡 音隔答

腋下狐臭

乳上生瘡

乳癰

乳癰腫及頭面

乳癰久不收口

乳岩

婦人乳忽縮入

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

胸部

無子食乳腫痛難消

胸膈閉結不通

胸滿腹脹

胸前生孔

胸旁生瘡

龜胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

或久不愈

驗方新編卷之二

肩部

擔肩癰癤 此惟擔夫有之

五棗子 燒存性 爲細末加黃丹 用水飛過 醋調敷之甚效 又方

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

心胃蟲疾作痛

酒食凝滯攻衝作痛或有形或無形鄉人稱為穿心

箭痛

咳嗽

胸膈脹滿 咳嗽不止

咳嗽氣喘

諸般咳嗽

肺痿咳嗽

寒咳

咳嗽嗆逆落枕即發

童子熱

大熱蟲

咳嗽痰喘

咳嗽氣喘遇寒即發

肺虛咳嗽

咳嗽痰血

熱咳

年久咳嗽

咳嗽嗆逆

久嗽連至四五十聲者

年老久嗽不能臥

咳嗽聲啞

小兒晝夜咳嗽食少髮黃

勞傷吐血

吐血治法

勞症諸方

治法愚寒喘發

咳血

咯血痰帶血絲

驗癆蟲法

次癆蟲法

治癆蟲法

童子癆

哮喘喉內有聲而氣喘者是

治哮喘妙法

驗方新編卷四目錄

脾胃

為惡心吞酸

涼藥服多嘔吐惡食

胃腕冷滯

脾家冷積食後胸滿

胃寒嘔吐黃水

痰疾

中痰氣絕

茯苓丸

胃口虛脹手足厥冷

胃口虛脹手足厥冷

冷水服多

脾胃虛冷不思飲食

胸胃積滯

胸胃積滯

下痰丸

下痰丸

痰氣結胸

痰飲吐水

痰疾癩狂

癡笑不止

羊顛風

增補痰迷譫

方語

三消

渴而飲水不止為上消飲水多而作瀉為下消多食易飢為中消

消渴飲水不止

多年消渴飲水百藥不效

飲水不止小便如膏

飲水不止小便時流

久病消渴不止

消食易饑

不想飲食

腹中易饑食下片時即吐

飲食積滯

胃口呆滯

飲食積外治法

飲食凝滯作痛

飲食過多脹滿不安

魚肉積滯

食魚積滯

生魚積滯

食犬積滯

食牛積滯

食鴨積滯

鴨蛋積滯

雞蛋積滯

食整煮雞蛋積滯

食鹽蛋積滯

食索粉涼粉積滯

食瓜果腹脹作痛

食西瓜並諸瓜過傷

食荔枝腹脹

食菱角腹脹

食豆不化

食麩不消

糯米積滯

飯食凝滯腹痛

食茶成癖

食積痞塊

噎膈

噎膈諸方

傷寒膈食

膈食初愈飲食宜少

反胃嘔吐

上吐下瀉

一二日一吐氣味變酸

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化

朝食暮吐暮食朝吐

饑餓嘔吐

乾嘔不出

酒後乾嘔

食物下喉卽吐

見食卽吐

食後少頃卽吐

嘔物不化

嘔吐清水

欲嘔而不嘔

口吐白沫谷嘔而不出
谷嘔而不吐而食不化

聞藥卽吐百藥不效

嘔吐不能服藥必有虵在胸膈

脾胃虛弱食不消化

嘔吐痰水

呃逆

偶然呃逆

氣熱呃逆

陰寒呃逆

體虛常呃逆二三聲

呃逆日久不愈一連四五十聲者

傷寒論方

傷寒論方

飲食初愈飲食宜少

反胃嘔吐

頭暈目赤不愈一連四五十數

斜寒刺散吐或三四五如蠶溫常刺散二三變不化

脾熱刺散吞食朝吐
原熱刺散

頭暈不出

泄後乾嘔

脾胃虛弱食不消化

脾泄熱水

開藥噴吐百藥不效

脾泄不消則藥必育也

驗方新編卷五目錄

肚腹

腹痛辨症

陰症腹痛

寒症腹痛

肚腹畏寒

熱症腹痛

虫疾腹痛

大人小兒腹中疝疾蟲疾作痛及男婦痞塊癥瘕各

項肚腹脹痛

食滯腹痛

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便

短澁渾身絀緊手足腰膝僵硬不省人事

忽然肚脹如鼓

腹中緊脹

肚腹麻木

忽然肚黑

肚腹脹大亮如水晶

臍眼出膿

臍中出水

臍眼出血

肚復堅硬臍眼出虫

肚腹左右生癰

肚臍生癰

小腹痛

小腸疽

臍下二三寸關元丹田二穴冷結小腹有形作痛

腹胃中癢不可忍

增補治疝古方

痞疾

治痞諸方

腹中堅如鐵石痛如刀割

腹中堅如鐵石臍內出水變作虫行之狀繞身作咳

痛養難忍掃撥不盡

婦人血蠱

髮癥 好飲清油者是嗽中
如有虫上下亦是

米瘕 好食生
米者是

肉瘕 常喜食
肉者是

虫瘕

蛇瘕

龜鼈瘕

蛇龍瘕

腹脹面黃

蟲疾

寸白虫疾

蛭虫上出口鼻

鼓脹 附浮腫

鼓脹辨症

治水鼓法

水鼓小便不通

日滿開鹽法

治氣鼓法

治血鼓法

各種鼓脹

食物積滯腹脹如鼓

肚腹脹滿飲食如常

十種水腫

通身浮腫

病後浮腫

脇部

兩肋之下為脇愚人多有以肩甲下為脇者不可不知

左脇有聲作疼嘔水

左脇鬱氣寒痛

怒氣動肝寒熱旬日左脇凝聚作痛難以舒轉

左脇作痛

右脇有形攻心作痛嘔吐清涎週身寒凜痛止則無

形跡

右脇脹痛不食

肝燥脇痛

兩脇不時作痛

脇痛連腰脊不能轉側

脇痛腸出臭穢

脇下漏瘡形如牛眼

兩脇脹滿

背部

發背治法

背癰諸方

背熱如火

腰部

腎虛腰痛

閃跌毆打腰痛

腰腿風溼冷痛

男婦腰痛如刺面腫面黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕

痰涎腰痛不能行

各種腰痛

纏腰丹

腰痛牽心氣絕欲死

腎虛腰痛脚軟

脾濕腰痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一個

目赤腹無

八字文者忌用

破去腸雜

不可破胆胆汗沾指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並

將蝦蟆心肝焙枯研末冲酒服以免毒氣攻心約一對時

破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如針刺痛更難忍甚至

心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散

見癰毒諸方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心自安定蝦蟆能拔極重

惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘

誤將蝦蟆揭去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦

不必驚慌用高麗參三四錢以砂礮煮濃汁服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃厚易見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若再腫痛此毒氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃膿盡卽不再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視 又方

鳳仙花

下半截連根用不用水洗

和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡腫

大如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦蟆方尤

爲神速

又方

用磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛

拔毒治之

見癰毒諸疾疔瘡門

止痛消腫最爲神效

又方

蜈蚣

焙枯

爲末猪胆調搽神效

又方

鷄蛋一個穿一小孔入砒

石壹分

套指頭上熱則再換立刻止痛如神真仙方也較

前各方功效更大

又方

雄黃

枯礬

各等分研末

用麻油或醋敷亦極效驗

又方

白蘿蔔挖孔入雄黃

叁分蒸半熟套指上或用真烏梅仁嚼融敷之均極效驗

又方

如色白者照後脫骨疽陽和湯各方治之

脫骨疽

此症生手足各指

或云只生手足第四指者是

或生指頭或生指節指

縫初生或白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟

紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑

陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用頂

大甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不

可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用金銀

花元參各叁錢當歸貳兩甘草壹兩水煎服一連十劑永

無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要又方

大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸均見陰疽諸方

色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之

方也又方甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷數日

必愈神效

甲疽又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒壹

兩黃芪貳兩醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取貳兩絞

去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也 又

方 乳香 胆礬 研細時時敷之此病須剔去甲不藥

亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效 又方 皂礬五錢火煨

候冷研末先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之舊紬裹定一日一

換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼痛 又方 陳皮

濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外用

蛇退燒灰雄黃壹錢為末乾糝或香油調敷 又方 輕

粉 乳香 沒藥各壹錢 黃丹貳錢 赤石脂五錢 寒水石叁錢

煨 其為末濕則乾糝乾則油調最妙 又方 甘草嚼融

厚敷乾則隨換數日全愈神效 又方 見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上削去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花又名指甲花連根蒂葉搗敷指甲上用布包好一日一換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰查藥物備要便知和銀硃共搗擦之若遲延不治必生蛇

頭蛙節等疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核有鹽者煮去鹽味用切兩段醋磨雞毛蘸搽二十日後漸

消

指節生瘡

名曰蛙節生黃豆嚼融敷須先漱即愈

指甲下生瘡

名曰蛙甲治與上蛙節同

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身緣毛

此名血餘症用

赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半

煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早

治卽爛全手

大指二指間爲虎口又名義指

生蒲公英搥融敷之數日卽愈

又方

生黃豆嚼融敷

將口漱淨再嚼甚效

又方

通草爲末用鷄蛋清調敷其腫卽

消

又方

白芨

叁錢研末

蟾酥

壹錢

共和雞蛋清搽神效

又方

白芷

滑石

黃丹各等分研極細末敷之神效

手了枝痛不可忍

通草研末生雞蛋白調敷卽愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自好
倘一經抓擦則綿纏難愈用白芷 黃丹 滑石各等分
研極細末敷之神效或用玉真散見跌打傷門敷之亦極效

手指斷落

方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門

手指及掌生黃白濃泡痛癢無時纏綿不已內必有

蟲

豬肝切片和桃葉搗融敷之神效或用白油膏見腿貼之
更妙

手指手掌皮厚如鉄

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用
生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切
不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉壹分

貼之必愈 又方 白鹽 花椒 等分醋和敷之未破者極效已破者勿用 又方 塘鷄糞敷之或用鮮桑葉搗敷均極效如腫而不紅又不甚痛者照卷十一陰疽各方治之爲要

鷺掌風

生手掌上紫白斑點疊起白皮堅硬乾燥甚則疊疊脫皮血肉外露或癢或痛久則成癬難愈用一大碗以紙緊糊碗口帛上用針刺破多孔上鋪細米糠二三寸厚手箔燃炭放糠上緩緩燒之燒至離紙三分光景將炭與糠一併棄去不可將紙穿取碗中糠油時時搽之數日斷根屢試神效有人患此

筋肉現露十餘年不愈照此醫痊永不復發 又方 真

小磨麻油 壹兩 紅砒 壹錢 敲細入油煎至砒枯烟盡為度

去砒留油冷透火氣用火烘油擦三五次十日即愈血寒

者最宜此林屋山人極驗方也 又方 鉛彈子 貳個如核桃大

每日在手內搓弄搓熱將鉛彈子握緊晝夜不歇如此十

餘日即愈愈後再搓二三月則不復發

手腕生物如豆紅紫疼痛

治法見卷十一癰毒門葡萄瘡內

手臂生瘡腫大如拳

以小刀畧破其皮 或用麝毒散 敷之即破 真硼砂 上水

片各壹分輕粉五厘為末糝之即化為水而愈矣

熱毒攻手腫痛欲脫

猪油和羊糞塗之或水煮馬糞洗之

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解

漏蘆酒浸一夜焙乾研末每服貳錢酒調下頗效

手足作痛

手足痛人以爲脾經之熱不知非脾也乃肝木之鬱結也

散其鬱氣則手足之痛自去用逍遙散見內外備用諸方加梔子

參錢製半夏各貳錢白芥子各貳錢水煎服二劑其痛若失蓋肝

木作祟則脾不敢當其鋒氣散於四肢結而不伸所以作

痛今一旦平其肝氣而脾氣自舒脾舒而痛在手足有不
盡除者乎

手足生瘡久不收口

取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火煨化研細
末加冰片少許糝之即愈或照癰毒門瘡不收口諸方治
之

小兒手軟

薏苡仁 當歸 秦艽 酸棗仁 防風 羌活

錢各五共

為末蜜丸芡實大荆芥湯化下

腋部 肩下卽是

腋下腫硬形如鴨蛋

色紅者照癰毒各方治之皮色不變者照陰疽各方治之

腋下疔瘡

音隔答

如豆如米或麻或痛恐是疔瘡查疔瘡門辨別治之

腋下癭瘤

治法見癭瘤門

腋下狐臭

用蒸餅一個劈作兩片放蜜陀僧細末壹貳錢急夾在腋下畧睡片時候冷棄去如係一腋狐臭只用一片夾之有

人患此二十餘年照治斷根屢試不爽 又方 頂大蜘蛛

一個或用小蜘蛛黃泥包好火內燒紅取出候冷去泥

加輕粉壹錢共研末日搽數次輕者二日即愈重則三四

日必斷根較前方尤簡便神驗百發百中 又方 蜜陀

僧 潮腦各四兩 枯白礬貳兩 輕粉叁錢 右為細末頻擦兩

腋擦至半月見效不可間斷半年全愈 又方 射香壹分

胆礬貳分 水粉叁分 取田螺貳個 將靨音掩起開以各藥入

螺中過一夜螺肉即化為水將水擦腋下其臭從大便出

宜埋土內恐人聞則頭眩暈也此方極效不可輕視

乳部

乳頭破裂

胭脂和蛤粉用水調敷

又方

鷄屎白炒研每服

壹錢

酒送下三服即愈

乳上溼瘡

男女乳上溼瘡膿血淋漓成片痛癢不休此名火革瘡用

蚌殼

五錢

輕粉

五分

冰片

壹分

共研末用銀花煎湯調搽

兩三次結痂收功或照癰毒門溼瘡黃水瘡

各治之

乳頭生瘡痛不可忍

生鹿角

叁分

生甘草

壹分

共研末用鷄蛋黃

壹個

入藥攪

勻置銅器中炙溫敷之日二次即愈神驗非常

乳癰 紅腫疼痛者是 男女皆有此症

炒白芷 製乳香 製沒藥 製法見藥 物備要門 浙貝 歸身 各

等分研末每服五錢酒送一服全消如已潰爛用醒消丸

酒送一服以止其痛外貼洞天膏自愈如色白者照流注

治法倘潰爛不堪者以洞天救苦丹按法與服七日後接

服大棗丸收功此林屋山人秘法也醒消諸方見癰毒門

又方 生蒲公英搗爛冲酒服渣敷乳上畧睡片時數次

即愈此為乳癰聖藥屢著神奇不可輕視 又方 豆腐

店棹上做豆腐淋下之水一桶入鍋熬乾成膏冷透火氣

厚厚敷之乾卽再敷乳上結塊自消五七次必愈屢試神
驗有人借貸五百金無力歸還以此方神效奉贈後試之
果驗人稱之五百金方此方雖治乳癰旣稱乳上結塊自
消則乳岩似亦可治 又方 並治乳吹 葱連根搗爛
敷上用瓦罐盛炭火蓋葱上一時蒸熱出汗卽愈穩而神
效

乳癰多至二三百頭者

柳樹根刮去皮搗爛蒸熱布包熨之冷則隨換過一宿卽
愈此孫真人千金方也

乳癰腫及頭面

照卷十五瘟疫門大頭瘟蚯蚓方治之其效如神

乳癰日久腫痛不愈

蝦醬用好醋蒸熱敷之諸藥不效者治之奇效

乳癰久不收口

用茅屋上陳年舊茅草剪尾一束研末加頂上梅花冰片
少許敷患處愈

乳岩 男女皆有此症

此症乳內生一小粒初如豆大漸大如塊如棗如圍碁子
不癢不痛至一年後或二三年漸漸腫痛臭爛孔深亦有
初起色白堅硬一塊作痛此係陰疽最爲險惡因哀哭憂

愁患難驚恐所致急宜早治遲則難愈初生月屨黃丸

服叁錢

酒送十服全愈或以陽和湯加土貝

五錢

煎服數

日可消倘悞貼膏藥必漸腫大內作一抽之痛已覺遲治

倘皮色變異難以挽回勉以陽和湯日服或以犀黃丸日

服或二藥每日早晚輪服服至自破而痛者外用大蟾即

蠟六隻每日早晚取一隻破腹刺多孔連腸雜去胆貼於

患口以拔其毒一日一換連貼數日若爛孔深大須將蟾

腹腸雜填孔每日用葱湯溫洗一次內服千金托裏散三

日後接服犀黃丸可救十中三四乳岩最不易治此方極

爲穩妥古來名方皆不及此若破後不痛而癢極者無一

毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一活一婦兩乳皆患乳岩兩載如桂圓大從未醫治因子死悲哭形大如盃以五通犀黃丸每日早晚輪服九日全消又一男子亦患乳岩因用鯽魚膏貼上兩日發大如拳色紅令其揭下與服陽和湯四劑倘色轉白可救色若仍紅無益矣四日患色仍紅哀懇求治以犀黃丸陽和湯輪服至十六日四處皆消獨瘡頭破爛用蟾拔毒之法半月收功又一婦患乳巖寒熱痛甚余以陽和湯同二陳湯煎服止痛安睡連進三服全愈又一婦患亦相同其弟以夏枯花粉連翹橘葉等藥連服五劑號痛不絕余視白色已變微紅難以全消

卽用肉桂炮姜麻黃加二陳湯煎服服下痛止瘡亦縮小

連服數劑瘡頂不痛而破貼陽和解凝膏收功此林屋山

人治驗秘法也犀黃丸諸方見陰疽門又方已潰爛者用

洞天救苦丹見癰毒諸方每服叁錢陳酒送下隔兩日一服數

日膿盡收功神效或用陽和解凝膏貼之或用蝦蟆散見同

前或照上蝦蟆拔毒之法俱極神效又方如初起者

用夏枯草蒲公英漏蘆橘葉雄鼠糞兩頭尖者是

甘菊貝母紫花地丁山慈菇連翹白芷栝

萁仁炙草廣皮茜根乳香沒藥銀花各貳

錢研末另用夏枯草熬膏和勻爲丸如梧子大每服五

錢滾水送下至重二服全消屢試神驗此王晉三經驗方也價廉易製貧寒之家最宜

男子乳忽壅腫如婦人乳

金銀花

蒲公英

各壹兩

花粉

白芥子

各五錢

製附子

木

通

各壹錢

柴胡

貳錢

白芍

通草

梔子

茯苓

各叁錢

水煎服

婦人乳忽縮入

急用兩手緊緊抓住取公鷄一隻約重十兩內外連毛破

開去腸雜加真射香

壹錢

入鷄腹內覆肚臍上即愈

婦人產後兩乳伸長細小如腸垂過小腹痛不可忍

川芎

當歸

各四兩

瓦器煎水時時服之另用

川芎

當

歸各壹斤

切大塊於爐內慢火燒烟安病人面前卓下務使

烟氣不絕令伏卓上將兩鼻及兩乳常吸烟氣如藥盡未

痊仍如前法煎服燒熏必安如藥已用過二料兩乳雖縮

上而不復舊用冷水磨葶蔴子壹粒塗頭頂心俟乳縮卽

時洗去

婦人乳吹

時時吹氣有聲

硃砂筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等字於本婦所

戴簪上

本命所屬之字不寫

戴之卽愈於初起時用之最妙 又方

照上乳癰葱蒸法治之

婦人乳孔塞痛

參看婦人科產後擠乳頭方

用核桃肉數顆搗碎滾酒冲服即愈

婦人乳汁不通

貝母 知母 牡蠣粉 各等分爲末用猪蹄湯調服貳

錢即通此秘方也 又方 鮮蝦壹觔 去皮鬚足用肉不

拘多少淨磁器內搗爛陳酒熱服盡量飲之少時有乳再

用猪蹄湯飲之日飲幾次乳如湧泉效驗如神但蝦止服

一次猪蹄湯可以長服 又方 內服前藥外用木梳梳

乳周回百餘遍即通

乳汁自流不止

此虛極也宜服十全大補湯見內外備用諸方 或請名醫調理

乳多發脹

紅花

歸尾

赤芍

牛膝

各壹錢

煎服即愈

無子食乳腫痛難消

麥芽

壹兩炒

川芎

壹錢

當歸

白芍

各叁錢

生地

貳錢

煎服即

消

又方

麥芽

壹兩炒

煎水

當茶服

即止

又方

用本

夫穿過包脚布敷乳過夜腫消痛止而愈或本婦現穿之

鞋包乳上過夜亦消

... 各等分爲末用... 煎服

... 土硫黃

... 又方 鮮蝦... 皮... 是... 肉...

... 煎水當茶服... 又方

... 煎水當茶服... 又方

... 白芍... 煎服

... 煎服

... 煎服

... 煎服

胸部 與心脾各部參看

胸膈閉結不通

按之極痛或通而復結氣喘煩燥狂亂而熱極者取

生

蚯蚓

又名曲蟥

四條洗淨研如泥入生姜汁薄荷汁

各壹茶挑

蜂蜜

半酒

井水調服若熱甚者加真梅花冰片壹貳分服再揉

心下片時汗出而愈神效如因寒熱痰痞水食結胸者照

卷十四傷寒門葱姜熨法最妙如因飲食積滯結胸者查

卷四飲食積滯門外治法治之若痰氣結胸查後疫疾各

方治之

煎香用

蒼朮

日兩錢熟存性

話

四兩

胸滿腹脹木煎到木來煎土煎出甚至良面黃腹衣

此脾土衰弱肝木氣旺木來尅土故也甚至身面黃腫亦

有不黃腫者用 蒼朮 貳觔淘米水泡壹日兩夜燒存性 甜酒麴 四兩燒存性

皂礬 壹觔醋泡晒乾入瓶內煨存性 加平胃散其為末醋為丸如梧子大

每服叁四十九酒下 米湯亦可 日服兩次神效此仙方也

胸前生瘡

有人胸生一孔咳嗽則與此孔相應隨有膿血流出此肺

痿也用 黨參 生黃芪 當歸 金銀花 各叁錢 生甘草

連翹 各錢半 官桂 壹錢 煎服數次自愈

胸旁生瘡

凡大人小兒胸間兩旁各生紅白瘰泡濕爛疼癢每處直

長一條連生十餘個不等名曰簾珠倒掛久則難治諸藥不效用端午日人家簷口所挂菖蒲連根葉切碎瓦上焙枯研末香油調搽五六次卽愈屢試屢效

龜胸

龜尿時時擦之久久自平龜尿難得以鏡對龜照之尿自出也

取不見效者以珠香照之亦效
此各藥並宜藥無效者用
此各藥並宜藥無效者用

馬方新編
卷二

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

此名淵疽症百藥難效惟用

隔蒜灸法

見癰毒通治門

在兩小

腿陽陵泉穴

穴在膝下外邊壹寸以腿縮攏有壹窩卽是

各燒七下或十四下

卽愈如不見效色紅者照癰毒方治皮色不變者照陰疽

方治

此症多由濕熱毒氣入於皮膚... 治法... 凡患此症者... 宜用... 藥材... 煎服... 功效... 凡患此症者... 宜用... 藥材... 煎服... 功效...

驗方新編卷三目錄

心部

心氣疼痛

心痛喉腫閉目不語

心氣怔忡

心胸煩滿

水停心中有聲如雷口眼歪斜不省人事

心膈飽脹腹中又飢又痛

心中嘈雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止

或兼噯氣或兼惡心

一切寒熱痰痞水食結住心胸

心下堅大如碗邊如旋盤

心疼忽長肉一條手不可近

心口生疽
心窩成漏

肺部

肺癰

各種氣痛

心胃氣痛

銀黃散

失笑散

走注氣痛忽有一處如打撲之狀痛不可忍走注不

定靜時其處冷如雪霜

香鬱散

姜附散

腎氣上衝心痛不痛

部 欵冬花

天門冬

去心

廣皮

枳壳

各壹兩

甘草

八分

用水煎汁去渣再熬成膏每早空心滾水調服甚效

又

方 大雪梨

四個

老姜

四兩

同搗取汁蜂蜜

四兩

黑豆

壹升

炒

研末乘熱和勻七蒸七晒不拘時服

又方

酸醋和

水煮鯉魚不用鹽送飯食

又方

猪板油蒸南棗去棗

皮惟食棗肉早晚吃叁五個數日而愈

久嗽連至四五十聲者

生姜汁

半杯

白蜜

貳匙

同放茶碗內滾水冲温服叁四次

而愈或用前紫蘇冲蛋方最效

年老久嗽不能臥

馬... 心部 與胸及脾胃各部參看

心氣疼痛

方見後各種氣痛門

一人心痛喉腫閉日不語

方見咽喉門

心氣怔忡

龍眼核壹斤即桂圓核

去黑皮長流水煮極爛加大黑棗

壹斤

去

核搗爛如泥為丸每晨淡鹽湯下叁錢即愈

又方

焦

白朮時時煎服極效有人心忡百藥不效後一名醫云是

脾虛常服白朮自愈試之果驗白朮多食橫中滯氣惟用

荷葉包裹久蒸或用蜜炙則可服也 又方 續豬心割

者為蒸熟切片蘸真硃砂少許飯後食之三五次即愈硃

砂不可多服 又方 白蓮肉去皮煮食久之自愈

貝心胸煩滿

一人心胸煩滿兩年不愈後服 雄黃五錢並飲清油半

碗吐出一蟲而愈

水停心中有聲如雷口眼歪斜不省人事

胆礬壹分為末温甜酒送下以吐盡痰為度 又一婦人

心胸脹悶口流涎沫自言心中有聲如雷亦服此葯吐出

一蟲斷之乃一髮也 又一人患此服胆礬不效後服

雄黃 五錢 清油 半碗 吐出一蟲而愈

心膈飽脹腹中又飢又痛

胡椒 七粒 研末好酒冲服即愈

心中嘈雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止

或兼噁氣或兼惡心

乃火動其痰也 焦朮 四兩 川連 五錢 橘紅 壹兩 共為末

神麩煮汁為丸如菉豆大每服五十九食遠姜湯下立效

又方 猪護心油蒸糯米食之即愈

一切寒熱痰痞水食結住心胸

見傷寒門葱姜熨法

心下堅大如碗邊如旋盤

此名氣分乃飲水所結也用

白朮

四錢

枳實

貳錢

煎服

心疼忽長肉一條手不可近

此腎火也

真礪砂

真梅花冰片

各壹分

點之立化爲水

內服六味地黃丸貳料全愈並用吳萸研末醋調敷兩足
心過一晝夜一換敷至數日爲止

心口生瘡

此名井泉疽又名慢心銳毒初起若心口內有塊漸大心
口發高毒陷卽死醫皆縮手諸書亦無藥治之法惟余家

秘集載以本人兩手十指以線量其長短共有若干積於一線放喉管正中處雙環至背脊之中看兩線合攏盡頭處爲中穴又以本人中指之中壹節用竹片量準作壹寸放在中穴之左右各遠壹寸各以墨記分立三穴如_中形也

心窩成漏

一人胸口一片如碗大無皮潰爛成漏膿血時流經久不愈用 葶薺磨成粉糝之數日卽愈神效非常

愈用 等費極如餘錢之數且明愈極效非常

一人聞口一狀收藥大無效竟離氣滿血枯流汗入不

小醫新編

出

病前穴爪及參團壹齊火炎炎畢全愈此林墨山人等代

列并中穴之空山各數壹寸各以墨指長立三穴取力并

風濕中穴及以木人中計之中壹指用竹中量準并壹寸

懸效難管五中裏雙影至背脊之中清兩縣合龍壽服

小藥補以木人兩手十許以懸量其身感其有竹下藥

肺部

肺癰 又名肺疽與咳嗽門參看

諸患易識獨肺中患毒難知有人秘傳兩脚骨疼痛者或脚骨不痛而舌下生如細豆一粒者再心口之上內微痛或兩脇微痛及咳嗽口渴喉乾此皆肺中生毒之證也卽用甘草桔梗各叁錢煎服服下如覺稍安肺之患毒無疑矣以犀黃丸見陰疽門服至一料全愈此是預識預治百無一死世人但知脚痛醫脚咳嗽醫嗽舌下一粒便以刀刺且此一粒癰未成膿定然色淡癰愈亦消重則其色紫黑如用刀刺立害諸書皆云口吐臭痰胸中發腥作痛者肺癰

也又稱症有三不治時吐臭痰久如硬米飯者不治嘔膿
不止者不治白面變赤者不治惟嘔而膿自出者易治治
之之藥惟地黃保生歸脾等湯輪服而已並無預知早治
之法直至吐臭痰發腥始知肺癰猶小舟飄入大洋也此
等立論安可爲後學津梁余每見此症吐膿膿色皆白用
犀黃丸治無不效貧寒不能治藥者用陳年醃芥菜滷每
早取半杯用豆腐漿沖服服後胸中一塊塞上塞下塞至
數次吐出惡膿數日膿盡自愈神效凡患此症者終身戒
食鴨蛋白鯢紅蘿蔔石首魚著甲魚食則復發難治此林
屋山人秘法也 又肺癰腸癰皆吐臭痰用棉花捲竹片

頭只壹個 又方 薏苡仁各炒爲末糯米湯調服或煮

粥或水服當下膿血而安 又方 竹葉絞汁壹盞服之

吐出膿血自愈 又方 元參半斤 天冬四兩 桔梗貳兩

炙草壹兩 水十碗煎至兩碗另加 蒲公英 金銀花各五

錢 再煎煎至壹碗食後卽服初起卽消日久卽愈極效無

比 又方 生茛炒 白芨 銀花 桔梗各壹錢 苡仁五錢

貝母壹錢 陳皮六分 甘草節各壹錢 甜葶貳分 葶炒八分 生薑壹片

水貳鍾煎半食後徐徐服初起者去黃芪加防風壹錢 久

不愈者加槿樹皮壹錢 未成卽消已成卽潰已潰卽愈其

效如神

神效如神

立效

未如鳴笛

与如鳴笛

与如鳴笛

水煎服前中介對谷翁煎取味香去黃芩味初服
貝母六錢刺史甘草倍方
枯草康
此方
白芨
驗方
淋懸
各壹
苾寸
正幾

再煎煎至壹碗食對四碗時吐唱前日入拍愈效現

水煎壹碗水十碗煎至兩碗長服

世用麴曲自思
又方
天參
淋懸

水煎水煎當才驅血而安
又方
付藥露打壹盤別之

處良壹碗
又方
蒸透寸各少氣未辭米甚開煎如蒸

上煎出濕火對本人購之深煎繼吞火煎最煩固則繼火

各種氣痛

心胃氣痛

真沉香

木香

公丁香

乳香

沒藥

靈脂

元胡

以上各

真射香

壹分

共研為末收入磁瓶以蠟封口不可

洩氣每服七分開水下此方專治男女心胃各種氣痛有

氣痛滴水入口即吐者有痛極難忍抓破衣物者服之即

愈神效非常百無一失如不見效即是蟲痛照後蟲積各

方治之

香薷散

此方得自仙傳凡各項心胃氣痛服

之止痛如神有人照此方送藥數十年無不應手奏效

青皮橘子

壹百個

香附

壹斤

鬱金

四兩

先將橘子鋪大蒸籠

丙蒂眼朝上用新布墊底再將香鬱貳味研末糝入於揆
 晚時蓋好蒸極透熟每橘蒂眼上放生姜壹簿片姜上加
 艾絨一小團將艾燒燃燒過另換姜艾連燒三次晒過一
 天次晚再蒸接連蒸晒九次每蒸壹次照前法連燒叁次
 無日晒卽風吹亦可製好用磁器收貯每服連橘蒂藥共
 壹錢用水煎壹服可煎兩叁次宜於冬天配製以免霉壞
 銀黃散 專治心胃寒痛年久者叁次斷根並治寒痧及
 肚腹寒痛屢試如神百發百中 銀硝半斤黃丹飛淨用
 大銀窩銀店傾放炭火上火要火又將銀硝放窩內用銅
 篋不住手順攪不可逆再將黃丹分作數次加入銀硝卽

化爲水攪至半個時辰硝丹合爲一色傾入冷水內俟冷
定取出研細磁瓶收貯埋地下一月拔去火毒每用五分
體弱者用叁分滾燒酒冲服如不知氣痛是寒是熱先服
胡椒末其痛畧緩者是寒然後再服此方必對症也

姜附散 良姜酒炒 香附醋炒 共爲末米湯爲丸每服叁

四錢食遠服凡心胃一切氣痛立止如神因寒而痛者良

姜加倍用因氣而痛者香附加倍用有人心胃疼痛十數

年不愈服此除根 又方 失笑散 五靈脂叁錢 蒲黃

貳錢 各炒研末好醋煮透加水連渣服凡男婦老少心腹

胸肋淤血作痛小腹疝氣脚氣及胎前產後血崩血暈一

切氣痛屢用皆效真神方也 又方 專治肝氣 夏枯

草 壹兩 煎水 體虛者加瘦猪肉四兩同煮 當茶飲服過叁四兩斷根此

藥能舒肝氣養肝血止肝風故能奏效如神屢試屢驗而

本草不言其能治肝病何哉又凡肝病最忌食鷄終身忌

食椿芽為要 又方 草菓 元胡索 五靈脂 沒藥

各五錢為末每服叁錢酒調下各種氣痛其效如神歌曰

草菓元胡索五靈脂沒藥酒調服叁錢一似手拈却 又

方 良姜 川樸 姜汁炒 五靈脂各等分研末每服壹錢滾

醋調下即止神效 又方 丹參 壹兩 檀香 砂仁 各壹

水煎服即愈婦人更效 又方 元胡索末 叁錢 酒下極

效有人因食蕎麥滯氣心胸痛不可忍大便不通百藥不
口卽吐後服此藥而愈又一老人下痢腹痛將死棺木已
備亦服此藥而愈凡氣痛諸藥不效者服此方必效是又
方 生地黃搗爛取汁冷服甚效有人心胃疼痛百藥不
效後用此方吐出一蟲而愈又一人服此泄下一蟲斷根
又方 醋泡過二三年大蒜頭食數顆立刻止痛或用生
蒜頭煮食亦可其又方 凡氣痛急切無藥以食鹽一撮
放刀口上炭火燒紅淬入水中乘熱飲之卽愈愈後戒食
腳魚 又方 照鼻部 治鼻血第一方燒少商穴法卽
愈

腎氣上衝心痛

方見前陰門

走注氣痛忽有一處如打撲之狀痛不可忍走注不

定靜時其處冷如霜雪

此因暴寒所傷用楊柳白皮酒煮布包乘熱熨之有赤

點處刺出血更妙凡諸急痛熨之皆止

心胃蟲疾作痛

或滴水入口即吐或口渴飲水不止或吐清水者皆是用

葱白汁壹盃飲下隨飲真小磨麻油壹盃少頃即愈蟲

當化水除根雖痛至牙開欲死者亦效

真川椒

真烏梅 生姜煎湯服卽愈 又方 病發時用艾葉

十片揉碎在銅器內炒乾不住手用將鹽滷要豆腐店內

半小酒盃傾入候焙乾倒出研末用熱燒酒壹杯送下俟

腹內作響或降氣或吐出清水卽愈 此藥須現製現服

隔夜卽不效服後戒茶與葷腥三日愈後每逢初一十六

日用淡鹽湯喫壹服永不再發其效如神 又方 白鱣

壹名淡煮飽食叁五次卽愈此魚最能殺蟲故也

酒食凝滯攻衝作痛或有形或無形鄉人稱爲穿心

箭痛方書無所稽考法宜宣通血絡

用 川棟子去核酒炒錢半 元胡索 五靈脂 桃仁去皮 蒲黃

各壹錢

水煎服其效如神此葉天士先生方也

二天黃

酒釀式

酒食蒸帶

魚是滑

白

十六

出

未

內

又

咳嗽 應與前肺癰及後吐血各門參看

胸膈脹滿咳嗽不安 並治各項咳嗽

外治法用 宮粉香油入鉄器內熬數滾離火用頭髮壹

團蘸粉搽胸膈數次即愈 又方 蕎麩鷄蛋清和成團

擦之亦效或用哮喘第一方亦可

哮喘痰喘

照後哮喘第一方治之其效如神或照前方亦可 又方

用真蚌殼粉 長者為蚌圓者為蛤須自取 蚌殼研粉若用蛤粉則不效 新瓦炒紅入

真青黛少許用淡醃菜水滴麻油數點調服貳錢神效有

婦人痰喘咳嗽終夜不寐面浮如盤一服即愈 又方

用多年陳白蜆殼又名蛤蜊殼燒過存性研極細末米湯服壹

錢壹日叁服神效 又方 皂角叁片肥皂更好蟲蛙者忌用 去皮

子莖 壹片入麻油炒過巴豆十粒 壹片入姜汁製過

杏仁去皮尖十粒 壹片入蜜製過小半夏十粒俱用火炙

黃色其研末每用五厘安手心臨臥以姜湯送服神效之

至 又方 雪梨四兩 生姜壹兩 共搗汁去渣加蜜四兩

其煎數沸入瓷器內封固不拘時服壹劑即愈無病亦可

服最能滋陰降火忌食蘿蔔 又方 藕汁 梨汁 白

菓汁各貳兩銅鍋內熬成膏隨意服之 又方 元參

生甘草 麥冬各壹兩 金銀花八兩 當歸貳兩 水煎服神效

或加白芍
叁錢亦可
兼治肺癰

咳嗽氣喘

生山藥

半碗 搗爛

甘蔗汁

半碗

和勻炖微熱服立止

咳嗽氣喘遇寒即發

乾姜

泡

皂角

泡去皮子弦 蟲蛙者忌用

肉桂

紫色者 去皮

各等分共搗篩白

蜜和勻杵叁千下為丸如梧子大每服叁丸開水下嗽發

即服日服數次忌葱麪油膩其效如神

諸般咳嗽

桔梗

炒

荊芥

炒

紫苑

飯上蒸壹 次再炒

百部

飯上蒸壹 次再炒

白前

飯上蒸壹

次再炒以共磨細末每服叁錢臨時開水調服如初感風

寒者生姜湯調下

予製此藥普送服者多效或問藥極

細微而取效甚廣何也予曰藥不貴險峻惟期中病而已

此方係予苦心揣摩而出之蓋肺屬金畏火者也遇熱則

咳金性剛燥惡冷者也遇寒則咳且肺爲嬌臟攻擊之劑

既不任受而外主皮毛最易受邪不行表散則邪氣留連

而不解經云微寒微咳寒之感也若小寇然啓門逐之卽

愈矣醫者不審妄用清涼酸澇之劑未免閉門留寇矣寇

欲出而無門必致穿窬而走則咳而見紅肺有二竅一在

鼻一在喉鼻竅貴開而不閉喉竅貴閉而不開今鼻竅不

開則喉竅將啓能無慮乎此方溫潤和平不寒不熱旣無

安靜宜其投之有效也

又方

枇杷膏

見後勞傷吐血門

最爲

神效

又方

欵冬花

川貝母

知母

各壹錢

煎數滾用

冰糖向燈火上溶化滴入藥內服之屢試神效並治咽喉

發乾

又方

細茶葉加紅沙糖拌炒乾冷透每服叁四

點神效

肺虛咳嗽

凡肺虛胸熱咳嗽氣急煩滿咽喉燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉嚨音嘶不出用黃蠟溶瀝極淨用酸漿水煮過八兩入銅器內化溶作壹百貳十九蛤粉四兩爲

衣養藥每服壹丸核桃半個細嚼溫水下靜臥閉口不語
日服貳丸漸漸平愈忌食鷄半年 造酸漿水法用清水
入飯少許浸四五日即酸或用隔壹貳日米泔水代之亦
可

肺痿咳嗽

凡感受風寒停留肺中或勞力內傷以致咳嗽聲重胸膈
隱痛頸項強硬不能轉側此肺癰也久則鼻流清涕咳吐
膿痰黃色腥穢重則胸脇脹滿呼吸不及飲食減少脈洪
自汗漸至咳吐血寒熱往來形體消瘦聲啞喉痛轉為
肺痿此危症也用 大栝藁壹個開壹孔內有子多少粒

用杏仁去皮尖照數配入封好外用黃泥包裹燒紅燒至無

烟取出用物蓋住候冷去泥又用川貝母照枯蘘子粒數配入共研

細末臨臥時每用貳錢白蜜調勻燈心煎水送下

咳嗽痰血涎唾中有少血散漫者此腎經相火炎上絡受熱傷之血也若血如紅縷從痰中咳出者此肺

者必死又咯出痰中有血絲屬腎經咳嗽有血屬肺經嘔吐成盆成碗者屬胃經自兩脇逆上吐出血屬肝經溺血屬小腸經下血屬大腸經牙宣出血屬胃腎

虛火

屬胃腎

真青黛 枯蘘仁去油 海石炒黑 山梔炒黑 訶子肉等分

蜜為丸噙化嗽甚加杏仁 又方 欵冬花 百合蒸焙

等分為末蜜丸龍眼大每臥時嚼壹丸姜湯下 又方

大柿餅

壹個去子

入

眞青黛

壹錢

綿扎緊飯上蒸熟臨睡時

食薄荷湯下極效

獨聖散

治多年咳嗽肺痿咯血紅痰用

白芨

叁兩

爲

末每服貳錢臨臥糯米湯下

台州獄吏憫一重囚囚感

之云吾七犯死罪遭刑拷肺皆傷損得一方用白芨末米

飲調服其效如神後日凌遲剖其胸見肺閒竅穴數十皆

白芨填補色猶未變也

寒咳

核桃連皮搗爛加水糖少許開水冲入蒸服數次極效或

照後蘇兜飲麻黃丸均妙

熱咳

真柿餅煎水服或用扁栢葉煮豆腐食極效 又方 巴

旦杏仁

壹兩雙仁者不用

泡去皮尖用新搗鉢新研搥將杏仁搗

爛如泥分爲叁服每服內加水糖

叁錢

共入蓋碗用滾水沖

入蓋片刻俟溫連仁末服下早晚各壹次數服而愈秋燥

熱咳更妙若用杏仁煎服則不效

咳嗽嗆逆落枕卽發此受寒也

照後麻黃貳方服之最妙

年久咳嗽

扁栢葉陰乾加

紅棗七枚煎濃湯代茶時時飲之忌食

葷腥煎炒另用 百合 四兩 冰糖 四錢 早晚蒸服不可間

斷輕則十日可愈重則半月自痊有老人咳嗽三十餘年

服此月餘脫然除根靈驗無比切勿輕視 又方 蘇兜

飲 紫蘇莞 七個 煎濃汁早晚沖鷄蛋服雖數十年咳嗽

無不神效 又方 麻黃 壹錢 熬濃汁壹碗去渣加水糖

貳兩熬至滴水成珠為丸如蓮子大每服貳叁丸日服數

次服完即愈咳嗽喘逆不能落枕者更效 又方 治咳

嗽喘逆 淨麻黃 紅棗皮 各五 南薄荷 各五 上肉桂 紫

蘇葉 桑白皮 杏仁 去皮 大腹皮 各四 炙草 六分 水煎

服放胆用之百發百中 又方 雄黃 壹錢 黃紙 叁張 用

鷄蛋白將雄黃調勻搽黃紙上晒乾搽凡氣管損入
 或烟筒內燒燃吸之如吃烟樣少頃嘔吐嗽止壹日壹次
 忌食諸物七日惟食白粥此孫真人千金方也神效非常
 不可輕視如嫌氣味難受食白煮猪肉卽解 又方 小
 猪肺壹副不見水去心不用將香油約壹茶杯灌入肺管內以
 線紮管頭入砂罐內加水先夜炖熟早晨空心吃肺不用
 鹽送先將浮油去淨其湯隨吃幾口餘湯泡飯連吃貳肺
 全愈屢試如神 又方 陳海蜃皮漂盡鹽冰糖拌蒸食陰
 虛久嗽者極效 又方 生地 沙參各貳兩 川貝母去心
 牡丹皮各壹兩 元參 黃芩 桔梗 知母 百合 百

猪板油 糯米糖 蜂蜜各四兩 共熬成膏時嘗挑服壹匙

口中噙化三五日即止 又方 核桃肉皮不去 生姜各壹兩

研膏蜜為丸貳錢壹顆每臥時嚼壹丸姜湯下氣促難臥

服此立定 又方 潞黨壹錢 陳皮 桔梗 紫蘇各錢半

五味子十五粒 水煎食遠溫服

咳嗽聲啞

訶子皮 五倍子 五味子 黃芩 甘草 各等分為

末蜜丸櫻桃大每壹丸噙化嚥下 又方 訶子皮叁錢半生

炒甘草貳錢半生半炒 木通叁錢 水煎去滓入生地黃汁壹盞小 臨

臥嚥下 又方 杏仁去皮尖並去油 搗融兌開水取汁炖熱服

勞傷吐血 癆病火動陽物易舉方見前陰門

凡勞傷吐血咳嗽等症忌食春芽食則病發難愈

勞症諸方

枇杷膏 專治勞傷虛損吐血咳嗽發燒身體瘦弱四肢

酸軟精血疲倦腰背疼痛飲食不進以及一切不足弱症

服之屢效咳嗽尤應驗如神輕者貳叁料全愈重者四五

料除根貧富可用不必另服別藥免致誤用害事即無病

常服可保身強神旺此方得自仙授藥極平易功最神奇

見者廣傳功德無量 枇杷葉 五十六片新鮮 大梨 貳個

者佳去皮 白蜜 半鍾先熬滴水成珠大便乾燥者多 大棗

心切片用

念方斤編

卷三 勞傷吐血

七

半斤或黑棗

建蓮肉

四兩不去皮

先將枇杷葉放銅鍋內砂鍋

亦可

以河水煎出濃湯用紬瀝清汁去葉與渣不用後將

梨棗蓮蜜和入煎熬以蓮肉融爛為止用磁瓶收貯隨意

溫熱食之凡虛病服藥多則脾胃受傷飲食減少病更加

重虛弱咳嗽者若不早治肺損難治惟此方最益臟肺治

咳嗽應效如神如虛弱並不咳嗽者枇杷葉不用只用河

水同煮咳嗽多痰者加川貝母

壹兩

研極細末俟煮熟時

入內煮壹貳滾取起若吐血用藕節

貳拾壹個

搗汁同煮冬月

多製久收不壞夏月隨食隨製

飴糖飲

治男婦五勞七傷身體燒熱精神困倦不思飲

食等症咳嗽吐血者忌用

女烟

白米

核桃肉 七個

裝入磁瓶內不可太滿滾湯煮壹炷香久埋

土內七日去火毒隨便每日服壹貳盃不可過大有效

元霜膏 治虛勞咳嗽吐血下血燒熱困倦其效如神

真烏梅汁

梨汁

蘿蔔汁

柿霜

白沙糖

白蜜

各四

兩姜汁 壹兩

赤苓末

八分 欵冬花

乳汁浸曬乾

紫苑末

各二兩

共

入砂鍋熬成膏為丸每服叁錢臥時含口中緩緩嚥下

加味四物湯

治癆熱咳嗽如神

當歸

熟地

各叁錢

川

芍藥

各貳錢

柳樹根

壹兩酒炒

水煎服奇效

雕胡飲

治虛勞咳嗽吐血吐膿雖垂危亦可用也

芩

馬方新編 卷三
白細根約叁四兩搗碎用好陳酒煮服每日壹貳次半月
全安

坎離丸 治一切虛勞立見神效 黑豆炒熟研末 紅

棗量用煮熟去皮核貳味共搗爲丸每服叁四錢鹽湯送
下或酒下

外治法 治一切虛勞咳嗽吐血燒熱等症但脉息有神

無不效應 箭頭砂 壹兩 明雄 五錢 共研細末綿紙包固

選未曾行經十二三歲童女身體壯實無病者將藥貼放

童女臍內用布捆緊過一週時取下稱藥比前多重壹貳

錢者更妙卽刻捆於病人臍上先備人乳十餘碗候病者

枇杷膏調養一月百無一失斷不可服別藥以免誤事

人紅丸 專治童子虛勞咳嗽吐血燒熱屢試神驗大人

亦治切勿輕視 人龍即蛭蟲甘壹條童便洗淨瓦上不

破皮紅棗叁十個飯上蘿蔔子壹錢五分大熟地五錢煮

自製真藕粉壹兩五錢真川連六分酒拌以上共搗為丸如梧

子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增兩粒加至貳十

壹粒為止服至壹料全愈

吐血治法

血吐在水內浮者肺血也羊肺煮熟蘸白芨焙研末食沉者

愈方新編 卷三 勞傷吐血 九

肝血也羊肝煮熟蘸白芨食半沉半浮者脾心血也羊心
羊脾煮熟蘸白芨食極效此聖惠摘元方也脾肺之血
係屬氣虛以補氣益脾爲主肝血係屬勞傷以滋陰降火
爲主如概用滋陰之藥則殺人如草菅矣俗謂非勞病而
治成勞病卽此是也吐血最忌用參無論人參高麗參黨
參均不可服此係名醫秘傳人多不信後有時醫試之每
治吐血之症用參者多不能愈不用參者全活甚多又
方凡勞傷咳嗽吐血用童便之清利者日日飲之勿間
或自己戒食葱蒜等臭濁之物並戒房事則小便自清去
其頭尾數滴日飲貳叁次每服南棗叁個自不惡心壹月

見效久飲除根身體強健吐血服小便者百無一死服寒

涼者百無一生此屢試屢驗良法也 又方 足紋銀壹

塊約重五錢放碗內早起將自己小便去頭尾撒碗內色黃者不

可用乘熱飲下數日即止忌酒與酸辣煎炒等物壹年愈後

將銀傾化已輕而奇臭蓋臊氣被銀收去也 又方 蓮

藕藕節日日煎湯飲之不可間斷輕則叁月重則半年斷

根無鮮藕時用藕粉亦可藕粉以自製為真買者多假無

益有損 又方 凡吐血多者用叁四兩重大當歸壹枝

切細取好陳酒壹觔慢火煎至壹滿碗候將要吐時口中

有血務必含住取藥壹口連血嚥下其血必止隨將酒分

作幾次飲完即此壹劑而愈後不再發每有醫家阻云吐

血尙要戒酒豈可用酒煮藥殊不知神驗非常此方活人

甚多從無一悞如一時煎熬不及急用當歸壹貳寸嚼融

帶血吞下即能漸止不致大吐亦可救急此林屋山人經

驗方也 又方 龍眼肉七枚 紅棗十四枚 白蓮子貳十粒

心不 去皮九粒 小黑豆四十粒 水煎蓮葉空心食大有奇效 又方

豬肺壹個 洗極淨以 硃砂叁分 川椒每歲壹粒 灌入再將肺

挖七孔每孔安桃仁壹粒放瓦鉢內蒸出自然汁不用 連

肺食盡其效如神 又方 薺菜叁斤俗名地菜 連根帶葉煮鷄

蛋叁四 十個 七晝夜不斷火隨時取食即愈極效方也 又方

用上白細粘米於清明前後浸水壹貳日亦可磨細日晒

夜露晒極乾以銅鍋炒黃色不可太過每用滾水和成如

指頭大煮熟連湯食不可加鹽與別物或少加白糖亦可無論時

候但覺咳嗽卽服壹日須服五六次切莫服藥服後忌茶

酒腥辣等物壹月戒房事半年有人吐血年餘百藥不效

遇一道人指授此方十日卽愈 又方 子鷄壹隻雌鷄

未生蛋者女用雄鷄未曾啼者先擇無人走動處挖一地坑用竹刀或磁

片忌銅鉄將鷄在坑內宰殺血滴坑內乾搏去毛破開腸

雜收拾乾淨腸雜毛糞均放坑內不可遺一點在地雞亦

不可沾水只將乾布內外擦淨取六月雪草按病人年紀

每歲用草嫩頭壹個同雞肝雞肫納入雞腹中用新瓦鉢
 兩個合雞在內以紙密密封口再用鉄鍋兩個合瓦鉢在
 內並將鍋口封緊鍋中鉢中總要拭乾不要滴水用稻草
 叁大把穀壳七八斤緩緩而煨約半時久雞自爛熟取出
 檢去六月雪草將雞用手折碎空心食之食雞三隻總無
 不愈真奇方也愈後須戒殺放生方免復發 又方 上
 肉桂 去皮五分研末冲服忌火 當歸 桔梗 枳壳 各七分 大黃 酒微煮 厚
 樸 姜汁炒 川鬱金 真紫蘇 各八分 水煎加童便半鍾姜汁貳
 茶挑先服貳劑再用 續斷 壹錢 麥冬 二錢 遠志 六分 真
 山藥 四分 赤芍 七分 益母草 叁分 川貝母 一分 去心 另
 研末冲服 水

煎服十劑 此貳方不論男女遠年近日血症只要現在
吐血之日先服前方貳劑後服次方十劑立時全愈永不
再發慎勿加減藥味亦斷不可服寒涼藥如從前誤食寒
涼藥以致寒血凝滯者服此十劑後自然漸次全愈不必
再服屢試屢驗功效如神若體弱者服六味地黃丸空咳
不止者服健脾丸卽愈

咳血

痰內有血出於肺與上咳嗽門參看

欵冬花

百合

百部

蒸焙

各等分爲末蜜丸龍眼大每

臥時姜湯下壹丸

又方

大蘿蔔

壹個

切須剝去肉壹

半入黃米糖令滿原頂蓋之火內煨熟食效

咯血 痰帶血絲出於腎與上咳嗽門參看

天冬 壹兩 茯苓 杏仁 貝母 甘草 各五錢 共研末煉蜜

為丸梧桐子大每服二三十丸 又方 柳花 焙乾研末 米湯

調服壹錢神效

驗癆蟲法

用乳香燒烟薰病人手背男左女右以紬帕蓋手掌心良久有毛從掌中出白者易治紅者難治黑者不治無毛者即無癆蟲

灸癆蟲法

用濕紙條貼背脊上紙先乾者即癆蟲處以墨點記用老

先備火盆鉄鉗如蟲出卽用鉗夾火盆內或遠送野外埋入土內恐飛入人口鼻內須謹防之

治癆蟲法

雄精

硃砂

硫黃

去砂泥各壹錢

麝香

壹分

各研極細末磁罐

收貯以頂好燒酒和勻用獨大蒜頭去蒂蘸藥從尾間脊骨徐徐逐節擦上如有腫處或極痛之處卽係癆蟲所在須於腫痛處多擦數次其蟲自滅不拘新久一切癆病皆能除根如病重者須擇天醫吉日總以午時擦之爲妙端午日更佳忌戊日巳日除日此藥能開背後三重關竅卽

虛怯恚憂之人於端午擦之亦能神清氣爽經絡流通大有補益此方傳自海外屢試如神又方八月初一日早收取百草頭上露水點膏盲穴在背上第四節骨左右兩旁各叁寸最為神效

童子癩

並治傳屍癩

貓糞

取屋上晒白者

用黃土包裹火內煨焦取出用碗蓋任候冷

去土研末黃糖和為丸每服叁四錢效若仙丹屢試屢驗此林屋山人方也

式蘭火盆趁熱取出唱用拋夾火盆內更盡差裡收型
 持心共撰十以艾青蘭效蘇其土極之多效為效
 美亦而

治哮喘妙法

病發先一時用鳳仙花

又名指甲花

連根帶葉熬出濃汁乘熱

蘸汁在背心上用力擦洗冷

則隨換以擦至極熱為止無

用生姜擦之

再用

白芥子

叁兩

輕粉

白芷

各叁錢

共研爲末

蜂蜜調勻作餅火上烘熱貼背心第叁節骨上貼過熱痛

難受正是拔動病根務必極力忍耐切勿輕易揭去冷則

將藥餅啓下烘熱再貼一餅可貼二三日無論病愈未愈

多備藥餅換貼不可閒斷輕則貼一二日重則貼三四日

或五六日永不再發有人患哮喘四十餘年貼至數日斷

根無論寒熱虛實鹽醬醋酒哮吼皆治神驗第一方也藥

味不可加減並治痰氣結胸及痰喘咳嗽 又方 海螵

蛸瓦上焙枯為末大人五錢小人貳錢紅沙糖拌勻調服數次

斷根土 又方 海螵蛸 心對氏 公極 四 診 長 歸 去 合 四

... 鳳山 荈 又 荈 帶 藥 然 出 數 十 乘 燕

台 鞠 頂 以 去

如 照

驗方新編卷之四

脾胃

惡心吞酸

此脾胃虛冷也

吳萸

四錢滾水
泡去苦味

水煎食遠服有人患此

多年一服即愈或加乾姜壹錢亦可忌夜食並忌生冷食

物又方 核桃嚼爛姜湯送下

胃口虛脹手足厥冷

山藥半生半炒研細米湯下貳錢日貳次忌鉄器

涼藥服多嘔吐惡食

前三方及後 鯽魚 橘皮二方均可用

面三冷水服多噉魚 湯火二衣以可出

沙子炒焦再加水煮澄清飲之即消 又方 食生蒜頭

戴叁枚亦效或服砂仁壹貳錢亦可須忌熱器

胃脘冷滯

有人胃中冷滯多年不愈後遇名醫診之曰此尸疰也用

死人棺中枕煮水服之而愈 迺衣可忌食並忌土苽食

脾胃虛冷不思飲食 此病水煎食穀服人感此

鯽魚和豆豉胡椒老姜陳皮烹煮空心食

脾家冷積食後胸滿兼治一切痰氣

橘皮 壹斤 柑橙 甘草 食鹽 各四 水五碗 慢火煮乾焙為

才每服黃耆錢白湯水... 橘皮散似屬相宜遂連日服之一日忽覺一物墜下大驚
自汗如雨須臾腹痛遺下數塊如鉄彈子臭不可聞從此
胸次廓然其疾頓愈蓋脾之冷積也

胸胃積滯

有人食白煮雞蛋過多胸胃積滯數年不愈後用
半斤煮食吐出一團開視已成小雞連服數次吐出十餘
團而愈

胃寒嘔吐黃水

並治痰飲吐水

暖胃膏

生姜

壹斤

搗取自然汁碗許入牛皮膠

乳香

物步

中痰氣絕

方見卷十二急救門

下痰丸 治一切風痰眩暈癡久不愈者

白礬壹兩 細茶葉五錢 為末煉蜜丸梧子大食遠姜湯下

五十九丸久服痰自大便出

茯苓丸 治痰症手臂痛疼並治婦人產後發喘四

肢浮腫

生半夏貳兩 茯苓貳兩 枳殼去瓢麩炒五錢 風化硝貳錢五分 如

但以朴硝撒在竹盤中少時盛壹時未易成 水置當風處即乾刮取用亦可 共為細末生姜汁煮糊為

丸如梧子大每服叁十九丸姜湯送下有人為痰所苦夜間咳嗽如人抽搐兩手發戰不能舉物服此隨愈

痰氣結胸

真銀硃

淨五錢

明礬

壹兩

同研用熨斗盛火瓦器盛藥鎔化

急刮搓丸每服

壹錢

好茶入姜汁少許服之心上隱隱有

聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀硃破積故

也 又方

梨汁

壹鍾

姜汁

白蜜

各半鍾

薄荷

叁錢

研細

末和水煮十餘滾服降氣如奔馬 又方 照哮吼第一

方治之極效

痰飲吐水

水嘔吐無時名曰痰飲

好赤石脂

壹斤研末

每服貳錢酒送

下至多服叁錢服至壹斤則終身不吐痰水又不下痢此

藥能補五臟令人肥健有人痰飲百藥不效服此而愈

又方

暖胃膏熨胃丸二方

見前脾胃

極效

痰疾癲狂

狂病有因傷寒而得之者此一時之狂也照仲景張公傷寒門治之用白虎湯以瀉火矣更有終年狂病而不愈者或持刃殺人罵官不認父母妻子見水則喜見食則怒此乃心氣之虛而熱邪乘之痰氣侵之遂成狂矣此等欲瀉

火而火在心不可瀉也欲消痰而痰在心之中不易消也

惟有補脾胃之氣則心自得養不必去痰痰自化不必瀉

火火自無矣方為化狂丹

高麗參

參錢

白朮

茯神

各壹兩

甘草

菖蒲

各壹錢

半夏

兎絲子

各叁錢

附子

壹分

水煎服

一劑狂定

二劑病痊

此方

妙在補心脾胃之三經而化其痰不去瀉火蓋瀉火則心

氣愈傷而痰涎愈盛狂將何止乎尤妙在附子壹分引補

心消痰之劑直入心中而氣尤易補而痰尤易消又何用

瀉火之多事乎此所以奏功如神也

又方

青橄欖

十斤

破砂鍋內熬十數滾

去核

入石臼內搗爛

再熬熬至無味

參錢

開水送下服完自愈凡痴癲羊頭風等症皆痰迷心

竅所致服此甚效此林屋山人經驗方也 又方 藜蘆

又名煎水多服必效生者炒食煮食俱妙有婦人風癲每

一二年一發或三四年一發久則一日發十餘次昏痴不

愈後服此方吐出痰涎二斗汗出如洗更覺昏困三日全

愈 又方 真川鬱金 七兩 白礬 參兩 薄荷水為丸硃砂

為衣如梧子大每早服一次開水下有婦人瘋癲十餘年

服至四五十日心間如有物脫去再服之十日而愈以礬

金入心去惡血白礬化頑痰硃砂安神故也愈後須用天

王補心丹加減調治方免後患 又方先將病人綁住

在離當心下叁指之處艾火燒七次或九次再燒兩太陽

七次次用辰砂川貝各叁錢酒煎服貳次再用海風

藤鳳尾草川貝各錢半石菖蒲叁錢煎服五六劑或再

服紫金錠壹貳錢愈後用蘆蒂棗肉爲丸每丸叁分服至

叁丸全愈屢試如神 又方絲綿壹尺燒灰開水下兌

酒服更妙

癡笑不止

食鹽燒紅河水煎飲過片時用手指入喉抵住舌根使作

嘔吐嘔出熱痰數次即愈

羊癲風

菜葉放口中青草亦可立時蘇醒仍照前煎橄欖膏服之可以

斷根

痰迷譫語方

鮮猪心壹具辰砂壹錢甘遂貳錢貳味合研為末藏猪心

中外用牛糞煨熟取出藥末和作兩丸將猪心煮汁和丸

吞下即愈

谷不唯意

中依眼平交掛鏡知世藥迷味非爾或深醉心燕者味其
流散心壹且頭如壹與甘滋有廷有和合世為味強醉心

烟射

菜葉效口中靜靜立執蔬豔的照前顏娟對膏那之何似

羊羸風

三消作瀉為下消多食易飢為中消

消渴飲水不止

三消湯 真台黨 白朮 當歸 茯苓 生地各壹錢 黃

栢 知母 黃連 麥冬 天花粉 黃芩各七分 甘草五分

水煎服神效三消皆治

天池膏 天花粉 黃連 真台黨 知母 白朮 五

味各叁兩 麥冬六兩 生地汁 藕汁各貳兩 人乳 牛乳各壹碗

生薑汁貳碗 先將天花粉七味切片用淘米水十六碗桑

柴火慢熬出汁盡五六碗瀝清入生地等汁慢慢煎熬加

白蜜壹觔煎去沫熬如膏收入磁罐用水浸三日去火毒

每用二三匙白滾水送下甚效三消通治

兔絲丸

兔絲子

酒浸選淨焙乾十兩

茯苓

蓮肉

各叁兩

五味子

壹兩

共為末另研真山藥末六兩酒煮搗數百杵丸如梧子大

每服五十九丸空心米湯下三消皆治

又方

綠豆煮汁

並作粥食最妙

又方

好梨日日食之多食必效或多

食蘿蔔更妙

又方

蠶繭壳

七個絲綿亦可

煎湯當茶飲之神

效繅絲水飲壹貳碗更佳

又方

黨參

壹兩

蜜炙研末

開水泡透蒸熟為丸如梧子大日服五丸酒下或茄根煎

湯下日加五丸加至叁十丸為止不可多服服五六次後

以飲水惡心為度惡心時乾物食之其渴自止奇效

又方 五焙子煎水飲之或作丸服之久則生津止渴

又方 牛膝五兩 生地黃五斤 搗融蜜丸梧子大空心酒

下叁十丸下元虛損宜久服為妙 又方 苦楝樹根新

白皮五錢 切片瓦上焙乾入射香少許 水煎空心飲之有

人口渴不止遇道人傳此方服之下蟲三四條而愈愈後

人必困頓用黨參貳兩煎水飲之 又方 如一日飲水

至一石者浮萍搗汁服之 又方 如飲水多而小便不

利者葵花根五兩煎湯清早服之

多年消渴飲水百藥不效

每日食好梨二三個或食蘿蔔亦可均極神效 又方

白芍甘草等分爲末每用壹錢開水送下日叁服七日而愈有人渴飲九年時發時止服此斷根

飲水不止小便如膏

茴香炒苦楝子炒各壹錢研末空心酒調服

飲水不止小便時流以上各方可以通治

雞蛋叁個要頭窩生者去壳攪融用燒酒四兩燒開冲服服後卽

蓋被睡下睡醒禁風一日卽愈有人一日飲水數桶上飲

下流服此而止神效非常 又方 有人日飲水數斗小

便時流飯量亦加服消渴諸藥年餘其病更甚後用真射

香叁分酒爲丸用枳椇子又名棘栒子又名雞距子煎湯服之遂愈問

其故乃食果成積及飲酒過度積熱在脾致有此疾射香能治酒果棘枸亦治酒病故能奏效也

久病消渴不止

並治泄瀉口渴

七味白朮散 白朮 高麗參 眞茯苓 霍香葉 乾

葛各壹錢 炙草五分 水煎當茶飲另用木香叁分 磨汁兌服

屢試如神

消食易饑 以上消渴各方可以通治

好梨日日食之多食自愈 又方 肉蓯蓉 山茱萸

五味子爲末蜜丸梧子大每服貳十九丸鹽水下

腹中易飢食下片刻卽吐

此蛇積也用醋泡大蒜汁飲數碗吐出一蛇即愈不吐再

服數碗自愈 又方雄黃五錢調水服數次即愈

梁日食艾冬食自愈 又方肉苁蓉 山藥黃

尚食長壽 凡土部各代何代無命

與鳩咳嗽 不吐便時

木煎當茶飲 凡用木香 蘇枳殼

白芷 白木 高麗參 員荊芥 雷香葉

入識前點不立 並治部萬口 有人月飲水數斗

消部部果棘味亦能 醋醃性 補寒 蛟 吐 病 更 花 後 用 且 好

其好代食果丸 蘇 延 治 醋 醃 與 胃 熱 五 熟 煙 亦 吐 迷 恨 吞

飲食積滯 與痞疾門參看

食積外治法

凡飲食停滯胸膈脹滿或大便不通或大便泄瀉或年老

或體虛難以攻擊內消者用亂髮一團 剪斷 酒麩一個 小者

亦可 葱白七個老姜叁錢胡椒七粒以雞蛋壹個破壳

傾入碗中將各藥搗融和入調勻用隔夜燈油煎成一餅

貼病人心坎下胃腕處 先用燈油於胃腕處順擦七次用

布帶束住冷則煎熱再貼約一二時似覺鬆動即便取出

其病立愈此法極穩而效屢試如神若治小兒藥料可以

稍減 又方 紫蘇熨法 見傷寒門 亦極神效

飲食凝滯攻衝作痛或有形或無形

方見各項氣痛門

飲食過多脹滿不安

用鹽擦牙溫水嗽下二三次如湯沃雪也

魚肉積滯

狗糞燒存性爲末酒服貳錢日叁服其積自大便出又

方山查炭研末爲丸每服四錢數次卽愈

食魚積滯

紅曲叁合煮爛連渣服積從大便出連服三次卽愈

生魚積滯

取水數十枚中石子燒紅投冷水中七次即熱飲之三五次

其積從大便出 又方 生姜汁和紫蘇汁飲之即消

食犬積滯開水中煎

山查肉 杏仁去皮 各貳十四粒煎濃湯飲自化

食牛腹脹煎濃湯飲自消

乾稻草壹把煎濃湯熱飲自消

食鴨積滯煎濃湯飲自消

淘糯米水煮熟飲一盞即消

鴨蛋積滯煎濃湯飲自消

治法與上同

雞蛋積滯

飲好醋卽消或飲豆豉水亦消

食整煮雞蛋積滯

腹中如有雞子鳴者多食大蒜卽可吐出

食鹽蛋積滯

肉豆蔻壹個煨去油煎服數個自消

食索粉涼粉積滯

杏仁五十粒蒸熟搗碎滾開水冲服卽消

食瓜果腹脹作痛

肉桂研末飯和丸棗豆大每服五分開水下又方五食

鹽湯卽愈

食西瓜並諸瓜過度

瓜皮煎湯解之諸瓜皆同

食荔支腹脹

荔支壳煎水服卽消

食菱角腹脹

取生姜汁飲立消

食豆不消

生蘿蔔汁飲之卽消

食麪不消

生姜汁冲好酒熱服自化 又方 生蘿蔔取汁炖熱服

神效凡食麪用醋斷不作脹

糯米積滯

神曲炒為末加木香末 開水下數日口中聞酒香其積

即散

飯食凝滯腹痛

飯搓成團加鹽少許燒枯煎水飲即消

食茶成癖

花椒 芝麻等分為末以蒸麪餅為丸如桐子大每服十

丸茶送下百日遂愈 又方 青礬四兩入小鑊內泥封

少烟一夜取出紅芽者尸煮去皮核其根為丸每用之金
或酒或茶下神效 又方 新鞋一隻將茶葉盛滿任意
食之食完再盛一鞋連食三鞋自不食也男用女鞋女用
男鞋奇效 又方 每日食榧子七個以愈為度

食積痞塊

木賊草 五錢 研細末每服五分開水空心調服年近者一
料即消年遠者不過兩料全愈屢試如神

木類草

正發 肺臟未通氣正長開水空心騰顯爭食者一

食膏滋藥

及詳各按川天衣 益甘金林水合國以愈無異

夏之食宗再盪一揮裏食三揮自不食出畏用文揮文用

起齋迥茶不輔發 艾衣 滌揮一雙綠茶葉盪齋丑意

人缺一交頰出珠藥登只燕去史效共勝爲式母照卷餘

噎隔

此症有氣隔食隔酒隔痰隔蟲隔數種惟氣隔及老人

又隔食者難治然施治得法亦可愈也

凡患隔食或脹愈後必戒殺放生方免復發至要至要

牛涎丸專治隔食糯米粉以老牛口涎拌和爲小丸

煮熟食之神效或用牛涎和水服亦妙取牛涎法以水洗

淨老牛口用鹽塗之少頃涎自出愈後終身戒食牛肉

又方牛反草煎水服其效如神無論何項噎隔皆治牛

食百草之後必將所食之草吐出慢慢嚼食所食之草卽

名牛反草此草吐出復食最爲難得須令牧牛兒俟吐出

時故意搶奪隨搶隨還俟數日搶慣之後乘其不備搶著

走開即可得也若一搶即走牛必怒奪恐致傷人又方

鹿肚草用活鹿破腹取其陳倉米五年以外的方灶心

土以家中自取者水煎服五服後飲食如常再將陳倉米

熬湯當茶時飲一盞一月後永不復發如鹿肚草有多者

照方服十餘劑更妙鹿肚草難以驟得先飲陳倉米湯救

急免病加增再覓鹿肚草配藥服之可也無鹿肚草用牛

反草亦可又方猪肺管四兩鮮藕四兩如無鮮藕舊

羅底壹個麪鋪所用羅麪之黃絲以上三味新瓦上焙枯

研細用生姜壹兩搗爛取汁白沙糖壹兩冲服初服必吐

吐後再服服至叁次卽不吐矣服後忌食各色豆一月此
 方活人甚多神效莫測珍之寶之並忌食豆腐豆芽腐芋
 一月 又方 小兒胎髮一個以陰陽瓦焙焦存性研細
 末陳酒送下極效 又方 先用雄雞壹隻去毛與腸雜
 洗淨裝入大碗內上用紙數層封固飯上蒸熟取出用鵝
 管或小竹管將紙上戳破一孔插入以一頭含口中令熱
 氣冲入喉內其關自開預先取山羊糞一斗侵瓦罏內三
 日暑熱天只每日清晨用竹枝攪一次澄清取清水煎後
 藥服之如係酒隔用 葛花叁錢 雲苓各貳錢 製半夏各貳錢 陳
 皮錢半 甘草壹錢 ○氣隔用 烏藥 雲苓各貳錢 陳皮去

砂仁各壹錢 研去膜香附貳錢 酒炒製半夏錢半甘草八分○食隔用

神曲貳錢 炒山查肉炒雲苓各錢半陳皮八分 去白法夏壹錢甘草

八分 服叁劑後即思飲食屢試皆驗 又方 淨牛乳以當

面取者 為佳 少加白糖時時炖熱飲之凡患噎隔大便燥結者

服此必效 又方 驢尿黑驢 更佳乘熱飲貳叁合極效此尿

有毒不可過多病重者七日方效 又方 用平地或牆

邊人糞要乾結者 稀糞不用以向東者為佳取回用陰瓦上焙枯以烟

盡為 度 研末每服叁錢淡酒送下不過叁服即思飲食屢試

如神有起死回生之妙 又方 製黃蛆壹錢半 研末真細松

蘿茶七分 五厘廣木香壹分 五厘製豆蔻四分 五厘共研極細末五更時

腥數日雖水米不進者無不應驗 製黃蛆法用糞坑中

蛆愈大愈好撈出以長流水洗淨放瓦罐內鹽水和泥封

固木炭火燒一炷香久以蛆至黃色爲度如尙未黃入砂

鍋內再炒黃忌銅鉄器 又方 猪毛連粗皮及蹄尖不

拘多少晒極乾放淨石上用明火點之燒至如膏藥樣住

火冷定研極細末每服叁錢滾開水下此方年在五十內

者百發百中真仙方也 又方 荔支 壹枚 去核將蜒蚰

壹條查藥物 放荔枝肉內再糝好冰片 叁厘 於蜒蚰上卽

將荔枝裹好仍放殼內以線紮好病人含口內有冷涎水

滲出徐徐嚥下一時許蜒蚰化完無水滲出吐出只須一
次可以立進飲食 又方 用雞蛋內白皮四十九個加
胡椒壹斤入好燒酒蒸四十九日晒四十九次收貯磁瓶
遇有患隔食者每早以開水吞胡椒叁錢三次卽愈神效
又方 生薑不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸於
不見天之糞坑內四十九日取起用長流水洗淨懸空吊
晒極乾爲末病貳年者用姜末叁分病壹年者用姜末貳
分入射香壹厘滾開水冲服只須一服而愈忌葷腥鹽醬
五十日永不復發此方極效無比存心濟世者宜預製以
救人功德無量糞坑要無婦女大小便者方好 又方

對酒服壹貳錢數服卽愈痰隔氣隔均效 又方 山梔

五錢炒 酒冲服一服卽愈無論老少神效無比惟胃寒者

不宜 又方 逢日食時自初虧起用白乾麩二觔永調

揉熟向日和成丸如桂圓核大以日色復原爲止卽將麩

丸於是日晒乾收好按壹歲壹丸空心煮食平淡而有奇

功麩圓外實內虛尤爲奇異不可輕忽多製可以濟人價

廉功大不見日則不效 又方 生藕汁 生姜汁 梨

汁 甘蔗汁 蜂蜜 蘿蔔汁 白菓汁 竹瀝 各壹錢 和

勻飯上蒸熟隨意飲之 又方 韭汁 梨汁 姜汁

人乳各壹盞

飯上蒸熟服之三日後再服極效

又方 天

生泉水時時熬服極效

又方

白蜜滾水調服每服壹

兩數服自愈

又方

黑沙糖

壹觔

生姜

壹觔

共搗如泥

入磁罐封固埋乾燥地下七日取出每日調開水送下痰

隔食隔均極效

又方

做米糖舖內柞過頭造之糟

壹觔

加生姜

四兩

共搗爛做成薄餅晒乾磨末磁罐收貯每早

以開水調服貳錢其味最美可以代茶

又方

穀樹子

又名楮樹

煎水服因食甜物而噎隔者服此最效

又名構樹 一人噎隔飲食不下華陀見之云是蛇瘕用醋泡大蒜

汁陳者

飲二三碗並多食大蒜後吐大蛇一條而愈

方 泔逐木槌一把煨枯爲末酒調一鍾服下半日卽能
飲食此方救人無數不可輕視 又方 有肝旺脾弱食
卽嘔吐屢治不效者此木尅土也宜用平肝補氣之藥治
之必愈不可認爲噎隔也 又方 患此症者有蟲藏於
胸膈時長時縮長則飲食難進或食後少頃卽吐皆有蟲
也用靛青葉搗汁無葉卽用藍錠亦可兌淡酒飲之立愈百藥不效
者此方最爲神效 又方 此症胸前必有二小骨漸漸
交合則不能食而死取生鵝血對口乘熱灌之其骨自化
飲食可進永戒食鵝牛二物一僧患隔食病臨死語其徒
云胸中有物作梗死後必爲剖出其徒剖得一骨後殺鵝

血偶滴骨上骨卽消化其徒亦患此病因飲鵝血而愈屢
試如神

傷寒隔食

核桃十五枚放砂鍋內水侵核桃高壹指深煮四五滾取水

飲之

隔食初愈飲食宜少

凡隔食初愈飲食不可驟進須先以米湯飲二日再以清
清稀粥服一二日再以濃粥服一二日每次只可一小碗
俟七日方可食乾飯每食不過一小碗日漸遞加切不可
食飽緣胃氣初復驟然飽食反致傷胃則不可救矣卽病

人要食生氣亦須聽之愈後忌鹽醬五十日仍請名醫調

理

反胃嘔吐凡患嘔吐以上噎隔各方可以通治

生姜壹大塊直切薄片勿令斷層層摻鹽以綿扎緊外用粗

草紙七層包之水泡濕慢火煨熟取起搗爛和米煎服立

止又方生姜汁壹盃煎滾聽用蜂蜜四兩煉熟聽用每服用姜汁一

匙蜜二匙白湯調服每日五六次效又方胡椒八分

酒藥一個末葱頭五根搥融有熱用茶炒無熱酒炒貼心窩

又方用極大只壳兩半個去內穰將真阿魏六七分

杏仁十貳粒去皮尖共搗爛入只壳內將兩半壳合口外用棉帛

裹好線紮緊入滾水內大火煮半日取起去壳內藥將壳焙乾爲末燒酒送下重者不過二次卽愈 又方 真頭

道糯米酒娘去糟好醬油

各半酒盃

和勻溫服卽止嘔能進飲

食 又方 年久陳石灰炒研好醋爲丸如豆大每服七丸

姜湯下三日卽愈

又方

柿餅

拌乾飯蒸熟連食八

日不飲滴水極重者八日必愈屢試屢驗萬無一失 又

方 藕二枝陰乾三四日去其頭二三段單吃藕稍一段

吞汁吞渣 一日一段 二日服完卽愈

又方

甘蔗搗汁

壹升入生姜汁

貳合

溫熱作五次服甚效

又方

甘蔗搗

服凡積食久而反胃極重者三四次即愈 又方 每早

用滾開水兌冷水各半碗服之久服斷根 又方 用老

姜壹大塊挖孔納紅棗壹枚紅棗去核內包砂仁壹顆外

用黃泥包裹煨透去泥與姜棗只取砂仁嚼食每食數顆

數次即愈極效或將姜棗砂仁煎湯服之亦效胃寒者最

宜 又方 蚯蚓糞壹兩 木香叁錢 大黃七錢 為末每服

五錢無根水調服忌煎炒酒醋椒姜熱物一二服即愈其

效如神因熱而嘔泄者最宜

上吐下瀉此尋常吐瀉也如因暑熱吐瀉不止急照卷十五霍亂門治之

樟木煎水服立止屢試如神並治霍亂亦效 又方 韭

菜搗汁隔水炖熱微溫服極效 又方 陳鹽梅 壹個 瓦

上焙枯加生姜 壹大 同煎服屢試神驗 又方 一人腹

痛上吐下瀉服六和湯霍香正氣散平胃散理中湯皆不

效因思傷寒書云胸中有熱而嘔吐胃中有寒而腹痛用

黃連 吳萸炒透 黃芩 生白芍 甘草 黨參 乾姜 法

夏 陳皮 雲苓 煎服即愈 又方 小兒吐瀉不止

用舊鉄釘有銹者煎水飲入口即止

一吐氣味變酸

有人飲食一二日之後一齊吐出氣味變酸百藥不效用

者反由十兩熬

姜自然汁叁兩和勻成膏取起不時搥服含俟破腹下
尚吐連服三次全愈

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化

此名胃囊症生於胃旁其形如囊凡有飲食必入此囊雖
食飽而肚仍饑餓因此物閒隔於上飲食不能入腹故也
初起一二日一吐吐出食物並無氣味肉食則化米食不
化久則二四日一吐若至五六日一吐則難救矣用 製
附子五錢雲苓壹兩每日煎服二次服至三日吐出食物
必變氣味再服三日則吐一半再服三日則不吐矣不吐
之後用六味地黃湯見內外備用諸方加油當歸火麻仁研末煉

蜜為丸每早服五錢晚服芝蔴五錢服至數日後胃囊必
 從大便而出重者形如牛皮輕則如紙此病人多不知諸
 書不載方係仙傳萬金難得珍之寶之

朝食暮吐暮食朝吐

此腎虛也用

熟地

貳兩

山萸肉

叁兩

水五碗煎至一碗

加肉桂壹錢研末兌入空心服一日一劑十日必愈愈後
 服六味地黃丸一二料方可斷根

饑餓嘔吐

凡人饑餓每有蝟蟲上胃食物必吐若誤用翻胃之藥其
 吐更甚宜用川椒煎湯飲即安

乾嘔不出

此極惡之症用甘蔗汁加生姜汁和勻溫熱服

酒後乾嘔

甘蔗汁飲數次極效

食物下喉即吐

此腎水虧也用

熟地

貳兩

萸肉

叁兩

麥冬

叁錢

煎服連

服十劑即愈後服六味地黃丸一二料不致再發

見食即吐

此胃經嘔也紅棗

貳個

胡椒

貳粒打破

帛包煨過煎湯服

外用米

壹盃炒熟

酒藥

壹個

共研勻貼心窩

食後少頃即吐

其病在胡心窩

此胃脘有蟲也白馬尿飲壹貳升極效或照卷五蟲疾方

治之

嘔物不化

此大腸嘔也黃糖

酒藥

陳壁土共煎湯服外用酒藥

貳個半生半煨細茶

叁錢

艾葉

貳錢

共搗爛茶炒貼心窩

嘔吐清水

此胆經嘔也生姜

壹塊切開中挖壹孔

甘草

研末五分

入姜內帛裹合住

煨熟取姜內甘草入姜壹片煎湯服外用

蜡樹根

去粗皮

瓦上霜 路旁陳茅草

皂角灰共搗碎茶少貼心窩

後而不出

此小腸經嘔也楓樹皮甘草煎服外用燕子泥樟樹皮其

搗碎有熱用茶炒無熱用酒炒貼心窩又方車前子

燈心 栝木葉煎湯服又方如嘔後小便不利者

楓樹漿作膏用皂角灰糝上貼臍眼用燈火在喉下燒三

次

口吐白沫欲嘔而不出

此膀胱經嘔也菘豆 糯米 鹽其炒搗碎加黃糖煎服

又方 蚯蚓 胡椒 艾葉 皂角灰其研碎清油炒貼

心窩 又方 如嘔後氣不散者用艾葉搗碎醋炒貼心

窩

欲嘔而不嘔面發紅眼流淚

此三焦嘔也生藕

洗淨搗汁如無以藕節代

乳汁

乾柿蒂

抱雞壳

煎服神效

又方

桑樹皮

茶葉

四季葱共搗爛炒

熱貼心窩如二便不通加皂角灰黃糖水調貼肚臍

又

方黃豆

研

童便和勻貼心窩

又方

上不嘔下不瀉

如霍亂者用

菜豆

糯米

鹽胡椒

灶心土共為末

以刀燒紅將藥放刀上陰陽水冲服外川

甜酒糟

皂

角灰同炒貼心窩如不愈用針刺中指出血即愈

聞藥即吐百藥不效

取家中灶心土藥店買者不真則不效水爲丸塞兩鼻孔卽不吐矣

極效

嘔吐不能服藥必有虵在胸膈

川椒

十粒炒

煎服或於嘔吐藥中加川椒飲之

又方

陳

鹽梅貳個和滑石末交搗作餅昏包火上煨枯開水泡服

甚效

脾胃虛弱食不消化湯飲不下

粟米

半升

磨成粉水爲丸梧子大每用七粒煮熟入鹽少

許空心汁服或加醋吞服

又方

真橘皮

去白研末

五更

安五分於掌心舐之卽睡三日必愈

又方

大鯽魚壹條

去腸入皂礬未令滿泥包煨存性研末每米飲服壹錢日

貳服又方有人因服涼藥過多漸至嘔吐旬日之後

進口卽吐竟致粒米不下湯水亦吐已七日矣請醫診視

脉不散亂尙有神氣雖因寒涼而阻隔但絕食以來大便

不通小便短濇卽用製大黃枳壳各壹錢煎湯服之竟

不吐出亦不思食次日復進一劑下咽一時後大小便通

利而思食矣誠哉藥之對症其效如此

嘔吐痰水

見痰疾門

頭寒中欬心土真濕不燥水爲其寒兩鼻不吐矣

呃逆

偶然呃逆

紙燃通鼻取嚏即止

氣熱呃逆

柿蒂煎水飲即止

陰寒呃逆

乳香

疏黃

陳艾

各貳錢

為細末用好酒壹鍾煎數沸乘

熱氣使病人用鼻嗅之外用生姜擦胸前最效

雄黃

貳錢

燒酒

壹盞

煎七分急令病人嗅其熱氣即止

又方

川椒

去子及閉口者少四兩

麩糊為丸如桐子大每服十九

醋湯送下食遠服神效

又方

荔枝

七個連壳核燒枯研末

滾水

調下食遠服立止

又方黃蠟燒烟熏二三次即止

又方

砂仁

炒研

生姜連皮等分搗爛熱酒食遠泡服貳錢

神效

又方

刀豆子燒灰存性開水調服貳錢即止

體虛常呃逆二三聲

公丁香

七粒

白蓮子

去心貳十七個

二味同煮爛去滓加煨姜片

糯米

半升

煮粥食即止

呃逆日久不愈一連四五十聲者

用生姜搗汁壹合加蜜壹匙溫熱服

驗方新編卷之五

肚腹

腹痛辨症

腹痛各症應與傷寒門參看

臍眼上痛者食痛也臍眼下痛熱手按之不痛或其痛多急或痛如刀割或吐或瀉或痛甚而覺有冷氣皆寒痛也手按之更痛冷物熨之不痛或自下而痛上或時痛時止腹滿堅結皆熱痛也時發時止痛在一處而不移者或有塊硬起者虫痛痞痛也又聞煎炒食物香氣則痛痛時口吐清水或口渴者亦虫痛也

陰症腹痛

男女交合之後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹

疼痛腎囊俗謂卵脬內縮亦有不縮者手足灣屈紫黑重則牙

緊氣絕謂之陰症傷寒治法見卷十四傷寒門

寒症腹痛參看陰症傷寒各方

或炒鹽熨之或炒葱姜熨之或用熟灰熨之或用滾水一

壺隔布熨之均止痛好法也

又方 或飲胡椒湯加糖沖入不可加鹽或飲姜湯均妙

又方 龍眼連壳燒存性研末兌酒服屢試屢驗

又方 白芍參錢 甘草 肉桂各壹錢 水煎服此張仲景神

方也

肚腹容易受寒動輒疼痛不已甚至寒中三陰命在須臾

遲則難救此下部虛損真陽不足命門火弱故也有人肚

腹畏寒上貼附桂膏又加厚棉腰圍數層遇寒仍不濟事

一老醫以製附子五錢上肉桂五分研末兌服無乾姜壹

錢水煎連服十餘劑雖天寒肚腹亦不畏冷再加補中補

氣等藥調理全愈附子走而不守得乾姜則守而不走如

不信單用附子一味熬濃汁滴紙上水必散開加乾姜熬

之滴紙上則水不散矣用炮姜則不效此秘傳也 又方 九製

硫黃丸見內外備用諸方門服之神效

熱症腹痛

服六一散最妙或用銅鐵令物熨之或服痧藥亦可若痛甚者或嘔或瀉者照卷十五霍亂痧症各方治之又上吐下瀉而腹痛者如作霍亂痧症治之不效須照噎隔反胃門內上吐下瀉方治之

虫疾腹痛

虫痛如有塊硬起者用手在硬處久久揉擦揉至一日其虫卽死從大便而出或查痞疾門各方治之

大人小人腹中疳疾虫疾作痛及男婦痞塊癥瘕各

項肚腹脹痛

方見痞疾門

食滯腹痛

方見飲食滯積門

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便

短澁渾身絢緊手足腰膝痙硬不省人事

照卷十一內外備用諸方門內灸法治之最妙

忽然肚脹如鼓

此症肚腹猝脹漸大如鼓此寒極也遲則不救急用武營
烏鎗藥二錢爆竹藥功緩不效以頂好燒酒煎滾沖服得
吐瀉卽生非陡然脹大者不可誤用

腹中緊脹

腹硬如石痛如刀割見後痞疾門

白糖煮酒飲數次即愈

肚腹麻木

此風襲也多煮葱頭食之並用葱姜炒熟熨之自愈

忽然肚黑

凡肚皮忽然青黑色此乃血氣失養風寒得以乘之所變

怪形真危惡之敗症也若不速治難救急用大青

研細末每

服壹錢五分以好酒調下黑退即愈否則終危此起死回

生之方也

大青多生溪溝旁葉似火麻葉藥店多假生

草藥店有之又有小青葉細性味相同功力稍緩

又方 鉛粉和鹽炒焦敷之亦效

肚腹脹大亮如水晶

柚子皮燒灰冲服神效柚子兩廣最多他省頗少以橘紅

代之亦可 又方 取癩蝦蟆六隻將四足紮住以蝦蟆

肚皮在人肚腹光亮之處輕輕摩擦幾次再取一癩蝦蟆

照前摩擦用至六隻即愈但蝦蟆眉內有蟾酥須防其迸

出射人傷眼宜用紬帕遮住病人兩眼 蝦蟆用過之後即放水中使吐毒氣

以救其命至要至要

臍眼出膿

此症先流臭水久則出膿不腫不疼多年不愈用葦菜葉

扁栢葉二味共搗取汁一酒杯加童便一茶杯蒸熱服

外用蘆甘石

要能浮水者

用好醋泡一晝夜瓦上焙乾研末敷

如不見效當請明醫治之不可忽也

臍中出水

龍骨醋泡焙枯研敷或用

赤石脂研末敷均效或照上

臍中出膿方治之更妙

臍眼出血

方見諸血門

壯腹堅硬臍眼出虫

方見痞疾門

肚腹左右生癰

即腸癰也須照腸癰方治之

肚臍生癰

肚臍腫大如瓜臍眼高突者是紅赤者照癰毒各方治之
不紅不熱者照陰疽各方治之

小腹痛

生臍下一寸五分氣海穴或生二寸關元穴或生三寸丹
田穴皆由七情火鬱而生也分別紅白陰陽治之

小腸疽

生小腹內按之如掌堅硬而熱微痛小便多出汗畏寒皮

色如常或現微腫脉緊實而有力者是也服犀黃丸見陰疽門即愈此林屋山人秘法也

臍下二三寸關元丹田二穴冷結膀胱小腹有形滿

痛手足厥冷

此厥陰傷寒重症宜用仲景當歸四逆湯治之桂枝

當歸各貳錢芍藥參錢細辛參分通草壹錢五分甘草八分大棗貳枚水煎

服神效其人有久寒者加吳萸四分生姜壹錢酒一小盃兌服

腸胃中癢不可忍

此火鬱結不散所致用柴胡 梔子炒花粉各叁錢白芍

壹兩甘草壹錢煎服即愈

治疝古方

薏苡仁 壹兩

用東方壁土炒黃色入水煮爛放沙盆內研

成膏每用無灰酒調服貳錢卽消

痞積

凡腹內瘀血凝結疼痛時發時止謂之痞積又有形

者為癥無形者為瘕又久瘕不愈亦成痞積方見

瘕疾門

治痞諸方

消痞膏治積年惡痞至重貼至兩張即消屢試神驗

陀僧

陸兩

阿魏

五錢

羌活

水紅花子

各壹兩

穿山甲

叁錢

香油

壹觔

火候照常熬膏法膏成時下麝香

壹錢

用布照

痞大小攤貼凡患痞癥處肌膚定無毫毛須看準以筆圈

記用膏貼之內用水紅花子研末三錢燒酒貳觔泡之時

飲一杯痞消乃止水紅花子卽紅蓼花子以自取爲真藥

店多假用之不效蘇軾說川蜀寶無寧手煎香華以筆圖

又方人 莧菜不拘紅白均可十觔 洗去泥不必去根以河水煎湯兩

大鉢用活甲魚壹個 重十二三兩者不必切碎入莧菜湯

連骨煮爛如膏去渣將甲魚膏薄攤晒乾研末用麻油兩

熬至滴水成珠下甲魚膏末四兩 如甲魚膏不足以鉛粉

添配攪勻成膏收之用青布裱紙一層量塊大小攤貼七

日卽消重者貼至兩次永不再發屢試屢驗如欲詳文見

又方人 臭椿樹皮在上中者佳要一大束去粗皮止用白

皮貳觔 切碎入鍋內水熬瀝去渣用文武火熬成膏薄攤

布上先以生姜搓出垢膩後以膏藥在錫茶壺烘熱則瘡塊上其初微痛半日後卽不痛俟其自落一張卽好永不
再發貼膏時微撒麝香少許於膏上然後貼之貼上膏藥
週圍破壞出水卽驗此方已驗多人卽脹滿腹硬過臍者
貼一二張卽愈眞神方也珍之重之孕婦忌用

又方

雄黃

白礬

各壹兩

爲末麪糊調膏攤布上貼之俟

大便腹滿而極多者卽愈此秘方也

又方

香附

皂礬

各壹兩

二味拌勻分三分各用紙包外

用黃泥裹成團陰乾若有破裂再以泥補之候乾以大炭
火煨之自早至晚過夜冷透取中間不焦者去礬只有香

附為細末以棗肉為丸如菜豆大每早開水下一丸不思口輕不過三五服重不過七服即愈病自大便而下煨時忌一切人見並不可聞雞犬聲犯則傷人恐致火災切記

腹中陡然堅如鐵石痛如刀割晝夜呼號
牛膝 參兩 用好燒酒十兩泡之緊緊封好熬至二兩飲之

吐出惡物神效

腹中堅如鐵石臍內出水變作虫行之狀繞身作咬

痛癢難忍掃撥不盡

蒼朮煎濃湯洗之並用蒼朮 二錢 麝香 貳厘 滾水調服

婦人血蟲

馬鞭草及劉寄奴草煎湯服或爲末服此治血蠱神藥也

髮癥

好飲清油者是喉中如有虫上下亦是

白馬尿飲一二碗卽化或以雄黃末服之卽吐出也

方 有人腰痛牽心發則氣絕一明醫視之云是髮痕以

油灌之吐出一虫掛壁上滴盡血水乃一髮也又一婦人

胸膈脹悶口流涎沫自言心下有聲如雷後用膽礬壹分

爲末温酒送下吐出一虫剪斷視之乃一髮也又一人患

此服膽礬不效後服雄黃五錢清油半碗吐出一虫而愈

米瘕

好食生米者是

鷄糞糞要白者佳白米各叁錢同炒焦爲末煎水服吐出米汁卽愈

肉癥 常喜食肉者是

白馬尿飲二三碗當吐肉出不吐難治

虱癥

人好嚙虱致成虱癥用舊梳舊篦一件各破作兩分以一分燒研為末以一分煮水調末服即下出此孫真人千金方也

蛇癥

一人隔噎飲食不下華陀見之云是蛇癥用醋泡大蒜汁陳者佳飲二三碗並多食大蒜後吐一大蛇而愈又方

蜈蚣一條瓦上焙枯研末酒服甚效又方如因食蛇

肉不消者但揣心腹有蛇形用大黃芒硝合而用之
微泄卽愈又方白頸蚯蚓搗汁服之

龜鼈癥

腹中如有龜鼈疼痛堅硬或動或不動者用殭蠶末壹錢

白馬尿一二碗調服並敷痛處神效又方石灰窰中

流結土渣色紅而輕者佳菜子油調敷數日卽消又方鉛粉

肆分用黍米煮湯調服大效又方生硫黃末沖酒服

時服之又方白母雞一隻先餓一日用猪油炒飯與

食取其糞焙乾爲末水調服一錢日服三次數日必愈

又方生蝦煮食一日二次數日斷根

蛟龍癥

春秋二時蛟龍虺蛇蜥蜴之類遺精入芹菜中人偶食之
 得病發則似癩面色青黃肚腹脹滿痛不可忍用糯米
 糖時時服之服至數斤後吐出小虫即愈若吐虻虫勿服
 又方用明雄朴硝各五錢滾水調服泄瀉即愈又方
 糯米氣香梗米杏仁煉乳餅煮粥食日食三次吐蛟龍
 有兩頭可驗

腹脹面黃

有人腹脹面黃百藥不效遇一明醫云是石虻極難醫治
 取死人棺中枕煮水與服吐出虻虫堅如石者數升而愈

蠱疾

寸白虫疾

此症面色黃瘦飲食少進發時腹痛口吐清水用 尖栳

椰壹兩 廣木香五錢 研極細末大人每服五錢小人每服

叁錢 開水調下其虫即隨大便而出先用煎炒香味令病

人聞之然後服藥無不神驗服藥須在月初乃效病重者

二三服即愈 又方 連鬚老葱頭搗汁 麻油調服或炒

葱頭食能化虫為水 又方 榧子七個 日服二次服至

七日虫化為水 又方 鴨蛋壹個 破一小孔入使君子

肉末壹錢 栳榔末壹錢 用紙封口蒸熟食之虫隨大便而

出 又方 小兒科雜治門內羊尿膠方治疳疾最效並

治大人虫疾

虻虫上出口鼻

川椒

閉口者不用

研末冲水服即愈並用川椒含口中更妙

人聞之然對虫藥熟不輒銀銀藥與吞其味改效誠重者

開水調不其虫鳴咽大勇而出去虫煎炒香葱合飲

木香

正發

世避除末大人每服五錢小兒每服

此法而益黃與增食少蟲齧却則瘳口吐青水用尖

有人按白虫飛百藥不效遇一明醫云是石蛭極難醫治

備選

鼓脹

鼓脹

辨症凡患鼓脹隔食愈後必戒殺放生方免復發至要至要

手指按之下陷不起者水鼓也隨手即起者氣鼓也週身老黑色皮內有紫黑斑點者血鼓也身大熱如火者難治身發寒熱如瘡者難治四肢發黑者難治腸脹脉大命絕者難治唇口黑暗脾絕者難治缺盆平心絕者難治手足心平腎絕者難治肚臍翻突肺絕者難治背平肝絕者難治陰莖腫爛者難治瀉後身有青筋起者難治大便滑泄者難治週身有破皮者難治先起於四肢後散於腹者難治先起於腹後散於四肢者易治

治水鼓法

手按之下陷不起者是

雄猪肚

壹個去淨內穢

老絲瓜筋

半條

土狗子

又名螻蛄拾個

小黑公

牛糞一泡

紫背浮萍

壹兩

以上各藥其裝肚內以麻線

縫好放新沙鍋內加水須用桑柴火煮爛去淨浮油煮好

去藥將肚溫水洗淨竹刀切片仍入原湯中再加赤茯苓

苓皮大腹皮

生姜皮

廣陳皮

生桑白皮

各叁錢甘

透包

綿大戟

包

芫花

各貳錢醋炒

用文武火再熬數滾原

汁約有一大菜碗將藥去淨猪肚與汁分作二次或三次

服下聽其自利其水由大小便出其鼓立消服此之日務

須依法嚴忌鹽醬一百二十天為要每日用真秋石可代

水鼓小便不通

小便通者亦可治

大田螺

肆個去壳

大蒜

伍個去皮

車前子

貳錢研末

共為餅貼臍中以帶

縛定水從小便出漸消終身戒食田螺

又方

商陸根

葱白搗填臍中小便利腫自消

又方

甘遂末水調塗

肚腹週圍另煎生甘草湯服之其腫自消

日滿開鹽法

鯽魚

貳斤

食鹽

叁斤

共用黃泥包固白炭火煨一週時去

泥將魚同鹽研細用此鹽用完再食生鹽方保週身經絡

堅固永不復發

治氣鼓法

按之隨手即起者是

雄猪肚

壹個去穢

內裝大癩蝦蟆

壹個

大砂仁

壹兩研

老絲瓜筋

半條

破爛敗鼓皮

手大壹塊

紫背浮萍

壹兩炙焦

以麻線縫好入新

沙鍋內加水用桑柴火煎爛去淨浮油照前治水鼓煮法

煮好去藥將肚洗淨竹刀切片仍入原湯中再加真紫

油厚朴

台烏

各五錢

雞心檳榔

大腹皮

真沉香

枳

壳

醋炒各叁錢

芫花

醋炒

綿大戟

麩包煨

上梅片

研細

甘遂

麩包煨各

錢用文武火再熬數滾原汁約一大菜碗將藥去淨猪肚

與湯分作二三次服沉香梅片二味不宜見火臨服時拌

肚內食之服後以大便下白沫為驗其鼓即消嚴禁鹽醬

一百二十天日滿開鹽亦照前方服之此治氣鼓第一神

方不可輕忽 又方 鷄內金壹副 沉香 砂仁各壹錢 陳

香櫞伍錢去核 其為末每服一錢五分姜湯下神效 又方

大癩蝦蟆壹個 砂仁不拘多少 為末將砂仁裝幕內令滿縫口

黃泥封固炭火煨紅取出候冷將蟆研末作三服陳皮湯

送下以放底多為效二三服全愈 又方 蘿蔔子貳兩

研末再以生蘿蔔搗爛和子絞取汁將砂仁貳兩浸汁內

一宿撈起晒乾再浸再晒七次為度每服一錢為末米飲

調下神效 又方 姜汁炒遠志五錢水煎服下氣通即愈

治血鼓法 週身老黑色皮內有紫黑斑點者是

愈方新編 卷五 鼓脹 七

雄猪肚壹個去穢臟 茜草壹兩 雄鷄屎四兩炒焦 紫背浮萍壹兩 老絲

瓜筋半條 各藥共裝肚內用蒜線縫好照前水鼓煮法煮

好去藥將肚切片仍入原湯再加 螞蟻燒枯存性 乾漆叁錢 降

烟盡 炒虫蟲查藥物備要便知 真花蓋石研 真血竭各叁錢 紅花

香各五錢 甘遂麩包 綿大戟麩包 芫花醋炒各錢 照前文武火

煮好去藥食肚與湯分作二三次服服後以大便下黑水

數次為驗其鼓自消嚴禁鹽醬一百二十天滿口開鹽亦

照前方服之此治血鼓第一仙方不可輕忽方內螞蟻必

不可少俟病愈後照服螞蟻法解之見解救諸毒門

各種鼓脹

輕粉真錢

巴豆

四錢 去油

生硫黃

壹錢

共研成餅先以新綿一

片敷臍上次以藥餅當臍按之外用布拈緊如人行五六

里自瀉下候三五度除去藥餅以溫粥食之久患者隔日

方去藥餅愈後忌飲涼水此方治水鼓如神其餘鼓脹功

力稍緩 又方 凡水鼓氣鼓多食野水鴨最妙 又方

取葢屋稻草煎湯頃入盆內先坐盆上熏之待湯溫方洗

其腹小便隨下黃水熏洗數次永不發 又方 黃牛糞男

雄糞女用雌糞 陰乾微火焙黃為末每用一兩酒三碗煎

四五月取淨者 一碗瀝去糞渣止飲酒三服全愈 又方 公雞壹隻 用

大麥連喂四五日取下雞糞一升炒黃色好酒一瓶浸雞

糞煮作一碗漑去渣令病人吃一碗少時腹中氣大轉舒
作鳴從大便而出其腫漸消如利未盡再服一二次必然
盡消如泄利不止用田螺四個酒淬煮吃卽以溫粥食之
如腫消盡再用腎氣丸六君子湯和平之藥調理可也雞
屎善能逐水而又通土性無微不入將所蓄之水盡歸大
腸而洩此奪造化之奇誠萬金不傳之方也此治水鼓極
效別種鼓脹其功稍遲 又方 獨頭蒜一歲一個去皮
入頂好甜酒六七成對燒酒二三成以酒蓋過蒜爲度蒸
熟如夏月露一宿又溫熱用冬月乘熱連酒服完從大便
出虛氣卽下穢物其重自消一段余良不忌鹽醬真山片

也 又方 西瓜一個切去頂若是滿穰挖去穰三斤以
蒜瓣填滿將原頂蓋上放新沙鍋內再用新沙鍋合上蒸
熟瓜蒜與湯作二三次食盡全消不思鹽醬 又方 雄
豬肚壹個入大蒜四兩煮爛淡食五六個忌鹽醬醋百日
自消奇效 又方 烏魚貳觔壹條者去腸淨入皂礬貳
兩外用粗紙打溼包好入穀壳火內煨午時起子時止取
去紙灰骨只用淨魚皂礬研末收貯每服三錢老米湯下
此藥行而不泄最妙 又方 蘿蔔壹枚週圍鑽七孔入
巴豆七粒入土種之待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽
七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連

根拔起陰乾收淨磁器內遇鼓脹者取一枚搥碎煎湯服之重者二枚立愈有心人宜預種之

食物積滯腹脹如鼓

方見解毒諸毒門食犬馬肉腹脹方內服三錢

兩收肚腹脹滿飲食如常乃溼熱生虫之象

照虫疾各方治之

散取十種水腫

曰清水先從左右肋腫起根在肝大戟為君曰赤水先從

舌根腫起根在心葶藶子為君曰黃水從腰腹腫起根在

脾甘遂炒為君曰白水從脚重起根在脾

在外腎芫花

醋炒

為君⑦風水從四肢腫起根在骨澤瀉

為君⑧石水從腎腫起根在膀胱藁本為君⑨高水從小

腹腫起根在小腸巴豆

去油

為君⑩氣水或盛或衰起根

在腹紅飯豆為君有十般腫病各有根源看十種病根除

將君藥加倍用餘丸味

即以上各藥

等分研末蜜丸梧子大用

赤茯苓煎湯吞三丸不拘時每日三服愈後再用中肉桂

乾姜

肉豆蔻

赤茯苓

莪朮

醋煮

川芎

桔梗各

等分為末每服三錢空心開水下每日早午晚各一次百

發百中功效非常

又方

烏魚

又名柴魚

加蔥與冬瓜皮

煮食立消

又方

青頭雄鴨煮湯飲之或煮粥食之厚

蓋被睡卧取汗

上腫者方宜汗

即愈

本種氣日早子細谷一六

通身浮腫

取活癩蝦蟆壹隻以巴豆七粒用紙包好納入口中用繩

吊在有風無日之處陰乾剖開去紙將頭足分為五起肝腸

亦分為五起配勻收入磁瓶勿使洩氣臨用取出焙枯研末冲酒

服從頭吃起病從頭消從前兩足吃起病從兩手消從兩

後足吃起病從兩足消或不必分開亦可輕者一二日消

盡重者五日全消終身忌食蝦蟆此治浮腫秘傳第一神

方也珍之寶之忌鹽醬一百二十日各種鼓脹亦可治

又方 活鱧魚一條重七八兩去鱗將肚音開去腸淨了

好綠礬

伍分

松蘿茶

叁錢

男子用蒜八瓣婦人用蒜七瓣

共入魚腹內放磁器中蒸熟令病人喫魚連茶蒜食更妙

從頭吃起病從頭上消從尾上吃起卽從腳上消其效無

比 又方

一童子年十一手足臂腿及指頭面遍身浮

腫數日後漸至沉重氣喘不眠用黃皮柑子

壹個

同甜酒

娘貳觔煮至將乾去柑内核取柑連酒食之二次全愈此

林屋山人經驗方也

病後浮腫

老鴨加真川厚樸

貳錢

蒸食連食三隻卽愈神效體虛者

勿服

又方

蝦蟆

又名田雞水雞

五隻

或用七隻男單女雙

去皮並去頭

與腸雜

肝不去

先入碗內蒸熟再入瓦罐內加水半小碗煮

融加陳酒一杯

再煮先食湯後食蝦蟆不用鹽醬連食數

次必愈永戒食蝦蟆有人病後腿膝皆腫至夜更甚服此

而愈

此方... 蝦蟆... 雞... 瓦罐... 水... 鹽... 醬... 連... 食... 數... 次... 必... 愈... 永... 戒... 食... 蝦... 蟆... 有... 人... 病... 後... 腿... 膝... 皆... 腫... 至... 夜... 更... 甚... 服... 此... 而... 愈... 又... 方... 蝦... 蟆... 五... 隻... 或... 用... 七... 隻... 男... 單... 女... 雙... 去... 皮... 並... 去... 頭... 與... 腸... 雜... 肝... 不... 去... 先... 入... 碗... 內... 蒸... 熟... 再... 入... 瓦... 罐... 內... 加... 水... 半... 小... 碗... 煮... 融... 加... 陳... 酒... 一... 杯... 再... 煮... 先... 食... 湯... 後... 食... 蝦... 蟆... 不... 用... 鹽... 醬... 連... 食... 數... 次... 必... 愈... 永... 戒... 食... 蝦... 蟆... 有... 人... 病... 後... 腿... 膝... 皆... 腫... 至... 夜... 更... 甚... 服... 此... 而... 愈

脇部兩肋之下為脇者不可不知

左脇有聲作疼常嘔酸水

有人寫字作事身常向左夜愛飲酒睡亦向左飲食多墜

左邊久則左脇下有聲作痛數日必嘔酸水一次每遇暑

天右邊有汗左邊無汗百端醫治二十年不愈後用蒼

朮壹斤淘米水泡三日去皮研末芝蔴五錢用水煮錢研汁大棗五十枚去皮核共搗為丸

梧子大每日空心溫水送五十九丸漸加一二百丸忌食桃

李雀肉服至三月全愈初服時如覺熱燥用梔子煎水送

下久服自不燥矣

左脇鬱氣疼痛

加味逍遙散 柴胡 白朮 白芍 當歸 雲苓 各壹錢伍

丹皮 梔仁 各壹錢 薄荷 五分 水煎服神效

怒氣動肝寒熱旬日左脇凝聚作痛難以舒轉

此絡脉瘀痺宜通血絡 桃仁 去皮尖 鬱金 各八分 歸鬚

五加皮 澤蘭 丹皮 新絳 各壹錢 旋復花 貳錢 青葱管

三寸水煎服 左脇作痛 柴胡 枳壳 川芎 香附 各壹錢 陳皮

柴胡 疎肝散 柴胡 枳壳 川芎 香附 各壹錢 陳皮

白芍 甘草 各柒分 水煎服

右脇有形攻心作痛嘔吐清涎週身寒凜痛止則無

形跡

此寒入絡脉氣塞阻逆宜辛香温通
川棟子酒炒壹錢半夏

姜汁炒延胡索各壹錢吳萸叁分泡淡良姜煎服蒲黃各八分雲

苓貳錢葶撥壹錢水煎服

推氣散小薑黃壹錢枳壳各壹錢五分肉桂各壹錢甘草各壹錢水煎服

白芍肝燥脇痛或皮膚起泡

大栝萸壹個連皮搗爛甘草貳錢紅花柒分水煎服經云損其肝

者緩其中栝萸甘緩而潤於鬱不逆此所以奏功如神也

白栝兩脇不時作痛肺癰亦兩脇作痛應與肺部參看

總考新編 卷五 脇部

手

白芥子炒五錢研末白滾水下無論痛在左右雖年老虛弱

百藥不效者三服除根或照哮喘門第一方治之亦妙

又方黃枳壳甘草炙各等分爲末每服二錢以鹽煎葱

白湯調下極效

又方小茴香壹兩枳壳五錢其爲末每服二錢鹽酒調

服立效

脊脇痛連腰脊不能轉側

六味地黃丸見內外備用諸方加杜仲續斷或煎服或作丸服如

不見效用八味地黃丸見同前加小茴自愈壹錢半夏

脇痛腸出臭穢

錢

煎濃湯淋之皮自合口以羊腰煮粥食之十日即愈

脇下生瘡

紅腫者照癰毒治色白平塌者照陰疽治

脇下漏瘡形如牛眼膿水不止

用鹽少許放白牛耳內然後取牛耳中垢以敷瘡上即愈
如不用鹽則牛耳不癢其垢難取或分別紅白照癰毒陰
疽各方治之

兩脇脹滿

炒鹽布裏熨之

心腹疼痛與客者白滾水下無論痛在左右雖年老虛弱

可藥兩劑雖漸服除根或煎藥吼門第一方治之亦妙

既各代出客者甘草子各等分爲末每服三錢以鹽煎服

取不用煎服其不藥其吐瀉如短長限珠白照藥毒到

風鹽少補效自若再內然發如寒在申請以煖飲土嚼取

服之細不鹹發汗取半則凱水不出

除頭昏眼腫毒宿食吐瀉服清眼劍取

六味細于主煎加杜仲續斷或煎服或作丸服如

幾煎豐長林之史自合口以羊翅煮滿食之十日即愈

汶酒煮燒枳殼細細出樓日必入用真事藥一沐沐五

背部

發背治法

參看癰毒陰疽各門

發背乃癰疽中大患緣其患位對心對肺對臍故也偏曰搭手因手可搭而名紅腫痛甚者應稱背癰易治如患色白腫痛者當以流注法治如平塌不痛者當以陰疽法治此皆陰發背也如悞服寒劑悞敷涼藥悞貼涼膏定然毒攻內腑不救此林屋山人秘法也

背癰諸方

牛皮膠

四兩

蒸化好酒兌服不飲酒者滾水兌服初起服

此毒不內攻不傳惡症

驗方新編

卷五

背部

三

又方 未成者用活癩蝦蟆壹個繫放瘡上半日蝦蟆受

毒必死取放水中吐出毒氣復活再換一個仍如前法換

至三四個後則毒散矣屢試極效若勢重者以活癩蝦蟆

一個或二三個破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞

再換二三次即愈並治一切癰毒屢試如神終身戒食蝦

蟆 又方 芝蔴油壹黃丹八兩宮粉壹槐枝數寸頭髮

壹團洗淨五七個銅綠伍錢將油燒滾入釘熬數滾去釘

入槐枝熬枯去之入髮熬焦又去之入丹粉銅綠熬成膏

置水中隔夜取出貼之其效如神百無一失

又方 栝藁五枚取子去壳真乳香五塊如棗大者共研細末以白蜜一

角同熬成膏每服三錢溫黃酒化服相宜
癱百藥不效後夢呂仙授此方服之而愈

壯本背熱如火腰痛久則寒冷此藥壯精骨補元陽利大

此虛火也生附子研末口水調敷兩足心

去青鹽以上各核桃又名破故紙鹽炒小茴香各壹共為

末用猪腰子一對剝開去白膜入藥在內札住再用麪包

裹好燒爛去藥取渣煎服一個酒送下

按字脊熱和茶炒食以酒送下甚效又方羊腰一對

杜仲炒蒸服酒下或用

高藥包火

必死取放水申吐毒氣復活再換一個仍如前法換
至三四個後則毒散矣屢試極效若勢重者以活癩蟻蟻

同皮屑建土兵先合倉上不久必臭不可用

再換二三次即愈並治一切癩毒屢試如神終身戒食蝦

又方 芝蔴油壹黃丹入兩宮粉壹槐枝數寸頭髮

此藥火也主抽子刊末口水調敷兩或水打終敷氣去打

背熱或火之入髮熬焦又去之入丹粉銅綠熬成膏

百藥不效或蔓呂山或批衣脚文面愈失

同然丸膏每服三錢盛黃或山或脚文面愈失

又腰部

腎虛腰痛

壯本丹丸腎虛腰痛久則寒冷此藥壯精骨補元陽利大

小便養丹田功效甚大肉菘蓉酒洗杜仲酒洗巴戟酒

去青鹽以上各核桃又名胡桃破故紙鹽炒小茴香各壹共為

末用猪腰子一對剖開去白膜入藥在內札住再用麩包

緊入火內燒熟去藥與麩每服一個酒送下又方青

殺羊脊髓和蒜炒食以酒送下甚效又方羊腰一對

去白筋切片以鹽醃去腥水入杜仲參錢蒸服酒下或用

荷葉包火中煨食亦可又方猪腰子破開去入小茴

香末

叁錢

紫緊麪包煨熟去藥與麪食之甚效

又方

猪腰

壹對洗淨破開去白筋

真茯苓

貳錢

切片夾入蒸出自然汁

用不

水放連腰食盡其效如神又方其白扁豆根洗淨不拘多

少酒煮服立驗並可斷根

末用腎虛腰痛脚軟

開去白熱入藥內掛再用豉

板粟

要扁的

布袋裝好掛有風處陰乾

次日翻動數每早取

七個細細嚼食再以猪腰子煮粥食之必強健

又方杜仲

壹兩

半水半酒煎大盞服之三日能行七日

全愈

腎虛

又方暗七製故紙丸

見內外備用諸方門服之神效無比

閃跌毆打腰痛

三仙散 羅裙帶葉

葉長二尺餘花梗長二三尺不等花如龍爪四圍下垂又名龍爪花與金

針花相似而畧大顏色或紅或白

杉木皮

槐樹皮各等分煎水熱洗其

渣搗融炒熱布包敷之冷則隨換日夜不斷有人閃跌傷

腰筋已結縮成團多年不愈以此敷洗筋即舒散數次平

復 又方 生軍散先以葱白搗爛炒熱將痛處擦遍隨

以生大黃研末姜汁調敷蓋以粗紙一日一換盡量飲以

好酒三日即愈年餘不愈者皆極神效並治閃跌內傷肩

挑重物受傷初時不覺日久忽然疼痛浮面按之不痛或

咳嗽牽扯作痛三五年不愈者用此亦效 又方 真礪

砂研極細用燈心點眼精四角淚出即鬆連點三次全愈

又方壹錢真橙子核五分製香附壹錢炒研為末酒服三錢

極效又方白葡萄乾壹兩用好酒煎服至重者兩服

全愈大黃而末益以酥丸一日一餅盡量煨以

脾溼腰痛

腰痛人皆以為腎之病也不知非腎乃脾溼之故腰間如

繫重物法當去腰臍之溼則腰痛自除白朮薏仁

壹兩水三碗煎湯一碗一氣飲之一服病即如失多以二

劑為止此方不治腎而正所以治腎也人參薤仁

腰腿風溼冷痛

人參薤仁

當歸 熟地 白芍 牛膝 石斛 茯苓各壹錢 川芎

木瓜 肉桂 防風 獨活各五分 木香 炙草各叁分 姜壹

片水煎兌酒服雖年久不愈亦效 又方 吳茱萸壹茶盃研

末以黃酒一杯拌勻炒熱攤油紙上敷患處用布捆好立

時止痛如冷再炒再敷

男婦腰痛如刺面腫面黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕

又痰涎腰痛不能行 風濕效驗

鹿角四兩剉屑炒黃為末酒下貳錢加牛膝為丸更效或用七

製故紙見內外備用諸方門方可斷根 又方 絲瓜

各種腰痛 又方 木瓜

診方新扁 卷五 腰痛 三

當歸 紅花

牛膝

各壹錢

威靈仙

五分

生桃仁

七粒

水一

碗煎好加老黃醋一碗服下即愈

又方

絲瓜根

又各木瓜

線瓜又名燒灰存性每服二錢酒下雖痛不可忍者可以立止

又方 葱白豆壳燒灰沖酒服極效神驗

纏腰丹

藥味陳面甄面黑屎血鼠蔥燙茶齒林聖藥

方見癰毒諸症門再燒也

不知非腎乃脾之故腰間如

腰疼痛牽心氣絕欲死

此藥神效

方見痞疾門髮癥方人不愈

此藥神效

當歸 鴨 燕 鹿 虎 白 芥 牛 麩 不 鐵 芥 芥 川 芎