

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇一六・子部・醫家類

瘍醫大全四十卷（卷三十九、卷四十）〔清〕顧世澄撰……………一

瘍科臨證心得集三卷方彙三卷方彙補遺一卷家用膏丹丸散方一卷〔清〕高秉鈞撰

景岳新方歌一卷〔清〕高秉鈞 吳辰燦 姚志仁撰……………七七

外科證治全書五卷末一卷〔清〕許克昌 畢 法輯……………二六七

外證醫案彙編四卷〔清〕余景和撰……………四三五

解圍元藪四卷〔明〕沈之問輯……………五六九

外科灰餘集二卷〔清〕程國彭撰……………六五九

癰科全書一卷〔清〕梁希曾撰……………六八七

損傷科一卷〔清〕霍孔昭撰……………六九九

瘍醫大全目錄

卷三十九

救急部

解救砒霜門主論 附方

救誤服蒙汗藥門主論 附方

救誤服酒毒門主論 附方

救誤服銀焮門主方

救誤服水銀門主方

救誤吞五金門主方

救誤吞針門主方

誤吞諸木竹釵門主方

救誤吞磁鋒門主方

救誤服銀粉門主論 附方

解誤服銀硃騰黃門主方

驗中蠱毒門主論 附方

解中斷腸草毒門主論

解中藥毒門主論 附方

解服鹽鹵門主論 附方

瘍醫大全 卷三十九 目錄 一 顧氏私書

中飲食門主論 附方

解燒酒毒門主論 附方

解中煤炭毒門主方

解中閉口椒毒門主方

救誤食桐油毒門主方

救誤吞田螺門主方

救誤吞桃李門主方

救誤食猪骨門主方

救誤吞雞骨門主方

救誤中猪肉毒門主方

救誤吞頭髮門主方

救誤吞蜈蚣門主方

救誤吞螞蝗門主論 附方

救誤中蛇虺百蟲毒門主方

解中蜈蚣毒門主方

解中蜘蛛毒門主方

解中蚯蚓毒門主方

解中蠱牛肉毒門主論 附方

瘍醫大全 卷三十九 目錄 二 顧氏私書

解中馬肉門主方

解中犬馬肉門主方

解中河豚毒門主論 附方

解食魚中毒門主方

解食黃鱔魚毒門主方

解誤食毒蟹毒門主方

解中蟹毒門主論

解中野菌地蕈靈芝毒門主論

解荳腐毒門主方

湯醫大全

卷三十九

目錄

三

顧氏秘書

解麪毒門主方

解中白菓毒門主方

解中輕粉毒門主方

救六畜瘟疫法

解中櫻桃毒門主方

湯醫大全卷三十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

精錄之柏泉

男 標燮用和 全校

救急部

凡解一切中毒以及誤吞金石虫蟄等證俱彙於此部中以便檢閱恭治

湯醫大全

卷三十九

解救砒霜論

顧氏秘書

解救砒霜門主論

雷直君曰世人有服砒霜之毒五臟欲裂者腹必大痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也急用瀉毒神丹飲之如立時大瀉則生否則死矣此砒毒已入於臟非可用羊血生甘草上吐能愈特又變下法救之飲之如不瀉此腸已斷矣又何救乎倘用之早未有不生者不可執吐法而無變通若初飲砒霜但飲甘草羊血立吐而愈如不吐速用瀉毒神丹瀉之則無不救矣 活人錄

凡中砒毒其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐
面色青黑四肢極冷者是

凡服砒人不可仰臥恐毒流四肢難治愈後須忌百

日烟酒姜椒煎炒 願德集

凡中信毒因氣惱自服者急用香油一碗灌之或吐

或下即活若係酒調者難救其毒發散於週身也

陳遠公曰服砒毒欲死若不急救必腐腸胃吐紫

血而死蓋砒石乃天生之石不會經火煨煉何毒

至此不知砒石生南岳之山鍾南山火毒又經火

傷醫大全 卷三十九 解救砒霜論 二 顧氏秘書

氣則其性大熱有火毒加之大熱酷烈之至安得

不殺人哉性又善走砒石下喉必升降於腸胃之

上下往來數十次腸剝皮穿人乃死矣疼欲死者

正毒氣上下攻也毒藥之橫莫此為甚治法必吐

出其毒然不能盡出其毒也必用解毒之味但初

下喉以羊血吐之亦有能生之者食久入胃則無

益矣宜用救死丹久暫皆可救用生甘草一兩元

參二兩地榆五錢瓜蒂七箇水煎下喉即吐煮渣

服之又吐砒毒全解矣 甘草解毒得瓜蒂必上涌

而吐砒能上升故引之盡

出也然砒又下行得元參地榆解大腸之火毒砒
之大毒已從上而出走下者亦餘毒耳得二味解
之則上下共相解紛毒又何能施其燥裂哉况元
榆俱潤中解毒所以能制毒也此方十可活八若
不吐者此腸胃已壞不可救矣非方不效也倘藥
不及煎於飯粥中煮灌之庶不至因循失救也

傷醫大全 卷三十九 解救砒霜論 三 顧氏秘書

解救砒霜門主方

解信毒法 願體集

速取梁上燕子窠用井水三四大碗放水桶內將手多攪調之用夏布手巾如榨腐法濾去泥葉取所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醒
初中砒毒 雷真君活人錄吐法

生甘草叁兩急煎湯加羊血半碗和勻飲之立吐即愈飲之不吐速用下法

瀉毒神丹 雷真君活人錄下法

湯醫大全 卷三十九 解救砒霜方 四 顧氏秘書

當歸 三兩 大黃 一兩 白礬 一兩

生甘草 五錢

水煎湯數碗飲之立時大瀉則生否則死矣

又方

黑鉛一兩磨水灌之

凡中砒霜一切毒藥垂死者

急用上號潔白糖靛花淡荳豉甘草各等分研勻冷水調灌即甦

又方

無名異 即漆匠用者 和生雞蛋清攪勻服之

又方

陳壁土攪水灌之

又方

急飲人溺及人糞汁或金汁灌之

又方

虎耳草葉洗淨搗汁攪冷水灌之

又方

牙硝不拘多少研末冷水調下

湯醫大全 卷三十九 解救砒霜方 五 顧氏秘書

又方

生鴨血灌之

又方

小薊根搗汁灌之

又方

大黃明礬研末新汲水調灌之得吐利即解

誤中砒毒橫身紫紫百解不效此名砒霜紫瘡

黃土地上挖一斗大坑以井水滿之攪令渾濁以

一碗與之少刻又與之待渾身紫紫俱散一吐即

甦雖冬月間亦宜用此法必效

解砒霜及一切草藥六畜肉中毒

白花糯米經過霜者生收晒乾研末用新汲水調服三錢

又方

直萊豆粉 黃土 各四兩

研極細用生雞蛋清九個共一處以浸萊豆冷水和稀服之即解若有黑羊血再灌碗許更妙

又方

傷醫大全

卷三十九 解救砒霜方

六 顧氏秘書

天竺菓煎服如無取根搗汁煎服亦可

又方

明礬三錢研末冷水攪勻送下一吐即愈

又方未盡用萊豆甘草夏枯草煎湯冷服

生漆搗子瓦上煉存性研末滾湯沖服五分

救誤服蒙汗藥門主論

蒙汗藥大約用天仙子為君加入狐心等物雖不殺人然令人迷而不醒山東村店多乘心迷以取財物醒來全不記憶恍惚不能辨別所以道途誤服蒙汗藥以致頭重足輕口吐涎沫目矇不言此迷心之故也雖不殺人久迷不醒亦可畏人以凉水解之亦能少甦但凉水入心水停心下倘虛人必變他症

或曰此症必是痰迷心竅宜以生姜開之投以姜汁

傷醫大全

卷三十九 蒙汗藥論

七 顧氏秘書

乎殊不知藥中天仙子居多得姜則愈迷其心矣故不可用也

解誤服蒙汗藥門主方

止迷湯

白茯苓 五錢 生甘草 三錢 瓜蒂 七個

陳皮 五分

水煎服即大吐而醒其從前事斷不遺忘不似涼水之解如醉如癡也

又方

飲冷水即安

醫方大全 卷三十九 蒙汗藥方 八 顧氏

救飲鳩酒毒門主論

凡飲鳩酒白眼朝天身發寒戰忽忽不知大醉之狀心中明白但不能言至目閉即死夫鳩毒乃鳩鳥之糞非鳩之羽毛亦非鶴頂紅也鳩羽與鶴頂紅皆不能殺人不遇生病惟鳩糞則毒此鳥出異國異國人恐言鳥糞則人必賤之故但言鳩以貴重之也此鳥非蛇蝎不食故毒甚於孔雀之糞孔雀糞冲酒飲有死有不死者而飲鳩則無不死也益鳩毒性熱功緩善閉人氣所以不能言發寒戰者

醫方大全 卷三十九 鳩酒毒論 九 顧氏秘書



救飲鴆酒毒門主方

消鴆

金銀花

八兩煎取
汁二碗入

白礬

寒水石

天花粉

各三錢

石菖蒲 二錢

麥冬 五錢

全煎灌之一時後目不上視口即能言矣再照方減半煎湯二劑全愈

傷醫大全

卷三十九

鴆酒毒方

十一

顧氏秘書

救誤服銀焰門主方

驗方

濃煎烏梅湯灌之即解

又方

黃泥水服兩茶鍾即解

傷醫大全

卷三十九

誤服銀焰方

十二

顧氏秘書

救誤服水銀門主方

驗方

揀開口花椒二兩吞下即畏水銀從大便出

傷醫大全

卷三十九

誤吞水銀方

三

顧氏秘書

救誤吞五金門主方

誤吞金銀銅鐵錫

蠶豆炒研末砂糖調服其物從大便出

又方

猪板油全青菜煮食自出

吞金 丹方

羊脛骨燒焦研末參錢米飲調下從大便出

吞鐵物 丹方

栗樹炭二塊將鐵錘搗極細砂糖和細丸米飲送

傷醫大全

卷三十九

誤吞五金方

三

顧氏秘書

下三錢立出

吞銅錢

羊脛灰煮粥食之

吞銅錢或銅

多嚼生葶藶食之自化

吞金

紅棗煮爛不時食之金從大便自出

吞金銀銅錫

先飲生鴨血杯許再多食炒蠶豈不切熟韭菜其

物即從大便畏出

吞鐵

艾蒿一把判以水五升煮取一升頓服即下

吞錢在喉不出

楚炭末指彈入喉中其兒當即咯出

吞釘及箭金針鐵

多食肥羊肉及諸肥肉自畏出

吞金環及釵

飴糖一觔一頓漸漸食盡多食之環及釵便出

傷醫大全

卷三十九

誤吞五金方

十四

顧氏秘書

知是服金屑死而未絕者

水銀一兩灌口中搖動令下咽喉入腹金即消滅

成泥而出

解金銀銅鐵毒

鴨尿汁解之

一人以銅條兩個作戲法由鼻孔進而從口出忽一

日銅條滑入腦中奇癢難忍無法可救黃公曰尔

磕我三百個頭我當救尔其价即連磕其頭叩未

百餘其銅條從鼻出此亦聰明人慧心智囊耳

吞錢

桑柴燒灰研末米飲調服二錢

又方

菘豆粉冷水調服三錢

又方

多服飴糖

誤吞金銀銅鐵

砂糖同砂仁煎濃湯多服自下

傷醫大全

卷三十九

誤吞五金方

十五

顧氏秘書

救誤吞針門主方

吞針入腹

蠶豆煮熟同生韭菜食之針從大便而出

又方

櫟炭末井水調服三錢

又方

蝦蟇眼睛一對冷水送下針穿眼內而出

桑根下尋

又方

傷醫大全

卷三十九 誤吞針方

共

顧氏秘書

黑砂糖和黃泥為丸吞下泥即裹針在大便中出

誤吞針刺咽中痛者

亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外以

湯浸濕急吞下咽頃刻扯出其針必刺於麻中而

出如一回不中節再吞再扯

又方

雄磁石研末水丸如櫻桃大吞下即服通利之藥

針從大便而出

針入咽喉無藥可施

癩蝦蟇數個將頭剝去倒垂流血以酥接之得一

盃許灌入喉中移時連針吐出針自軟曲

又方

舊磁石煨存性研末每服三錢酒調服亦能化鐵

又方

將半生半熟出芽蠶豆搗爛以韭汁為丸吞下

又方

磁石如棗核大吞之其鍼立出

又方

傷醫大全

卷三十九 誤吞針方

共

顧氏秘書

磁石研細將黃蠟和攪如針大小涼水下吞針從

大便出

誤吞諸木竹釵門主方

驗方

取剪刀故鋸燒赤入漬酒中以女人大指甲二枚
燒存性研末和服

吞桃枝竹杖

但口中數數多食白糖自消去

木屑噎喉

鐵斧磨汁灌之

竹絲鯁

湯醫大全

卷三十九

誤吞諸木竹釵方

末

顧氏秘書

不拘黑白芝麻炒熟泡湯飲再以乾芝麻嚼服幾
口或以生芝麻搗爛嚼食

救誤吞磁鋒門主方

驗方

生紅蘿蔔搗爛吞下其磁鋒即從大便而出

湯醫大全

卷三十九

誤吞磁鋒方

末

顧氏秘書

解誤服銀粉門主論

凡服鉛粉者非婦女角口憤不欲生冀其鉛能墜腸而殞更有婦女打胎服之不惟不效每致求生不得欲死不能且生子多癡呆身體發瘡毒更有因服銀粉錯筋入骨老來遍身筋骨疼痛無法可療此故自取之也深可憫焉特立此門救之新增其見證面色呈青腹中墜痛欲死者是

楊醫大全

卷三十九

誤服銀粉論

三

顧氏秘傳

解誤服銀粉門主方

驗方

麻油 黃蜜 紅紗糖

攪勻服之

又方

多食生薑即解

又方

香油灌之即解

又方

急搗蘿蔔汁飲之

楊醫大全

卷三十九

誤服銀粉論

三

顧氏秘傳

解誤服銀硃騰黃門主方

驗方

薤菜水溫服即解

傷醫大全

卷三十九

誤服銀硃方

三

顧氏秘書

驗中蠱毒門主論

令病人朝取井華水唾水中唾如柱直下沉者是蠱也浮者非蠱也 三四

中蠱者大便黑如漆或堅或薄或微赤者是蠱也 金千

孫直人曰凡中蠱毒嚼白礬不瀉而味反甘嚼生黑

豆不腥者是

若含甘草而不吐者非蠱也 微今鐸

遜齋閑覽云海南魚有石首蓋魚枕也取其石為器

可盛飲食如遇蠱毒器必裂其效甚著聞人製作

傷醫大全

卷三十九

驗中蠱毒論

三

顧氏秘書

最精人但玩其色而鮮有識其用者

又曰唾津在淨水中沉即是浮則非

又曰口含大豆中蠱者豈即脹而皮脫無蠱者豆雖

脹皮不脫

又曰煮雞蛋一枚去殼以銀簪一隻插入蛋中併含

入口內一飲之頃取視簪卵俱黑即為中蠱

訣曰脉緊數如斂股弦直而吐甚者即中蠱也急治

之

又曰脉洪大者生微細者死

陳遠公曰有遊兩粵與女人交好或與男子成讐下
蠱於飲食之中食之則兩目漸黃飲食倦怠一年
三載無藥解之必致暴亡世傳造蠱土人各將毒
虫與蛇蝎等物共投缸內彼此相食食完止存一
物不死者取為蠱母此訛傳也蓋彼地別有蠱藥
乃天生之毒也土人治此症有方可解大約用礬
石化蠱恐外人知之故秘不言礬石消痰又善化
堅蠱積腹中內必堅硬而外以痰包之所以一物
二用奏功頗神惟人身柔弱者多強健者少而蠱
瘍醫大全 卷三十九 驗中蠱母方 舌 顧氏秘書

結胸腹間必正氣大虛倘用礬石不更虛其虛乎
必於補氣血之中加消痰化蠱之味有益無損始
稱萬全也宜破蠱全生湯

解中蠱毒門主方

治中蠱毒

濃煎石榴皮汁飲之使吐惡毒

又方

熱茶化膽礬半分服之令吐

又方

米飲調礬金末三錢服之

又方

微今鐸 先取炙甘草一寸嚼之嚙汁若中毒隨即吐出仍

瘍醫大全

卷三十九 解中蠱母方 舌 顧氏秘書

以炙甘草三兩生姜四兩水六升煮二升日三服

若嚼甘草不吐則非蠱也

又方

范石湖文集

昔李燾為雷州推官得治蠱方毒在上用升麻吐
之毒在腹用礬金下之或合二味服之不吐則瀉
活人甚多

破蠱全生湯

人參

當歸 各一兩 白礬

生甘草 半 夏 各三錢 白茯苓 五錢

水煎服

傷醫大全

卷三十九

解毒藥方

三

顧氏秘傳

解中斷腸草毒門主論

人有服斷腸草者初則胸中隱隱作痛久則氣不能通及至腹痛二便俱不能出而死此草即鉤吻也至陰之物狀似黃精葉如毛鉤子二個此草喜閉氣尤使血不行氣血閉塞致爾人死非腸斷也聞廣間多生此草婦女小忿往往短見食之竟死如飴以其不大苦楚也有用羊血灌之得吐則生然亦有不吐者往往不救此草殺人甚緩用解毒通利之味無不生者不似砒之酷也宜通腸解毒湯

水鑑

傷醫大全

卷三十九

斷腸草毒論

三

顧氏秘傳

解中斷腸草毒門主方

誤中斷腸草卽珍珠蘭之類又名水莽藤毒

生雞蛋三四個打開灌之

又方

黑豆 一杯研 生甘草 五錢

煎濃汁服之登時卽解

又方

白礬化水解之

又方

傷醫大全

卷三十九

斷腸草毒方

手

顧氏秘書

熱羊血灌碗許以吐盡惡物自甦

又方

冬青樹葉冷水搗汁服下卽解

又方

雞抱雛卵劈開以清油調勻灌之

通腸解毒湯

金銀花

生甘草 各一兩 大黃 一錢

水煎服一瀉而愈

救中藥毒門主論

凡中草烏川烏天雄附子毒則心煩躁悶甚則頭岑岑然遍身皆黑必死 入門

凡服藥過多生出毒病頭腫如斗唇裂流血或心口

飽悶或膈腹撮痛皆中藥毒也

脉訣曰人中百藥毒傷其脉洪大者生微細者死

又曰洪大而遲者生微細而數者死

凡解藥毒湯劑不可熱服宜涼飲之蓋毒得熱則勢愈盛也然此特以中熱毒爲言耳若解木鱉菌蕈

傷醫大全

卷三十九

救中藥毒方

手

顧氏秘書

黃連石膏之類而中陰毒者豈仍避熱而猶堪以寒飲乎

救中藥毒門主方

凡中相反藥毒面青脉絕腹脹吐血

蠶退紙即出過燒灰研一錢冷水調服雖危可活

中草烏川烏天雄附子毒入門

煎萊豆黑豆汁冷服之黑豆即馬料豆

又方

甘草黑豆濃煎飲汁

又方

防風甘草湯冷飲之入口即定

湯醫大全

卷三十九 救中藥毒方

顧氏秘書

川椒毒戟人咽喉氣閉欲絕入門

嗅大棗三枚解之

多服摩角則令人煩入門

麝香一字調水飲之

解百藥毒

萊豆研開甘草全煎服

誤服巴豆口渴面赤五心煩熱泄不止者

川黃連一錢煎服立解

又方

石膏蒲汁立解

又方

小豆汁立解

又方

薑汁立解

又方

大豆汁立解

皂礬毒

急取麵糊一鉢服之

湯醫大全

卷三十九 救中藥毒方

三

顧氏秘書

附子天雄斑毛毒

單用馬料豆煎汁服

凡敷搽藥內有砒霜患處作痛或腐潰者

用濕泥頻塗換之若毒氣入腹胸膈苦楚或作吐

瀉冷飲米醋一二杯即止多亦不妨生菜豆末蘇

油調服亦可

敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉

防已煎湯解之

服川烏草烏等藥悶亂流涎或昏憤嘔吐或吐血下

血

大黑豆遠志肉防風甘草任用一味煎湯解之大
凡服風藥過多皆宜用之如不應急用生姜汁甘
草解之

敷貼巴豆患處作痛肌肉潰爛

生黃連為末水調敷之即解 若毒入內吐瀉等
症更以水調服一二錢或大小豆莖滿汁皆可

敷貼藜蘆毒入內

煎葱湯解之

湯醫大全

卷三十九

救中藥毒方

三

顧氏秘書

解諸藥毒

生薑汁灌之

又方

薺苳汁解之

又方

白扁豆汁解之

又方

錫糖汁解之

又方

米糖汁解之

解一切藥草中毒

濃煎甘草飲之無不生也又食少蜜更佳

湯醫大全

卷三十九

救中藥毒方

三

顧氏秘書

解服鹽瀉門主論

服鹽瀉者口鹹作渴腹痛身踈足縮而死夫鹽能補腎何便殺人不知鹽瀉味苦苦先入心心過鹽瀉氣滯不通瀉見心不受乃犯於腎腎見味苦又不受遂往來心腎之間心腎之氣交相滯而瀉流入於腸則不可救矣夫大小腸最惡鹽瀉入之必縮小其腸而成結結則氣不通安得不踈曲而死乎治法以甘草湯解之

湯醫大全

卷三十九

解服鹽瀉論

三

顧氏秘書

解服鹽瀉門主方

驗方

急搗肥皂汁和水灌之即吐如吐未盡用熱豆腐漿灌之即吐腐形如不吐以鷲翎絞喉數次必吐

甘草湯

生甘草 三兩

煎湯救之如瀉未久加淡豆豉一兩全煎服之腸潤未必皆死要在活用之耳

又方

湯醫大全

卷三十九

解服鹽瀉方

三

顧氏秘書

冷荳腐漿灌之

又方

抹桌布瀝水灌之

又方

皂角水冷服

中飲食毒門主論

書云善解毒者無如火蓋火能革物之性

陳遠公曰誤食漏脯以致胸膈滿飽上吐下瀉腸如刀割痛瀉不止而有死者夫漏脯乃隔宿之肉為屋漏水滴入而名之也似無大害何以殺人此言歲久之屋梁塵甚多屋上必有蛇蝎行走塵灰倒掛蛛網結成無非毒物天雨之水順流而下凡毒氣得水則化然化於水中也水入肉內毒將何往自然結於肉中而不化食之安得不變生不測哉亦有食而不死又何故此必非歲久之屋未經毒物故也雖不死而病必不免所以為太上所戒急用解毒之藥自可得生

傷醫大全

卷二十九

中飲食毒論

三

顧氏秘書

中飲食毒門主方

凡一切飲食毒

用麻油一二杯飲之得吐毒即解

化瀉湯

大黃

山查

厚朴各三錢

白芷

麥芽

各二錢

生甘草 五錢

水煎服

解百般飲食毒

粉甘草

生用二兩

陳皮

一升

傷醫大全

卷二十九

中飲食毒方

三

顧氏秘書

水煎頻服

解燒酒毒門主論

人有恣飲燒酒大醉而死必身腐爛臭穢去酒為大熱之物純陽無陰尤為至熱多飲過度力不能勝一時醉倒而熱性發作腐爛腸胃其人已入醉鄉不知生死用井水頻撲其心胸解開頭髮浸頭於冷水中候溫即換凉水後用解炎化酒湯主之
又曰錫壺盛燒酒過夜有毒飲之傷人
又曰鱧魚浸燒酒內即成泥

傷醫大全

卷三十九

解燒酒毒論

三六

顧氏秘書

解燒酒毒門主方

凡過飲燒酒人事昏沉將醉人放板門上矮橈架住頭低脚高將頭髮打散以盆乘水入生研菜豆於水內隨將頭髮浸水盆內如水一溫即另換一盆浸至酒散人事清白方止仍用大片熱豆腐鋪胸前豆腐蒸變拔出酒毒又換熱豆腐貼之自活醒後宜喫菜豆湯
又方
葛花濃煎汁或葛根湯灌之

傷醫大全

卷三十九

解燒酒毒方

三五

顧氏秘書

又方
一枳椇子搗研煎湯解

又方

甘蔗削去皮搗汁飲乾嘔自止

又方

白蘿蔔汁灌之並救受狼烟煤炭毒

又方

熱尿灌之

又方

鍋蓋上氣汗水數鍾徐徐灌之

解炎化酒湯

人

參一兩如無以黃芪二兩代之

柞木枝二兩

白茯苓

五錢

黃連

寒水石

各三錢

石菖蒲

一錢

水煎一碗待冷灌之得入口即活此方以柞木

解酒毒黃連寒水石解火毒菖蒲引入心中茯

苓分消酒食之氣用人參者所以固真氣使不

傷酒而散蓋火酒係氣酒也熱極則氣易散固

傷醫大全

卷三十九

解燒酒毒方

聖

顧氏秘書

真氣則火可瀉毒可解氣不脫也

解中煤炭毒門主方

中煤炭毒一時悶倒不救殺人言瑤方

急以新汲清水灌之

中煤炭毒昏暈惡心跌倒急移在風涼處

鹹菜水灌之

傷醫大全

卷三十九

煤炭毒方

聖

顧氏秘書

解中閉口椒毒門主方

閉口椒食之令人身冷吐白沫欲絕
地漿水飲之即解 金匱方

傷寒論木全

卷三十九 閉口椒毒方

望

顧氏秘書

解誤食桐油毒門主方

桐油入咽令人發吐不止 秘方
急飲熱酒即解

傷醫大全

卷三十九 誤食桐油毒方

望

顧氏秘書

救誤吞田螺門主方

誤吞田螺鯁喉不下死在須臾

活鴨以水灌於鴨子喉中少頃將鴨倒懸令鴨吐
出涎水與患者服之其螺自化

湯醫大全

卷三十九

誤吞田螺方

四

顧氏秘書

救誤吞桃李門主方

誤吞桃李不下

狗骨煮汁摩頭上即下

又方

以少許水灌小兒頭承其水與飲即出

湯醫大全

卷三十九

誤吞桃李方

四

顧氏秘書

救誤食猪骨門主方

驗方

象牙刮末浮於新汲水上吸之即下

湯醫大全

卷三十九

誤食猪骨方

四

顧氏秘書

救誤吞雞骨門主方

驗方

隔年灶糖食之自化

又方

香油煎滾溫服即下

湯醫大全

卷三十九

誤吞雞骨方

四

顧氏秘書

救誤中猪肉毒門主方

驗方

猪牙燒爲末一錢開水調服

瘍醫大全

卷二十九 救誤中猪肉毒方

果

誤吞頭髮門主方

吞髮繞喉不出

自己亂髮燒灰開水調服一錢

瘍醫大全

卷二十九 誤吞頭髮方

四九

顧氏秘書

救誤吞蜈蚣門主方

驗方

急吞生雞蛋二枚不可嚼次日即裹出

蜈蚣誤入咽喉中咬之垂死

生公雞熱血灌入喉中蜈蚣即出

人喉中似有物行動吐痰則痛更甚身上皮膚開裂

有水流出目紅腫而又不痛足如斗腫而又可行

直絕世莫辯之症此乃人食生菜有蜈蚣在葉上

不知而食之乃生蜈蚣於胃口之上入胃則胃痛

瘍醫大全

卷三十九 誤吞蜈蚣方

辛

顧氏秘書

上喉則喉痛饑則痛更甚也方用雞一隻煮熟五

香調治芬馥之氣逼人乘人睡熟將雞列在病人

口邊則蜈蚣自然外走倘有蜈蚣走出立時拿住

不可讓其仍進口中或一條或數條出盡自愈大

約喉間無物走動則無蜈蚣矣然後用全膚湯沃

苓三兩黃芪當歸薏仁各一兩白芍五錢生甘草

三錢荆芥陳皮各一錢防風五分水煎服十劑則

皮膚之裂自愈而雙足如斗亦消矣蓋蜈蚣在上

焦非藥食能殺因藥下喉即至胃中而蜈蚣却在

胃口之上故不能殺之也所以引其外出然後以

藥調治其氣血自愈皮膚開裂者乃蜈蚣毒氣盤

踞肺邊肺主皮毛故皮膚開裂足如斗者足乃腎

之部位肺居上為腎之母母病則子亦病然腎水

終是不乏而毒氣留於腎部故足之皮大而浮非

骨之病也所以能走也眼屬肝肝受肺氣之毒薰

蒸故紅腫也 秘傳

瘍醫大全

卷三十九 誤吞蜈蚣方

辛

顧氏秘書



救誤吞螞蝗門主論

芹菜內螞蝗極多摘洗不淨每每誤食下咽肚腹作痛

或云螞蝗煨灰研細散於木碗內露一宿卽變細螞蝗何況誤吞活螞蝗乎

螞蝗一名水蛭以火焙爲灰見水復活惟土井及蕪芹菜根內小如米麥人所難防誤食必害人若知此物在腹但以芝麻油潤肛門虫聞香盡出可無害矣

湯醫大全

卷三十九 誤吞螞蝗論

至

顧氏秘書

救誤吞螞蝗門主方

驗方

水田泥爲丸如桐子大每服二三錢用水送下螞蝗卽隨泥解出空心服之更效

又方

蜜糖一杯和水服之

又方

空心飲地漿水少許自下

湯醫大全

卷三十九 誤吞螞蝗方

至

顧氏秘書

誤中蛇虺百虫毒門主方

驗方

雄黃一錢
巴菝去油一粒
麝香一分
乾姜五分

共研細開水調服

傷醫大全

卷三十九

百虫毒方

五

韻氏秘書

解中蜈蚣毒門主方

驗方

桑汁或桑根桑葉煎湯服

傷醫大全

卷三十九

蜈蚣毒方

五

韻氏秘書

解中蜘蛛毒門主方

驗方

藍青汁服之

湯醫大全

卷二十九

解中蜘蛛毒方

解中蚯蚓毒門主方

凡中蚯蚓毒者形如大痲瘋眉鬚脫落

石灰泡熱水候冷浸良久即愈

小兒受之

藍湯溫洗或鴨血塗之

湯醫大全

卷二十九

解中蚯蚓毒方

毛

顏氏醫書

解中瘟牛肉毒門主論

人有食牛犬肉一時心疼不能吐瀉此毒結心胃不升不降也亦宜用吐如吐之不效當用消肉化毒丹夫牛犬無毒本補精血之物何以毒至於此必牛犬抱病將死又加縛束以激動怒氣毒結於皮肉之間適當其處人誤食之故食之生病重至暴亡也

凡中馬犬河豚魚蟹毒者心下必堅硬或腹脹口渴忽發熱妄語者是

傷醫大全

卷二十九

瘟牛肉毒論

五

顧氏秘書

解中瘟牛肉毒門主方

凡誤食瘟牛肉口吐白沫不醒人事早稻草煎湯灌之立醒

又方

烏桕樹根皮酒煎全熱酒服

又方

菊花連根搗汁全熱酒服

消肉化毒丹

山查

神曲

大黃

湯醫大全

卷二十九

瘟牛肉毒方

五

顧氏秘書

雷丸

各三錢

枳殼

厚樸

各二錢

水煎服

解中馬肉毒門主方

驗方

蘆根搗汁一碗飲之或者煮汁服並煎湯洗浴

湯醫大全

卷二十九

解中馬肉毒方

顧氏

解中犬馬肉毒門主方

犬馬肉毒

杏仁去皮四兩研以百沸湯和仁絞汁作三服喫

即解

又方

急喫冷粥一碗頃刻毒解思食

犬馬河鯢諸魚蟹毒心下堅硬或腹脹口渴發熱諸

語梅師方

蘆根煮汁服立解

湯醫大全

卷二十九

犬馬肉毒方

李


顧氏秘書

中六畜肉毒

水煎墻上黃土二錢飲之即解

食自死六畜諸肉中毒

搗黃柏末以水和方寸七服未愈再服



解中河鮑毒門主論

人有愛食河鮑以至血毒中人舌麻心悶重者腹脹而氣難舒口開而聲不出若久延則害人夫河鮑水族也有食之死有食之無事者何也乃人之腸胃有宜有不宜耳大約肝經血燥胃氣又弱者多能中毒蓋河鮑乃魚中善怒者也食之自能動氣况肝血本燥之人肝氣自急以急濟急安得不增急暴之氣哉氣急難舒故心悶也氣急聲難出故舌麻也治當吐出其肉則氣舒腹寬聲出何有舌

傷醫大全

卷二十九

河鮑毒方

李

顧氏秘書

麻心悶之害乎古有拚死喫河鮑之語其實河鮑不能殺人但性怒不甚相宜耳宜瓜蒂散加味治之

又曰河鮑魚血令人麻子能令人脹眼睛令人昏凡食之者必須洗盡血去其子其眼庶無害也

又曰河鮑魚第一宜洗淨血水第二防有灰塵落在鍋內所以炒河鮑賣者多在露天地面上免灰塵落在鍋內也

又曰以蘆筍全魚則解毒矣

解中河鮑毒門主方

驗方

槐花煎濃汁服之即解

又方

橄欖煎湯服

又方

急飲人糞汁

中河鮑子毒

急取臘腸煮食即不服矣

傷醫大全

卷二十九

河鮑毒方

李

顧氏秘書

河鮑菌毒

錢氏

多服金汁即解如難得即於乾地上挖一潭用水和泥漿稍定服水一二碗即解

又方

香油灌之吐出毒物即愈

又方

磨紫金錠服

加味瓜蒂散

白茅根

蘆根各一兩瓜蒂一兩

水煎汁服必大吐吐後必愈

易醫大全

卷二十九

河鮑毒方

毒

顧氏秘書

救食魚中毒門主方

驗方

煎冬瓜仁汁飲之

又方

煮橘皮湯停冷飲之

易醫大全

卷二十九

救食魚中毒方

毒

顧氏秘書

解黃鱔魚毒門主方

驗方 簡便

食此犯荆芥能害人急服地漿解之

瘍醫大全

卷十九

解黃鱔魚毒方

李

顧氏秘書

解誤食毒蟹毒門主方

驗方

家紫蘇汁或乾紫蘇煎湯即解

又方

薑汁服

又方

冬瓜汁服

又方

黑豆汁煎服

瘍醫大全

卷十九

解誤食毒蟹方

李

顧氏秘書

又方

綠汁服

又方

靛青汁或小藍汁服

又方

蘆汁飲之

解中蠶毒門主論

有食蠶腹痛欲死手足發青而亡者夫蠶雖介屬本無大毒然蠶類多屬化生有蛇化有龜化有魚化者龜魚所化皆益人惟蛇化最毒其腹下必隱隱蛇皮之狀其色大紅必不可食食必殺人腹大痛者乃毒氣攻腸也不必解蠶之毒仍當解蛇之毒

傷醫大全

卷二十九

解中蠶毒論

李

顧氏秘書

解中蠶毒門主方

慎將蠶肉同莧菜喫成蠶腹脹

速飲白馬尿一碗即化

中蠶毒

白芷

雄

黃各三錢

丹砂

山查

枳

實各一錢

白茯苓五錢

水煎服一劑痛止二劑毒出矣

又方

飲薑汁數碗或龍青水亦效

傷醫大全

卷二十九

解中蠶毒方

李

顧氏秘書

又方

鹽汁飲

解中野菌地蕈靈芝毒門主論

陳遠公曰人誤食竹蕈或吞樹菌以致心疼胸脹腸
瀉腹痛而死夫蕈亦芝草之類生於莎葉朽木所
謂臭腐出神奇何以毒種於中乎殊不知竹根樹
柯而生蕈菌者以土之濕熱也濕熱之下必聚蛇
蝎惡虫其氣上騰而蕈菌得氣易於生發故較他
產更肥其味極美而其質實毒也解菌湯救之

湯醫大全

卷二十九

野菌地蕈靈芝毒門

顧氏秘書

解中野菌地蕈靈芝毒門主方

驗方

黃泥漿灌之即解 地漿能解百毒真神方也

又方

橄欖搗為泥食之即解

又方

金汁解

又方

紫金錠磨服即解

湯醫大全

卷二十九

野菌地蕈靈芝毒門

顧氏秘書

又方

菜豆研生甘草煎濃汁飲即解

解菌湯

生甘草 二兩 白芷 三錢

水煎服以鵝翎探喉必盡吐而愈如已入腸探
引不吐亦必腹疼下瀉可保生全

解豆腐毒門主方

驗方

蘿蔔湯飲之即解

湯醫大全

卷二十九

解豆腐毒方

三

顧氏

解麵毒門主方

驗方

多食生蘿蔔即解

湯醫大全

卷二十九

解麵毒方

三

顧氏

解中白菓毒門主方

凡中白菓毒驟然一聲卽暈去儼如驚狀者是

白鯨頭煎湯灌三四次卽甦

又方

麝香一分煎湯服

傷醫大全

卷三十九

解中白菓毒方

去

願

解誤服輕粉門主方

誤服輕粉筋骨疼痛

川椒去目每日清晨白湯不拘多少吞之

傷醫大全

卷三十九

誤服輕粉方

去

願

救六畜瘟疫法

立救丹

白礪砂

白附子

高良薑

猪牙皂

各一錢

雄黃五分

火硝二分

麝香

一分

共乳極細末 凡牛馬驢用三分猪羊只用一

分俱吹左鼻孔內再點眼角避風立效

癩犬欲死

用蜈蚣三條研末入飯與癩犬食之數日立愈

傷醫大全

卷三十九

救六畜瘟疫法

立

解中櫻桃毒門主方

驗方

甘蔗汁解之

傷醫大全

卷三十九

解櫻桃毒

七

顧氏秘書

瘍醫大全目錄

卷四十

奇病部

奇病門治法

附寒門秘法

瘍醫大全

卷四十 目錄

顧氏秘書

瘍醫大全卷四十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之極東陽

男 柳燮用和

全校

奇病部

古今奇病附寒門秘法俱彙於此部中以便檢閱
治

瘍醫大全

卷四十

奇病法

顧氏秘書

奇病門治法

張仲景曰生蛇腹中以身上辨之身必乾涸如柴似
有鱗甲者蛇毒也最易辨惟白芷一味為丸每日
米湯送下五錢即全愈

人有腹中生蛇者乃毒氣化成也或感山嵐水溢之
氣或感四時不正之氣或感尸氣病氣而成也方
名誅毒丹用雄黃一兩生甘草二兩白芷五錢端
午日修合為末粽子米和丸桐子大飯前食之食
後必作痛用力忍之切勿飲水一飲水則不效矣

華真君曰人手上皮上現蛇形一條痛不可忍此乃蛇乘人之睡而作交感於人身乃生此怪病服湯藥不效以刀刺之出血如墨汁外用白芷末搽之少愈明日又刺血如前又以白芷末搽之二次化去其形先刺頭後刺尾不宜亂刺也

人有胃腕不時作痛過饑更甚尤畏大寒日日作痛予以大蒜三兩搗汁灌之忽吐蛇一條長三尺而愈蓋蛇最畏蒜氣此一奇症也

人有背上忽然痛疼裂開一縫攏出蛇一條長二尺

傷醫大全 卷四十一 奇病法 二 顧氏秘傳

者頗善跳躍仲景先生親手治之而驗其症必先背脊疼甚而又無腫塊久則腫矣長有一尺許一條直似立在脊上乃用刀輕輕破其皮而蛇忽跳出其人驚絕用人參一兩附子一錢半夏天南星各三錢治之忽甦生肌散敷其患處而愈于問其故而背忽痛耶彼人云我至一廟見塑一女娘甚覺美麗非常偶與雲雨之思頓起背脊之痛今三月以來痛不可忍若有蛇鑽毒刺光景予心疑似生怪物見其人又健旺故用刺開皮肉不意蛇出

而人竟死也予隨用三生飲救之而愈可立醫案以見病之奇而神聖之不可藐玩也

人有臍口忽長出二寸似蛇尾狀而又非蛇不痛不癢此乃祟症也然亦因任帶之脈痰氣壅滯遂結成此異病也人世之間忽生此病必有難喻之災蓋人身而現龜蛇之象其家必然敗落而時運亦未必興隆也法當用礪砂冰片麝香各一分兒茶二錢白芷雄黃各一錢研細末將其尾刺出血必然昏暈欲死急以藥點之立刻化為黑水急用白

傷醫大全 卷四十一 奇病法 三 顧氏秘傳

芷三錢煎服自愈倘不愈則聽之不可再治蓋妖旺非藥能去非前世之冤家即今生之妖孽也人身忽長鱗甲於腹間脇上此症婦女居多而男子亦間生焉蓋孽龍多化人與婦人交即成此症而男子與龍合亦間生鱗甲也此病速治為妙少遲則人必變為龍矣今傳一方用雷丸大黃白礬鐵衣雄黃各三錢研細棗肉為丸凡得此病用酒送下三錢立時便下如人精者一碗胸中便覺開爽再服三錢則鱗甲盡落矣此方之妙妙在無毒不

散而龍又最惡雄黃故相濟而成功又何疑哉况各藥又皆去毒去水之品此方之最神最奇者也如人先遍體發癢以錐刺之少已再癢以刀割之快甚少頃又癢甚以刀割之覺疼必流血不已再癢以石灰止之則血止而癢作又以刀割之又流血又以石灰止之止之又癢勢必割至體無完膚而後止此乃冤鬼索命之報也無法可救 岐天師憫恤世人不知作惡誤犯者亦有之特定救割全生湯救之方用人參一兩當歸三兩荆芥三錢水生湯醫大

傷醫大全 卷四十 奇病法 四 顧氏秘書

煎服貧人無力買參以黃芪二兩代之服三劑必效而癢止痛亦平但須對 天盟誓萬勿作犯法之事有冤讐者為之懺經禮佛庶幾不再發否則發之再不能救矣 人有生鳥鵲於頭上臂上外有皮一層包之或如瘤狀或不如瘤而皮膚高起一塊者內作鳥鵲之聲逢天明則啼逢陰雨則叫逢饑寒則痛疼百藥不效此乃不敬 神聖而戲弄之也必須用刀割破其皮則鳥鵲難以藏形乃破孔而出宛似鳥鵲但

無羽毛耳鳥鵲出孔之後以生肌散敷之外用神膏方載癰 三日後依然生合此病 岐天師見之數次 扁鵲之治 華陀之醫皆 岐天師之教 人有心窩外忽然生瘡如碗大變成數口能作人聲叫喊此乃憂鬱不舒而祟憑之也方用金銀花生甘草各三兩人參五錢茯神白礬各三錢水煎服即安靜不鳴矣再用二劑即愈蓋甘草消毒人參茯神以安其心白礬以止其鳴金銀花以解其火熱故易於奏功也

傷醫大全 卷四十 奇病法 五 顧氏秘書

如人無故見鬼如三頭六臂者或如金甲神或如斷手無頭死鬼或黑或白或青或紅之狀皆奇病也然此皆心虛而祟憑之用石室秘丹主之方用白朮蒼朮各三兩半夏大戟山茨菇各一兩天南星三錢附子一錢共為細末加麝香一錢做成餅子如玉樞丹一樣此方更妙於紫金錠凡遇前病用一餅薑湯化開服之必吐頑痰碗許自愈 人腰間忽長一條肉痕如帶圍至臍間不痛不癢久之飲食少進氣血枯槁此乃腎經與帶脉不和又

過於房事盡情縱送乃生此疾久之帶脉氣衰血亦漸耗顏色黯然雖無大病而病實篤也法當大補腎水而兼補帶脉自然身壯而形消方用滅痕丹熟地山萸肉各一觔杜仲山藥各半觔白朮一觔白芍六兩白朮肉炒破故紙當歸車前子各三兩共為末蜜丸每日早晚各服一兩十日後覺腰輕再服十日其肉淺淡再服全消不須兩料也然必須忌房事三月否則無效此方乃純補腎經而少兼任帶脉也任帶之病而用任帶之藥何愁不建功哉

湯醫大全

卷四十 奇病法

六

顧氏秘書

人腹中忽有應聲蟲有用殺蟲祛痰熱藥寒藥治之俱不應然則終何以治之哉古人有將本草讀之而蟲不應聲者用之即愈今岐天師別有一神奇法治之省閱本草之勞神用生甘草一味入白礬各等分不須二錢飲下即愈蓋應聲蟲非蟲也乃臟中毒氣有祟以憑之也用甘草以消毒用白礬以消痰况二物一仁一勇又以智用之智仁勇三者俱全崇不覺低首而却走矣

凡山魃木客狐狸虫蛇作祟憑身者用生桐油搽其下身不便處最妙或以本人褲子包頭則妖自大笑而去永不再犯蓋妖原欲盜人之精氣然最喜清潔見人汚物包頭則其人之不潔可知故棄之而去亦因其好潔而亂之也不成器之物而睡夢中來壓人者亦以此法治之

湯醫大全

卷四十 奇病法

七

顧氏秘書

腹中生驚乃飲食饑飽之時過於多食一時不能消化乃生驚甲之虫似驚而非驚也亦用誅毒丹以馬屎一碗童便半合飲之即消雄黃乃殺蛇之藥白芷乃爛蛇之品甘草乃去毒之劑而馬尿乃化驚之聖藥也故用之隨手而效耳此則奇病而用奇藥也

如有腹中高大宛似坐胎形容憔悴面目瘦黃骨乾毛枯此乃鬼胎也方用紅花半觔大黃五錢雷丸三錢水煎服傾盆瀉出血塊如雞肝者數百片而愈後乃用六君子湯調治之自然復原此等之病乃婦人淫心忽起有物以憑之纔生此症無論室女出嫁之人生此病者邪之所湊其氣必虛窺又

起淫心有不邪以親邪者平方中妙在用紅花爲君又用至半觔則血行難止有躍躍自動之貌又加以大黃走而不守之味則雷丸蕩邪之物自然功成之速也

如有頭角生瘡當日卽頭重如山第二日卽變青紫第三日青至身上卽死此乃毒氣攻心而死也此病多得之好吞春藥蓋春藥之類不過一丸食之卽強陽善戰非用大熱之藥何能致此世間大熱之藥無不過陽起石附子二味俱有大毒且陽起

石必經火煨而後入藥是燥乾之極自然尅我津液况窮工極巧博婦女之歡筋骸氣血俱動久戰

之後必大洩盡歡水去而火益熾矣久久貪歡必

然結成大毒火氣炎上所以多發在頭角太陽之

部位也初起之時若頭重如山便是此惡症速以

金銀花一觔煎湯飲之數下碗可少解其毒可保

性命之不亡而終不能免其瘡口之潰爛也再用金銀花玄參各三兩當歸二兩生甘草一兩煎湯日用一劑七日仍服瘡口始能收斂而愈此種病

世間最多而人最不肯戒用春方痛哉如脚大指生疽亦多不救治法全此

人忽頭面腫如斗大看人小如三寸飲食不思呻吟如睡此痰也用瓜蒂散吐之而頭目之腫消又吐之而見人如故矣後用六君子湯水煎服三劑全愈此亦崇憑之也

人有中心悶甚面赤不能飲食此得之食鯉有虫在胸中也以加味瓜蒂散治之方用人參半夏甘草各三錢黃連陳皮各一錢瓜蒂七個吐之吐虫數

升皆赤頭而尾如魚須斷酒色否則三年後必飽滿而死

張仲景曰有人大腿腫痛堅硬如石疼若異常欲以繩繫足高懸梁上其疼乃止放下疼卽如斫腿中大响一聲前腫卽移大醫之上腫如巴斗不可着席將布兜之懸掛其疼乃可此亦崇憑之也方用生甘草一兩白芍三兩水煎服蓋生甘草專瀉毒氣白芍平肝木以止痛也痛止則腫可消毒出則崇可杜也正宗孽病門亦有此症

人遍身生疣瘡或內如核塊或外似蘑菇香葷木耳之狀者乃濕熱而生也數年之後必然破孔出血而死當先用外藥洗之然後用湯藥消之則愈浴洗方用蒼耳子草一筋荆芥苦參白芷各三兩水一大鍋煎湯傾在浴盆內外用席圍而遮之熱則薰溫則洗洗至水冷而止三日後乃用煎方名紅黃霹靂散人參薏苡仁各一兩白朮芡實各五錢茵陳白芥子半夏澤瀉黃芩各三錢附子一錢水煎服十劑自然全消無跡矣外邊亦無不消也

湯醫大全

卷四

奇病法

顧氏秘書

張仲景曰有人脚板下忽生二指痛不可忍者乃濕熱之氣結成觸犯 神祇之故方用消指散明砂一分人參一錢冰片三分瓦葱一兩為末以刀輕刺出血刺在生出指上即時出水敷星星在血流之處隨出隨移以血盡為度流三日不流水矣而痛亦少止再用化水湯薏苡仁一兩白朮五錢人參生甘草牛膝川草薺白芥子各三錢半夏一錢水煎服四劑全愈而指盡化為水矣外用 岐天師膏藥加生肌散敷之即愈矣

凡皮膚手足之間如蚯蚓唱歌者乃水濕生虫也方用蚯蚓糞水調敷患處厚一寸可也其鳴即止再用煎湯薏苡仁芡實各一兩白朮五錢生甘草三錢黃芩二錢附子三分防風五分水煎服即愈此治濕則重無以養况又以生甘草解毒化虫防風去風而逐瘀附子斬關而搗邪所以奏功如神也人手掌忽高起一寸不痛不癢此乃陽明經之火不散而鬱於手也論理該痛癢而今不痛癢不特火鬱於腠理而且水壅於皮毛也法當用外藥消之

湯醫大全

卷四

奇病法

顧氏秘書

蓋陽明之火盛必然作渴引飲不休今又不渴是胃中之火盡消而流毒於掌中必其人陽明之火盛手按於床席之上作意行房過於用力使掌上之氣血不行久而突突而高也不痛不癢乃成死肉矣方用附子一個煎湯以手漬之至涼而止如是者十日必然作痛再漬必然作癢又漬而高者平矣蓋附子大熱之物無經不入雖用外漬無不入內入者也倘以附子作湯飲之則週身俱熱又引動胃火掌肉不消而內症蜂起子所以外治而愈

也或附子湯中再加輕粉一分引入骨髓更效
人脚板中色紅如火不可落地又非痰毒終歲經年
不愈此病乃用熱藥立而行房火聚於脚心而不
散故經歲經年不愈也法當用內藥消之若作外
治必然爛去脚板宜用祛火湯熟地三兩麥冬玄
參沙參釵斛各一兩山萸肉茯苓甘菊花各五錢
丹皮牛膝車前子澤瀉各三錢草薢二錢水煎服
十劑消二十劑全愈然須戒房事三月否則必發
發則死矣慎之哉

傷醫大全

卷四

奇病法

三

顧氏秘傳

人有手足脫下而人仍不死之症此乃傷寒之時口
渴過飲凉水以救一時之渴孰知水停腹內不能
一時分消遂至四肢受病氣血不行久而手足先
爛手指與脚指墮落或脚指脫落之後又爛脚板
久之連脚板一齊墮落矣若有傷寒口渴過飲涼
水者愈後倘手足指出水者急用 岐天師之方
可救指節脚板之墮落也方用意苡仁三兩白朮
一兩茯苓二兩車前子五錢肉桂一錢水煎服一
連十劑小便大利而手脚不出水矣永無後患不

必多服

人有手指甲盡行脫下不痛不癢此乃腎經火虛又
於行房之後以凉水洗手遂成此病方用六味地
黃湯加柴胡白芍骨碎補治之而愈

人有指縫流血不止有虫如蟬蛻之小鑽出少頃即
能飛去此症乃濕熱生虫也然何故生虫而能飛
耶蓋不止濕熱而又帶風邪也凡虫感風者俱有
羽翼能飛安得人身得風之氣轉不能飛也方用
黃芪薏仁熟地各五錢當歸白芍茯苓白朮甘草

傷醫大全

卷四

奇病法

三

顧氏秘傳

各三錢人參柴胡荆芥川芎各一錢水煎服此方
之妙全不去殺虫而但補其氣血而佐之去濕去
風人身氣血和自不生虫補氣血之和則虫自無
藏身之窟况又逐水消風虫更從何處生活耶此
方之所以平而奇也服四劑則血不流而虫不出
再服四劑手指完好如初矣

人有脚肚之上忽長一大肉塊如瘤非瘤如肉非肉
按之痛欲死此乃脾經濕氣結成此塊而中又帶
火邪故手不可按按而痛欲死也法當峻補脾氣

而分消其濕為是然而外長怪狀若在內一時消之恐不易得當用內外夾攻之法自然手到病除內服消濕化怪湯白米芡實薏仁各一兩澤瀉五錢人參茯苓車前子白芥子白礬草薺各三錢牛膝半夏陳皮各二錢水煎服二劑後用蚯蚓糞炒一兩黃柏炒五錢兒茶三錢水銀一錢冰片麝香各五分硼砂一分共研至不見水銀為度將未醋調膏敷患處一日即全消矣極有神效此膏凡有塊者以此內外治之無不效應如響

湯醫大全 卷四 奇病法 五 顧氏秘書

人自覺腸胃癢而無處抓搔者祇覺置身無地此乃火鬱結而不散之故法當用表散之藥宜化癢湯柴胡黑山梔天花粉各三錢白芍一兩甘草二錢水煎服即愈

人糞從小便出小便從大便出者此夏天暑熱之症醫以五苓散治之亦妙今止用車前子三兩煎湯三碗一氣服完即愈

人有小便中溺五色之石未溺之前痛甚已溺之後少覺寬快此即石淋也交感之後入水或入水之

後交感皆有此症宜消石丹方用熟地山萸肉澤瀉各三兩茯苓薏仁麥冬車前子各五兩骨碎補二兩芡實八兩青鹽一兩肉桂三錢共為末蜜丸早晚白滾湯吞下各一兩十日必無溺石之苦矣此症成之最苦欲溺而不溺而又欲溺尿管中痛如刀割用盡氣力止溺一塊其聲錚然見水不化乃膀胱之火熬煎而成此異病也其色或紅或白或黃或青或黑不一總皆水鬱而火煎之也此方之妙全不去治石淋而轉去補腎水之不足水足

湯醫大全 卷四 奇病法 五 顧氏秘書

而火自消火消而水自化其中有與妙之旨也倘治膀胱則氣不能出而又何以化水哉以上詳載石室秘錄目睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出作痛名曰肝脹用羌活一味煎汁服數盞自愈夏子益奇疾方

徐之才曰眼見空中有五色物此色慾過多大虛所致當以補藥飲之入門

入門云眼中視物皆倒植此必因酒吐時上焦反覆致倒瞻府故視物皆倒法用瓜蒂藜蘆復吐以正

其膽入門

得效云寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似鐘磬聲日漸瘦弱吳茱萸木香等分煎服自愈又云手十指節斷壞惟有筋連無節肉出如燈心長數尺餘遍身綠色名曰血餘赤茯苓胡黃連煎服

又云四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒

浸黃蘆三兩經一宿焙乾為末每二錢酒調下

又云人自覺其形作兩人並臥不辨真假不語問亦

傷醫大全

卷四

奇病法

七

顧氏秘書

無對乃是離魂辰砂人參白茯苓濃煎湯服重者氣爽假者化也

大腸頭出名曰截腸初截寸餘者可治若腸盡出不

治用麻油盛於器醫坐上飲天麻子汁數升愈

虱出怪病臨臥渾身虱出血肉俱壞每夕漸多痛癢

難言且舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開但飲塩醋

湯半月即安

奇疾方

肌肉化更有虫如蠟走於皮下作聲如兒啼急用雄

黃雷丸一兩為末搽猪肉上炙熟喫盡自愈

奇疾方

破腸症乃腹破腸出鼻穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣喫羊腎粥十日即愈

奇疾方

乳懸婦人產後兩乳伸長細小如腸垂過小腹痛不

可忍名曰乳懸將川芎當歸各二兩以半筋剉末

瓦器水煎不拘時服仍餘筋半到大塊用香爐慢

火逐漸燒烟安病人面前桌下要烟氣不絕令伏

桌上將口鼻及病乳常吸烟氣如藥盡未痊如前

法煎服及燒烟燻吸必安如用兩料已盡兩乳雖

傷醫大全

卷四

奇病法

七

顧氏秘書

縮上而不復舊用冷水磨草蘇子一粒於頭頂心

塗之片時後洗去則全安矣

奇疾方

發斑怪症有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如鋼

乃熱毒結於下焦也用白礬滑石各一兩為末作

一服水三碗煎半不住服即愈

奇疾方

眉毛動搖目不交睫喚之不應但能飲食有經日不

效者用蒜三兩取汁酒冲服即愈

採醫書

麻骨症自頂麻至心窩而死者或自足心麻至膝而

死者用人屎燒灰豆腐漿調飲即止

萬病回春

氣奔怪病人忽滿身皮底混混如波浪聲癢不可忍
抓之血出不能解謂之氣奔用苦杖人參青鹽細
辛各一兩作一服水煎一大碗細飲之服盡便愈
經驗方

脉溢乃毛竅血出若血不出皮脹如膨須臾眼耳口
鼻被氣脹合此名脉溢飲生薑汁水各一盞即安
奇方試驗

大腸重行行坐不得用鶴虱灰水調五錢服之自愈
奇症單方

傷醫大全 卷四十一 奇病法 六 顧氏秘書

惡肉毒瘡一女子年十四腕軟處生物如荳半在肉
中紅紫色痛甚方土用水銀四兩白紙二張揉熟
蘸擦之三日自落 李樓怪證方

昔一士兩足不癢不痛每行動絕不聽其所用或扭
於左而又墜於右或扭於右而又墜於左之玄而
行不能一步步正走孫文垣以為由筋軟不能束
骨所致用人參黃芪白芍以補肺金蒺藜仁虎骨龜
版杜仲以壯筋骨以鐵華粉專制肝木煉蜜為丸
早晚服之竟愈 三吳治驗

咽喉生肉層層相叠漸漸腫起不痛多日乃有竅臭
氣自出遂退飲食用臭橋皮煎湯連服愈 外科方

傷醫大全 卷四十一 奇病法 六 顧氏秘書

附刊寒門秘法

寒門五法

一曰發

發則重解肌者為表之表藥用辛甘言腠理緻密

非辛甘不能開發故曰發發者發正表也寒傷營無汗麻

黃湯風傷衛有汗桂枝湯

二曰解

解則輕於發為表之輕藥用辛涼言腠理將疎惡

傷醫本全

卷四 寒門

辛

顧氏秘書

寒已罷邪將化而為熱但表病裡和非辛不能散

表非涼不能解熱故曰解解肌肉也升麻葛根湯主之

三曰和

和又輕於解表將罷藥用辛者少涼者重言邪將

入腑而未深入腑曰表不可曰裏不可發與解俱

難施於表裏之中故曰和和者和其半表半裏也

小柴胡湯主之

四曰攻

攻則重於和為表已罷邪氣入腑藥用苦寒言邪

自三陽經入結於腸胃非苦寒不能攻故曰攻攻其實熱也承氣湯主之

五曰救

救則與攻大異熱則攻寒則救藥有溫熱言邪不

由陽經而入竟中三陰名曰直中內寒盛極陽氣

已危故曰救救者急救危陽也寒客中焦理中湯陰症厥逆四逆湯

吐法大意

五法獨不言吐者蓋仲景有汗吐下三法為皮毛胃

腑而設汗之言邪在皮毛吐之言邪在胃之上脘

傷醫本全

卷四 寒門

辛

顧氏秘書

下之言邪在胃腑凝結今人以吐法用在半表半

裏所害匪淺蓋少陽膽經汗吐下三法皆禁悞吐

之遂變為壞症則吐不施於半表半裏明矣若胃

上脘痰涎胸痞者方敢議吐實邪以瓜蒂赤小豆吐之虛煩以梔子淡

豆豉吐之虛痰以人參蘆吐之風痰以皂角白礬吐之乾霍亂以燒鹽熱童便吐之

陽經分經腑

三陽在經者可汗凡言經者皆邪舍於皮毛經行皮

毛之裏肉之外邪容於經有太陽陽明少陽之分

可發可解可和皆邪之在經者故仲景云三陽主

病在經則不可下下之為痞氣為結胸也三陽已入腑者可下而已凡言腑者皆邪居腸胃腑主泄水穀傳從糟粕邪之入腑有自太陽入腑有自陽明入腑有自少陽入腑可下可清可攻皆邪之入腑者仲景云三陽之病在腑則不可汗汗之為譫語為厥竭經腑既明攻發自不混亂矣

陰經分傳中

邪自陽經次第而入謂之傳經可攻蓋傳經乃邪自外入內為實為熱不可用直中溫藥若悞投名曰傷醫大全 卷四十一 寒門 圭 顧氏秘書 動陰血是實其實也邪不由陽經而入者謂之直中可溫言直中者乃邪不由外入為虛為寒忌用傳經寒藥若悞投使寒愈盛令重虛其虛矣能明傳中則承氣理中無有不當耳

皮毛肌肉筋骨臟腑論

凡寒之侵人也必先入皮毛而邪在皮毛作何景象發熱如火燎惡寒毛豎鼻塞不汗皮膚痛不可近席 此在皮毛也正屬太陽表症故曰發表內經云邪在皮毛者汗而發之此之謂也 由皮毛傳於

肌肉則邪稍進一步惡寒已去必唇焦熱盛口唇者肌肉之本也今見唇焦則知肌肉受邪故不言發表而曰解肌 由肌肉傳於筋骨則邪又進一步必齒燥自汗蓋齒乃骨之餘熱入筋骨故齒乾燥肌肉者身之墻垣熱薰於肉致腠理開則自汗皆熱在筋骨也故用白虎湯 石膏知母甘草粳米參白以瀉骨中之熱耳 由筋骨傳於臟腑邪已深入外症悉具必惡熱便閉下利黃赤或腹痛時作極則發狂此乃邪熱深入臟腑不曰泄裏而曰

傷醫大全

卷四十一 寒門

圭 顧氏秘書

攻裏 有不從陽經傳來者謂之直中三陰內純寒而外無陽經之形症必見厥逆清穀囊縮甲青等症此直中之寒也不曰攻裏而曰救裏 由三陽熱症亦復有厥逆過肘膝者經云熱深厥亦深熱微厥亦微此種萬不可悞認為直中三陰之厥逆 妄投 四逆 表症曰發表

- 一脈浮表也
- 一身痛表也
- 一發熱表也

一頭痛表也

一惡寒表也

一目舌和表也

一脊項強太陽正表也

一端與咳嗽表也

一四肢拘急表也

一口不渴大小便如常表也

一脈不出表也

一面慘澀漸表也

傷醫大全

卷四十一 寒門

五

顧氏秘書

上症一見知邪在表必待發表方可攻裏若悞

下必為痞為結胸為懊憹矣

邪傳肌肉曰解肌

一脈尺寸俱長邪在陽明肌肉也

一身熱不惡寒目痛鼻乾邪在肌肉也

一漱水不欲嚥邪在肌肉也

一唇焦邪在陽明肌肉也

上症一見知邪在陽明經不在陽明腑慎勿混

治

邪在半表半裏曰和解

一脈不浮不沉半表半裏也

一嘔吐半表半裏也

一胸中脹滿未經下過半表半裏也

一耳聾脇痛半表半裏也

一舌滑半表半裏也

一往來寒熱半表半裏也

一頭汗盜汗半表半裏也

一口苦目眩半表半裏也

傷醫大全

卷四十一 寒門

五

顧氏秘書

一默默不欲飲食半表半裏也

上症一見知邪在半表半裏此經有三禁惟小

柴胡湯加減和解悞用他藥則變壞症

傳經裏症曰攻裏

一脈沉滑有力裏也

一下利清黃水裏也

一小腹滿而脹痛或硬裏也

一譫語或發狂裏也

一發斑裏也

一轉矢氣裏也

一頭痛發熱俱止裏也

一自汗裏也

一小便多裏也

一潮熱裏也

一下利腸垢裏也

一惡熱裏也

一目不得明裏也

一腹痛裏也

傷醫大全

卷四十一

寒門

五

顧氏秘書

一不得眠裏也

一手足心並腋下汗裏也

一咽乾齒燥裏也

一舌苔黃黑及津液枯涸裏也

一大便閉裏也

上症一見不拘日數遲早即知傳經裏症下之

無疑若誤汗為斑爛矣

直中寒症曰救裏

一脈沉細無力直中寒也

一背惡寒直中寒也

一嘔吐清涎直中寒也

一四肢厥逆過肘膝直中寒也

一多眠直中寒也

一乾嘔不渴直中寒也

一腹痛綿綿下利清穀直中寒也

一吐衄直中寒也

一踰臥直中寒也

一囊縮唇甲青直中寒也

傷醫大全

卷四十一

寒門

五

顧氏秘書

一惡寒身痛不頭痛不發熱直中寒也

一四肢拘急不發熱直中寒也

一身痛如被杖直中寒也

一小便清長直中寒也

上症一見即知直中溫之宜亟亟焉

表裏俱見

一頭痛發熱表症若下利清穀裏也寒也屬表裏俱

見寒症也

一腹痛口渴甚者裏症或脈浮是表症亦屬表裏俱

見熱症也

一大便閉屬裏症倘微惡寒此乃表未盡亦屬表裏俱見為熱症也

傳經表裏俱見為熱為實宜解表為主攻裏次之若裏症急者又在活法

直中表裏俱見為寒為虛宜救裏為主發表次之此治表裏俱見之大法也

脉浮

或問脉浮何以是表症曰浮者脉在肉上行也按

傷醫大全

卷四十一

寒門

无

顧氏秘書

之不足如水浮水面經云寸口脉浮主病在表表

者外也如邪在裏脉必沉細又焉得浮故一見浮

脉屬表症無疑又曰脉浮屬表倘裏症而脉尚浮

者治法奈何曰裏症脉浮者表未盡也必先解表

而後攻裏仲景云解表不開不可攻裏太陰篇云

腹痛脉尚浮者桂枝加大黃結胸症悉具脉浮不

可下是裏症固當下今脉浮又不敢攻矣若表已

罷便閉譫語脉浮者當從權下之此乃取證不取

脉也

身痛

或問身痛何以是表症曰寒則傷榮邪客於人必

由皮毛肌內今邪舍於皮毛肌肉血脉凝滯不行

令人身痛若熱在肌肉血脉榮衛週流一身暢於

四體焉有身痛之理內經論咳云時感於寒微則

為咳甚則為痛為泄鍼經云寒甚則痛熱甚則肉

消腫破內經諸痛皆以為寒未有以熱為痛者由

此論之知痛為寒明矣故謂凡見身痛屬表無疑

宜用辛散令血氣流行而痛自已又曰身痛既為

傷醫大全

卷四十一

寒門

无

顧氏秘書

表症在裏症亦有身痛者曷故蓋裏症身痛乃直

中裏症非傳經裏症也若傳經裏症則屬熱熱土

流行又何得身痛哉夫直中身痛者寒氣襲入臟

腑陽已衰危氣血凝滯令人身痛宜急溫之別之

何如有頭疼發熱痛如繩縛者表症也無頭疼發

發而痛如破杖者直中也或曰太陽表症亦有身

痛不用麻黃而用四逆者何也曰表症悉具脉當

浮緊反沉遲無力是中寒也故不可與麻黃而用

四逆是病表有虛寒故脉不能浮緊用四逆湯溫

之此乃太陽脉似少陰假脉浮緊正屬太陽表症
又孰敢用四逆乎此取脉不取證也

發熱

或問發熱何以是表症曰寒鬱腠理則閉塞而發
熱翕翕然烙手此熱止在皮膚而內無熱名曰表
病裏和內經諸症亦論凡風寒客人使人毫毛畢
直皮膚閉而為熱而汗又云體若燔炭汗出而解
又熱病論云人傷於寒則為熱病若大汗其熱解
矣即此觀之發熱屬表明甚又曰發熱固屬表倘

醫醫大全

卷四十一 寒門

三

顧氏秘書

發熱便結裏症又急治法從表乎從裏乎曰裏急
者當從權下之亦不敢離表藥何也即以三黃石
膏湯論之三黃石膏連栝子麻黃淡豉全蘇
棗細茶煎熱服懸咽表裏三焦熱盛宜
其湯治發狂口渴及發熱症內有麻黃者為發熱
而設也可見裏症雖急亦不敢純用寒涼尚加辛
散况尋常發熱有不以為表者乎又問凡發熱皆
在陽經不在陰經仲景云少陰發熱用麻附細辛
湯此又何說曰少陰發熱者表裏俱傷惡寒為直
中非傳經少陰也雖名直中今有發熱者亦不得

純為直中故用麻附細辛今表裏兩解乃發散溫
中也若傳經少陰則惡寒而不發熱然表熱與直
中少陰熱別之奈何蓋少陰發熱脉必沉遲無力
外無頭痛或下利清穀厥逆諸寒症此少陰症似
太陽若此症兼頭痛者是表裏俱見為兩感寒症
又何以為少陰熱乎總之裏症盛急而外發熱者
利藥加麻黃少陰發熱溫藥加細辛可見熱屬表
症仲景又云三陰無發熱蓋言傳經也

頭痛

醫醫大全

卷四十一 寒門

三

顧氏秘書

或問頭痛何以屬表曰三陽經上至於頭惟太陽
經脉最長其痛居多夫三陽俱有頭痛各分其症
以別之故一見頭痛即是表症又曰三陰經無頭
痛厥陰何以有頭痛曰三陰至頸而還何得頭痛
惟厥陰與督脉會於巔頂部攝諸陽故有頭痛然
厥陰頭痛亦不常見必嘔吐涎沫內無熱症乃直
中也當溫之傷寒循經傳至厥陰倘頭痛脉浮為
欲愈不愈用小建中湯小建中湯芍藥多桂薑甘
草大棗和更加節糖補中
厥虛勞腹
痛服之瘥

惡寒

或問惡寒何以是表曰人身外為陽為表寒屬陰邪今表虛為寒所乘名曰陰盛陽虛蓋陽不能溫其膚衛於外致令空虛雖居密室亦引衣自蓋謂之惡寒仲景云陰盛陽虛汗之則愈故惡寒屬表假熱在肌膚必裸體煩躁是曰惡熱又焉得為惡寒乎若見惡寒知寒在肌膚急投甘辛之劑可也又曰裏症亦有惡寒者何故曰裏症惡寒者直中也非傳經裏症也蓋傳經之症其熱已入腑必然惡熱焉得惡寒直中惡寒者乃寒氣盛極陽微不溫故厥逆而惡寒別在何處直中惡寒無頭痛發熱之症為異經云發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰也又問惡寒固屬表倘傳經裏症盛急亦微惡寒治法如何微惡寒者表未盡也必先解表表解然後攻裏若裏急權下之此活法也又曰設誤下而為結胸令邪在胸而痛盛急微惡寒何法治之曰結胸為誤下而成今惡寒是邪未盡而結於胸必先解表方服陷胸藥若再攻之表邪又結於

傷醫大全

卷四十一

寒門

三

顧氏秘書

胸必不可救故結胸有一毫惡寒不可攻可見惡寒屬表矣

目舌和

或問目舌和何以屬表蓋目乃五臟精華所係舌者所以司內因寒熱而變之者若臟腑有熱目必黃赤舌必乾燥黃黑今日舌如常知邪未入臟腑表病裏和專屬於表無疑

脊項強

或問曰脊項強何以見其是表曰太陽經起於目內眥上抵額角自顛頂下行入項走肩膊由肩脊至足小指皆太陽經絡部位邪客背脊循脊上下故脊項強屬太陽表症至於他經各行其道又何至脊項強哉既曰項強屬太陽屬表當發汗又言結胸項強者當下何故曰結胸項強者非真項強也蓋結胸誤下致表邪入胸胸與項近邪結上焦襖於項氣不得宣通其首仰不能俯俯則胸痛危在須臾故結胸項強脹痛者當急下之非太陽經項強也別之奈何太陽經症其症首能俯仰亦

傷醫大全

卷四十一

寒門

三

顧氏秘書

胸中不痛是太陽經項強也若已經下過其首俯而胸痛者結胸項強也

喘

或問喘者何以是表症曰肺主皮毛寒邪外傷必從皮毛而入肺有七葉同氣升降表受寒邪斂束於肺至氣不可上下故發喘也以麻黃湯論之用杏仁者為肺金而設麻黃所以去皮毛之寒邪皮毛與肺同氣連合所以喘屬表症今久病喘者尚用麻杏况新病乎又曰喘既屬肺為表指掌云喘

傷寒

卷四十一 寒門

書

顧氏秘書

滿不惡寒者當下而痊何也曰有一等傳經裏症因便閉不通故濁氣壅塞而成喘者此則不出於肺故當下之必察其外症若有一毫表症而喘者勿作裏症治也悞為裏症而攻之則逆仲景云喘家無裏症當投杏子此言明甚

咳嗽

或曰咳嗽何以屬表曰肺為五臟華蓋形如覆釜今寒邪客之則葉斂束不能開發故氣上衝經云時感於寒乃為咳嗽可見咳嗽屬表矣曰裏症亦

有咳嗽否曰裏症雖有欬嗽屬直中而不屬傳經

蓋直中咳嗽者乃寒急上束於肺故咳嗽下利清穀四肢厥逆外無表症為異倘兼有表症而咳嗽者又非直中咳也若云傳經咳嗽則不是夫傳經屬熱熱主流通其氣出入疾速又寧有咳嗽耶問曰裏熱無咳嗽人言咳嗽屬火者何也曰咳嗽屬火者雜症也病有虛實二火火主炎上亦令咳嗽或先受寒起咳久則變熱亦屬火嗽二者皆久病也內外無寒症惟咳嗽而已故有新久之別新則

傷寒

卷四十一 寒門

書

顧氏秘書

為傷風為傷寒久則為虛火為實火風寒者散之虛火者從治之實火者清涼之曰逆治曰從治皆治雜症咳嗽也至於傷寒一見咳嗽非表即直中傳經斷無之

四肢拘急

或問四肢拘急何以是表症曰寒侵皮毛則拘急經云寒多則筋骨攣痛熱甚則筋弛肉緩故四肢拘急屬表無疑曰陰經每見拘急者何也曰乃直中陰經因傷寒拘急何以別之有身熱頭痛者表

症也無身熱頭痛者直中也至於汗吐下後四肢

拘急者此津液內竭血不能潤筋骨宜真武湯

真武湯芍木苓草附子炮來一氣煎咳嗽辛乾並五味下痢去芍乾薑全小便利時茯苓減嘔者去附生薑

口不渴大小便如常

或問口不渴大小便如常何以是表症曰蓋皮毛

肌肉為表筋骨臟腑為裏邪在表則內和口不渴

二便如常若裏熱薰灼臟腑必口渴便閉或不利

腸垢而小水短赤拂其常矣

湯醫大全 卷四十一 寒門 美 顧氏秘書

脈不出

或問脈不出胡為表病也曰夫脈者血之府熱則

血行豈有脈伏之理惟表受寒深脈遂隱伏曰裏

症亦有伏脈何謂也夫裏症伏脈惟直中者有之

乃寒極凝滯不行用四逆湯加豬膽汁治之

四逆湯附草三陰脈逆太陽沉或並薑芎參芍桔通陽復脈力堪任若傳經裏症則屬

熱熱則血行脈何得伏有陽厥熱極脈亦伏者此

又何說熱極脈伏百無一二外或見大熱症脈雖

伏指必溫亦或有痛處痛極故脈伏也至於尋常

脈伏非表症即直中矣

以上俱表症當發表

尺寸脈俱長

或問尺寸俱長何以知邪在肌肉曰長者泛溢也

過乎本位陽明乃氣血俱多之經邪一傳之薰蒸

肌膚氣血淖溢故脈陰陽俱長耳當用辛涼解表

不可用辛甘正表之藥或云脈長者邪舍陽明肌

肉有投承氣者何也蓋用承氣者乃陽明之腑非陽

明之經也夫陽明腑病當下之其脈長洪有力便閉

湯醫大全 卷四十一 寒門 美 顧氏秘書

譚語等症方敢投承氣若陽明經病其脈長而浮

乃表病裏和又孰敢用承氣乎又云凡病在陽明

不可下又曰陽明當急下之令醫者是非莫辨蓋

仲景所立諸法淺人莫解而叔和以六經各集成

篇致陽經不分經腑陰經不分傳中抑知仲景用

攻者攻陽明之腑不攻陽明之經表者表陽明之

經不表陽明之腑又安得以經為腑以腑混經乎

目痛鼻乾

或問目痛鼻乾何以是邪在肌肉也余謂目乃陽

明胃腑所居之經絡胃司肌肉邪必由皮毛而入
肌肉目痛鼻乾故云邪在陽明肌肉至於他經則
各行其道何有是症

漱水不欲嚥

或問漱水不欲嚥何為邪在肌肉曰唇者肌肉之
本今唇焦思漱水是邪在肌肉然不欲嚥者曷故
蓋熱止在肌肉臟腑無熱不過漱水以潤唇耳故
不欲嚥乃表病裏和又曰表症已除遂屬裏症或
亦漱水而不嚥者治法從表乎從裏乎曰既無表

湯醫本全

卷四十一

寒門

素

顧氏秘書

症裏必有熱熱則消水漱當嚥矣若不嚥者是內
有瘀血也何以辨之外無表症必見小腹硬滿小
便自利大便枯黑者是也宜用桃仁承氣湯攻之
桃仁承氣五般奇甘草硝黃併桂枝
熱結膀胱小腹脹如狂蓄血最相宜

以上俱邪在肌肉當解肌

脈不浮不沉

或問不浮不沉何以是半表半裏症曰浮為表沉
為裏今不浮不沉表邪將入腑故脈不浮裏邪尚
未入臟故脈不沉非表非裏知邪在中也屬半表

半裏無疑

嘔吐

或問嘔吐如何是半表半裏曰蓋邪將入裏裏氣
上冲邪正相爭雖出於胃原是少陽部位膽為清
淨之府毫物不能容納今邪氣相干故令嘔吐屬
半表半裏又有胃熱胃寒之分辨之以口渴與不
渴耳

胸前脹滿

或問胸前脹滿何以是半表半裏也曰身上半屬

湯醫本全

卷四十一

寒門

素

顧氏秘書

陽身下半屬陰胸前乃清陽之分正在半表半裏
之間邪至此將入裏而未深入裏今胸滿而腹未
滿者乃邪氣非有物也故胸滿在半表半裏之間
若腹滿者是有物而非邪氣也但痞氣亦脹滿胸
前何以別之曰痞氣因邪在表悞下以致胸脹必
問其人曾經下否若經下過即是痞氣未經下而
胸前脹滿者即半表半裏症

耳聾

或問耳聾何以是半表半裏症曰蓋足少陽膽經

上絡於耳故見耳聾知屬半表半裏也

脇痛

或問脇痛何以爲半表半裏曰蓋足少陽膽經布於脇脇痛故爲半表半裏至於他經或出於巔背或布於面目何得脇痛或云水氣亦令人脇痛曰水氣必作乾嘔心滿咳引脇痛及頭汗出此水氣脇痛非少陽脇痛也若半表半裏脇痛者外必見膽經之症耳

舌滑

湯醫太平

卷四十一 寒門

望

顧氏秘書

或問舌滑何以是半表半裏曰舌司腸胃寒熱之變係矣邪在表則舌和如常在裏則舌乾而各色現出今舌滑尚有津液潤澤但不如常其邪將入腑未入腑非在表非在裏故云屬半表半裏

往來寒熱

或問寒熱往來何以是半表半裏曰夫邪在陰則寒在陽則熱少陽膽經正陰陽交界之所邪至此經致陰陽相爭寒熱相半故寒熱往來屬半表半裏或問曰陽明亦有寒熱往來者何意曰若陽明

經病邪在肌肉則身發熱焉有寒熱往來已傳陽明之腑鬱熱薰蒸結糞在內故寒熱或往或來是陽明之腑非陽明之經當用調胃承氣湯攻之胃承氣硝黃甘草緩微和將胃保不用朴實傷上焦中焦燥實服之好故云陽明內實則寒熱往來耳

頭汗

或問頭汗爲半表半裏者蓋以諸陽經脈絡上至頭則有汗諸陰經脈絡繫背至頸而還焉得有頭汗故一見頭汗卽屬半表半裏或問曰既諸陽脈

湯醫太平

卷四十一 寒門

望

顧氏秘書

上至頭今汗出當云表症何以爲半表半裏曰若表症尚有寒邪閉塞焉能有汗今既有汗是寒邪將化爲熱名曰裏症則頭有汗名曰表症則頭無汗故云半表半裏又曰瘀血水氣發黃亦有頭汗者何也夫瘀血頭汗小便自利水氣頭汗胸滿咳嘔發黃頭汗小便不利若半表半裏頭汗必往來寒熱也然三症頭汗皆未離乎陽可見頭汗屬半表半裏也

盜汗

或問盜汗何為半表半裏曰夫熱邪薰灼腠理使人有汗寒則腠理閉密無汗是裏當出汗不止今汗在睡而出覺而收乃邪將旺於陰分猶未深入於陰亦屬半表半裏又問曰雜症盜汗亦作半表半裏治乎曰雜症盜汗乃陰虛之極血分虧損名曰勞怯之症今傷寒盜汗乃有餘之邪名曰外感非雜症一例論也

目眩口苦

或問目眩口苦何以是半表半裏曰日者肝之竅

傷醫大全 卷四十一 寒門 望 顧氏秘書

膽汁藏於肝病在少陽膽經故目眩口苦者膽之汁也熱泄膽汁故口苦二者是少陽膽經病半表半裏法宜和解至於他經便無此症

以上俱邪在半表半裏當和解

脉沉有力

或問脉沉有力何以是傳經裏症曰夫脉存則生脉絕則死太過不及則病內實則脉實內虛則脉虛今沉者病脉也主病在裏有力者實也主病為熱今脉沉有力是裏實且熱也

下利清黃水

或問下利清黃水何為裏症曰蓋腸胃因久失下致燥糞結實成塊則清黃水下漏魄門如物之聚而結實者水液不能滲漏物堅如磊石者沃之水必滲漏矣今病者下利清黃水糞結如磊石在內此水從結糞傍流走而出急下之無疑往往以直中下利清穀者為漏底傷寒若誤認此症為漏底投以四逆如抱薪救火殆哉故云下利清黃水是裏症當急下之

傷醫大全 卷四十一 寒門 望 顧氏秘書

小腹痛

小腹痛者胡為裏症曰夫胸膈屬清陽之分雖脹滿是邪氣而非有物小腹乃糟粕之區若脹滿非邪氣也故知有物急下之又云瘀血症及溺澁症者亦少腹脹滿何以別之凡小便自利少腹硬滿而痛者此瘀血症也小便不利而少腹脹滿者即溺澁不通也若小便短赤大便閉結致少腹硬者乃內有燥糞故爾滿也即瘀血溺澁皆是裏症 譫語發狂

譫語發狂為裏症者蓋熱實於胃熱極故發狂輕則令人譫語皆是傳經裏症難經曰發狂譫語乃實熱陽盛所使經言有虛有實何也曰驚狂屬虛或當汗不得汗火迫致狂名曰火邪驚狂當用柴胡龍骨牡蠣之類非若實熱發狂可下也

發斑

或問發斑亦裏症耶曰斑有溫毒有熱毒有胃爛溫毒者即冬受寒至春陽與陰氣相搏而發者是也熱毒者是暑氣伏胃因遇寒而發者是也胃爛

湯醫大全

卷四十一 寒門

醫

顧氏秘書

者或誤下而熱乘虛入胃或失下而熱不得外洩毒氣入胃深極也故斑者毒也毒者垂危失常偏陰偏陽之至也外因六氣相感胃有熱毒薰蒸胃主肌肉熱甚傷血裏實表虛故令周匝遍體狀如蚊螻紅赤者生紫黑者死以熱極而胃爛也舌苔唇裂者不治治當解毒清涼不可表藥取汗蓋表虛裏實發汗則益令開泄更增斑爛矣又問陰症亦有發斑者何也曰或因汗吐下後中氣虛乏或因慾事耗損真陽或因過服涼藥遂成陰症寒伏

湯醫大全 卷四〇

於下通其無根失守之火上薰肺胃而發斑點其

色淡紅隱隱見於肌表與陽症發斑色紫赤者不

同此胃氣極虛若服寒藥立見危殆吳鶴臯曰以

參芪桂附而治斑法之變也醫不達權安足語此

又問曰內傷亦有發斑者何也曰內傷元氣不足

之病因氣血兩虛亦身痛心煩作熱但脈虛大懶

於言動倦怠自汗為異耳若妄作外感有餘治立

見傾危速進補中益氣湯熱眠熱止自愈丹溪曰

內傷發斑者胃氣極虛一身之火遊行於外宜補

湯醫大全

卷四十一 寒門

醫

顧氏秘書

以降之大建中湯最佳

有伏陰誤服涼藥逼其虛湯浮散於外而為陰斑

脈雖洪大按之無力或手足逆冷過肘膝者先用

炮薑理中湯以復其陽次隨症治不應加附子

轉失氣

或問轉失氣何以是裏症曰言其氣下泄也觀無

病人將欲大便必先氣泄病者內有燥糞結而不

通則氣必下失陽明篇云若不轉失氣者不可投

承氣湯是知轉失氣屬裏矣

六三

頭痛發熱俱止

頭痛發熱俱止是裏也邪之初中始於太陽太陽為表之表頭痛發熱俱多少陽陽明為表之中亦頭痛發熱若邪入裏必表症盡除焉得頭痛發熱乎

自汗

自汗何為裏症經云寒則腠理閉塞熱則腠理開踈太陽始受寒邪未化為熱腠理緻密無汗當用麻黃湯始無汗忽變為有汗者知熱已入腑薰蒸

湯醫本全

卷四十一 寒門

吳

顧氏秘書

鼎沸故自汗為裏症假寒在表焉有汗乎或問自汗為裏有用桂枝湯又曷故蓋自汗用桂枝湯者乃太陽傷風症夫裏症自汗為陽盛孰敢用桂枝仲景去桂枝下咽陽盛則斃別之奈何浙浙然惡風頭痛發熱悉具者太陽傷風自汗也煩躁惡熱不惡風寒者裏症自汗也

小便多

或問小便多者何為裏症曰蓋飲食入胃由胃傳於小腸經曰小腸者受盛之官胃司水穀清濁不

分一槩混受由小腸而下則有膀胱與大腸清者從溺滲入膀胱糟粕從胃之下口傳於大腸膀胱竅開水入大腸必作泄瀉若大便堅閉津液走前則小便頻數今小便多者大便閉結故症屬裏也小便若少大便雖閉水液不久浸入大腸當先鞭滿而後溏泄矣仲景云小便少者不可攻以其不久當自便也

潮熱

或問潮熱何以是裏症曰潮熱者如潮水之汛不

湯醫本全

卷四十一 寒門

吳

顧氏秘書

失其期如今日發於未申至明日仍發於未申蓋未申時屬陰今見潮熱是邪居陰分熱結在裏薰灼結糞當下之又問曰潮熱屬裏固當下猶有表症何以治之曰已有潮熱倘兼表症未退必先解表然後攻裏乃為當耳

下利腸垢

或問下利何以是裏曰下利出於腸胃若表有邪則裏和焉得下利因邪入腑熱灼腸胃致有此症又曰表症亦下利否曰三陽合病則有下利或少

陽陽明合病陽明者內主胃腑故有下利三陽合病若不入腑又無下利何者為辨但有發熱及諸表症耳下利固為裏症又當分傳中傳經則腸垢直中則清穀二者下利以腸垢清穀為異

惡熱
或問惡熱何以是裏症曰熱傳臟腑薰蒸煩寃揭去衣被揚手露體此熱傳裏也若有寒在內則惡寒焉有惡熱之理

目不明
傷醫木半 卷四十一 寒門 吳 顧氏秘書

或疑目不明以為裏者何解曰目係五臟精華五臟屬陰陰居於裏故云在裏况瞳人屬腎內熱灼極則腎水枯涸不能照物譬之炎天熱甚致目昏蔽當速下之以救腎家將絕之水設謂此症屬虛誤投熱藥害豈淺鮮哉

腹痛
或問腹痛何以屬裏曰嘗考坤為腹乃純陰也謂之曰陰則腹痛非表明甚若腹未痛而胸前痛者邪未深入尚作半表半裏症今腹痛知邪已傳腑

矣曰既腹痛屬裏當投大黃又用桂枝者何意曰或太陽症誤下致腹痛尚有微表未解或太陰裏症而脈帶浮者故用桂枝大黃今表裏兩解然腹痛雖屬裏又有傳經直中之分須慎之

不眠
或問不眠何以見裏症曰蓋熱邪入腑令人煩躁不安若寒盛為直中則屬陰陰主靜靜則多眠又豈能不眠又問不得眠固屬傳經裏症有投寒藥愈盛者何故此乃汗吐下後症也名曰津液內竭不得眠必心蘊虛煩脈未浮弱也 富用真武湯及酸棗仁湯而裏症不眠者則煩燥口渴不已脈必有力故知之

傷醫木全 卷四十一 寒門 吳 顧氏秘書
手足心腋下出汗
手足心及腋下出汗為裏症者蓋人身諸背屬陽諸腹屬陰手足掌心腋下皆居陰地五臟經絡所係熱邪薰蒸臟腑致掌中腋下汗出若掌中腋下未滋潤者邪尚在表未入裏謂之表病裏和今掌心腋下出汗知大便已鞭實急下之為裏症無

疑

咽乾齒燥

或問咽乾齒燥何以屬裏曰夫咽為胃之路齒乃骨之餘今咽乾者腑熱盛也齒燥者熱灼骨也骨與胃非裏乎或問曰內熱甚當咽痛寒症亦咽痛何也蓋直中之寒為咽痛必下利清穀四肢厥逆此乃寒極而成反致咽痛與之水則不欲嚥不若傳經咽乾齒燥極喜飲水耳

以上俱傳經裏症當攻裏

傷醫大全

卷四

寒門

辛

顧氏秘書

脉沉細無力

或問脉沉細無力何以是直中寒症曰蓋元氣固於一身暢於四肢熱則脉數寒則脉遲定理也沉者陰也無力者虛也是寒中陰經陽氣衰微故脉不能有力假內有熱脉必實而且滑安得無力若脉無力即為寒為虛為直中耳外雖有表症或大熱之症不敢用攻裏及發表藥若不憑脉而槩投麻黃令重虛其虛欲救晚矣

背惡寒

或問背惡寒如何是直中曰陰邪入於陽分陰盛陽衰當用附子理中湯或曰陽明腑病背亦惡寒何也曰夫陽明腑病背惡寒者外無寒症必見口渴煩躁背屬陽陽熱內陷入腑則背空虛致微惡寒故用白虎湯若口中和者正屬直中寒症又孰敢用白虎耶總之渴則內有熱不渴則內有寒也嘔吐清涎沫

或問嘔吐涎沫何以為直中曰胃腑有寒熱必先

現涎沫內經云諸嘔吐酸水及水液渾濁者皆屬

傷醫大全

卷四

寒門

辛

顧氏秘書

於熱諸病吐涎及澄澈清冷者皆屬於寒如天寒則水清天熱則水濁之意若有熱有火在胃脘之間自燒耗津液以致口渴化為酸濁之水又安得有清涎沫乎

四肢厥逆

或問四肢厥逆何為直中寒症曰蓋四肢屬陽寒邪屬陰陽衰陰盛故發厥過乎肘膝况肘膝乃人之四關今寒過之是為直中脉沉遲無力者急温之或問又有陽厥者何也此物極則反雖厥指甲

尚温不似寒厥冷極外症必口渴煩躁惡熱小便短赤大便或閉或下利腸垢脉必沉實有力但有一症卽以爲別

多眠

或問多眠何以屬直中曰陰盛則靜靜則使人多眠若傳經熱症則屬陽陽主動焉得多眠又云表症亦有多眠者何說曰表症是感邪深重必頭痛發熱方爲表症多眠若傳經裏症則煩躁惡熱揚去衣被甚則譫語發狂又何能多眠耶總之多眠非直中寒症卽是表症矣

傷醫大全

卷四十一 寒門

三

顧氏秘書

乾嘔

或問乾嘔何以是陰寒症曰蓋寒鬱中脘陽氣不舒欲吐不吐名曰乾嘔若有熱在內則吐出物或嘔酸苦水便無此症或謂太陽少陽水氣亦令人乾嘔何也曰太陽乾嘔頭痛發熱少陽乾嘔胸滿脇痛水氣乾嘔咳引脇下痛惟直中乾嘔則外無一毫表症必見下利清穀而慘澀漸及諸寒症然太陽少陽水氣三者乾嘔究未離乎寒也

下利清穀

或問下利清穀何以是直中寒症夫寒邪居內則水穀不化經云食下卽化腐臭而出者是有火也食下不化完穀而出者是有寒也又云天寒則水清天熱則水濁病機云諸水液澄徹清冷者皆屬乎寒今下利清穀非寒而何若傳經熱症便下利腸垢而不下利清穀矣

吐蛔

或問吐蛔何爲直中曰蛔得熱則安遇寒則泛吐蛔必膈上有寒也投之涼藥則逆當急温之又問曰倘外大熱症而吐蛔亦禁用寒涼藥否曰如烏梅理中丸係安蛔藥也皆用附子乾姜雖有熱症必先安蛔而後可治他症不然膈上虛寒犯之必危

踈臥

或問踈臥何爲直中曰熱則舒暢流通何有踈臥試觀常人冬月獨臥寒極必踈臥天氣稍煖則手足伸舒臥便自如曰陽經表症亦有踈臥者寒耶

傷醫大全

卷四十一 寒門

三

顧氏秘書

熱即曰陽經踈臥表中寒深故也須大發表分別
在有頭痛發熱及諸表症乃是陽經踈臥蓋陰經
踈臥則無一毫表症

囊縮

或問囊縮何以屬直中者曰蓋熱主流通寒則歛
縮且直中寒症乃陰盛陽衰不能溫其下故令陰
囊收縮如常人遇冬舉丸反隱於上此寒盛也遇
夏舉丸下垂此陽盛也然指掌以囊縮用承氣者
何意曰厥陰者肝也肝主筋膜若次第傳至厥陰
傷醫太全 卷四十一 寒門 蕭 顧氏秘書

唇甲青

六經已盡邪氣盛者致筋急舌卷如中風狀而囊
為之歛搐以筋聚於陰器故也非似直中曰隱曰
縮夫指掌以囊縮當下者必口渴煩滿極方敢投
承氣至於口不渴兼有一毫厥逆清穀悞投承氣
必危
或問唇甲青何以是寒症曰蓋指得血而能握唇
得血而色赤今寒中之血凝不能濡潤唇甲色變
况色之赤者為熱青者為寒急溫無疑或曰陽厥

亦唇甲青別之如何曰陽厥熱深也熱極反厥然
唇甲似青實非青也乃紫黑色唇雖紫口必渴與
之水則飲破唇視之咽喉如煤指甲雖紫尚溫若
直中者唇青而口和甲青而厥逆寒熱之辨相隔
千里司命者凜之毋忽
小便清長

或問小便清長何為內有寒乎曰夫內熱則便赤
短少內寒則便清且長或曰邪在皮毛未入腑者
亦便清長何以別之曰邪在表為表病裏和言便
如常今謂之曰清長則異於常時耳要知直中小
便清長必見厥逆清穀外無表症為異若有頭痛
發熱而小便清長如舊者則又屬表矣
以上俱直中寒症當救裏

似症辨疑

少陰似太陽

有少陰直中發熱似太陽發熱何以辨之曰蓋太
陽發熱必有頭痛脈浮而緊宜麻黃湯少陰屬裏
寒不當發熱今發熱何也乃表裏俱傷惟表有寒

傷醫太全

卷四十一

寒門

蕭

顧氏秘書

故發熱雖發熱脉必沉遲或下利清穀當用麻黃
細辛以發表附子以温中令表裏寒邪兩解若有
頭痛發熱而脉重緊卽是太陽表症又何以爲少
陰熱乎經云陰症少頭痛設有頭痛發熱兼之下
利清穀卽是兩感於寒而非少陰熱矣
陽明經症似腑症

有陽明經症誤作陽明腑症者如何辨蓋陽明經
病表病裏和也陽明腑病裏病表和也經腑同見
者表裏俱病也經則目痛鼻乾無便閉語惡熱

傷醫大全

卷四十一 寒門

素

顧氏秘書

等症此不可下腑則惡熱自汗便結無頭痛惡風
惡寒此不可汗然汗解者汗陽明之經而不汗陽
明之腑下者下陽明之腑而非下陽明之經也
表症自汗似裏症自汗

有表汗認爲裏汗何以別之蓋表病自汗太陽傷
風也裏病自汗熱邪傳腑也風者善行數變性主
舒暢萬物人身腠理開故自汗必惡風頭痛發熱
其脉浮而緩若裏症自汗則惡寒身熱蒸沸亦
腠理閉而自汗惡熱甚外熱大裏症其脉洪而有

方一惡風脉浮而緩一惡熱脉洪有力須細察之
表症身痛似直中身痛

表症身痛似直中身痛從何分別蓋表症身痛太
陽傷寒也裏症身痛寒邪經中三陰也名曰表則
頭痛發熱名曰陰又何有頭痛發熱表症身痛者
重表之直中身痛者重温之皆寒爲病以寒主凝
滯血脉故令人身痛若熱則無身痛症
如狂似正狂

如狂未若正狂之甚陽熱盛極令人發狂其症大
傷醫大全

卷四十一 寒門

素

顧氏秘書

便閉結小便短赤面紅口乾經曰重陽者狂此之
謂與若如狂乃蓄血下焦少便自利唇焦漱水不
欲嚥當用桃仁承氣湯一小便短少而狂甚一小
便自利而糞黑爲別

動陰血似衄血症

動陰血與鼻衄何以異蓋衄從鼻孔中流出若動
陰血則不止在鼻乃少陰傳經裏症熱極而反厥
逆者是誤用麻附以熱症而用熱藥使內熱愈甚
迫血妄行故從耳目口鼻中流淌名曰動陰血非

衄血也

表惡寒似裏惡寒

表惡寒不同裏惡寒者直中裏症惡寒外無一毫身熱頭痛若表症惡寒必有發熱頭痛之異經曰發熱惡寒者發於陽無熱惡寒者發於陰此乃千古確論

古確論

陰躁似陽躁

有陰極反煩躁似陽躁者何法辨之蓋熱極煩躁必口渴飲水能嚥或大便閉或下利腸垢腹中急

湯醫本

卷四十一

寒門

素

顧氏秘書

痛若直中陰寒反躁者乃物極則反口雖渴欲水不下嘔大槩以脉消息之耳辨其有力無力脉稍有力而能嚥水者即是陽躁非陰躁也

瘀血發黃似鬱熱發黃

瘀血發黃與鬱熱發黃何以別之蓋當汗失汗致熱邪傳裏薰灼肌肉熱弗能升越令人發黃則小便不利若膀胱熱不解瘀血蓄於下焦而發黃則小腹硬痛而小便自利二症發黃惟視小便利與不利耳

熱厥似寒厥

寒熱之厥辨在何處蓋寒厥四肢逆冷過乎肘膝指甲青脉沉細無力有寒症見於外若熱極而厥者火極似水雖厥而指甲尚溫不似寒厥過乎肘膝脉來沉實大而有力以此為別

直中咽痛似傳經咽痛

直中傳經皆有咽痛不知傳經咽痛必口渴渴能消水大便閉不閉則下利腸垢小便短赤若直中咽痛則脉來無力或下利清穀口不渴而咽痛者

湯醫本

卷四十一

寒門

素

顧氏秘書

名曰腎傷寒急用半夏桂甘湯若見口燥渴即傳經咽痛宜用苦寒之劑二者總在渴與不渴消水不消水辨焉

太陽無脉似陰脉

太陽無脉即脉不出也認作陽症見陰脉者不可也蓋太陽無脉因寒邪在肌膚凝滯不行血脉難以週流故無脉乃表感寒邪深重外必見太陽症方是當大發表以通血脉豈得混作陽症見陰脉乎

太陽脉似少陰

有太陽脉似少陰別之奈何在外絕是太陽表症
頭痛發熱惡寒身痛脉當浮緊今反沉遲無力此取
脉不取是太陽表症得少陰脉此裏虛久寒正氣
衰弱故脉不能浮緊而見沉細若正氣旺脉必浮
緊何至沉遲無力故用四逆湯使正氣旺通寒外
出脉遂自然浮緊設誤投麻黃發表是重虛其虛
矣

太陽腑症似裏症

太陽腑症與裏症有辨蓋太陽腑者膀胱也膀胱

傷醫大全

卷四十一 寒門

李 顧氏秘傳

所以盛溺若溺短赤即太陽腑病候以溺赤為裏

症者非太陽始受病必頭痛發熱甚則邪傳於本

腑遂便赤此邪止在太陽經腑其他臟腑平和無

恙勿作裏症治當兩解太陽經腑之邪發散中加

滲利藥如五苓散五苓散治太陽腑白木澤瀉猪

苓散無寒但渴服之茯苓勝膀胱氣化添官桂利便消

起有表症兼溺赤即不敢用發散然果是裏症而

小便短赤無一毫表症清利無妨若溺赤而兼有

表症外無胃腑症者此是太陽經腑相傳太陽經腑相傳

表又何疑焉

津液內竭誤利小便

有津液內竭小便不利而失錯利之過矣蓋人身
之汗與溺同源經云天寒衣厚則為氣為溺天熱
衣薄則為汗言寒則溺多而汗少熱則汗多而溺
少陽明腑病汗多小便不利者皆津液內竭妄利
之重虛其虛而便愈不利矣果是裏症熱在下焦
及未曾大汗而小便不利者方用滲利之品若一
見自汗或大汗後小便不利者乃津液內竭切勿
輕利也

兩感須分傳中

兩感者陰陽雙傳也表裏並行如膀胱與腎脾與

胃肝與膽俱傷若與他經同見即為合病或表裏

俱見遂非兩感矣如活人書宜先救裏以四逆湯

以六書言不可救以攻為主二者偏見非活法也

果見下利清穀必先救裏果見煩滿口乾則先攻

裏大法傳經兩感先治表直中兩感先救裏或救

或攻以治其急為上於陰經中分寒熱於裏症內

何傳中二字不然既兩感何得又試以直中兩感傳中既傳中又何得謂之兩感耶
 論外症頭痛發熱脊項強痛者太陽表症也下利清穀脈來沉遲無力少陰寒症也表急者麻黃湯為主加溫熱之品如麻附細辛湯是也裏急者以四逆湯為主加發表藥令表裏兩解表裏俱急則先治其一若表盛於外而熱盛於內名曰傳經兩感外症頭痛發熱太陽也咽乾口渴腹脹滿少陰也如是只以解表為主加辛涼藥如口渴腹脹滿裏症急者方敢攻裏必加辛涼解表何也凡傳經不與直中同

湯醫大全 卷四十一 寒門 五 顧氏秘書

看直中寒邪徑入陰經五臟已危必先救裏傳經自表入裏若裏症不急有一毫表症必先解表而後攻裏內經所謂逐邪必絕其源者是也如陽明與太陰俱盛於外頭疼目痛發熱陽明也腹脹自利口渴太陰也陽明經病在者宜解肌為主加涼藥治裏陽明腑病同見者調胃承氣湯下之如少陽與厥陰症俱盛於外耳聾口苦發熱少陽也口渴發熱縮厥陰也少陽症急以小柴胡湯至之加以涼藥治裏厥陰消渴囊縮者則以承氣為主加柴

胡牛夏治表噫兩感固為不救司命者能操活法或可冀生總之兩感之寒宜先救裏兩感之熱宜先解表此治兩感之大法亦治兩感之活法也

合病併病

夫合病者用也或二陽形症俱見或三陽形症俱見謂之曰合併者歸也先二陽形症俱病後一陽病裏一陽形病在外方謂之曰併其合病併病形症辨在何處合病如外見脊腰疼痛及耳聾脇痛乃太陽與少陽合病也外見耳聾脇痛及目痛鼻乾乃少陽與陽明合病也如此方謂之合併病如外先見腰脊強及耳聾脇痛後耳聾脇痛止單腰脊項強者此少陽併於太陽也外先見耳聾脇痛後目痛鼻乾鼻乾止而單耳聾脇痛者此陽明併於少陽也外先見目痛鼻乾及腰脊項強後腰脊項強已而單目痛鼻乾此太陽併於陽明也如此方謂併病又曰一經不徹復過一經亦名併病蓋陽主動動則合合則併陰主靜靜則無合併之理假如與陰經同見或兩感或為表裏俱見則不為

湯醫大全 卷四十一 寒門 五 顧氏秘書

合病併病矣仲景云三陽有合病有併病陰經既無合併治法當從表不從裏明矣三陽合病以解表發表爲主看某一經形症多者則以某一經藥爲主加他經藥在內此治合病之大法也若併病看併於何經併於太陽則發表併於陽明經則解肌併於腑則下之併於少陽則和解此治併病之大法也然而三陽合間有下者何也蓋三陽合病宜下外無惡寒必惡熱譫語已合陽明之腑方可用調胃承氣湯若有一毫惡寒不見惡熱譫語孰

傷醫大全 卷四十一 寒門 李 顧氏秘傳

敢下乎

熱入血室

傷寒有熱入血室一症晝則明了夜則譫語如見鬼狀醫誤認爲裏隨大下之或昏冒終日不知人事又誤爲表隨大汗之邪在血脈或誤攻裏或誤發表必至不救試思何以爲血何以爲熱人身之血譬如江河周流不息隨氣而轉在於脈中內經云諸血皆屬於脈又曰脈者血之府夫熱者邪氣也婦人傷於寒邪必不免於病熱或病中經水適

來或已病經水忽絕經去血空熱邪乘虛陷入蓋血之源在心心爲血本又主藏神今熱邪入於血室使人昏冒譫語治惟母犯表裏母傷胃氣只有小柴胡一湯和解或用地黃湯倘誤用他藥令重虛其虛斃而後已不則聽其自愈以經行則熱隨血去倘經來適斷者症如瘧狀其血必結結者血滯不行用小柴胡湯加紅花主之若誤認熱入血室爲表爲裏則死生在乎須臾危哉

胎前傷寒

傷醫大全 卷四十一 寒門 李 顧氏秘傳

蓋胎賴血養血去則胎不能存孕婦設受寒邪大汗則傷血大下則傷陰皆能動胎內經曰奪汗者無血如發汗攻裏必先安胎爲主外有表邪用四物湯爲主倍加黃芩白朮佐以蘇葉乾葛羌活柴胡卽孕婦表藥也外有半表半裏症用小柴胡湯去半夏倍加黃芩白朮卽孕婦和解藥也內有裏症用四物湯加黃芩白朮佐以黃厚樸枳實卽孕婦攻裏藥也假若症候危急非毒藥不能攻又當救母不救子設拘執救胎則母亦不可救矣內

經云婦人身重毒如之何岐伯曰有故無殞者亦無殞者大積大聚衰其大半而止言有故母有故也上無殞者無損母也即救其已生不救其未生亦無殞者言子亦無損蓋言毒藥止攻邪氣邪去病愈則子亦安故言不損也言衰其大半而止者假如發表汗一半則止不可過汗其大下一半則止不可過下恐多汗過下有傷陰血胎氣亦損治孕婦用藥之難如此

產後久病傷寒

傷醫大全

卷四十一

寒門

顧氏秘書

夫產後血氣太虛久病氣血比弱二者設感寒邪治不與正傷寒同產後氣血虧以致惡寒發熱必虛弱無力非傷寒也當大補氣血用小柴胡湯加減在裏用大柴胡湯加甘草大柴胡湯用大黃煎加薑棗表兼裏妙法內攻併外攘若虛弱甚而裏症急者用大柴胡湯加人參固下蓋參能補肺氣肺與大腸相為表裏用參以助藥力雖行而不傷其氣血此產後傷寒用藥之法也若久病虛疾亦惡寒發熱與傷寒相似慎勿作傷寒治虛疾惡寒發作有時鼻口

息均脉虛無力非正傷寒也若脉來者力畏熱惡寒無有間時鼻息氣喘方是外感久病之中又感

寒邪若表症則用參蘇飲

參蘇飲內用陳皮枳殼前胡羌活獨活紫蘇枳殼木香甘草胡人參以表

外感此或人參散毒飲

羌活獨活紫蘇枳殼木香甘草胡人參以表

之不可大用燥熱辛甘之劑愈耗津液若在平

表半裏以小柴胡湯去半夏加減和之蓋半夏能

燥津液故去之若邪在裏用調胃承氣湯去

芒硝加減用之慎勿用寒涼以傷胃氣胃氣一傷

飲食便廢矣此治久病感寒之大法也天久病產

傷醫大全

卷四十一

寒

顧氏秘書

後但傷其寒者不可大發表大攻裏發表則重虛其陽攻裏則重虛其陰必致六亡產後久病固不宜大汗大下設病勢危篤又當從權也

感冒

感冒者非冬時正傷寒也今人不分感冒與正傷寒

一槩混治者多矣蓋冬中殺厲之氣名正傷寒春

夏秋則為溫為暑為涼何得有寒間有非時寒

邪人或感之曰名感冒則所病非輕亦不

得用冬時正傷寒辛甘辛溫之藥當用微辛涼

以解之如蘇軾葛元人春夏皮膚緩而腠理疎
則邪易入或勞力汗出而遇微寒或自外卸衣或
畏暑貪負涼或大時暴寒皆能傷之其症鼻寒清涕
咳嗽頭痛身微發熱微惡寒此感冒症也又何得
謂之傷寒哉或曰夏天既無寒間有陰症而用四
逆湯何也曰夏月三陰在內用事此人必有房事
致腎經空虛或食冷物徑中本經而成此症足者
陰經所過之處或是履寒水徑中本經之絡而成
此症則不謂夏月有寒此自傷之也亦急溫之此

傷寒大全

卷四十一 寒門

六

顧氏秘書

夏月腎虛中寒之症除此則為中暑為熱病
所以春夏只有溫暑間有微寒人或感之則
名為感冒不得律為正傷寒矣



嘉慶己巳仲春鐫

瘍科心得集

盡心齋藏板

瘍科臨證心得集序

醫者意也昔人謂素之所解
 口不能宣而著書為無益語
 雖超妙而不得其平嚮使靈
 樞素問諸經不傳於世而周
 秦以下勘有論述則後世益
 驚疑回惑于生死之交而庸
 醫之誤人者直恒河沙數矣夫
 應變呼吸得心應手驅使草
 木如行三軍此不可得而言也
 至於血脉經絡陰陽表裏之
 會審乎百病之原而善治之
 是猶閉門造車出門合轍何

不可言而亦何可不言錫山高子
錦庭以瘍醫名習是業者流
注不衷於古不通于今守其不
經之才變易而治一毒流于人
而不自知其非高子則曰外科
必從內治然讀內經然後可以

序二

臨症攻其眩瘍也先究乎色
聲味之淫進察乎精氣神之
變寒熱虛實洞見癥結由是
副殺以破之針灸以出之尚其
定方則又君臣佐使子以兄弟
井然銖兩因心益病家之瀕

於危而受活者不少焉余蒞錫
數載家人有患瘍屬治輒效
今年夏幼子腫發於面自唇
齒間延緣頰頰而及于目惡目
潰腐甚創且殆高子過傳以良
膏飲以和劑拔毒剔骨痂脫

序三

而病瘥迨入冬余姊隨發肝氣
日夜掣痛以年逾六旬平素
氣血虛怯深患之亟延高子
至曰癰膿已成幸生皮裏膿
外刺之膿出蓋許痛止即安
余甚感之既乃出所為書焉

余敘讀其論幼孩有所謂腮与
多胃及腸癰者即余家之兩
病其它辨析微至歷有經驗
而辨論獲解雖前人或未之
達然後歎高子之肱折深而
其書未可以賤昧而不顯也因

序四

亟勸之梓而名其集曰心得
是固醫之所以為意絕非有
膠柱之迹存且能深憫夫庸
醫之誤人有以發其蒙而救
其失生用意尤厚矣嗟乎士
大夫高談經濟或鮮能及物

而仁人君子之術願以諸才技之
中則是書之有裨於世豈淺
鮮哉至若運用之妙則非高
子不能言而余又烏能代為之
耶

嘉慶乙丑小春上澣山右楊潤敘

序五



序



憶余幼時偕鄭喜江姊
丈同受業于淮南董村
阮師之內皆松陵靈胎徐
丈往來吳中旅居與小蘿村
師衡宇相望也亦頻相過

序一

愷每竊聞其緒論徐丈方
輯經經之釋諸書嘗質正
於師之曰丈之外科洵精且博
矣而用力乃專意于內科何
哉丈曰凡言外科者未有不
本於內科者也若不深明內

序二

科之旨而徒抄襲舊方
以為酬應鮮有不蹈案
駝腫背之謂矣余心韙之
今閱高子錦庭之書而益
信錦庭積學工學臨證
已三十餘年精習經方洞
曉脈理雖治外科而必熟
復于內經諸聖賢之旨洵能
探其本不籠其末者歟故
其治病也不膠於成見不涉
于附和或症同而治異或症
異而治全神存於心手之際

務使三縛悉除四難並解
非意會于中起然有悟者
其孰能之顏曰心得誠自
道其所自也書成將付剞劂
以嘉惠後學可見用心之厚
而世之習是科者得此書而

序三

循誦習傳奉如圭臬亦可
不迷于嚮往也已今靈胎
徐丈之哲嗣漁村先生世以
家學公卿倒屣名重海內
與予春江埒丈弓淵誼曠日
嘗寄覽焉未知漁村以為

何如也

嘉慶丙寅仲夏吳趨郭一臨
題於錫學之如舟小舍



序四

醫家內外科並有起死之責
毫釐之誤人命係之世人重
肉輕外於傷科每易言之職
是科者又皆庶材膏學不深
明脈氣淺深虛實之辨柔
性矣臣佐使之宜墨守其術

叙一

以鄭按合烏虜其偉不效象其
亦僅矣 高子錦庭係內外兩
科范聖學杜雲門之高弟究心
靈樞素問探索有年洞垣一
方淺其癥結蓋亦內外之學
皆有心伯又憫傷科之誤人也

按專治之亦仁人君子之用心矣
頃出所著見亦名曰心法集
標淺形為而必探治本原量
其陰陽強弱以施治痘余特
周禮天官瘍醫掌腫瘍潰
瘍金瘍折瘍之祝藥劑殺之

叙二

齊注家謂劑者利也膿血殺
者以藥食其惡肉又曰凡療瘍
以五毒攻之以五氣養之以五
藥療之以五味節之注謂攻劑
殺攻為其宿肉於後養之五
氣蓋五穀之誤首上成其藥力

此可以見古者瘍藥攻補並施之明證今之業是者惟持攻毒之方治至外而不知其內循其末而不究其本多怪乎學醫人費也 高子足書出使人知必深明內科如可言外科不

叙三

乃僅執成方亦尔從事其有
功於世豈淺鮮哉
嘉慶十年小春下浣孫尔準書



例言

一余稟性疎愚見聞謏陋豈於方書敢云博覽第三十年來臨證參詳頗有心得茲集中議論時著鄙見其有當於古人與否未敢自必望 高明教之

一是集論列諸證不循瘍科書舊例每以兩證互相發明而治法昭然若揭其中有兩證而同一治者亦有兩證而治各異者如發背搭疽流注腿癰雖生兩處而治法則一如乳癰乳痰及頸項火痰癰痰即發一處而治法各異總以虛實陰陽寒熱分別

例一

臨證者務以意會之審辨明確然後用藥始無所失

一是集編次諸證前後依人身上中下為序例他如痘毒瘋瘡廣瘡結毒等類發無定處不能屬於何部者另列於後始不致牽率混淆以便如例檢閱

一是書未入內景經絡之圖不詳本草氣味之論以古人成書具在考鏡有資毋庸贅述學者稽古証今尋求此集與前哲當有印合處知虞初之本有自也

一是集採摭古人處俱係集腋成裘間有一二錄其原論者則標其姓氏於首餘俱不及著名以難於脩載也並非掠美識者諒諸

一集中所舉湯頭丸散膏丹有可通用者有不可通用者若於逐條論後詳載未免復出繁冗今概另列於後查閱較爲簡易

一世俗每稱我有秘方我不惜工本好藥每遇病卽執秘方施治不明藥中氣味不識瘍發根源陰陽寒熱藥不對證反受其誤是書悉究病因用藥

例二

不執板法雖曰外科實從內治竊以爲得古聖賢之心法故名之曰心得

一大方中有四絕證風癆臟膈是也瘍科中亦有四絕證謂失營舌疳乳巖腎巖翻花是也此外諸證明其陰陽寒熱知其氣血標本俱可醫治然亦有不愈者如腦疽發背疔毒正虛邪實毒甚營枯津液耗傷正不敵邪火毒內陷致有神昏閉脫及陰證之腎俞虛痰陰寒附骨膿出清稀日久不斂精神疲乏胃衰脾敗穀食漸減形神俱奪氣血不能

來復或潮熱自汗或晝夜熱不退致成損怯而斃其論俱詳叙集中細心求之臨證自有把握

一是書凡有緊要外瘍俱已論列其餘零星細證名目猶多茲不繁載者非敢爲遺漏也蓋以瘍科之證在上部者俱屬風溫風熱風性上行故也在下部者俱屬濕火濕熱水性下趨故也在中部者多屬氣鬱火鬱以氣火之俱發於中也其間卽有互變十證中不過一二集內所論頗已詳括餘證悉可參悟而得毋俟再爲指示也

例三

一景岳先生新方八陣悉皆平生心得經驗之方立法純粹以精能補前賢所未備習斯業者日夕浸潤而不覺蒙其惠者飲食仁壽而有餘惜無歌括成書使人誦習余 師聖學范先生臨證之暇曾囊括成章如汪訥菴湯頭歌括之例然簡而未備茲表兄吳鶴山復爲增潤彙爲一帙因附刻於集後以公同好亦足爲博古之一助云

瘍科臨證心得集目錄

卷上

瘍證總論

瘍科調治心法畧義

申明外瘍實從內出論

辨腦疽對口論

腦疽後論

辨百會疽玉枕疽論

辨天疽銳毒虛實論

瘍科心得集

目錄

辨大頭疽抱頭火丹毒論

辨鬢疽額疽論

辨鳳眉疽眉心毒眉心疔眉發論

辨眼丹眼漏論

辨眼泡菌毒眼泡痰核論

辨鼻淵鼻痔鼻蛆論

辨龍泉疔虎鬚疔顴骨疔論

辨唇疔繭唇節唇疔論

辨口瘡口糜論

辨小兒螻螂子雪口疔梅花疔論

辨牙齦托腮寒熱虛實傳變骨槽論

骨槽後論

辨牙漏牙宣牙疔論

辨走馬牙疔風熱牙疔牙菌論

辨舌疳舌痺論

辨木舌舌蛆論

辨舌疔牙巖舌疔論

辨懸癰撻舌論

瘍科心得集

目錄

辨喉蛾喉癰論

辨纏喉風虛實不同及小兒馬脾風論

辨喉疔喉菌論

辨喉痺喉癰論

辨梅核氣喉疔論

辨爛喉丹痧順逆論

附王步三先生爛喉丹痧論

辨耳癰耳菌虛實論

辨鷓鴣瘟耳根癰異證同治論

辨發頤疏豆瘡論

辨頸癰鎖喉癰論

辨風熱痰驚痰論

辨療癰瘦瘤論

辨缺盆疽臍癰脚癰論

附湯森亭先生肩背臂膊諸痛論

辨夾癰米疽論

辨臂癰魚肚癰論

辨骨蠛疽垂臂癰論

瘍科心得集

目錄

三

辨石榴疽鵝癰論

辨螻蛄串肘癰肘後毒論

辨手腕疽兌疽論

辨手癰背手心毒托盤疔論

辨手了癰合谷疽論

辨蛇頭疔蛇眼疔水蛇頭論

辨代指蛀節疔鯁肚疔論

卷中

辨失營馬刀生死不同論

辨猴背搭手陰陽虛實異證同治論

辨胸發疽臈中疽甘疽論

辨肺痿肺癰論

附喻嘉言先生肺痿肺癰論

辨井疽心漏論

辨幽癰赫癰衝疽論

辨乳癰乳痰乳巖論

辨乳癰乳疽論

辨捧心癰脂痰論

瘍科心得集

目錄

四

辨胃腕癰脂癰論

辨脇癰助癰論

辨腹癰臍癰臍漏論

辨小兒臍風臍汁不乾論

辨癰瘰癧塊論

辨大腸癰小腸癰論

辨小腹癰緩疽論

辨腎俞癰鶴口疽論

辨腸風臟毒論

辨脫肛痔漏論

辨肛門癰腫頭毒偷糞鼠論

辨臂癱騎馬癱論

辨胎火胎毒猴猴瘡論

辨赤遊丹流火論

辨囊癰懸癰論

辨附骨疽附骨痰腎俞虛痰論

辨流注腿癰陰陽虛實異證同治論

辨大腿癰陰包毒論

瘍科心得集

目錄

五

辨鶴膝風人面瘡論

辨膝蓋癰疔疽論

辨委中毒膝眼毒論

辨魚肚毒腓膈疽黃鯁癰論

辨附陰疽接骨發論

辨外踝疽內踝疽論

附穿拐痰 醫照毒

辨足跟疽癰癰論

辨脚發背脫疽論

辨湧泉疽足底疔論

辨漏蹄瘋腫眼疽論

辨膝節風漏肩風論

卷下

楊梅瘡結毒總論

辨下疳論

辨腎巖翻花絕證論

辨魚口便毒論

痘毒總論

諸瘡總論

瘍科心得集

目錄

六

辨廉瘡血風瘡論

辨天泡瘡翻花瘡論

辨膿窠瘡黃水瘡論

辨疥瘡瘰癧瘡論

辨白禿瘡肥瘡論

辨濕毒瘡腎臟風瘡論

辨蜘蛛瘡漆瘡凍瘡論

辨跌打損傷及杖瘡論

大麻風論

瘍科臨證心得集卷上

表兄吳辰燦鶴山叅訂

錫山高秉鈞錦庭纂輯

男 觀海履安校

瘍證總論

人身一小天地也天有日月星辰地有山川草木人有五臟六腑不外乎陰陽氣化而已氣化不能全而無偏有順而無逆故天有時而失常地有時而荒無人有時而疾病夫病之來也變動不一總不越乎

瘍科心得集

總論

卷上

內證外證兩端而其致病之由又不越乎內因外因二者何謂內因喜怒憂思悲恐驚七情也陰也何謂外因風寒暑濕燥火六氣也陽也發於陽者輕而易愈發於陰者重而難痊內科外科俱是一例今以內科論之如瘋癆臑膈諸證此發於臟者也陰也治之不易愈如傷寒瘧疾諸證此發於腑者也陽也治之易愈傷寒之傳經在陽經者易愈在陰經者不易愈夫人能知之而外科之證何獨不然有由臟者有由腑者有在皮膚肌骨者無非血氣壅滯營衛稽留之

所致發於臟者其色白其形平塌膿水清稀或致臭敗神色痿憊陰也發於腑者其色紅而形高腫膿水稠粘神清氣朗陽也此其大概也細論之發於臟者為內因不問虛實寒熱皆由氣鬱而成如失營舌疳乳巖之類治之得法止可帶疾終天而已若發於腑即為外因其源不一有火熱助心為瘍有寒邪傷心為瘍有燥邪劫心為瘍有濕邪壅滯為瘍此俱係天行時氣皆當以所勝治之又有寒邪所客血泣不通者反寒熱大作煩躁痠疼而似熱熱邪所勝肉腐膿

瘍科心得集

總論

二

卷上

腥甚至斷筋出骨以致聲嘶色敗而似寒又有勞汗當風營逆肉裡而寒熱難辨者又有不內外因者膏粱之積狐蟲之感房勞之變丹石之威無不可作大疔成大癰即如誤食毒物跌壓杖棒湯火虫獸等傷亦皆作癰作膿總由營氣不從之所致也然則治之奈何亦在審其脈以辨其證而已大約瘡瘍未潰之先脈宜有餘已潰之後脈宜不足有餘者毒盛也不足者元氣虛也倘未潰而現不足之脈火毒陷而元氣虛也己潰而現有餘之脈火毒盛而元氣滯也按

定六部之脉細察虛實其間宜寒宜熱宜散宜收宜
攻宜補宜逆宜從總以適事爲故未可鹵莽圖治也
再瘡瘍之部位其經絡氣血之循行卽傷寒之經絡
也傷寒無定形故失治則變生外證雖有一定之形
而毒氣之流行亦無定位故毒入於心則昏迷入於
肝則癩厥入於脾則腹疼脹入於肺則喘嗽入於腎
則目暗手足冷入於六腑亦皆各有變象兼證多端
七惡登見經曰治病必求其本本者何曰臟也腑也
陰陽也虛實也表裡也寒熱也得其本則宜涼宜溫
瘍科心得集

總論

三

卷上

宜攻宜補用藥庶無差誤倘不得其本則失之毫釐
謬以千里可不慎諸

瘍科調治心法畧義

內經曰諸痛瘡瘍皆屬於心又曰營氣不從逆於肉
裏乃生癰腫又曰膏粱之變足生大疔又曰出汗偏
袒使人偏枯汗出見濕乃生痤癩又曰開閤不得寒
氣從之乃生大僕又曰地之濕氣感則害人皮肉筋
脉由此數者而窮之則知臟腑受病之根源皮肉結
瘍之枝葉也向使內無鬱熱蘊蓄於中外無濕熱侵
襲於內則肌肉流暢氣血和平癰何從生疽何從作
乎凡治癰腫先辨虛實陰陽經云諸痛爲實諸癢爲

瘍科心得集

瘍科調治心法

四

卷上

虛諸癰爲陽諸疽爲陰又當辨其是癰是癩是疽是
發是疔等證然後施治庶不致於差謬如熱發於皮
膚之間腫高根闊者爲癰五臟鬱熱毒流骨髓附骨
而生經曰方覺大如伏爪爲疽酒色迷真厚味適口
或心志不遂鬱不得伸毒生於薄肉處又或染禽獸
之毒或惹牛馬之穢初生黍米不加謹護而誤觸犯
之輕者必重重者必危須用藥以解其毒不然立見
其敗矣夫癰疽發背之證有五善七惡不可不辨動
息自寧飲食知味一善也大小便自調面色光亮二

善也神氣精明語言清明三善也膿潰腫消色鮮不
 是四善也身體和平起居如常五善也五善俱見善
 可知矣若夫七惡二目緊小唇青瘡黑一惡也膊項
 難轉四肢沉重目閉耳聾二惡也聲嘶色脫面青氣
 喘弗寧三惡也不能飲食納藥嘔吐口不知味痛極
 渴甚四惡也冷汗虛汗時出恍惚嗜卧語言顛倒五
 惡也煩躁咳嗽腹痛泄瀉小便混濁六惡也膿血既
 泄腫起猶甚膿水臭穢七惡也七惡俱見則惡不可
 言矣五善見三自吉七惡有二即凶凡治癰疽初覺
 瘍科心得集 瘍科調治心法 卷上 五

一宜以敗毒為主 證治法至於痰核癭瘤瘰
 癧馬刀之疾俱由濕勝生痰痰勝生火火勝生風風
 極而患作矣皆成於內蘊七情外感六慾宜清痰降
 火之劑宜熱敗毒之藥既盛必用外消始覺行以艾
 灸切勿妄行勾割先醫曰諸經惟少陽厥陰二經生
 癰疽惟少陽陽明二經生瘰癧蓋由多氣少血之故
 耳凡診外科之脈脈浮緊應當發熱其不發熱而反
 洒淅惡寒若有痛處必發癰疽脈浮而數身體無熱
 形默默胸中微燥不知痛之所在者必發癰疽未潰
 瘍科心得集 瘍科調治心法 卷上 六

則宜熱拔毒既覺則排膿定痛初腫毒成而未破一
 毫熱藥不敢投先須透散若已破潰臟腑既虧飲食
 少進一毫冷藥吃不得須用和營扶脾此固昔人治
 癰疽發背之法無過於此然更當酌以時令審以脈
 理辨其虛實決以輕重量勢而用庶不致天人之天
 年也至於傷寒流注由可汗而失汗由可和而失和
 血滯皮膚毒阻骨髓故生斯毒從上流下者毒生必
 少從下流上者毒生必多亦須解表清肌拔毒清熱
 可內消而愈矣若疔毒雖有三十六種之別其害則

之先按之有刀鋒之健浮既潰之後按之畧如鋒之
 輕浮此易收功也若未潰之先脈來遲緩不疾不徐
 既潰之後脈來健實或大與洪難取效也若一得癰
 疽脈來前後虛弱此危證也凡刺癰腫須認有膿無
 膿用手按之手起而即復者有膿手起而不即復者
 無膿此所謂引手重按乃痛膿之深也輕按即痛膿之淺
 也按之不甚痛者未成膿也至於用刀手法刀口勿
 嫌闊大取膿易盡而已凡用刀之時深則深開淺則
 淺開慎勿忽畧如開魚口便毒背疽臍癰腹癰瘰癧

宜淺開之若臂癰疔肉厚等處宜深開之使流出膿以泄內毒不可不知也凡瘍初生之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若起居平和飲食如故其瘡疽浮淺也如膿出而反痛者此為虛宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之如疽發深而不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也凡瘡瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不食宜參芪白朮膏以峻補之河間謂瘡瘍瘍科心得集

瘍科調治心法

七

卷上

嘔者濕氣侵於胃宜倍白朮癰疽發渴血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血凡癰疽有實熱者易療虛寒邪熱者難治腫起堅硬膿稠者為實腫平軟漫膿稀者為虛凡治癰疽發背疔瘡乳癰一切無名腫毒先須托裏勿使毒入附延骨髓托裏之後宣熱解毒定痛排膿是為急切工夫

申明外瘍實從內出論

夫外瘍之發也不外乎陰陽寒熱表裏虛實氣血標本與內證異流而同源者也其始或外由六淫之氣所感或內被七情受傷經云邪之所湊其氣必虛陰虛者邪必湊之又云營氣不從逆於肉裏乃生癰腫明乎此義則治證了然矣如夏令暑蒸炎熱肌體易疎遇涼飲冷逼熱最易內入客於臟者則為痧為脹客於腑者則為吐為瀉客於肌表者則為痞為瘰為暑熱瘡為串毒為丹毒遊火客於肉裏者則為癰為瘍科心得集

申明外瘍實從內出

八

卷上

瘍客於絡脈者為流注為腿癰斯時正氣壯強逼邪出外依法治之在內證尤為易愈或三日或五日或一候即霍然矣若外瘍則稍多日期亦有暑邪內伏遇秋而發者在經則為瘧在腑則為痢其在肌絡則為流注腿癰等證是名陽挾陰用藥則以解散和營通絡即不散而成膿亦不至有大患又有正虧邪伏深入交寒露霜降而發者在內則為伏邪癰瘡朝涼暮熱或晝夜熱而不退纏延不已致陰虛化燥瘰癧神迷內閉外脫不可為治在外發癰瘍則為正虛邪

實陰中挾陽成膿潰後雖與性命無妨然收功延日不能速愈此陰陽寒熱表裏虛實氣血標本之大凡也為瘍科中之第一義故首揭之

心身集

臨外場實從內出

九

卷上

辨腦疽對口論

薛立齋曰腦疽屬太陽膀胱經積熱或濕毒上壅或風溫外感或陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸所致其源之淺深不同而證之輕重亦異初起一粒形如蘇豆至一二日微寒身熱漸漸加大至七日成形根盤紅腫頂突寬鬆是為順證斯時憎寒壯熱朝輕暮重舌白苔膩胸痞噦惡脈細弦數此濕熱上壅即用黃連瀉心湯或溫胆法若面油紅舌乾絳赤煩躁乾噦口渴喜飲大便堅實是火熱傷液如犀角地黃湯瘍科心得集 腦疽 對口 十 卷上 或羚羊角銀花地丁石斛蘆根鮮首烏黃芩枳壳山梔丹皮燈心竹葉夏枯艸等類清其火毒解其營熱至十四日後膿透根盤焦紫熱退身涼膿水淋漓倘有不能透徹清營方內加甲末製蚕角針以攻其毒至二候半瘀腐漸脫新肉漸生身熱漸退脾胃醒復過二十八日後腐全脫新肉滿飲食嘉調養好四十日收功 又有一種陰證初起形色俱不正寒熱不加重身雖發熱而色形寒瘍不高腫根盤平塌散漫不收過候不透膿稀不腐正氣內虧不能使毒外洩

而顯陷裡之象此由平日腎水虧損陰精消涸陰火熾甚而成其危險不能過三候矣其中猶有三陷變局謂火陷乾陷虛陷也火陷者氣不能引血外腐成膿火毒反陷入營漸致神迷發瘧發厥乾陷者膿腐未透營衛已傷根盤紫滯頭頂乾枯漸致神識不爽有內閉外脫之象虛陷者膿腐雖脫新肉不生狀如鏡面光白板亮脾氣不復惡穀日減形神俱削漸有腹痛便泄寒熱宛似損怯變象皆不治之證也大凡此證以小者爲對口大者爲腦疽俗卽云落頭疽也

瘍科心得集

腦疽 對口

上

卷上

由感於六淫之邪而發者爲順爲陽傷於七情而發者爲逆爲陰餘疽倣此對疽發背必以候數爲期七日成形成膿三候脫腐生肌

已上論中自陰證起及三陷變局不錄方藥者以其變化多端各宜隨證治之

腦疽後論

腦疽之證前言從外感受者輕從五臟蘊結內發於外者重茲復舉而申明之由外感發者多生於正中屬督脉所主督脉起於尾閭穴貫脊而上氣血交會毒氣得之乃能外發故易於高腫潰膿生肌收口此爲易治之證從內發者多生於偏旁屬太陽膀胱經所主太陽膀胱主司寒水性質多沉起於巔頂貫項兩旁夾脊而下此處發疽氣血與瘡毒交會下流故瘡多平塌根脚走散兩肩漫腫膊項難轉背如負石

瘍科心得集

腦疽後

上

卷上

難以成膿難潰難斂此不易治之證夫所謂從五臟蘊結而成者其源有五心緒煩擾煽動不寧以致火旺而沸騰行於項間與寒水交滯而爲膿者一也惱怒傷肝項乃三陽經統筋之所肝傷則血脉不潮筋無榮養凝結爲腫故項緊急強痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅硬漫腫破流血水木痛無腫者二也思慮傷脾脾氣日損又或膏粱損胃胃汁乾枯以致中脘痞塞氣不運行逆於肉裡乃生壅腫其患外皮雖腐內堅不潰口燥舌乾飲食不進根脚走散膿

穢色敗者三也憂鬱傷肺肺傷則毛竅閉塞腠理不通氣不舒暢縱橫經絡結而為腫其瘡形多平陷色淡不榮華皮腐脂流形如湯潑氣粗短促鼻燥鼻焮漉漉生痰殷殷發嗽者四也恣慾傷腎腎傷則真陰之氣敗真陰一敗相火即生此火最能自升自降或動或靜瘡形紫黑脈數乖度煩躁口乾隨飲隨渴者五也故云內發者重

外瘍中腦疽為第一險證易成易敗變化多端故再細論之特揭篇首

瘍科心得集

腦疽後

三

卷上

辨百會疽玉枕疽論

百會疽者一名玉頂疽起於前頂後一寸五分頂中央旋毛中督脈足太陽之交會處初起寒熱大作形如粟米根盤堅硬疼痛徹腦頭如頂石色赤者可治此由陽經亢極熱氣不散氣血凝滯結聚巔頂而成或由六陽經受風邪風火相煽臟腑熱毒上攻所致其證為陽治以真人活命飲瀉心湯或犀角地黃湯至七日成膿膿泄毒化調理可愈若因心事勞攘或真陰耗竭虛陽浮泛而發其色紫黑三五日後悶亂而神不定則不可治矣證雖發於陽實由陰精之消涸也 玉枕疽即後腦發生於腦後枕骨中由足太陽膀胱經濕熱凝滯而成焮赤高腫者易治平塌漫腫未膿先腐但流血水者難治治與腦疽同

瘍科心得集

百會疽

玉枕疽

兩

卷上

辨天疽銳毒虛實論

天疽銳毒者發於耳後一寸三分屬少陽膽絡左
名天疽右名銳毒俗謂之耳後發此證有虛有實初
起根盤散漫頂不高突平塌色白形神俱靜微惡寒
微身熱漸減穀食此由肝邪久鬱微感溫邪觸動而
發如正旺者氣血亦能化膿潰後腫消鬱散月餘收
功治法用疎肝流氣飲或羚羊角散加石決明牡蠣
刺蒺藜或真人活命飲如陰虧肝旺化風逆絡半邊頭
痛徹腦者正氣不能引血成膿毒必內攻或手足逆
冷或氣喘呃逆或癰或厥或七日或兩候而斃此為
真陰證也 又有溫邪阻絡耳後發腫根鬆頂高初
起雖色白成膿却焮紅憎寒壯熱痛則朝輕暮重潰
後即熱退腫消膿盡收口是即風熱輕證名火痰毒
也治以疎散涼解為主如萬靈丹荆防敗毒散羚羊
角散之類

瘍科心得集

天疽 銳毒

卷上

辨大頭疽抱頭火丹毒論

大頭疽者係天行邪熱疫毒之氣而感之於人也一
名時毒一名疫毒其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無
頭或結核有根初起狀如傷寒令人憎寒發熱頭疼
肢體甚痛恍惚不寧咽喉閉塞五七日乃能殺人若
至十日之外則不治自愈矣治宜辨之先診其脈凡
滑數浮洪沉緊弦滑皆其候也但浮數者邪在表犀
角升麻湯發之沉瀄者邪氣深也察其毒之盛者急
服化毒丹以攻之實熱便秘者大黃湯下之或年高
氣鬱者五香連翹湯主之又於鼻內嚙通氣散取十
餘嚏作效若嚙藥不嚏者不可治之若嚏出膿血者
治之必愈凡左右看病之人日用嚙藥嚏之必不
傳染切須記之其病人每日用嚏藥三五次以泄熱
毒此治時疫之良法也凡經三四日不解者不可太
下猶宜和解之以犀角散芩連消毒飲甚者連翹湯
之類至七八日大小便通利而頭面腫起高赤者可
與托裏散托裏黃芪湯如腫甚者宜砭患處出惡血
以洩其毒凡病者五日以前精神昏亂咽喉閉塞語

瘍科心得集

大頭疽 抱頭火丹

卷上

言不出頭面赤腫湯水難入者必死之候治之無功矣須知此疾有陰有陽有可汗者有可下者粗工但云熱毒只用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審也陶節菴曰大頭傷風之證若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫不開并面部焮赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脉來數大者用普濟消毒飲主之如內實熱甚者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日晡潮熱往來寒熱口渴咽乾目疼脇

湯科心得集

大頭毒 抱頭丹毒

七

卷上

鼻額欠腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止若不散必成膿也俗云大頭天行親戚不相訪問染多不救泰和間多有病此者醫以承氣加板藍根下之稍緩翼曰其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭面為腫盛以承氣瀉胃中之實熱是為誅伐無過遂製普濟消毒飲子與之全活甚眾 抱頭火丹毒者亦中於天行熱毒而發較大頭瘟證為稍輕初起身發寒

湯科心得集

大頭瘟 抱頭丹毒

六

卷上

下滿宜小柴胡湯加花粉羌活荆芥連翹芩連主之若發於頭上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荆防敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者與普濟消毒飲外用清涼救苦散敷之大抵治法不宜太峻峻則邪氣不服而反攻內必致傷人且頭面空虛之分邪既着空虛則無所不至法當先緩後急則邪自服先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃氣弱食少者兼助胃氣候其大便熱結方以大黃下之拔其毒根此先緩後急之法也蓋此毒先腫

熱口渴舌乾脉洪數頭面焮赤有暈治以犀角地黃湯或羚羊地丁銀花黃芩山梔石斛元參丹皮知母連翹之屬若舌膩有白苔者宜黃連解毒湯外以如意金黃散蜜水調塗則愈此證不傳染

辨發疽額疽論

夫發疽者乃少陽三焦膽相火妄動又兼腎水不能生木或感風熱而發蓋髮之際肌肉相薄最難腐潰初起寒熱交作頭眩痛徹太陽甚則耳目連鬢通腫治法不可妄用針灸必分陰陽表裏邪正虛實治之庶不致誤如初見瘡時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脈虛數無力又兼患上堅硬不甚焮痛無潰無膿瘡根流散此乃真氣虛而邪氣實也托裏為主消毒佐之如清肝養血湯托裏消毒散之類若初見瘡時多熱少寒頭眩作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便閉澀六脈沉而有力瘡形根脚不開焮腫疼痛身體發熱易腐易膿此乃正氣實而邪氣虛也消毒為主托裏佐之如梔子清肝湯鼠粘子湯之類又有形色紫黑瘡勢平陷堅硬無膿而毒流耳項又兼氣味不正形容不澤精神不明飲食不進者俱為不治額疽生額上髮際之間曲差穴屬足太陽膀胱經起則多發寒熱頭疼如砵不可忍耐項似拔腰如折先宜用萬靈丹汗之以解散風邪後用清托又有左額疽

瘍科心得集

瘡疽 額疽

九

卷上

右額疽狀如桃李此屬足陽明胃經積熱而成此處近太陽穴於潰後外傷風水即能害人雖貼膏藥亦須遮護謹密又宜用藥使瘡口速斂如經冬月即變冷瘡况此處近太陽穴上至額角都為險處如過時潰爛者不治

瘡疽 額疽

卷上

辨鳳眉疽眉心疔眉發論

鳳眉疽者生於眉心一名印堂疽屬足太陽膀胱經風熱壅結陰陽相滯而生初起色黯根平硬腫疼痛如初起色赤浮腫焮痛此名眉心毒若色黑不痛麻癢太過根硬如釘之狀寒熱並作即眉心疔也治法初用萬靈丹發汗內服荆防敗毒散若不能消散者即用奪命丹活命飲攻之有膿刺之用升膏提毒生肌散收口 眉發生於眉稜無論左右皆膀胱小腸肝胆四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合

瘍科心得集

鳳眉疽 眉心疔 眉發

三

卷上

腫堅硬色赤按之有根易成膿者順無膿者逆至十四朝不潰煩悶嘔逆不食者凶治法與前症同東垣云初起宜用海馬崩毒法救之

海馬崩毒法

凡發背對口眉疽等證初起時

用熱水自肘後洗至手六經起端處止日洗數十

遍以泄熱毒務洗至指甲皮穰方可住洗蓋三陽

經俱屬督脉經所領洗至指甲皮穰者俾熱從根

本而解也此係秘傳慎勿輕忽

辨眼丹眼漏論

夫眼丹者生於眼胞或在上或在下眼胞屬脾胃證雖見於脾胃之部實由心經受毒熱傳脾胃熱毒升上以致氣血凝聚而成丹毒也風多者則浮腫易消熱甚者則堅腫難散宜以如意金黃散敷之湯飲則用羚羊甘菊石決明夏枯草金銀花丹皮山梔等如膿成急以針刺之遲則眼頭自破此乃睛明穴內空難斂成漏者多 眼漏一名漏睛瘡生於目內眥下由肝熱風濕病發於足太陽膀胱經睛明穴其穴係

瘍科心得集

眼丹 眼漏

三

卷上

藏淚之所初起如豈如粟紅腫疼痛瘡形雖小根源甚深斯時宜用清解清散如穿潰每難收斂遂成漏管以升藥條插入提之一日一換數十日方收口內服神效黃芪湯或作為丸亦可此證又有潰斷眼邊弦者最難收口

辨眼胞菌毒眼胞痰核論

眼胞菌毒者乃脾經素有濕熱思鬱氣結而成其患眼胞內生出如菌頭大蒂小漸長垂出甚者眼翻流淚久則致昏朦治法用軟綿紙蘸水磨於眼胞上少頃用左手大指甲墊於患根右手以披針尖頭齊根切下血出不妨隨用翠雲錠磨濃塗之其血自止內宜服涼膈散清脾飲若初起時以清涼圓洗之 眼胞痰核結於上下眼胞皮裏肉外其形大者如棗小者如荳推之移動皮色如常硬腫不疼由濕痰氣鬱

瘍科心得集

眼菌 眼痰

三

卷上

而成外用生天南星蘸醋磨濃頻塗眼皮日數淺者即消日數深者雖不能即消常常塗之塗令皮薄微微剝損以手指甲擠出如白粉汁即愈然消散者多

辨鼻淵鼻痔鼻衄論

鼻淵者鼻流濁涕不止或黃或白或帶血如膿狀久而不愈即名腦漏乃風熱燥腦而液下滲此腎虛之證也經曰腦滲為涕又曰膽移熱於腦原病式曰如以火燥金熱極則化為水然究其原必腎陰虛而不能納氣歸元故火無所畏上迫肺金由是津液之氣不得降下併於空竅轉為濁涕津液為之逆流矣於是腎肝愈虛有升無降有陽無陰陰虛則病陰絕則死此宜戒怒以養陽絕慾以養陰斷炙博遠酒麵以

瘍科心得集

鼻淵 鼻痔 鼻衄

三

卷上

防作熱然後假之良醫滋腎清肺為君開鬱順氣為臣補陰養血為佐俾火息金清降令胥行氣暢鬱舒清竅無壅陽開陰闔相依相附臟腑各司乃職自慎以培其根藥餌以治其病間有可愈者苟或驕恣不慎或誤投涼藥雖倉扁不能使之長生矣主治之方如初起用蒼耳散久則六味地黃湯補中益氣湯麥味地黃湯加味道遙散酌而用之可也 鼻痔者鼻內瘰肉結如榴子漸大下垂或時縮進或時垂出閉塞孔竅使氣不得宣通此由肺氣不清風濕鬱滯而

成夫鼻孔為肺之竅為呼吸之門戶其氣上通於腦
 下行於肺肺氣壅盛一有阻滯諸病生焉故有鼻痔
 之患宜內服辛夷散或辛夷清肺飲外以礪砂散逐
 日點之漸化為水乃愈宜慎起居節飲食庶不致再
 發 鼻衄者或心火或肺火或胃火逼血妄行上干
 清道而為衄也有因六淫之邪流傳經絡湧泄清道
 而致者有因七情所傷內動其血隨氣上溢而致者
 有因過食膏粱積熱而致者治法外因者以辛涼清
 潤為主如羚羊犀角細生地石斛生石羔知母元參
 瘍科心得集 鼻淵 鼻痔 鼻衄 卷上

連翹山梔丹皮等內因者若係肝陽化風上逆則宜
 甘鹹柔婉如阿膠生地石決明天冬麥冬之屬若腎
 陰虧損虛陽浮越者則以滋潛為主如六味九虎潛
 丸之類其由飲食不節而火盛者則用和陽消毒如
 黃連解毒湯是也又書謂婦人產後口鼻有黑氣及
 見鼻衄為不可治者何也蓋五臟之華皆上注於面
 凡色紅赤者陽熱之生氣也青黑者陰寒之絕氣也
 况口鼻為陽明多血多氣之部而見陰寒慘殺之氣
 則胃中陽和之氣衰敗可知矣復至鼻衄則陽亡陰

走也胃絕肺敗陰陽兩亡故不可治

瘍科心得集

鼻淵 鼻痔 鼻衄

卷上

卷上

辨龍泉疔虎鬚疔額骨疔論

夫面部之上人中之中為龍泉人中之旁為虎鬚面
中高骨為額骨俱係陽明絡脈經行之地此三處生
疔俱有輕有重醫者但分輕重治之不必分彼此之
異也其輕者多因風熱而結初起跡如蚊咬而根盤
已經堅腫惡寒身熱次日頭破如一粒椒外用圍藥
敷之頂用白雪丹以萬應膏蓋之間日揭開頂如殭
腐狀以升膏蓋之再間一日揭膏其堅腐自落膿隨
而出藥用羚羊地丁銀花丹皮知母連翹黃連山梔
瘍科心得集
藥疔虎鬚疔額骨疔
卷上

至寶丹及犀角地黃湯外藥亦如前法又古方有奪
命丹可用一粒入瘡頭以膏藥蓋之若不省人事或
牙關緊急以奪命丹為末葱酒調灌亦可若有紅絲
急宜用針於血絲盡處挑破使出惡血以洩其毒或
有生者又有餘毒走絡而遍體發流注者治與陽證
流注同

瘍科心得集
藥疔虎鬚疔額骨疔
卷上

辨唇疔齒疔唇疔論

唇疔生於上下唇唇係脾胃兩經火毒所致初起如粟或不痛或癢甚其形甚微其毒極深其色或赤或白若唇口上下紫黑色者根行甚急不一日頭面腫大三四日即不救疔毒以愈小而愈橫也治宜急泄火毒勿損其脾胃之氣毒易散矣以蟾酥丸犀角地黃湯主之外用白雪丹入瘡頭以膏蓋貼俟次日揭開擠去毒血如未透泄再用再貼又初時須細看腿灣委中穴有紫黑筋用長針刺破出血其毒即泄

瘍科心得集

唇疔 齒疔 唇疔論

无

卷上

或胃火積熱上壅小兒時以舌伸舐以潤其燥以白芷五倍子為末搽之即愈

瘍科心得集

唇疔 齒疔 唇疔論

无

卷上

辨口瘡口糜論

夫口瘡與口糜者乃心脾氣滯更外感風熱所致初起不可使用涼藥敷搽恐寒凝不散內潰奔走久而難愈必先用辛輕升散而後清涼使鬱火達外再視其所因而治之若脈實口乾滿口色紅而爛斑甚者此實火也以涼隔散主之若脈虛不渴口內色淡而白班細點此因思煩太甚多醒少睡虛火上攻宜以知柏四物湯加丹皮肉桂治之更有脾元衰弱中氣不足不能按納下焦陰火是以上乘而為口瘡糜爛

瘍科心得集

口瘡 口糜

三

卷上

者丹溪所謂勞役過度虛火上炎遊行無制舌破口瘡是也又當從理中湯加附子治之若作實熱誤投涼藥則必致害矣又小兒生此證者以陰氣未生陽氣偏盛又因將養過溫心脾積熱薰蒸於上而發治宜瀉心化毒清涼為主若月內諸病而口無涎沫者凶

辨嬰孩螻螂子雪口疳梅花疳論

嬰孩螻螂子者以其在母腹中時吸飲胎火血熱產下後或三五朝而發或半月或月餘而發其始起也兩頰外堅裏腫難於吮乳斯時即以巴豆一粒麝香七厘搗研和勻作兩丸放膏藥上貼兩太陽風門穴次日即起水泡揭開急將銀針挑破去其毒水即愈此水不可令其流入眼內若入眼恐致損明又法將鮮生地一大黃一兩搗爛和入麝香二分均作兩團紮於兩足底湧泉穴如三日後仍難吮乳者即以

瘍科心得集

螻螂子 雪口 疳 梅花疳

三

卷上

刀破之割去其惡腐之物以真京墨磨塗之自愈亦有割傷而外頰堅腫成膿者 雪口疳乃胎熱蘊蓄心脾上蒸於口舌上遍生白屑如鷺之口故又名鷺口甚則咽間疊疊腫起致難乳哺時必多啼叫急用月石一錢以滾水泡半茶杯將棉花裹筋頭上蘸水繳淨白苔重手出血不妨以冰硼散吹之如口內舌上生白斑如梅花瓣者即名梅花疳治同上煎飲用川連大黃銀花鈎藤甘草丹皮山柅石斛等或加犀角汁亦可

辨牙齦托腮寒熱虛實傳變骨槽論

夫牙齦托腮者一生於風寒暑熱陽明濕熱交蒸一
生於陰虧絡空少陽胆火循經上逆生於風寒濕熱
者初起惡寒發熱而浮腮腫牙關不能開合牙齦脹
及咽喉湯水似乎難入實可下咽斯時宜表散透邪
如牛蒡薄荷秦艽蠶蚕夏枯草荆芥石斛等類不可
以喉脹熱盛即用鮮地羚羊清火等藥若遏抑凝滯
則腫愈堅牙關愈閉矣至三四日後寒熱不退不能
消散其膿結於盤牙盡處者為牙齦結於腮邊外者
為托腮結於牙根者為牙癰是可清火徹熱如羚羊
犀角石斛蘆根薄荷荆芥之屬如舌白膩滑惡心嘔
逆者即以芩連山梔或溫胆法如大便燥實者以肺
胃火盛即用鮮地瓜萸枳實杏仁等類穿潰後邪從
膿泄身熱自退脾胃自復牙關自開調養數日即膿
盡收口 其生於陰虧絡空者或其人素嗜酒不節
慾常有鬱勃不舒偶感微邪引動肝陽胆火上循入
絡起自牙關堅固不開腮腫脹惡寒身熱脈細而
數漸漸成膿至十日或半月後膿從牙齦而泄或從

瘍科心得集

牙齦托腮骨槽

三

卷上

舌旁而出或在左延及於右或在右延及於左即名
沿牙毒久則腮邊出頭即名穿牙毒外通裡徹即名
骨槽風延久必成朽骨必俟多骨脫落方能收功此
證雖不害人性命然收功延日難以速痊治當以疎
肝散鬱育陰為主佐以解毒泄熱 又幼孩生此證
者彼既無醇酒炙博又無肝邪鬱滯是因齒生未齊
骨髓未滿營衛未充偶感風寒客熱襲入骨髓正不
却邪而發顯煩漫腫裡雖出膿勢必外潰久不斂口
亦成多骨治法總以調和氣血扶養胃氣為主俟正
氣充足方能脫骨收口矣

瘍科心得集

牙齦托腮骨槽

三

卷上

骨槽風後論

夫骨槽風之證固有傳變而成者矣亦有非傳變而成者其人或有憂愁思慮驚恐悲傷以致氣血凝滯或山風寒襲入筋骨邪毒交生起於耳前連及腮頰筋骨之間隱隱疼痛漸漸漫腫堅硬寒熱如瘡牙關緊急難於進食久則腐潰腮之裏外仍然漫腫硬痛此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合肝脾受傷熱毒蘊積是以筋骨緊急肌肉腐爛而膿多臭穢初宜用艾灸以解內毒服降火化痰清熱

瘍科心得集

骨槽風後

五

卷上

消腫之劑潰後或用八珍湯或十全大補湯補托藥中宜加麥冬五味亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭者非理中湯佐以附子不能回陽非殭蠶不能搜風也若牙關拘急不開宜用生薑片墊灸頰車穴在耳垂下五分陷中二七壯兼用針刺口內牙盡處出血其牙關自開如外腐不脫膿水不清久則必成朽骨俟朽骨脫去始能收口如或穿腮落齒虛熱不退形焦體削痰盛不食者俱為逆證設至後脾氣醒復飲食加增亦有向愈收功者其腐爛處用口疳藥加牛黃珍

珠兒茶吹之外用升膏提之

瘍科心得集

骨槽風後

五

卷上

辨牙漏牙宣牙疔論

牙漏之患起於心胃火鬱腎陰消涸或心事鬱遏胃熱挾其五志之火而發有生於上牙齦者亦有生於下牙齦者初則高腫作痛久則上現黃泡破後出膿漸安然其口難合細如針孔但遇操勞或心緒煩擾或煎炒烟酒過度即再發而腫痛時出穢膿更有串至左右齒根者雖不妨命為累亦甚初起宜升陽散火法或甘露飲久則當用六味地黃湯加元參石斛麥冬蘆根或涼八味或大補陰丸等多服久服自可

瘍科心得集

牙漏 牙宣 牙疔

卷上

五

全愈初治切不可用苦寒之藥內服外搽致令心胃之火鬱而又鬱反使火毒根株愈深亦不可早用斂藥亦能使火毒內斂便有腐蝕脫根落齒之害 牙宣又名齒衄從牙縫中出血或鮮血時從牙齦外溢齒乃骨之餘腎之所主也心腎火邪逼血妄行故齒出血然少陰氣多血少血必點滴而出齒亦隱隱而痛多慾者恒犯之治當涼心滋腎玉女煎或六味地黃湯或涼八味加骨碎補女貞子阿膠地骨皮等主之亦有胃經實火上攻而齒齦出血者陽明氣血俱

多火旺則血如潮湧善飲者每犯之宜清熱涼血犀角地黃湯主之清胃散亦可又有胃虛火動腐爛牙齦淡血常流者宜歸芍地黃湯仍不止亦用犀角地黃湯或玉女煎吹以殺疔止血藥 風熱牙疔如寒熱而起者初則牙痛後即齦腫連腮頰頂尖高突按之引手內有膿也刺之即瘥治以清透散邪牛旁解肌湯或玉女煎或犀角地黃湯各宜酌量治之

瘍科心得集

牙漏 牙宣 牙疔

卷上

五

辨走馬牙疔風熱牙疔牙菌論

李東垣曰走馬疔者腎經熱毒上攻腎臟主骨齒為骨餘上奔而潰勢如走馬之速故名之小兒或因胎毒或因痧痘後餘毒或因傷寒時疫後而發或因疔痢後而結其外候身體壯熱手足時冷或面浮腫或消泄頻頻始則口臭繼遂齦爛色如乾醬後則齒黑有時牙齦出血或膿臭成疘侵蝕口齒甚至顛頰紅腫次日其色變紫隔日即黑再過日即腐脫齒落氣喘痰鳴頭額冷汗而脫矣治法初起宜內服清解如

瘍科心得集

走馬牙疔 風熱牙疔牙菌

完

卷上

犀角地黃湯或玉女煎之類先去積熱再服化毒丹撤去其毒吹以冰青散加西黃珍珠或亦有得生者大凡此證穢氣冲人者死下蝕咽喉上蝕鼻梁者死齒落無血者死涎向外流者死黑腐不脫者死身熱不退者死穿腮透唇者死鼻梁黑暗者死脾敗便泄飲食不進者死 又有風熱牙疔其來迅速寒熱時作即以前兩三日而發大人小兒多有之牙縫出血牙根碎腐宜以疎散清解為主亦有不發寒熱者因胃火濕熱上蒸而發治以清解或苦降泄熱如犀角地

黃湯或黃連解毒湯等吹藥同上或殺非藥吹之亦可 牙菌生於牙齦其形狀紫黑色高低如菌此屬火盛血熱兼氣鬱而成加味逍遙散主之前藥亦可服

瘍科心得集

走馬牙疔 風熱牙疔牙菌

四

卷上

辨舌瘖舌痺論

舌瘖者中風而舌不轉運舌強不能言是也經曰喉
 嚨者氣之所以上下會厭者聲音之戶舌者聲音之
 機唇者聲音之扇橫骨者神氣所使主發舌者也舌
 為心之苗然心之本脉系於舌根脾之絡脉系於舌
 傍肝脉循陰器絡於舌本少陰之脉走喉嚨系舌本
 足四經之脉皆上於舌邪中其經則痰涎閉其脉道
 舌不能轉運而為之瘖矣有喉瘖者勞嗽失音即喉
 嚨聲啞是也故喉瘖者喉中之聲嘶而舌本能言舌
 瘖者舌本不能言而喉中之聲如故中風而舌瘖者
 舌與喉俱病而音聲不能發於會厭也然有外感內
 傷之因外感者風寒火熱之邪也經曰諸病暴瘖皆
 屬於火內傷者心肺腎三經致病亦多由痰火壅塞
 上竅氣血兩虛不能上榮則舌機不轉也有腎虛而
 氣不歸源內奪而胞絡內絕不能上接清陽之氣者
 有元氣不足肺無所資者有血衰而心失所養者蓋
 心為聲音之主肺為聲音之戶腎為聲音之根經曰
 三焦之氣通於喉嚨氣弱則不能上通矣治者能於

傷科心得集

舌瘖 舌痺

望

卷上

根本用力則丹田清陽之氣自能宣揚振作故古人
 每以獨參湯地黃飲子取效也 舌痺者強而麻也
 乃心緒煩擾憂思暴怒氣凝痰火所致夫舌固屬心
 脾而肝脉亦絡舌本故傷寒邪傳厥陰則舌捲囊縮
 而不言七情所鬱則舌腫滿口而不得息心熱則舌
 裂而瘖脾熱則舌滑而胎脾閉則舌白胎如雪肝熱
 則舌木而硬若人無故舌痺者不可作風熱治蓋由
 心血不足血虛火燥耳理中湯合四物湯治之

傷科心得集

舌瘖 舌痺

望

卷上

辨木舌舌動論

木舌者舌忽腫脹轉掉不仁舌者心之苗心者舌之本因心經熱毒而發或因臟腑壅熱心脾積熱其氣上衝而發甚則塞滿口中硬如山甲若不急治則致害人更不可用手去按按則恐損舌根每長致語言不清楚如至啼叫無聲面色頻變而驚疼者不治治法以小刀點紫黑處或刺舌下金津玉液二穴破出血痰以冰硼散吹之內服荆防敗毒散煎藥內務多加山梔乃瀉火之要品也 舌衄者舌上出血如線

瘍科心得集

水舌 舌衄

聖

卷上

不止是心胃火邪熾甚逼血妄行以六味地黃湯加槐花主之或黃連解毒湯犀角地黃湯亦可外用槐花炒研細乾摻

辨舌疳牙巖舌疔論

舌疳者由心脾毒火所致蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證最惡初如豆後如菌頭大蒂小又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重急用北庭甘點之自然縮小而愈若失於調治以致焮腫突如泛蓮或狀如雞冠舌本短縮不能伸舒言語時漏臭涎再因怒氣上衝忽然崩裂血出不止久久爛延牙齦即名牙巖甚則頰腫結核堅硬時痛皮色如常頂突一點色黯不紅破

瘍科心得集

舌疳 牙巖 舌疔

聖

卷上

後時流臭水腐如粟綿其證雖破堅硬仍前不退此為綿潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名翻花巖也因舌難轉掉飲食妨碍故每食不能充足致令胃中空虛而怯證悉添日漸衰憊初起腫赤宜用導赤湯加黃連虛者歸脾湯便溏者歸芍異功湯然此證治法雖多百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已 舌疔舌上生紫泡其形如豆堅硬寒熱疼痛應心而起亦心脾之火毒也宜用蟾酥丸含放舌下隨化隨嚥以解內毒甚者刺之服犀角地黃湯

辨懸癱搥舌論

懸癱者生於上腭形如紫李墜下抵舌初起寒熱大作成癱後舌不能伸縮口不能開合惟欲仰面而臥鼻中時出紅涕乃手足少陰三焦積熱所致治宜刺之去青黃赤血吹以冰青散加黃連內服黃連解毒湯或犀角地黃湯數日可愈 搥舌者舌根下生癰或舌下又生一小舌謂之重舌又有舌下生三小舌其狀如蓮花之形又名蓮花舌蓋舌為心之苗肝脾脉皆絡舌本或由思慮太過心火上炎所致或由脾濕科心得集 懸癱搥舌 聖 卷上

經有熱阻其氣血而成或由憂思抑鬱肝邪上亢而結初起頭痛寒熱交作用牛蒡解肌湯發汗若寒熱不退即用黃連解毒湯或犀角地黃湯有膿針之吹以冰硼散如無膿七日後可消 又或有外感風熱頰下漫腫而發外懸癱搥舌者起時頭疼項強寒熱交作有成膿者亦有不成膿者以鐵箍散圍之治以透表散邪如熱盛或羚羊角川連亦可如過五六日後皮色焮紅漫腫者即成膿矣宜刺之此證與風熱痰毒同

辨喉蛾喉癰論

咽喉為一身之總要百節關頭呼吸出入之門戶左為咽屬胃右為喉屬肺或內因或外感癆證頗多試先即喉蛾喉癰論之夫風溫客熱首先犯肺化火循經上逆入絡結聚咽喉腫如蚕蛾故名喉蛾今世俗鶩之鶩謂不可食菜者非也或生於一偏為單蛾或生於兩偏為雙蛾初起寒熱漸漸脹大即用疎解散邪如牛蒡散加黃連荆防敗毒散之類又以水硼散加薄荷川連末吹之至三四日後脹甚痰鳴湯水難入宜以刀刺

瘍科心得集 喉蛾 喉癰 聖 卷上

喉間腫處用皂角燒灰胆礬牛黃冰片各一分麝香三厘為末吹之必大吐痰而鬆再服清火徹熱湯飲如黃連解毒湯或鮮地羚羊知母石斛元參丹皮蘆根連翹之屬若不大便者可服涼膈散通腑泄便凡蛾有頭如黃色糕者必以刀點之或有不出黃頭者即不必點至七日後寒熱自退腫脹自消大凡風火為期亦有虛火上炎而發者以其人腎水下虧腎中元陽不藏上越逆於喉中而結須用引火歸源之法若桂附八味丸是也辨虛實之法若實火脉數大清

晨反重夜間反輕口燥舌乾而開裂虛火脈細數日
間輕而夜重口不甚渴舌滑而不裂也且外感之腫
脹其勢暴急內因之腫脹其勢緩慢以此斷之庶無
差悞 喉癰生於咽外正中腫形圓正其感風熱而
發者與喉蛾同治若因心肝之火上燦肺金熱毒攻
喉而發為癰腫者宜用龍胆湯或黃連瀉心湯之類

傷科心得集

喉蛾

喉癰

卷上

辨纏喉風虛實不同及小兒馬脾風論

夫纏喉風者熱結於喉腫達於外喉之外且麻且癢
風痰壅甚聲如曳鋸是其候也其證有虛有實虛證
初起前二日必胸膈氣逆出氣短促忽然咽喉腫痛
痰涎上湧甚則頸如蛇掣水漿不入手足厥冷手指
甲白手心壯熱最為危險此由陰虧火亢而發其人
素有痰熱或因飲酒過度而胃火動或因忿怒失常
而肝火動或因房勞不節而腎火動火動痰生而痰
熱燔灼壅塞於咽嗑之間火性最速所以內外腫痛
傷科心得集 纏喉風小兒馬脾風 吳 卷上

而水漿難下也治療之法急則治標標者緩則治本
本者或用丸散以吐痰散熱或用鴛翎蘸桐油探吐
或以銀針刺腫處出惡血吹以冰硼散或刺大指少
商穴出血後用湯藥以降火補虛但治法雖多愈者
不過十之一二醫遇此證亦惟盡人事以待天而已
其證之實者則由風溫襲犯肺胃風火相煽上逆於
喉痰涎隨而湧上亦宜先去其痰後服麻杏甘膏湯
若待三日後病勢不退或更加咽喉掣緊面赤氣粗
即為不治之證矣 小兒患馬脾風是風溫襲於肺

竅或胸膈積熱心火凌肺熱痰壅盛肺脹喘滿胸高
氣急脅縮鼻張悶亂欬嗽煩渴痰潮聲啞喉間氣喘
如曳鋸者是也若不急治死在旦夕陳飛霞道人曰
蓋心為午火屬馬言心脾有風熱也急用牛黃奪命
散下之效用黑牽牛半生半炒白牽牛半生半炒錦
紋大黃晒板榔切晒各取末一錢和勻每用五分蜜
湯調下量兒大小加減痰盛加輕粉一字以大便秘
痰氣平為度

瘍科心得集

喉疔喉疔

究

上卷

辨喉疔喉菌論

喉疔喉間上腭有青白紅點平坦者是也或亦有喉
間作痛而潰爛者此由腎虛火旺沸騰上部而發治
之須用六味丸加減若山梔黃芩元參丹參女貞知
母龜板之屬隨宜用之吹藥冰青散中加五倍子白
芷牛黃珍珠黃連等物又有肺經熱毒積聚而發者
其證生於咽喉之下肺管之上看之不見吹藥不到
飲食妨礙此名過橋疔潰爛作痛往往久而不愈此
或係天行疫毒或係梅毒遺毒俱宜服化毒丹銀花
解毒湯或涼隔散吹藥與上同 喉菌狀如浮萍畧
高而厚紫色生於喉旁因憂鬱氣滯血熱而生婦人
多患之輕則半月二十日重者月餘要在治之得法
患者守戒忌口方能痊愈加味逍遙散主之

瘍科心得集

喉疔 喉菌

平

卷上

辨喉痺喉癰論

夫喉痺者咽喉腫痛無形腫而無形者為喉痺腫而有形即為蛾為癰或

腫一邊或腫兩邊妨於飲食阻於呼吸故名痺也經

曰一陰一陽結謂之喉痺一陰少陰君火也一陽少

陽相火也二脈俱絡咽喉或其人平素陰虧君相無

制亢甚逆於喉中而結或外為風溫所襲助其火邪

致循肺絡入喉而結其風熱喉痺內外皆腫痰涎壅

塞喉間治法先去其痰腫甚者用刀點之出血瀉火

以水研散吹之內服羚羊角散或黃連解毒湯可愈

瘍科心得集 喉痺 喉癰 至 卷上

至虛火上攻而為痺者宜服六味地黃湯知栢八味

丸大補陰丸之屬以滋陰壯水為主又有腎水衰竭

龍火不藏上越於喉中而成痺者以腎脈循喉嚨故

火亢亦有此證其人必時時欬嗽咽燥口渴手足心

熱脉細數若但壯其水而龍火不肯潛藏須用導火

歸源之法從下而引之方能退伏若桂附八味丸是

也餘如阿膠麥冬龜版燕窩女貞貝母元參之類清

燥救肺亦可隨時酌用 喉癰之生也始時必有陰

虛欬嗽後遂喉中作癢而痛嚙唾隨覺乾燥必再加

嚙唾而後快久則成形或如哥窰紋樣又如秋葉背

後紅絲又或紅點密密如蚊蚤咬迹之狀良以真陰

虧損腎火上冲肺金受燥營血枯槁而結治法與喉

痺大畧相等此證若久不愈則咽喉必至失音而成

損怯不可救矣治以清燥救肺湯或大補陰丸或知

栢八味丸

瘍科心得集 喉痺 喉癰 至 卷上

辨梅核氣喉痞論

梅核氣者乃痰氣結於喉中如塊噉之不下吐之不出金匱云婦人咽中有如炙癭半夏厚朴湯主之炙癭者乾肉也此病不因脾胃故不礙飲食二便不因表邪故無骨疼寒熱乃為積寒所傷不與血和血中之氣溢而浮於咽中得水濕之氣凝結難移男子亦間有之藥用半夏厚朴湯乃二陳湯去陳皮甘草加厚朴紫蘇生薑也專治婦人七情之氣鬱滯不散結成痰涎或如梅核在咽咯噉不下或中脘痞滿氣不

場村心得集

梅核氣

喉痞

卷上

舒暢或痰飲中滯嘔逆惡心並可取效蓋半夏消痰降逆厚朴散結生薑茯苓宜至高之滯而下其濕蘇

葉味辛氣香色紫性溫能入陰和血則氣與血和不得上浮也 喉痞者謂有言而無聲由風火侵肺悞服寒涼生冷音雌者輕虛癆肺損音啞者難治又病人瘥後氣短及聲不出者皆肺氣不行宜服降氣湯多加前胡臨服加薑汁以佐之又婦人有子瘖病經云婦人重身九月而瘖者胞之絡脈絕也無治當十月後謂胎至九月兒體已長胞宮之絡脈繫於腎經

者阻絕不通故間有是證蓋腎經之脈上繫舌本脈道阻絕則不能言至十月分娩後而自能言不必加治治之當補心腎

梅核氣

喉痞

卷上

者阻絕不通故間有是證蓋腎經之脈上繫舌本脈道阻絕則不能言至十月分娩後而自能言不必加治治之當補心腎

辨爛喉丹痧順逆論

夫爛喉丹痧者係天行疫厲之毒故長幼傳染者多外從口鼻而入內從肺胃而發其始起也脈緊弦數惡寒頭脹膚紅肌熱咽喉結痺腫腐遍體癍疹隱隱斯時即宜疎表如牛蒡解肌湯升麻葛根湯內加消食等藥喉內用珠黃散吹之至三四日溫邪化火熱盛痧透者解肌湯內加犀角羚羊石斛花粉如大便乾結燥實者涼膈散亦可如協熱便泄舌苔白膩者葛根苓連湯至五六日熱甚神識時迷咽喉腐爛鼻

瘍科心得集

爛喉丹痧

卷上

五

附王步三先生爛喉丹痧論

夫爛喉丹痧之證方書未載其名上稽往古金匱有陽毒之文叔和著溫毒之說其證形與今之名丹痧爛喉者極合本論以升麻龍甲湯黃連解毒湯主治是論邪入陰陽二經治法大例原未教人穿鑿執方學者以意會之可也今考斯證每發於雜氣邪陽之令來勢卒暴莫制如迅雷風烈令人色沮見者莫不萎媮咋舌却走不遑與費氏所論痘證中邪火毒伏之例如脈伏厥冷汗淋便洩痰逆躁煩諸惡欵相同

瘍科心得集

爛喉丹痧

卷上

五

之議治用紫雪丹其法亦不可缺顧臨證權宜要在
生心化裁之妙耳然歟否歟自有能辨之者管見一
班俟 高明教政倘更示以指南不致蒼生貽誤幸
甚幸甚

爛喉丹痧

卷上

辨耳癰耳菌虛實論

夫耳者腎所開竅又屬少陽胆三焦經脈所會之處
為癰為瘍不外乎諸經火逆所致然有虛火有實火
不可不辨也如風溫襲阻初起必寒熱往來頭痛耳
中腫脹脈弦硬數似乎瘧狀用牛蒡荆芥薄荷夏枯
草丹皮山梔或小柴胡湯如得汗邪微則腫脹自平
或至三五日後脹痛更甚身熱不和風溫化火必挾
肝邪上升脹痛時如針刺內成膿矣用羚羊角丹皮
山梔鈎芩夏枯草或龍胆瀉肝湯俟膿泄邪微自熱
場科心得集 耳癰 耳菌 卷上
退痛止但其膿不能即乾必須十日半月收功以少
陽三焦多氣少血血少則肌肉難長故瘡口難合耳
此實火之證也須知耳內有膿時不可用末藥搽之
蓋耳竅止有開而無合將藥納入塞阻孔竅膿不外
泄熱毒即循絡外達繞耳紅腫則發外耳癰矣必欲
開刀膿泄方愈所謂虛火耳癰者或因肝胆怒火遏
鬱或因腎經真陰虧損相火亢甚而發初起亦必寒
熱脹而不腫頭項連項掣痛脈細數神形靜此肝陽
挾虛火上逆不能消散久則成膿此瘍最難速愈初

時用羚羊角散重其鎮肝清熱久宜用大補陰丸或金匱腎氣丸滋陰補虛度可取效又幼孩三四歲時亦有此證經年膿水不乾此係先天不足水不養木肝陽上逆而結不痛不腫不必治之俟陰分足肝陽平則愈矣又小兒因胎風胎熱或洗浴灌水耳內亦致作痛生膿初時不可搽藥候毒盡自愈如月外不癢以紅綿散治之耳菌耳口中發一小粒形紅無皮宛如菌狀不作膿亦不作寒熱但耳塞不通纏綿不已令人耳聾先用針刺破以玉紅膏塗之耳脹痛

瘍科心得集

耳癰 耳菌

堯

卷上

用虎耳草汁滴入耳內痛即止內服藥同虛耳癰

附耳漏生於耳根翎上女孩穿耳穿傷者多此證潰膿最難收口必升藥條提之歷久方愈

辨明鷓鴣瘡俗名土瘡耳根癰同治論

夫鷓鴣瘡者因一時風溫偶襲少陽絡脈失和生於耳下或發於左或發於右或左右齊發初起形如鷓鴣卵色白濡腫狀若有膿按不引指但癢不痛微寒微熱重者或憎寒壯熱口乾舌膩初時則宜踈解熱甚即用清泄或挾肝陽上逆即用熄風和陽此證永不成膿過一候自能消散耳根癰初起根盤堅腫其色亦白止發一邊從無雙發憎寒發熱時踈解散邪得汗則消如過七日身熱不退即欲成膿治用羚羊角散如寒熱無汗即用小柴胡湯加製蚕角刺攻透之俟開刀出膿腫消熱退而安其時用藥須扶胃和營不可亂投補托益風溫偶阻是正旺邪實若投參芪歸朮必致氣血壅滯脾胃呆鈍膿反不清以致延綿日期不即收口大凡風溫偶感者此為陽實證正旺邪實候膿泄邪退營衛自和而愈若用參芪扶正固托則反受其累矣此不可不知也同學者宜類推之如時邪瘧證後餘邪未徹耳項發願亦有成膿者治法與此同

瘍科心得集

鷓鴣瘡耳根癰

李

卷上

辨發頤豌豆瘡論

發頤乃傷寒汗下不徹餘熱之毒未除邪結在腮頤之上兩耳前後硬腫疼痛初起身熱口渴當用連翹敗毒散清熱解毒或普濟消毒飲亦可如正虛邪實津虧液枯大便秘結神識昏蒙脈來弦硬者則以犀角地黃湯加西黃膽星竹瀝主之又有濕溫時邪或伏邪癰瘡或溫疹疫毒雖得汗而餘邪未徹走入少陽發於頤者身體仍然寒熱舌苔白膩或大便堅結或協熱下泄當以瀉心合溫胆或葛根芩連湯治之

瘍科心得集

發頤 豌豆瘡

全 卷上

辨頸癰鎖喉癰論

頸癰生於頸之兩旁多因風溫痰熱而發蓋風溫外發必鼓動其肝木而相火亦因之俱動相火上逆脾中痰熱隨之頸為少陽絡脈循行之地其循經之邪至此而結故發癰也初起頭痛身發寒熱頸項強痛漸漸腫赤投以疎解散邪勢輕者即能消散若四五日後寒熱不解便欲成膿當清熱和營出膿後扶胃和營大約半月收功亦有因於陰虛少陽三焦火鬱上攻氣血凝滯而發者然此證必兼挾風熱非純乎

瘍科心得集

頸癰 鎖喉癰

全 卷上

如寒熱不止患上紅腫光亮而爽者勢必成膿穿潰後不可驟投補托止宜扶胃和營外以升膏蓋貼如膿不外洩用升藥線提之 豌豆瘡者亦因傷寒汗下後餘毒未盡故於瘡後而發只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荆芥連翹羌活白芷之類煎服外用芒硝赤小豆青黛為末以雞子清和猪胆汁調和敷瘡上最効勿動其鬻待其脫落無痕

辨風熱痰驚痰論

夫風熱痰皆發於頸項間以風溫阻於少陽絡絡而發初起寒熱項間痠痛結核形如鷄卵根盤散漫色白堅腫斯時宜用牛蒡解肌湯五日後身涼自能消散如身熱不退即頂尖色漸轉微紅而成膿矣穿潰後膿泄邪退自能收口然此證生於幼孩者多蓋風溫襲入化火發熱最易成膿以幼孩純陽不耐身熱故也成膿時或發瘰癧不妨 又有小兒驚後發痰者以風溫初襲來勢急暴肝陽弗寧即手足搐搦有

瘍科心得集

風熱痰 驚痰

卷上

三

頃其勢稍殺即循經而上結於頸項之間腫硬成瘍此名驚痰其兒即驚止體安如熱不退即欲成膿不可妄用驚藥但以牛蒡解肌湯治之

辨瘰癧瘦瘤論

瘰癧之病屬三焦肝胆等經風熱血燥或肝腎二經精血虧損虛火內動人或悲怒憂思氣逆於肝胆三經二經多氣少血故怒傷肝則木火動而血燥腎陰虛則水不生木而血燥血燥則筋病肝主筋也故累累然結若貫珠其候多生於耳前後連及頸項下至缺盆及胸脇之側其初起如豆粒漸如梅李核或一粒或三五粒按之則動而微痛不甚熱久之則日以益甚或頸項強痛或午後微熱或夜間口乾飲食少

瘍科心得集

瘰癧 瘦瘤

卷上

三

思四肢倦怠或堅而不潰或潰而不合皆由氣血不足故往往變為癆瘵外臺秘要云肝腎虛熱則生癧病機云瘰癧不係膏梁丹毒火熱之變總由虛勞氣鬱所致止宜以益氣養營之藥調而治之其瘡自消蓋不待汗之下之而已也若不詳脈證虛實之異而藥用追餒攻下及行氣散血之藥則必犯經禁病禁以致血氣愈損必反為敗證矣治法若寒熱熾痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯以清肝火兼服加味四物湯以養肝血若寒熱既止而核不散者

此肝經火燥而血病也用加味道遙散以清肝火六味地黃丸以生腎水若腫高而稍軟面色萎黃皮膚壯熱膿已成也宜針以決之及服托裏之劑若經久不愈或愈而復發膿水淋漓肌肉羸瘦者必純補之劑庶可收效若益氣養營湯以補氣血六味丸以滋腎水培肝木補中益氣湯以健脾土是也又如夏枯草能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可用之他若貝母陳皮木香香附青皮地骨皮山梔等為化痰散滯利膈之品亦可隨手加入外又有隔

瘍科心得集

瘰癧 癭瘤

奎

卷上

蒜艾炙之法或又用豆豉餅炙之以琥珀膏貼之亦佳若其氣血未損而核不消者方可服散堅之劑如必效散或遇仙無比丸俟其毒一下即止更以益氣養營湯調理之又有方用夏枯草忍冬花蒲公英各四五錢同煎湯朝夕代茶飲之十餘日漸消然此藥但可治標若欲除根必須灸肩髃曲池二穴以疎通經絡如取此穴當以指甲掐兩肘尖兩肩尖骨縫交接處其患處覺有痠麻者方是其穴此證男子不宜太陽青筋潮熱欬嗽自汗女人忌眼內紅絲經閉骨

蒸煩熱必變成癆瘵而不可救又幼孩生此證者係先天稟薄後天生氣不足營衛並弱之故宜用丸藥以固先天肝腎煎劑以扶後天脾胃方可消散而愈瘰癧者非陰陽正氣所結腫乃五臟瘀血濁氣滯而成也瘰者陽也色紅而高突或蒂小而下垂瘰者陰也色白而漫腫無癢無痛人所不覺內經云肝主筋而藏血心畏血而主脈脾統血而主肉肺司腠理而主氣腎統骨而主水若怒動肝火血涸而筋攣者自筋腫起按之如筋久而或有赤縷名曰筋瘤若

瘍科心得集

瘰癧 癭瘤

奎

卷上

勞役火動陰血沸騰外邪所搏而為腫者自肌肉腫起久而有赤縷或皮俱赤者名曰血瘰若鬱結傷脾肌肉消薄外邪所搏而為腫者自肌肉腫起按之石軟名曰肉瘰若勞傷肺氣腠理不密外邪所搏而壅腫者自皮膚腫起按之浮軟名曰氣瘰若勞傷腎水不能榮骨而為腫者自骨腫起按之堅硬名曰骨瘰當各求其所傷而治其本大凡屬肝脾二經結核宜八珍加山梔胆草以養氣血清肝火六味丸以養肺金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二地

丹皮酒炒黑胆草山梔若中氣虛者補中益氣湯兼服之倘治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒氣凝於瘡口營氣不能滋養於患處以致久不生肌而成漏者悉宜調補脾氣則氣血壯而肌肉自生若不慎飲食起居及七情六滯或用寒涼極藥蛛絲纏芫花線等法以治其外則誤矣又癰瘡諸證只宜服藥消磨切不可輕用刀針搗破血出不止多致危殆

辨缺盆疽臈癰疽論

缺盆疽者生肩前陷中初起肩背拘急寒熱大作飲食少進小水不利卽焮紅腫痛有頭如水泡後遂旁生數頭根盤堅硬此足陽明手足少陽經積熱聚濕所發宜急治之若稍緩必致潰爛是經少血多氣瘡口遂有難合之患初宜蟾酥丸發汗解毒更與荆防敗毒散潰後宜用補托 臈癰在肩下膊上結核如桃如鶯鴨卵色赤痛甚臈臂表裏俱腫惟肘節處差小有似藕形故又名藕包毒屬手三陽經外感風溫

附湯森亭先生肩背臂膊諸痛論

謹按經云西風生於秋病在肺俞在肩背故秋氣者病在肩背然則肩背之痛當責之於肺無疑矣但有風寒風熱氣盛氣虛痰飲之別蓋肺主皮毛皮毛受邪以傳於肺鬱遏經絡因而作痛當以辛溫之藥散之或風熱乘其肺使氣鬱甚者當瀉風熱以辛涼之藥解之又肺主氣化而治節一身或氣盛有餘則壅而不行阻塞經絡肩背則痛或氣血不足則少氣不足以息亦令肩背作痛盛則苦辛瀉之虛則甘溫補

瘍科心得集

肩背臂膊諸痛

究

卷上

之又肺為貯痰之器肺中素有積痰隨氣流注經絡以致隧道壅遏為痛此又當理痰而順氣蓋氣清則痰自化也外此又有腎氣上逆作痛一證此逆氣即陰氣也腎中陽虛濁陰之氣始得上干清陽之位此當甘辛溫藥峻補真陽而驅逐陰邪若專理肺氣反為誅伐無過臂痛之證或為風寒濕所搏或痰飲流入經隧或因挈重傷筋所致或因氣血凝滯經絡不行而作痛其於治法風則散之寒則溫之痰則理之若因傷筋而血瘀治以通經而活血諸法之內總當

佐以薑黃桂枝以其橫行為手臂之引經也

瘍科心得集

肩背臂膊諸痛

丰

卷上

辨夾癰米疽論

夾癰者又名腋癰生肩膊下窩內若其皮色不變漫腫無頭日久方痛乃生寒熱者此由肝經血滯脾經氣凝所發此患難消終必作膿未破者用柴胡清肝湯已破則益氣養營湯主之首尾溫補切忌寒涼三四日即頭痛寒熱者此足少陽胆手厥陰心包絡手少陰心三經外感風熱而發首宜疎風散邪兼和營通絡則邪熱退而腫消矣 其有赤色堅腫者名曰米疽初起之時其形如核即寒熱時作亦由肝脾二

瘍科心得集

夾癰 米疽

十一

卷上

經憂思恚怒氣凝血滯并風溫外襲而發其治法即與前二證相參可也

辨臂癰魚肚發論

臂癰魚肚發者俱生臂上在臂外為臂癰在臂內垂肉處為魚肚發總緣經絡熱極風邪外干氣血有垂而生也當分經絡用本經之藥為引行其氣血則未成可消已成亦易潰而易愈矣其分經治法則東垣之論甚詳焉其曰臂痛有六道以兩手伸直垂下大指居前小指居後而定之前廉痛者屬陽明以升麻乾葛白芷行之後廉痛者屬太陽以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之夫臂肘之上接骨之下內連大小筋脉此處發癰痛每舉動不便垂手多墜疼如膿深徹骨即傷筋脉拳縮不舒搗搗又宜加緩慢筋脉之藥此治法之大較也至其散邪清熱化毒和營則與諸癰疽同治如秋令伏邪阻絡舌白嘔惡寒熱胸悶者即用瀉心或溫胆法如風溫夾濕火入絡者即用羌防靈油片黃之類

瘍科心得集

臂癰 魚肚發

十一

卷上

辨骨蟻疽垂臂發論

薛立齋曰骨蟻疽生臂外前廉大骨之後屬手陽明大腸經由七情不和積怒積憂積熱所致初起生瘰如粟米漸大如荳旬日大如桃李堅硬疼痛不可忍若紫暈開大腐爛斑點串通肌肉遍身拘急發搐嘔噦不食冷汗自出滑泄煩躁脈亂者死此乃真陰虛極而火獨亢之故治當滋其化源勿以揚湯止沸之法誤之 垂臂發生於垂臂接骨下臂驚上起如鷄鴨卵大皆由營衛不調之所致也喜患生寔處而不

瘍科心得集

骨蟻疽 垂臂發

七

卷上

透內治宜祛風散邪消痰化毒庶不致有大患矣

辨石榴疽鵠癰論

立齋曰石榴疽生肘尖上一寸餘屬三焦天井穴由三焦相火與外濕熱相搏而成初起一點黃粟小泡根脚便覺開大色紅堅硬漸漸腫如覆碗疼痛不可忍皮破泛出瘡如榴子令人寒熱時作如瘡狀內服蟾酥丸發汗以菊花燒灰存性加輕粉少許研敷腫處神效破後用菊花蓋煎湯洗之頂上用奪命丹以膏蓋之此證以九日得膿為吉反此為凶湯劑如疔疽調治 鵠癰生於肘撐上紅腫作痛若潰之必殞

瘍科心得集

石榴疽 鵠癰

七

卷上

命不可輕忽初宜炙之

辨蜈蚣串肘癰肘後毒論

丹溪曰蜈蚣串生於臂也小臂內中廉屬包絡經由思慮傷脾脾傷則運化遲故生濁液流於肌肉脾氣鬱滯不舒凝結而成初起筋骨如中流矢疼痛漸增漫腫堅硬不紅不熱手背及內關前後連腫數塊臂膊不能轉動日久其腫塊漸次潰破孔孔時流白漿內潰串通諸孔外勢腫硬不消膿水淋漓如漏患者必面黃肌瘦飲食減少午後寒熱交作虛證並添而成敗證矣初宜逍遙散次用人參養營湯調和氣血扶

瘍科心得集

蜈蚣串肘癰 肘後毒

毒

卷上

助脾胃十中可保三四若妄投寒涼尅伐損傷脾胃則沽者鮮矣 肘癰生於肘之圍繞由心肺風火凝結而成形小為癰形大為癰 肘後癰亦風火鬱結氣血凝滯而成二證初起俱宜疎散調營

辨手腕癰兌疽論

丹溪曰手腕癰生手腕外面屬手三陽經由風火濕毒凝結而成乃皮肉澆薄之處若遷延日久不潰或漫腫平塌既潰腐爛露骨者逆難於收功若腫硬焮赤不爛而多生頭者即名鼓椎瘋又名手腕疽 兌疽生手腕裏面橫紋後前梢動脈之間又名脉疽初起寒熱腫痛徹手膊舉動不便此乃肺金門戶若潰深則肺氣大泄最為危候以上二證均衍疔疽調治

瘍科心得集

手腕癰 兌疽

毒

卷上

辨手發背手心毒托盤疔論

手發背發於手背中渚液門二穴屬手少陽三焦經若發於正中勞宮屬手厥陰心包絡經由風熱相乘氣血壅滯而結初起形如芒刺憎寒惡熱昏悶作癢疼痛嘔逆遂滿手背高腫後聚毒成瘡深入至骨成膿潰速者順若漫腫堅硬潰遲為疽又有初起一粒高腫隔日即爛此屬濕火初宜俱用荆防敗毒散次用黃連解毒湯或犀角地黃湯有將手背盡行爛去者須參珍珠散貼白玉膏王膏手心毒一名擎珠毒又名瘰疽屬手少陰心收功

傷科心得集 手發背 手心毒 托盤疔 卷上

手厥陰心包絡二經濕火之毒所結也其瘡如泡色如血赤外形雖小內毒有餘疼痛非常日夜無間此證往往有不能收功流血至死者治法必用大補水之劑佐以解毒之味如地丁銀花元參生地當歸丹皮貝母之屬 托盤疔生於手掌中心係手厥陰少陰二經之所司也由心火熾甚逼血妄行肝風鼓舞毒散四肢加以憂思過度酒色不節遂至毒流骨髓侵於勞宮勞宮係心經之脈絡故毒生焉初起堅硬起泡其泡明亮者即挑之治以銀花解毒湯

辨手了發合谷疽論

五指了處結毒焮腫者除大指合谷穴名合谷疽餘皆名手了發俗名手了支手背了是手三陽經受證手掌心了是手三陰經受證初起如粟漸大如荳焮熱疼痛不止此皆由濕火凝聚而成初起宜踈散清熱解毒成功後其膿不透即以製蚕角刺透之待膿泄邪退扶胃而和其營然後收功 合谷疽又名虎了毒此手陽明大腸經濕熱之毒結聚之所致也初起黃粟小泡熱癢焮痛根深有紅線上攻腋內者即

傷科心得集 手了發 合谷疽 卷上

名合谷疔若初起如荳漸至漫腫堅硬焮痛而不可忍者名合谷疽治法與前證同

辨蛇頭疔蛇眼疔水蛇頭論

蛇頭疔又名天蛇毒又名調疽生手大拇指頂頭或生他指初起如粟漸大如荳或如桃李堅硬赤腫痛疼極速心又或青或白乍黃乍紫乍黑或癢或麻木不痛自筋骨發出根深毒重屬手太陰肺手厥陰心包絡經熱毒結聚而成甚則手背手心皆腫指頭皮硬當以猪胆套之或以雄黃散塗之與以蟾酥丸發汗解毒更服銀花解毒湯若四五日後潰膿有黃頭可刺者順如不潰無膿黑色過節者險其藥即進

瘍科心得集

蛇頭疔 蛇眼疔 水蛇頭

卷上

老

挑破去其惡水即愈

涼膈或黃連解毒犀角地黄湯等若毒氣攻心嘔吐不食膨脹齒縫出血是為危候此證膿未熟時不可開刀早否則致皮裂肉腐疼痛倍增不能速愈若患久即有多骨多骨出始能收口虛而不斂者宜補之更有膿不泄火毒不化腐爛其筋至落去一節者蛇眼疔生於手指甲旁尖角間形如荳粒色紫半含半露硬如鐵釘亦火毒所發若有黃頭出如眼者即以針挑破之水蛇頭指頭有黃泡明亮者是亦宜挑破去其惡水即愈

辨代指蛙節疔鯀肚疔論

代指俗名癩爪生指甲身之內三四日後甲面上透一點黃色初起先腫焮熱疼痛應心宜用甘草朴硝各五錢煎湯浸洗即搽如甲面透黃即係內膿已成但無路得泄須用線針在指甲身就膿近處挑一小孔膿方得出隨後輕手擠盡餘膿用黃連膏貼之易愈若失治以致膿毒浸淫好肉爪甲潰空必然脫落宜用琥珀膏貼之日久收功 蛙節疔又名蛇節疔生於手指中節接骨處繞指俱腫其色或黃或紫由

瘍科心得集

代指 蛙節疔 鯀肚疔

卷上

之再服奪命丹以追其毒餘治同疔疽

火毒凝結而成治同疔疽 鯀肚疔者一名蛇腹疔生於手指中節裏面形如魚肚故又名魚肚毒一指通腫焮熱痛連肘臂由辛熱風濕之毒上干心經故發此毒乃心經受證也但中指通連五指若中指疔色紫黑者其毒必惡易於攻心心若受毒即嘔吐不食神識昏迷而為不治之證矣務用護心丹時時服之再服奪命丹以追其毒餘治同疔疽

瘍科臨證心得集卷中

表兄吳辰燦

錫山高秉鈞

男

觀海履安校

辨失營馬刀生死不同論

夫失營馬刀一為不可治一為可治以患處部位相同而形又相似故併而論之失營者由肝陽久鬱惱怒不發營虧絡枯經道阻滯如樹木之失於榮華枝枯皮焦故名也生於耳前後及項間初起形如栗子

瘍科心得集

失營馬刀

卷中

頂突根收如虛痰癰瘤之狀按之石硬無情推之不肯移動如釘着肌肉者是也不寒熱不覺痛漸漸加大後遂隱隱疼痛着肌骨漸漸潰破但流血水無膿漸漸口大內腐形似湖石凹進凸出斯時痛甚徹心胸悶煩躁是精神不收氣不攝納也隨有瘡頭放血如噴壺狀逾時而止體怯者即時而斃如氣強血能來復者亦可復安若再放血則不能久矣亦有放三四次而斃者余此證為四絕之一難以治療若犯之者宜戒七情適心志更以養血氣解鬱結之藥常常服之

庶可綿延歲月否則促之命期已其應用之方如加

味逍遙散歸脾湯益氣養營湯補中益氣湯和營散

堅丸等酌而用之可也 馬刀由肝血二經鬱逆氣

火所結亦生在頸項間其形長而堅硬按之有青甚

有連發纍纍沿至脇下胸前者亦惡證也倘患者能

使情懷舒暢調養得宜治之以疎肝散邪和營軟堅

則可於半載一年之內而獲全愈設不能自愛又或

境遇不齊證則有增無減綿延日久瘡頭破爛膿血

大潰腫勢愈堅遂成損怯而斃者多矣然究非若失

瘍科心得集

失營馬刀

卷中

營之不可治也故合二證而論之以明其生死不同如此用藥與瘰癧同

辨發背搭手陰陽虛實異證同治論

發背搭手之為瘍重矣其證各異而治則同揆也故合而論之發背者發於脊中屬督脉及足太陽膀胱經其證有上中下之分傷於肺則發於上在天柱骨下傷於心與肝則發於中為對心發傷於脾與腎則發於下為對脾發大抵發背之證其名雖多有蓮蓬發對心發對總不越乎陰陽二證其感於六淫之邪而發者為陽證初起或一頭或二頭數日後或大如手掌或大如碗而焮赤腫高疼痛發熱煩渴不寧勢

瘍科心得集

發背 搭手

三

卷中

若甚重其脉洪數有力能進飲食先以蟾酥丸發汗更與銀花解毒湯或犀角地黄湯清營解熱勿使傷其脾胃俟膿一潰諸證悉安須知有膿時急宜當頭開之否則使毒內攻致生變證至潰後即腐爛尺餘者若無惡證則投以大補之劑肉最易生此陽證易治者也其感於七情而發者為陰證或由於鬱怒憂思或由於房勞過度或由於膏粱厚味醇酒炙博丹石熱毒其人平素陰精消涸火毒內生結聚釀成大患初起一頭如粟根盤散漫不甚高腫不甚焮痛色

平紅活紫滯無神脉微細而無力飲食不進止覺悶痛煩躁大渴便秘睡語咬牙四五日間瘡頭不計其數形如蓮蓬故名蓮蓬發又名蜂窠疽發若見中間一頭獨大四邊出無數小頭者即名百鳥朝王瘡口各含黃濁而積日不潰按之流血至八九日其頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其浮面共爛為一瘡肉雖腐而不脫其膿內攻其色黑黯此元氣大虛而為內陷之證必致神昏瘧厥手足逆冷腹痛泄瀉而不可救矣必於成功後用參耆內托散峻補

瘍科心得集

發背 搭手

四

卷中

元氣冀其引血成膿化毒外泄外用烏金膏或奪命丹蓋貼以提其毒俾不至腫不潰腐不爛方得生機丹溪曰癰疽未潰以疎托解毒為主已潰以托補元氣為主陳遠公謂陽毒可用攻毒陰毒必須補正此數語實為外科樞要慎勿坐失機宜致證危勢篤而束手待斃也 至於搭手亦有上中下之分上搭手生於肩膊後骨上去背溝二指之間名鼠疽乃手足太陰太陽之所司也中搭手生於脊骨第九椎兩旁膏肓穴名青龍疽係陽明太陰之所司也下搭手生

於脊骨第十四節腰窩間旁開三寸背門穴乃大陰經之所司也謂之搭手者因患者以手搭之上中下俱能搭着故名蓋上搭由上焦積熱中搭由心火有餘下搭由肝脾火熾總歸於下元虛弱腎水耗散而成此證亦有陰陽之別陽證形高而腫起陰證形低而陷下陽證色紅陰證色帶滯陽證初起必痛陰證初起必癢陽證潰爛多膿陰證潰爛多血陽證由於外感陰證由於內傷其調治之法與發背之證大畧可通雖曰證有大小勢有輕重而所以清熱化毒補湯科心得集

湯科心得集

發背 搭手

五

卷中

雖潰而外面不腐因暑濕鬱遏而成若膿出稠厚而內腐易脫者易愈治與陽證發背同又治發背搭手之證最妙灸法不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但未成膿或不潰者俱可灸之取大蒜切片安瘡頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛方止其毒氣自然隨火而散若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪瘡頭上聚艾於蒜餅上燒之亦可蓋如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效

湯科心得集

發背 搭手

六

卷中

辨胸發疽腫中疽甘疽論

胸發疽生於正胸堂去結喉三寸與心窩不遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命宜速治之若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也宜用牛黃熊膽研細香油調塗四邊弦上以免開花如痛甚用乳香沒藥為末鋪粗紙上外以青布片捲好蘸清油點火在瘡四圍照之痛自止矣內服蠟酥丸活命飲以消散之若便秘脈實者即與涼隔散通腑泄熱成功後托裏消毒潰則用八珍十全等補劑斂口 腫中疽

瘍科心得集 胸發疽 腫中疽 甘疽 七 卷中

生心窩上兩乳中間屬任脈腫中穴蓋腫中為氣之海氣所居焉能分布陰陽若臟腑陰陽不和七情不平則發此毒初亦服蠟酥丸活命飲若腫硬發熱作嘔大便秘結煩躁飲冷舌乾口苦六脈沉實有力宜服內疎黃連湯以內除之使邪氣不致傳變歸心則吉傷如前證治法 甘疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴之下無論左右皆由憂思氣結而成治法同上

辨肺痿肺癰論

人有久嗽後肺受損傷皮膚黃瘦毛悴色焦咽喉腫啞寒熱往來自汗盜汗氣喘不得卧小便數而不渴口中有濁唾痰沫而無膿寸口脈數而虛濇者此為肺痿人有胸膈間作痛咽乾口燥而渴喘急不得安卧咳嗽不止吐痰便覺疼甚按之更增氣急痛不可忍四肢微腫喉間聞腥臭之氣隨吐膿血胸前皮膚甲錯肉微起其人能右睡而不能左卧左卧即喘急不安脈數而有力者此為肺癰痿者萎也如草木之凋而不榮為津亡而氣竭也癰者壅也肺氣鬱逆久壅而成也蓋肺為五臟華蓋處於胸中主於氣候於皮毛凡勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺則汗出惡風欬嗽短氣鼻塞項強胸膈脹滿久而不瘥便成肺痿又或汗下過多重亡津液亦能致之若其風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏氣血稽留蘊結於肺久則變為肺癰至如房慾不節腎水虧而虛火上炎又或醇酒炙博辛辣厚味薰蒸於肺無不可成癰也然痿為正

瘍科心得集 肺痿 肺癰 八 卷中

氣虛癱為邪氣實正氣虛者治之宜緩邪氣實者治之宜速虛則宜補中帶清實則宜補中用瀉治癱宜清燥救肺湯治癱則未潰者宜葶藶大棗瀉肺湯或千金葶藶湯其已潰者宜內補黃芪湯

易斗心集 肺癰 肺癰

附喻嘉言先生肺癰肺痿論

金匱所論肺癰肺痿之證誰秉內照曠然洞悉請以一得之愚借為敷陳人身之氣稟命於肺肺氣清肅則周身之氣莫不統攝而順行肺氣壅濁則周身之氣易致橫逆而犯上故肺癰者肺氣壅而不通也肺痿者肺氣萎而不振也纔見久咳上氣先須防此兩證肺癰由五臟蘊崇之火與胃中停蓄之熱上乘乎肺肺受火熱薰灼即血為之凝血凝則痰為之裹迺至咳聲頻併口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛濁痰如湯科心得集 肺癰 肺痿 十 卷中 膠發熱畏寒日晡尤甚面紅鼻燥胸生甲錯寸口脈滑數而寔此肺結之癰日漸長大則肺日脹而脅骨日昂始先即能辨其證屬表屬裏極力開提攻下無不愈者奈何醫者但知見咳治咳或用牛黃犀角冀以解熱或用膏子油粘冀以潤燥或朝進補陰丸或夜服清胃散千蹊萬徑無往非殺人之算病者亦自以為虛勞尸瘵莫可奈何迨至血化為膿肺葉朽壞傾囊吐出始識其證十死不救嗟無及矣間有癰小氣壯胃強善食其膿不從口出或順趨肛門或旁穿


脇肋仍可得生然不過十中二三耳金匱治法最精
 用力全在未成膿之先今人施於既成膿之後其有
 濟乎肺痿者其積漸已非一日其寒熱不止一端總
 由胃中津液不輸於肺肺失所養轉枯轉燥然後成
 之蓋肺金之生水精華四布者全藉胃土津液之富
 上供固缺但胃中津液暗傷之實最多醫者粗豪不
 知愛護或膝理素疎無故而大發其汗或中氣素餒
 頻吐以倒傾其囊或癰成消中飲水而渴不解泉竭
 自中或腸枯便閉強利以求其快漏卮難繼只此上
 傷科心得集
 肺癰 肺痿
 十一 卷中
 供之津液坐耗岐途於是肺火日熾肺熱日深肺中
 小管日窒咳聲以漸不揚胸中脂膜日乾咳痰艱於
 上出行動數武卽喘鳴衝擊連聲痰始一應寸口脉
 數而虛其人咳口中反有濁唾涎沫者爲肺痿之病
 金匱治法非不彰明然混在肺癰一門况難解其精
 意大要緩而圖之生胃津潤肺燥下逆氣開積痰止
 濁唾補真氣以通肺之小管散火熱以復氣之清肅
 如半身痿癱及手足痿軟治之得法亦能復起雖云
 肺病近在胸中呼吸所關可不置力乎肺癰屬在有

形之血血結宜驟攻肺痿屬在無形之氣氣傷宜徐
 理肺癰爲寔誤以肺痿治之是爲實實肺痿爲虛誤
 以肺癰治之是爲虛虛此辨證用藥之大畧也

傷科心得集

肺癰 肺痿

十一 卷中



辨井疽心漏論

井疽生於心窩乃任脈經鳩尾穴又名穿心毒最為難治此因心火妄動而發若初起狀如黃豆即煎赤高腫心躁煩而肌熱如焚唇乾舌燥黃色渴飲冷水斯時或以涼膈散通腑瀉熱或用犀角地黃湯清營解毒若得瘡勢漸退自可調理而愈如或堅硬紫黑毒氣內陷惡聞食臭嘔吐不寧精神恍惚腹脹泄瀉者不治又有起時腫硬肉色不變積久穿潰者此名穿心冷癩乃因多食生冷死厭之物惡毒積久內犯

瘍科心得集

井疽 心漏

三

卷中

心包絡故外發於心掩也宜以溫補氣血之劑治之心漏者初時胸間生瘡因不慎酒色致成漏竅每每流血久則神形困憊腰痛難伸行同僂僕此其瘍雖屬心根由於腎夫心腎本相通也心氣必得腎氣以相生腎氣必得心氣以相閉心漏之成成於腎氣之泄安可不補腎氣之衰乎然補腎而心氣不閉則補腎無益蓋有出氣而無止氣耳或云漏瘡多成於濕熱今補腎而不閉心竅則漏不愈閉心竅而不去濕熱只治心腎漏亦不能愈也然漏亦不同漏在他

處者可泄其濕熱在胸間者不可泄濕熱也蓋漏既成於腎虛腎虛則寒而非熱也腎虛者腎水虛而非邪水盛也補真陰而邪水自消溫腎寒而濕熱自退矣溫腎丸主之鹿茸二具去毛酥炙附子二枚泡去皮臍入參青鹽各二兩瓦松二枝紅棗四兩煮棗搗丸每空心酒下三十九丸服月餘而漏自愈一方無瓦松人參此方兼治腎虛腰痛如神

瘍科心得集

井疽 心漏

三

卷中

辨幽癰赫癰衝疽論

幽癰生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鷲
卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結
腸胃不通火鬱而成斯毒自內發外者也初服神授
衛生湯潰後即用補托 赫癰生臍上三寸屬任脉
經建里穴由七情鬱火凝結而成初如粟粒癢痛相
兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微
紅頂尖根束漸透赤色者以活命飲消散之成膿後
用托裏消毒散既潰宜參著內托散 衝疽一名中
瘍科心得集 幽癰 赫癰 衝疽 卷中

癰疽生於臍上二寸係任脉經下臍穴由心火熾甚

流入腎經所致腫高色赤膿稠者易愈若不塌黑色

膨脹惡心膿水清稀內腎疼痛瀉利無度謔語直視

者死潰久不斂者死凡此皆屬虛耳法宜用大補之

劑如能受補即不死也

辨乳癰乳痰乳巖論

薛立齋曰乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經
男子房勞恚怒傷於肝腎婦人思慮憂鬱損於肝脾
皆能致湯第乳之為瘍有不同有乳中結核形如丸
卵不疼痛不發寒熱皮色不變其核隨喜怒為消長
此名乳癰良由肝氣不舒鬱積而成若以為痰氣鬱
結非也夫乳屬陽明乳中有核何以不責陽明而責
肝以陽明胃土最畏肝木肝氣有所不舒胃見木之
鬱惟恐來尅伏而不揚氣不敢舒肝氣不舒而腫硬
瘍科心得集 乳癰 乳痰 乳巖 卷中

之形成胃氣不敢舒而畏懼之色現不疼不赤正見

其畏懼也治法不必治胃但治肝而腫自消矣迨遷

散去薑薄加瓜蒌半夏陳皮人參主之

此方端解肝

胃氣不解自舒益以瓜蒌半夏
治胸中積痰痰去腫尤易消也 有乳中結核始
不作痛繼遂隱隱疼痛或身發寒熱漸成膿潰破
者此名乳痰或亦由肝經氣滯而成或由於胃經痰
氣鬱蒸所致用藥疎肝之中必加貝母半夏瓜蒌等
以治痰則才膿可消至已潰必兼補氣血方易收口
乳瘍之不可治者則有乳巖夫乳巖之起也由於

憂鬱思慮積想在心所願不遂肝脾氣逆以致經絡痞塞結聚成核初如豆大漸若棋子不紅不腫不疼不癢或半年一年或兩載三載漸長漸大始生疼痛痛則無解日後腫如堆粟或如覆碗紫色氣穢漸漸潰爛深者如巖穴凸者如泛蓮疼痛連心出血則臭並無膿水其時五臟俱衰遂成四大不救凡犯此者百人百死如能清心靜養無望無碍不必勉治尚可苟延當以加味道遙散歸脾湯或益氣養營湯主之此證潰爛體虛亦有瘡口放血如注即時斃命者與

瘍科心得集

乳癰乳疔

七

卷中

失營證同

辨乳癰乳疽論

夫乳癰之生也有因乳兒之時偶爾貪睡乳以口氣吹之使乳內之氣閉塞不通以至作痛此即外吹證因循失治而成者有因所乳之子膈有滯痰口氣吹熱貪乳而睡熱氣吹入乳房凝滯不散乳汁不通以致結核化膿而成者亦有憂鬱暴怒傷肝肝氣結滯而成者又有肝胃濕熱凝聚或風邪客熱壅滯而成者始時疼痛堅硬乳汁不出漸至皮膚焮腫寒熱往來則癰成而內膿作矣凡初起即當發表散邪疎肝清胃

瘍科心得集

乳癰

乳疽

十

卷中

速下乳汁導其壅塞則自當消散若不散成膿宜用托裏若潰後肌肉不生膿水清稀宜補脾胃若膿出反痛惡寒發熱宜調營衛若晡熱焮腫作痛宜補陰血若食少作嘔宜補胃氣切戒清涼解毒反傷脾胃也况乳本血化不能漏泄遂結實腫乳性清寒又加涼藥則腫硬者難潰膿潰膿者難收口矣其藥初起如牛蒡子散橘葉湯道遙散之類潰後則宜益氣養營湯又若半夏貝母瓜蒌消胃中壅痰青皮疎厥陰之滯公英木通山甲解熱毒利關節當歸甘草補正

和邪一切清痰疎肝和血解毒之品隨宜用之可也
又有濕火挾肝陽逆絡或時疫或伏邪聚結而成者
起時乳頭腫硬乳房嫩紅漫腫惡寒身熱毛孔深陷
二三日後皮卽濕爛隔宿焦黑已腐再數日後身熱
退而黑腐盡脫其生新肉如榴子象摻以珍珠散以
白玉膏蓋之內服疎肝清濕熱之劑以收功此濕火
乳癰也再婦人乳頭有數孔一孔又有一絡絡於乳
房其始生癰也祇患一絡迨其膿血出盡又患一絡
逐絡遮及遂至滿乳則危而不救者多矣初起每早

瘍科心得集

乳癰 乳疽

十九

卷中

服元壽丹可保不傳餘絡今外科謂乳有數 若其

始生硬腫卽有頭出後復旁生數頭頭中有膿不冬

此名乳疽是爲陽明痰熱之毒兼挾肝胆之火結成

治當清理痰氣疎通肝邪解毒和營如荆防蘇葉白

芷貝母瓜蒌青皮夏枯草等物在所需用矣

附 內吹孕婦二三月或至八九個月乳中有核成癰

是胎氣旺而上冲致陽明乳房結腫疼痛宜服石

膏散清之可消若潰後雖膿出腐脫肌生必俟分

脫後始能收口

乳頭風乳頭乾燥而裂痛如刀刺或指之出血或
流枯水或結黃脂此由暴怒抑鬱肝經火邪不能
施洩所致胎前產後俱有之內服加味逍遙散外
以白芷末乳汁頓熟調敷

男子乳癰與女不同男子乳頭屬肝乳房屬腎以
肝虛血燥腎虛精怯故結腫痛治當以六味地黃
湯加歸芍青皮主之

辨捧心癱痞痰論

捧心癱生於人字骨下低陷中腫堅色白脉空孔無力腰痛膚黃面浮有因脫力中傷或受傷營衛失和而發有因抑鬱傷肝肝邪乘脾脾氣不能運行致氣血留滯而發亦有因病後臟腑氣衰營衛不能通調而發治法宜和營通絡調養氣血使之漸漸內消若至成功出膿每易成損性難以痊愈 痞痰生於中腕穴下或左或右初起結核漸漸腫大堅硬色白其病因脉證與捧心癱相似治法亦同此證宜速治若

瘍科心得集

捧心癱

痞痰

圭

卷中

成功後膿從嘔吐出者不治

辨胃腕癱痞癰論

胃腕癱者生於中腕穴又名胃募在人字骨下三指上四寸有外癰有內癰外癰在皮裡膜外初起漫腫漸漸焮紅成膿此由平素醇酒厚味濕熱積聚脾陽失運凝滯氣血而發或因傷寒結胃腑氣雖通脾肺氣虛不能升降以致濕濁混淆留滯不散營衛失和而結治當利其濕熱開提肺氣扶助脾胃清營解毒庶能消散倘有膿即宜開破以泄其邪後用補托收功至於內癰俗名痞癰生於胃中初起中腕穴必隱痛微腫按之堅

瘍科心得集

胃腕癱

痞癰

圭

卷中

硬身皮甲錯不澤也寒熱如瘧多因醇酒炙燔七情火

鬱又外感寒氣隔陽使熱濁之氣填塞胃腕胃中清氣下陷營氣不從故發右關脉必見沉細蓋胃脉見於右關本宜洪大而反沉細者是見胃氣之逆也人迎胃經穴在喉兩旁脉來甚盛以熱聚於胃口而不行故人迎反甚耳有此二脉癱已成矣其時少陰厥逆機關不利胸膈痞悶腹中疼痛連心若脉洪數者已有膿也宜急排之赤薏苡仁湯主之大射干湯亦可設脉遲緊者雖膿未成已有瘀血也宜急下之牡丹皮散

主之如痰氣上壅者甘桔湯大便不利者大乙膏作
九服之小便赤澀腹滿不食者三仁湯體倦氣喘作
渴小水頻數者肺氣虛也補中益氣湯加麥味補之
此證若膿自口吐出必至毒氣漫延腐爛腸胃脾氣
日衰飲食少納形神憔悴精氣竭而斃

瘍科心得集

胃肌癰

肺癰

五

卷中

辨脇癰肋癰論

脇癰又名穿脇癰或發於左脇或發於右脇入之兩
脇乃足厥陰肝經氣分出入之道路一有阻滯不得
疎通鬱而為痛故血亦為之凝聚矣是以脇之上下
發毒皆屬肝經此證多因鬱怒肝火而發或因肝膽
之氣不平而風火內搏營逆血熱結聚而發惟虛怯
人生之若肥胖內實者鮮此證也初起宜梔子清肝
湯解鬱瀉火已成四妙湯加青皮香附膿成者即針
之勿傷內膜潰後宜八珍湯加山萸肉牡丹皮澤瀉
兼滋腎水但氣虛胃弱之人亦不可過與補陽之藥
恐內受熱劑則虛熱愈盛感則透傷內膜切宜慎之
又病因虛勞所得如破流臭敗膿水清稀補托不應
者是死證也 肋癰生於肋條骨間又名俠癰亦
由肝火鬱怒結聚而成初起骨間隱痛漸腫起後
或大如杯碗色或赤或白痛寒難忍內腸絞刺患在
左痛牽右肋患在右痛牽左肋體虛之人難以勝受
惟此處癰疽多是为毒邪入攻而死者多人染此患
急宜用針刺出膿血防其內攻若至二候潰出稠膿

瘍科心得集

脇癰

肋癰

五

卷中

為吉潰出清水為凶治法與前證參用

辨腹癰臍癰臍漏論

腹癰者亦名腹皮癰生於腹之皮裏膜外乃脾經之毒因食煎燻油膩酒醉太過入房以致毒不流通而結無論左右隱痛日久後發癰腫於皮外右關脉見沉數而腹痛甚者是其候也不可過服尅伐之藥若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂難致收功矣初宜服活命飲或化毒除濕湯潰後服托裏消毒湯 臍癰生於臍中由心經積熱流於小腸經毒聚而成心與小腸為表裏心移熱於小腸故發是毒腫大如瓜高突若鈴

癰科心得集 腹癰 臍癰 臍漏 卷中

或紅或白但臍為任脉神闕穴禁針之所宜早消散否則恐其內潰若有膿即穿破出外為吉初宜多服蠟礬丸湯劑則用黃連解毒合五苓散治之或導赤散加歸尾赤芍銀花亦可 漏臍瘡或因腎虛火亢而發或因惱怒氣鬱而發宜服補劑外以生肌散敷之又小兒臍中撒尿因肝腎虧乏氣不宣化是童癩敗證不治

辨小兒臍風及臍汁不乾論

凡見生月內肚脹腹硬臍圍浮腫口撮眉攢牙關不開名曰臍風撮口證蓋因臍帶剪短或包縛不緊以致水濕浸臍客風乘虛而入傳之於心蘊蓄其邪復傳脾絡舌強唇青手足微搐喉中痰響是其候也服延壽丹少許即愈如神脫氣冷者不治 夫臍為根木風濕防護須嚴一有所失則臍腫不乾每出青黃水久而作搐入於經絡即成風癇並撮口臍風皆為惡候宜以五倍子研末摻之但初生小兒僅如血泡

瘍科心得集

臍風 臍汁

七

卷中

不可用冰麝之膏貼之並忌大寒大熱之劑蓋肌肉未堅臟腑柔脆難以抵當耳

辨癥瘕癖塊論

夫癥者徵也血凝痰滯有形可徵故一定而不移瘕者假也由氣結聚無形成假故推之而可動且時有時無來去靡常發無定所至於癖塊者與癥相似每在兩脇有由癭而得者謂之癭母有由氣而得者謂之氣癖竊思三者之證皆內為喜怒憂思悲恐驚七情所致蓋人之氣血營衛一身上下周流無時或間苟得充實順序積聚何由而生一有所傷則氣液水穀失其運旋以致稽遲而為積為聚也故數證者俱

瘍科心得集

癥瘕癖塊

七

卷中

從鬱論病本在於肝脾而胃與八脉亦與有責治之之法當從諸經再究其氣血之偏勝氣虛則補中以行氣氣滯則開鬱以宣通血衰則養營以通絡血瘀則入絡以攻痺如或營傷氣阻者須於養營之中通泄其氣如或絡虛則脹氣阻則痛者須以辛香苦溫和絡通降又如肝胃兩病者宜泄肝救胃肝胃脾同病者則扶土制木肝臟之氣獨鬱不宜者宜辛香溫治於氣血痺絡逆失和者宜辛香溫理其血病由衝任擾及肝胃而逆亂者仍從肝胃兩經主治宜疎降

溫通凡此皆施治之大要貴在醫者之生心化裁耳
總之用攻法宜緩宜曲不可太峻太峻則正氣受傷
用補法忌濇忌呆須當疏利疏利則積滯可去此尤
不可不知也至於古人調治之方若金鈴子散疎肝
導滯湯益氣養營湯紫甲煎丸旋覆葱絳湯等俱可
酌用須隨機應變不執方而方始為我用矣

瘍科心得集

癥瘕疝

五

卷中

辨大腸癱小腸癱論

夫大腸生癱者或其人平素醇酒炙煇濕熱鬱蒸相
傳受傷肺氣不能宣降致濕熱下注壅遏氣血而發
肺與大腸為表裡肺傷則濕熱下注於大腸而生癱也 或由七情所傷饑飽勞
役擔負重物致使氣血乖違濕動痰生腸胃痞塞運
化不通而結初起發熱惡寒脈數而乳皮毛甲錯右
足屈而不伸腹急漸腫按之急痛大便墜重小便澀
滯若淋如癰未成者宜以大黃湯下之瘀血去盡自
安如體虛脈細不敢下者以活血散瘀湯和利之癱
瘍科心得集 大腸癱 小腸癱 辛 卷中

已成腹中疼痛脹滿不食便淋刺痛者以薏苡仁湯
決之如膿從大便出者易治若在臍旁出頭者即以
卧針刺之若從臍內出膿者不治亦有臍突腫硬透
臍生瘡者此名盤腸癱證治法與上同 小腸癱者
少腹腫而硬按之則痛左足屈而不伸洩數似淋時
時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急甚則腹脹大此證
或由於肝邪積聚寒凝氣阻而成或由於產後經期
氣滯瘀凝營衛失和而發至若奔走暴急負重遠行
或醉飽房勞生冷並進致腸胃受傷敗血濁氣壅遏

皆能致之其因久積陰冷所成者宜用溫熱之劑以
溫發之金匱之用附子苴仁敗醬散是也其因內結
熱所成者宜利之金匱之用大黃湯是也若氣滯痰
凝者宜用旋覆花苴絲湯又薛立齋曰脈遲緊者未
有膿也宜牡丹皮湯下之當有血下脈洪數者已有
膿也用薤苳仁湯排之小腹疼痛小便不利膿壅滯
也用牡丹皮散主之氣血虛者宜用八珍湯加黃耆
肉桂丹皮北五味欬而補之古人治法可以酌用要
知成膿後外有頭可刺者為順若外不可刺而或從

瘍科心得集

大腸癰 小腸癰

三

卷中

小便出膿者死蓋大小腸二癰雖名為腸癰大抵生
於皮裡膜外者多故能在外出膿是為易愈若外無
頭者必生於腸內而腸皮甚薄易於腐爛此惡證也
彼大腸癰之從大便出膿者以濕熱內結腑氣通而
順勢下趨出盡穢濁故可愈至從臍內出膿者大便
必結而不通邪從上泄難以去盡久則爛腸故不治
耳而小腸癰之膿從小便出者以其邪傳入膀胱滲
泄或恐腑氣不能宣達而穢濁即未能循竅下行因
致正虛邪着延久而斃者多矣

辨小腹癰緩疽論

小腹癰生於小腹皮裏膜外或因膏粱厚味或因七
情火鬱以致脾虛氣滯而成小兒乃驚積虧損所致
初起漫腫堅硬肉色不變數日後有熱漸紅者屬陽
易治無熱不紅者屬陰難治此證不問初起未潰已
潰俱宜助胃壯氣而以行經活血之藥佐之如四君
子湯加川芎當歸白芷枳殼之類如誤用尅伐攻利
涼藥敗證必出若其純陰無陽者宜十全大補加參
耆薑附以溫發之又有腫高焮赤作痛者此屬濕火
養氣血溫通經絡理中湯合四物主之

瘍科心得集

小腹癰 緩疽

三

卷中

辨腎俞發鶴口疽論

腎俞發者即腰疽生於兩腰內腎陷肉之間或生兩腰中間最為險候蓋腎為性命根本藏精藏氣藏神又乃受命先天育女育男育壽此必房勞過度氣竭精傷慾火銷陰外陽煽動以致真陰從此而耗既耗之後其臟必虛所以諸火諸邪乘虛而入其證初起令人口乾寒熱大作百節俱痛如本臟稍有真陰制火瘡形自可高腫紅活為膿治以人參養營湯加山黃肉北五味知母黃柏及加減八味丸以救其源若瘡形紫黑乾枯堅硬不作膿者為真陰內敗再無可生之理死在十五日前後 鶴口疽發於尾間穴之高骨尖上亦名尾間發靈樞名銳疽此由三陰虧損督脈之經濁氣濕痰流結而成初起形似魚脰久則突如鶴嘴朝寒暮熱日輕夜重潰後稀膿出而無禁又或鮮血出而不停凡發此者壯年猶可老者可危初宜滋陰除濕湯和之已成未潰者和氣養營湯托之潰而不斂者滋腎保元湯補之久而成漏者琥珀臘礬凡先天大造丸兼服甚妙

瘍科心得集

腎俞發 鶴口疽

卷中

聖

辨腸風臟毒論

夫大腸之下血也一日腸風一日臟毒腸風者邪氣外入隨感隨見所以色清而鮮臟毒者蘊積毒久而始見所以色濁而黯經云陰絡傷則血內溢而便血人惟醉飽房勞坐卧風濕生冷停寒酒麪積熱使陰絡受傷腸胃虛損外邪得以乘之以致營血失道滲入大腸而下久則元氣愈陷濕熱愈深而變為臟毒矣先便而後血者其來遠先血而後便者其來近治法大要先當解散脾胃風邪熱則敗毒散冷則不換

瘍科心得集

腸風 臟毒

卷中

聖

金正氣散加川芎當歸後隨其冷熱治之其或內傷陽氣不足下焦之陰無元陽以維之而下血者宜補中益氣湯六君子及參苓白朮散加芎歸枳殼地榆槐花等蓋血氣出於穀氣故必賴補中升陽以胃藥收功胃氣一回血自循經絡矣

附林氏謂腸風者本足陽明清氣不能升發透達於四肢腠理之間下陷於大腸大腸之血脉亦隨此

氣而虛陷久則氣血鬱結而化為濕熱因此血隨氣滯凡登園氣陷火迫之時其血先糞而至至

則清散不多初起謂之腸風蓋因方中多用荆芥
防風升麻諸風藥升舉清陽之氣遂疑為外感之
風也即使是風亦血熱所化之風豈外風能入於
大腸也哉至於臟毒者因腸風日久氣血兩虛虛
陷之氣日甚而大腸之濕熱蘊積日深手陽明大
腸為積血之處其勢必隨氣下陷從糞之前後而
來來雖不痛而其色多黑黯成塊故有毒之名而
實無痔漏腸癰膿血疼痛之毒也若其病久遠氣
血愈虧則脾胃之元氣諒必先虧不能統運周身

瘍科心得集

腸風 臟毒

重

卷中

血脈使之流行無碍亦隨陷於大腸而成結陰便
血之證在下清氣不舉便血而兼遺泄之病在上
濁氣凝結中滿而兼喘嗽之恙甚至肢體浮腫胃
腹脹悶而死是證應分為三輕曰腸風甚則臟毒
重則結陰也 結陰者陰氣內結不得外行滲入
腸間乃寒濕生炎而陰邪之勝也
附 馮魯瞻曰風寒暑濕熱外邪所乘皆可下血蓋風
喜傷肝肝傷則不能藏血因致下血醉後飲冷寒
飲內傷血為寒凝滲入大腸因致下血內外傷濕
濕傷凝胃隨氣下流故致下血膏粱人厚味酒色

藜藿人勞役過度以致熱積下焦故致下血更有
內傷陽氣不足陰無所攝脾虛陽氣下陷不能統
血每致下血初起之脈或沉數有力或弦數不清
久則芤數無力或沉澹而弱至結陰脾虛之脈非
芤澹則虛搏治法初則宜於升陽清熱次則清補
相兼和血解毒結陰則當升清利濁兼於溫補其
血可也

附婦人崩中證

丹溪曰婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣

瘍科心得集

腸風 臟毒

美

卷中

俱虛故也若勞動過極臟腑俱傷以致衝任氣虛
不能約制經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜
大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之劑以
治其心補陰瀉陽經自止矣

辨脫肛痔漏論

夫脫肛之證有因久痢久瀉脾腎氣陷而脫者有因
 中氣虛寒不能收攝而脫者有因酒濕傷脾色慾傷
 腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者有因濕
 熱下墜而脫者又肛門為大腸之使大腸受寒受熱
 皆能脫肛老人氣血已衰小兒氣血未旺皆易脫肛
 經曰陷者舉之徐之才曰瀉可去脫皆治脫肛之法
 也考葉天士先生治脫肛之證不越乎升舉固攝益
 氣三法如氣虛下陷而脫者宗東垣補中益氣湯舉
 腸科心得集 脫肛 痔漏 卷中

陷為主如腎虛不攝而脫者宗仲景禹餘糧石脂丸
 及熟地五味兔絲葦固攝下焦陰氣為主如肝弱氣
 陷脾胃氣虛下陷而脫者用攝陰益氣兼以酸苦泄
 熱為主如老年陽氣下陷腎真不攝而脫者又有鹿
 茸陽起石補骨脂人參等提陽固氣一法觀其案中
 所載諸條亦云脩矣醫者宜奉以為宗也又汪訥菴
 云有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連槐栢及四
 物升柴之類苦味堅陰然斯證雖多但苦寒之味不
 可恃為常法耳 痔瘡者肛門內外四旁忽生紅瘰

先痒後疼後成爲痔或因其人素有濕熱過食炙博
 厚味或因醉飽入房筋脉橫解精氣脫泄熱毒乘虛
 流注或因淫極強固其精以致木乘火勢而反侮金
 或因擔輕負重竭力遠行氣血縱橫經絡交錯或因
 陰虛火熾又婦人臨產用力過甚血逆肛門亦能致
 此若破而不愈則成漏矣此證屬肝脾腎三經凡陰
 精虧損者難治多成漏證若肺與大腸二經風熱濕
 熱者熱退自愈若不守禁忌者亦成漏證至成漏後
 有串營者有串陰者有串腸者有穢從瘡口而出者
 瘍科心得集 脫肛 痔漏 卷中

形雖不同治頗相似其初起時腸頭腫而成塊者濕
 熱也作痛者風熱也大便秘結者火也潰而爲膿者
 熱勝血也當各推其所因而治之凡遇痲痛便秘小
 便不利者宜清熱涼血潤燥疎風若氣血虛而爲寒
 涼傷損者宜調養脾胃滋補陰精若大便秘澀或作
 痛者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火導濕下墜腫痛而
 癢者祛風勝濕小便澀滯腫痛者清肝導濕其成漏
 者養元氣補陰精為主大凡痔漏下血服涼血藥不
 應者必因中氣虛不能攝血非補中升陽之藥不能

愈也切忌寒涼之劑亦有傷濕熱之食或腸澀而下膿血者宜苦寒之劑內疎之凡痔漏脉弦絕澀者難治滑大柔和者易治經云因而飽食筋脉橫解腸澀為痔其屬肝脾腎明矣若有患痔而兼疝患疝而兼下疳皆屬肝腎不足之變證但用黑地黃丸益氣湯以滋化源為善若專服寒涼治火者無不致禍凡痔瘡潰久不愈而成漏管者若內服外洗純用苦寒必致脾元日損肌肉難生若妄用刀針藥線繫紫鉛丸懸墜利剪割切良肉受傷反以致害又或日將藥紙瘍科心得集

脫肛 痔漏

完

卷中

插入拔出致瘡內四傍新肉磨成硬管愈種愈深遂成痼疾此皆醫之過也

辨肛門癰腫頭毒偷糞鼠論

蓋肛門為足太陽膀胱經所主足太陽會陽穴在肛門之旁是經

為濕熱所聚之腑此處生癰每由於酒色中傷濕濁不化氣不流行者多其始發也惡寒身熱繞肛而痛如鮮地杏仁槐米地榆苧連枳殼蘆根蔗汁等類若大便再不通行即用涼膈散通腑得大便一行其濕毒隨便而泄或亦有不咸膿者如便通後其腫痛仍然不減繞肛成膿者為臟頭毒或左或右成膿者為

瘍科心得集

肛門癰 臟頭毒 偷糞鼠

畢

卷中

偷糞鼠在兩邊出膿者為肛門癰投藥宜用歸尾草薜槐米苡仁丹皮山梔等清理下焦濕熱此證潰膿後自熱退身涼痛止倘或肝腎充足氣血和諧即可於十日之內收口矣如延久不斂每多成漏總以升藥條提之此瘍雖有三名其實總歸濕熱下注而結用藥治法俱同故併而論之

按治漏管又有掛割之法最能取事但增痛損神漏終不去蓋內理阻隔而成管若不漸漸入藥腐脫拔去焉能肌理淪浹如近時諸葛靜山治法最

妙惜其人已故其法失傳

江門雜錄 臆頭毒倫彙編 巳 卷中

辨腎癱騎馬癱論

腎癱生於腎上膀下近大腿處由太陽膀胱濕熱流結氣血凝聚而成形大如盤腫潤盈尺上覆其腰下遮其胯此為陰中之陰務須宜熱拔毒大補氣血培養腎胃滋補根源如此庶血易聚而膿易作毒易出而熱可宣不然經時纍月腫仍如故疼痛日深是以中年之後猶慮患此惟一見虛弱即與滋補可保終吉若妄以清涼敗毒內服外敷則氣血得寒益凝毒氣不得外發反致內攻多致不救治法如初起患上場科心得集 腎癱 騎馬癱 望 卷中 有頭紅熱墜重如石口乾發熱者此毒從五臟蘊積宜內消沃雪湯通利積熱外敷如意金黃散拔出瘀膿紫血內兼托藥自愈如漫腫色白脉虛弱者此寒凝濕滯氣血兩虛宜與桂枝和營湯兼服萬靈丹發汗潰後服八珍十全收口 騎馬癱亦名驢馬墜生於腎囊之旁大腿根裏側股縫夾空中由肝腎濕火結滯而成此處乃至陰之下醫治不可過用寒涼之劑又不可用刀針如用只可針一二分慎之慎之初起以七味聖神湯治之甚妙蓋此毒乃乘虛而人必

大補其血而佐以逐邪之品則病去如失矣餘法與前同

附 上馬癱生於左腎之下摺紋中下馬癱生於右腎之下摺紋中坐馬癱生於尻骨界上總由濕熱凝結而成

瘍科心得集

腎癱

馬癱

望

卷中

辨胎火胎毒及猴猴疔論

夫小兒之有胎火胎毒何也或其父醉酒入房而得胎孕或既孕之後房慾不禁內蘊火毒又或其母滋味過厚忿怒無節驚喜不時火熱燔灼營血不清兒在胎中吸飲穢濁此皆先天受毒致產後或月內或月餘其毒驟發痛楚號泣臂腿焮紅紫暈其膚碎裂狀如刮痧或遍體焮赤或口糜難乳或咽腫音啞若不急治毒即內陷腹滿氣逆致成胎驚而斃者多矣治以生大黃磨濃汁調入西黃末再以金銀花蘆根

瘍科心得集

胎毒

猴疔

望

卷中

甘草鈎勾煎湯沖服得大便瀉後其火自退毒氣外泄即可調理而愈 如或腎腫焮爛紅赤無皮或亦有焮赤遍體者此即名猴猴疔緣其父曾患下疳楊梅惡疾服輕粉昇藥遏抑毒氣在內故遺毒於胎元須以猴疔化毒丹治之四五十服可愈設或晚治毒氣浸淫亦必內陷漸致形瘦神怯音啞鼻塞氣逆腹滿而不可救慎之慎之

辨小兒赤遊丹遊火論

赤遊丹者乃心火內鬱三焦風熱乘之故發於肌膚之表風勝則樹木皆搖故令遊走殊速名之丹者以應心火而色赤也形如雲片上起風粟作癢而痛或發於手足或發於頭向胸背令兒踈悶腹脹發熱遊走遍體流行甚速須急治之自腹而流於四肢者易治自四肢而歸於腹者難療治宜涼心瀉肝如龍胆瀉肝湯犀角地黃湯之類又當順天時若暑熱以通聖辛涼之劑解之嚴寒以升麻葛根辛溫之劑解之

湯科心得集

赤遊丹 遊火

聖

卷中

辨囊腫懸癰論

囊腫者陰囊癰腫乃足厥陰肝經所主由肝腎二經陰虧濕熱下注而成初起腫痛小便赤澀當用龍胆瀉肝湯清利解毒或芩連黃柏山梔苡仁木通甘草當歸之類若膿已成而小便不利者是熱毒壅閉也先用托裡消毒散後用針以泄之若膿已出而腫痛不減者是熱毒未解也用清肝益營湯此證由陰道虧濕熱不利所致故除濕滋陰藥不可缺若潰後膿清或多或少或斂遲者須用十全大補湯加山萸丹皮澤瀉以補益之如虛而不補少壯者多成痼疾老弱者多致不起又有脫囊起時寒熱交作囊紅皴腫皮膚濕裂隔日即黑間日腐穢不數日間其囊盡脫辜丸外懸勢若險重其實不妨皆由濕熱下流所致參以珍珠散以白玉膏蓋之內服四苓或草薢湯又有一種水疝腫痛而皮色光亮無熱無紅內有聚水宜用針針之引去水氣則安內服五苓等利濕之藥 懸癰生於腎囊之後穀道之前又名海底漏最難收功患此者俱是極虛之人由足三陰經虧損濕熱結聚

湯科心得集

囊腫 懸癰

聖

卷中

而發初生狀如蓮子日久漸如桃李赤腫痲痛潰後
輕則成漏重則氣血瀝盡變為癆瘵者多矣治法初
起腫痛而小便赤澀者肝經濕熱也龍胆瀉肝湯主
之若痲腫發熱者清肝解毒小柴胡去半夏人參加
車前黃栢芍歸甘草已潰者用八珍湯加製甘草柴
胡梢酒炒黃栢知母切不可過用寒涼損傷胃氣惟
製甘草一藥名國老散不損血氣不動臟腑其功甚
捷最宜用之

易科心身集

癰疽

腫毒

卷中

辨附骨疽附骨瘕腎前虛瘕論

附骨疽者俗呼為貼骨癱生於大腿外側骨上此陰
寒之證也凡人環跳穴足少陽穴名處無故酸痛久而不
愈者便是此證之兆蓋由元氣素虧風邪寒濕乘虛
入裡絡脉被阻失和致血凝氣滯而發始時臂腿間
筋骨痠疼甚者曲伸不能轉側不紅不熱皮毛不變
身體乍寒乍熱而不能作汗積日累月漸覺微腫
起除變為陽寒化為熱熱甚則腐肉為膿此疽已成
也謂之附骨者以其毒氣深沉附著於骨也腎主骨

癰科心得集

附骨疽 附骨瘕 腎前虛瘕

吳

卷中

腎經陽和之氣不足故腎部隧道骨縫之間氣不宜
行而陰寒之邪得深襲伏結而陰血凝滯內鬱濕熱
為潰為膿古人有用附子者以溫補腎氣而又能行
藥力散寒邪也大畧此證初起治法宜用溫經通絡
宣達陽和滲濕補虛為主若既見滑數按之軟熱膿
已成也速宜開之毋使久留延漫否則全腿俱潰矣
至出膿之後須溫養氣血扶胃和營方能速愈切不可
用寒涼外敷內服貽害非小 附骨瘕者亦生於
大腿之側骨上為純陰無陽之證小兒三歲五歲此

先天不足三陰虧損又或因有所傷致使氣不得升血不得行凝滯經絡隱隱微痛遂發此瘍初起或三日一寒熱或五日一寒然形容瘦損腿足難以屈伸有時疼痛有時不痛骨瘦漫腫朝輕暮重久則漸漸微軟似乎有膿及刺破後膿水清稀或有豆腐花塊隨之而出腫仍不消元氣日衰身體縮小而頸鷄胃驚背之象唇舌乾焦二便枯秘或脾敗便泄飲食少納漸成童癆而斃又大人亦有之男則係房勞不禁色慾過度腎水乾涸而生女則由真陰不足經枯血竭科心得集

瘍科心得集

附骨疽 附骨痰 腎虧瘰癧

卷中

辨流注腿癰陰陽虛實異證同治論
夫流注腿癰證雖殊而治則一要在辨其陰陽明其虛實而已若因於風寒客熱或暑濕交蒸內不得入於臟腑外不能越於皮毛行於營衛之間阻於肌肉之內或發於周身數處而為流注有生於四肢關節者或發於腿上而為腿癰此屬實邪陽證初起憎寒壯熱或微惡寒發熱遍身骨節疼痛其腫處漸漸加大斯時宜以發散透解或亦可以消散如身熱無汗即能成膿大抵陽證流注出膿其色雖白不可認作陰證虛證流注腿癰大率皆色白或亦有根盤白而頂微紅者此必膿已成流注腿癰成功即頂色白而脈見滑數按之軟熟其膿已成即欲開之以泄其邪邪泄後方得熱退身涼而元氣自然來復脾胃亦醒飲食有加數日間氣血充盈即能收口矣其有體虛之人元氣不足或因鬱結傷脾暴怒傷肝氣凝血滯或濕氣逆於肉腠或寒邪入於筋絡或濕痰阻於經隧或瘀血注於關節又或病後餘邪發散未盡種種病由皆因葷氣不能運行使邪氣壅滯而為患也其發為流注也或結塊或漫腫或一或三

瘍科心得集

流注 腿癰

三

卷中

或五或七流注總此猶未穿彼又腫起外候則惡寒發熱飲食減少脉來細弱此必培其脾胃祛其寒濕調其營血脾胃健則血自生而氣自運行豈可不固其本根妄用寒涼剋伐之劑而蹈虛虛之戒哉其發為腿癱也則漫腫無頭皮色不變乍寒乍熱時痛時痠筋屈不伸不能轉動苟非大補氣血溫經通絡何以能使之消散更何以使之速起速潰易斂易愈也此虛證屬陰之治法與證同揆惟貴學者審察而明辨之耳

瘍科心得集

流注

腿癱

聖

卷中

陽證流注腿癱必欲辨明風寒暑熱客於何部經絡總以發表和營如正旺邪實宜萬消化堅丸攻透方能無膿卽消有膿卽潰屢用屢驗切勿以藥味峻猛而避之如潰膿後急欲調和脾胃若久不斂口者方可補托如陰寒着骨而發足不能伸舒或身不能轉動必須用陽和湯溫經通絡潰後調治與前同

辨大腿癱陰包毒論

大腿癱之證發於內側者屬肝脾二經發於外側者屬胆胃二經或由於濕熱不化留滯經絡阻其氣血而成或由於風寒濕外邪侵襲壅遏不行而結須辨其色之赤白審其證之陰陽然後施治勢焮腫痛者屬濕熱宜清利解毒平陷堅硬色不變者為陰邪凝結宜踈散溫發膿潰後均宜補托 陰包毒生於大腿內陰包穴是足厥陰肝經風熱之毒兼挾濕濁而成腫高而硬又名臃疽俗言此疽堅硬無膿殊不知內膿已成一時不能透出皮膚須用內托方潰膿急卽針之宜服荆防敗毒散或黃耆柴胡湯此湯治腿內近股癰疽大有神效

瘍科心得集

大腿癱

陰包毒

聖

卷中

辨鶴膝風人面瘡論

鶴膝風者以膝腫而脰腿枯細如鶴膝之形而名之也此證有二有發之暴者為水鶴膝有發之緩者為旱鶴膝凡人驟感風寒暑濕膝中即覺疼痛三五日後腿足不得屈伸寒熱間作膝之內外皆腫色微紅焮熱光亮股形漸覺細小此實邪也為輕證若通其經絡祛其濕熱散其風寒無難平復而愈若發之緩者由足三陰經虧損風寒濕之邪乘虛而入血脉阻滯不得流行注膝成病下股之血脉有去而無返是

傷科心得集

鶴膝風 人面瘡

書

卷中

以愈瘦愈冷而筋愈縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熱而肌愈削此證與附骨疽俱係腎虛所致蓋腎主骨而腎以下俱屬腎真氣衰弱邪氣得以深襲經久不消極陰生陽寒化為熱而後潰也若誤用寒涼必成廢疾或掌曲偏枯或痿弱不起或堅硬如石為石疽或日久始潰皮肉俱腐為緩疽必當以桂附治之以下部道遠非此不能下達又非此不能入腎經而宣行也又小兒鶴膝風如色紅焮腫朝輕暮重寒熱交作者先以公羊角散加黃柏蒼朮或獨

活寄生湯先去其濕火然後溫補若腫硬色白不作膿者因稟受腎虛血氣不充而成宜以六味丸加鹿茸或虎潛丸補其精血仍須調補脾胃以助生化之源 人面瘡者即鶴膝風破爛所成以膝有蓋骨似額下兩旁有眼中有高骨似鼻穿潰腐壞宛如人面之形故名非真有生出瘡形如人之面前人謂與之肉且能食有是理乎要之此證冷毒入於骨髓但有白漿流出元氣消乏肌肉已死不能化膿生新雖有仙術亦不能為之收功矣

鶴膝風 人面瘡

書

卷中

辨膝蓋癰疽論

膝蓋癰生於膝蓋色紅焮腫疼痛屬濕火為氣血實
疽疽亦生在膝蓋腫大如癰其色不變寒熱往來屬
寒凝濕滯為氣血虛和軟為順堅硬如石者逆經云
肉之小會為谿谿者二肘二膝四腕也凡脾病在谿
腎有邪其氣留於兩膝凡筋病皆屬於筋筋乃肝之
餘故又屬肝是以谿會有病皆從脾腎肝三經邪氣
乘之也倘兩膝俱生即屬敗證不治治法濕熱者宜
清利解毒草薢化毒湯主之寒濕者宜溫散和營通

瘍科心得集

膝蓋癰疽

卷中

絡桂枝和營湯主之

辨委中毒膝眼毒論

委中毒生於膝灣內委中穴穴在膝後腓中屬膀胱
經經曰腓中毒由胆經積熱流入膀胱壅遏不行而
成夫膀胱為聚濕之所熱入混淆注於絡脉生癰則
莫非濕熱凝結為患初起木硬腫痛微紅屈伸艱難
故又名曲鯁寒熱不退則成膿矣治宜清濕熱活血
化瘀舒筋散邪若不速治恐筋縮遂成廢疾 膝眼
毒生於膝蓋骨下兩旁膝眼中又名托疽外側者屬
足少陽胆經內側者屬足太陰脾經初起必先膝眼
痠痛後乃焮腫作痛成膿係濕火注聚而成者多亦
有腎經感受風邪寒濕相侵而受者其寒濕濕火之
別一則形高腫而色赤一則形微腫而色白必細認
清楚然後施治始無差誤

瘍科心得集

委中毒

卷中

辨魚肚毒腓脛疽黃鯁癰論

魚肚毒生於小腿肚上屬足少陰與足太陽二經初起憎寒壯熱煩躁結腫軟痛皆由腎經素虧膀胱濕熱下注而成宜服清利濕熱涼血和營之劑成膿後即宜刺破勿使毒氣蔓延致久難收口虛則以補劑托之 如小腿肚漫腫堅硬下塌紫暗舉痛者即名腓脛疽穿潰後出稠膿兼血者為順出清水者為凶初服仙方活命飲或草薢化毒湯潰後宜八珍湯十全大補之屬補其氣血 黃鯁癰生於小腿肚裡側

瘍科心得集

魚肚毒 腓脛疽 黃鯁癰

卷中

手

辨跗陰疽接骨發論

跗陰疽生內踝上三寸初生小泡疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵破流血水係三陰交會濕熱積聚而成治同癰疽但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調理不可不慎 接骨發生於小腿肚之下脛骨與足後跟骨相接處故名之此屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃堅硬漫腫色紅急脹微疼膿宜速潰遲則膿毒損筋筋脈既傷腿缺踵行踵行者不能全足踏地惟恃足指着力而行也治同癰疽

瘍科心得集

跗陰疽 接骨發

卷中

手

辨外踝疽內踝疽論 附穿拐痰腫眼毒

外踝疽即脚拐毒俗名穿拐毒屬足三陽經脈絡也
由濕熱下注血凝氣滯而成初起外踝焮腫疼痛徹
骨舉動艱難寒熱往來如有紅暈者宜服荆防敗毒
散加牛膝膿熟針之後兼用托補法若其皮色不變
而漫腫無頭者此名穿拐痰由三陰虧損寒濕注聚
阻絡所致幼兒因生後天不足而發初起宜溫通滋
補托第此證屬虛每難速效 內踝疽生兩足

瘍科心得集

外踝疽 內踝疽

毒

卷中

成者亦有由寒濕凝聚而成者證形同前治法亦可
通用其有腫甚串及外踝後俱穿潰腐爛如腫瘡四
圍紫黑時流毒水或淌臭膿名曰腫眼毒俗名夾棍
瘡也由脾經濕毒流滯而成亦有砂傷或毒蚊蛇蟻
咬傷而起者最難收功搽以珍珠散貼以白玉膏內
服草薺化毒湯或五苓四妙等

辨足跟疽厲癰論

足跟疽生於足跟骨下由臟腑積熱或汗足涉水遠
行傷筋而成初起赤腫疼痛膿成有頭可刺出黃白
色膿者易治若初起便破黑色而爛者難治此處屬
足太陽膀胱經申脈穴乃陽蹻發源之所腎經所過
之地瘡口久潰不合陽蹻脈氣不能沖發腎氣由此
而泄以致患者益虛恐遂成終身之疾初宜用隔蒜
灸法內服仙方活命飲加肉桂牛膝潰後宜補中益
氣湯人參養營湯桂附地黃丸隨證滋補治之又名

瘍科心得集

足跟疽 厲癰

毒

卷中

兔嚙瘡者蓋獵人被兔咬脚跟成瘡久而不斂必氣
血瀝盡而死若人脚根患此亦非易愈故名兔嚙也
厲癰發於足旁小指之側由足三陰經虧損為疽
者重若兼足三陽經濕熱下注而成癰者輕如紅腫
疼痛潰後有膿腐脫無黑氣侵漫屬濕熱偏勝易治
若微紅微腫潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險證
難治若黑暗漫腫痛甚而不潰膿煩熱作渴小水淋
瀉為陰敗惡證治宜隔蒜灸之投以十全大補湯或
補中益氣湯八味丸之屬或可收功若妄用苦寒就

伐之劑多致不救

足跟疽 厲腫 卷中

辨脚發背脫疽論

脚發背一名足跗發經云三背不宜生瘡惟足背冬筋少骨肉少皮薄又在至陰之下發瘡疽者升發遲慢所以為險候也其證或由於足三陰精血虧損或由於足三陽濕熱下注而生若初起寒熱作嘔堅硬紅腫疼痛作膿者屬濕熱為可治又或有因物撞傷初起一粒漸漸加大寒熱交作日重一日而成斯證者亦因濕火之盛而然必俟熱退腫勢方收止而漸消此與爛皮乳癰相似摻以珍珠散貼以白玉膏可

瘍科心得集 脚發背 脫疽 李 卷中

愈若色微赤微腫而膿清者屬精血虧損為難治若黑暗不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓者陰敗末傳惡證也為不治治法濕熱下注者先用隔蒜灸內服活命飲以解壅毒次用托裏消毒散潰後服益氣湯六味丸以補精氣若色暗不痛者着肉用桑枝灸以行壅滯助陽氣更用十全大補湯八味丸以壯脾土滋化源多有復生者若專治其瘡復傷生氣吾未見其生者 脫疽者足指生疔重者潰而紫黑不疼不痒久則脫去其節故名之亦有患於手指者名曰

疔疔重者腐去本節輕者筋攣此由膏梁厚味醇
酒炙博積毒所致或因房術澁精丹石補藥銷燬腎
水房勞過度氣竭精枯而成有先渴而後患者有先
患而後渴者皆腎水虧涸不能制火也此證形勢雖
小其惡甚大初起如粟黃泡一點皮色紫暗如煮熟
紅棗黑氣漫延腐爛漸開五指相染甚至脚面疼如
湯燄火燃穢臭難聞遂成五敗之證血死心敗皮死
肺敗筋死肝敗
肉死脾敗
骨死腎敗而不可救凡遇此證乘其未及延散須用
隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒蓋用藥
攻則患在偏僻之處氣血罕到藥難導達况攻毒之
劑必先傷脾胃反損元氣不若灸法為良也孫真人
云在肉則割在指則截毒之重者古人原有割截之
法然每為病家之所忌未可輕言况證之首尾吉凶
變駁難定豈可不顧前慮後而妄施之乎至於用藥
之法若色赤腫痛者元氣虛而濕熱壅甚也即用活
命飲托裡散之屬以解其毒仍速用補劑如十全大
補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損
庶可保生如作渴者宜滋陰降火若色黑不疼痛不

瘍科心得集

脚發背 脫疽

卷中

卷中

漫膿者則不可救

諸方書論脫疽單生於足大指而別指生者則名
敦疽謂敦疽易治脫疽難治以脫疽之指屬陰經
也學者宜詳審之足大指屬
足太陰

瘍科心得集

脚發背 脫疽

卷中

卷中

辨湧泉疽足底疔論

湧泉疽 腎經穴名 生於足心又名井泉疽俗名病穿

板又名穿窬天蛇屬少陰腎經虛損滯熱下注而成

若高突焮腫過侯卽潰膿者毒淺易愈若或麻或痒

黑陷不痛二十一日之內不潰膿者屬陰敗之證毒

深難救治宜隔蒜灸之或用神燈照法內服除濕解

毒之劑若虛甚膿遲則進十全大補湯潰後與八味

地黃湯補中益氣等以滋化源切不可過用攻伐之

劑致傷脾胃使元氣愈虛多致不救 足底生疔初

湧泉疽 足底疔 壺 卷中

起如小瘡或小泡根脚堅硬四圍焮腫或疼痛或麻

木令人憎寒頭痛發熱或嘔吐惡心煩躁悶亂此由

肥甘過度不慎房酒以致邪毒蘊結而成經曰膏粱

之變足生大疔此之謂也凡患此者多有紅絲至臍

須看明急用針於血絲盡處挑破之使出惡血亦用

隔蒜灸法痛則灸至不痛不痛者灸至痛若灸而不

痛針疔四邊皆令血出以奪命丹一粒入瘡頭孔內

以膏藥蓋之內服解毒之劑或荆防敗毒散活命飲

兼托裡補藥若頭突如水晶樣者卽用刀點之蓋以

升膏又或初起黃泡止有硬塊不甚腫赤者爲水疔
亦宜當頭刺破以升膏蓋之凡脚底生疔若有老皮
之處宜去之否則其頭難出

湧泉疽 足底疔 壺 卷中

辨漏蹄瘋鷓眼疽論

夫漏蹄瘋之發也其源有二一由醇酒炙煇肝腎陰虧絡道空虛濕熱下注而生一由於貧苦鄉人勞力傷營氣血失和而發其瘍起於足底皮厚處初則皮堅腫突隱隱作痛時痛時止或一月或兩月後漸漸穿破但有滓水而無膿血久則皮爛其口如錢大其肉凹進色如鷓肝艱於任地用珍珠散摻之以白玉膏蓋貼服萆薢滲濕湯兼服知柏八味丸須飲食安養必拖延歲月方可收功其或成膿者為鷓眼疽屬瘍科心得集

漏蹄瘋鷓眼疽

卷中

卷中

陰虧血熱濕熱注絡不化較漏蹄稍為易於收斂然亦要加謹調治外以升膏蓋貼服藥如前

辨歷節風漏肩風論

金匱云風寒濕三氣雜至合而成痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺經云風勝則動熱勝則腫想因寒濕阻絡化火蒸熱營衛失和遍體節骸痠楚掣痛而為歷節風痺起時寒熱或先發於手或先發於足或遍體皆發或發一節漫腫至七日始退再發一節或止發於一處總以濕熱輕重之分如發於氣分者其色白發於血分者其色紅用藥以透表燦濕解肌俟熱減腫退再以和營通絡瘍科心得集

歷節風漏肩風

卷中

卷中

有數月不愈者以邪去營虧當用補益

漏肩瘋肩骸痠楚或疼痛漫腫亦因風寒濕阻絡而發用藥與前證同

瘍科臨證心得集卷下

表兄吳辰燦

錫山高秉鈞

男 觀海履安校

楊梅瘡結毒總論

楊梅瘡者實名洋毒瘡又名時瘡又名棉子瘡總由濕熱邪火所化若瘡毒傳染氣化者輕此肺脾二經受毒其瘡先見於上部皮膚作痒筋骨不疼其形小而且乾堅實凸起有似棉子故有棉子之名此毒在

瘍科心得集

楊梅瘡 結毒

卷下

皮膚未經入絡治宜發散解毒如防風通聖散麻黃一劑飲俱可若淫女媾精精化慾染者重乃肝腎受毒或先發下疳或先患魚口然後始生此瘡先從下部見之漸至遍身大而且硬濕而後爛筋骨多疼小便澀淋此證最重因其毒氣內入骨髓外達皮毛若非汗下兼行何以洗濯其臟腑乎斯時即宜用鷄子大黃丸或九龍丹等瀉之使毒濁從來路而出是為正治切不可用輕粉升丹等藥過之梅毒一服輕粉其毒入筋骨如油入麵莫之能解積久外攻勢必至

結毒潰爛見諸惡證每難措手甚有為害一身而并殃及妻兒者皆輕粉升丹過藥之貽患也大抵世之治楊梅瘡者其法有四有遏抑其毒而不令其出者有重用行藥而行去其毒者有用升發之劑而發出其毒者有用解托之劑而敗去其毒者四者之中升發解托雖未能使毒一時盡出必久而取效然施之可以無弊至於遏抑內收貽害非淺固不可用矣即重用行藥每致大傷元氣醫者豈可不審虛實而輕用之乎若其人瘡發已久氣血已虛毒猶未退此即

瘍科心得集

楊梅瘡 結毒

卷下

不可瀉宜施解毒托散之法要在臨證變通可也外此又有薰條擦藥哈吸等法亦非善道宜屏去之至如搽藥收口必俟其人筋骨不疼瘡根淡白內毒已散方可用之否則歛早遺毒亦不能無後患也乃若結毒之證其初起也必先筋骨疼痛漸漸腫起發無定所隨處可生發在關節則損傷筋骨縱愈曲直不便發於口鼻崩梁缺唇雖痊形必破相發於咽喉更變聲音發於手足妨於行動入於巔頂頭疼欲破兩眼脹痛其瘡起處色紫而黑穿潰後黃膿泛濫污水

淋漓臭腐不堪口內凹進凸出如湖石之狀皆由毒氣遏鬱沉伏骨髓外攻使然考之瘍科書中所載調治之方計以百數然大概仍不越乎瀉與遏兩端內惟仙遺糧湯金蟬脫甲酒虛弱者芎歸二朮湯年久者五寶丹不斂者十全大補湯用土茯苓煎服數方可用近今有十味淡齋方最為靈效其藥品純粹不獨愈其患亦能盡解餘蘊之毒永不再發也

瘍科心得集

楊梅瘡

結毒

三

卷下

辨下疳論

下疳生於前陰一名妬精瘡屬肝經濕熱下注而成其來有三有由慾念萌而未遂未經發洩而邪火遏鬱敗精濁血留滯經隧結而為腫者有因交合不潔以致淫毒傳襲而發者有由房術熱藥塗沫洗搽使精久不洩邪火煽動鬱滯而生者皆由蘊毒所致初起或先小便淋澀溺痛次流黃濁敗精遂陰莖疼痛堅硬紫脹漸漸破損漸漸腐爛膿水淋漓其臭腥臊以肝性臊也亦有先皮腫光亮如水晶破流毒水腫

瘍科心得集

下疳

四

卷下

痛日生麻痒時發者治法當以疎利肝腎火邪除濕解毒為主若清肝導滯湯龍胆瀉肝湯黃連解毒湯葶藶湯蘆薈丸之類隨宜酌用外參珍珠散五寶丹蓋此證形異名殊輕重不一生於馬口者名下疳生玉莖上者名疔疔莖上生瘡外皮腫脹包裹者名袖口疔龜頭外腫如瘤者名鷄喙疔疔久而腐爛偏卸者名蠟燭疔又有膿疔楊梅疔銀根疔諸種要之無外因而病者不過去其濕熱或滋其真陰濕熱既清其瘡自愈無足慮也惟感觸淫邪毒自少陰直入精

官而發者不易愈卽治如前法猶必令患者食淡戒
房事若能守禁則服藥自然有效一月收功者只消
半月而愈矣

易科心得集

下疳

五

卷下

辨腎巖翻花絕證論

夫腎巖翻花者俗名翻花下疳此非由交合不潔觸
染淫穢而生由其人肝腎素虧或又鬱慮憂思相火
內灼水不涵木肝經血燥而絡脉空虛久之損者愈
損陰精消涸火邪鬱結遂避疾於肝腎部分初起馬
口之內生肉一粒如豎肉之狀堅硬而癢卽有脂水
延至一二年或五六載時覺疼痛應心玉莖漸漸腫
脹其馬口之豎肉處翻花若榴子樣此腎巖已成也
漸至龜頭破爛凸出凹進痛楚難勝甚或鮮血流注
瘍科心得集 腎巖翻花絕證
斯時必脾胃衰弱飲食不思卽食亦無味形神困憊
或血流至兩三次則玉莖盡爲爛去如精液不能灌
輸卽溘然而斃矣此證初覺時須用大補陰丸或知
柏八味兼用八珍十全大補之屬其病者再能怡養
保攝可以冀其久延歲月若至成功後百無一生必
非藥力之所能爲矣此與舌疳失營乳巖爲四大絕
證猶內科中有瘋癆癩癩不可不知

瘍科心得集

腎巖翻花絕證

六

卷下

辨魚口便毒論

魚口便毒生於小腹下兩腿合縫之間左為魚口右為便毒屬厥陰肝經此證得之奔走勞役濕熱下注者少惟交感不潔遭淫毒而患者為最多每每先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱穢毒之為患也亦有強力入房忍精不洩或慾念不遂以致敗精搏血雷聚經隧壅遏而成者臨證當細為審辨治法惟宜開鬱散氣清利濕熱而毒邪之證先宜發汗次利小便使毒從膚腠而出或從小便而泄發汗利便不應

瘍科心得集

魚口

便毒

七

卷下

者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之此定法也凡婦人患此者多在兩拘腫痛或腹中結塊小腹痞悶上攻兩脇小便澀滯憎寒壯熱多由肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾所致宜用龍胆瀉肝湯加味逍遙散之屬不可概投散血攻毒之劑又小兒亦有此證總由肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒氣為之斟酌

辨痘毒總論

夫痘者係先天之毒所發而痘毒者是毒發未盡而復結為癰也人之有生受氣於父成形於母當父母媾精之時惟恃一點真元之火相為凝結是胎元之初成即胎毒之蘊蓄故名之曰胎毒此毒潛伏命門至受生以後有觸則發無觸則不發故其發有遲速有數月而即發者有數歲而始發者更有十餘歲而後發者當其未發時形氣俱泯無可端倪若未燧之火何處尋覓又何可解釋及其有觸而發則勃然不

瘍科心得集

痘毒

八

卷下

可禦蓋其毒氣動於命門發自五臟實動五臟真氣斯時全賴血氣送毒外出運化之而成漿收結之而成痂而後其毒始盡臟腑可安若或血氣衰弱漿水不足不能盡送毒氣外出雖痘瘡已愈而遺毒之未盡者不免結為癰瘍而痘毒生焉已然痘毒之生也發於時痘後者輕發於種痘後者重何則時痘感時行之邪觸動胎元之毒而發故其為痘證也重而毒能盡泄痘後即或生癩不過癩癰疔癩而已至種痘則外無天行時邪祇借些微痘苗之氣以引胎元之

毒故其為痘證也輕痘出之後餘毒未能盡泄而發為痘毒純是先天火邪所結所以潰膿腐爛未能速愈也且餘毒必發於節節蓋以痘未結痂火毒未泄走入絡中故或發於肘腕或生於膝脛起則漫腫寒熱潮熱煩燥口乾成膿潰後若小兒先天稟足氣實壯強者即可數日收功其或正虧餘毒攻絡者即名氣虛毒滯穿潰後每難收口總須胃強脾旺氣血充盈始可無妨如體怯少納或脾泄便溏或潮熱不退即成損怯矣要知此瘍起時若焮紅漫腫寒熱交作

瘍科心得集

痘毒

九

卷下

者當從實證治宜清火解毒起時如色白漫腫緩於成功作膿者當以虛證治即用補托加潰後不收斂者當以虛痰治若止用清火解毒之劑使脾胃受戕乳食不貪微熱不退致成損怯而斃者多矣此不可不辨也

辨諸瘡總論

夫惡瘡諸痛癢瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合浸淫不休潰敗肌膚而諸瘡生矣然有辨焉如疥癬癰疹之屬拂鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已足矣若拂鬱氣血在肌肉之分外達皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜發汗仲景所謂瘡家不可發汗汗出則瘡者是矣一瘡而有宜汗不宜汗之戒蓋熱有淺深表裡

瘍科心得集

諸瘡

十

卷下

故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺虫潤燥皆解凝結涎沫之藥敷之瘡之在肌肉則當因其重而滅之瀉經絡之熱清涼氣血外以化膿生肌膏貼之瘡在頭巔則當射而取之須酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺虫解熱藥敷之明此三者其於治瘡思過半矣

辨臙瘡血風瘡

臙瘡者生於兩臙初起發腫久而腐潰或津滯搔癢破而膿水淋漓乃風熱濕毒相聚而成或因飲食起居虧損肝腎陰火下流外邪相搏而致外臙屬三陽經濕熱易治內臙屬三陰經濕兼血分虛熱難治蔣示吉謂色紅者多熱腫者多濕癢者多風痛者屬實早寬而暮腫者屬氣虛下陷初起者風熱濕毒為多日久者下陷濕熱為勝初宜用獨活防已黃柏蒼朮草薢牛膝歸尾苡仁丹皮赤芍銀花黑梔猪苓澤瀉

瘍科心得集

臙瘡

血風瘡

十一

卷下

辨天泡瘡翻花瘡論

天泡瘡者形如水泡皮薄而澤或生面首或生遍身由天行少陽相火為病故名天泡為風熱客於皮膚間外不得泄佛熱血液結而成泡宜清熱涼血熱解則愈如兼表邪而發熱脈數者宜荆防敗毒散如火盛者或加芩連連翹金銀花元參之屬如癰腫疼痛脈數便結者此表裡俱實也宜防風迴聖散雙解之如外多毒水以金黃散敷之或以石珍散摻之無有不愈 翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致

瘍科心得集

天泡瘡

翻花瘡

十一

卷下

或瘡口竅肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一措損每流鮮血久亦虛人治法當滋肝養血如梔子清肝湯是也外塗藜蘆膏景岳方竅肉自入須候元氣漸復膿毒將盡塗之有效不然雖入而復潰若誤用刀針蝕藥火灸其勢益甚或出血不止必致寒熱嘔吐等證須大補脾胃為善

辨膿窠瘡黃水瘡論

膿窠瘡者大如黃豆黃膿起泡痛甚起時先從水泡作癢後變膿泡乃肺經有熱脾經有濕二氣交感而成治當清熱散風涼血除濕如四妙湯加防風荆芥或涼血消風散外搽普濟丹或蛇床子散或一掃光若不癢而痛者以生大黃二兩生石膏一兩研末麻油調搽兼戒口味自愈 黃水瘡者頭面耳項忽生黃泡破流脂水頃刻沿開多生痛癢此因日晒風吹熱毒鬱於皮毛暴感濕熱或內發濕熱之物致風動瘍科心得集 膿窠瘡 黃水瘡 三 卷下

瘍科心得集

膿窠瘡 黃水瘡

三

卷下

辨疥瘡瘰癧論

夫疥有五種乾疥濕疥虫疥砂疥膿疥如肺金痿盛則生乾疥瘰癧皮枯而起白屑腫經濕盛則生濕疥暑腫作痛破泄黃水甚流黑汁肝經風盛則生虫疥瘰癧徹骨撻不知痛心血凝滯則生砂疥形如細砂焮赤癢痛抓之有水腎經濕盛則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡白或脾經濕盛亦生之但頂含稠膿癢痛相兼為異皆有虫染人最易切忌熱湯浸洗圖快一時殊不知熱毒攻裡愈深入雖有良方何能刻日奏效患者戒之兼忌一切發物海鮮治法內服疥靈丹或消風散外搽綉球丸或一掃光俱可 瘰癧瘡者俗名坐板瘡生於兩股密如撒粟尖如芒刺癢痛非常渾身毛刺甚者皮損粘衣此由脾經濕熱濕毒鬱久而成或有因久坐卑濕之地或坐烈日石上釀成濕熱亦能致之此處乃至陰之所血亦罕來藥力少至當用外治法以苦參湯洗之搽以鷺黃散

瘍科心得集

疥瘡 瘰癧瘡

三

卷下

辨白禿瘡肥瘡論

白禿瘡者俗名癩瘡乃足太陽膀胱督脉二經受濕熱生虫作痒瘡痂高堆是也風襲則起白屑熱甚則禿久則傷孔而不生髮治當消風除濕殺虫止痒養血

肥瘡生於頭頂乃臟腑不和之氣上衝血熱之毒上注小兒陰氣未足陽火有餘故竄多犯之宜內服荆芥防風連翹天花粉貝母元參赤芍生地牛蒡子等清熱解毒涼血和血俟毒氣少解方外用藥以塗之

瘍科心得集

白禿瘡肥瘡

五

卷下

切不可驟加寒涼塗搽以致熱毒內攻不救蓋小兒臟腑嬌嫩易入難出也

辨濕毒瘡腎臟風瘡論

濕毒瘡生於足脛之間狀如牛眼或紫或黑膿水淋漓止處卽潰爛久而不斂此因脾胃虧損濕熱下注以致肌肉不仁而成又或因暴風疾雨寒濕暑熱侵入肌膚所致在外屬足太陽少陽經在內屬足厥陰太陰經初覺急服荆防通聖散加木瓜牛膝防已蒼朮治之若延久不愈者宜服補中益氣湯合二妙散外搽製柏散或金黃散 腎臟風者屬腎虛風邪乘於膝脛以致皮膚如癬或漸延上腿久則延及遍身

瘍科心得集

濕毒瘡

腎臟風瘡

六

卷下

外證則搔痒成瘡膿水淋漓眼目昏花內證則口燥舌乾腰腿倦怠吐痰發熱盜汗體疲治法用六味丸為主佐以四生散若脾胃虛弱者用補中益氣湯爲主佐以六味丸四生散爲善外貼黃蠟膏

辨蜘蛛瘡漆瘡凍瘡論

蜘蛛瘡或衣沾蜘蛛遺尿或虫蟻遊走染毒而生形與水窠瘡相似淡紅作痒且痛五七箇成簇日漸延開甚亦使人惡寒發熱卽以犀角磨汁塗之則愈否則以芎藭在瘡上揉搓出水用金黃散搽之或以雄黃枯礬等分研細乾搽亦可 漆瘡者漆味辛熱火象有毒之物人之皮毛腠理不密故感其毒而成初起發泡作痒變瘡甚則傳變肢體皮破爛流血水作痛寒熱交作須忌浴熱湯兼戒口味不然卽變頑風

瘍科心得集

蜘蛛瘡 漆瘡 凍瘡

七

卷下

辨跌打損傷及杖瘡合論

凡跌打損傷或從高墜下惡血流於內不分何經之傷皆肝之所主蓋肝主血也故凡敗血凝滯從其所屬而必歸於肝多在脇肋小腹者皆肝經之道也若其壅腫痛甚或發熱自汗皆當酌其虛實而以調血行經之藥治之治法凡胸滿脇脹者宜行血老弱者宜行血活血腹痛者宜下血瘀肉不潰或潰而不斂宜大補氣血若打撲墜墮稍輕別無瘀血等證而疼痛不止者惟和氣血調經脈其痛自止更以養氣血

瘍科心得集

跌打損傷

杖瘡

六

卷下

老弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便以酒佐之推陳致新其功甚大若脇脹或作痛或發熱煩躁口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥大凡腫痛或傷損者以葱搗爛炒熱罨之或用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之尤妙或用生薑陳酒糟同搗爛炒熱罨之亦可至脈法出血多者其脈虛細沉小者生浮數實大者死從高顛仆內有瘀血腹脹脈堅強者生小弱者死以脈病不相應故也 杖瘡一證其重者必以瘀血爲患血瘀在外者淺則砭之深則刺之內潰者

瘍科心得集

跌打損傷

杖瘡

九

卷下

開之腐肉者取之血瘀在內者宜以活血和氣之藥和之甚者利之行之此治血凝之法也然其受刑之時號叫則傷氣忍痛則傷血悲憤則傷志血氣情志俱傷虛所必至若不培補則羸困日甚矣况脾主肌肉脾氣受傷則飲食必減血脈損壞則肌肉俱病故比既傷之後但察其虛多滯少者則宜以參耆歸朮熟地甘草之屬專理脾氣以托氣血脾健則元氣自復肌肉自生可保無虞矣其有傷筋骨而作痛者宜以沒藥降聖丹治之若牙關緊急或腰背反張者以

玉真散治之並效總之此證宜先察其有瘀無瘀及形氣虛實酌而治之凡諸變證治法有未盡者宜與前跌打損傷條互參通用

辨大麻瘋論

夫大麻瘋者經謂之癘風又謂之癩風乃因其人中氣不足而感天地間陰癘濁惡之邪或受風木之化而風熱化虫或受濕毒於皮毛而後及營衛或犯不潔或因傳染皆得生虫盖虫者厥陰主之厥陰為風木主生五虫也初不為意而漸久漸多致不可解救先則眉癢而漸脫落兩額紅潤浮腫而癢漸至兩臂皮粗毛落甚而通身肌膚淫淫作癢難忍其毒深入血脉之中而濕熱蘊積於臟腑之內虫蝕臟腑沿蛇

瘍科心得集

大麻瘋

五

卷下

肌肉久之精神枯涸諸虫聚食遂傳為癆瘵而死亡人謂其病有三因五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼盲唇翻聲啞皆為難治凡遇此證初起速為清散可保無恙其或歲月已久而精神氣血未衰六脉洪大而實或洪數有力者用汗吐下三法分表裏攻逐之使毒氣不得稽留而速化繼服清熱解毒涼血補血兼養營益衛之劑禁

用辛燥之品致耗津精血耗而助酷烈之勢歷者前方若馮氏之再造散醉仙散陳氏之萬靈丹苦參丸神應養真丹諸法已備學者宗之可也然患者必須斷酒戒色忌食發風動氣葷腥鹽醬炙博生冷之物方為有益否則無功慎之慎之

瘍科心得集

大麻瘋

五

卷下

瘍科心得集方彙目錄

卷上

黃連瀉心湯

溫胆湯

犀角地黄湯

羚羊角散

真人活命飲

疏肝流氣飲

萬靈丹

荆防敗毒散

犀角升麻湯

五福化毒丹

五利大黃湯

五香連翹湯

通氣散

犀角散

瘍科心得集

方彙目錄

芩連消毒飲

連翹湯

定痛托裏散

托裏黃芪湯

普濟消毒飲

通聖消毒飲

小柴胡湯

清涼救苦散

黃連解毒湯

如意金黃散

清肝益營湯

托裏消毒散

梔子清肝湯

鼠粘子湯

神效黃芪湯

蒼耳散

六味地黃湯

補中益氣湯



加味逍遙散

辛夷散

辛夷清肺飲

涼膈散

涼膈清脾飲

紫雪丹

至寶丹

奪命丹

蟾酥丸

歸脾養營湯

清涼甘露飲

知柏四物湯

四物逍遙散

理中湯

八珍湯

十全大補湯

升陽散火湯

甘露飲

瘍科心得集

方彙目錄

知柏八味丸

大補陰丸

玉女煎

清胃散

歸芍地黃湯

牛蒡解肌湯

地黃飲子

四物湯

導赤散

歸芍異功湯

桂附八味丸

龍胆瀉肝湯

麻杏甘膏湯

銀花解毒湯

清燥救肺湯

半夏厚朴湯

蘇子降氣湯

升麻葛根湯

葛根苓連湯

升麻鼈甲湯

金匱腎氣丸

連翹敗毒散

卷中

益氣養營湯

和營散堅丸

加味四物湯

豆豉餅

琥珀膏

必效散

遇仙無比丸

柴胡清肝散

人參養營湯

雄黃散

護心丹

烏金膏

傷科心得集

方彙目錄 三

內疎黃連湯

葶藶大棗瀉肺湯

內補黃芪湯

神授衛生湯

參芪內托散

橘葉湯

元壽丹

赤豆苡仁湯

大射干湯

牡丹皮散

三仁湯

四妙湯

化毒除濕湯

蠟礬丸

五苓散

活血散瘀湯

薏苡仁湯

附子苡仁敗醬散

四君子湯

滋陰除濕湯

和氣養營湯

滋腎保元湯

琥珀蠟礬丸

先天大造丸

不換金正氣散

六君子湯

參苓白朮散

赤石脂禹餘糧湯

黑地黃丸

內消沃雪湯

桂枝和營湯

當歸清營湯

葶藶湯

陽和湯

潰堅湯

虎潛丸

傷科心得集

方彙目錄 四

獨活寄生湯

葶藶化毒湯

化斑解毒湯

防風通聖散

升麻葛根湯

麻黃一劑飲

仙遺糧湯

金蟬脫甲酒

芎歸二朮湯

五寶丹

十味淡齋方

清肝導滯湯

土荳蘆湯

蘆薈丸

二妙散

四妙丸

解毒雄黃散	石珍散
藜蘆膏	普濟丹
蛇床子散	一掃光
芥靈丹	消風散
綉毬丸	製栢散
四生散	黃蠟膏
復元活血湯	沒藥降聖丹
玉真散	
補遺	
瘍科心得集	方彙目錄
白虎湯	歸脾湯
清營解毒湯	瀉火救肺湯
桔湯	清肝解鬱湯
大黃湯	旋覆葱絲湯
金鈴子散	鱉甲煎丸
疎肝導滯湯	羌活勝濕湯
草薺溲濕湯	苦參湯
通天再造散	醉仙散
苦參丸	砒砂散

方彙目錄 五

翠雲錠	清涼圓
北庭丹	踏粉散
鷲黃散	太乙膏
黃連膏	金黃散
托裏散	麥味地黃丸
紅棉散	逍遙散
千金葦莖湯	牛旁子散
石膏散	托裏消毒湯
廷壽丹	牡丹皮湯
瘍科心得集	方彙目錄
七味神聖湯	黃芪柴胡湯
雞子大黃丸	涼血消風散
神應養真丹	四苓散
萬應膏	口疳藥
殺疔藥	化膿生肌膏
夾紙膏	國老散
隔蒜灸法	神燈照法
桑枝灸法	

方彙目錄 六

瘍科心得集方彙

依論中前後編次 日月膏丹丸散附後

上卷

仲景黃連瀉心湯 治一切火熱癰腫瘡瘍

黃連 黃芩 甘草

三因溫胆湯 治氣鬱生涎濕熱壅滯舌苔膩白

瘍毒內攻心煩噦惡

陳皮 半夏 茯苓

甘草 枳實 竹茹

瘍科心得集 黃連瀉心湯 溫胆湯 犀角地黃湯 治一切肺胃之 方彙

濟生犀角地黃湯 清營解熱能治一切肺胃之

火

犀角 生地 白芍 丹皮

加柴胡黃芩治肝火

新方羚羊角散 治風熱挾肝陽上逆耳癰項腫

痰毒托腮等證

羚羊角 夏枯草 丹皮

鈎藤鈎 連翹 桑葉

山梔 元參 象貝母

真人活命飲 治一切癰疽未成膿者即消已

成膿即潰此止痛消毒之聖藥也或陰夾陽陽夾

陰之證皆可服

金銀花 防風 白芷 當歸

天花粉 乳香 沒藥 角刺

穿山甲 陳皮 象貝母 甘草節

新方疎肝流氣飲 治肝鬱不舒乳癰乳痰諸證

柴胡 薄荷 鬱金

當歸 丹皮 黃芩

瘍科心得集 真人活命飲 疎肝流氣飲 方彙

白芍 山梔 夏枯草

陳氏萬靈丹 治癰疽疔毒對口濕痰流注附骨

陰疽鶴膝等證

茅朮 全蝎 石斛 明天麻

當歸 甘草 川芎 羌活

荆芥 防風 麻黃 北細辛

川烏 草烏 何首烏 明雄黃

蜜丸如彈子大每藥一兩分作四丸又六丸又九

丸觀年之老弱壯取用外用硃砂六錢研細為衣

活人解毒散 亦名消風敗毒散 發熱時

氣風毒邪熱亦治腸風下血風濕癰腫瘡瘍

柴胡 荆芥 防風 羌活

獨活 前胡 川芎 枳殼

人參 甘草 桔梗 茯苓

內熱加酒炒黃芩 熱甚加酒炒川連 口渴加

花粉

犀角升麻湯 治時毒或風熱頭面腫痛或

咽喉不利或發痘疹腮等證

瘍科心得集 制防敗毒散犀角升麻湯 五福化毒丹 方彙

犀角 升麻 防風 羌活

白芷 白附子 黃芩 甘草

五福化毒丹 治咽喉牙口瘡毒腫痛並小

兒一切熱毒瘡癩驚風煩躁口舌生瘡夜臥不寧

等證

元參 桔梗 茯苓

人參 牙硝 青黛

甘草 麝香 金箔

右為末煉蜜丸芩實大每服一九薄荷湯下

五香連翹湯 治時毒癰腫赤痛煩渴便秘

脈腎而數

大黃 黃芩 升麻

芒硝 梔子

五香連翹湯 治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯

不行者

乳香 木香 沉香 丁香

香附 黃芪 射干 連翹

升麻 木通 獨活 桑寄生

瘍科心得集 五香連翹湯 通氣散 犀角散 方彙

甘草

通氣散 治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄

其毒

牙皂 川芎 北細辛

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為效

犀角散 治痘瘡癰毒時毒熱感煩躁多渴

小便赤澀或赤斑

犀角 甘草 防風 黃芩

右為末每服二錢水一小盞煎五分溫服

景岳 普濟消毒飲 治天行時疫大頭瘟發熱惡

寒頸項腫痛脈洪按痺等證

柴胡 桔梗 羌活 防風

黃連 連翹 枳殼 荆芥

白芷 川芎 射干 黃芩

甘草 加薑煎服

景岳 連翹湯 治癰疽時毒焮赤腫痛

連翹 升麻 朴硝 元參

芍藥 白朮 防風 射干

瘍科心得集 普濟消毒飲 定痛托裏散 五方藥

大黃 甘草 杏仁

景岳 定痛托裏散 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼 當歸 白芍 川芎

乳香 沒藥 肉桂

景岳 托裏黃芪湯 治癰疽氣虛作瀉甚效

黃芪 甘草 天花粉 加人參亦可

東坦 普濟消毒飲 治疫癘憎寒壯熱頭面腫感

目不能開氣逆上喘咽喉不利口舌乾燥

黃連 黃芩 人參 生甘草

桔梗 柴胡 薄荷葉 連翹

鼠粘子 板藍根 馬尾勃 白殭蚕

升麻 元參 大黃

通聖消毒飲 凡頭面腫感兩目不開鼻塞

口乾舌燥內外有熱或咽腫痛不利或內實大便

秘結脈洪數煩渴者宜服之

荆芥 防風 白芍 連翹

甘草 川芎 當歸 薄荷

黃芩 山梔 滑石 桔梗

瘍科心得集 普濟消毒飲 小柴胡湯 清涼救苦散 六方藥

石膏 芒硝 大黃 麻黃

牛蒡子

腫不消加元參 一方用犀角

仲景 小柴胡湯 治用胆風熱癰癥結核或腫痛

色赤或寒熱往來或怒火口苦耳聾耳癰乳癰乳

疽等證

柴胡 人參 黃芩 生薑

半夏 甘草 大棗

清涼救苦散 治大頭瘟腫甚者以此敷之

芙蓉葉 霜桑葉 白藜 白芨

大黃 黃連 黃柏 紫車前

白芷 雄黃 赤小豆 芒硝

右各等分爲末用蜜水調敷腫處頻掃之

崔氏黃連解毒湯 治一切火毒熱毒狂躁心煩

濕熱壅滯諸證脈洪而數

黃連 黃芩 黃柏 山梔

陳氏如意金黃散 治癰疽發背諸般疔毒漆瘡

火丹濕痰流毒風熱天泡肌膚赤腫婦人乳癰小

瘍科心得集 黃連解毒湯 如意金黃散 清血藥 七 方彙

見丹毒

天花粉 黃柏 大黃

白芷 厚朴 陳皮

甘草 蒼朮 南星

爲末或蜜水或葱湯或葱酒又或大藍根葉汁調

敷要在臨證審用

景清肝益營湯 治肝胆小腸經風熱血燥筋

攣結核或耳項胸乳脇肋作痛並一切肝火之證

熟地 當歸 山梔 龍胆草

茯苓 白芍 柴胡 白朮

木瓜 川芎 炙甘草

景托裏消毒散 治癰疽已成不得內消者宜

服此以托之

人參 川芎 黃芪 當歸

白芍 白朮 茯苓 金銀花

白芷 甘草 桔梗 皂角刺

景梔子清肝湯 治少陽經虛肝火風熱上攻

遂成癰疽痛連頸項太陽等處或耳內作痒生瘡

瘍科心得集 托裏消毒散 梔子清肝湯 八 方彙

或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱喘甚胸滿口

苦舌乾 柴胡 川芎 當歸 牛蒡子

白芍 牡丹皮 石膏 山梔

黃芩 黃連 甘草

全鼠粘子湯 治癰疽初起寒少熱多頭眩作

痛口燥咽乾渴欲飲冷二便秘澀六脈沉實有力

頰悶疼痛者

桔梗 鼠粘子 赤芍 地骨皮

當歸 夫花粉 元參 甘草稍

木通 防風 連翹 大黃

景神效黃芪湯 治癰毒內虛毒不起化及潰

後諸虛不能收口

黃芪 麥冬 人參 熟地

茯苓 甘草 白芍 當歸

川芎 遠志 官桂 薑 棗

陳無擇 蒼耳散 治鼻淵

薄荷 辛夷 白芷 蒼耳子

瘍科心得集 九 方彙

葱茶調服

錢仲陽 六味地黃湯 治肝腎不足真陰虧損

舌燥喉痛虛火牙痛牙疳等證

生地 山萸 茯苓

山藥 澤瀉 丹皮

東垣 補中益氣湯 治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱

或因赴伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散

生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁仁渴脉

洪大弦虛或微細軟弱及脫肛痔漏等證

人參 黃芪 於朮 陳皮

柴胡 升麻 甘草 當歸

大加味道遙散 治肝鬱氣滯或口舌生瘡或

耳內作痛及乳癰乳痰等證

柴胡 白芍 當歸 茯苓

白朮 甘草 黃芩 半夏

白芷 陳皮 桔梗

氏 辛夷散 治鼻生瘰癧肉

藁本 防風 辛夷

瘍科心得集 十 方彙

白芷 升麻 木通

川芎 細辛 甘草

辛夷清肺飲 治鼻痔

辛夷 黃芩 山梔 麥冬

百合 石膏 知母 甘草

升麻 枇杷葉

方 涼膈散 治心火上盛中焦燥實煩燥口渴

目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘胃熱發

斑及小兒驚急痘瘡黑陷外瘍實火內攻神識昏

蒙古黑噦惡等證

芒硝 大黃 山梔 連翹

薄荷 黃芩 甘草 竹葉

陳涼膈清脾飲 治癰瘍熱甚

防風 荆芥 黃芩 石膏

山梔 薄荷 赤芍 連翹

生地 甘草

局紫雪丹 治外內煩熱不解發斑發黃瘧毒

疫毒熱毒及小兒驚癇外瘍疔毒走黃神識昏迷

瘍科心得集

涼膈清脾飲此藥丹至寶丹

方彙

黃金 寒水石 石膏 滑石

磁石 升麻 元參 甘草

犀角 羚羊角 沉香 丁香

朴硝 硝石 辰砂 木香

麝香

製法詳醫方集解

葉至寶丹

犀角 硃砂 雄黃 琥珀

玳瑁 西牛黃 麝香 龍腦

金銀箔 水安息香

為極細末將安息香膏重湯煮入諸藥搜和丸如

彈子大外用蠟護臨服剖開用人參湯下

景奪命丹 治疔瘡發背等證或麻木或嘔吐

重者昏憤此藥服之不起者即起不痛者即痛痛

甚者即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成即消已

成即潰有奪命之功乃惡證中之至寶也

蟾酥 酒化 輕粉 麝香 枯礬

銅綠 乳香 沒藥 寒水石 煨

瘍科心得集 奪命丹蟾酥丸 方彙

硃砂 蝸牛

右為末用蝸牛或酒糊搗丸茶豆大每服二三丸

葱酒下外用一九八瘡孔內以膏蓋之

蟾酥丸 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臂腿等

疽一切惡證

蟾酥 酒化 輕粉 枯礬 寒水石

銅綠 乳香 沒藥 麝香

胆礬 雄黃 蝸牛 硃砂 共為末端午日於淨室中先將蝸牛研爛再用蟾

酥研勻方入各藥搗勻丸如菰豆大每服三九用葱白嚼爛包藥在內將熱酒一杯送下被蓋卧出汗

生濟 歸脾養營湯 治思慮太過勞傷心脾驚悸盜汗發熱體倦食少不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶瀉後氣血不復盜汗不眠等證

人參 白朮 茯苓 棗仁

遠志 歸身 木香 黃芪

炙甘草 龍眼肉

傷科心得集

歸脾養營湯治盜汗發熱驚悸

方集

陳氏清涼甘露飲 治齒唇膏梁所釀暴怒所結

遂成斯疾高突堅硬或損破流血或虛熱生痰或渴證久作並治

犀角 銀柴胡 茵陳 石斛

枳殼 麥冬 甘草 生地

黃芩 知母 枇杷葉 竹葉

燈心

知柏四物湯 治血虛煩熱

生地 歸身 白芍

川芎 知母 黃柏

四物逍遙散 柴胡 當歸 白芍 茯苓

白朮 炙甘草 川芎 生地

生薑 薄荷

仲景理中湯 臟腑中寒四肢強直

人參 白朮 泡薑 甘草

八珍湯 治氣血俱虛惡寒發熱煩躁作瀉大便不實飲食不進小腹脹痛眩暈昏憤傷科氣血

傷科心得集 治盜汗發熱驚悸

俱傷膿水清稀久不收斂等證

人參 生地 茯苓 當歸

白朮 川芎 白芍 炙甘草

十全大補湯 治癰瘍氣血虛弱患久不愈或潰瘍膿清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作瀉

人參 生地 黃芪 肉桂

白朮 當歸 白芍 茯苓

川芎 炙甘草

東垣升陽散火湯 治陽經火鬱癰毒壅滯

川芎 炙甘草

東垣升陽散火湯 治陽經火鬱癰毒壅滯

葛根 升麻 柴胡 羌活

獨活 防風 人參 芍藥

炙甘草 生甘草 生薑 大棗

干 甘露飲 治胃經火熱口臭喉瘡齒齦宣露

吐血衄血齒血陽證骨槽

生地 熟地 茵陳 黃芩

枳殼 枇杷葉 石斛 甘草

天冬 麥冬

知栢入味丸 治陰虛火動壯水之主以制陽

瘍科心得集 方彙

光

即六味地黃湯加知母黃栢

丹 大補陰丸 降陰火補腎水

熟地 龜板 黃栢 知母

右爲末將猪脊髓蒸熟煉蜜同搗和爲丸

玉女煎 治水虧火盛心虛不足陽明有餘

口疳碎腐

石膏 熟地 麥冬

知母 牛膝

與 清胃散 治胃經火熱唇口腫痛齒齦潰爛

喉痛上連頭面或惡寒發熱

生地 升麻 黃連

當歸 牡丹皮 石膏

歸芍地黃湯 治瘍後營虧胃弱飲食少思

當歸 白芍 生地 人參

茯苓 於朮 炙甘草 陳皮

新 牛蒡解肌湯 治頭面風熱或頸項痰游風

熱牙癰等證

瘍科心得集 方彙

牛蒡子 薄荷 荆芥

連翹 山梔 丹皮

石斛 元參 夏枯草

河 地黃飲子 治舌疳不能言足廢不能行此

少陰氣厥不至急當溫之名曰痲證凡陰虛有二

有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地 山茱萸 石斛 麥冬

五味子 遠志 茯苓 石菖蒲

肉桂 附子 巴戟肉

局方四物湯

治瘡瘍血虛發熱或因貴後致嘔
熱內熱煩躁不安者皆宜服之

生地 白芍 當歸 川芎

錢乙導赤散

治心火及小腸熱證便赤淋痛口

糜生瘡

生地 木通 竹葉 甘草梢

歸芍異功湯

治癰瘍脾胃虛弱飲食少血虛

作痛

人參 茯苓 白朮 炙甘草

傷科心得集

四物湯藥亦效 歸芍異功湯
桂附八味丸

方景

陳皮 當歸 白芍

崔氏桂附八味丸

治命門火衰不能生土以致

脾胃虛寒而患流注鶴膝等證不能消潰收斂或

飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺

即六味地黃湯加肉桂附子

局方龍胆瀉肝湯

治肝胆經實火濕熱脇痛耳

聾肌溢口苦小便赤澀白濁溲血魚口下疳囊癰

等證

龍胆草 柴胡 黃芩 山梔

生地 車前子 澤瀉 木通

當歸 甘草

仲景麻杏甘膏湯

治風溫外感痰鳴氣逆或小

兒慢痺風驚痰發瘧

麻黃 杏仁 甘草 石膏

此肺金藥麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘草緩肺急

石膏清肺熱

新方銀花解毒湯

治風火濕熱癰疽疔毒

金銀花 地丁 犀角 赤苓

傷科心得集

麻杏甘膏湯
清燥救肺湯

銀花解毒湯
半夏厚朴湯

方景

連翹 丹皮 川連 夏枯草

清燥救肺湯

治肺胃火盛咽乾喉痺咳痰吐

血

霜桑葉 杏仁 麥冬 石膏

人參 阿膠 胡麻仁 甘草

枇杷葉

金匱半夏厚朴湯

治婦人七情之氣鬱滯不散

結成痰涎或如梅核在咽或中脘痞滿氣不舒暢

或痰飲中滯嘔逆惡心並可取效

半夏 茯苓 厚朴

紫蘇 生薑

方局 蘇子降氣湯 治心腹脹滿喘促氣急消痰

進食

蘇子 半夏 當歸

前胡 桂枝 厚朴

橘紅 甘草 生薑

仲 升麻葛根湯 升散陽明牙痛牙交托腮等

瘍

湯科心得集 蘇子降氣湯升麻葛根湯 九 方彙

升麻 葛根 芍藥 甘草

仲 葛根芩連湯 大陽陽明解表清裡外瘍火

毒內逼協熱便泄

葛根 黃芩 黃連 甘草

仲 升麻鱉甲湯

升麻 當歸 蜀椒

甘草 鱉甲 雄黃

右六味以水四升煮取一升頓服之老少再服取

汗

金匱腎氣丸 治脾胃陽虛不能行水小便不

利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰厥口

成盡證其效如神

即六味丸加牛膝車前肉桂附子

菴連翹敗毒散 治發願硬腫

連翹 山梔 羌活 玄參

薄荷 防風 柴胡 桔梗

升麻 川芎 當歸 黃芩

芍藥 牛蒡子

湯科心得集 金匱腎氣丸 連翹敗毒散 三 方彙

加紅花同煎

湯加天花粉 向腫加白芷 項腫加威靈仙

大便實加大黃川山甲 虛加人參

卷中

景 益氣養營湯 治抑鬱勞傷思慮太過心神

俱憊以致四肢頸項結成瘰癧纒纒如貫珠謂之

筋癭或軟或硬或赤或白或痛或不痛日晡發熱

及潰而不斂者並效

人參 茯苓 陳皮 貝母

香附 當歸 川芎 黃芪

熟地 白芍 甘草 桔梗

白朮 柴胡 薑 棗

陳和營散堅丸 治失營證堅硬如石不熱不

紅漸腫漸大者

人參 當歸 白朮 扶神

香附 橘紅 熟地 南星

貝母 遠志 丹皮 柏子仁

棗仁 角沉 蘆薈 龍齒

瘍科心得集

醫方類聚

二

方集

右為末煉蜜丸每服三錢食後用合歡樹皮煎湯送下

景加味四物湯 治血虛營弱肝胆有火

即四物湯加山梔柴胡丹皮

景豆豉餅 治瘡瘍腫毒硬而不潰及潰而不

歛並一切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅子如錢大厚三倍置患處以艾壯於餅上灸之乾則再易如灸發背用嗽口水調餅覆患處以

艾鋪餅上灸之未成者即消已成者亦殺其大毒如有不效必氣血虛故也

景琥珀膏 治頸項瘰癧及脇下初結小核漸

如連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥或

成漏證

琥珀 白芷 防風 當歸

木鱉子 木通 丁香 桂心

硃砂 木香 松香 麻油

右先將琥珀等六味為末其餘藥入油煎黑濾去

瘍科心得集

琥珀膏 必效散

三

方集

渣徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

景必效散 治瘰癧氣血尚無虧損瘰核不愈

內服此藥外以鍼頭散腐之若氣血虧者先服益

氣湯數劑後服此藥服後癰毒盡下再服前湯數

劑

南礪砂 輕粉 麝香 巴豆

白檳榔 斑貓

右為極細末取鷄子二個去黃用清調藥仍入內以濕紙數重糊口入飯甌蒸熟取出曝乾研末

虛者每服五分實者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿餌瘡毒去後多服益氣養營湯瘡口自合

景 遇仙無比丸 治瘰癧未成膿其人氣體如

常宜服此丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣少充方服此丸核消後仍服前湯如潰後有瘡肉者宜用白雪丹更不斂亦宜服此丸斂後再服前湯

瘍科心得集

遇仙無比丸瘰癧湯

方彙

白朮 檳榔 防風 黑丑

蜜陀僧 郁李仁 斑貓 甘草

為細末米糊丸梧子大每服二十九早晚煎甘草檳榔湯下服至月許覺腹中微痛自小便中取下瘰癧如魚目狀已破者自合未膿者自消

薛 柴胡清肝湯 治肝胆三焦風熱瘡瘍或怒

火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡 黃芩 山梔 川芎

人參 甘草 連翹 桔梗

局 人參養營湯 治脾肺俱虛營血不足

人參 黃芪 當歸 白朮

炙甘草 桂心 陳皮 熟地

五味 白芍 遠志 薑

棗

陳 雄黃散 治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛值

心者宜用之

雄黃 蟾酥 冰片 輕粉

瘍科心得集

參養營湯瘰癧身烏金膏

方彙

其為細末新汲水調塗紙蓋日用三次極效

陳 護心丹 治瘡毒內攻口乾煩燥惡心嘔吐

者宜用此藥

茶豆粉 乳香 硃砂 甘草

右共研極細每服二錢白滾湯調服早晚二次

景 烏金膏 治發背中央肉死塗之即腐未死

塗之即生若初起腫痛用點數處則解毒頓消若瘡血腐黑塗之即潰

用巴豆去殼炒黑研如膏點瘡處或塗瘡肉上

則其消化或加乳香少許亦可如瘰癧內或加

香油少許調稀可用

內疎黃連湯 治瘡瘍發熱而嘔大便秘結

脈洪而實

黃連 芍藥 當歸 枳殼

太香 黃芩 梔子 薄荷

桔梗 甘草 連翹 大黃

菴

水煎仍量虛實治之

湯科心得集

瘰癧瘡毒發熱而嘔

玉

方泉

三因葶藶大棗瀉肺湯 治上氣喘急身與面目俱

浮鼻寒聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜葶藶 大棗

須先服小青龍湯二服方用此

內補黃芪湯 治癰毒內虛毒不起化及潰

後諸虛迭見

黃芪 麥冬 人參 熟地

茯苓 甘草 芍藥 當歸

川芎 遠志 官桂 薑

棗

陳神授衛生湯 解毒消毒清熱活血止痛

白芷 天花粉 連翹 牛蒡子

荆芥 甘草節 防風 金銀花

歸尾 川貝母 乳香 沒藥

若大便秘結熱甚者加酒炒大黃

丹參其內托散 治瘡癰膿毒不化膿潰作痛

及痘瘡裡虛發痒或不潰膿為倒靨等證

人參 黃芪 當歸 川芎

湯科心得集

瘰癧瘡毒發熱而嘔

玉

方泉

厚朴 防風 桔梗 白芷

紫草 官桂 木香 甘草

白芍

新橋葉湯 治乳癰焮紅漫腫或初起或漸成

膿者

橋葉 蒲公英 象貝母 夏枯草

青皮 當歸 赤芍 花粉

香附 黃芩

張通 元壽丹 乳癰初起服之即消已潰可保

餘辦無恙

龜殼止用龜蓋
火煨存性

研細末熱酒調服三錢盡量飲醉即愈

大赤豆薏苡仁湯 治腸癰少腹癰

赤小豆 苡仁 防己 甘草

大大射干湯 治胃癰始成

射干 升麻 白朮 赤芍藥

赤茯苓 山梔仁

煎熟入蜜生地汁和服

瘍科心得集

赤豆薏苡仁湯

卷

方彙

金牡丹皮散

治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮 瓜蒌仁 桃仁 薏苡仁

按金匱要畧云牡丹皮散用冬瓜子仁非瓜蒌仁

蓋冬瓜子仁有解毒護膜厚腸生肌之功

大三仁湯 治胃癰小便赤澀腹滿不食

薏苡仁 桃仁 牡丹皮 冬瓜子仁

說四妙湯

此瘍科首用捷法功效立奏增減

活法醫者臨證酌用

生黃芪 當歸 金銀花 甘草節

能穿潰者加白芷角針山甲一伏時自潰如初起
焮痛口渴加天花粉此治癰疽發背腸癰之神方
也

新化毒除濕湯

治濕熱下注

歸尾 澤蘭 苡仁 牡丹皮

赤芍 金銀花 枳殼 川通草

景蠟礬丸

治金石發疽一切癰疽托裡止痛

痛護臟腑神妙不問老少皆可服之

瘍科心得集

蠟礬丸五卷散

天

方彙

黃蠟一兩黃色者佳溶開入礬末

白礬一兩明亮淨者為末

右二味和勻象手急丸桐子大每服二三十丸漸

加至四五十九丸熟水或鹽湯送下日進二三服至

三四兩之上愈見奇功矣 此方不惟止痛生肌

而已其護膜止瀉消毒化膿及內癰膿托裡之

功甚大

仲五苓散

治瘡毒下部濕熱小便短少

猪苓 茯苓 白朮 澤瀉

官桂

陳氏活血散瘀湯 治產後惡露不盡或經後瘀

血作痛或暴急奔走或杖後瘀血流注腸胃作痛
漸成內癰及腹痛大便燥者並宜服之

川芎

歸尾

赤芍

蘇木

丹皮

枳殼

桃仁

瓜蒌仁

檳榔

大黃

水煎空心服

陳氏薏苡仁湯

治腸癰腹中疼痛或脹滿不食

瘍科心得集

續修四庫全書 醫家類

方

方

小便澀滯婦人產後多有此病縱非癰服之尤效

薏苡仁

瓜蒌仁

牡丹皮

白芍

金匱附子苡仁散

治腸癰

薏苡仁

敗醬

附子

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓服

小便當下

局方四君子湯

治一切陽虛氣弱脾衰肺損飲

食少思體瘦面黃皮焦毛落脉來細軟

人參

白朮

茯苓

甘草

薑

棗

陳氏滋陰除濕湯

治鶴口疽初起朝寒暮熱日

輕夜重如瘡等證

川芎

當歸

白芍

熟地

柴胡

黃芩

陳皮

知母

澤瀉

地骨皮

貝母

甘草

薑

陳氏和氣養營湯

治前證已成不得內消者宜

瘍科心得集

續修四庫全書 醫家類

方

方

此藥托之

人參

陳皮

白朮

黃芪

茯苓

丹皮

當歸

熟地

沉香

甘草

陳氏滋腎保元湯

治前證元氣虛弱膿水淋漓

久而不斂

人參

黃芪

白朮

茯苓

歸身

杜仲

山萸

丹皮

熟地

附子

肉桂

甘草

薑 棗

陳氏琥珀蠟礬丸 治癰疽發背已成未成之際

恐毒氣不能外出必致內攻預服此丸護膜護心亦且散血解毒

白礬 一兩 雄黃 一錢 琥珀 一錢
錢 黃臘 一兩 分 蜂蜜 一錢
硃砂 一分

右四味先研極細另將蜜臘銅杓內溶化離火片時候蠟四邊稍凝方入上藥攪勻共成一塊以一人將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大用硃砂

瘍科心得集

琥珀蠟礬丸 先天大造丸

至

方彙

爲衣磁罐收貯每服二三十丸白湯食後送下病甚者早晚日進二次其功最効

陳氏先天大造丸 治風寒濕毒襲於經絡初起

皮色不變漫腫無頭或陰虛外寒侵入初起筋骨疼痛日久遂成腫痛潰後膿水清稀久而不愈漸成漏證者並可服

紫河車 熟地 歸身 茯苓

人參 枸杞 兔絲子 肉蓯蓉

黃精 白朮 何首烏 川牛膝

仙茅 骨碎補 巴戟肉 破故紙

遠志 木香 青鹽 丁香

黑棗肉

右爲末煉蜜丸每服三錢空心溫酒送下此方非獨治流注成漏者又補一切氣血虛羸勞傷內損及男婦久無嗣息並有奇功

不換金正氣散 治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏

痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消

寒熱不作

瘍科心得集

不換金正氣散

至

方彙

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

半夏 藿香

六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不

消或不潰飲宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

人參 茯苓 白朮 甘草

半夏 陳皮

仲參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐

或瀉

人參 茯苓 白朮 陳皮

山藥 扁豆 甘草 建蓮

砂仁 苡仁 桔梗

赤石脂餘糧湯 止利

赤石脂 禹餘糧

等分杵碎煎

石脂餘糧湯以止脫重以固下甘以益氣

黑地黃丸 治脾胃不足房室虛損形瘦無力

面色青黃亦治血虛久痔

熟地 蒼朮 五味子 乾薑

瘍科心得集 赤石脂餘糧湯 方錄

用棗肉丸米飲或酒下

陳氏內消沃雪湯 治發背并五臟內癰尻臂諸

腫大小腸癰肛門臟毒初起俱未出膿疼痛不可

忍者

青皮 陳皮 乳香 沒藥

連翹 黃芪 當歸 甘草節

白芷 射干 天花粉 川山甲

貝母 白芍 金銀花 皂角刺

木香 大黃 水酒各半煎

桂枝和營湯 治寒凝濕滯氣血虛者

桂枝 當歸 秦艽 茯苓

川斷 廣皮 牛膝

當歸清營湯 治肝胆二經風熱血燥筋攣結

核乳癰乳疔並一切耳項肝火之證

當歸 生地 山梔 赤苓

白芍 柴胡 川芎 甘草

貝母 丹皮 花粉 連翹

景岳草薺湯 治楊梅瘡及癰癤咽喉惡瘡癰漏

瘍科心得集 桂枝和營湯 方錄

潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙

用土草薺即土茯苓二三兩以水三鍾煎一鍾

不拘時徐徐服之

全生集 陽和湯 治陰寒腿癰鶴膝風流注等證

肉桂 鹿角膠 白芥子 熟地

麻黃 炮薑

東垣潰堅湯

知母 黃柏 黃連 花粉

黃芩 升麻 柴胡 龍胆草

連翹 葛根 甘草 桔梗

歸尾 白芍 三稜 莪朮

昆布

虎潛丸 治精血不足筋骨痿弱足不任地及

骨蒸勞熱

虎脛骨 熟地 龜板 瑣陽

當歸 牛膝 白芍 黃柏

知母 陳皮

羯羊肉酒煮爛搗丸鹽湯下

湯科心得集

虎潛丸 獨活寄生湯 草薢化毒湯

方景

獨活寄生湯

治肝腎虛熱風濕內攻腰膝

作痛冷痺無力屈伸不便

獨活 桑寄生 秦艽 防風

細辛 川芎 人參 當歸

熟地 白芍 桂心 茯苓

杜仲 牛膝 甘草

新方 草薢化毒湯

治濕熱氣血實者

草薢 歸尾 丹皮 牛膝

防已 木瓜 苡仁 秦艽

卷下

化斑解毒湯

治三焦風熱上攻致生火丹延

及遍身癢痛者

元參 人中黃 知母 生甘草

石膏 牛蒡子 升麻 川連

連翹 淡竹葉

河間防風通聖散

治外證陽毒腸風痔漏

大黃 芒硝 荆芥 防風

山梔 白芍 連翹 甘草

湯科心得集

化斑解毒湯 防風通聖散 葛根湯

方景

桔梗 川芎 當歸 石膏

滑石 薄荷 黃芩 白朮

麻黃 牛蒡子 薑 葱

錢氏升麻葛根湯

治丹毒身體發熱面紅氣急

啼叫驚搐等證

升麻 葛根 白芍 柴胡

黃芩 黑山梔 木通 甘草

麻黃一劑飲

治遍體發瘡初起節節痠楚服

此一劑以透發其毒

麻黃一錢 防風一錢 銀花三錢 白蘇皮三錢

當歸一錢 胡麻三錢 甘草一錢 羌活一錢

秦艽一錢

用肥羊內一觔河水三大碗煎至一大碗取汁吹

去面上浮油將前藥煎至一飯碗溫服以羊肉淡

食過口仰面睡於帳內不可見風取汗為度

仙遺糧湯 治一切楊梅瘡不拘始終虛實

皆可取效

當歸 生地 防風 金銀花

湯科心得集 仙遺糧湯 金蟬脫甲酒 方景

木通 苡仁 連翹 白蘇皮

黃連 白朮 甘草 皂角刺

土茯苓即名仙遺糧用鮮者四兩洗淨以木石拍

搥碎用水三碗煎二碗入前藥加燈心二十根煎

服

陳氏金蟬脫甲酒 治楊梅瘡不拘新久輕重皆

效

大蝦蟆一隻好酒五觔將蝦蟆浸入封瓶口煮香

二座取起待次日隨量飲之以醉為度蓋覆出汗

有酒次日只飲量之一半酒盡瘡愈服酒後不許

見風忌房事慎口

芎歸二朮湯 治結毒

川芎 當歸 防風 獨活

人參 茯苓 銀花 厚朴

苡仁 木瓜 白朮 皂角刺

甘草 山甲 土茯苓 精羊肉

五寶丹 治九種楊梅結毒並及兒女者

真珠 新白者佳 琥珀 透明血色者甘草

湯科心得集 青礬末湯 五寶丹 方景

硃砂 透明者三厘 滴乳石 木香甘草水

片腦 半分

各研細末稱准共合一處每用藥末二分半八飛

羅麵二分半再研和勻

每日用鮮土茯苓一觔洗淨川石口木槌搗碎用

水十二飯碗煎至六碗濾去渣再煎至四碗然後

將藥五分細摻於土茯苓湯內隨手攪勻一日吃

完重者四十服輕者一二十服即愈若舊有輕粉

等毒服藥後當盡發出不使少留

若病在上者加木香二錢病在下加牛膝一两與
土茯苓同煎服湯之法病在上飽服在下飢服忌
茶酒並一切發風動氣之物其毒貼清涼膏或加
摻藥收口

十味淡齋方 治下疳廣瘡誤服輕粉升藥致爛喉

塌鼻遍體節骨凌楚或腐爛不堪他藥不效者

川貝母 去心生 研一两 白芷 焙一两 防風 焙一两

海螵蛸 浸淡漂淨 去甲一两 當歸 炒一两 川芎 炒一两

金銀花 晒一两 花粉 晒一两 半夏 薑汁製 炒一两

瘍科心得集 十味淡齋方 方彙

南星 薑汁製炒 一两五錢

各藥要圖圖忌金銀銅鐵錫器在瓦盆內炒用木

槌於石臼內打成末篩淨稱準分量分作二十一

服每服五錢每日用鮮土茯苓一觔不見鐵器於

石臼內搗碎放於瓦接罐中用河水十二飯碗煎

六碗去渣下藥末五錢再煎至三飯碗朝午晚各

服一碗服此六十三口收功然服此藥須要忌一

切鹽味煎藥忌一切金銀銅鐵錫器如犯上二項

即無效矣

陳清肝導滯湯 治肝經濕熱玉莖腫痛小水

濕滯作痛者服之

扁蓄 瞿麥 滑石 甘草

大黃 引燈心

景土萆薢湯 治楊梅瘡及咽喉惡瘡癰漏潰

爛筋骨拘攣疼痛皆妙

用土萆薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不

拘時徐徐服之

若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以此

瘍科心得集 方彙

一味為主外加對證之藥無不神效

景蘆薈丸 治疔癰消瘦發熱潮熱飲食少思

口乾作渴或肝火食積口臭生瘡牙齦腫爛等證

蘆薈 胡黃連 木香 青皮

白蕪荑 當歸 茯苓 陳皮

甘草

米糊丸

丹二妙散 治濕熱在經筋骨疼痛瘡瘍遍體

蒼朮 黃柏

四妙丸

治前證而兼血虛者

蒼朮 黃柏 當歸 細生地

若濕熱甚者細生地當歸或易草薢苳仁亦可

景岳解毒雄黃散

治一切癰腫潰瘍毒勢甚者

用此藥洗二三次

雄黃 一兩 白礬 四兩 寒水石 煨一兩 五錢

右為末用滾湯二三碗乘熱入藥末一兩洗患處

以太乙膏或神異膏貼之

陳氏石珍散

治天泡作爛疼痛膿水淋漓

瘍科心得集

景岳解毒雄黃散

聖

方彙

石膏 煨

輕粉 各一兩 青黛 兩

黃柏末 各三錢

右為末先將甘草湯洗瘡後以此藥填其痛即

止

景岳藜蘆膏

治一切瘡疔瘡肉突出

用藜蘆一味為末以生豬脂研為膏塗患處周口

易之

又方

苦參

藜蘆 各一兩

用豬油八兩熬枯去渣入松香一兩化開離火加

枯礬雄黃各一兩攪勻治膿窠瘡以此塗之

大普濟丹

治疥癩等瘡

硫黃 花柳 炒 潮腦 各一錢 生明礬 五分

枯白礬 一錢 五分 猪板油 兩

搗丸夏布包以火烘之候溫擦之

陳氏蛇床子散

治膿窠瘡生於手足遍身根硬

作脹癢痛非常

蛇床子 大楓肉 松香 枯礬 各一兩

黃丹 大黃 各五錢 輕粉 三錢

右為末麻油調搽濕爛者乾搽之

瘍科心得集

景岳解毒雄黃散

聖

方彙

陳氏一掃光

治血熱濕熱癢瘡

苦參 黃柏 各一兩 烟膠 一升 木鱉肉

蛇床子 點紅椒 明礬 枯礬

硫黃 楓子肉 樟冰 水銀

輕粉 各三錢 白砒 五錢

右為末用熟豬油二觔四兩化開入藥攪勻作丸

龍眼大磁瓶收貯用時搽擦瘡上二次即愈

大芥靈丹

治疥瘡

枳殼 炒 山梔 連翹 荆芥

當歸 羌活各七錢 白芷 白蘚皮炒

苦參糯米泔浸一日

右為末煉蜜為丸桐子大每服五十九丸白湯送下立可除根

消風散 治疥癬等疾

羌活 防風 荆芥 川芎

厚朴 人參 茯苓 陳皮

甘草 僵蚕 蟬蛻 藿香

每服三錢茶調下

瘍科心得集 消風散 疥癬丸 製和散 聖方彙

陳氏綉毬丸 治一切乾濕疥瘡及膿窠爛瘡瘙

癢無度者

樟冰 輕粉 川椒 枯礬

水銀 雄黃各二錢 楓子肉一百粒

以上共為末同大楓子肉再研和勻加柏油一兩

化開和藥攪勻丸作圓眼大擦瘡上

大製柏散 治濕毒瘡

厚黃柏數觔入糞坑內浸一百日取出入黃土內

埋三日取出晒乾研細蜜水調搽如瘡有水則乾

摻之

景四生散 治廉腿瘡浸淫不愈或眼目昏花

名腎臟風並治風癬疥癩血風瘡證

黃柏 獨活 白附子真白蒺藜 寺分

為末每服二錢用猪腰子一枚切開入藥濕紙包

煨熟空心鹽湯下

大黃蠟膏 治廉瘡

龍骨 煨 赤石脂 血竭各三錢

研末用香油一兩入血餘一小團煤枯去渣再入

瘍科心得集 聖方彙 黃蠟膏 復元活血湯

黃蠟一兩白膠香三錢溶化離火再入前藥末攪

勻候冷磁瓶貯之用時捏作薄片貼瘡上間三日

翻轉再貼

復元活血湯 治跌打損傷有瘀血者

柴胡 花粉 當歸 山甲

桃仁 紅花 大黃 甘草

酒煎

景沒藥降聖丹 治跌打損傷接續筋骨

當歸 酒炒 白芍 川芎 川烏頭泡云

生地 蘇木 乳香 另研 沒藥 另研

骨碎補 炙 自然銅 火煨醋淬十次各一兩

右為末生薑汁和蜜丸每兩作四丸每服一丸用

米酒半盞送下

本事方 玉真散 一名定風散 治打撲金刃破

傷風重者牙關緊急腰背反張並治蛇犬所傷

天南星 湯泡七次如急用以濕紙裹煨 防風 等分

右為末每服二錢溫酒調下若牙關緊急腰背反

張者每服三錢童便調下若內有瘀血亦愈至於

瘍科心得集 玉真散 虎骨湯 歸脾湯 聖方彙

昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若破傷瘡

口及瘋犬咬傷須用嗽口水及童便洗淨隨用生

南星為末搽之或以水調塗之出水為妙

補遺

白虎湯 治肺胃實熱

煨 石膏 知母 甘草 粳米

加入參名人參白虎湯

歸脾湯 治瘡瘍憂思傷脾血虛發熱食少體

倦或唇瘡流注及不能消散潰斂等證

人參 白朮 黃耆 當歸

炙甘草 茯苓 遠志 棗仁

木香 龍眼肉 生薑 大棗

新方 清營解毒湯 治血熱腫痛癰疽之未成膿

者宜服此

鮮生地 銀花 丹皮 赤芍

山梔 地丁 甘草節 連翹

新方 瀉火救肺湯 治肺癰肺痿初起火盛咳逆

桑白皮 杏仁 黃芩 生石膏

瘍科心得集 清營解毒湯 救肺湯 清肝解鬱湯 聖方彙

知母 枇杷葉 蘆根

振 甘桔湯 治熱腫喉痺

甘草 桔梗 薄荷 連翹

黃芩 山梔 竹葉

景岳 清肝解鬱湯 治肝經血虛風熱或乳內結

核或為膿潰不愈凡肝胆經血氣不和之病皆宜

服此

人參 川芎 當歸 貝母

白芍 青皮 柴胡 茯苓

熟地 山梔 白朮 甘草

丹皮

景岳 大黃湯 一名牡丹皮散 專治腸癰小腹

堅腫而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒其脈沉緊膿未成者急服之

牡丹皮 瓜蒌仁 各桃仁尖 去皮 大黃 煨

芒硝 各二錢

本方無瓜蒌即名大黃牡丹皮湯

旋覆葱絳湯 治血液虧損肝氣脹痛或少腹

瘍科心得集 方彙

癥瘕

旋覆 青葱 新絳

河間 金鈴子散 治肝氣鬱逆諸證

金鈴子 延胡

仲景 鱉甲煎丸 治瘧母一切癥結

鱉甲 烏扇 黃芩 柴胡

鼠婦 乾薑 大黃 芍藥

桂枝 葶藶 石葦 厚朴

丹皮 瞿麥 紫葳 半夏

人參 廬虫 阿膠 蜂窠

赤硝 蟻螂 桃仁 煨龜下灰

清酒

千金方有海藻大戟無鼠婦赤硝

新方 踈肝導滯湯 治肝經鬱滯欲成乳癰乳癰

乳巖等證

川棟子 延胡 青皮 白芍

當歸 香附 丹皮 山梔

羌活勝濕湯 治外傷濕氣一身盡痛

瘍科心得集 方彙

羌活 獨活 藥木 蔓荊子

川芎 炙甘草 防風

如身重腰痛沉沉然經有寒也加漢防已五分附

子五分

新方 草薢滲濕湯 治濕熱下注臙瘡漏蹄等證

草薢 苡仁 黃柏 赤苓

丹皮 澤瀉 滑石 通草

大 苦參湯 切疥癩瘋癬洗之並佳

苦參 二兩 蛇床子 白芷 金銀花

野菊花 黃柏 地膚子 大菖蒲
用河水煎湯臨洗入猪胆汁四五枚洗二三次全愈宜避風忌發物

寶鑑 通天再造散 治大瘋實熱內壅以此攻之

皂角刺 大黃炒各 鬱金 五錢 白丑頭末六錢五分 牛生牛熟

右為末每服五錢日未出時向東以無灰酒調服當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是年深者赤色是近日者數日再進一服無虫積乃止忌口避風并房事

易科心得集 漢世醫家秘傳 果 方藥

寶鑑 醉仙散 治癩瘋遍身麻木

鼠粘子 胡麻子 蔓荊子炒 枸杞各一兩

苦參 白蒺藜 瓜蒞根 防風各五錢

右為末每一兩入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調晨午晚各一服服後五七日先於牙縫內出臭涎渾身痛昏悶如醉後利下惡物臭積為效

陳氏 苦參丸 治大麻瘋不分新久穿潰爛老幼俱可服之

苦參 一觔 楓子肉 六兩 荆芥 一觔 防風 六兩

白芷六兩 全蝎 何首烏 白附子

枸杞子 威靈仙 當歸 大胡麻

川芎 蒺藜 大皂角 川牛膝

牛蒡子 獨活各五兩 蔓荊子 風藤

羌活 連翹 蒼朮 天麻

杜仲 草烏泡去皮尖 甘草各三兩 杏仁 二兩

人參 一兩 白花蛇切片炙黃二兩

右為細末醋打老米糊為丸梧子大每服三四十丸溫酒食前後下避風忌口

瘍科心得集 補砂散 辛 方藥

陳氏 補砂散 治鼻痔

補砂 一錢 輕粉 三分 冰片 五厘 雄黃 三分

共為末用草梗咬毛蘸藥勤點鼻痔上日五六次自然漸化為水而愈

陳氏 翠雲錠 治眼泡菌毒

杭粉 五兩 銅綠 一兩 輕粉 一錢

用黃連一兩同川米百粒熬膏和藥作錠陰乾

又治爛弦風眼或暴赤腫痛者

全大 清涼圓 治眼泡菌毒

當歸尾 石菖蒲 赤芍 各二錢 羌活 五分

地膚子 生杏仁 川連 各一錢 胆礬 二分

共研粗以大紅綢包裝如櫻桃大滾水浸泡乘熱

醃洗

清北庭丹 點舌菌

人中白 番礪 各五分 滑雞糞 瓦上青苔

瓦松 各一錢

右用傾銀罐子二個將藥裝在罐內將口封固外

用鹽泥固濟以炭火煨紅俟三炷香為度候冷開

湯科心得集 瘡科心得集 方彙

罐將藥取出入冰片麝香各一分共研細末用磁

針破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

蛤粉散 濕熱痛瘡以此摻之

蛤粉 輕粉 白芨 冰片

大驚黃散 治坐板瘡

菜豆粉 兩 黃柏 三錢 輕粉 三錢 滑石 五錢

陳太乙膏 一切癰疽瘡瘍提膿生新神效

生地 土木鱉 元參 赤芍

大黃 白芷 當歸 各五錢 肉桂 二錢 五分

乳香 沒藥 各二錢 阿魏 一錢 輕粉 五分

血餘 一團

用藤油一觔入藥熬枯瀘去渣下血餘再熬枯去

渣將炒過淨東丹六兩攪勻看老嫩適中方下阿

魏乳沒輕粉攪勻攤貼

黃連膏 治是三陰濕熱腿脚紅腫皮破脂流

類乎血瘋浸淫不止痛痒非常者

先用桐油一觔入鍋熬起白星為度加黃蠟一兩

五錢溶化入研細炒黑大黃末一觔攪勻再入冰

湯科心得集 瘡科心得集 方彙

片二分攤貼

景金黃散 敷天泡濕熱等瘡

滑石 一兩 粉甘草 五錢

此方或加菜豆粉枯礬治濕熱肥瘡更妙

景托裏散 治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜萸 梔 當歸 酒拌 黃芪 鹽水 白芍

甘草 熟地 花粉 銀花

角刺

右用無灰酒煎服

麥味地黄丸 治腎陰不足火燥肺金喘咳勞熱或有鼻衄鼻淵等證

麥冬 生地 茯苓 五味子

鬱金 白芍 烏藥 丹皮

澤瀉 茵陳 山藥 歸身

右為末煉蜜丸每服五錢

紅棉散 治耳內生瘡流膿乃肝經鬱火所

結

枯白礬 二錢 臘脂棉 一錢 煨

湯科心得集 李時珍紅棉散治耳內生瘡方

研勻先用棉杖子攪去膿水後蘸藥摻入耳底膿

自乾又有加麝香少許者

元 逍遙散 治肝鬱不舒致成乳癖乳巖失營

癰癤等證

當歸 白芍 白朮 茯苓

柴胡 甘草 薄荷

右薑水煎服

千金葶藶湯 治肺癰

葶藶 苡仁 桃仁 瓜瓣

陳氏牛旁子散 治乳癰乳疽結腫疼痛無論新久但未成膿者服之

牛旁子 陳皮 山梔 銀花

甘草 黃芩 花粉 連翹

瓜蒌仁 角刺 柴胡 青皮

水煎加酒一杯服

石膏散 治陽明風熱頭痛或孕婦乳房結

核

石膏 川芎 白芷 等分

湯科心得集 李時珍石膏散治陽明風熱頭痛方

石為末每服四錢茶調下

陳氏托裏消毒湯 治癰疽已成不得內消者宜

服此以托之

人參 川芎 白芍 黃芪

當歸 白朮 茯苓 白芷

金銀花 皂角刺 甘草 桔梗

延壽丹 治小兒臍風

貝母 白芷 苡仁 車前子

川連 赤芍 木通 山梔

金匱牡丹皮湯 治過癩脉遲而緊未成膿當服此以下其血

大黃 芒硝 丹皮 桃仁

瓜子仁

岐天師 七味神聖湯 治騎馬癱

金銀花 蒲公英 人參 當歸

甘草 大黃 花粉

黃芪柴胡湯 治陰包毒

黃芪 柴胡 丹皮 牛膝

傷科心得集 治癩癧癰疽疔毒 方集

丹參 黃芩 荆芥 防風

山梔

雞子大黃丸 治毒濁下疳

錦紋大黃 一兩切片 晒乾研

用雞子雄七枚搗丸分三服每日空心燒酒下

陳氏涼血消風散 治風濕浸淫血脉致生瘡疥

搔痒無度及大人小兒風熱癢疹遍身雪片斑點

乍有乍無並効

當歸 生地 防風 蟬脫

知母 苦參 胡麻 荆芥 蒼朮 石膏 甘草 木通

牛旁子

水煎服

陳氏神應養真丹 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左癱右換半身不遂手足頑麻言語蹇澀氣血凝滯遍身疼痛者並服

當歸 川芎 白芍 天麻

羌活 熟地 木瓜 鬼絲子

傷科心得集 治癩癧癰疽疔毒 方集

右為末入地黃膏加蜜丸每服四錢空心鹽湯下

四苓散 治同五苓

卽五苓去桂

萬應膏 卽萬靈膏

口疳藥 詳冰青散內

殺疔藥 詳冰青散內

化膿生肌膏 卽應卽應用膏

夾紙膏 卽十層膏

國老散 卽用甘草一觔為末每服三錢酒下

隔蒜灸法

用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之五壯換蒜或三五十壯或至百壯未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換其痛者灸至不痛不痛者灸至痛灸後仍服托裏之劑

神燈照法

雄黃 硃砂 血竭 沒藥 麝香 各一分

湯科心得集

湯科心得集 卷七 方集

右研末用綿紙捲為粗撚約長尺許每撚中入藥三分以真麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外周圍徐徐照之以漸將撚收入瘡口更須將撚猛向外提以引毒氣出外自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡勢漸消可漸減之隨後用敷藥

桑枝灸法

治諸瘡毒堅而不潰潰而不腐新肉不生疼痛不止用桑枝燃着向患處灸之火盡再換灸至片時為度

家用膏丹丸散方

目錄

- 紅昇丹 白降丹
- 應用膏 萬靈膏
- 內傷膏 紫金膏
- 肉桂膏 紫霞膏
- 白玉膏 玉紅膏
- 干槌紅玉膏 干槌綠雲膏
- 十層膏 麻黃膏
- 湯科心得集 家用膏丹丸散方目錄
- 玉樞丹 黎洞丹
- 梅花點舌丹 西黃化毒丹
- 痧餘化毒丹 痘後化毒丹
- 猴疔化毒丹 紫金錠
- 八將丹 八寶丹
- 十寶丹 生肌散
- 珍珠散 神妙生肌散
- 冰礪散 冰青散
- 珠黃散 珠寶散

陽鐵箍散

陰鐵箍散

日用應酬固藥

四黃散

紫靈散

五香丸

萬消化堅丸

化堅丸

八反丸

五龍丸

洞天救苦丹

虎潛丸

九龍丸

分清泄濁丸

廣毒至靈丹

增製史國公藥酒方

却病延年藥酒

太乙丹

瘍科心得集

家用膏丹散方 目錄 二

塘棲痧藥方

諸葛行軍散

和傷末藥

大麻瘋方

治瘋酒藥方

治瘋丸藥方

白癩瘋搽藥

退管丸藥

家用膏丹丸散方

紅昇丹 一名三仙丹 一切瘡瘍潰後拔毒去腐

生新長肉瘡口堅硬肉黯紫黑用丹少許鷄翎掃

上立刻紅活外科若無昇降二丹焉能立刻奏效

水銀 二兩 鎗硝 二兩 白明礬 二兩

先將硝礬研碎放於鐵鍋內中開低窩以水銀傾

入窩內將硝礬蓋之用磁碗蓋合以綿紙擦條捺

碗口再以鹽泥封固後將黃沙壓住碗旁露出碗

底以新綿花着碗底內用鐵磚壓上先用文火一

煬科心得集 紅昇丹 白降丹 一 家方

炷香烘煬硝礬次用武火二炷香看碗底內棉花

焦黑為度如不焦再煉半炷香取下冷開刮下之

丹磁瓶貯之退火用 一方有皂礬雄黃硃砂約

各一兩名大昇丹力量尤大

白降丹 凡癰疽無名大毒每用少許瘡大者用六

七厘小者用二二厘水調敷瘡頭上初起者立刻

起洩消散成膿者腐肉即脫拔毒消腫誠乃奪命

金丹也

水銀 二兩 火銷 二兩 白礬 二兩 白朮 五錢

食鹽一兩 石膏三錢 礪砂三錢 皂礬一兩

用陽城罐一隻放微火上徐徐挑藥入罐化盡微火逼令極乾所謂陰昇之法全在此刻如火大則汞先飛走如不乾則藥必倒塌無用其難如此結胎後以瓦盆二只盛水半盆將粗官碗一只覆合於水內碗底上以三寸盆仰放後再以陽城罐倒合於盆內用好棉紙截寸許潤以罐子泥草鞋灰光粉三樣研細以鹽滷汁和練極熟於罐口合緊一層泥二層紙糊五六層候乾再將醬缸蓋量

瘍科心得集

白降丹

二

家方

陽城罐之大小中鑿一洞套於罐之半腰恰蓋着於盆口上外用新瓦三片鐵絲紮緊如烟通罐樣入炭用武火二炷香其丹即降於盆內退火冷開即名白雪丹

降藥之神不假刀砭一伏時便見功效勝於刀針之險多矣

上降藥法 癰疽初起堅硬未成膿者用水調一二厘塗於瘡頂上不可貼膏藥少頃即起一泡挑破出水自消 已成而內膿急脹按之隨手而起

者此膿已熟矣用水調一二厘點正頂上以膏貼之一伏時大膿自洩不假刀針 如陰疽根脚走散瘡頭平陷即用降丹七八厘或分許水調掃於瘡頭堅硬處次日即轉紅活便是吉兆 如瘡毒內膿已成久不穿潰者只要出一小頭怕頭出過大可用綿紙一塊量瘡大小中剪一孔以水潤貼瘡上然後調降藥點放紙孔內揭去紙以膏貼之則所降之頭不致過大若瘡小藥大反令痛傷胃口嫩及良肉不可不知

瘍科心得集

白降丹

三

家方

白降丹點在瘡毒上即追蝕毒氣有幾分深必追至病根方止所以點後疼痛非常若內膿已脹皮殼不厚點之便不十分痛楚有用蟾酥化汁調白降丹用其疼稍減

水煉降藥法 新煉出白降丹研細用元色緞五寸將降藥篩勻緞上捲緊以麻線捆紮極緊放瓦罐內清水煮約一伏時內換水三次將緞卷取起掛風處陰乾然後打開以鷄翎掃下磁瓶收貯片治癰疽用之並無痛楚

應用膏

治疔疽流注腿癰穿潰者用此

當歸 連翹 白芨 白芷

大黃 山梔各八錢 官桂二錢 蒼朮

羌活 天麻 防風 黃芪

荆芥 川甲 甘草 羌花各六錢

方八 葶藶子 小生地各一兩

用真麻油十觔入藥文武火熬枯濾去渣再熬至

滴水成珠稱每觔淨油春秋下潤淨東丹五兩冬

四兩夏六兩收成膏後下乳香沒藥末各一二兩攪

瘍科心得集

應用膏

四

家方

勻攤用

萬靈膏 治一切無名腫毒未成即消已成即潰

並治一切寒濕之證

生地 歸身 川芎 蒼耳子

大戟 尖椒 甘菊 蒲公英

生大黃 土槐皮 羌活 獨活

紅花 川烏 草烏 赤芍

紫草 香附 川椒 番木鱉

桂枝 狗脊 澤蘭 申薑

胡椒 附子 牙皂 白附子

荆芥 金銀花 黃柏 山慈姑

生首烏 全虫 元胡 蠶蚕

百部 南星 白疾藜 山甲

白芷 白芥子 花粉 益母草

蛇床子 川牛膝 黃芪 大楓子肉

細辛 苦參 龜版 桑寄生

升麻 黃芩 胡麻 杜苧蒲根

冬瓜皮 天麻 楊樹鬚 鬧楊花

瘍科心得集

萬靈膏

五

家方

黃草以上各五錢 土茯苓一兩

用香油八觔將前藥入油加嫩桑枝二三觔熬藥

至枯濾去渣入後藥

松香四兩 朴硝 雄黃 桂圓核灰

皂礬 牛皮灰 樟水各五錢 麝香三錢

冰片三錢 龍骨五錢 再入東丹三觔收成膏

內傷膏 治內傷腰疼足痠寒濕流筋絡流注鶴

膝麻痺等證

毛鹿角切 烏藥八兩 紅花一兩 全當歸切 二錢

木瓜 一兩 上官桂 二兩 申薑 二兩 秦艽 二兩

老鶴草 二兩 離鄉草 三兩 虎骨 二兩 商陸 三兩

用麻油十觔浸藥二十一日煎枯濾去渣離火入

淘淨飛丹六觔收成膏再入肉桂 未二兩 乳香 沒

藥末各二兩麝香二錢攪月用紅布或青布攤貼

紫金膏 治痰核瘰癧

官桂 六兩 生地 十二兩 秦艽 五兩 羌活 三兩

黃芩 二兩 防風 三兩 木通 三兩 川連 一兩

當歸 九兩 木瓜 六兩 白朮 三兩 方八十二

房科心得集 紫膏 六 家方

鱉甲 六兩 白芷 三兩 遠志 二兩 大蜈蚣 十五

丹參 五兩 紫草 十二兩 毛慈菇 五兩 生甲片 一兩

血餘 五兩 茜草 六兩 商陸根 三觔

右藥俱切不切碎

加柳枝 五兩 桃枝 五兩 棗枝 五兩 桑枝 五兩

槐枝 五兩

用真麻油二十觔將前藥浸十日熬枯去渣用淨

飛丹十五觔炒透收膏再下明乳香 去油 研 沒藥

去油 研 五兩

肉桂膏 治一切寒濕痺痛乳痰乳癰瘰癧等證

川烏 草烏 海藻 當歸

甘草 白芨 甘遂 白芷

細辛 芫花 半夏 肉桂

紅花 大戟 虎骨 麻黃 一兩

五倍子 兩

用麻油二觔青油一觔五兩入藥煎枯去渣下淨

東丹炒一觔收成膏再下乳香去油研沒藥去油

研各一兩寸香研五錢百草霜一兩攪勻用紅布

瘍科心得集 肉桂膏 紫膏 白芷 七 家方

攤貼

紫霞膏 治老年結毒穿潰不斂

嫩松香 六兩 糠青 研二兩 乳香 去油 研 沒藥 去油 研 各五錢

用麻油六兩熬至滴水成珠下松香再煎二三十

沸下糠青再熬自有紫色離火下乳香沒藥

白玉膏 治濕毒瘡白泡癰瘡漫傷等收濕生肌長

肉甚效

鮑魚 大者 鉛粉 一觔 輕粉 五錢 象皮 一兩

真珠 研三錢

用麻油一觔入鮑魚煎至枯瀝去骨再煎一二十沸離火少頃然後下鉛粉輕粉象皮末珍珠末攪勻成膏

玉紅膏 去腐生新此外科收斂藥中之神方也

白芷 二錢 甘草 一兩 歸身 二兩 瓜兒血 兩

輕粉 各四錢 白占 二兩 紫草 五錢

用麻油一觔先將白芷歸身甘草紫草四味入油熬枯瀝去渣復煎滾下血竭化盡次下白占微火

亦化退火下輕粉攪勻傾入磁罐內聽用凡用藥

瘍科心得集

毒膏 毒膏 毒膏

八 家方

將牙簪挑藥施於瘡頂上以膏蓋之

干搥紅玉膏 治濕毒流注無名腫毒未經穿潰者

草麻子 去殼 松香 熬四兩 南星 研五錢 半夏 研五錢

乳香 去油 五錢 沒藥 去油 五錢 銀硃 七錢 八

搗成膏者老嫩以草麻肉增減用布攤貼

干搥綠雲膏 治痰核甚效

草麻子 去殼 松香 熬四兩 海藻 炙研 昆布 炙研 五錢

南星 研五錢 半夏 研五錢 杏仁 五錢 糠青 研一兩

搗成膏

一方有乳香沒藥各五錢

十層膏 治年久新起腫瘡已經去腐生肌長肉神效

黃芩 黃柏 白芷 各二錢 乳香 去油 研

沒藥 去油 研 血竭 研三錢 黃占 一兩 白占 五錢

輕粉 研一錢 血餘 錢 象皮 炙研 密陀僧 研一兩

珍珠 研一錢

用麻油十兩先將芩柏芷三味入油煎枯瀝去渣

次下血餘煎枯去血餘再下黃占白占溶化然後

瘍科心得集

十層膏 麻黃膏

九 家方

下乳沒血竭陀僧輕粉象皮珍珠末攪勻將皮紙

一張分作六小張以一張染膏提出攤於檯上用

手兩面泥勻再持一張染膏如前法攤在前一張

上共作十層如遇腫瘡將此膏依瘡大小剪下紫

於瘡上一口揭去一層紫完瘡愈極妙神方也

麻黃膏 治牛皮血癬瘡枯血燥遍體發癩發痒

川連 黃芩 黃柏 紫草

麻黃 各一錢 小生地 三錢 班毛 七枚

用雄豬板油十兩將上藥熬枯瀝去渣入黃蠟一

兩白蠟五錢煇化再入草麻子肉大楓子肉各三錢搗爛如泥調和離火俟半冷後入

雄黃 三錢 樟冰 二錢 生礬 三錢 五倍子 二錢

輕粉 一錢 銅青 二錢 東丹 二錢 金底 二錢

研細調勻磁碗收貯不時類瘡

玉樞丹 治一切無名腫毒

山茨菇 有毛者淨洗焙乾 川五倍 鹽水內焙乾

紅牙大戟 去蘆根洗淨焙乾 大硃砂 水飛

明雄黃 水飛 麝香 三錢

瘍科心得集

千金子 去殼包種油炒

各研極細用糯米粥打和分作四十九丸凡遇無名

腫毒或酒或米飲下一丸外卽以清水磨塗神效

黎洞丹 治一切跌打損傷並可磨塗諸腫

血竭 研末 牛黃 一錢 阿魏 三錢 天竺黃 三錢

兒茶 三錢 三七 三錢 藤黃 一錢 五倍子 三錢

乳香 去油 沒藥 去油 山羊血 五錢 千金子 去壳油 三錢

硃砂 二錢 水片 一錢

共研極細末糯米糊丸金箔爲衣每丸重一錢陳

酒送下一丸

梅花點舌丹 治無名腫毒未成卽消已成卽潰

蟾酥 一錢 熊胆 一錢 牛黃 三分 麝香 三分

雄黃 三錢 血竭 三錢 硼砂 一錢 葶藶子 三錢

沉香 一錢 乳香 去油 沒藥 去油 冰片 三錢

硃砂 三錢

共研極細末卽將蟾酥熊胆酒化搗丸辰砂爲衣

每服三分葱頭湯送下

一方加蝸牛輕粉胆礬銅綠

瘍科心得集

西黃化毒丹 治疔疽火毒內陷神識模糊不醒人

事者

西黃 一分 眞珠 三分 血珀 五分 胆星 三分

辰砂 三分

共爲細末均作三服燈心湯下

瘍餘化毒丹 治疔疽餘火未清艱於收口難斂者

以此化之

滴乳石 一錢 西黃 一分 眞珠 四分 天竺黃 六分

陳胆星 一錢 血竭 一錢 川連 五分 硃砂 一分

右為末加燈心灰四分每服三分金銀花湯下

痘後化毒丹 治痘證後餘毒未結遍體發癩者

西黃一分 藥珠三分 血珀五分 燈心灰二分

胆星三分 冰片一分 天竺黃三分 甘草人中黃五分

共為細末每服三分金銀花露調下

猴疔化毒丹 治幼孩遍體胎火胎毒臂赤無皮音

啞鼻塞或赤遊丹毒

真珠三分 血珀五分 飛滑石八分

右為末每服三分乳汁調下

瘍科心得集

家方

紫金錠 治一切風水腫毒

大黃一兩 降香屑五錢 山茨茹三錢 紅牙大戟五錢

南星五錢 生半夏五錢 雄黃三錢 麝香三分

乳香三錢 沒藥三錢

共研極細末以藕糊打丸撚錠子鮮菊葉汁磨敷

八將丹 一切疽毒不起疔毒不透腐肉不脫用此

提毒化毒甚妙

西黃三分 冰片三分 蟬退七枚 大蜈蚣七條

麝香三分 山甲片七個 全虫七個 五倍子三錢

瘍科臨證心得集 家用膏丹丸散方

其為細末用少許摻於瘡頂上以膏蓋之

八寶丹 收口生肌長肉

珍珠五分 血珀五分 煨心全象皮一錢 龍骨一錢

辰砂一錢 乳香五分 沒藥五分 白芷一錢

共乳極細磁瓶密貯待用

十寶丹 又

琥珀五分 珍珠三分 乳香五分 沒藥五分

象皮五分 血竭五分 兒茶五分 龍骨一錢

辰砂五分 麝香一分

瘍科心得集

家方

其為極細末密貯待用

生肌散 又

珍珠一錢 生研象皮一錢 白蠟一錢 兒茶一錢

輕粉五分 鉛粉五分 大冰片一分 瓜兒竭一錢

乳香一錢 沒藥一錢

其乳極細末先用豬蹄湯或濃茶洗淨用少許摻

之

珍珠散 止痛生肌收口

珍珠主研三錢 蘆甘石煨一兩

石羔 在童便內浸四十九日切晒夜露不可經雨煨研一兩五錢

其為極細末摻之

神妙生肌散 餘腐未盡而不收口者用此

赤石脂 兒茶 海螵蛸 血竭

黑鉛 各一錢 硃砂 生肌在此 乳香 沒藥 各二錢

輕粉 三分

先將黑鉛加水銀一錢全煎化再將前藥研細入於鉛汞內研極細摻之

冰硼散 一名金丹 吹喉間腫痛或蛾癰

瘍科心得集

神效生肌散 冰硼散 諸書

十四 家方

硼砂 二錢 風化霜 二錢 僵蚕 炙三錢 薄荷葉 一錢

生礬 一錢 冰片 五分 滴乳石 三錢 人中白 煨三錢

其研極細磁瓶收貯

風化霜法 將嫩黃瓜一條挖去穢以銀硝研細

納入掛於簷下透風處三日後瓜皮上自有白霜

鈎出拭下以磁瓶收貯待用

水青散 一名碧丹 吹口糜疔腐及爛頭喉蛾喉

痺喉疔喉癰

川連 兒茶 青黛 煨心灰 各三分

西黃 二分 冰片 三分 人中白 煨五分

證重者加珍珠

如痧痘後牙齦出血或成走馬疔毒加練青五倍

子白芷末

珠黃散 治爛喉疔腫腐湯水難入者并治遠年爛

喉結毒腐去蒂丁及幼孩口疳口糜等證

西黃 一分 大硃砂 一錢 珍珠 三分 上滴乳石 一錢

月石 一分 寸香 三分 雄精 一錢 兒茶 一錢

大梅片 二分 人中白 煨一錢

瘍科心得集

珠黃散 諸書

十五 家方

先將珠研極細後八餘藥俱研極細磁瓶收貯勿

令洩氣

珠寶散 治火燙灼傷腐爛不堪者

珍珠 三分 西黃 一分 鉛粉 五分 蜜陀僧 二錢

熟石羔 一錢 冰片 一分 大黃 三錢 寒水石 三錢

甘草人中黃 三分

其為極細末用鷄子清調敷如濕爛無皮者乾摻

陽鐵簾散 此方遇陰證用之

細辛 半觔 川烏 半觔 草烏 半觔 官桂 半觔

白芥子 四兩 川椒 三兩 降香末 一兩 陳小粉 十兩

生半夏 四兩 生南星 四兩

用葱頭汁調敷四圍使不走散

陰鐵種散 此方遇陽證用之

降香末 半升 大黃 三兩 乳香 四兩 赤小豆 三升

沒藥 四兩 黃芩 八兩 方八 一兩 生南星 四兩

山茨菇 四兩 陳小粉 十兩

用罾醋調敷四圍

日用應酬圍藥

瘍科心得集

陰鐵種散 日用圍藥 四黃散

十六 家方

生南星 半兩 生半夏 四兩 當歸 四兩 大黃 四兩

陳小粉 十兩

火盛者用芙蓉葉汁寒盛者用葱頭汁調敷

四黃散 治一切白泡痛瘡濕瘡坐板燙火等瘡

大黃 二兩 黃柏 一兩 黃芩 一兩 川連 五錢

尖板榔 兩 老松香 兩 熟石羔 三兩 厚朴 一兩

寒水石 兩

共為細末香油調搽

紫靈散 治一切疥癩瘋癬搔癢難忍諸瘡證

瘍科臨證心得集 家用膏丹丸散方

牛烟膏 一兩 松香 二兩 淨東丹 五兩 黃芩 四兩

黃柏 四兩 樟冰 二兩 尖板榔 三兩 西丁 二兩

明礬 八兩 銅坭 三兩 生大黃 四兩

共為末用蒜油調搽

五香丸 治疥癩頑癬肥瘡坐板瘡血熱等瘡

杏仁 三兩 升藥底 一兩 花椒 五錢 樟冰 五錢

大黃 一兩 蛇床子 一兩 黃柏 一兩 西丁 三兩

大楓子肉 三兩

共研細末將楓子肉杏仁研和再加油胡桃雄猪

瘍科心得集

紫靈散 五香丸 萬消化堅丸

十七 家方

板油搗和為丸如茨實大遇疥瘡頑癬用夏布包

藥搽之

萬消化堅丸 治癰疽腫毒立見奇功 孕婦忌服

方八 兩 芫花 五錢 甲片 二兩

川烏 五錢 草烏 五錢 乳香 三錢 沒藥 三錢

當歸 二兩 延胡 二兩 全虫 二兩

共為細末麵糊丸如梧子大每朝服十四丸陳酒

送下

化堅丸 治肝經帶火乳痰乳癰及頸項失營馬刀

鬱痰癱核

大生地

四兩

酒炒

川芎

二兩

酒炒

當歸

二兩

酒炒

丹參

二兩

酒炒

花粉

二兩

香附

二兩

醋炒

半夏

鬱金

二兩

青皮

二兩

橘核

三兩

沉香

五錢

研

茯苓

二兩

刺藜

延胡

二兩

炒

柴胡

五錢

蘇梗粉

共為末煉蜜丸每朝服五錢陳酒送下

八反丸 治痰核癭瘰

湯科心得集

卷九 八反丸 五龍丸

本

家方

桂心

甘遂

細辛

歸身

半夏

甘草

白芷

芫花

海藻

紅花

全虫

牙皂

虎骨

白芨

川烏

薑汁製

草烏

薑汁製

各一兩

右各炒為末用核桃肉泡去皮四兩烏梅淨肉一

觔蒸爛明礬末八兩量加棗肉共搗為丸每服三

錢清晨夏枯草湯下

五龍丸 治流注腿癱之半陰半陽者服之未成即

消已成即潰併治魚口便毒

山甲

土拌

全虫

酒拌

槐米

炒

土貝母

研各

等分

右為末麵糊搗丸每服三錢陳酒送下

洞天救苦丹 治乳痰乳癖未成岩者

經霜棟樹子

炒二

兩

白芷

焙一

帶子蜂房

炙一

兩

頭尖

二兩

右為末每服二錢沙糖調陳酒送下

如無經霜棟樹子以川棟子代之如無帶子蜂房

以蜈蚣七條代之

湯科心得集

卷九 洞天救苦丹 九龍丸

本

家方

虎潛丸

治陰寒鶴膝瘋

西土

薑腐煮

一炷香

血竭

等分

右為末麵糊搗丸每服五分陳酒送下

九龍丹

瀉一切下疳魚口便毒

毒瘡

廣痘

初起

乳香

去油

沒藥

去油

江子肉

血竭

兒茶

各三

錢

共為末生蜜搗丸如梧子大空心陳酒送下七丸

或九丸服後不可食物俟瀉三五次後然後食飯

併肉以補之

分清泄濁丸 治肝經濕火淋濁管痛小便不利併

治下疳濕爛火盛者

生大黃 切晒乾

西珀 鎊同燈心

共研和用鷄蛋清雄頭七枚搗丸均作三日服空

心燒酒送下服後一時許小水如金黃色

廣毒至靈丹 治廣痘毒癰梅瘡透頂下疳結毒

生大黃 晒研

生川連 晒研

廣珠 五錢

黃芩 鹽水炒

硃砂 三錢

百步 鹽水炒

瘍科心得集

治寒濕流經歷節風痺

家方

核桃夾 鹽水炒

肥皂夾灰 二兩

血餘 二兩

骨餘 土拌炒

陳酒泛丸每日朝三錢夜二錢陳酒送下不吃酒

夏枯草湯送下

增製史國公藥酒方

治寒濕流經歷節風痺

桂枝

秦朮

防風

牛膝

草薢

當歸

虎骨

川芎

川斷

杞子

紅花

鱉甲

白茄根

稀莖草

老松節

五靈脂

嫩桑枝

樟木

杜仲

狗脊

獨活

苡仁

蚕沙

五加皮

薑黃

甘草

槐枝

蒼耳子

川烏

草烏

柳枝

海風藤

先將燒酒浸五日後再入陳酒浸煮不拘時飲之

却病延年藥酒 治脫力勞傷

大生地

當歸

紅花

烏藥

劉寄奴

木香

赤芍

丹參

淮山藥

川斷

白芷

羌活

瘍科心得集

却病延年藥酒本方

家方

骨碎補

落得打

甘草

牛膝

枳殼

丹皮

破故紙

石蘭

五加皮

白朮

木瓜

秦朮

威靈仙

白芍

蘇子

川芎

虎骨 炙

葛根

延胡

自然銅 煨

青皮

木通

杜仲

花粉

將陳酒浸煮不拘時服

太乙丹 治一切痧證山嵐瘴氣暑氣惡心肚腹

疼痛等證

廣木香一錢 麝香三分 丁香一錢 茅朮去皮毛一錢
 沉香一錢 西黃三分 雄黃二分
 右為極細末將熊胆一錢二分蟾酥一錢燒酒浸
 溶化搗藥為丸如梧子大硃砂為衣

唐棲痧藥方 治同前

茅朮三兩 大黃六兩 丁香六錢 麻黃三兩
 天麻三兩 寸香三錢 蟾酥九錢 甘草四錢
 雄黃三兩 辰砂三兩

共為極細末將蟾酥燒酒化搗藥為丸梧子大硃

瘍科心得集 唐棲藥方 痧氣散 楊乘 三 家方

砂為衣

諸葛行軍散 治一切肚腹疼痛惡心嘔吐身體

煩暈脹滿等證

硃砂五錢 雄黃一兩 月石三錢 鎔硝三錢
 寸香五分 冰片五分 西黃三分 飛金五十張

右共為細末磁瓶收貯每遇痧證用少許噴鼻

和傷末藥 治跌打損傷閃氣腰疼傷筋傷骨

歸尾 延胡 紫荊皮 大茴香

川烏薑汁炒黑 草烏薑汁炒黑 甘草節 自然銅煅

紅花炒 蒲黃 丹參 五靈脂陳酒飛
 甘松 山柰 砂仁
 右各二兩研末每服一錢五分重者二錢輕者一
 錢陳酒調即以酒送下盡醉為度至重之傷三服
 可愈

大麻瘋方

鎮江丁叅領染瘋疾得此秘傳治之全愈又以醫
 治多人無不取效如神但患此證者眉毛若盡脫
 落即屬難治如眉毛未脫雖手足骨節有塌損皆

瘍科心得集 大麻瘋 三 家方

可取效若初起未深之證百試百驗先服湯藥四
 劑每日一劑服完再吃丸藥

湯藥方

陳皮 白芷 苦參 天麻
 秦艽 川斷 防風 荆芥
 羌活 風藤 苡仁 牛膝
 當歸 海桐皮 蒼朮 木香
 桂枝 連翹 甘草各一錢 黑棗二枚
 生薑片 水二碗煎至一碗服渣再煎二次服

丸藥方 每丸藥一錢加楓子膏春秋八厘

夏六厘冬一分

大胡麻一斤 小胡麻一斤 牛膝四兩 白蒺一斤

苦參一斤 防風各八兩 當歸六兩

苡仁四兩 蒼朮六兩 川斷四兩 近加小生地八兩

共研細末水泛丸每日早午晚三服每服三錢或二錢照數加楓子膏熬圓攪和以毛尖茶送下

楓子膏方

大楓子去壳取仁銅鍋內炒至三分紅色七分

瘍科心得集

家方

黑色為恰好如太過無力不及傷眼炒後研成

細膏如紅沙糖一樣用銅杓盛向火上熬四五

滾倒在紙上放於土地下以物蓋之待用如上

面有霉拭去依法用百日內切忌房事切忌食

鹽犯之不效並忌食醬醋酒一切鷄魚發風動

火等物

治瘋藥酒方

能治一切瘋證

當歸五錢 大胡麻一斤 杞子五錢 防風五錢

草薺五錢 白芍五錢 丹參七錢 海風藤五錢

瘍科臨證心得集 家用膏丹丸散方

香加皮五錢 荊芥五錢 杜仲五錢 牛膝一兩

川芎五錢 赤芍五錢 甘草三錢 白芷三錢

真茅朮五錢 生地二兩 黃柏三錢 巴戟一兩

秦艽一兩 桑枝四兩

先用滴花燒二觔先浸一日後加原陳酒十五觔

冰糖四兩核桃肉八兩紅棗四兩猪板油八兩用

大口瓶一個以麻布袋將各藥放入袋內紮緊類

糊封瓶口浸三日再隔湯煮二炷香為度退火三

日早晚服酒一杯

瘍科心得集

治瘋藥方

家方

治瘋丸藥方

大胡麻四兩 苦參二兩 羌活二兩 石菖蒲二兩

蜀活二兩 白附子二兩 防風二兩 葳靈仙二兩

白歸身二兩 粉甘草二兩

各藥炮製稱准磨極細末用酒糊為丸每日清晨

稱准服二錢陳酒送下

白癩搽藥方

白芨三錢 陀僧二錢 雄黃二錢 白附子五錢

硫黃二錢 硃砂二錢 雌黃五分 原寸香三分

頂梅片三分

其研極細末用生薑蘸擦之

退管丸藥

炙蜂房 研一兩 五錢

真象皮 炙黑研 二兩

粉兒茶 研四兩

猪脚壳 炙黑一兩 五錢

明乳香 去油研一兩 五錢

刺猬皮 炙黑一兩 五錢

生人脫 浸晒炙黑 研二兩

胡連 焙四錢

黑沒藥 去油一兩 五錢

生礬 研二兩

象牙屑 焙黃研 六兩

瓜血竭 研四兩

湯科心得集

退管丸藥

表

家功

右為細末煉蜜黃蠟溶化打糊丸梧子大空心每服三錢陳酒送下

嘉慶己巳仲春鑄

景岳新方歌

盡心齋藏板

新方歌括序

景岳之有新方誠純粹以精者也補和攻散寒熱因
因八陣之設悉依編次古方之法窺其製方用藥之
意有足與古方相表裏而并發前人所未及者所以
業醫者莫不潛心體玩奉以為宗幾等於肘後千金
俱為枕中之秘矣顧方計以累百博聞之下強記頗
難余因仿汪訥菴先生古方歌括之例而以韻語編
之方係以歌脩載諸藥兼述治療使當日用意精深
處顯然共明雖語愧不文未免貽譏謗陋然足為從
事景岳者闡其易簡之路若熟讀是歌而能提綱挈
領觸類旁通於以應變無窮博施濟眾庶無負仁人
之術云爾是為序

嘉慶歲次己巳孟春之吉錫山吳辰燦題

景岳新方歌括目錄

補陣

大補元煎

左歸飲 附左歸丸

右歸飲 附右歸丸

五福飲 附七福飲

一陰煎

加減一陰煎

二陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

夫營煎

小營煎

補陰益氣煎

舉元煎

兩儀膏

貞元飲

當歸地黃飲

濟川煎

地黃醴

歸腎丸

養化血餘丹

養元粉

玄武荳

蟠桃果

王母桃

休癯飲

和陣

六安煎

金水六君煎

苓朮二陳煎

和胃二陳煎

苓朮二陳煎

和胃飲

排氣飲

大和中飲

小和中飲

大分清飲

小分清飲

解肝煎

二木煎

廓清飲

掃虫煎

十香丸

芍藥枳朮丸

蒼朮丸

括痰丸

貝母丸

神香散

攻陣

景岳新方歌

目錄

二

吐法

赤金荳

太平丸

敦阜丸

獵虫丸

百順丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂飲

大溫中飲

柴陳煎

柴苓煎

柴苓飲

柴胡白虎煎

歸葛飲

走馬通聖散

柴葛煎

歸柴飲

寒陣

保陰煎

抽薪飲

徙薪飲

大分清飲

清流飲

化陰煎

茵陳飲

清膈煎

化肝煎

安胃飲

景岳新方歌

目錄

三

玉女煎

太清飲

綠豆飲

玉泉散

雪梨漿

滋陰八味丸

約陰丸

服蠻煎

約營煎

熱陣

四味回陽飲

六味回陽飲

理陰煎

養中煎

溫胃飲

五君子煎

六味異功煎	胃關煎
佐關煎	柳扶煎
四維散	鎮陰煎
歸氣飲	煖肝煎
壽脾煎	三氣飲
五德丸	七德丸
復陽丹	黃芽丸
一炁丹	九炁丹
溫臟丸	聖米煎
景岳新方歌 目錄 四	
固陣	固陰煎
秘元煎	惜紅煎
兔絲煎	固真丸
苓朮兔絲丸	鞏隄丸
玉關丸	
敦阜糕	
因陣	
逍遙飲	決津煎
五物煎	調經飲

通瘀煎	胎元飲
固胎煎	涼胎飲
滑胎煎	殿胞煎
脫花煎	九蜜煎
清化飲	毓麟珠
養育丹	柴歸飲
疎邪飲	涼血養營煎
柴葛煎	搜毒煎
六物煎	六氣煎
景岳新方歌 目錄 五	
九味異功煎	透邪煎
牛膝煎	何人飲
追瘡飲	木賊煎
牙皂散	荔香散
外癩傷寒結胸法	連翹金貝煎
連翹歸尾煎	桔槔杏仁煎
當歸蒺藜煎	芍藥蒺藜煎
螻蛄散	腸癰秘方
槐花蕊	金露散

二辛煎

冰玉散

冰白散

代匙散

三香散

二十四味敗毒散

景岳新方歌

目錄

六

景岳新方歌

表弟高秉鈞錦庭

錫山吳辰燦鶴山公纂

同學姚志仁體元

補陣

大補元煎為首尊人參熟地草薹存杞歸杜仲兼山藥氣血俱傷妙可吞

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊

景岳新方歌

大補元煎

補陣

化救本培元第一要方 本方與右歸飲出入互用

人參 熟地 山藥 山茱萸

杜仲 當歸 枸杞 炙甘草

如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之 如氣分偏虛者加黃芪白朮如胃

口多滯者不必用 如血滯者加川芎去山茱萸

如滑泄者加五味故紙之屬

左歸飲 萸地藥苓叢杞草齊成壯水功若便為丸散

茯苓更加龜鹿二膠同兔絲牛膝還宜用精血能充
效莫窮

此壯水之劑也凡命門陰衰陽勝者宜此方加減
主之

熟地 茯苓 炙甘草

枸杞 山藥 山茱萸

如肺熱而煩者加麥冬血滯者加丹皮 心熱而

躁者加玄參 脾熱易饑加芍藥 腎熱骨蒸多

汗者加地骨皮 血熱妄動者加生地 陰虛不

寧者加女貞子上實下虛者加牛膝以導之 血

虛而燥滯者加當歸

於本方去茯苓甘草加兔絲子牛膝龜膠鹿角膠

名三歸丸 治真陰腎水不足不能滋養營衛漸

至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不

歸原或虛損傷陰或遺淋不禁或氣虛昏逆或眼

花耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津

液枯涸等證俱速宜壯水之主以培左腎之元陰

而精血自充矣宜此方主之 如真陰失守虛火

左歸飲

補陣

炎上者宜用純陰至靜之劑於本方去枸杞鹿膠
加女貞子麥冬 如火燥肺金乾枯多嗽者加百
合 如夜熱骨蒸加地骨皮 如小水不利不清
加茯苓 如大便燥結去兔絲加肉蓯蓉 如氣
虛加人參 如血虛微滯加當歸 如腰膝痠痛
加杜仲鹽水炒用 如藏平無火而腎氣不足者
加破故紙去心蓮肉胡桃肉龜膠不必用 凡五
液皆主於腎故凡屬陰分之藥無不皆能走腎有
謂必須導引者皆見之不明耳

左歸飲

三

補陣

右歸飲 附桂兼山藥杞子地黃炙草膠杜仲山萸不
可缺益火之源效莫先若然除草鹿膠入絲子當歸
飲改圓

此益火之劑也凡命門陽衰陰勝者宜此方加減

主之 此方與大補元煎出入互用如治陰盛格

陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸

冷服之尤妙

熟地 枸杞 山藥 山茱萸

甘草 杜仲 肉桂 制附子

如氣虛血脫或厥或昏或汗或逆或虛狂或短氣者必大加人參白朮隨宜用之 如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑 如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之 如小腹多痛者加吳茱萸 如淋帶不止加破故紙 如血少血滯腰膝軟痛者加當歸

於本方去甘草加鹿膠克絲子當歸名右歸丸

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進或嘔惡

膨脹或翻胃噎隔或怯寒畏冷或臍腹多痛或大便不實瀉利頻作或小水自遺虛淋寒疝或寒侵

谿谷而肢節痺痛或寒在下焦而水邪浮腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不寧或四體不

收或眼見邪祟或陽衰無子等證俱速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣此方主之

如陽衰氣虛必加人參以為之主隨人虛實以為輕重蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入

陰分欲補命門之陽非加人參不能捷效 如陽

虛精滑或帶濁便澹加補骨脂酒炒用 如痰泄

腎泄不止加北五味子肉豆蔻麩炒去油用 如

飲食減少或不易化或嘔惡吞酸皆脾胃虛寒之

證加乾薑炒黃用 如腹痛不止加吳茱萸湯泡

半日炒用 如腰膝酸痛加胡桃肉連皮用 如

陰虛陽痿加巴戟肉肉苁蓉或加黃狗外腎一二

付以酒煮爛搗入之

五福飲庸五種藥當歸熟地人參着還宜朮草互相

需氣血皆虧五臟霍益以棗仁與遠志七福更治心

脾弱

凡五臟氣血虧損者五福能兼治之足稱王道之

最

人參 熟地 當歸

白朮 炙甘草

凡治氣血俱虛等證以此為主或宜溫者加薑附

宜散者加升麻柴葛左右逢源無不可也

本方加棗仁遠志名七福飲 治氣血俱虛而心

脾為甚者

一陰煎用生熟地芍藥麥冬甘草比再入丹參與牛膝水虧火勝稱神異

此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損而脉證多陽虛火發熱及陰虛動血等證或癱疾傷寒屢散之後取汗既多脉虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰水虧而然也皆宜用此方加減主之

生地 熟地 芍藥 麥冬

甘草 牛膝 丹參

景岳新方歌

一陰煎

六

補陣

如火盛躁煩者加入龜膠化服 如氣虛者間用

人參 如心虛不眠多汗者加棗仁當歸 如汗

多煩躁者加五味子或加山藥山茱萸 如見微

火者加女貞子 如虛火上浮或吐血或衄血不

止者加澤瀉茜根或加川續斷以澁之亦妙

加減一陰煎二地黃麥冬知母骨皮襄白芍炙草還

宜入火之甚者服尤良

治證如前而火之甚者宜用此方

生地 芍藥 麥冬 熟地

炙甘草 知母 地骨皮

如躁煩熱甚便結者加石膏 如小水熱澁者加

梔子 如火浮於上者加澤瀉或黃芩 如血燥

血少者加當歸

二陰煎治心經熱生地棗仁甘草列連麥元參與茯

苓木通嚮導方能泄

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂

失志多言多笑或瘍疹煩熱失血等證宜此主之

生地 麥冬 棗仁 生甘草

景岳新方歌

二陰煎

七

補陣

元參 茯苓 黃連 木通

引加曉心或竹葉亦可 如痰勝執甚者加九制

膽星或天花粉

三陰煎用人參草芍藥當歸熟地棗能治肝脾精血

虧管虛失血皆堪保

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等病故曰

三陰凡中風血不養筋及瘧疾汗多邪散而寒熱

猶不能止是皆少陽厥陰陰虛少血之病微有火

者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸 棗仁 人參

熟地 芍藥 炙甘草

如嘔惡者加牛薑汗多煩躁者加五味子 汗多

氣虛者加黃芪 小腹隱痛加枸杞 如腰膝筋

骨無力加杜仲牛膝

四陰煎 生地麥門冬百合沙參芍藥從甘草茯苓焉

可少清金保肺自從容

此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾

感津枯煩渴欬吐衄多熱等證

生地 麥冬 白芍 百合

沙參 茯苓 生甘草

如夜熱盜汗加地骨皮 如痰多氣厥加貝母阿

膠或天花粉亦可 如金水不能相滋而乾燥喘

嗽者加熟地 如多汗不眠神魂不寧加棗仁

如多汗兼渴加五味子 如熱甚者加黃柏鹽水

炒用或元參亦可但分上下用之 如血燥經遲

枯澁不至者加牛膝 如血熱吐衄加茜根 如

多火便燥或肺乾欬咯者加天門冬或加重便亦

可 如火載血上者去甘草加炒梔子

五陰煎用四君子藥芍地黃均可恃更兼扁豆補脾

虛還需五味為之使

凡真陰虧損脾虛失血等證或見溇泄未甚者所

重在脾故曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地 山藥 扁豆 炙甘草

人參 白朮 芍藥 五味子

茯苓 加蓮肉去心二十粒

大營煎 杜仲地黃推牛膝當歸炙草倍肉桂更同杞

子入陰虛血少此方該

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼

痛或氣血虛寒心腹疼痛等證

當歸 熟地 枸杞 炙甘草

杜仲 牛膝 肉桂

如寒滯在經氣血不能流通筋骨疼痛之甚者必

加制附子方效 如帶濁腹痛者加故紙炒用

如氣虛者加人參白朮 中氣虛寒嘔惡者加炒

焦乾薑

小營煎 性味本和平山藥地黃杞子并白芍當歸同

炙草補陰補血最堪烹

治血少陰虛此性味平和之方也

當歸

熟地

山藥

芍藥

枸杞

炙甘草

如營虛於上而為驚恐怔忡不眠多汗者加棗仁

茯神 如營虛兼寒者夫芍藥加生薑 如氣滯

有痛者加香附引而行之

補陰益氣煎

用歸身山藥人參炙草陳熟地升柴薑

數片陰虛外感效如神

此補中益氣湯之變方也治勞倦陰傷精不化氣

或陰虛內乏以數外感不解寒熱痰瘧陰虛便結

不通等證凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升

散無不神效

人參

當歸

山藥

熟地

陳皮

炙草

升麻

柴胡

引加生薑

舉元煎內重升麻白朮人參補氣嘉甘草黃耆俱用

炙氣虛下陷此方誇

治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等證有不利於

歸熟等劑而但宜補氣者以此主之

人參

黃芪

炙甘草

白朮

升麻

如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用 如兼滑

脫者加烏梅或文蛤

兩儀膏內用人參熟地倍增偏補陰桑火煎濃自蜜

景岳新方歌

卷之二

二

補陣

煉益精化氣此為欽

治精氣大虧諸藥不應或以克伐太過耗損真陰

凡虛在陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰

分而精不化氣者莫妙於此其有未至大病而素

覺陰虛者用以調元尤稱神妙

人參

大熟地

倍用

右二味用好甜水或長流水浸一宿以發其文武

火煎取濃汁若味有未盡再用水煎取汁并散

稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入真白蜜收之每以

白湯點服 若勞損欬嗽多痰加貝母亦可
貞元飲 熟地草當歸元海無根氣失依慎不可投痰
逆餌緣其脉必細而微

治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣道
噎塞勢劇垂危者常人但知為氣急其病在上而
不知元海無根虧損肝腎此子午不交氣脫證也
凡婦人血海常虧者最多此證宜急用此飲以濟
之緩之敢云神劑凡診此證脉必微細無神若微
而兼緊尤為可畏倘庸眾不知妄云痰逆氣滯用

景岳新方歌

貞元飲 當歸熟地飲

圭

補陣

牛黃蘓合及青皮枳殼等劑則速其危矣

熟地 當歸 炙甘草

如兼嘔惡或惡寒者加煨薑 如氣虛脉微至極
者急加人參隨宜 如肝腎陰虛手足厥冷加肉

桂

當歸地黃飲 甘草炙山藥山苳不可易杜仲還宜牛

膝存腎虛腰膝疼皆釋

治腎虛腰膝疼痛等證

當歸 熟地 杜仲 炙甘草

牛膝 山藥 山茱萸

如下部虛寒加肉桂甚者仍加附子 如多帶濁

去牛膝加金櫻子或加故紙 如氣虛者加人參

枸杞

濟川煎 歸膝肉苁蓉澤瀉升麻枳殼從虛體用之通

大便斯為穩法妙無窮

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑

必不可用若勢有不得不通者宜此主之此用通

於補之劑也最妙最妙

景岳新方歌

濟川煎 續陣

圭

補陣

當歸 牛膝 肉苁蓉

澤瀉 升麻 枳殼

如氣虛者但加人參無碍 如有火加黃芩 加

腎虛加熟地

地黃醴內杞沉香燒酒浸之男婦皆益血益精功獨

廣和營和衛效非常

治男婦精血不足營衛不充等患宜製此常用之

沉香 枸杞 大懷熟

右約每藥一斤可用高燒酒十斤浸之不必煮但

浸十日之外飲可用矣凡服此者不得過飲服完
又加酒六七斤再浸半月仍可用

歸腎丸中熟地萸茯苓山藥更相需杞歸杜仲兔絲
子陰弱陽衰遺泄驅

治腎水真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴
遺泄陽衰等證 此左歸右歸二丸之次者也

熟地 茯苓 山藥 山茱萸

當歸 枸杞 杜仲 兔絲子

煉蜜和熟地膏為丸桐子大每服百餘丸饑時或

滾湯淡鹽湯送下

資化血餘丹參莫剛首烏歸地杞苓班鹿膠原與小

茴台巴戟猶宜絲子板杜仲胡桃皆要品菴蓉久服

固精關兼培氣血功非小黑髮烏鬚且悅顏

此藥大補氣血故能烏鬚髮壯形體其餘培元資

育之功有不可盡述者

血餘 熟地 鹿角膠 兔絲子

枸杞 當歸 小茴香 白茯苓

杜仲 巴戟 肉菴蓉 胡桃肉

人參 何首烏

煉蜜丸食前用白滾湯送下 精滑者加白木山

藥 便溏者去菴蓉加補骨脂酒炒用 陽虛者

加附子肉桂

養元粉 山藥及川椒灰實蓮心元米饒養胃實脾功

效廣白糖加入滾湯調

大能實脾養胃氣

糯米 山藥 芡實

蓮肉 川椒

為末每日饑時以滾水一碗入白糖三匙化開入

藥末一二兩調服之或加四君山查肉更妙

玄武荳中大小茴菴蓉故紙共相陪羊腰杞子青鹽

煮將汁收乾黑荳該

羊腰子 枸杞 補骨脂 大茴香

小茴香 青鹽 肉菴蓉 大黑荳

用甜水二斗以砂鍋或鐵鍋煮前藥七味至半乾

去藥渣入荳拌勻火煮乾為度如有餘汁俱宜拌

滲於內取出用新布攤晾曬乾磁瓶收貯日服之

其效無窮若陽虛者加制附子一二兩更妙

蟠桃果治遺精濁芡實蓮心膠棗肉倍用胡桃熟地

黃補脾滋腎皆充足此方先用猪腰六摻入大茴蒸

極熟去膜去筋藥拌勻搗成餅子空心服

治遺精虛弱補脾滋腎最佳

芡實 蓮肉 膠棗肉

熟地 胡桃肉

右以猪腰六個摻大茴香蒸極熟去筋膜同藥末

搗成餅每日服二個食前用白滾湯或好酒

鐘送下此方凡人參制附子俱可隨意加用

玉母桃惟地木多首烏巴戟杞相和丸如龍眼饑時

補腎培脾力不頗

白朮 大懷熟 何首烏

巴戟 枸杞子

右為末煉蜜搗丸龍眼大每用三四丸饑時嚼服

滾湯送下 或加人參其功尤大

休瘡 飲 何人歸朮草過多汗散培元好復煎用水配

陰陽外露一宵溫服早

此止瘡最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以
衰老或以弱質而瘡有不能止者俱宜用此

人參 白朮 何首烏

當歸 炙甘草

水煎食遠服渣再煎或用陰陽水各一鍾煎一鍾

相亦如之俱露一宿次早溫服一鍾食遠再服一

鍾 如陽虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之

類甚者或加制附子 如陰虛多熱煩渴喜冷宜

滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或加

景岳新方歌

休瘡歌

七

補陣

黃芩 如腎陰不足水不制火虛煩虛餒腰痠脚

軟或脾虛痞悶者加熟地山藥枸杞杜仲之類以

滋脾腎之真陰 如邪有未盡而留連難愈者於

此方加柴胡麻黃細辛紫蘊之屬自無不可 如

氣血多滯者或用酒水各一鍾煎服或服藥後飲

酒數杯亦可

和陣

金水六君煎 用二陳再加熟地與歸身能擊水泛為

痰證肺腎虛寒效可臻

治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急等證神效

當歸 熟地 陳皮 半夏

茯苓 炙甘草

引加生薑 如大便不實而多濕者去當歸加山藥 如痰盛氣滯胸膈不快者少加白芥子 如陰寒盛而嗽不愈者少加細辛 如兼表邪寒熱者加柴胡

景岳新方歌

余者煎

安煎

六

和陣

六安煎裡二陳藏芥子杏仁再入薑氣逆痰多誠可用風寒欬嗽亦能康

治風寒欬嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮 半夏 茯苓 甘草

杏仁 白芥子

引加生薑 凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者多不易散宜少加北細辛 若冬月嚴寒邪盛者加麻黃桂枝亦可 若風勝而邪不甚者加防風或蘇葉亦可 若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆

景岳新方歌

可 若兼寒熱者加柴胡蘇葉 若風邪欬嗽不止而兼脾胃之火者加黃芩甚者再加知母石膏

所用生薑止宜一片 凡寒邪欬嗽痰不利者加當歸老年者尤宜若氣血不足者當以金水六君煎參用 凡非風初感痰勝而氣不順者加藿香

兼脹滿者加厚朴暫開痰氣然後察其虛實寒熱而調補之若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用此

和胃二陳煎足誇砂仁還與炮薑加胃寒嘔惡因痰

景岳新方歌

和陣

陳皮煎

六

和陣

滯噎氣胸痺服此嘉

治胃寒生痰惡心嘔吐胸膈悶噎氣

乾薑 砂仁 陳皮 半夏

茯苓 甘草

芥木二陳煎澤瀉薑和中利膈是良方痰凝水氣停心下嘔吐吞酸盡可嘗

治痰飲水氣停畜心下嘔吐吞酸等證

豬苓 白朮 澤瀉 陳皮

半夏 茯苓 乾薑 炙甘草

一一三

如肝腎兼寒者加肉桂

和胃飲用陳皮朴乾薑炙草四般藥寒濕傷脾吐瀉
良痰飲腹疼脹滿卻

治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔

惡脹滿腹痛等證 此即平胃散之變方也凡嘔

吐等證多有胃氣虛者一聞蒼木之氣亦能動嘔

故以乾薑代之

陳皮 厚朴 乾薑 炙甘草

此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉

景岳新方歌

和胃飲

排氣飲

平

和脾

之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼時氣寒

熱者加柴胡

排氣飲惟食滯需陳皮厚朴木香烏藿香枳澤兼香

附氣逆能平脹痛驅

治氣逆食滯脹痛等證

陳皮 木香 藿香 香附

枳殼 澤瀉 烏藥 厚朴

如食滯者加山查麥芽 如寒滯者加焦乾薑吳

茱萸肉桂之屬 如氣逆之甚者加白芥子沉香

青皮檳榔之屬 如嘔而兼痛者加半夏丁香之

屬 如痛在小腹者加小茴香 如兼疝者加荔

枝核煨熟搗碎用

大和中飲朴陳查枳實砂仁瀉麥芽飲食停畱與積

聚尋常諸品妙無涯

治飲食留滯積聚等證

陳皮 砂仁 麥芽 厚朴

枳實 山查 澤瀉

脹甚者加白芥子胃寒無火或惡心者加炮乾薑

景岳新方歌

大和中飲

小和中飲

三

和脾

疼痛者加木香烏藥香附之類多痰者加半夏

小和中飲快胸中陳朴查苓甘草充扁豆生薑方內

集婦人胎氣治宜宗

治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

陳皮 厚朴 茯苓 扁豆

甘草 山查

引加生薑 如嘔者加半夏 如脹滿氣不順者

加砂仁 如火鬱於上者加焦梔子 如婦人氣

逆血滯者加紫蘊梗香附之屬 如寒滯不行者

加乾薑肉桂之屬

大分清飲用車前澤瀉二苓枳殼聯梔子木通通積
熱疸黃溺血盡能痊

治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕
熱下利黃疸溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

茯苓 猪苓 梔子 枳殼

澤瀉 木通 車前子

如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草之屬 加大便
堅鞭脹滿者加大黃 如黃疸小水不利熱甚者

景岳新方歌

大分清飲 小分清飲

和脾

加茵陳 如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮

小分清飲茯苓枳朴薏仁澤瀉停小便不通兼濕
腫不能受補此方寧

治小水不利濕滯腫脹不能受補等證

茯苓 薏仁 枳殼 厚朴

澤瀉 猪苓

如陰虛水不能達者加生地牛膝 如黃疸者加
茵陳 如無內熱而寒滯不行者加肉桂

解肝煎治怒傷肝氣逆能平脹滿寬半夏陳皮蘼葉

朴砂仁芍藥茯苓攢

治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者宜
用化肝煎

陳皮 半夏 厚朴 茯苓

蘼葉 芍藥 砂仁

引加生薑 如脇肋脹痛加白芥子 如胸膈氣
滯加枳殼香附藿香之屬

二水煎陳草朴苓乾薑澤芍木香停氣泄濕泄均堪
治脾弱肝強用此靈

景岳新方歌

解肝煎 二水煎

和脾

治肝強脾弱氣泄濕泄等證

白朮 蒼朮 茯苓 炙甘草

芍藥 陳皮 厚朴 木香

乾薑 澤瀉

廓清飲用芥陳朴枳瀉茯苓同大腹葶子生研壅滯
通氣逆腫脹差堪服

治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水不利年力
未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非水等證

枳殼 厚朴 陳皮 大腹皮

澤瀉 茯苓 白芥子 蘿蔔子

如內熱多火小水熱數者加梔子木通 如身黃

小水不利者加茵陳 如小腹脹滿大便堅實不

通者加生大黃 如肝滯脇痛者加青皮 如氣

滯胸腹疼痛者加烏藥香附 如食滯者加山查

麥芽

掃虫煎 烏藥草烏梅樞肉吳板青小茴研細雄硃和

少沸虫攻腹痛得懷開

治諸虫上攻胸腹作痛

青皮

烏藥 板榔 小茴香

烏梅 甘草 糊蘆肉 吳茱萸

硃砂 雄黃

右將前八味煎好去渣隨入後三味再煎三四沸

攪勻徐徐服之

如惡心作吐加炒乾薑 或先啖牛肉脯少許俟

一茶頃頓服之更妙

十香丸用皂烏澤沉木丁香同荔枝核陳皮香附酒為

丸氣滯寒停諸痛釋

治氣滯寒滯諸痛

木香 沉香 陳皮 烏藥

丁香 澤瀉 香附 小茴香

荔枝 皂角

為末酒糊丸湯飲下 癩疝之屬溫酒下

芍藥枳木 再加陳荷葉煮粥糊丸吞脾胃不和食

積痞小兒脹滿腹常疼

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛脾胃不

和等證 此方較之枳木丸其效如神

白木 赤芍 枳實 陳皮

荷葉湯煮黃老米粥為丸桐子大米飲或滾白湯

下百餘丸 如臍寒加乾薑炒黃用 如脾胃氣

虛加入參

蒼木丸中芍芍收草茴故紙朴椒投脾經寒濕常流

瀉元米糊丸服自瘳

治寒濕在脾泄瀉久不能愈者

雲苓 白芍 炙甘草 小茴香

川椒 厚朴 真茅朮 破故紙

為末糯米糊丸桐子大每食遠清湯下七八十九
括痰丸裡夏陳薑炙草猪苓白芥襄積飲停痰胸脇
脹吞酸疼痛餌皆良

治一切停痰積飲吞酸嘔酸胸脇脹悶疼痛等證

半夏 陳皮 猪苓 炙甘草

乾薑 白芥子

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服一錢許滾白

湯送下 如胸脇疼痛者加台烏藥

貝母丸惟一品超清金止嗽熱痰消肺癰肺痿皆堪

景岳新方歌

括痰丸 貝母丸

三

神傳

治煉蜜丸吞功獨饒

消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑貝

母一兩為未用沙糖或蜜和丸龍眼大或噙化或

嚼服 若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎

蓬砂天竺黃各一錢佐之尤妙如無百藥煎即醋

炒文蛤一錢亦可或粟殼亦可酌用 若治肺癰

宜加白礬一錢同貝母丸服最妙

神香散 白蔻共丁香胸脇胃中逆氣張嘔噦脹痰與

隔噎清湯調下即無妨

治胸脇胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈噎
諸藥不效者惟此最妙

丁香 白荳蔻

二味等分為末清湯調下五七分甚者一錢日數

服不拘 若寒氣作痛者薑湯送下

攻陣

吐法首於攻陣呈搗研藟子用宜生溫湯和攪徐徐
飲上越還能使下行

景岳新方歌

吐法 赤金

老

攻陣

此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或
食或氣逆不通等證皆可以此吐之

用蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少

頃即當吐出即有吐不盡者亦必從下行矣

赤金荳用皂巴霜生附丁香與木香天竺辰砂輕粉

合血凝氣滯積堪嘗

治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹虫積結聚癥

堅宜此主之此丸去病捷速較之硝黃稜莪之類

過傷厥氣者大為勝之

巴霜 輕粉 生附子 丁香

皂角 木香 天竺黃 硃砂

右為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大硃砂為衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十九用滾水或煎藥或薑醋茶蜜茴香史君煎湯為引送下

若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也 如治氣濕實滯鼓脹先用紅

棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚者一二十九同棗肉研爛以熱燒酒加白糖少許送下 如治

醫方類聚

太平丸

天

攻陣

虫痛亦用棗肉加服止用清湯送下

太平丸 蓬朮芥三稜朴瀉薑陳牙皂芎烏藥木香巴草薹積停脹滿總堪憑

治胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積氣痙血痙邪實秘滯痛劇等證 此方借些微巴豆以行群藥之力去滯最妙如欲其峻須用巴豆二錢

陳皮 厚朴 木香 烏藥

三稜 蓬朮 乾薑 白芥子

牙皂 澤瀉 草豆蔻

巴豆 用滾湯泡去皮心膜稱足一錢用水一

碗微火煮至半碗將巴豆撈起用乳鉢研極

細仍將前湯攪入研勻然後量藥多寡入蒸餅浸爛搗前藥丸如綠豆大每用三分或五分甚者一錢

右隨證用湯引送下 凡傷食停滯即以本物湯

下 婦人血氣痛紅花湯或當歸湯下 氣痛陳皮湯 疝氣茴香湯 寒氣生薑湯 欲瀉者用

熱薑湯送下一錢 未利再服 利多不止用冷水一二口即止

水一二口即止

敦阜丸 麥芽烏藥青巴霜牙皂木香丁香山查陳瀉蒜

頭汁蒸餅糊丸下積停

治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角

烏藥 丁香 青皮 陳皮

澤瀉 巴霜

右共為末用生蒜頭一兩研爛加熱水取汁浸蒸餅搗丸綠豆大每服一三十九丸隨便用湯引送下

如未愈徐徐漸加用之

獵虫丸 樞肉共雄黃輕粉燕桃乾漆榔皂角史君子

錫等瘦黃脹痛百虫妨

治諸虫積脹痛黃瘦等病

燕莢 雷丸 桃仁 史君子

雄黃 錫灰 檳榔 細樞肉

輕粉 皂角 乾漆

湯浸蒸餅為丸紅豆大每服五七分滾白湯下陸

續服之 如虫積堅固者加巴豆霜與輕粉同

景岳新方歌 獵虫 百順丸 攻陣

百順丸 大黃牙皂角丸吞通秘方超卓陽邪積滯頓

消除諸積還教如洗濯

治一切陽邪積滯凡氣積血積虫積食積傷寒實

熱秘結等證但各為湯引隨宜送下無往不利

川大黃 牙皂角

右為末用湯浸蒸餅搗丸綠豆大每用五分或一

錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜為丸亦可

散陣

一柴胡飲從寒散地芍黃芩陳草贊內有火而外有邪四時不正皆能判

一為水數從寒散也 凡感四時不正之氣或為

發熱或為寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或

產後經後因冒風寒以致寒熱如瘧等證但外有

邪而內兼火者須從涼散宜此主之

柴胡 黃芩 芍藥 生地

陳皮 甘草

如內熱甚者加連翹 如外邪甚者加防風佐之

景岳新方歌 陳皮 芍藥 散陣

如邪結在胸而痞滿者去生地加枳實 如熱

在陽明而兼渴者加天花粉或葛根熱甚者加知

母石膏亦可

二柴胡飲散從溫厚朴細辛陳夏存甘草生薑解外

感本無內熱此為珍

二為火數從溫散也 凡遇四時外感或其人元

氣充實臟氣素平無火或時逢寒勝之令本無內

熱等證者皆不宜妄用涼藥以致寒滯不散則為

害非淺宜此主之

陳皮 半夏 柴胡 厚朴

生薑 細辛 甘草

如邪感者可加羌活白芷紫蘇防風之屬擇而用之 如頭痛不止者加川芎 如多濕者加蒼朮

如陰寒氣勝者必加麻黃或兼桂枝不必疑也

三柴胡飲三為木歸芍陳薑炙草六素稟陰虛感外因肝經血少咸宜服

三為木數從肝經血分也 凡人素稟陰分不足

或肝經血少而偶感風寒者或感邪不深可兼補

而散者或病後產後感冒有不得不從解散而血

氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡 芍藥 陳皮 炙甘草

生薑 當歸

如微寒欬嘔者加半夏

四柴胡飲四為金薑草當歸須用參加入陳皮寬膈

滯氣虛外感此方任

四為金數從氣分也 凡人元氣不足或忍饑勞

倦而外感風寒或六脉緊數微細正不勝邪等證

必須培助元氣兼之解散庶可保全宜此主之若

但知散邪不顧根本未有不元氣先敗者察之慎

柴胡 人參 生薑 當歸

炙甘草

如胸膈滯悶者加陳皮

五柴胡飲從脾胃地芍歸陳木草彙徒散外邪非所直兼培氣血斯為貴

五為土數從脾胃也 脾土為五臟之本凡中氣

不足而外邪有不散者非此不可此與四柴胡飲

相表裏但四柴胡飲止調氣分此則兼培氣血以

逐寒邪尤切於時用者也神效不可盡述凡傷寒

瘧疾痘瘡皆所宜用

柴胡 當歸 熟地 白朮

芍藥 陳皮 炙甘草

寒勝無火者減芍藥加生薑或泡乾薑或再加桂

枝更妙 脾滯者減白朮 氣虛者加人參隨宜

腰痛者加杜仲 頭痛者加川芎 勞倦傷脾陽

者加杜仲 頭痛者加川芎 勞倦傷脾陽

虛者加升麻

正柴胡飲為陳防甘草生薑治瘧良外感風寒頭體痛惡寒發熱總堪嘗

凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛痰瘧初起等證凡血氣平和宜從平散者此方主之

柴胡 防風 陳皮 芍藥

甘草 生薑

如頭痛者加川芎 如熱而兼渴者加葛根 如

嘔惡者加半夏 如濕勝者加蒼朮 如胸腹有

景岳新方歌

陳皮 芍藥

散

散

微滯者加厚朴 如寒氣勝而邪不易解者加麻黃去浮沫服之或蘆葉亦可

麻桂飲中歸草陳加薑煎服汗津津傷寒瘟疫與陰暑陰勝邪留寒谷春

治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能

散者非此不可無論諸經四季凡有是證即宜是

藥勿謂夏月不可用也不必厚益但取津津微汗

透徹為度此實麻黃桂枝二湯之變方而其神效

則大有超出二方者不可不為細察

官桂 當歸 陳皮 炙甘草

麻黃

引加生薑 若陰氣不足者加熟地黃 若三陽

併病者加柴胡 若元氣大虛陰邪難解者當以

大溫中飲更迭為用

大溫中飲桂麻柴薑草歸參地朮倍寒疫暑邪身發

熱陽虛溫托始為佳

凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣

身雖熾熱時猶畏寒即在夏月亦欲衣被覆蓋或

景岳新方歌

陳皮

散

散

喜熱湯或兼嘔惡泄瀉但六脈無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正不勝邪之候若

非峻補托散則寒邪日深必致不救溫中自可散寒即此方也服後畏寒悉除覺有躁熱乃陽回作

汗佳兆不可疑之畏之 此外凡以素稟薄弱之

輩或感陰邪時疫發熱困倦雖未見如前陰證而

熱邪未甚者但於初感時即速進此飲連二三服

無不隨藥隨愈真神劑也 此方宜與理陰煎麻

桂飲相參用

熟地 人參 肉桂 冬白木

當歸 柴胡 麻黃 炙甘草

乾薑

如氣虛加黃芪 如寒甚陽虛者加製附子 頭

涌加川芎或白芷細辛 陽虛氣陷加升麻 如

肚腹泄瀉宜少減柴胡加防風細辛亦可

柴陳煎劑性溫純半夏薑苓甘草因欬嗽風寒發熱

證多痰痞滿效如神

治傷風兼寒欬發熱痞滿多痰等證

景岳新方歌

柴陳煎 柴苓煎

羹

散陣

柴胡 陳皮 半夏 茯苓

甘草 生薑

如寒勝者加細辛 如風勝氣滯者加菴葉 冬

月寒甚者加麻黃 氣逆多嗽者加杏仁 痞滿

氣滯者加白芥子

柴苓煎用黑山梔枳殼木通澤瀉施外熱內蒸煩渴

痢發黃並與此方宜

治傷寒表邪未解外內俱熱瀉痢煩渴喜冷氣壯

脈滑數者宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表

邪發黃等證

柴胡 梔子 澤瀉 枳殼

黃芩 木通

如瘧痢並行鮮血純血者加芍藥甘草 如濕勝

氣陷者加防風

柴苓飲用五苓全風濕發熱兼脈緊身疼表未

解中寒泄瀉服之痊

治風濕發熱發熱身痛脈緊表裡俱病小水不利

中寒泄瀉等證

景岳新方歌

柴苓煎 柴胡煎

湯

散陣

柴胡 猪苓 茯苓 澤瀉

肉桂 白朮

如寒邪勝者加生薑 如汗出熱不退者加芍藥

柴胡白虎煎 石膏苓甘草麥冬竹葉心表證未除能

散解陽明溫熱不傷陰

治陽明溫熱表邪不解等證

柴胡 黃芩 石膏 麥冬

細甘草

引加竹葉二十片

歸葛飲須冷水浸陽明溫暑時邪甚陰虛無汗渴而煩服此汗流功獨任

治陽明溫暑時證大熱大渴津液枯涸陰虛不能作汗等證

當歸

乾葛

以冷水浸凉徐徐服之得汗即解

走馬通聖散 秘傳方雄黃炙草與麻黃傷寒初感陰邪甚倉卒宜投特質強

治傷寒陰邪初感等證 此方宜用於倉卒之時

其有質強而寒甚者俱可用

麻黃

雄黃

炙甘草

右為細末每服一錢熱酒下即汗 或加川芎

柴葛煎惟瘟疫宜養陰散毒效堪期連翹芍藥兼萃草表裡熱兮用勿疑

治瘟疫表裡俱熱散毒養陰及痘疹等證

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草

連翹

歸柴飲用炙甘草作汗無由因血槁宜散風寒非善全養營求汗斯方好

治營虛不能作汗及面陰不足外感寒邪難解者此神方也 如大便多澀者以白朮代當歸亦佳

當歸

柴胡

炙甘草

或加生薑 或加陳皮 或加人參

寒陣

保陰煎 二地兼山藥川斷草芩黃栢芍脉滑熱多帶濁宜崩淋便血俱堪卻

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脉滑多熱便血不止

及血崩血淋或經期太早凡一切陰虛內熱動血等證

生地

熟地

芍藥

川續斷

山藥

黃芩

黃栢

生甘草

如小水多熱或兼怒火動血者加焦梔子 如夜熱身熱加地骨皮 如肺熱多汗者加麥冬棗仁

如血熱甚者加黃連

如血虛血滯筋骨腫痛者加當歸

如氣滯而痛去熟地加陳皮青皮丹

皮香附之屬

如血脫血滑及便血久不止者加

皮香附之屬 如血脫血滑及便血久不止者加

地榆或烏梅或百藥煎或文蛤亦可 如少年或血氣正盛者不必用熟地山藥 如肢節筋骨疼痛或腫者加秦艽丹皮

抽薪飲斛栝梔芩枳澤木通甘草臨火熾宜清不可補內蒸冷服效尤深

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩 石斛 木通 梔子

黃柏 枳殼 澤瀉 細甘草

水煎食遠溫服內熱甚者冷服更佳 如熱在經

絡肌膚者加連翹天花粉以解之 如熱在血分

大小腸者加槐蕊黃連以清之 熱在陽明頭面

或躁煩便實者加生石膏以降之 熱在下焦小

水痛澀者加龍膽草車前以利之 熱在陰分津

液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之 熱在

腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徒薪飲治三焦火黃柏丹皮芩麥可芍藥陳芩同入

煎內熱未甚服之妥

治三焦凡火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以

此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮 黃芩 芍藥 麥冬

黃柏 茯苓 丹皮

如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮

梔子

大分清飲用車前澤茯苓通猪枳聯熟積便癰腰腹

痛疽黃濁血總能痊

治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕

熱下利疽黃濁血邪熱畜血腹痛淋閉等證

茯苓 澤瀉 木通 猪苓

梔子 枳殼 市則子

如內熱甚者加黃芩黃柏龍胆草之屬 加大便

堅鞭脹滿者加大黃 如黃疸小水不利熱甚者

加茵陳 如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮

清流飲地芍草芩連枳殼澤苓歸杜煎發熱陰虛多

瀉痢便紅淋痛悉能捐

治陰虛挾熱瀉痢或發熱或喜冷或下純紅鮮血

或小便痛赤等證

生地	茯苓	澤瀉	黃芩
芍藥	當歸	甘草	黃連
枳殼			
如熱甚者加黃柏	小水熱痛者加梔子		
化陰煎	二地兼知柏龍胆猪苓綠豆澤牛膝車前淋濁濁水虧火盛閉癢釋		
治水虧陰涸陽火有餘小便癢閉淋濁疼痛等證			
生地黄	熟地黄	牛膝	猪苓
生黃柏	生知母	澤瀉	綠豆
龍膽草	車前子		
若水虧居多而陰氣大有不足者可遞加熟地即			
用至一二兩亦可			
茵陳飲內用青皮澤草菊花同黑梔挾熱而兼瀉與			
痢疸黃溺濕總相宜			
治挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃疸濕熱			
閉澀等證			
茵陳	澤瀉	青皮	焦梔子
甘草	甘菊花		

清膈煎	貝陳芥木通膽星海石六般同痰因火動氣衝滿內熱渴煩功獨崇		
治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證			
陳皮	貝母	膽星	海石
木通	白芥子		
如火盛痰不降者加童便	如渴甚者加天花粉		
如熱及下焦小水不利者加梔子	如熱在上		
焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏	如痰火上		
壅而小水不利者加澤瀉	如痰火閉結大便不		
通而兼脹滿者加大黃或朴硝酌宜用之			
花肝煎	芍藥青陳皮梔澤丹皮土貝奇怒氣傷肝兼		
動血脇疼脹滿服之宜			
治怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脇痛脹滯			
動血等證			
青皮	陳皮	丹皮	芍藥
梔子	澤瀉	土貝母	
如大便下血者加地榆小便下血者加木通	如		
兼寒熱加柴胡	如火盛加黃芩	如膈腹脹痛	

加白芥子 脹滯多者勿用芍藥

安胃飲 陳皮同麥芽木通芍藥澤山查上衝胃火誠堪泄呃逆不平自可差

治胃火上衝呃逆不止

陳皮 山查 麥芽 木通

澤瀉 黃芩 石斛

如胃火熱甚脈滑實者加石膏

玉女煎方熟地膝麥冬知母石膏集水虧火盛脈浮

洪煩熱渴乾微效必頭痛牙疼失血除少陰不足陽

明實若然大便泄而溏此劑非宜臨證悉

治水虧火盛六脈浮洪消大小陰不足陽明有餘

煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神若大便溏泄

者乃非所宜

生石膏 熟地 麥冬 知母

牛膝

如火之感極者加梔子地骨皮之屬 如多汗多

渴者加北五味 如小水不利或火不能降者加

澤瀉或茯苓亦可 如金水俱虧因精損氣者加

人參尤妙

大清飲用通知母石斛石膏相配偶胃熱狂斑嘔吐煩肅清其火斯無咎

治胃火煩熱狂斑嘔吐等證可與白虎湯酌用

知母 石斛 木通 石膏

或加麥門冬

綠豆飲能解熱毒勞蒸諸火俱堪逐除煩止渴悉伊

功和蜜或鹽隨所欲

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦

可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日三四次

不拘此物性非苦寒不傷脾氣且善於解毒除煩

退熱止渴大利小水乃淺易中之最佳最捷者也

玉泉散治陽明熱甘草石膏無別物煩渴頭疼便秘

除斑黃瘟疫熱痰泄

亦名一六甘露散 治陽明內熱煩渴頭痛二便

閉結溫疫斑黃及熱痰喘嗽等證 此益元散之

變方也其功倍之

生石膏 粉甘草

石為細末每服二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下 若加硃砂亦妙

雪梨漿 味美氣清香切片甘泉水浸良解熱除煩陰火退生津止渴飲其漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

用清香甘美大梨削去皮別用大碗盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其粗退陰火極速也

滋陰八味丸非別六味更加知柏合火盛陰虛濕熱兼變丸亦可作湯液

治陰虛火盛下焦濕熱等證 此方變丸為湯即

名滋陰八味煎

山藥 丹皮 熟地 白茯苓

澤瀉 山茱萸 知母 黃柏

煉蜜搗丸桐子大或空心或午前用滾白湯或淡

鹽湯送下百餘丸

約陰丸 歸地芍丹參苓朮地榆續斷芩白石脂須兼

五味先期經水便紅淋

治婦人血海有熱經脈先期或過多者或兼腎火而帶濁不止及男婦大腸血熱便紅等證

當歸 白朮 生地 白石脂

茯苓 地榆 黃芩 北五味

芍藥 丹參 川續斷

右為末煉蜜丸 火甚者倍用黃芩 兼肝腎之

火甚者仍加知母黃柏 大腸血熱便紅者加黃

連防風

服變煎是入心肝地麥首蒲芍牡丹知母木通陳斛 痰鬱開氣化自神安

此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱

結通神明養正除邪大有奇效

生地 麥冬 芍藥 石菖蒲

石斛 茯苓 丹皮 陳皮

本通 知母

如痰勝多鬱者加貝母 痰盛兼火者加膽星

陽明火盛內熱狂叫者加石膏 便結脹滿多熱

者加玄明粉 調服或暫加大黃亦可 氣虛神困者加人參

約營煎 芍草地榆梅續斷槐花荆芥灰生地黃芩清血熱便紅無論自何來

治血熱便血無論脾胃大小腸膀胱等證宜用此

生地 芍藥 甘草 續斷

地榆 黃芩 槐花 荆芥穗

烏梅

如下焦火盛者可加梔子黃連龍膽草之屬 如

氣虛者加人參白朮 如氣陷者加升麻防風

熱陣

四味回陽飲 用理中以朮易附力加雄元陽虛脫垂危頃溫服徐徐定有功

治元陽虛脫危在頃刻者

人參 製附子 炙甘草 炮乾薑

武火煎溫服徐徐飲之

六味回陽飲又增地歸薑附草人參諸虛劇甚陰陽

脫此劑按危力可任

治陰陽將脫等證

人參 製附子 炮乾薑 炙甘草

熟地 歸身

如肉振汗多者加炙黃芪或冬白朮 如泄瀉者

加烏梅或北五味亦可 如虛陽上浮者加茯苓

如肝經鬱滯者加肉桂

理陰煎 歸地草乾薑此治真陰虛弱方痰飲惡心陰

嘔腹疼脹滿息寒涼婦人血滯經遲妙倦客邪侵

濕托良或補命門加附子陽衰添桂信揚贊

此理中湯之變方也 凡脾胃中虛等證宜剛燥

者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營

之類欲知調補當先察此 此方專治真陰虛弱

脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等

證 又凡真陰不足或素多勞倦之輩因而忽感

寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤舌焦

或雖渴而不喜冷飲或背四肢體畏寒但脈見無

力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用

力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用

此湯照後加減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰達而寒邪不攻自散此最切於時用者也神效不可盡述

熟地 當歸 乾薑 炙甘草

或加桂肉

此方加附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證 若風寒外感邪未深入但見發熱身痛脈數不洪凡內無火證素稟不足者但用此湯加柴胡連進一二服

其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃

放心用之或不用柴胡亦可恐其清利也此寒邪初感溫散第一方惟仲景獨知此義但仲景之溫散首用麻黃桂枝二湯余之溫散即以理陰煎及

大溫中飲為增減此雖一從陽分二從陰分其跡若異然一逐於外一托於內而用溫則一也學者當因所宜酌而用之 若陰勝之時外感寒邪脈

細惡寒或背畏寒者乃太陽少陰證也加細辛甚者再加附子真神劑也或并加柴胡以助之亦可

若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛不能解者宜去薑桂單以三味加減與之或止加人參亦可 若治脾腎兩虛水泛為痰或嘔或脹者於前方加茯苓或加白芥子以行之 若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之加山藥扁豆 吳茱萸破故肉豆蔻附子之屬 若腰腹有痛加杜仲枸杞 若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁之屬

養中煎用草人參山藥乾薑扁豆苓中氣虛寒為嘔

泄瀉中補氣此方珍

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參 山藥 炙甘草 白扁豆

茯苓 乾薑

如噯腐氣滯者加陳皮或砂仁 如胃中空虛覺

餒者加熟地

溫胃飲 中寒食少思吞酸嘔吐瀉兼資參歸扁木薑

陳草胎氣不安臟冷宜

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臍寒嘔

者再加附子真神劑也或并加柴胡以助之亦可

惡胎氣不安等證

人參 白朮 陳皮 乾薑

當歸 扁豆 炙甘草

如下寒帶濁者加破故紙 如氣滯或兼胸腹痛

者加藿香丁香木香白豆蔻砂仁白芥子之屬

如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴

胡 如脾氣陷而身熱者加升麻 如水泛為痰

而胸腹痞滿者加茯苓 如脾胃虛極大嘔大吐

不能止者倍用參朮仍用胡椒二三分煎熟徐徐

五君煎

五君煎

六味異功煎

聖

熟陣

服之

五君子煎 用四君薑脾胃虛寒致有嘔吐濕因兼

泄瀉煎來溫服正相當

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參 白朮 茯苓 炙甘草

乾薑

六味異功煎 即五君加陳利氣更堪云虛寒有濕兼

微滯嘔泄不寧定解紛

即前方加陳皮 治證同前而兼微滯者

參薑飲內草須炙肺胃脾虛寒致疾氣短噉頻嘔吐
痊小兒吐乳亦能釋

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等證

人參 乾薑 炙甘草

此方或陳皮或草撥或茯苓皆可酌而佐之

胃關煎 山藥木焦薑扁豆吳萸草黃脾胃虛寒泄

瀉甚腹疼冷痢並能康

治脾胃虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等

證

五君煎

五君煎

聖

熟陣

熟地 白扁豆 炙甘草 白朮

山藥 焦乾薑 吳茱萸

瀉甚者加肉豆蔻麩炒用或破故紙亦可 氣虛

勢甚者加人參 陽虛下脫不固者加製附子

腹痛甚者加木香或加厚朴滯痛不通者加當歸

滑脫不禁者加烏梅或北五味子 若肝邪侮

脾者加肉桂

佐關煎 山藥瀉者加扁豆草薑桂朴陳生冷傷脾初

瀉痢腎元未損此方珍

治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒濕安脾胃此胃關煎之佐者也

厚朴 陳皮 山藥 炙甘草

扁豆 猪苓 澤瀉 乾薑

肉桂

如腹痛甚者加水香或吳茱萸亦可 如瀉痢不止者或破故紙或肉豆蔻皆可加用

抑扶煎 陳草猪苓澤瀉烏藥吳萸薑朴台不但陰寒嘔惡除且宜生冷痢而泄

景岳新方歌

抑扶煎

四續散

番

熱陣

治氣冷陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起血氣未衰脾腎未敗或脹痛或嘔惡皆宜先用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒濕傷臟霍亂邪實者最宜用此

厚朴 陳皮 烏藥 炙甘草

澤瀉 猪苓 乾薑 吳茱萸

如氣滯痛甚者加水香或砂仁亦可 如血虛多痛者加當歸 如寒濕勝者加蒼朮

四續散治痢無休脾腎虛寒滑脫瘳參附烏梅薑炙

草二陰血脫并堪投

治脾腎虛寒滑脫之甚或泄痢不能止或氣虛下陷二陰血脫不能禁者無出此方之右

人參 製附子 乾薑 炙甘草

烏梅肉

右為末和勻用水拌濕蒸一飯頃取起烘乾再為末每服一二錢溫湯調下

鎮陰煎 地草瀉牛膝附桂兼收導火提此治陰虛致絡陽血隨而溢脉細脫

景岳新方歌

鎮陰煎

烏藥煎

重

熱陣

治陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢以致大吐大衄六脉細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痺上熱者當以此湯冷服

熟地 牛膝 澤瀉 炙甘草

肉桂 製附子

如兼嘔惡者加乾薑炒黃用 如氣脫倦言而脉弱極者宜速速多加人參

歸氣飲中熟地先乾薑扁豆茯苓蘇丁陳藿草平呢

逆脾腎寒侵嘔吐症

治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中脾腎等證

熟地 茯苓 扁豆 乾薑

丁香 藿香 陳皮 炙甘草

中氣寒甚者加製附子 肝腎寒者加吳茱萸肉

桂或加當歸

煖肝煎 歸杞小茴停烏藥沉香桂茯苓肝腎陰寒少

腰痛小腸疝氣服之靈

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等證

景岳新方歌

煖肝煎

香膠煎

羹

熱陣

當歸 枸杞 茯苓 小茴香

肉桂 烏藥 沉香

引加生薑 如寒甚者加吳茱萸乾薑再甚者加

附子

壽脾煎 又號攝營煎遠志參歸棗建蓮山藥乾薑同

木草脾虛脫血此方賢

治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒積勞及誤用

攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧陷神魂不寧大

便脫血不止或婦人無火崩淋等證凡兼嘔惡尤

為危候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸
源此歸脾湯之變方其效如神若犯此證而再用
寒涼則胃氣必脫無不即斃者

白朮 當歸 山藥 炙甘草

棗仁 遠志 乾薑 蓮肉

人參

如血未止加烏梅凡畏酸者不可用或加地榆亦

可 滑脫不禁者加醋炒文蛤下焦虛滑不禁加

鹿角霜為未攪入藥中服之氣虛甚者加炙黃芪

景岳新方歌

三氣飲

羹

熱陣

氣陷而墜者加升麻或白芷亦可 兼溼泄者

加補骨脂炒用 陽虛畏寒者加製附子 血去

過多陰虛氣餒心跳不寧加熟地七八錢或一二

兩

三氣飲中仲細辛杞苓地膝芍歸身桂心白芷附甘

草善治風寒濕若神

治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節痺

痛之極及痢後鶴膝風痛等證

當歸 枸杞 杜仲 熟地

牛膝 茯苓 肉桂 北細辛

白芷 附子 芍藥 炙甘草

引加生薑 加氣虛者加人參白朮 風寒勝者

加麻黃 此飲亦可浸酒大約每藥一斤可用燒

酒六七升浸十餘日徐徐服之

五德丸 炮薑補骨脂木香五味并吳萸腹疼嘔惡傷

生冷脾胃虛寒瀉泄施

治脾胃虛寒瀉泄驚澹等證或暴傷生冷或受時

氣寒濕或酒濕傷脾胃腹痛作瀉或飲食失宜嘔惡

景岳新方歌 五德丸 七德丸 素 熟脾

痛泄無火等證

補骨脂 吳茱萸 木香 乾薑

北五味

湯浸蒸餅九桐子大每服六七十丸甚者百餘丸

滾白湯或人參湯或米湯俱可下 腹痛多嘔者

加胡椒更妙

七德丸 吳萸烏藥薑木香故紙茯苓蒼脾傷生冷多

停滯瀉痢腹疼無不良

治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年壯氣血未

衰及寒濕食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏裨也

合烏藥 吳茱萸 乾薑 蒼朮

木香 茯苓 補骨脂

神麩糊丸桐子大每服七八十丸滾白湯送下

復陽丹理陰寒甚吐瀉腹疼寒疝證五味胡椒草附

薑炒黃白麵為丸進

治陰寒嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

附子 炮薑 胡椒 北五味

景岳新方歌 復陽丹 黃芽丸 素 熟脾

炙甘草 白麩

右為末和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證

用藥引送下

黃芽丸用參為主少佐焦薑治嘔吐脾胃虛寒食不

消吞酸脹泄常嚼愈

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸

嘔吐等證此藥隨身常用甚妙

人參 焦乾薑

煉白蜜為丸芡實大常嚼服之

一蒸丹中參附收虛寒脾腎病應投腹疼泄瀉誠堪已陽痿怯寒亦可瘳

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證 此即參附湯之變方也

人參 製附子

煉白蜜為丸每服五分白滾湯下

九蒸丹 焦薑肉蔻需骨脂熟地附吳萸葦芩五味同甘草脾腎虛寒藉此扶

治脾腎虛寒如五德丸之甚者

熟地

製附子 肉豆蔻 焦薑

葦芩 吳萸黃 補骨脂 甘草

五味子

煉白蜜為丸或山藥糊丸如桐子大每服七八十

丸或百九滾白湯下 如氣虛者加入參尤妙

溫臟丸 川椒歸芍木參苓樞肉史君合楨薑配入泡吳萸虫積復生能杜絕

治諸虫積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健脾胃以杜其源此方主之

人參 芍藥 川椒 細樞肉

白朮 茯苓 乾薑 史君子

當歸 枳榔 吳萸黃

右為末神麩糊為丸桐子大每服五七十九或百丸饑時白湯下 如臟寒者加製附子

聖木煎桂朮陳薑能治脾虛飲食傷吐瀉脇疼胸膈痞脈微神倦自無妨

治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇肋疼痛或過用剋伐等藥至傷臟氣有同前證者加量無力

氣怯神倦者速宜用此不得因其虛痞虛脹而畏

用白朮此中虛實之機貴乎神悟也若痛脹覺甚者即以此煎送神香散最妙若用治寒濕瀉痢嘔吐尤為聖藥

白朮 乾薑 肉桂 陳皮

若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人參炙甘草之類當任意加用 若治中虛感寒麻黃柴胡亦可加用

固陣

秘元煎益心脾氣參朮藥苓共五味遠志棗仁草共
櫻遺精帶濁差堪餌

治遺精帶濁等病此方專主心脾

人參 遠志 山藥 棗仁

金櫻子 白朮 茯苓 芡實

炙甘草 五味

此治久遺無火不痛而滑者乃可用之 如尚有

火覺熱者加苦參 如氣大虛者加黃芪

固陰煎 地藥味萸攀參草兔絲遠志班經水因虛脫

景岳新方歌 秘元煎 固陰煎 全 固障

不固濁淋滑泄總能關

治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證此

方專主肝腎

人參 熟地 山藥 山茱萸

炙甘草 遠志 五味 兔絲子

如虛滑遺甚者加金櫻子肉或醋炒文蛤或烏梅

如陰虛微熱而經血不固者加川續斷 如下

焦陽氣不足而兼腹痛泄泄者加補骨脂吳茱萸

之類 如肝腎血虛小腹痛而血不歸經者加當

景岳新方歌

歸 如脾虛多濕或兼嘔惡者加白朮 如氣陷
不固者加炒升麻 如兼心虛不眠或多汗者加
棗仁炒用

兔絲煎亦治心脾思慮勞傷精即遺鹿角霜歸遠志
草參苓山藥棗仁宜

治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此主
之

人參 鹿角霜 當歸 遠志

炙甘草 山藥 茯苓 棗仁

景岳新方歌 兔絲煎 固障 全 固障

兔絲子

或加白朮

惜紅煎可治腸風婦女淋漓崩漏紅朮芍荆甘山藥
斷烏梅五味地榆充

治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等證

白朮 芍藥 荆芥穗 炙草

山藥 續斷 北五味 烏梅

地榆

如火盛者加黃連黃芩 如脾虛兼寒脾泄者加

破故紙人參

苓朮兔絲丸可珍腎脾虛損夢遺類藥蓮味仲同甘草服此頓令病去身

治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困倦等證

白茯苓 白朮 蓮肉 炙甘草

兔絲子 杜仲 五味 山藥

右用山藥末以陳酒煮糊為丸桐子大空心滾白

湯或酒下百餘丸 如氣虛神倦不能收攝者加

人參尤妙

醫方新考

養源丸

膏

固陣

固真丸內兔絲多牡蠣雲苓櫻子和精滑夢遺憂損
特蜜丸酒下理沉疴

治夢遺精滑

兔絲子 牡蠣 金櫻子 雲茯苓

右蜜丸空心好酒送下三錢或鹽湯亦可

玉關丸可治崩淋帶濁腸風血不禁交蛤麩禁訶五

味滑泄瀉痢并堪噉

治腸風血脫崩漏帶濁不固諸藥難效者宜用此

丸兼煎藥治之及瀉痢滑泄不能止者亦宜用此

文蛤 白麩 枯礬 北五味

訶子

右為末用熟湯和丸梧子大以溫補脾腎等藥隨
證加減煎湯送下或人參湯亦可 如血熱妄行

者以涼藥送下

鞏隄丸益智朮絲子韭味地苓附故紙山藥糊丸溫

酒吞命門火益水泉止

治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水不禁等證

熟地 兔絲子 故紙 益智仁

醫方新考

鞏隄丸

膏

固陣

白朮 北五味 附子 茯苓
家韭子

右為末山藥糊丸如梧子大每服百餘丸空心滾

湯或溫酒下 如兼氣虛必加入參

敦阜糕中白麵需冬朮故紙與之俱為末白糖調服

好腸滑瀉痢久能驅

白麩 冬白朮 破故紙

右共為末食前將白糖加入隨宜用清滾湯調服

如糕法如胃寒者每藥一兩加乾薑炒末五分或

一錢如有氣不順或痛或嘔每末一兩加丁香二錢如滑泄不禁者每兩加粟殼末炒黃一錢若作丸則宜三味等用即名敦阜丸

因陣

逍遙飲 地芍棗歸陳遠志茯神炙草倫思鬱損傷經脈舛心脾衝任可調勻

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脈不調者

景岳新方歌

逍遙飲 決津煎

突

因陣

當歸

芍藥

熟地

棗仁

茯神

遠志

陳皮

炙甘草

如氣虛者加人參 如經水過期兼痛滯者加酒炒香附

決津煎裡桂烏藥地膝瀉歸通血絡能養血虛經痛 調補而後瀉如疏鑿

治婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水濟水若江河一決而積垢皆去宜用此湯隨證加減至之 此用補為瀉之神劑也如氣虛者宜少用

景岳新方歌

香陳之類甚者不用亦可

當歸

澤瀉

牛膝

肉桂

熟地

烏藥

如嘔惡者加焦乾薑 如陰滯不行者非加附子

不可 如氣滯而痛脹者加香附或木香 如血

滯血澁者加酒炒紅花 如小腹不煖而痛極者

加吳茱萸 如大便結滯者加肉苁蓉微者以山

查代之

五物煎同四物湯更加肉桂法誠良血虛凝滯多者

景岳新方歌

五物煎

突

五物煎

積小腹急疼用此康

治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹痛急產難經滯

及痘瘡血虛寒滯等證神效

當歸

芍藥

熟地

川芎

肉桂

兼胃寒或嘔惡者加乾薑炮用 水道不利加澤

瀉或猪苓 氣滯者加香附或丁香木香砂仁烏

藥 陰虛疝痛者加小茴香 血瘀不行臍下若

覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒紅花 痘瘡血

虛寒勝寒邪在表者加細辛麻黃柴胡紫菀之屬
調經飲用青歸膠香附查苓除婦疾經滯不調氣不
平宜於多痛宜於實

治婦人經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸 牛膝 山查 香附

青皮 茯苓

如因不避生冷而寒滯其血者加肉桂吳茱萸之

類 如兼脹悶者加厚朴或砂仁亦可 如氣滯

者加烏藥或痛在小腹者加小茴香

通瘀煎 血積痛無涯歸尾紅花香附查烏藥木香

澤瀉經停氣滯服之嘉

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後瘀

血實痛并男婦血逆血厥等證

歸尾 紅花 香附 山查

烏藥 木香 青皮 澤瀉

兼寒滯者加肉桂或吳茱萸 火盛內熱血燥不

行者加炒梔子 微熱血虛者加芍藥 血虛澁

滯者加牛膝 血瘀不行加桃仁去皮尖用或加

菴木玄胡索之類 痰極而大便結燥者加大黃
或加芒硝蓬朮亦可

胎元飲 杜仲當歸芍參朮草陳熟地着胎不固分與

不安任衝失守宜斯藥

治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用

之或間日或二三日常服一二劑

人參 當歸 杜仲 芍藥

熟地 白朮 陳皮 炙甘草

如下元不固而多遺濁者加山藥補骨脂五味之

類 如氣分虛甚者倍白朮加黃芪但芪朮氣浮

能滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之 如

虛而兼寒多嘔者加炮薑 如虛而兼熱者加黃

芩或加生地杜仲 如陰虛小腹作痛加枸杞

如多怒氣逆者加香附無妨或砂仁亦妙 如

有所觸而動血者加川續斷阿膠 如嘔吐不止

加半裏生薑三五片

固胎煎 芩朮芍砂仁更入阿膠歸與陳氣滯肝脾兼

火旺滑胎屢墮此方珍

治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩 白朮 當歸 芍藥

阿膠 陳皮 砂仁

涼胎飲用地歸苓枳芍斛苓甘草停胎氣不安由內熱熱多加栝更清寧

治胎氣內熱不安等證

生地 芍藥 黃芩 當歸

甘草 枳殼 石斛 茯苓

加熱甚者加黃栝

滑胎煎 臨月最宜煎地藥芍歸枳仲睥常服易生能

奏效虛人參朮更推先

胎氣臨月宜常服數劑以便易生

當歸 川芎 杜仲 熟地

枳殼 山藥

如氣體虛弱者加人參白朮隨宜用之 如便實

多滯者加牛膝

殿胞煎用桂川芎炙草當歸苓亦充產後每多兒枕痛此煎熱服獨誇功

治產後兒枕疼痛等證如神

當歸 川芎 茯苓 炙甘草

肉桂

如脉細而寒或嘔者加乾薑炒黃色用 如血熱

多火者去肉桂加酒炒芍藥 如脉弱陰虛者加

熟地 如氣滯者加香附或烏藥亦可 腰痛加

杜仲

脫花煎義取催生牛膝芍歸肉桂并更用車前將產利紅花同入效方成

凡臨盆將產者宜服此藥催生最佳并治產難經

日或死胎不下俱妙

當歸 肉桂 川芎 牛膝

紅花 車前子

若胎死腹中或堅滯不下者加朴硝三五錢即下

若氣虛困劇者加人參隨宜 若陰虛者必加

熟地三五錢

九蜜煎 吳萸桂地黃細辛歸芍草苓薑心疼腹痛四肢冷產後寒侵陽弱良

治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四肢厥冷

當歸 熟地 芍藥 炙甘草

茯苓 乾薑 肉桂 北細辛

吳茱萸

清化飲中地芍丹麥苓芍斛不嫌寒產餘因火身發熱血熱妄行陰弱安

治婦人產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥 茯苓 丹皮 麥冬

黃芩 生地 石斛

如覺骨蒸多汗者加地骨皮 熱甚而渴或頭痛者加石膏 下熱便澀者加木通或黃柏梔子皆可隨證用之 如兼外邪發熱加柴胡

毓麟珠裡八珍資杜仲川椒與兔絲鹿角霜尤不可少調經種子此方司

治婦人氣血俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠或飲食不甘瘦弱不孕服一二劑即可

受胎凡種子諸方無以加此

人參 茯苓 白朮 炙甘草

川芎 當歸 芍藥 兔絲子

熟地 杜仲 川椒 鹿角霜

右為末煉蜜丸彈子大每空心嚼服一二丸用酒或白湯送下 如男子制服宜加枸杞胡桃肉鹿角膠山藥山茱萸巴戟肉 如女人經遲腹痛宜

加酒炒破故紙肉桂甚者再加吳茱萸湯泡一宿

炒用 如帶多腹痛加破故北五味或加龍骨醋

新方歌 黃芩丹 書 因陳

殿用 如子宮寒甚或泄或痛加制附子炮乾薑

如多鬱怒氣有不順而為脹為滯者宜加酒炒

香附或甚者再加沉香 如血熱多火經早內熱

者加川續斷地骨皮或另以湯劑暫清其火而後

服此或以湯引酌宜送下亦可

贊育丹 仙茅歸地叢蛇床巴戟杞萸充淫羊杜仲菴

蓉木桂附還須韭子同陽痿物衰須用此虛寒何慮

少兒童

治陽痿精衰虛寒無子等證妙方

熟地	杜仲	巴戟肉	山茱萸
白朮	枸杞	淫羊藿	肉苁蓉
當歸	仙茅	韭子	蛇床子
附子	肉桂		

或加人參鹿茸亦妙

柴歸飲治痘瘡先芍藥荆甘身熱宜是痘是邪疑未
的夾虛夾實總堪煎

治痘瘡初起發熱未退無論是痘是邪疑似之間
均宜用此平和養營之劑以為先着有毒者可托
有邪者可散實者不致助邪虛者不致損氣 凡
陽明實熱邪甚者宜升麻葛根湯如無實邪則悉
宜用此增減主之

當歸 芍藥 柴胡 荆芥穗

炙甘草

血熱者加生地 陰虛者加熟地 氣虛脈弱者
加人參 虛寒者加炮薑肉桂 火盛者加黃芩
熱渴者加乾葛 腹痛者加木香砂仁 嘔惡
者加炮薑陳皮 若治麻疹或以荆芥易乾葛

景岳新方歌

陰寒盛而邪不能解者加桂枝麻黃

疎邪飲倍芍柴胡炙草還兼荆紫蘇痘疹初呈血氣
感無庸滋補散邪需

治痘疹初起發熱凡血氣強盛無藉滋補者單宜
解邪用此方為主以代升麻葛根湯及蘊葛湯等
方最為妥當

柴胡 倍用 芍藥 倍用 蘊葉 荆芥穗

炙甘草

無火者加生薑 火盛內熱者加黃芩 渴者加
乾葛

涼血養營 煎 治痘瘡血虛血熱最為良紅花紫草骨
皮芍苓草當歸生地黃

治痘瘡血虛血熱或熱渴或色燥不起及便結溺
赤凡陽盛陰虛等證悉宜用此

生地黃 當歸 芍藥 生甘草

地骨皮 紫草 黃芩 紅花

渴加天花粉 肌熱無汗加柴胡 熱毒盛者加
牛旁子木通連翹之屬 血熱毒不透者加犀角

柴葛煎堪痘疹調黃芩芍藥草連翹養陰散毒除瘟
疫表裡相兼壯熱消

治痘疹表裡俱熱散毒養陰及瘟疫等證

柴胡 乾葛 芍藥 黃芩

甘草 連翹

搜毒煎惟痘疹宜乾枯熱熾色衛薰牛旁紫草木通
切蟬退苓翹地骨皮

解痘疹熱毒熾感紫黑乾枯煩熱便結純陽等證

紫草 木通 芍藥 牛旁子

蟬退 黃芩 連翹 地骨皮

渴者加天花粉麥門冬 陽明熱甚頭面牙齦腫
痛者加石膏知母 大腸乾結實臍腹實脹者加

大黃芒硝 血熱妄行者加犀角童便 小水執
閉者加山梔車前子 兼表熱者加柴胡

六物煎因四物湯人參炙草更扶陽痘瘡血氣能充

沛男婦虛羸弱轉強

治痘疹血氣不充隨證加減用之神效不可盡述
并治男婦氣血俱虛等證

川芎 當歸 熟地 芍藥

人參 炙甘草

如發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以疎表或
加防風佐之 如見點後痘不起發或起而不貫

或貫而漿薄均宜單用此湯或加糯米人乳好酒

肉桂川芎以助營氣 如氣虛瘵塌不起加川山

甲炒用 如紅紫血熱不起宜加紫草或犀角

如脾氣稍滯者宜加陳皮山查 如胃氣虛寒多

嘔者加乾薑炒用或加丁香 如腹痛兼滯者加

木香陳皮 表虛氣陷不起或多汗者加黃芪

氣血俱虛未起未貫而先癢者加肉桂白芷 如

元氣大虛寒戰咬牙泄瀉宜去芍藥加黃芪大附

子乾薑肉桂

六氣煎方痘最宜人參木草桂歸芪氣虛倒陷癢平
癢寒戰咬牙效更奇

治痘瘡氣虛癢癢倒陷寒戰咬牙并治男婦陽氣
虛寒等證

黃芪 肉桂 人參 白朮

當歸 炙甘草

加減法照前六物煎

九味異功 煎附桂薑參芪歸地草丁香痘瘡寒戰咬

牙陷嘔吐腹疼泄瀉良

治痘瘡寒戰咬牙倒陷嘔吐泄瀉腹痛虛寒等證

人參 黃芪 當歸 炙甘草

熟地 丁香 肉桂 製附子

乾薑

如泄瀉腹痛加肉豆蔻麩炒用或加白朮

景岳新方歌 透邪煎 麻疹熱初生甘草升防歸芍荆解利得宜毒

易散投於未出勢當輕

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之先

不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減

欲求妥當當先以此方為主

當歸 芍藥 防風 荆芥

升麻 炙甘草

如熱甚脉洪滑者加柴胡

牛膝煎推截瘧靈歸陳二味甚芳馨邪經透散斯方

妙血氣微虛自得寧

截瘧六效凡邪散已透而血氣微虛者宜此主之

牛膝 當歸 陳皮

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服

何、飲內用歸陳加入煨薑氣味純氣血俱虛瘧不

止補而能截效如神

截瘧如神凡氣血俱虛久瘧不止或急欲取效者

宜此主之

何首烏 當歸 人參 陳皮

煨生薑 煎法 景岳新方歌 瘧疾 完 因陳

煨生薑

若善飲者以酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服

亦妙再煎不必用酒

追瘧飲分歸首烏青陳夏草更柴胡陰陽水煮還宜

露血氣未衰散後需

截瘧甚佳凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者

用此截之已經屢驗

當歸 甘草 半夏 何首烏

青皮 陳皮 柴胡

水賊煎中水用蒼青皮半夏朴檳榔多痰多濕身經
癰形實氣強服此良

凡癰疾形實氣強多濕多痰者宜此裁之大效

半夏 青皮 木賊 白蒼朮

厚朴 檳榔

用陳酒二鍾煎露一宿於未發前服之

牙皂散惟一味燒細研火酒服時調專治平胃脘苦

疼痛諸藥難瘳此法超

治胃脘痛劇諸藥不效者服此如神

用牙皂燒存性以烟將蓋為度研末用燒酒調服

一錢 軒節效

蕩香散用荔枝核更取大茴等分合油氣痛治氣分

宜氣停小腹痛亦釋

治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹痛

痛等證神效

荔枝核 大茴香

右為末用好酒調服二三錢 如寒甚者加制過

吳茱萸減半用之 凡心腹胃脘久痛屢服屢發

者惟婦人多有之用荔枝一錢木香八分為末每

服一錢清湯調下數服除根

外羅傷寒結胸法薑蔥蘿蔔搗勻敷滯行邪散須乘

熱攻藥不堪中氣虛

凡病傷寒結胸其中有中氣虛弱不堪攻擊內消者

須以此法外羅之則滯行邪散其效如神

葱白頭 生薑 生蘿蔔

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熟用手

巾或白布包作大餅卷胸前脹痛處此藥須分二

包冷則輪換卷之無不即時開通汗出而愈但不

宜太熱恐炮烙難受也

又法以大蒜一二十頭搗爛攤厚紙或薄絹上貼

於脹處少頃即散用治一切脹痛無不神妙

連翹金貝煎用紅藤夕句蒲公好結朋陽分羅揚宜

服此乳胸肺膈並稱靈

治陽分癰毒或在臟腑肺膈胸乳之間者此方最

佳甚者連用數服無有不愈

金銀花 貝母 紅藤 夏枯草一名女

同草

蒲公英 連翹

用好酒二碗煎一碗服後煖卧片時 火感煩渴

乳腫者加天花粉 若陽毒內熱或在頭項之間

者用水煎亦可

連翹歸尾 煎入銀花甘草紅藤無以加流注癰腫丹

毒證無名腫毒並稱嘉

治一切無名癰毒丹毒流注等毒有火者最宜用之

連翹 歸尾 甘草 金銀花

紅藤

用酒煎服如前 如邪熱火感者加槐花

桔梗杏仁 煎草百合夏枯草與紅藤麥連翹阿枳貝

煎治咳血肺癰胸痛息

治欬嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱痛將成肺癰者

此方為第一

桔梗 杏仁 連翹 夏枯草

甘草 百合 阿膠 金銀花

麥冬 貝母 枳殼 紅藤

如火感兼渴者加天花粉

當歸蒺藜 煎草首烏地芍荆防芫芷俱血氣不充毒

不化癰疽瘡疹痛如無

治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實熱而腫

痛淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相為奇正

也當酌其詳

當歸 熟地 芍藥 何首烏

炙草 防風 川芎 荆芥穗

白芷 白蒺藜

瘡毒方歌

瘡毒方歌

全

因詳

酒煎服 陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加乾

薑附子 氣虛不化者加黃芪人參 毒陷不能

外達者加川山甲或皂刺

芍藥蒺藜 煎瀉木通梔苓龍胆地黃同遍身濕熱多

瘡疹下部諸瘍並有功

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外

以蟬蛻粉敷之

梔子 黃芩 木通 龍胆草

澤瀉 芍藥 生地 白蒺藜

如火不甚者宜去龍胆梔子加當歸茯苓薏仁之屬 如濕毒甚者加土茯苓

鱧蚘散入人中白破爛諸瘡毒水溢足股陰囊腫潰餘下疳毒口敷皆合

治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫痛下疳諸瘡皆神效

海螵蛸 人中白

右為細末先以甘草多煎濃湯乘熱蒸洗後以此藥搽之如乾者以麻油或熬熟猪油或蜜水調敷

之 若腫而痛甚者加冰片少許更妙 若濕瘡

膿水甚者加蜜陀僧等分或煨過官粉亦可或煨制爐甘石更佳

腸癰秘方精且詳紅藤先用酒煎膏地丁午後如前服必欲除根末藥良 末藥方中石蠟蚘天龍蟬退大黃加蜘蛛須老蚕歸合早上還宜酒服嘉

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止者是若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先用紅藤一兩許以好酒二碗煎一碗午前服醉臥之 午後用紫花地丁一兩許亦如前

煎服服後痛必漸止為效然後服後末藥除根神妙

當歸 蟬退 天龍 石蠟蚘 此草藥也

大黃 蠶蚕 老蜘蛛

右其為末每空心用酒調送一錢許漸服自消

槐花蕊用治梅毒不論初生與久癩早午晚時三次服下疳兼治是神方

治楊梅瘡下疳神方

凡棉花瘡毒及下疳初成或毒氣經久難愈者速用新槐蕊揀淨不必炒毒食前用酒吞下三

錢許早午晚每日三服服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也

金露散 蟬蚘天竺黃爐甘石煨水飛詳硃砂月石加水片目赤障翳腫痛良

治赤目腫痛翳障諸疾

天竹黃 海螵蛸 月石 硃砂 水飛

爐甘石 煨淨 七次飛淨

右為極細末磁瓶收貯每用時旋取數分研入水

片少許諸目疾皆妙 若治內外皆墮取一錢許

加珍珠八厘胆礬三厘研勻點之 若治爛弦風

眼每一錢加銅綠飛丹各八厘 如赤眼腫痛每

一錢加乳香沒藥各半分

二辛煎用石膏多少佐細辛氣味和口舌牙根腫痛

甚煎湯頻漱自然痊

治陽明胃火牙根口舌腫痛不可嘗先用此湯漱

之漱後傳以三香散或仍服清胃等藥以治其本

生石膏 北細辛

右二味用水二碗煎一碗乘熱頻漱之

冰玉散兮月石水蠶蚕惟有石膏增牙疳齒疳口疳

痛敷與吹之效足稱

治牙疳牙痛口瘡齒疳喉痺

生石膏 月石 冰片 蠶蚕

右為極細末小磁瓶收貯敷之吹之

冰白散研成細末杏冰銅綠人中白專敷口與舌皆

糜走馬牙疳也可拭

治舌糜爛及走馬牙疳等證

人中白 冰片 銅綠 杏仁

右為細末敷患處 此方按古法有以人中白七

分與枯礬三分同用者 又有以蜜炙黃柏與人

中白等分仍加冰片同用者是皆可師之法

代匙散用石膏月皂角胆礬冰片協蠶蚕草薄治喉

痺研和頻吹通頃刻

專治喉痺

月石 腦荷 石膏 胆礬

粉草 蠶蚕 冰片 皂角

右為細末用竹管頻吹喉中 加牛黃五分更佳

三香散裡用川椒冰片丁香方特超如少川椒草擦

代牙根腫痛立能消

治牙根腫痛

丁香 川椒 冰片

右為末敷痛處 如無川椒以草擦代之

二十四味敗毒散陳歸二地膝荆芎連翹羌獨兼甘
桔防已蘇皮薏木通白芷忍冬風芍藥黃連知柏黑
梔同楊梅瘡潰宜煎服加入土苓功自洪

當歸 川芎 生地 熟地

芍藥 牛膝 荆芥 防風

白芷 忍冬 桔梗 防已

羌活 獨活 薏仁 白蘇皮

連翹 木通 陳皮 粉草

黃柏 知母 梔子 黃連

二十四味敗毒散

右每貼加土茯苓乾者四兩鮮者須半觔用水六
碗煎三碗分三次每日早午晚各服一碗 右方
後四味須察其人陰陽寒熱酌而用之

外科證治全書

序

士人讀書明理期於世有所濟立功名以見重當時此體用兼備之學也若學成理明無意立名而慈祥之念無時無地不期於濟世此其品詣不又加人一等乎哉余觀倫聲許生外科證治一書而有感焉倫聲少嗜學經史而外房及諸子百家一名一藝之微手披目覽各有所得山居數十年怡然自樂不肯以學自炫閒因良善之家式微爲之指示趨吉脩方或嬰孩疾痛時醫束手爲之施送藥餌無不速效人始奇之由是名噪於士大夫間延訪遂眾辭之不獲已擇近地大山水處始一命駕人與之款洽言皆

外科證治全書

序

經濟文章絕不及他事庚寅春余遇於皖江郡城年逾八十白髮蕭疎神明弗衰非學養之醅耶嗣余權篆蕪關通尺素書邀其掉扁舟冒雪而來圍爐談論竟日叩其生平閱歷如郡縣學宮添建文峯高閣不周歲而人文蔚發是何神速倫聲則謙讓未遑謂吉凶皆盈虛消長自然道理一有趨避必干造物之忌若乃勝地名區善人多則吉祥自生趨吉之說皆事之適然相合非盡關人力也其言似謙其實有至理存焉臨別檢行篋余見有外科證治一書則續成其故友畢蒼霖未竟之業其部首分別陰陽證治其卷末並列急治五條共書五卷自記甚悉余益歎其品

學之優也書成不獨擅其美必推善於創始之良友其所分門別類者皆二十餘年歷試活人無算之實學非借著書立說以求聲譽者比余將遠別數千里外此書若仍攜歸恐久而失傳為借鈔副本付剞劂以質世之精醫理者雖曰小道亦足見倫聲所學之緒餘與濟人之素心云爾生名克昌和州國學生倫聲其字也時道光歲次辛卯夏月督樞使者雲夢程懷璟書於上海樞署

外科證治全書

序

二

自記

性好奇少時誦讀之暇訪求名醫著述見外證與小兒痘證兩門生死反掌非比內證尙可延遲待治聞東臺周舒軒先生精醫術往從學焉十餘年深究精思稍知梗概繼得鄭西賓痘證必讀雖集腋成裘而分門晰類瞭如指掌又得前明耿仁齋麻科明鏡遺稿惜乎殘缺過半為之增著刪繁分列四篇便於習學二書皆梓行於世第外證一書汗牛充棟偏執者多適中者寡有同人畢蒼霖者著外科證治闡發透澈於外證大有裨益蒼霖甫著兩卷年未三十而卒書成廢帙雖不敏廣集諸名家外科考證訪求效方立癰疽就簡於各證部之首分別陰陽臟腑經絡認證醫治歷試二十餘年診視送藥無不獲效四遠就醫者歲無虛日又增內景外因奇證蠱證中毒五條併立應驗藥方附於書末以備急用共成五卷非敢問世聊以備遺忘耳許克昌自識

外科證治全書

自記

三

序

有學問之醫有閱歷之醫外科古有專業無專書故閱歷為尤切漢唐作家十數然多亡佚無徵今其理則具於靈樞素問其病名治要則莫先於病源莫精於千金莫詳於外臺顧閱深奧衍未異通曉且時異事殊即方藥所載或至貴而驟不可得或甚賤而莫識其名是以精而用之者蓋鮮自後源流不一治遂多歧其專門名家大率由閱歷而進之學問者也近世外科證治一書不為高論一以陰陽虛實為之端法期簡要方必中和深有取於王氏全生集而刪繁補缺幾於明備覽之而得其歸用之而有其效

外科證治全書

序

視他書徒眩名目侈陳古義或不甚切於日用者有閒夫自武進曹畸菴有瘍醫雅言之述千金外臺將可以復明於世獨於宋後諸家等之自檜以下今以此書為礪矢則學問即閱歷閱歷亦學問泝流窮源庶無遺憾耳謹識其大槩以諭世之篤嗜斯道者
同治乙丑冬孝感屠仁守書於成都寓齋

重刻外科證治弁言

一此書創刻於吾鄉程玉農廉訪垂今三十餘年未見別本將來流傳必且益少蜀中同官諸君子相與贖資重刻誠為快舉

一蜀中論外科推王氏全生集為善本此書於全生集採摭尤備於其所不備者又皆大備故此書較全生集有過之無不及也

一此書初刻體例多未盡一舛錯尤甚茲刻屬知醫者再三警校凡是正二百餘條仍間有誤文實因無可勘據不若姑闕疑以傳疑

外科證治全書

弁言

二

一此書引用各家皆未注明來歷係是隨時甄錄意在得瘥而止茲刻亦不及徧考識者詳之

一附刻全生集醫案因與此書足相印證參閱良便

一此書不及丹藥茲得瘍醫雅言丹藥方簡明切要錄附於後以成完璧其意詳見識語中

同治丁卯仲春月京山易崇堦倥侗氏書

外科證治全書卷一

凡例

- 一 是書逐證措治條分部款甚詳其有證治同而部位名異者因立癰疽就簡於各部之首辨明紅白陰陽按癰疽治法便於查閱萬無一失
- 一 凡有方而僅治某證者則列於某證之後有方而通治諸證者則另立通用方類逐方排著不致雜亂其用藥分量俱備庶無臨證乖方之誤
- 一 人身臟腑陰陽各具形義經絡部位各分攸司猶兵家之地利也不知地利不可以為軍師不知臟腑經絡而克得為醫師乎歷來諸書經絡歌括文句參差聯章成誦辨晰為難今閱陳見飛先生小集中有外自頭目以至足內自心肝脾肺腎以及六腑筋脈景說次第成列良為盡善爰採以分列各部為學者便於因證參閱也
- 一 五善七惡歌是書本不欲取葢癰疽之初不過營氣壅遏衛氣鬱滯致成瘡腫因其勢而利導之皆屬善全何惡之有迨其日久潰腐或陰陽誤治或氣血衰羸則七惡蜂起斯時反惡歸善回天之力不可謂非醫家之責也茲錄二歌者一以畏矯古之譏一以備

吉凶之鑿耳願世之醫家勿以現有惡象盡誘不治苟有一綫可挽當參酌援之更以內科脈理詳審之庶不愧為仁術

一 世人以升降藥為外科拔膿之要藥殊不知升降藥乃鹽礬砂汞火力煅煉而成藥之霸道者也去瘀生新或有賴焉若證患日久氣血本已虛虧豈可任用霸劑必補氣血為主禁痛禁爛全生集中已切言之焉可忽諸凡外證之初起者消之痛痒者止之潰爛者斂之臨危者救之去瘀用平安餅鍼頭散生新用象皮散六和散獲效奏功百無一誤是知升降藥雖

外科證治全書卷一 凡例

二

- 一 有益而亦有損也故二方不入選用
- 一 各部癰疽證治分別陰陽言語每多重贅恐人偶一認錯為害不淺學者詳之
- 一 罕見罕聞之奇疾醫書亦不可缺載其按部位而患者分列部位其患無定處共集一類又如血擁號蟲等類者茲更集奇疾怪蟲兩門冀或偶有是病便於醫治
- 一 方藥所當炮製者須按本草照法精製不可忽畧如製番木髓等與本草稍異另附列製法於後
- 一 惡蟲證中有蟲證皆稟陰陽不和溼熱毒生凡有蟲

傷則於蟲傷門尋類推治

一 中毒類似與外科無涉要知醫乃仁術何在非救人之道即飲食藥餌亦有中其毒者待及求方問藥人命休矣故亦錄附卷後且可為養生者知所慎防云耳

一 是書採集羣書並經親見獲效其開折衷萃輯五易稿而始成癰疽證治皆所親驗苟依方脩合認證用藥洵使窮荒僻壤咸慶生全識者當不以鄙言為狂僭也

外科證治全書 卷一 凡例

三

外科證治全書卷一 目錄

卷之一

癰疽證治統論 癰疽部位名記

胃氣論 論腫 論潰

論斂 論痛 論痒

五善歌 七惡歌 飲食宜忌論

陽癰證治則例 陰疽證治則例 爛潰不斂治法

翻花起肛治法 患孔毒根治法 漏管治法

多骨治法 毒氣攻心治法 破傷風治法

發癰證治 瘡口誤入毒水治法

外科證治全書 卷一 證治目錄

四

瘡中生蛆生蟲治法

頭面證治 計十證 面部證治 計十六證 眼部證治 計廿三證

卷之二

鼻部證治 計十一證 耳部證治 計十四證 口部證治 計八證

唇部證治 計八證 齒部證治 計十七證 喉部證治 計十四證

誤吞類 八條

卷之三

項部證治 計五證 胸部證治 計三證 乳部證治 計五證

腋脇三部證治 計三證 肩部證治

膊臂手三部證治 計十八證 背部證治 計一證

腰部證治 計三證 腹部證治 計四證 前陰證治 計十證

後陰證治 計六證 股部證治 計四證 膝部證治 計四證

脛部證治 計九證 足部證治 計十六證

卷之四

發無定處證治 計四十證 內景證治 計八證

惡瘡證治 計五證 奇疾證治 計九證 怪蟲證治 計九證

外因雜傷證治 計三十人證

卷之五

通用法 計七法 備用法 計六法 通用方 計七十方

附中毒類 計五十條

外科證治全書 卷一 證治目錄 五

外科證治全書卷一

環峯許克昌倫聲

木末畢 法蒼霖 同輯

癰疽治法統論

問曰癰疽何為而發也答曰人之一身氣血而已非氣不生非血不行氣血者陰陽之屬也陰陽調和百骸暢適苟六淫外傷七情內賊飲食不節起居不慎以致臟腑乖變經絡滯隔氣血凝結隨其陰陽之所屬而攻發於肌膚筋脈之間此癰疽之所以發也曰然則癰疽有別乎曰癰者壅也邪熱壅聚氣血不宜其為證也為陽屬六腑高腫色紅焮熱疼痛而其發也必暴故所患浮淺而易治疽者沮也氣血虛寒陰邪沮逆其為證也為陰屬五臟漫腫色白堅鞭木痛而其發也必緩故所患深沈而難療此癰疽之所以別者然也曰然則其治之也當若何曰初起者審其證而消之成膿者因其勢而逐之毒盡者益其所不足而斂之此治癰之大旨也於是乎未出膿前癰則宣其陽毒之滯疽則解其陰寒之凝已出膿後癰則毒滯未盡宜托疔有寒凝未解宜溫既患陰疽雖在盛暑之時必用辛熱之劑以助陽氣如生陽癰雖在嚴寒之時必用寒涼之劑以瀉火邪不拘盛暑嚴寒但當舍時而從證也曰然則視

外科證治全書 卷一 癰疽治法統論 六

其外即可知其內歟曰吾聞之醫者意也有諸內則形諸外故四診爲醫家辨證之筌踞而望居其一是以外科之證形色可憑善惡可準一定而不移顯然而易見非若傷寒證有傳經之變也蓋色紅焮痛者實熱壅聚也色白陰痛者虛寒沮逆也憎寒發熱者表邪未解也口渴便秘者裏邪未通也紅活高腫者氣血拘毒於外也白塌漫腫者氣血冰結於內也根紅散漫者氣虛不能攝血緊附也不痛堅韌者血凝不能附氣流行也外紅裏黑者毒滯不化也紫暗不明者胃氣大傷而肌肉死敗也按之陷而不卽高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成也按之隨指而起頂已

外科證治全書

卷一

癰疽治法統論

七

軟而熱甚者膿已灌足也膿色濃厚者氣血強旺也膿色清淡者氣血衰弱也諸如此類審其外悉其內按其委瀾其源此所謂望而知之者也曰然則瘡疥之與癰疽同乎否有不發爲癰疽而發爲瘡疥者何也曰人之軀殼計有五層皮脈肉筋骨也發於筋骨間者疽是也發於脈肉間者癰是也發於皮腠間者瘡疥之屬是也大抵營衛不足溼熱邪風肥甘濁氣淫於肌膚留滯不散則瘡疥所由生或痒或痛或膿或水名類頗多治法不一熱則涼之溼則利之蟲則殺之風則散之燥則潤之滋之更宜戒沐浴以避溼氣忌厚味以清營衛而瘡瘥矣此所以較癰疽之證

治有大同而小異者焉噫人能慎養氣暢血盈不使形體有衰則癰疽瘡疥從何而發苟或不然百病叢生又豈惟癰疽瘡疥而已哉古人不治已病治未病非虛語也安得人人及乎其未病而治之歟

癰疽部位名記

紅腫曰癰白塌曰疽部位既殊稱名亦異在頭爲大頭毒於頭頂中爲玉頂發百會疽前額門際爲透腦疽側下爲侵腦疽頤門前爲佛頂疽於額爲額疽額角爲旁額疽腦後爲玉枕疽下爲腦後發爲對口腦疽偏爲偏腦疽爲燕尾魚尾毒爲腦鍊於髮內爲油風爲蛀髮癬白禿瘡髮際

外科證治全書

卷一

癰疽部位名記

八

瘡爲蠟梨瘡其於嬰孩也爲鱗瘡頭爲蠛蛄瘡在面爲面遊風爲肺風粉刺爲白屑風爲雀斑爲黑痣於眉爲鳳眉疽爲眉心疽眉尾爲瘰疽於眼爲時火眼爲掩纏赤眼爲眼丹爲偷鍼爲皮翻證爲眼疱痰核爲眼疱菌毒爲睛目中努肉爲椒瘡爲漏睛瘡於鼻爲鼻癰鼻疔爲鼻淵腦漏控腦砂爲鼻鼈爲鼻疔爲酒皸鼻爲鼻衄其下爲馬刀瘡於脣以上爲脣疽爲龍泉疽於脣爲脣風爲蘭脣爲反脣疔爲鎖口疔脣以下爲虎鬚毒於顴爲顴瘍顴疔爲羊鬍子燕窩瘡爲落下頰在鬢爲鬢疽爲勇疽爲顴疔在耳爲耳病耳竅內爲黑疔耳疔耳疔耳疔耳疔耳疔

梢後摺間為耳後疽耳摺間連耳輪通腫為耳發耳垂後為耳根毒耳後縫間為旋耳瘡耳後一寸三分高骨後左為天疽右為銳毒於腮為疔腮為發頤為頰瘍為頰疔為面發毒為凍風其口內於大人為口破口糜為牙癰為牙宜為牙疔為齒齲為風火蟲牙為齒齲為齒齲為骨槽風為舌腫為紫血脹為舌衄為重腭為痰核為舌疔為舌疔舌蕈瘰癧風為舌鞭生衣為痰包為重舌為喉痺為喉閉啞瘵喉風為弄舌為乳蛾蛾子喉風為纏喉風為鎖喉為喉癰為喉疔為喉珠為喉蕈喉癰為上腭癰為骨梗其於嬰孩也為鎖牙疔為走馬牙疔為垂癰為白口瘡為鵝口

外科證治全書 卷一 癰疽部位名記 九

瘡在項為結喉癰為雙發喉側為夾疔夾喉癰為落頭瘡為失榮為瘰癧為氣癰為氣癰為百脈疽項下顛骨陷中為蠱疽缺盆疽鎖骨疽項後為天柱疽稍下為脾肚癰其於婦人也為鈕扣風在肩正中為肩中疽肩穴中為肩擔肩前廉為乾疽肩後廉為過肩疽肩後腋外為膠疽肩梢尖為肩風毒肩前腋上骨縫開合坳陷中為樂疽於臑為臑癰為藕包毒臑後垂肉處為魚肚發肘尖上寸餘為石櫛疽當肘為肘癰於臂為臂癰臂疽臂外廉為骨蠹疽掌後橫紋上三寸為穿骨疽掌後橫紋上二寸為螻蛄串腕背面為腕癰腕裏面橫紋前梢動脈間為兌疽於手為手

發背為病蝦為掌心毒為痲瘡為鵝掌風為虎口疽丫叉毒為合谷疔為紅絲疔為手丫發於大指為調疽於指頂堅鞭有頭為蛇頭疔問腫無頭為天蛇毒指甲旁為蛇頭疔指甲後為蛇背疔指骨節為蛇節疔指裏面如魚肚為蛇腹疔一指通腫為泥鰍疽指甲身為代指為甲疽指骨節癰大為蜣螂蛀油灰甲為鵝爪風兩手及臂紅紫斑爛為狐尿刺其於胸也乳上肉高處為甘疽兩乳中央為顛中疽心窩中為井前疽心窩兩旁為脾發疽胸側乳上瘡孔多為蜂窩疽乳旁為疔癰癰其於內也為肺癰為胃癰為脾癰為肝癰為腸癰其於婦也為內外吹乳為乳巖

外科證治全書 卷一 癰疽部位名記 十

為乳疽為乳發乳癰為乳懸為乳中結核於腋為腋癰腋疽為暗疔為鴨蛋毒於肋為肋疽腋下三寸為淵疽肋骨延及腰胯為內發丹毒肋下軟肉為季腋癰疽在背上下為對肺發對心發對臍發為蓮子發為蜂窩發為酒毒發為丹毒發為連珠發為痰疔發為陰陽之氣疽為禽疽為肉龜黃瓜癰偏為上中下搭手背脇間為串疽其於腹也臍上七寸為幽疽上四寸為中腕疽胃疽上三寸為嚇疽上二寸為衝疽於臍為臍癰為臍中出水為腹皮癰偏為箭袋為少腹疽旁為緩疽其於內也為息賁為伏梁為疝氣為肥氣為奔豚其於孩兒也為臍突為臍瘡於腰為腎

俞發為蛇串纏腰火丹於腎為疔瘡久而偏潰為蠟燭瀉
為子癰為囊癰囊脫為腎囊風為懸癰腎囊後為穿襠發
大骹根裏側縫夾空中為跨馬癰小腹下陰毛旁結腫為
橫疔小腹下骹根上摺紋中左為魚口右為便毒陰毛際
為人腳蟲陰虱瘡其於婦人也為陰挺為陰腫為蚌疽為
陰蝕蠶瘡為陰脫為陰癰總名陰瘡在腎為腎癰為腎疽
為坐板瘡中尾骨尖為鶴口疽尻骨前肛門後為湧泉疽
肛門兩旁為臟毒肛門內外為痔瘡肛門前陰根後中間
為偷糞鼠潰經走洩為海底漏尻骨高骨畧上為坐馬癰
左臀下摺紋中為上馬癰右臀下摺紋中為下馬癰白為

外科證治全書

卷一 癰疽部位名記

十一

東瓜癰其於孩兒也為脫肛為肛門作痒在股外側胯尖
後為股陽疽在胯骨節間為環跳疽大骹外側為附骨疽
大骹裏側為咬骨疽股內合縫下近囊側為股陰疽右骹
夾陰縫摺紋中為陰疽大骹正面膝蓋上六寸高肉處為
伏兔疽大骹肚為肚癰大骹裏側近膝為箕門癰遠骹為
骹游風骹起雲片茄色腫鞭毒攻牙齦為青骹牙疔於膝
為膝癰為疔疽為膝眼風為鶴膝風膝兩旁為緩疽膝後
摺紋中為委中毒骹坳摺紋兩梢旁為上水魚膝腫似人
形為人面瘡於骹脛骹肚為腎氣游風膝眼下三寸外為
三里發小骹裏側長數寸為黃鯁癰小骹肚下長二三寸

為青蛇毒脛骨下足後根相接處為接骨發內踝上三寸
為附陰疽在內為走緩鞋帶疽在外踝為腳拐毒裏外踝
骨通腫不紅為穿踝疽生脛骨一二寸為溼毒流注繞脛
而生為瓜藤纏於小骹為流火小骹肚中為腓膈發骹肚
為魚肚癰孔如鑽眼黃水綿綿為鱗漏骹脛廉骨或裏或
外為膝瘡兩骹坳及兩腳灣為四灣風脛骨曲坳處為風
疽於腳骨為夾棍疽潰為驢眼足背為足背發足心為湧
泉疽腳底為牛程蹇足掌起如豆粒黃泡為田螺炮大拇
指爛為臭田螺足指色黑旁有紅暈為脫疽足無名指患
色白而痛甚為脫疽足指甲旁肉高起突為甲疽為肉

外科證治全書

卷一 癰疽部位名記

十二

刺雞眼足跗兩旁小如棗栗為厲疽癰足跗之前上下大
如癰為四注足攣跟為足跟疽足跟旁如棗栗黃腫若琉
璃為土栗足跟底起紫白泡為冷疔膝下足上腳氣於腳
丫為腳丫疽其於婦人也為裙帶風瘡至若發無定處者
為時毒為黃水瘡為惡核為石疽為癭癰為流注為疔瘡
為多骨疽為癩發為蛇瘡癰疽為大麻風為楊梅瘡為結
毒為血箭為疔為血風瘡為白駁風為血疔為赤白游風
為汗斑紫白癩風為癩瘍風為破傷風為發瘻為風疔為
頑癬為痔瘡為蛇風虱白疔為疥瘡為火赤瘡為貓眼寒
瘡為魚脊瘡為翻花瘡為漆瘡為天泡瘡為栗瘡作痒為

傲冬瘡為瘡癤為天火丹毒為瘡疽為痛風為痒風為毒氣攻心為瘡口誤入毒水為諸瘡生蛆蛆為暑令瘡毒小癩為體氣為黑子痣其於嬰孩也為遺毒爛斑為胎癩為痘癰痘疽為痘爛為痘風為奶癬胎癩瘡或跌撲為金瘡為杖瘡為夾傷為榜傷為湯火傷為鐵鍼入肉為箭頭入肉為竹木刺入肉為人敵傷為熊虎狼敵傷為馬敵傷為犬敵傷為豬敵傷為貓敵傷為鼠敵傷為蛇敵傷為蜈蚣敵傷為射工傷為蝎螫傷為蠅螫傷為蚯蚓傷為蜘蛛敵傷為羊棘子螫傷為蜂螫傷為蠶敵傷為壁虎敵傷為蜈蚣敵傷為螞蝗敵傷為蟻螫傷為砂虱傷為石蛭傷為海

外科證治全書

卷一

癰疽部位名記

三

水傷又其惡瘡也為天行瘡為頑瘡為癩瘡為罕瘡為無名瘡其奇疾也為血擁為棠梨炮為肉人為肢瘡為肉蝶為肉綫產婦腹中痒為氣旋為氣奔其怪蟲也為號蟲為厲虱為紅綫蟲為續命蟲為溼蟲為腐蟲為肉蛆為信蟲為月望蟲諸名有辨治證無訛初起未潰當觀現在之形已潰潰久須問初起之色初起色紅應施癰藥初起色白當用疽丹識證惟精奏效如響

胃氣論

胃屬土胃氣即土氣也土為萬物之源胃為養生之本胃強則人強胃弱則人弱有胃氣則生無胃氣則死甚矣胃

氣之關於人者不亦鉅哉經脈別論云食氣入胃濁氣淫於心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於腑腑精神明留於四臟此可知臟腑形體莫不皆有胃氣也凡證之規五善七惡者非臟腑胃氣存亡之明徵乎胃氣一失便為凶候故善治外證者無論大小輕重必先顧其胃氣察其能食不能食以驗之能食者胃氣強內顧無憂固可專治外證不能食者胃氣弱中州坐困禍起蕭牆必須先定內患令其能食待血氣有所資賴然後再治外證所謂本立而道生也然理脾胃者人只知薄荷荝草查撲麥牙之類為脾胃之藥而不知

外科證治全書

卷一

胃氣論

四

風寒溼熱飲食勞倦皆能傷脾如風邪傷者宜散之寒邪傷者宜溫之溼邪傷者宜燥之熱邪傷者宜清之飲食傷者宜行之勞倦傷者宜補之但去其傷脾胃之病即是理脾胃之正藥也奈何今之業外科漫守一二成方開口便云有毒概用寒涼漫施攻伐以致受害而斃命者不可勝數豈古方之不宜於今也抑藥證之大相背謬耶蓋不察其胃氣之強弱病因之虛實為何如耳且夫古人資稟樸質其從七情干涉者少而從風寒濕熱外感凝滯者多故證之初起每每用霸藥取效今之穿鑿太過七情六慾煩擾之甚而陰陽血氣無有不虧傷者亦偏用霸藥成方以

試之是投之於井而更加之以石也吾知其胃氣微虛者猶可出入而胃氣大虛者斷難假借也故曰癰疽外證肌肉之病所用之藥有病則病受之於脾胃何涉乎殊不知肌肉乃脾胃所主治藥乃胃氣所關肌肉不能自病脾胃病之諸藥不能自行胃氣行之諸藥入口必先入胃而後行及諸經以治其病也未有藥傷其脾胃而能愈病者亦未有不能運行飲食之脾胃而反能運行諸藥者也惟明鑒者察之

論腫

癰疽之起總由血氣壅滯所致如河渠淤塞者然苟使血

外科證治全書

卷一 胃氣論

論腫

五

氣流暢何癰疽之有故火毒壅滯則紅腫焮痛而成癰寒痰壅滯則白塌木腫而成疽癰作實熱治疽作虛寒治一目了然不俟診脈可知也及其壅滯既久變好血而成膿創好肌而破口苦矣哉當初未作膿之時亟隨癰疽證治消治之俾其痛止腫平安然暢適豈不快歟每見恃能刀鍼不細察病情當用刀鍼否漫云洩毒乃殺人不轉睫之徒也不但病人負痛已甚又何能堪此痛苦更有妄施刀鍼以致潰爛難斂七惡蜂起仁心仁術者諒不安為若此也

論潰

癰疽初起失治致肌膚潰爛凡癰將潰之時則先消其未成膿之地而潰不致於延爛既潰之後則補托其未盡之毒而潰不致於翻花有膿成而不自潰者虛人內服代刀散外用齧頭膏無有不潰如氣血壯盛皮肉粗厚之人即以鍼刺分許亦可但疽始終總以溫補開腠消解為治王洪緒先生云疽初起即見平塌安可用托托則致潰即流注瘰癧惡核等證倘有潰者仍不敢托托則潰者縱斂增出者又如何耶旨哉言也

洪氏曰凡大癰潰後世人往往投灸草灸者或用半灸半生殊不知內托散等方用人淺者非以補其虛不過以人

外科證治全書

卷一 論潰

論斂

六

淺助黃耆托毒之力而無補毒之害蓋灸者止補氣不能托毒灸草只補中不能解毒倘毒氣未盡誤投灸者灸草致毒反受補助大痛內攻將如之何余之治凡遇初潰大癰止其痛痛息則毒散其腫亦退色轉紅活體虛年老者淺耆甘草皆灸也如體旺家貧者無淺亦可收功

論斂

肌肉者脾胃所主收斂者血氣所關苟使脾胃強血氣旺則昨腐今生朝膿夕斂何致遷延歲月臭爛起肛受苦萬狀故曰初腫宜消其壅滯之漸既潰宜托其惡毒之餘毒盡宜斂斂之法但當大壯血氣純補脾胃不可泛敷生肌

之藥蓋毒盛自潰毒盡自斂如水到渠成不容矯強以圖速效若餘毒未盡妄敷生肌藥阻蓋毒氣反致延邊腐臭為害非淺果其痛失腫平色轉紅活而內補外敷不日可斂矣學者審之

論痛

諸痛皆由氣血淤滯不通而致凡寒熱虛實膿淤風氣皆能為痛不可不為之辨夫色赤焮痛者熱也色白痠痛者寒也不脹不悶揉按暫安者虛也又脹又悶畏人按按者實也痛如筋牽雞啄惡寒惡熱者膿也痛如肉拗氣抽微脹者淤也痛而走注者風也痛而刺脹者氣也諸痛如此而止痛之法要在臨病制宜熱毒之痛以寒涼折其熱而痛自息寒邪之痛以溫熱和其寒而痛自除因虛而痛者補其虛因實而痛者瀉其實因燥而痛者潤之因寒而痛者通之因膿血閉鬱者開之因惡肉浸潰者化之因陰陽不和者調之因經絡秘滯者利之隨機應變方為上上治法也

論痒

痒雖屬風亦各有因凡初起作痒者風熱相搏搔甚即痛是也潰後作痒者膿瀰冒風突起顆瘡是也將斂作痒者因初時肌肉結滯氣血不通至此氣血漸和助養新肉痒

若蟲行是也他如皮膚搔痒由血燥而風生疥癬延綿屬風淫而蟲蝕證有不同治有微別勿視為一類也

五善歌

心善精神爽言清色潤鮮瘡疼兼不渴寤寐兩安然肝善身體便睛明不怒煩指頭紅活色起坐自平安肺善聲音響無痰韻更長肌膚多滑潤大便自尋常脾善唇滋潤肢溫便不難膿稠無臭惡知味且加餐腎善誠為要水深火自降口和無燥渴小水得稀長

七惡歌

一惡神昏憤心煩舌燥乾瘡形多紫黑言語自呢喃二惡腰身強睛斜體自寒瘡頭流血水驚悸是傷肝三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脾敗不知疼四惡皮膚槁聲嘶韻不長痰多兼喘促鼻動肺將亡五惡成消渴昏眠體不伸形容多慘黑囊縮腎無根六惡身浮腫腸鳴嘔呃頻大腸多滑瀉臟腑並將傾七惡瘡回陷形如剝鱗同四肢多逆冷污水自流通

飲食宜忌論

古人治病雖賴乎藥亦資乎餌藥之所忌關乎人之死生餌之宜忌涉乎病之輕重餌者飲食之類也凡病人恣啖無忌以致證候因循反覆變態無常固然不可而每有斷

戒幾盡若一無可啖者亦不通之甚也夫飲食之所忌者以其與所患之證相妨者也如椒薑麪蛋煎炒博炙之屬俱能助壅動熱患陽癰者忌之瓜果梨柿生冷性寒之屬俱能損胃傷脾患陰疽者忌之雞鵝蝦蟹海味腥膻之屬俱能動風發痒患瘡疥者忌之其餘不與證相妨礙者以及猪肉腰肚海參老鴨蔬菜之品食之無庸忌也况大患潰後氣血兩虛脾胃並弱非有味之物何以滋補虧傷若徒恃區區無情之草木以為調理吾知其無病者且不可而謂其有病者為宜乎人之維身止此血氣血氣已虛不為迴護至胃敗陰虛枯陽燔熾七惡變亂而成敗證者是

外科證治全書

卷一 飲食宜忌論

九

誰之咎歟此乃醫家病家之積弊所以不可不亟講也至於忍餓傷精過飽傷氣茹冷成痞等類又惟在知命者自愛焉

陽癰證治則例

凡患色紅疼痛根盤寸餘者癰也毒發三四日尚未成膿以抑陽散通用五十七圍患外內以醒消丸通用四十七熱陳酒送服三錢其痛即止夜間得睡次日患皮起皺再一服全消如過四五日患將作膿亦以醒消丸與服消其四圍腫鞭痛息毒散此以大變小之法有膿之患頂取敵頭膏通用六十一貼加以代刀散通用三十九三錢酒服穿之或以鍼刺分許穿之以洞

天膏通用七十六貼不幾日收功如患盤數寸者或居背心腦後腰肚胸腋陰囊等險穴處則用五通丸通用五十三三錢醒消丸三錢早晚以敗毒湯通用二輪服皮皺痛止再服至愈倘潰即內托散通用三十八醒消丸亦早晚輪服

一初起兼發熱惡寒肢體拘急者散消飲通用十一主之待表證退再按前法治之

一潰後忽見惡寒發熱等表證者托邪飲通用十二主之待表退按前治法

一大便乾燥秘澀雖數日不解宜潤之不可下也潤腸煎通用十三主之如有表證只宜解表表解而裏自通設

外科證治全書

卷一 陽癰證治則例

十

仍不通投以潤腸煎

一大癰不論已潰未潰但發熱而不惡寒者此熱勝血也敗毒湯加四物湯通用二十三主之

一妊婦患癰不可與醒消丸以丸內有麝香故也宜以仙方活命飲通用一去山甲愈之如既潰餘毒未盡腫

鞭不消治以內托散去川芎加乳香沒藥

一醒消丸內麝香價貴如有家貧不能服者以仙方活命飲代之然不及醒消丸速效

陰疽證治則例

陰疽之形皆濶大平塌根盤堅韌皮色不異或痛或不痛

乃外科最險之證倘誤服寒涼其色變如隔宿猪肝毒攻
內臟神昏即死治之之法非麻黃不能開其腠理非肉桂
炮薑不能解其寒凝腠理一開寒凝一解氣血流行則患
隨消矣血氣不能化毒者則宜溫補排膿雖當潰膿而毒
氣未盡腫鞭未消亦仍以溫氣血開腠理為要大抵初起
患輕未經誤藥者可用加味二陳湯通用十八納陽和丸通用
同煎數服消之如曾經誤藥或皮色稍變須服陽和湯通用
五其甚者與犀黃丸通用早晚輪服潰後亦然如失榮惡
核石疽等證初起毒根深固者須更兼紫元丹通用開服
方能全消凡詳見於各部中宜同參用

外科證治全書 卷一 陰疽證治則例 三

一初起兼頭疼發熱惡寒肢體拘急等表證者先以保
安萬靈丹通用汗之或人蔘敗毒散通用去獨活加
桂枝一錢汗之待表證退按前法治之
一潰後忽見表證則以托邪飲通用加桂枝一錢煎服
少頃啜熱粥一甌暖臥微汗取效不可令大汗如未
效再進待表勢解須接補元氣用補中益氣湯加茯
苓半夏熟地最妙
一初起或潰後欲嘔而別無表證者胃氣虛也六君子
湯通用加炮乾薑主之
一潰後但惡寒而不發熱者陽氣虛也十全大補湯通用

二十 加薑附主之
一潰後見肺熱內熱證者陰血虛也四物湯通用去川
芎倍熟地加參朮地骨皮甘草主之
一大患久潰或膿血去多忽見發熱惡寒面赤煩燥口
雖渴而喜熱飲者此血虛發燥急以當歸補血湯通
三十 或當歸黃耆湯通用服之否則發瘡
一潰後口乾作渴飲水不歇小便頻數或淋瀝作痛或
舌上燥黃如金色者乃腎水枯竭心火炎熾此證最
惡急用加減八味丸通用以滋補之否則不救遲治
亦不救

外科證治全書 卷一 陰疽證治則例 三

一潰後喘促咳嗽脾肺虛也補中益氣湯去升麻加茯
苓半夏五味子主之或加熟地口燥者加麥門冬
一潰延日久病人脾虛氣滯者則先服六君子湯加芎
歸數劑滲朮草宜生忌炙待其飲食復常再按前法
治之凡經表汗後亦是治
一好飲之人每發酒毒如陰疽狀發無定處初起漫腫
內似結核不紅或淡紅重着板痛多有兼頭暈發熱
汗出嘔吐之證此元氣大傷酒毒熏蒸結滯經隧治
宜清利溼熱培補元氣內服加味解醒湯見發無定
外以赤小豆為末滾水或米醋調敷或以烏龍膏處癰發下

六敷之若誤投陽和湯小金丹等甘熱之藥輕則嘔吐膿血重則神昏發狂成瘰不救此證從前未經發明余歷視頗多特表揭於此毫釐千里生死攸關業醫者細心審辨焉

一凡色白大小陰疽忌貼洞天千槌鯽魚等膏蓋寒涼不利於陰疽且內有巴豆葶麻子未潰者則致潰已潰者貼則致命有孕者貼則墮胎故凡陰疽未潰者宜敷抑陰散通用既潰後宜貼陽和解凝膏通用

一犀黃丸通用小金丹通用內有麝香妊婦忌服當以陽和湯愈之愈後再服三四劑以代小金丹永杜後患

外科證治全書

卷一 翻花起肛治法

三

一 小兒不能服煎劑者以小金丹化服代之

爛潰不斂治法

凡潰爛不堪之患外用藥湯通用洗淨撒山蓮散通用內

以洞天救苦丹通用每服三錢陳酒送服醉蓋取汗隔兩日又送一服再隔兩日再送一服所空隔之兩日以醒消

丸通用每日服後毒水流盡七日後再服醒消丸兩

次接用大棗丸通用每日早晚各進五錢最危險者可奏奇功

翻花起肛治法

凡癰疽年久不斂定致翻花四圍起鞭肛治之取老蟾破腹連雜以蟾身刺數孔貼蓋患口輕者日易一次重者日易兩次貼蟾之日內服醒消丸通用每服三錢陳酒送下止其疼痛三日後毒盡再服醒消丸通用消其翻花輭其鞭肛功效不凡也如大患初潰者亦如前法其毒則從蟾孔出倘肛口鞭患孔深取活牛蒡子草根枝葉或取紫花地丁嫩草搗爛塗入肛內皆能拔毒平肛

患孔毒根治法

凡爛孔有惡肉凸起名曰毒根往往有用降藥爛去者乃庸醫之誤也獨不知弱體豈可增痛况爛去仍又長出安

外科證治全書

卷一 患孔毒根治法

毒

可再爛耶凡遇此證宜貼平安餅通用外以膏藥掩之一日一易輕者二三日重者六七日不疼不痛毒根自落貼

時日服內托散通用俟毒根落後服保元湯通用四物湯通用收功

漏管治法

潰後一經夢遺走洩即成漏管如其素有此疾則先以加減六味丸通用愈之再治其漏法用附子餅豆豉餅通用

法隨患大小灸之令微熱不可令痛乾則易之每灸二三十壯灸後以消管錠通用或鍼頭散通用紅入管內化之

如未知內之深淺可先以豬鬃探之然後用綿紙捲藥為

搥量其大小深淺塞入日易日塞至愈乃止

多骨治法

無論老少皆生多在牙床頰下手足骹膊等處因潰久毒氣流連外被寒邪襲入與膿毒凝滯藉人氣血化成法用推車散通用吹孔內如有骨次日不痛自出吹過週時無骨出則知內無多骨也大進溫補消痰之劑不致復生多骨

一小兒初生身肉之中按之有如脆骨由受胎時精血交錯所致迨其人長大後其脆骨處必然發腫生疽及潰後多骨脫出其口方收此乃胎元結成稟賦自虛不可強取

外科證治全書

卷一 多骨治法 毒氣攻心治法

三

候其自破則取之治法皆同

毒氣攻心治法

凡大瘡毒氣內攻多由藥誤乃受降藥毒定致神昏煩燥惡心嘔吐等證急用生甘草一兩煎濃汁調護心散通用令病者時刻呷呷至大半自然嘔止神清然後接服醒消丸通用以平其勢

破傷風治法

破傷風者因跌撲金刃傷破皮肉及新久諸瘡未合口失於調護風邪乘虛襲入經絡宜亟治之如遲則邪陷三陰頭目青黑額上汗珠下流目瞪身汗如油腹滿自利舌卷

囊縮皆莫救矣要在初受風時其證發熱惡風筋脈拘急牙關緊急傷口鑄澀腫脹或四圍起粟作痒此風熱尙鬱在表急取玉真散通用四十二錢溫酒調服蓋被暖臥一時許即可消散如入裏勢甚舌強口噤項背反張口吐涎沫不省人事四肢抽搐無有甯時者取玉真散三錢用童便調服雖有瘀血亦愈至於昏死心腹尙溫速進玉真散二服亦可保全其患口以熱童便洗淨生南星爲末糝之或以水調塗之出水方妙待風邪勢平接進榮養氣血之劑八珍湯通用爲宜

發瘧治法

外科證治全書

卷一 破傷風治法 發瘧治法 瘡口誤入毒水治法

三

癰疽發瘧敗證也勢類破傷風牙關緊急四肢強勁腰背反張肢體抽搐有汗曰柔瘧無汗曰剛瘧皆緣癰疽大潰亡血過多筋無所養治宜大補氣血用十全大補湯通用手足逆冷加桂附倘誤作中風則速其危矣

瘡口誤入毒水治法

瘡潰未合誤入皂角汁毒及一切污穢毒水復致患口焮腫疼痛先以藿香湯洗淨用白礬桃丹炒等分細末撒之或烏梅嚼爛塗之亦可如患者疼痛切骨煩悶發昏恐毒內攻則用馬齒莧五錢酒煎飲之盡醉取效

瘡中生蛆蟲治法

夏日諸瘡潰爛失於洗滌積膿污穢致蒼蠅叢聚生蛆用
皂礬水飛末糝之其蛆卽化爲水或以鹿角燒灰醋調塗
之或以柏枝燒瀝取油塗之亦有冬月瘡潰生蛆者陰溼
所化也治法亦同

外科證治全書 卷一 瘡中生蛆蟲治法 毛

頭部證治

大頭毒

鱗瘡頭

鬚毛瘡

禿瘡

蛀髮癬

肥瘡

白屑風

油風

腦蝕

頭響

筋脈

巔

頭頂也巔骨

俗名天靈蓋 足厥陰肝脈與督脈會於巔足太陽膀胱

脈交巔足少陽膽脈交巔

腦

髓也

足少陰腎筋屬海髓足太陽膀胱脈絡腦角兩

筋核 足少陽筋皆直上頭角

外科證治全書 卷一 頭部證治 未

額

髮際之下兩眉之間

足陽明胃至額顙手陽明太陽筋

上額左角手少陽三焦筋結額上角足太陽膀胱筋下

髮足少陰腎主之

癰疽就簡

百會疽

亦名玉頂發生巔

佛頂疽

生額門

勇疽

亦名腦發

生目小

昔之後五分

童子腦後玉枕骨上

疽

生左右

額疽

生額中

旁額疽

生額左

玉枕

生額上

之侵腦疽

之侵腦疽

生透腦前

腦鑠

生腦後

風府穴

透腦疽

生百會穴

門上小兒患

俱按癰疽則例治之

大頭毒 俗名六頭傷寒

頭目赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒咽噎填塞
牙關緊急涕唾稠黏飲食難下不得安臥此乃寒覆皮
毛鬱遏經絡不得散聚而為腫宜以苦溫之劑溫之溫
經散寒用托裏溫經湯依方服之以薄衣覆其首以厚
被覆其身臥於暖處使經血溫腠理開寒氣散陽氣升
大汗出後腫減八九再去麻黃防風加連翹牛蒡子全
愈

一凶荒之際疫氣流行凡患如前證而家家戶戶傳
染者當按後面部時毒之法治之

外科證治全書 卷一 頭部證治

托裏溫經湯

麻黃 五分或八分 升麻 五分 防風 乾葛

人參 白芷 當歸 白芍

甘草 蒼朮 各一錢

右水二鍾煎一鍾服臥暖處得汗乃散或加柴胡

鱗瘻頭 瘻久名

患生嬰孩頭髮內腫塊不紅初起往往錯認跌腫至高
大作方知覺醫者每以為頭屬陽漫用清涼解毒是以
潰者內膿復瘻增出不一不知此患色白其膿不紅乃
陰寒虛弱之證也宜用小金丹療之初起三服乃消潰

後七丸而愈外貼陽和解凝膏如能服煎劑者則以加
味保元湯加當歸熟地服之尤善

小金丹 通用五十二 陽和解凝膏 通用七十七 加味保元湯 通用二十九

髮髮瘡 又名髮際瘡

生頭上及頂後髮際頂白肉赤狀似葡萄痛如錐刺痒如
火燎破流膿水亦有浸淫髮內者惟胖人多生之乃內
鬱溼也宜貼以黃香餅

黃香餅

黃檗 一兩 乳香 三錢

右各末共研槐花煎水調作餅貼之

外科證治全書 卷一 頭部證治

禿瘡

生頭皮上初起小者如豆大者如錢其痒難堪撓破出水
結白膿痂日久延蔓成片髮盡根絕此證多係胎毒宜
用防風通聖散料以醇酒浸透焙為細末每服一錢或
二錢量其壯弱用之食後白滾湯調下服至頭上多汗
為驗外於雜頭後煎滾水沖灰湯溫洗敷掃蟲散敷後
不可再洗日日敷藥至愈乃止

防風通聖散 通用 以八劑作一料 生甘草倍用

掃蟲散

獨核肥阜 一個分開去核以洋糖填實內入巴豆仁 每片兩粒半仍將肥阜合好外用綫紫包

泥包固火煨取出冷輕粉末
定去泥研為極細末
檳榔 各八分

右藥共研細末香油調膩敷之
附方 存驗

大楓子仁 木鼈子仁 蛇牀子 各五錢
輕粉 三錢

右藥共研細末麻油入小鍋內熬至滴水成珠調之以
刀刮去瘡痂花椒湯洗淨將藥敷上日敷一次八日愈

附方 存驗

藜蘆 一兩

右研極細末豬脂調塗之

蛀髮癬

外科證治全書 卷一 頭部證治

三

頭上漸生禿斑久則運開乾枯作痒由陰虛熱盛雍頭時
風邪襲入孔腠搏聚不散血氣不潮而成用生木鼈切

片浸數日入鍋煮透煎湯雍頭後洗之搽蜈蚣油至愈
乃止又法用草烏連皮切片炙脆研粉醋調日塗三次

數日愈

蜈蚣油

大活蜈蚣 三條用茶油三兩浸
四五日後以油聽用

肥瘡 俗名黃水瘡

隨處可生而生於頭面者居多初如粟米痒而兼痛破流
黃水浸淫成片乾則結成堆痂屬脾胃溼用白明礬研

粉鋪綿紙上捲作長條打成結子幾個入茶油浸透放

鐵篩上用火燒結結內油滴下以碗盛之燒至枯將諸

結研粉秤之加製松香末等分共調油內熱以拂瘡早

晚兩度五六日愈或以花椒湯洗淨擦繡毬丸亦效或

以六一散加枯礬麻油調搽每六一散一兩入枯礬二

錢立效忌食肉蝦蟹一切動風助熱之物食則延開難

愈

繡毬丸 見發無定處瘡疥

白屑風 又名白駁

生髮內初起微痒久則漸生白屑疊疊飛起脫之又生此

外科證治全書 卷一 頭部證治

三

風熱所化也用零陵香官白芷等分煎汁俟冷入雞子
白攪勻日塗二次或以二味浸油飾髮香澤異常且不

起屑如有延生面目耳項燥痒者當與後面部油風參

治

油風 又名鬼雜刺 俗稱落髮

頭髮乾枯成片脫落皮紅光亮痒甚由血燥有風所致夫

髮為血餘腎主髮脾主血髮落宜補脾腎故婦人產後

脾腎大虛多患之丹溪云脈弦氣弱皮毛枯槁頭髮脫

落黃耆建中湯主之髮脫落及臍下痛者四君子湯加

熟地黃鹿角膠每日清晨用醇酒化服三錢至於外治

方法雖多而錯節盤根還當內治

一白禿無髮用川椒四兩酒浸收瓷器內蓋好不洩氣日以搽之

一赤禿無髮用牛角羊角燒灰等分豬脂調敷

一病後髮落用猴棗野薔薇枝煎汁刷之

一髮禿不生用嫩棗樹皮一把斫一尺許滿插空瓷瓶內勿令到底上面以火然之則下面必有汁滴瓶內

先以熱水洗頭後將此汁刷在禿處即生髮矣

一毛髮黃赤用羊矢燒灰和臘豬油塗之日三次夜一次至髮黑乃止

外科證治全書 卷十一 頭部證治 毒

一髮槁不澤用木瓜浸油梳頭或用胡麻油常塗之梳

須用黃楊木者佳

一年老髮白當拔去白髮以白蜜塗毛孔中仍用梧子

搗汁塗之必生黑髮又方青殺羊矢納鯽魚腹中瓦

缶固濟燒灰塗髮易生而黑甚效

一頭上生虱用水銀同茶葉漬溼搗和不見水銀塞髮

內數日即盡又方用銅綠明礬摻之或用藜蘆末摻

之俱妙

黃耆建中湯

桂枝木 一錢 炙甘草 一錢 芍藥 三錢 黃耆 五錢

膠飴 一兩 大棗 六枚 生薑 一錢

右水煎去滓入膠飴微火上燉和溫服方以甜故也

四君子湯 二十

腦蝕

腦中痛若有蟲蝕食髓者用桃葉作枕枕之其蟲自鼻出

頭響

頭響乃氣挾肝火八味逍遙散主之 十五

亦有頭內如蟲蛀響名天白蟻用茶子研細末吹鼻中

即效

外科證治全書 卷十一 頭部證治 毒

面部證治

時毒

面腫

面瘡

疔腮發頤

疔瘡

面游風

面塵

雀斑

黑痣

眉核

眉瘡

眉稜骨痛

眉跳

落下頰

燕窩瘡

面皮破

筋脈

面頭前五臟之精氣上熏於面顴骨之下迎香穴之外為

面中央應乎手陽明大腸兩顴之內面主之上應乎手

外科證治全書

卷一 面部證治

五

太陽小腸其脈循頰上頰目下斜終於顴山

眉目關足厥陰肝脈從目系過眉上額足少陽膽筋脈過

眉角

顴骨為骨本即面兩腎主之足太陽膀胱足少陽膽手陽

明大腸筋皆結顴足陽明胃經合顴太陽小腸脈經顴

顴骨穴在頰下銳骨端陷中

頰耳前顴側面手陽明大腸脈筋俱上頰手太陽小腸脈

上頰足陽明胃脈循頰而上足少陽脈俱過頰足厥陰

肝脈下頰手少陽三焦筋過曲頰脈亦交頰

頰肉之空轉處也手太陽小腸筋結頰足少陽膽筋脈

俱過頰

人中鼻柱之下唇之手陽明大腸脈交人中督脈人中水

溝穴

髭在口上大腸主之血氣盛則髭美衰則無髭

鬚在口下大腸主之血氣盛則鬚美衰則無鬚

髻在頰胃主之血氣盛則髻美而長血少則髻短氣少則

髻少血氣皆少則無髻

癰疽就簡

顴癰顴疽生顴骨頰癰生耳下頰鳳眉疽生眉稜骨眉心疽生

眉中開又虎鬚毒生下唇之下中央又俱按癰疽則例治

名印堂疽虎鬚毒名頰癰又名承漿疽按癰疽則例治

之

一形小如豆色紫頂焦或如泡痲痒木痛惡寒發熱者

疔也當按疔瘡治法如生人中正中名龍泉疔尤惡稍

遲多致不救

時毒

時毒者四時不正之疫氣而感於人也初覺憎寒發熱恍

惚不甯肢體痠疼或兼咽痛次發腮項頰耳前後腫

盛無頭或似結核或兼起疙瘡甚至頭面俱腫焮赤疼

痛口舌乾燥咽喉不利常見年歲凶荒芻蕘之人多患

之乃飢飽不時胃氣有損邪氣乘虛而入客於心肺之

開上攻為患宜從輕治安裏為主兼升散解毒用普濟
消毒飲最善如不應則宜砭去惡血仍投前藥即應更
於鼻內啗通關散取十餘噓即效若啗藥不噓及神昏
喉塞語言不出者不治凡左右侍病之人日日用啗藥
取噓始不傳染此預防之法也

閱諸書治法凡初起耳項腫痛狀似傷寒惡寒發熱者
人淺敗毒散微汗之兼口渴大便結表裏俱實者防
風通聖散疏利之無表裏證或已汗下腫不消者小柴
胡湯加連翹元淺桔梗薄荷鼠黏子天花粉或加酒炒
黃連和解之如已汗下解毒不消勢將作膿氣弱難潰

外科證治全書 卷一 面部證治

者用消毒托裏此皆古人治時毒之法錄備參用

普濟消毒飲

- 黃連 五錢 酒炒 黃芩 五錢 酒炒 橘紅 二錢 元淺 二錢
- 生甘草 二錢 人淺 三錢 連翹 一錢 馬勃 一錢
- 鼠黏子 一錢 薄荷葉 一錢 板藍根 一錢 桔梗 二錢
- 白殭蠶 七分 炒 升麻 七分 柴胡 二錢

右為細末半用湯調時服之半用蜜丸噙化之服盡
即愈或加川芎當歸咬咀三五錢水煎稍熱時服
之如大便鞭加熟大黃一錢或二錢以利之

消毒托裏散

- 黃耆 人淺 白朮 當歸
- 白芍 川芎 甘草 白芷
- 金銀花 熟地黃 數分量 用之

通關散

右水煎分瘡之上下食之前後服之

細辛 用真者藥店每以馬鹿香草亂之 薄荷 豬牙皂角

右等分為極細末以紙燃少許入鼻內候得噓口開隨
進湯藥一方止用二味無薄荷

人淺敗毒散 通用 防風通聖散 通用 小柴胡湯 通用

面腫

外科證治全書 卷一 面部證治

面腫有虛實虛腫者形羸脈弱無痛無熱面目浮白或兼

氣喘乃大虛之候用八珍湯十全大補湯主之實腫者
形強脈壯紅腫面熱煩渴或按之痛乃陽明壅實風熱
上攻小兒多有此證宜用防風通聖散甚者以木香檳
榔丸下之外以杏仁杵膏塗腫處

一因飲酒過度溼熱上蒸面腫者用四君子湯加藿香
葛根滑石天花粉主之

一甌上熱氣熏面腫痛者用炊布燒存性敷之
木香檳榔丸

- 木香 檳榔 青皮 醋炒 陳皮 炒

枳殼炒 黃檗酒炒 黃連吳茱萸湯炒 莖朮以上各五錢醋煮

三稜五錢醋炒 大黃酒浸一兩 香附 黑牽牛各二兩

右用芒硝水丸每服一錢或二三錢量虛實服

八珍湯通用二十五 十全大補湯通用二十六 防風通聖散通用二十七

四君子湯通用二十

面瘡赤名面發毒

生面上頰車骨初起一個漸發數個形如赤豆色紅焮腫

疼痛堅硬似疔時浸黃水係肺胃風邪內用地榆山梔

紫草薄荷各二錢枇杷葉去毛五錢生甘草一錢竹葉

二十片水煎熱服外取柳葉湯洗面土瓜根汁塗之或

外科證治全書卷一 面部證治 瘡

杏仁研如泥雞子白調敷之

一有瘡如水痘延蔓遍生者用黃檗一塊豬胰塗炙酥

為未溼者乾溲乾者麻油調搽

一婦人面起細瘡名粉花瘡用定粉五錢菜油調泥梳

內以艾葉燒煙熏之候煙盡覆地上一夜取出搽之

且無瘡迹

疔腮又名含腮 發頤又名汗毒

患生於腮有曰疔腮有曰發頤當分別治之腮內痠痛者

疔腮也以赤豆散敷之病後兩頤發腫不作痠痛者發

頤也宜表散風毒用白芷天麻防風荆芥各一錢陳酒

煎服醒消丸三錢即愈

赤小豆散

赤小豆一味研細末米醋調敷立愈

醒消丸通用四十七

疔瘡

面上起紫炮名疔瘡係肝火用四物湯加胡黃連柴胡甘

草膽草黃芩人蔘煎服外取鹿角尖磨濃汁厚塗之

一生紫塊疙瘩大如錢或滿面俱有漸成麻風用牛舌

草根四兩取汁穿山甲十片燒存性川椒末五錢生

薑四兩取汁研和細絹包擦如藥乾加醋調連擦數

外科證治全書卷一 面部證治 面游風

次即愈忌食動風物

面游風

初起面目浮腫燥痒起皮如白屑風狀次漸痒極延及耳

項有時痛如鍼刺溼熱感者浸黃水風燥感者乾裂或

浸血水日夜難堪治宜養血潤膚飲兼六味地黃丸早

晚輪服十餘日取效外用生豬脂頻潤抹之或用鰻鱔

魚汁取油塗之

養血潤膚飲

當歸三錢 熟地 生地 黃耆各四錢

天冬去心 麥冬各二錢 升麻 片苓各一錢

桃仁泥 紅花 各六分 天花粉 一錢五分

右水煎溫服如大便燥結加火麻仁郁李仁各五錢如

風感痒甚加明天麻一錢五分

面塵 又名黑斑 又

面色如塵垢日久煤黑形枯不澤或起大小黑斑與面膚

相平由憂思抑鬱血弱不華外用玉容散每早晚蘸以

洗面內宜疏膽氣兼清肺加味歸脾湯送六味地黃丸

主之有女貞散一方方理頗佳附錄備用

一有好食斑鳩而致者初面生黑斑數點日久面俱黑

蓋斑鳩常食半夏苗以中其毒故也用生薑一味搗

外科證治全書 卷一 面部證治 聖

取汁將渣焙乾研細即以汁黏丸每日早晚服二三

錢一月可愈

女貞散

黃丹 水飛去鹽砂炒透 攤地出火氣用 紫苑 真者

右二味等分爲末每服二錢日兩服陳酒下

玉容散

甘松 三奈 茅香 各五錢 白僵蠶

白芨 白蘇 白附子 天花粉

綠豆粉 各一兩 防風 零陵香 藁本 各三錢

肥阜 三錢 去皮弦 香白芷 一兩

右爲細末每日早晚蘸末擦面

附方 存驗

殺羊脛骨

右爲細末雞子白調敷日以白梁米泔洗之三日效

加味歸脾湯 通用三 六味地黃丸 通用四十三

雀斑

生面部碎點無數其色淡黃或淡黑乃腎水不榮於上浮

火滯結而成內宜服六味地黃丸以滋化源外用玉容

散早晚擦洗自愈

六味地黃丸 通用四十三 玉容散 見前

外科證治全書 卷一 面部證治 聖

黑痣

形如微點小者如豆比皮膚高起一錢有自幼生者有中

年生者係經絡之血滯於衛分陽氣束結而成用錢鍼

撥破痣頭以膏點之不可太過恐傷好肉三四日結痂

其痣自落須戒醬醋愈後無根

點痣膏 一名水晶膏

礦子石灰五錢爲末濃蘸水大半茶鍾浸之以蘸水

高灰二指爲度取糯米五十粒撒於灰上如蘸水浸

乾陸續添之泡一日一夜冬月兩日一夜將米取出

搗爛成膏先以錢鍼撥破挑少許點之點多恐傷好

肉

眉核

眉閒生核初如豆日久漸大如桃宜養肝血清肝熱益元氣用逍遙散犀黃丸日服消之外以生南星末葱汁調敷

逍遙散通用

犀黃丸通用

眉瘡

眉叢生細瘡如疥作膿破流黃水結痂小兒多患之用穿山甲前膊上甲炙焦爲末入輕粉少許研勻茶油調搽即愈又方用蒜瓣燒灰燈蓋油調搽

外科證治全書

卷一 面部證治

聖

一眉毛脫下用橄欖核火煨存性研細麻油調火上燉微熱以指頭蘸油於兩眉不住揩抹又方垂楊柳葉陰乾爲末用薑汁於鐵器中調之夜夜摩抹俱效
一眉毛不生用白芥子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次即生

眉稜骨痛

眉屬肝肝脈從目系上額肝膽相表裏足少陽風熱與痰則眉稜骨痛用加味逍遙散加天麻防風半夏治之熱盛者加黃芩兼頭惡寒者去白芍丹皮梔子加川芎羌活

一有眼不能開晝靜夜劇是溼痰則用二陳湯加蒼朮枳殼蘇子

一有肝虛血少纔見天明眉稜骨疼用四物湯加甘菊鮮首烏挾風加羌活防風有熱加丹皮黃芩

加味逍遙散通用

二陳湯通用

四物湯通用

眉跳

眉跳者眉毛搖動目瞪不能視喚之不應但能飲食乃奇證也用蒜三兩取汁酒調服

落下頰

落下頰乃氣虛之故不能約束機關也令患者平身正坐

外科證治全書

卷一 面部證治

器

以兩手托住下頰左右大指入口內納槽身上端緊下頰用力往肩下捺關竅向腦後送上即投關竅隨用絹帛兜頰於頂上半時許去之即愈又方用烏梅一枚含燕亦可自上

燕窩瘡

生於下頰初如粟如豆色紅熱微痒痛破津黃水頗類黃水瘡但疙瘡如攢耳係脾胃溼熱宜服芩梔平胃湯外搽碧玉散

芩梔平胃湯

蒼朮二錢

甘草五分

厚樸一錢二分

陳皮一錢二分

黃芩一錢五分 山梔仁一分

右水二鍾煎八分食遠服

碧玉散

黃檗末 紅棗肉焙乾存性為末

右等分加枯礬減半共研細末香油調敷

面皮破

凡面皮跌破及抓破用人乳頻塗立結靨即日愈或生薑自然汁輕粉末和塗

外科證治全書 卷一 面部證治 罌

眼部證治

目赤腫 內障 外障

迎風流淚 目痒 暴盲

雞盲 赤眼淹纏 爛眼

拳毛倒睫 偷鍼眼 眼丹

眼瘤 眼疔 皮翻證

眼胞痰核 椒瘡粟瘡 漏睛瘡

肝脹 血漬 眼翳

小兒目疾 瞇目

筋脈

外科證治全書 卷一 眼部證治 罌

睛窠一名目胞即兩目外衛之胞也 血之精為目窠之總絡

瞳神俗名瞳人 屬腎為骨之精腎水虧損英華不斂則瞳神散大無光

黑眵瞳人屬肝為筋之精內連目系 內廉深處目睛入腦之系 肝火上

沖則兩輪赤痛

白眵黑輪外四圍白處 屬肺為氣之精肺火上騰則白眵有紅筋

目網即上下目胞之兩輪又名目睫 屬脾為肌肉之精足太陽膀胱細筋

散於目上網足陽明胃細筋散於目下為目下網

兩眦近鼻之眼角為內眦亦名大眦近鬢之眼角為外眦亦稱外眦 屬心為血之精手太

陽小腸支脈至內眦足太陽膀胱脈起內眦手太陽小

腸手少陽三焦筋脈俱至銳皆足少陽膽脈起銳皆筋亦結內皆

睫毛脾胃主之

淚肝主之肝風動則淚出淚熱肝實淚冷肝虛

治目大要

目有專科諸書多畧之然有他證兼患目者治目之道安可不明夫五臟六腑之精氣雖皆上注於目大要則在三經肝開竅於目故論目必首肝然有心神散亂卒見非常之怪或精散視歧觀一物為兩則心又為目之大關蓋諸脈皆屬目心主脈者也而脾又為諸陰之首五

外科證治全書卷一 眼部證治

聖

臟六腑皆稟脾氣上貫於目而為明脾胃虧損臟腑之精氣皆失所司不能歸明於目矣細辨虛實再辨虛實之在氣在血暴發在表為實久病在裏為虛虛者昏暗黑花瞳散在氣則迎視物不明在血則瘦乾枯少潤治宜養肝血安心神尤必先理脾胃實者赤腫脹痛翳膜眵淚治宜除風散溼涼血平肝此治目大要也點洗之方只宜辛平若用寒涼阻逆之致邪熱內攻反成翳障及妄將冷水冷藥冷物澀洗致昏瞎者有之不可不慎

目赤腫

目為肝竅目病宜歸肝凡紅赤腫痛及少壯暫得之病皆

作肝實血熱治肝為相火治當益陰陰旺而相火自平肝主風木又為外邪合之則腫而痛治當散邪邪去而內風自息閱坊書眼科多用苦寒辛散等藥非所宜因治復目湯一方藥雖平淡而屢用屢效蓋目為五臟六腑之精氣不堪投猛峻藥外治則用丹砂散點之最為穩妙

一有時火暴甚而赤痛異常者用雞子黃連膏點眼皆勿令緊閉待熱淚湧出數次即愈

一凡年及中衰或酒色過度目無腫痛但羞明昏暗視無力眯痛如摳等證則皆屬肝腎之不足也治參

外科證治全書卷一 眼部證治

聖

內障條

一損目破睛用牛口涎點之如睛突出者急揉進日點

二次須避風即黑睛破者亦有可愈

一眼目被打傷青腫者用生半夏為末水調敷之

復目湯

當歸 二錢 赤芍 二錢 大熟地 五七錢 或生地

黃芩 一錢五分 薄荷 二錢 甘菊 二錢

甘草 五分 川芎 一錢

右水煎食後臥時稍熱服 痒加蟬退防風各一錢五

分 腫加羌活木通各一錢 痛加酒連五分山梔

仁一錢 翳膜加木賊刺蒺藜各二錢柴胡一錢或
八分 傷酒加葛根二三錢 目眩夜痛加夏枯草
香附各二錢 目中赤脈加蜜蒙花二錢 白睛上
紅不退加桑白皮三錢 兩瞳痛去川芎加澤瀉一
錢五分鹽炒黃檗一錢 肝虛淚多加鮮首烏五七
錢或一兩 紅腫而不羞明者加山萸肉杜仲各二
錢 腫痛兩眼如桃合而為一痛不可忍者先用防
風通聖散下之然後服此方加連翹蔓荊子各一錢
五分

丹砂散 此李時珍方也

點治諸眼皆妙

外科證治全書

卷一

眼科證治

果

海螵蛸 去殼皮

蘆甘石 上好者煨碎童便浸七次飛用

硼砂 各一兩

辰砂 水飛五錢用此則不枯

右研極細末如灰瓷瓶收貯臨用少加冰片研點

二百味草花膏

羯羊膽 一枚

白蜜 五錢要真白蜜未用上白洋糖兌過者

右將膽汁同蜜和勻椀盛蒸稠如膏瓶收每用少許點

之如日久藥乾用人乳潤之

雞子黃連膏

雞子 一枚

黃連 粗末一錢

右將雞子開一小竅取雞子清以瓷椀將黃連末子糝

於雞子清上用筋徹底速攪打數百使成浮沫約得
半椀許傾出清汁用點眼皆勿得緊閉眼胞擠出其
藥待熱淚湧出數次即愈內加冰片少許尤妙 按此
火眼暴赤疼痛熱在膚腠淺而易解者點數次可愈
如熱由內發火在陰分者不宜用此寒涼非惟不能
去內熱而且閉其火邪也

內障

內障與不病之眼相似並無腫痛翳膜惟睛昏黑無光若
有所障然內實無障也其珠色青藍或微兼綠色眼科
雖有烏風障綠風障青風障黃風障高風昏花障肝虛
目脹振驚內障等名總由血少神勞肝腎虧損精竭視

外科證治全書

卷一

眼科證治

辛

昏神竭視黑治當專補腎水兼補其氣用加味明目地

黃丸或八珍湯加甘菊淮山藥牛膝山萸肉枸杞子殼

精草五味子夏枯草天冬麥冬等藥酌用之

一目眩痛至夜更甚連眉稜骨及頭半邊腫痛以苦寒

藥點服反甚者用夏枯草香附 炒 各二兩甘草四錢

共為末每用三錢清茶調服四五服可愈

一目中見禽蟲飛走紛紛不已者肝膽病也用酸棗仁

炒 羌活青箱子元明粉各一兩為末每水一盞藥末

二錢煎和渣服日二次

加味明目地黃丸

生地黃一觔人浸四兩 五味子三兩 牛膝二兩
 麥冬六兩 歸身五兩 甘枸杞五兩 甘菊八兩
 右研極細末煉蜜爲丸

八珍湯通用二十五
 外障

外障者眼生翳膜如圓翳色白或大或小 冰翳如冰凍 滑翳如水
 子微如凝脂 散翳如魚鱗 橫翳如劍脊 浮翳如魚鱗
 黃色如凝脂 散翳如魚鱗 橫翳如劍脊 浮翳如魚鱗
 白色如凝脂 散翳如魚鱗 橫翳如劍脊 浮翳如魚鱗
 繞瞳人深處 偃月翳形如 棗花翳周開如 白翳黃
 心生大小 背頭四邊 黑花翳青 星月聚散翳黑昧上四
 斑瘡入眼努肉攀睛此皆有餘之證多由腎水虧泛陰

外科證治全書 卷一 眼部證治

火內鬱不得升發或誤用寒涼點洗致風熱阻逆而成
 初起邪氣未定翳膜浮淺者易治日久邪氣已定翳膜
 深牢者難治治宜宣發不宜疏利疏利則邪氣內播爲
 翳益深當用撥翳湯藥肝湯早晚輪服使邪動翳浮佐
 以丹砂散點之緩緩取效戒暴躁惱怒並忌煎炒辛熱
 等物

一努肉攀睛大背赤肉堆起用杏仁十四枚去皮尖嚼
 吐於手心乘暖以綫纏筋頭點努肉上日三次努肉
 漸消
 一赤脈貫瞳人用元薑爲末米泔煮豬肝日食之

撥翳湯

生地黃三錢 歸身一錢五 柴胡
 牛蒡子 川芎 防風 天花粉
 草決明 白蒺藜 蜜蒙花 穀精草
 白粉葛 梔子酒炒 木賊草去節 羌活各八分
 川連三分酒 甘菊二錢
 右加生薑一片水煎食遠服如大便秘澀者加酒炒大
 黃一錢五分大便通潤仍除之按每日早服藥
 藥肝湯

外科證治全書 卷一 眼科證治

黑羊肝七尖 用四兩如無羊肝即 兔糞八枚
 木賊去節 當歸身各二錢 蟬蛻二十四個
 右先將兔糞木賊當歸蟬蛻四味用清水二大碗入瓷
 罐內漫火熬滾令其性味俱出後將羊肝七尖切薄
 片入於湯內一刻即熟先飲湯後食肝每日清晨用
 之晚服撥翳湯兩月之久翳膜可消一半百日可全
 愈

還瞳散存驗 消翳膜遮睛
 蜜蒙花一觔 木賊四兩 羌活八兩
 白蒺藜四兩 石決明四兩 者夏火煨
 右共爲末每服二錢清茶下

丹砂散見前目赤腫痛

迎風流淚

淚為肝液風行水流風動則淚出又肝熱多淚如燒竹瀝火灸瀝出迎風出淚風火合也火發風沖相搏致淚疏風散火雖是正治亦當審肝經之虛實實用復日湯加防風蔓荊子首烏虛加人蔘外用霜後桑葉煎水頻頻洗之

復日湯見前目赤腫

目痒

凡目運眩多淚痒不可忍者風也風動肝木吹噓鼓舞故

外科證治全書卷一 眼科證治 運眩不止無火故不痛治以疏風為主四物湯加防風

荊芥蘇葉薄荷各二錢主之或加蟬蛻僵蠶

四物湯通用二十三

暴盲

平日目無他病外不傷輪廓內不損瞳人倏然盲而不見此氣脫大虛之候急煎人蔘膏或保元湯大劑熬膏服之血脫者亦照此治經云血脫益氣是也
一有平素好飲熱酒胃氣受傷汚濁之血積其中而然者必其形實脈澀用四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮煎調人蔘服之如二三服後鼻面見紫黑色者此滯

血行也再服數劑愈謹案丹溪醫案人蔘下有未字

一有因受陰溼之氣胃陽受困忽然視物不見或有時

畧見而不明其人必食減神倦脈緩大無力用白朮

為君黃耆茯苓為臣附子為使服十餘劑愈

一有每睡起則視物不明或赤腫良久卻愈者此血熱

也用生地汁浸粳米半升曝令透骨乾再浸再曝三

次用瓷瓶煎湯令沸下地黃米四五匙煮成薄粥湯

待溫食半飽後飲三盞即睡數日愈或用四物湯去

川芎倍生地加丹皮黃芩酒炒各一錢水煎臨臥服

數劑愈

外科證治全書卷一 眼科證治

保元湯通用二十三

雞盲俗又名雀盲外

兩眼至晚不見至曉復明此元陽不足之病用蒼朮散久服自愈

服自愈

蒼朮散

茅山蒼朮米泔水浸一夜切片焙乾

右為細末每用三錢取羊肝如無羊肝以豬肝代之一二兩批開擦

藥入內麻錢縛定用酒一合水一碗砂鍋內煮熟臨

臥服之

赤眼淹纏

赤眼有經年不愈者皆因肝腎陰虛邪熱留滯故耳用桑

白皮杜仲各二錢厚樸檳榔各一錢共為粗末取雄雞

肝一具不經水去紅筋同藥入白酒釀六兩隔湯煮熟

瀝去藥渣以酒肝食之隔兩日再如法食一法接用六

味地黃丸加首烏四兩蜜蒙花二兩同為丸服之愈

六味地黃丸通用四十三

爛眼

眼眶沿邊赤爛垢膩乃脾經溼熱上蒸用萬金膏貼之熱

盛者服瀉黃散

一溼熱鬱久必生蟲用覆盆子葉搗汁以紗蒙患上滴

外科證治全書卷一 眼部證治

五

漬下少頃蟲從紗中出其細如綫赤而長不過三四

日蟲盡即愈或收覆盆子葉曬乾搗細末臨用以人

乳少許浸半日用之

萬金膏

五倍子

黃連

防風

荆芥穗

當歸

川芎

苦蘆 各四錢

銅綠 五分

右生研極細末以薄荷煎汁丸彈子大臨用時以熱水

化開一丸乘熱洗眼日三次神效

瀉黃散

石膏四兩

防風二兩

豨薟草三兩

炒麩乾

梔子仁生用一兩 生甘草二兩

右研極細末每服二三錢小兒服一錢白滾湯調下日

二服

拳毛倒睫

脾胃氣虛目緊皮縮眼睛上小睫毛倒入眼中謂之拳毛

倒睫補中益氣湯加石斛蟬蛻川芎主之禁用芍藥五

味等酸收之劑外取虱血點入眼內數次愈又法用木

髓子一個去殼為末綿裹左眼塞右鼻右眼塞左鼻數

夜自愈

一有伏熱內攻陰氣外行所致者去其伏熱眼皮便寬

外科證治全書卷一 眼部證治

五

升陽散火湯

連翹

黃芩

蔓荊子

升麻

羌活

柴胡各一錢

歸身二錢

生地四錢

甘草生用一錢

右水煎食後溫服

補中益氣湯通用三十

偷鍼眼

生睫邊形如豆粒有尖以綿鍼刺破即瘥故俗名偷鍼乃

太陽經結熱也如刺後風邪襲入瘡口面目浮腫目赤

翳痛者用芎皮散二錢菊花湯調下覆頭出汗即愈
芎皮散

川芎 二兩 青皮 一兩

右共為細末每服二錢菊花煎湯調服

附方 存驗

生南星末同生地黃搗膏貼太陽穴鍼眼自消即刺
後冒風亦可愈

眼丹

風熱搏於眼胞則患眼丹紅腫脹疼風盛者腫輒下垂不

能視物用荆防敗毒散散之熱盛者煨紅紫色堅硬或

外科證治全書 卷一 眼部證治 妻

疼痛用仙方活命飲去瓜萸根加羌活川芎消之如日

久不消成膿欲潰者按陽癰則例治之然須速愈若潰

久潰深亦能成漏

荆防敗毒散 通用 仙方活命飲 通用

眼癰

眼皮上突出一紅疤懸如魚膽用過江蜘蛛絲蜘蛛牽絲

為過 纏之即脫又方用櫻桃核磨水搽漸漸自消

眼痔

生上下眼睫邊頭大蒂小黃殼水胞如葷形或頭小蒂大
漸長垂出堅凝不痛纏綿經年不愈致成目疾初起用

清涼丸洗之自消有經年皮厚藥不應者法當用輾綿
紙蘸水潤眼皮毒處少頃用左手大指甲墊於患根
右手持披鍼尖頭齊根切下血出不妨用翠雲錠子磨
濃塗之其血即止內服涼膈清脾飲忌海味魚腥煎炒
清涼丸

當歸尾

石菖蒲

赤芍 各二錢

川連 生

地膚子

杏仁 各一錢

羌活 五分

膽礬 二分

右共研粗末以大紅綱包之如櫻桃大滾水浸泡乘熱
薰洗忌入塵土

翠雲錠子

外科證治全書 卷一 眼部證治 妻

杭粉 五兩

銅綠

黃連 各一兩 輕粉 一錢

右共研細末用糯米百粒水一盞煎半盞汁濃去米再
煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃以雞翎蘸
塗患處

涼膈清脾飲

生地

連翹 去心

梔子 生研

薄荷

荆芥

防風

石膏

黃芩

赤芍 各一錢

甘草 五分

右水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

皮翻證

痘風眼翻

眼皮外翻如以舌舐脣之狀小兒多有之痘風眼爛胞腫
弦緊則眼皮亦翻治法皆宜瀉脾胃之積熱瀉黃散主
之

瀉黃散見前

眼胞痰核

生上下眼胞皮裏內外大者如棗小者如豆推之移動不
紅不疼用生南星磨粉薑汁或米醋調濃頻敷日淺者
即消日深者兼服二陳湯陽和湯即效

椒瘡 粟瘡

二證生於眼胞之裏有如沙擦開張不便多淚而痛其粟

外科證治全書 卷一 眼部證治

粟堅赤者如椒粒名椒瘡其細類黃輦形如黃粟者名
粟瘡俱宜服清脾涼血湯外以清涼丸洗之如眼皮裏
有紅絲堆粟者乃血熱有瘀也法以燈草刮絲處令血
出即愈

一睛上生瘡用桑皮一兩以清水於白碗內浸半日視
水碧色為度筋頭纏綿蘸點滿眼微疼勿畏日久瀝
去熱汁日點十次不過二三日可愈

清脾涼血湯

- 荆芥 防風 赤芍 元棧
- 陳皮 蟬蛻 蒼朮 白蘇皮

連翹去心 大黃各錢五 厚樸五分 生甘草五分
右加竹葉三十片水煎食遠服

清涼丸見前

漏睛瘡

生大眼角太陽膀胱經睛明穴其穴係藏淚之所初起如
豆如棗紅腫疼痛瘡勢雖小根源甚深初宜復目湯加
連翹防風荆芥銀花各一錢五分生梔仁柴胡各一錢
燈心五十寸水煎服之如潰後有膿從大眇內出者成
漏難治可用柿餅搗爛塗之或黃丹水飛極細炒 鯉魚膽汁
和成膏日點三五次若潰斷眼邊弦者不治

外科證治全書 卷一 眼部證治

復目湯見前日赤腫痛

肝脹

眼前垂下至鼻大便血出此名肝脹羌活一味水煎數服
愈一方用獨活

血漬

眼內白珠忽黑見物如舊毛髮動直不語如醉此名血漬
用五靈脂二錢酒調服愈
一有目赤鼻張大喘渾身發斑髮如銅鐵絲鞭乃熱毒
結於下焦用白明礬滑石各一兩水三碗煎一椀半
不住口飲盡即愈

眼疔

眼中出血如射此陰虛相火之病宜用生地熟地各五錢當歸白芍各二錢知母黃柏木通側柏葉柴胡黃芩各一錢桃仁紅花各五分水煎溫服

小兒目疾

孩兒患目赤痛不能服藥者用胡黃連細末一錢人乳調按男左女右塗腳心湧泉穴即愈如眼生白翳取桑汁以燈心點之即退

一痘後毒火攻目皆因長漿時不知用藥攻漿漿不充滿故至回水收靨之際無形之毒火上炎攻注兩目

外科證治全書 卷一 眼部證治

全

眼胞紅腫不能開放急以清毒保目湯連服二三劑

解之猶可免患如遲至毒火亢極翳膜遮蔽瞳人痛苦異常日夜叫號以致兩目喪明則成廢人矣斯時治之亦當用清毒保目湯解之於前看有翳膜遮蓋

黑白眵侵入瞳人者徐徐用撥翳湯治之於後或隔一日一劑雖三四月之久尚保無虞不可過用寒涼責效於數劑之間又不可聽庸俗眼科用藥磨點登時損廢

一痘後初開眼內有星翳者取燕脂泡水鋪紙上以新筆在紙上蘸水拂翳日三次三日愈遲治貽害

一痘後受風成迎風落淚者用蕤仁一粒去皮草紙研混淨油以色白為度研粉人乳和點日三次次日另換蕤仁再點藥隔宿者不用

一疔眼腫痛難開隱涩多淚漸生白膜雲翳遮睛外則搽毛鷲甲揉鼻喜合面而坐宜用銀柴胡胡黃連白

蕪黃龍膽草各五分炒以雄雞肝不見水者和藥搗爛用好白酒釀浸一宿次日置飯鍋上蒸溫服立效

忌煎炒雞魚豬首生冷發物

清毒保目湯

柴胡一錢 蟬蛻十二個去頭足當歸 桔梗各八分

外科證治全書 卷一 眼部證治

全

連翹 防風 荆芥穗 赤芍

牛蒡子 川芎各七分 升麻 薄荷

黃芩各五分 梔子酒炒 生甘草各三分

右加燈心五十寸水煎溫服

撥翳湯

見前

其證淚多隱涩難開睛眵礙痛初得時宜翻轉眼皮用棉裹釵腳撥出眵物來日久多生雲翳不可忽誤

一天絲風颺入目宜急治之用京墨磨濃以新筆蘸塗目內閉目少時以手張開其絲自成一塊用綿輕輕

惹下則愈如未盡再塗案六寸三葉原闕此條據證治準繩補九字餘仍關待補

外科證治全書

卷一

眼部證治

空

外科證治全書卷二

環峯許克昌倫聲
木末畢 法蒼霖 同輯

鼻部證治

鼻柱癰

鼻痔

鼻鼈

肺風粉刺

鼻疔

鼻瘡

鼻齧瘡

鼻淵

鼻衄

鼈鼻

鼻毛癰

筋脈

山根

一名下極即俗所謂鼻梁是也

足陽明胃脈交山根

面王

在鼻下相家日準頭亦日明堂

足陽明胃脈起面王筋亦結面王筋

鼻孔

即面王兩旁一名鼻隧

手陽明大腸脈挾鼻孔手太陽小腸脈

抵鼻孔足太陽膀胱筋結鼻孔

鼻柱癰

生鼻柱屬督脈經鼻為肺竅故又屬肺色紫腫破時覺木痛多由鬱火壅結初宜服千金漏蘆湯宣解鬱毒次用仙方活命飲加梔子木通薄荷桔梗消之如勢欲潰膿案陽癰則例潰後治法

千金漏蘆湯

漏蘆 一兩

枳殼 一兩

樸消 一兩

大黃 一兩五錢

生甘草 一兩

麻黃 一兩

黃芩 一兩

白芷 一兩

連翹一兩 去心 升麻一兩

右共研末每用三錢水一鍾薄荷葉一錢煎五分溫服以取便利為度

仙方活命飲通用一

鼻痔一名瘰肉痔癰

生鼻孔內如肉贅下垂色紫微硬擣塞鼻孔氣息不通香臭莫辨或臭不可近痛不可搖此厚味擁溼熱蒸于肺門如雨霽之地突生芝菌也內服加味瀉白散外用黃白散點之戒酒腥暴怒

加味瀉白散

外科證治全書 卷二十一 鼻部證治

桑白皮生 地骨皮各三錢 生甘草八分 桔梗

辛夷各二錢 黃芩 陳皮 木通一錢五分

右水煎食遠服一方加山梔仁生研一錢

黃白散

輕粉 杏仁去皮尖 白礬 雄黃各一錢

麝香少許

右五味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄礬麝香同研極

細瓷器收貯患者於臥時用筋頭蘸米粒許點瘰肉

上一日臥點一次半月效

千金瘰肉方存驗

瓜蒂 華陰細辛等分

右為末綿裹少許塞鼻中一方加枯礬雄黃等分麝香少許

鼻鼈一名酒鼈鼻

鼻準及鼻兩邊紅赤係陽明血熱好酒者多得此病肺受熱鬱所致亦或血熱遇寒汗濁凝結見紫黑色治宜化滯血生新血四物湯加酒芩紅花生甘草陳皮赤苓煎好入陳酒一杯調五靈脂末二錢熱服氣弱者加黃者炒三五錢如不好酒者肺風致病不用五靈脂加防風荆芥外俱用硫黃膏臨臥洗面淨塗

外科證治全書 卷二十一 鼻部證治

硫黃膏 硫黃 白芷 天花粉 水粉各五分

全蝎一枚 芫青七箇去翅 蟬蛻五箇

右為細末用麻油一酒盃黃蠟一錢許熬勻離火方入

前藥末和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近

眼數日閒腫處自平赤鼻一消如退風刺一夕見效

硫黃散存驗

硫黃 輕粉各一錢 杏仁五分

右為末用蜜酒調於臥時塗上次早洗去效或用津唾

調搽更妙

附石殿撰鼻齋方 存驗

天台烏藥 三錢 銅綠 三錢 樟腦 三錢 大楓子 三兩

右為細末將大楓子仁去殼搗如泥入瓷罐內隔水重湯煮三炷香取出炸油和藥搽鼻患處二次即愈此藥極效未搽時與搽後皆戒酒色一月除根不發搽後患處腫痛勿畏

肺風粉刺

面鼻起碎紅疙瘩形如黍屑破出白粉汁宜用硫黃膏洗面後塗之數日愈

硫黃膏 見前鼻齋

外科證治全書 卷二 鼻部證治

鼻疔

生鼻孔內腫脹痛引腦門寒熱交作甚則唇腮俱浮腫須速治宜服奪命湯奪命丹更以奪命丹研細吹鼻內

奪命湯 俱見發無定處疔瘡內

鼻瘡

生鼻竅內狀如粟米初覺乾燥疼痛甚則鼻外色紅微腫痛似火炙乃肺經壅熱上攻內用黃芩湯清之外用辰砂定痛散搽鼻內如乾燥者以麻油頻潤之

黃芩湯

黃芩 二錢 酒炒 桑皮 三錢 生 梔子 一錢五分 桔梗 連皮酒炒

赤芍 連翹 各一錢 薄荷 一錢五分 生甘草 五分

右水煎食後服

辰砂定痛散

辰砂 五分 石膏 一兩 煨 胡黃連 五錢 冰片 二分

右共研極細末生地汁調搽鼻中或麻油調亦可

鼻齧瘡

多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛乃肺經風熱內服澤瀉散外搽青蛤散即愈

澤瀉散

澤瀉 鬱金 生山梔仁 生甘草 各一錢

外科證治全書 卷二 鼻部證治 五

右水煎或為末開水調服

青蛤散

蛤粉 石膏 各一兩 黃檗 生末 輕粉 各五錢

青黛 三錢

右共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀塗瘡上

鼻淵

鼻流濁涕經年累月不止當別寒熱涕臭屬熱膽移熱于腦風寒伏鬱所致用奇授藿香丸涕清不臭覺腥者屬虛寒用八味地黃丸加川芎升麻蒼耳子所以用腎藥者腦屬腎也又有虛暈腦痛不出水者即控腦砂有蟲

食腦中用天蘿散外以桃葉作枕枕之自愈

奇授藿香丸

藿香連枝葉 八兩

右研細末雄雞膽汁和丸如桐子大每服五錢食後吞

耳子湯下或清酒送下

天蘿散

絲瓜藤 近根處者
燒存性

右為末每服三錢食後清酒送下

八味地黃丸 通用
四五五

鼻衄

外科證治全書 卷二 鼻部證治 六

陰虛火動氣逆于肝血隨鼻出不甚不足慮甚而久者與

吐血無異治宜涼血行血用黃芩白芩各二兩水丸服

之神效如不甚只用外治一用水紙搭鼻衝責其火在

胃也一用涼水拊後頸責其火在膀胱也一用綫紫中

指左衄紫左右衄紫左右皆衄左右皆紫責其火在

心胞絡也皆治鼻衄捷法

鼽鼻

鼻竅常塞不聞香臭用鐵鎖在石上磨取末豬脂調綿裹

塞鼻內又方用乾薑為末蜜調塞鼻

鼻毛癰

鼻毛一晝夜忽長一二尺漸粗圓如繩摘去更生痛不可

忍因食豬羊血過多所致用硃砂乳香飯丸早晚水下

十粒自落

外科證治全書 卷二 鼻部證治 七

耳部證治

銳毒

膿耳

停耳

聾耳

耳痔

耳菌

耳挺

耳疔

內傷耳痛

耳鳴

暴聾

旋耳瘡

耳疔

百蟲入耳

筋脈

耳中

腎氣通耳耳中病責在腎

手太陽小腸足少陽膽手少陽三焦脈

俱入耳中

耳前足陽明胃脈上耳前筋結耳前足少陽膽脈手少陽

三焦脈俱走耳前三焦脈從耳前屬目

外科證治全書

卷二十一 耳部證治

八

耳後手太陽小腸筋足太陽膀胱筋俱走耳後完骨足陽

明胃脈之支足少陽膽脈手少陽三焦脈俱過耳後

銳毒 一名耳後毒

發在耳後宜別陰陽治之患色白者案陰疽例治患色紅

者案陽癰例治如發耳垂後名耳根毒辨治亦然

膿耳 停耳 聾耳

耳孔內時出膿曰膿耳赤腫潰爛流膿曰停耳膿溼結塊

塞耳暴聾曰聾耳皆內火攻冲鬱聚不散歸芍地黃湯

熟地易生地白芍易赤芍加山梔仁柴胡主之甚者用龍膽瀉肝湯

加柴胡外俱用紅棉散

一有耳忽大痛如有蟲在內奔走或血水流或痛不

可忍者用蛇蛻燒灰存性研細末鵝翎管吹之立愈

紅棉散

海螵蛸

枯礬

各三錢

乾燕脂

一錢五分

麝香

右共研細末瓷器收貯聽用每少許吹入耳內或搽潰

爛處俱效

膿耳方

存驗

菖蒲根

水洗淨

右搗取汁先用棉旋捲乾耳內膿然後將菖蒲汁灌入

盪洗數次即愈

外科證治全書

卷二十一 耳部證治

九

聾耳方

存驗

地龍糞

釜底墨

生豬脂

右共搗勻蔥汁和捏如棗核綿裹塞耳潤則換

歸芍地黃丸

通用三七

耳痔

耳菌

耳挺

三證皆生耳竅內耳痔形如櫻桃亦有形如羊奶者耳菌

形如蘑菇頭大蒂小耳挺形如棗核細條而長努出耳

內皆係肝腎溼熱鬱於血分所致以脾胃主九竅故也

微腫悶疼色紅皮破偶一觸犯痛引腦顛內俱用加味

逍遙散甚者龍膽瀉肝湯外用雞矢白炒研敷之或黃

白散點之漸漸消化又方以火酒滴人仰之半時即可

箱出

加味道遙散通用 龍膽瀉肝湯通用 黃白散見前鼻部

耳疔 一名黑疔

生耳竅暗藏之處色黑形如椒目疼如錐刺引及腮腦破

流血水急服奪命湯外用蟾酥雄黃等分爲末水和濃

滴入耳內

奪命湯見發無定處疔瘡

內傷耳痛

耳內不膿不腫只作乾痛或作痒或出水或經年不愈或

外科證治全書 卷二十一 耳部證治

交接便發此皆肝腎二家虛火爲病加減八味丸主之

加減八味丸通用

耳鳴

耳鳴者耳中有聲或若蟬鳴或若鐘鳴或若火熖熖然或

若流水聲或若簸米聲或睡著如打戰鼓如風入耳皆

因腎元虧損肝木疏洩陰氣升至上竅竅隔一膜不能

越出竅外止於竅中汨汨有聲故外入之聲爲其內聲

所混聽之不清服攝陰煎脾胃弱者兼服補中益氣湯

一有因怒而鳴者乃三焦氣逆小柴胡湯加當歸川芎

山梔仁主之

攝陰煎

活磁石一兩 地黃 首烏 龜版

鼈甲各五錢 山茱萸 白芍 山藥各二錢

五味子一錢五分

右水煎二次去渣食前溫服治元陰虛損高年逆上之

氣屢有奇效如爲丸將方內磁石減半龜鼈首烏各

減二錢依方合十劑水跌爲丸每清晨淡鹽湯下五

六錢

補中益氣湯通用 小柴胡湯通用

暴聾

外科證治全書 卷二十一 耳部證治

暴聾者猝然閉塞無聞腎氣虛脫則有之亦或三焦氣逆

氣鬱而然者其證必闕闕焯焯脹悶煩熱四物湯加柴

胡山梔中氣弱者加減歸脾湯亦或肝膽風熱上攻而

然者其證必兼頭痛小柴胡湯加川芎歸身山梔仁亦

或因損傷挖傷雷礮震傷患停耳潰膿不止等證而聾

者則宜用開通之法如腎虧精脫或年衰或病後或勞

倦過度或大恐氣結漸至耳聾者須大培根本用八珍

湯地黃丸補中益氣湯之類然多難愈

開通法

一用酒浸鹹沙一日至晚去沙將酒含口中取活磁

石一塊塞耳左聾塞左右聾塞右此導氣古法也

一用巴豆一粒去心皮斑蝥一枚去翅足二物合搗

綿裹塞耳中再易甚效

一用六蒜一瓣中刺一孔以巴豆一粒去皮膜慢火

入蒜內炮極熟用新棉包定塞耳中二次效

一用全蝎四十九枚以生薑厚片如數鋪鍋內置蝎

於其上輕烙薑片至黃色取蝎去毒並頭足研爲末

酒調送下隨量飲醉取汗外取生蝎去毒爲末酒調

滴耳中聞流水聲即愈

四物湯通用

小柴胡湯通用

補中益氣湯通用

外科證治全書

卷二 耳部證治

三

旋耳瘡一名月蝕瘡

生耳後縫閒延及耳摺上下色紅如刀裂之狀時流黃水

乃膽脾溼熱用穿粉散搽之即愈

穿粉散

輕粉隔紙微炒研 穿山甲炙

鉛粉

黃丹各三錢飛用

右共研細末香油調搽

附方 存驗

胡黃連

右一味研細末麻油調搽

耳聾

耳竅中時流鮮血肝腎火升所致用地芩飲或六味地黃湯加山梔仁赤苓外用蒲黃炒黑研末糝入即止

地芩飲

生地黃 一兩 黃芩 二錢 酒炒

右加青荷葉五錢水煎去渣微溫服

六味地黃湯通用

百蟲入耳

凡蟲偶入耳中以生薑擦貓鼻其尿自出取尿滴入耳內

蟲即出或用米醋滴入其蟲不出亦死用細蘆管入耳

吸之蟲隨出

外科證治全書

卷二 耳部證治

三

一蜈蚣入耳用香雞肉置耳邊豬肉炙香亦可

一飛蛾入耳用雞管極氣吸之或擊銅器於耳邊

一蟻入耳用韭汁灌

一蜒蚰入耳用鹽撒耳內即化水或以苦酒注入

一螞蝗入耳取田中泥一盆枕耳聞氣即出

一磕頭蟲其蟲案其後即磕頭有聲入耳灌以生油即出不可殺之

一蚤蝨入耳用菖蒲末炒熟袋盛枕之

一蛆蟲入耳用杏仁搗爛取油滴入不出即死

一水銀入耳用金銀箸耳邊即出

一水入耳中用薄荷汁滴入立效

口部證治

口糜

口瘡鵝口

口菌

連珠疔

口疳

螳螂子

口疔

懸癰

筋脈

口脾氣通口口之四周為吻足陽明胃筋脈俱挾口手陽明大腸脈出

兩吻

涎俗名口水脾主之脾虛不能約束則涎自出脾損發熱則涎

泛濫

口糜

滿口糜爛色紅作痛口乾舌燥甚者腮舌俱腫初宜服導

外科證治全書 卷二 口部證治 五

赤湯加麥冬五味子薄荷如斑爛延及咽喉不能飲食

日輕夜重者用蘇子利喉湯如口臭洩瀉脾虛溼熱者

用連理湯如口燥大便溏屬虛熱用補中益氣湯加麥

冬五味最善或兼服六味地黃丸以滋化源外俱用珍

珠散擦之

連理湯

人參

白朮各二錢

乾薑 一錢

黃連 一錢

甘草 一錢

右水煎熱服

導赤湯通用

補中益氣湯通用

蘇子利喉湯見後

六味地黃丸通用 珍珠散見後

口瘡

滿口白色斑點甚者陷露龜紋口乾不渴此屬心腎不交

虛火上炎宜服歸芍地黃湯加麥冬五味子或少加肉

桂以為向導從治之法也外吹珍珠散如舌乾黃鞭或

熱從腳起乃無根之火宜服加減八味丸以滋化源

一初生小兒口內滿生白屑名鵝口一名雪口先用棉

蘸水絞去口中白屑以珍珠散頻吹內服犀角汁即

愈

口瘡神效方存驗

外科證治全書 卷二 耳部證治 五

吳茱萸

右為末米醋調敷兩足心一夜即愈不拘多少小兒累

用神驗引虛火歸元之功也

附方存驗

用陳白螺螄殼燒灰加兒茶少許為末吹患處一次

即愈諸疔悉治

歸芍地黃湯通用

加減八味丸通用

珍珠散見後

口菌

多生在牙齦肉上隆起形如菌或如木耳紫黑色火盛血

熱氣滯而生宜內服加味甘桔湯外吹珍珠散如火鬱

火熾則生舌上治法詳見舌部

加味甘桔湯

甘草三錢

桔梗

荆芥

牛蒡子炒

貝母去心

薄荷各一錢五分

右水煎服如內熱盛或飲食入口即吐者加黃連一錢

如口渴唇焦舌燥便秘溺赤者加生地黃芩山梔仁
如有腫處加金銀花五錢

珍珠散見後

連珠疔

舌下生水泡初起一枚漸發至七八枚刺破吹珍珠散

外科證治全書

卷二 口部證治

七

口疔一名脾瘡

有經年不愈者有時愈時發者皆因素食肥甘所致食肥

多熱食甘滿中其氣上溢生疔用天冬麥冬元蓳等分

白蜜丸彈子大不時取一九入口噙嚥久服自效外吹

珍珠散

一小兒口疔用生香附生半夏等分爲末雞子白調作

餅貼男左女右腳心一周時愈

珍珠散見後

螳螂子

小孩腮内生一紅塊不能食乳名螳螂子用生地五錢酒

浸搗爛塗腳心男左女右外用布縛好乾則易之至愈
乃止

小兒口内生黃馬牙即螳螂子口噤頰腫證重者以鍼
微刺患處出血即用京墨磨塗立愈附驗

口疔

口内生肉毬有根綫長四五寸餘吐毬出方能飲食以手
輕案痛徹心腑每日用生麝香一分水調頻服之三日
根化即愈

懸癰一名上脰癰

生於上脰形如紫李脾經蘊熱所致不急治恐毒氣上攻

外科證治全書

卷二 口部證治

七

頭腦則不可救宜用銀鍼鍼破癰頭用鹽湯攪淨瘀血

吹珍珠散內服加味甘桔湯

加味甘桔湯見前

珍珠散見後

唇部證治

唇癰 唇疔 繭唇 唇風

唇瀰 唇裂 唇瘡 缺唇

筋脈

唇經所主 脾之榮在唇四白足陽明胃脈環唇足厥陰

肝脈環唇 謹案榮應作華素問曰其華在唇四白

唇癰

生於唇不拘上下左右大者如李小者如棗色紫有頭腫

鞭疼痛甚者寒熱交作內用仙方活命飲外敷螻蛄散

即消

外科證治全書 卷二十一 唇部證治 六

仙方活命飲 通用 螻蛄散 通用 六十八

唇疔 一名反唇疔 一名鎖口疔

生上下唇角初起形如粒米堅鞭腫盛癢木痛憎寒發

熱甚則令唇外翻或口不能開故有反唇鎖口之名須

案疔瘡法速治之遲則走黃致命

繭唇

唇上起白皮小泡漸腫漸大如蠶繭或唇下腫如黑棗燥

裂痒痛皆七情火動傷血治宜補脾氣生脾血則燥自

潤火自平腫自消補中益氣湯加梔仁芍藥丹皮最妙

或加味歸脾湯亦妙外用紫歸油頻潤之如日久失治

誤服清火之藥多致翻花不治

紫歸油

紫草 當歸

右等分麻油熬去渣出火氣以棉蘸油頻潤之

補中益氣湯 通用 加味歸脾湯 通用

唇風 一名唇疔

多在下唇初發痒紅腫日久破裂流水疼如火燎似無皮

之狀此脾經血燥也如風燥則不時開動四物消風飲

主之 宜倍用 外用紫歸油頻抹愈

四物消風飲 通用 紫歸油 見前

外科證治全書 卷二十一 唇部證治 九

唇瀰

溼爛曰瀰脾家溼熱內用白朮散外取葵根燒存性研末

豬脂調塗

白朮散

白朮 三錢 雲苓 二錢 薏苡仁 五錢 鮮石斛 四錢

葛根 二錢 木瓜 五分 生甘草 五分

右加石蓮肉二十枚水煎溫服

唇裂

唇上乾燥漸裂開縫作痛係脾熱以紫歸油潤之內服滋

唇飲

滋唇飲

生地黄 四錢 鮮石斛 三錢 竹茹 石膏 生研

當歸 白芍 各二錢 生甘草 一錢

右水煎去渣加白蜜少許和服

紫歸油 見前

唇瘡

蟲食肛上唇生瘡聲必啞蟲食臟下唇生瘡必乾皆因

腹内生熱而食少者腸胃空虛三蟲求食之故用烏梅

湯主之亦有氣鬱生瘡者則無聲啞噤乾之證用飯上

滴下氣汗水塗之如神白荷花瓣貼之亦效

外科證治全書 卷二 唇部證治

烏梅湯

烏梅 三枚 醋浸 黃連 一錢 二錢 乾薑 一錢 犀角 二錢

木香 八分 雄黃 一錢 五厘 人蔞 一錢 桃仁泥 八分

右水煎頓服

缺唇

先敷麻藥用刀刮取兩邊薄皮用絲縫在一處以蟹黃敷

之自收口

麻藥 備用

齒部證治

牙癰 齒痛 齒齲齒齩 骨槽風

牙疔 牙齲 牙疔 牙齲 牙齲

牙漏 蟲疔 走馬牙疔 齒齲

牙縫脹 髓溢 馬牙 取齒牙

筋脈

齒牙 內狀曰齒外板曰牙皆 足陽明胃脈入上齒縫中手

陽明大腸脈入下齒縫中

牙癰 一名牙疔 又名牙疔

生牙根肉上不拘上下內外其狀高鞭小塊或如豆大紅

外科證治全書 卷二 齒部證治

腫疼痛宜用鍼刺出毒血以珍珠散吹之內服龍膽瀉

肝湯

龍膽瀉肝湯 通用 珍珠散 見後

齒痛

齒痛多在內牀內牀主嚼勞而易傷若是腎虛搖動不痛

痛則必是風火蟲風從外入火自內出蟲又風之所化

而風痛俱多內服牙疼飲用二辛煎漱之即愈

一有因食蟹致齲腫肉弩出者用生地汁一碗以豬牙

卓蘸炙汁盡為末敷之即愈

牙疼飲

石膏四錢 升麻一錢五分 大生地五錢 防風
薄荷葉 荆芥穗 前胡 天麻各二錢
甘草一錢

右水煎食後熱服避風如牙腫加金銀花羌活各二錢
如牙燥去升麻前胡加元蔞一錢五分如牙爛去前
胡天麻加木通梔仁各一錢五分
一辛煎

北細辛五分 石膏五錢

右二味為粗末濃煎頻漱即愈不可嚥下

齒齩齒齩

外科證治全書 卷二 齒部證治 三

齒齩齒齩皆屬蟲齒齩齩內腐爛出膿血齒齩牙黑不腐
爛不出膿血以此為別皆係腸胃溼熱鬱久生蟲凡齒
齒齩碎齩齩齩痛不齩則微痛齩齩又或痒或脹痛忽
然而止者皆蟲齩之故與風火大異用五靈脂如米大
齩在痛齒上少頃溫水漱出必有蟲又靈升散最妙遇
蟲痛寒痛處少許立愈

靈升散 一名升丹

樟腦五分 川椒紅一撮

右藥等分研碎放銅杓內茶鍾蓋上稠麩封四圍勿令
走氣放風爐上微火升之少頃覺樟腦氣透出即取

安放地上候冷揭開藥俱升在茶鍾底刮下入瓷器
密封聽用

熏蟲牙法驗過

用撇盆一箇盛水少許中覆一粗椀取瓦片煨紅置
椀底上放韭子一撮清油數點待煙起用竹筒上口
小下口大如喇叭式罩椀上以上口對痛齒熏之良
久煙盡以溫水漱吐必有小蟲出未盡再熏

骨槽風

牙骨及腮內疼痛不腫不紅痛連臉骨者是也加味二陳
湯入陽和丸主之甚者用陽和湯數劑即愈此證初起

外科證治全書 卷二 齒部證治 三

往往有誤為牙疼而用涼藥者致牙齩蝕爛透骨穿腮
延及咽喉則不救宜急用陽和湯犀黃丸每日早晚輪
服外用南星散搽之如有多骨以推車散吹入隔一夜
其骨不痛自出吹至次日無骨退出用生肌藥服保元
湯加肉桂芎歸收功

南星散

用天南星一枚挖空入雄黃一塊麥麩包裹火燒俟
雄黃融以杯合定遠火俟冷去麩研末加麝香一分
研拂患處

加味二陳湯通用

陽和丸通用

陽和湯通用

犀黃丸 通用 四十八

牙疔 又名穿牙疔

推車散 通用 六十六

保元湯 通用 二十八

先一二日牙痛寒熱交作後痛更甚牙縫齦上發一紅粒

齦肉皆紫黑者是也痛引腮項若兼痒麻破流血水用

銀鍼刺之擦拔疔散服奪命湯如失治則走黃不救矣

拔疔散 見疔瘡

奪命湯 見疔瘡

牙齦

牙齦盡腫宣露于外或衄血不止清胃散加薄荷忍冬藤

主之外擦珍珠散

清胃散

外科證治全書

卷上 齒部證治

毒

石膏 四錢 生研

生地黄 四錢

丹皮 一錢五分

黃連 一錢

黃芩 一錢

升麻 一錢五分

甘草 一錢或五分 生

右水煎去渣熱服

珍珠散 見喉部

牙齦 一名牙宣

齒縫出血無論大人小兒當別虛實治之陽明實熱則血

出如湧口必臭而牙不動清胃散主之陽明壅實之甚

口渴便秘而衄不止者用調胃承氣湯入童便和服下

黑糞即愈然必便秘口渴燥熱方可用如陽明虛熱牙

齦腐爛血水滲流不已者二薑湯主之或補中益氣湯

醫宗金鑑

卷之六

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

加山梔丹皮如腎陰不固虛火上熾口不臭牙不痛但

搖動不堅或微痛不甚而牙縫點滴出血者治宜滋腎

六味地黃丸加猴薑主之或有陽虛火浮者則宜用加

減八味丸加猴薑隨手應效如小兒疳積氣盛者必兼

服蘆薈丸外俱用小薊散擦之

調胃承氣湯

大黃 三錢 酒製

元明粉 一錢五分

枳殼 一錢五分

右水煎去渣八元明粉溶化頓服

二薑湯

人蔘 元蔘 等分

外科證治全書

卷二 齒部證治

毒

右水煎溫服一加麥冬甘草

小薊散

小薊 百草霜

蒲黃 炒

香附 醋製

右等分研細末用擦牙上半刻以溫茶漱之

又方 存驗

青竹茹

右一味醋浸一宿含漱甚效

清胃散 見前

補中益氣湯 通用 三十一

六味地黃丸 通用 四十三

加減八味丸 通用 四十六

蘆薈丸 見後陰門 肛門作痒

牙齦

生於牙盡齧中牙關緊閉此證初起勢甚危夜九甚然不
難愈先用珍珠散吹牙齦外用黃熟香附削釘漸漸搥
進牙門漸開即將珍珠散吹患處

珍珠散 見喉部

牙漏

患牙證久不愈齒縫出膿甚致齒落如上邊左門牙落則
不治外吹珍珠散內服滋陰降火之劑歸芍地黃湯加

元瀆麥冬

珍珠散 見喉部

歸芍地黃湯 通用

蟲疳

外科證治全書 卷十一 齒部證治

去

腫腫出血疼痛臭穢惡寒惡熱此皆腸胃溼熱為患兼風
則開口呷風更痛積熱則臭穢難近宜用清胃散去黃
連加歸身元瀆各二錢風加防風臭如山梔又要知喜
寒惡熱胃血受傷用此方固佳若惡寒喜熱胃氣受傷
必用補中益氣湯外俱搽珍珠散

附方 存驗

胡黃連 五分 膽礬

兒茶 各一分

右共研細末搽之治牙齦疔爛立效

清胃散 見前

補中益氣湯 通用

珍珠散 見喉部

走馬牙疳

初牙間紅腫漸變紫黑腐爛臭穢此係胎毒或痘毒殺人
最速一日爛一分兩日爛一寸走馬喻其速也鼻梁上
發紅點如珠則不治上唇左門牙落者死急服清胃散
外以童便漱其毒赤霜散吹之雖致延爛穿腮不堪危
險之候竝效

赤霜散

用紅棗一枚去核入紅砒如黃豆大一粒紫好放瓦
上炭火炙至棗枯煙盡為度取起益熄俟冷加冰片
一分研吹立效

又方 存驗

外科證治全書 卷十一 齒部證治

去

用白馬前躡修下之腳皮炙炭存性為末加冰片少
許吹患立愈

清胃散 見前

齒豁

牙牀不痛齒疏豁動搖脫落係腎虛六味地黃湯加枸杞
續斷猴薑主之外用青鹽二兩食鹽四兩川椒煎汁拌
鹽炒乾研末常以搽牙永無齒疾

牙縫脹

滿口牙齒浮而脹不能齧嚼此元氣大虛補中益氣湯十
全大補湯酌用

補中益氣湯通用

十全大補湯通用

髓溢

牙齒長出分餘漸至難食名髓溢用白朮煎湯漱服又方

常咋生地黃妙

馬牙

初生小孩牙齦有白色如脫骨者是將發此毒即打嚏日

日要挑珍珠散吹之

珍珠散見喉部

取齒牙

活鯽魚一尾約重十兩以白砒一錢八魚腹放無風無貓

外科證治全書

卷二 齒部證治

表

犬處七日魚身發出白毛用雞羽拂毛以少許膏藥收

之每遇病牙取些微膏藥貼其上片刻即落

附固齒方

採旱蓮草洗淨每斤用青鹽四兩淹十日取出曬乾

為末每日早晚擦牙

舌部證治

紫舌脹

重舌

痰包

舌疔

舌菌

舌核

舌疔

舌吐不收

舌尖敲去

筋脈

舌為心苗舌

足太陰脾脈連舌本散舌下足少陰腎脈

繞舌本足太陽膀胱經結舌本手少陽三焦脈繫舌本

紫舌脹一名木舌

舌腫色如豬肝脹塞滿口堅硬疼痛不能轉動粥藥不入

乃心脾壅熱先用衣絨紮筋頭上露分許當舌尖或舌

外科證治全書

卷二 舌部證治

表

兩旁刺出紫血舌之下不可刺恐傷舌繫傷則不能收

功次用筋捲棉蘸甘草湯潤其唇旋蘸生蒲黃細末在

舌四旁頻擦至腫消舌軟方止內服九味敗毒湯

九味敗毒湯

黃連

荊芥

黃芩

連翹

牛蒡子

薄荷葉

木通

山梔各一錢

甘草四分

右加銚心一撮水煎去渣溫服

附方

雄雞冠血浸舌嚥下即消

重舌 一名子舌 又名確舌

舌之下血脈脹起如小舌狀故名不可用鍼刺宜用桑皮
蠶髮灰等分末醋調厚敷舌下或珍珠散吹之又方
用繡鐵鎖燒紅打下鐵繡研末水調一錢噙嚥

痰包

生舌下結腫如匏棉軟不鞭塞脹舌下有妨飲食言語色
黃作痛不安乃痰飲熱氣凝注舌絡宜用小剪將包剪
破則出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨搽珍珠散服二
陳加芩連薄荷湯忌煎炒火酒等物

二陳加芩連薄荷湯

外科證治全書 卷二 舌部證治

陳皮 二錢 半夏 二錢 茯苓 二錢 甘草 一錢

黃芩 一錢 黃連 五分 薄荷 一錢五分

右水二鍾煎八分食後服

珍珠散 見後喉部喉癰

舌疔

舌生紫泡其形如豆堅鞭寒熱疼痛應心宜服奪命湯倍
黃連煎好含口徐徐嚥之或再服奪命丹三粒以解蘊
毒

奪命湯 俱見發無定處疔瘡下

舌菌 一名舌痔 一名舌芝

其證生舌上初如豆次如菌頭大蒂小亦有如雞冠樣者

妨礙飲食言語諸書云是心脾鬱火實熱亦有不盡然

者如色赤疼痛口渴煩燥或舌紫腫脹時流臭涎或因

怒氣上沖忽崩裂血出不止此可作鬱火治用瓷鋒刺

破菌處擦北庭丹以蒲黃末蓋之內服九味敗毒湯加

犀角汁少許連服數劑自然縮愈如色白木木然不甚

痛舌上枯白口不作乾或舌本強鞭短縮或兼項領結

核外勢頗類喉風但喉風咽喉常腫湯水不能下嚥此

症嚥喉不腫湯水可以下咽多緣心境不佳元氣虧損

若誤服寒涼則致爛開透舌穿腮湯水漏出又名爲瘰

外科證治全書 卷二 舌部證治

瘰癧風百無一生總因偏執清火敗毒故耳初起治法以

補中益氣湯加桂枝白芍或歸脾湯潰爛者用犀黃丸

十全大補湯輪服多獲全愈故辨證不可不明

北庭丹

礪砂 人中白 各五分 瓦上青苔 瓦松

糖雞矢 各一錢

右用傾銀罐子一箇將藥裝入罐內鹽泥封固入炭火
煨紅取出俟冷加麝香冰片各一分研細末收瓷瓶

聽用

九味敗毒湯 見前紫舌脹 補中益氣湯 通用 歸脾湯 通用

犀黃丸 通用 四十八

十全大補湯 通用 二十六

舌核

舌上生核強鞭作痛宜用衣絨點破以冰硼散擦之內辨寒熱虛實用藥

冰硼散

冰片 五分 硼砂 五分

共研細末瓷瓶密貯每用少許擦擦瘡處如咽喉腫痛並效一方有元明粉五錢硃砂五分

舌衄

舌上忽生孔血出如縷由心脾腎三經火鬱而然用槐花

外科證治全書

卷二十一 舌部證治

三

炒研末敷之自止內服導赤散如血出舌鞭者用小蘗搗汁和酒服乾者為末冷水服

舌吐不收

舌出數寸連日不收者有傷寒產後中毒大驚四種傷寒用冰片末搽舌上則應手而收病重者用五錢方愈產後用硃砂末敷舌上仍令作產子狀以二女掖之乃于窗外潛累盆益置危險處墮地作聲令患者驚聞即收如中毒舌忽脹出口外用雄雞血浸之或冬青濃煎汁浸之受驚者驚定則收

舌尖蔽去

用螃蟹一隻搗爛取汁以雞毛拖汁掃上即長或以栗子一箇去殼同搗嚙口內亦好如無生蟹則用蟹殼煨存性研極細糝上亦可漸漸長完

附接舌仙方

用馬蘭花根 如天門冬樣 螃蟹共搗爛陰陽瓦焙乾為末敷之七日可長成或用熟蟹黃同馬蘭根搗爛陰乾為末敷之效更速

外科證治全書

卷二十一 舌部證治

三

喉部證治

喉痺 喉癰 乳蛾 鎖喉

喉閉 纏喉風 喉菌 喉珠

喉癰 喉癰 喉癰 喉中腥臭

咽喉痛 梅核氣 骨梗類 誤吞類

筋脈

喉嚨 喉在咽前通肺主出氣故喉 足陽明胃足少陰腎二

脈循喉手少陽三焦脈由喉

咽 咽在喉後通胃主納食胃口在膈膜下咽至胃長一

少陰心足太陰脾二脈挾咽手太陽小腸脈循咽足厥

外科證治全書 卷二 喉部證治

陰肝脈循咽後

噎 噎之低 噎音聲之戶曰會厭當咽上可開闔掩喉食下

會厭 噎不掩則錯必舌腭抵上腭則會厭方掩喉

辨證大畧

咽喉之地尤為亟證 咽喉噎會厭為飲食氣息之道路四

緊之地當 頃刻而痛難忍實係寒生 寒生者陰寒也外

治當引火歸元如方中 婉轉而痛方騰乃為熱病 熱病

熱也風無熱不熏熱無風不熾治當疎風降 譬之龍雷

之火燄因陰生 龍雷之火虛火也龍雷之性必陰雲四

清日則則退藏不動矣人身腎中之相火亦猶是平素

於外則現頃刻急證 燎原之火熾出漸著 燎原之火凡

如喉痺之類是也 草之中初得一點凡火熾然其勢不覺殊不知由

響而至於燄燄由燄燄而至於炎炎遂不可止遏不可

邪熱灼熾蓋非一朝一夕之故如喉痺喉蛾之類是也

經云驟起非火緩起非寒 此引靈樞內經之旨以證辨

當其未動不知其為火也及其一發暴不可禦故病則

驟起若夫五行有形之陽火指虛火蓋驟 虛寒實熱識透

起緩起之閒正有陽火陰寒之別也 者獲濟 藥有天壤之殊故治病非難識病惟難耳能於

虛實寒熱之閒辨得明識得透 是在明睿之士知所區

別乃隨所投而無誤耳 喉痺 喉痺寒滿口鼻聲如曳鋸呼吸

閉絕而死陽火之證誤投陰寒之藥則致 爛舌如紫茄飲食廢絕而死噫毫釐千里性命繫焉豈

外科證治全書 卷二 喉部證治 可視醫為小道哉苟隨證知所區別

投藥百無一誤非明睿之士不能 喉痺 喉者不仁也驟起也危極之證痰在喉中作響響如打鼾

鼻色白而不腫諸書皆稱肺絕不救蓋緣誤服寒涼以

致死耳如果用桂薑湯服之立愈倘喉內痰邪塞滿舌

有痰護此痰不出聲如曳鋸惟誤服寒劑方有是證遲

則痰塞鼻內氣無出入即死急取鵝毛一根黏釐許桐

油入喉一卷則痰隨油吐出進桂薑湯或歸源湯

桂薑湯

肉桂 炮薑 甘草 各五分

右共歸碗內取滾水沖入更將碗煨於滾水中掉藥口許慢慢嚥下立愈案此方專治頃刻而起前無恙者此陰火虛寒之證服之立愈

歸源湯

大附子 生者一枚去皮臍切作大片用白蜜塗炙令透老黃色為度

右收貯臨用取如粳一粒口含嚥津治格陽喉痺頃刻

暴痛之證立愈

喉癰

喉間紅腫疼痛無別形狀宜先服蘇子利喉湯一劑接後服黃連清喉飲外吹珍珠散即愈如舌下若生一小舌

連喉腫痛為瘡舌喉癰二者相兼則因用珍珠散吹舌

外科證治全書 卷二 喉部證治

根舌下及兩旁不得間斷服藥如喉癰

一咽中結塊腫痛水食不通此危證也治法如前兼服

百靈丸

一女人患喉閉腫痛乳蛾等證當問其月經調否如經閉者宜用四物湯加羌蔚子牛膝香附桃仁各二錢

服之俾經脈流通喉證自愈如仍未愈服蘇子利喉湯

蘇子利喉湯

蘇子 前胡 赤芍 甘草

桔梗 各一錢 元蘆 連翹 浙貝 各一錢五分

右水煎溫服 案此方可加薄荷二錢或一錢

黃連清喉飲

川連 一錢 桔梗 牛蒡子 炒 元蘆

赤芍 荆芥 各一錢 甘草 一錢 連翹

黃芩 天花粉 射干 防風 各一錢

右水煎熱服 此方治喉癰實火證也但喉病實火者少

喉癰一二劑不應且有口乾便秘煩熱之證方可用

之如便洩口和雖有喉癰腫痛之甚亦祇用蘇子利

喉湯倍桔梗加牛蒡射干各錢半

治之兼服百靈丸必愈尤為善法

百靈丸 百草霜 即鍋底煤也係燒山柴草樹方是除當底及

外科證治全書 卷二 喉部證治

右用煉蜜丸芡實大每用一丸新汲水化服 案此方取

珍珠散 火化從 治之義

硼砂 雄精 川連 兒茶

人中白 冰片 薄荷葉 黃蘗 各末等

大破珠子 研末減半

右各末戩足共歸一處加研勻細瓷瓶密貯聽用

吹喉散 附驗

冰片 三分 殭蠶 五釐 硼砂 二錢 牙硝 七錢五分

右各為末吹喉神效

附刺少商穴法 治一切喉證腫痛凡於道路乏醫藥之處遇有喉患藥未及備宜用此法急救之
穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自臂勒至刺處出血即愈

四物湯 通用 二十三

乳蛾

其形圓如筋頭白色生於咽喉關上者輕生於關下者重或左有右無或右有左無日單左右皆有日雙雙者輕單者重用蘇子利喉湯數劑即愈外吹珍珠散又以土牛膝絞汁含口漫嚥妙

外科證治全書 卷二 喉部證治

表

急救乳蛾方 附驗

用兩手從臂上抹至大拇指指間四五寸以繩紮住男左女右以鍼刺大指縫中出血即愈

乳蛾破爛神效方 附驗

人中白 三分 冰片 二分

右共研細末吹之

蘇子利喉湯

珍珠散 俱見前 喉癰

鎖喉

喉內無蛾形痰聲不響而喉欲閉者是也治同喉蛾

喉閉

此證兩三日即氣急喉痛手足厥冷忽然痰壅氣閉命懸頃刻者是治同喉蛾若兩三日前並無喉恙而屬驟起者須用歸源湯或桂薑湯忌服前藥

纏喉風

喉內熱結喉外腫繞且痒且麻者是治同喉蛾

喉菌

狀如浮萍色紫生喉旁憂鬱氣滯血熱則生婦人多患之輕則半月重則月餘宜守戒忌口內用蘇子利喉湯加山梔丹皮香附兼服百靈丸外吹冰硼散

蘇子利喉湯

百靈丸 俱見前 喉癰 冰硼散 見前 舌核

外科證治全書 卷二 喉部證治

表

喉珠

腦門生一紅綫如髮懸一黑泡大如櫻桃血絲相裹挂至咽門此肺經鬱熱所致如用刀點即死取土牛膝活根搗汁以好醋二三滴和勻滴入鼻中三四次絲斷珠破吐出瘀血立愈

喉癰

形如圓眼核大紅絲相裹或單或雙生於喉旁亦有頂大蒂小者由肝膽鬱怒鬱熱而成忌用刀鍼宜服益氣左金湯外以碧玉散頻點之

益氣左金湯

人蔘 一錢 陳皮 牛蒡子 各一錢五分

麥冬 一錢五分 生梔仁 薄荷葉 各一錢

苦桔梗 三錢 黃芩 二錢 浙貝母 一錢五分

甘草 生 蘇葉 雲苓 各一錢

右加竹葉三十片水三鍾煎一鍾食遠服渣再煎服

碧玉散

硼砂 三錢 膽礬 冰片 各三分

右共研細末用時以筋頭蘸點患處

喉癰

喉間生紅絲如戈蜜紋又如秋海棠葉背不開不腫氣出

外科證治全書 卷二 喉部證治 罕

如常乾燥而痒飲食不遂乃係虛火上炎最淹纏難愈

癆瘵多生此證至喉啞則不救用青靈丹不時噙服外

以清溪祕傳礬精散吹之斯疾要清心戒慾忌鹽醬及

助火之物否則縱然見效不能除根也

青靈丹

牛黃 冰片 各一分 膽礬 三分 雄精

硼砂 兒茶 山豆根 各八分

右為細末用白梅三枚去核共搗作十九分十日噙服

清溪祕傳礬精散

用白礬不拘多少研末取方磚一塊以火燒紅灑水

於磚上將礬末布於磚上以瓷盤覆蓋四面灰擁一

日夜礬飛盤上掃下用二錢白霜梅兩箇去核明雄

黃穿山甲炙各一錢共研細末以細筆管吹入喉內

喉癰 一名喉瘡

喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛有竅出臭氣廢飲食

用枸橘葉煎湯頻服消腫導毒

喉中腥臭

此肺胃熱毒用黃芩射干煎服

咽喉痛

不能納唾與食此為地氣閉塞屬虛火蘇子利喉湯加荆

外科證治全書 卷二 喉部證治 罕

芥倍桔梗元蔘主之吹珍珠散

蘇子利喉湯 珍珠散 俱見前

梅核氣

喉中似有物如龍眼大吞不入吐不出名梅核氣男婦皆

有此證宜用甘草苦桔梗老蘇梗橘紅厚朴半夏茯苓

金沸草生薑之類服之漸愈或鍼少商穴亦妙

骨鯁類

諸物梗於喉中或刺或骨必有鋒芒所以刺而不下凡下

而逆者反而上之則順矣故治此者當藉飲食之勢涌

而吐之使之上出則如拔刺之捷也如遲延芒刺既深

或飲食已消無可推送以致腫痛者用捕梗丸噉口化咽不十九其梗不出即消雖梗死之人但有微氣服之必活

一諸魚骨梗用白錫糖食之自消

一魚骨橫在胃間不上不下痛楚之甚飲食不得欲死者用橄欖食之即消或將橄欖核研末急流水調服愈

一魚鱗梗在胃間則眼中常見一小鏡子用芥醋一甌半飢啜之即愈

一誤吞火肉骨梗於喉間引手可揣摩百計不下用南外科證治全書卷上喉部證治 望

一研砂一塊汲水洗淨含化終食間愈

一雞骨梗喉用鳳仙花根搗爛噉嚙即下急以溫水漱口否則損齒亦治魚骨

一蟹殼梗喉用活鴨一隻倒懸取鴨口涎半盞嚙之即下

一稻麥芒梗喉用紫花地丁嚼爛嚙下即安或頻食餚糖亦安

一桃李核梗喉用狗骨煮湯磨摩頭上

一竹木梗喉用舊鋸或秤錘燒紅淬酒熱飲之極效又方取牛口涎開水對服即下

一頭髮梗喉用舊木梳燒灰酒服或將亂髮燒灰存性開水調下即愈

一鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜取癩蝦蟆數箇將頭剝去倒垂流水以椀接之得一杯許水灌入喉中移時則連鍼吐出鍼自輒曲或用錫糖一斤食盡則便出如鍼已入腹百藥不能治用蠶豆韭菜同煮日食則隨大便出

捕梗丸

尋多年懸挂麻繩上有灰塵堆積者連繩解來用新瓦盛之炭火煨枯存性研末洋糖丸如芡實大每用外科證治全書卷上喉部證治 望

一丸含在口中化下不十九其梗物不出即消雖梗死之人但有微氣服之必活 案此方治諸骨梗喉極效

誤吞類

誤吞銅錢多食葶藶即可化堅為軟從大便出又方多食胡桃自化而出 胡桃與銅錢共食即成粉可證

一誤吞鐵骨等物腸中不能轉送覺墜者多食青菜豬油則送入大腸與糞同出甚效

一誤吞黃金昔江應剎治一王姓者因事犯鹽院驚懼自吞黃金一二錢心中憤憤無可奈何少頃已獲正犯其事遂平因欲求生遍治不效迎宿視之四肢厥

冷六脈沈伏計無所出沈思銀工鎔金必用礪砂礪砂制金故也急市礪砂四錢爲末粥米分二次服下少頃煎承氣湯服利下礪砂裏金從大便而出或誤服金屑未死者用鴨血灌之可活

一誤吞鐵釘昔張景岳先生治一王氏子甫周歲其母以鐵釘與之玩弄不覺納之口中吞入喉間其父號呼求救先生往視之但見其母倒提兒足以冀其出口鼻皆血危劇之甚先生曉之曰豈有倒懸可以出釘而能無傷命哉因速令抱正遂聞噓聲乃釘已下咽不在喉矣其父曰嬌嫩之臟安能堪此先生因其

外科證治全書卷二 喉部證治

聖

哀求之切不得不允姑以慰之然計無從出而逼索方藥頃刻再四祇得靜坐齋頭潛思熟計亦無所得乃取本草一玩觀啟其機見所載云鍼畏樸硝遂悟得一方用活慈石一錢樸消二錢並研爲末付其父令以熬熟豬油加密和調藥末與之食于申未之頃盡吞之至次早其父匍匐階前曰昨于三鼓忽解下一物大如芋子瑩如葶菜潤滑無稜藥護其外撥而視之則釘在其中矣乃京中釘鞋所用磨菰釘也蓋硝非慈石不能使藥附釘慈石非硝不能逐釘速出非油則無以潤非蜜則未必吞合是四者則著者著

逐者逐潤者潤同功合力裏護而出矣

一誤吞銀用韭菜一把入滾水略煮不切斷淡食之少頃菜抱銀嘔出或從大便出

一誤吞鈞鉤昔有漁人誤吞鈞鉤劉遵導令溶蠟爲丸以糝灌下鈞銳入蠟卽曳而出

一誤吞水蛭即蝮水蛭入腹經停日久復生水蛭吮呷精血令人面目肌肉黃瘦每飲食下咽少時腹中攢

攻且痒且痛不可忍不治必死用田中泥一塊小死魚三箇同豬膏鎔搗勻再用巴豆十粒去油淨同魚膏四味搗勻丸如綠豆大用田中泥水空心吞下大

外科證治全書卷二 喉部證治

聖

八五七九小兒三九須與洩下蛭盡用八珍湯調理一誤吞蜈蚣昔有婢用火筒吹火不知內有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚鼠入口不覺下喉求救人無措手適有人云取小雞一隻斷喉取血燉飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出又金莊一農夫夏晝臥地熟寐聞蜈蚣入其口既寤喉中介介然如梗狀咯不能出嚥不能下痛痒不定甚爲苦楚一醫用雞卵打破入酒調勻燉服仍以大黃爲末和麻油飲之頃刻洩下蜈蚣尚活蓋蜈蚣被卵拘攣其足不能舒動以利藥下之故從大便而出且雞性好食蜈蚣亦取相制之義也

承氣湯

大黃

厚朴

去皮炙

枳實炙

右水煎燉服

八珍湯

通用二十五

外科證治全書卷二終

卷二

喉部證治

吳

外科證治全書卷三

環峯許克昌倫聲

木末畢

法蒼霖

同輯

項部證治

腦後發

失榮

瘰癧

鈕扣風

項強

筋脈

頸項俗名脖項之前有缺盆缺盆之中即任脈之天突穴

為頸前居中第一行脈 缺盆之上有人迎穴喉間開

一寸五分屬胃為頸前第二行脈 人迎後一寸五分

名扶突穴屬大腸即頸前第三行脈 扶突後名天窗

外科證治全書卷三

項部證治

十一

穴屬小腸即頸中第四行脈 天窗後為膈脈頸中無

穴乃第五行脈 膈脈後名天牖穴屬三焦即頸中第

六行脈 天牖後天柱穴屬膀胱即頸中第七行脈

天柱後居頸之中央者督脈也 名天府自前中一行

至此為第八行脈

缺盆

缺盆穴在橫骨上左右各一為一十二經之道路

手陽明大腸手太陽小腸

足陽明胃足少陽膽手少陽三焦脈俱入缺盆手太陽

肺足陽明胃足少陽膽足太陽膀胱俱結缺盆

癰疽就簡

天柱疽

生項後高骨即大椎骨也患形初起如臥蠶極痒

魚尾毒

生項後髮際下兩旁骨俗名燕

尾即偏腦疽之百脈疽初發漫腫大小數塊環繞頸項小證也左右同其色紅紫痛熱不食氣逆咳嗽結喉癰生項前結喉之上又名夾喉癰生結喉之兩旁癰陰疽則例治法

腦後發俗名對口

生項後入髮際正中因與口對故俗名對口患偏兩傍則

名偏對口治當辨其紅白色紅者用五通丸醒消丸敗毒散潰後托毒散醒消丸色白者用陽和湯十全大補湯如口乾作渴飲水不歇小便頻數或淋瀝作痛舌上燥黃如雞內金者乃腎水枯竭心火上炎此證最惡急用加減八味丸以滋補之否則不救餘按癰疽治法

外科證治全書卷三 頂部證治

五通丸通用 醒消丸通用 敗毒散通用

內托散通用 陽和湯通用 十全大補湯通用

加減八味丸通用

失榮

生於肩之上耳之前後初起腫核皮色如常日漸長大堅鞭如石推之不移按之不痛半載一年方作陰痛由憂思恚怒痰氣凝結而成初宜服紫元丹消之每隔兩日進一服所隔之兩日以陽和湯犀黃丸早晚輪服外敷抑陰散如潰貼陽和解凝膏內亦以陽和湯犀黃丸輪服日日不間可冀收功若經久潰氣血衰弱形體瘦削

破爛紫斑滲流血水或腫泛如蓮穢氣熏人愈久愈大越潰越堅者俱屬敗證不治

紫元丹通用 陽和湯通用 犀黃丸通用

陽和解凝膏通用 抑陰散通用

瘰癧

小者為瘰大者為癧生於項間初起一小核在皮裏膜外不覺疼痛皮色不異漸大如桃李芴增不一諸書辨其名類云形軟遇怒即腫盛者名氣癧堅鞭筋縮者名筋癧形如蛤蜊堅鞭作痛作腫者名馬刀瘰癧一包而生數十枚者名蓮子癧繞項而生者名蛇盤癧其形大小

外科證治全書卷三 頂部證治

不一連接數枚者名子母癧如黃豆結筴一般者名鎖項癧形小多痒者名風癧生項間延至胸腋者名瓜藤癧一枚上堆粟三五枚盤疊成攢者名重臺瘰癧生如鼠形名鼠癧又名鼠瘡累累如串俗名老鼠串要皆屬肝腎虛損氣結痰凝而成初起用子龍丸每服三分淡薑湯下日三次外敷烏骨膏小孩不能服丸者用小金丹日日敷服至愈乃止數年忌食香橙食則復發一內潰爛或成膿未潰者或兼有未盡成膿者則用犀黃丸止其已潰之痛鬆其成膿未潰之脹消其未盡成膿之核其已成膿者用敵頭膏穿之兼服溫補祛

痰活血壯氣之劑如陽和湯加味二陳湯加味保元湯四物養榮湯皆可隨宜選用外貼陽和解凝膏

一潰爛延至肩胸脇下不堪之極四五年不能愈者用洞天救苦丹三服犀黃丸六服按潰爛不斂規法服之外用荆芥根下一段剪碎煎湯溫洗良久敷雄樟散待九日後皮色變白孔內紅活接服大棗丸肌肉漸長用生肌藥收功

一有爛至咽喉飲熱湯外覺熱痛者乃危險之極稍遲則爛穿咽喉不救急取鞭柴心一根量本人中指量其三指共積一薪隨其長短男左女右就手之左右

外科證治全書

卷三 頂部證治

四

即在手下之腳骨正中骨頂之處定準一直量上盡頭以墨記取艾團連灸三壯膏藥掩之可保咽喉不穿然後按前治法

一凡潰後瘡中或有紫塊不可妄用鍼刺當聽其自化雄樟散

雄黃 樟腦 等分

右研粉麻油調頻搗患上

灸瘰癧祕法 存驗

取肩尖肘尖骨縫交接處各有一穴即手陽明經肩頤曲池二穴也當以指甲掐之覺有酸麻方是各灸

七壯在左灸左在右灸右左右俱病者俱灸之按景岳云

又瘰癧不論已成未成已潰未潰俱宜灸之以手仰置肩上微舉起則肘骨尖自見即是灸處以三四十壯為度如患三四年不愈者辰時灸至申時三次灸即愈更服溫補之劑按此法乃單灸曲池以多為貴也然但用前法則已妙矣倘有不應者又當以此法治之

子龍丸通用五十六

小金丹通用五十二

犀黃丸通用四十八

陽和湯通用五

加味二陳湯通用十八

加味保元湯通用二十九

外科證治全書

卷三 頂部證治

五

四物養榮湯通用二十七

洞天救苦丹通用五十三

烏龍膏通用六十一

陽和解凝膏通用七十七

大棗丸通用五十五

敵頭膏通用六十一

瘰癧多由風熱毒邪與血氣相搏鬱結成核如貫珠於

耳項之間腫鞭白色搖奪不動而有根者便是瘰癧

用藥多有不效最宜於用鐙火至易至妙

鐙火焦法

如瘰癧在左則焦左邊瘰癧在右則焦右邊前至頸上耳

腳下起離六分地一點一點直下乳次過脇上至肺

俞穴頸上耳後正在瘰癧上周圍一焦第二次照原路

空處補之便愈若只有核而搖動者不是瘰癧初起

紅腫便是癰疽不可作瘰癧治

陳遠公治瘰癧方名消串丹

白芍一兩 白朮一兩 柴胡二錢 天花粉三錢

茯苓五錢 陳皮一錢 附子一片 甘草一錢

蒲公英三錢五分 紫背天葵五錢

右水煎連服八劑將藥減半再服十劑而瘰癧盡化再

服一月全愈接服六君子湯以為善後之計斷不再

發此方妙在蒲公英與紫貝天葵為消串之神藥然

非佐之以白芍柴胡則肝木不平非輔之以白朮茯苓

則脾土不健何以勝攻痰破塊之烈哉又得附子

外科證治全書卷三 項部證治 六

之力以引藥直搗中堅所以能起沈疴於旦夕耳

又云人有入生瘰癧兩頸之間盡多潰爛胸膈之上無

非瘰癧已有破頭欲腐者遂至身體寒熱肌肉消瘦

飲食少思盜汗自汗驚悸恍惚此等證原係難治然

治之有法尚可救也大約瘰癧初起以解鬱為先而

佐以補虛以消其毒倘執尋常法祛痰敗毒為事鮮

不速斃者方用轉敗散

轉敗散

人蔘二兩 柴胡二錢 白芍三錢 銀花三兩

當歸二兩 半夏五錢 白朮一兩 生甘草三錢

水煎服四劑胸膈之痰塊盡消再服四劑頸上潰爛亦

愈將前方減半再服十劑瘡口悉平再不發也

內消瘰癧應驗方

土貝母 白芷 各五錢

共為細末糖霜調陳酒下三錢重者三服愈

又方

用鼠矢兩頭尖者為雄圓者為雌揀開各曬乾研末

男用雌女用雄將雞子一箇頂上打一小洞傾去白

但存黃入鼠矢在內以滿為度攪勻用皮紙封固洞

口飯上蒸熟去殼臨臥時搓碎火酒送下隔一日再

外科證治全書卷三 項部證治 七

服雖遠年破爛者不過三四次即愈未破者即消

鈕扣風

生於頸下天突穴之間由汗出之後邪風襲於皮膚起如

粟米搔痒無度抓破津水誤用水洗浸淫成片輕者用

芥菜花一味細末醋調敷之最妙或樟硫散熟豬脂調

搽亦妙甚者須兼服消風散

消風散

荆芥 防風 蒼朮 當歸

薄荷 蟬蛻 石膏 木通

牛蒡子各一錢五分 生地三錢 甘草七分

水煎食遠服

樟硫散

硫黃一錢

樟腦

川椒紅

生白礬

各二錢

研末用白蘿蔔一箇掏空將藥填滿以蘿蔔蓋之紙包三四層灰火內煨半時許俟冷取出同熟豬油調稠搽患上

項強 俗名落枕

頸項強急轉移不便乃膀胱經感風寒溼氣所致或閃促亦令項強用硼砂研細以骨髄蘸津挑硼砂點兩目內淚出稍鬆連點三次立時即愈

外科證治全書

卷三

項部證治

八

胸部證治

井泉疽

心漏

龜胸

龜背

筋脈

胸結喉下曰缺盆缺盆下曰胸在膈之下 胸中筋結胸中手少陰心筋結胸中足太陰脾筋脈皆

散胸中足厥陰肝脈上胸中足少陽膽脈下胸中足少

陰腎脈入肺注胸中手厥陰胞絡脈起胸中筋散胸中

膈上兩旁 膈高處曰膈足陽明胃脈到膈足少陽膽經繫膈

癰疽就簡

甘疽 生胸堂兩膺 膺中疽 生胸膺之上兩膺發疽 生心窩下

外科證治全書

卷三

胸部證治

九

同蜂窩疽 生胸側乳房之 蠱疽 生胸之上項之下鎖子

瘡癰發 生乳 以上六證患盤不大俱按陽癰陰疽則

例治法

井泉疽 一名慢心銳毒

生於心胸屬任脈中庭穴初起心口內似有物塊漸大心窩發高殆至毒陷即死此危險之證醫皆縮手治宜用灸法以本人兩手十指用綫量其長短共積於綫在喉管正中處雙環至背脊之中看兩綫頭盡處則為中穴又以本人中指之中一節用柴心量準作一寸在中穴之左右各開若許皆以墨記分立三穴如每穴用艾

三大壯一齊灸之灸畢全愈

一起如豆粒腫痛燥熱者名穿心疔宜時服護心散以

防毒陷按陽癰則例同疔瘡門參治

護心散通用四十一

心漏

胸前潰竅血液常流日久年深諸治罔效者鹿茸補漏丸

主之人有胸間生瘡不慎酒色遂成漏竅常流血液久

則神形困憊腰痛難伸偃僕人以爲心漏也孰知是腎

衰而成漏乎方用溫腎丹

鹿茸補漏丸

外科證治全書

卷三 胸部證治

十

鹿茸 酥炙 附子 炮等分 鹽花 減半

右棗肉搗爲丸綠豆大每酒吞三十九

溫腎丹

鹿茸 二枚 附子 二箇 青鹽 人蘆 二兩

蔥 二枝 紅棗 四兩

右爲細末紅棗煮熟搗爲丸每空心酒下三十九服半

月而腰痛減服月餘而心漏愈

龜胸 一名雞胸

生於胸中因陽虛痰凝氣結胸膈凸起如雞胸狀堅塌不

痛不醫遂成終身殘疾初起可治年久難治從生下得

之可治從胎中帶者難治治之之法先用六君子湯數

劑調其脾胃然後以紫元丹每隔兩日進一服所隔之

兩日以小金丹陽和湯或陽和丸合加味二陳湯煎早

晚輪服輕者半月重者一月即愈如患經潰不救

由感風熱凝注爲痰停滯心胸咳嗽喘促肺氣脹滿攻

於胸膈漸成龜胸或乳母過食辛熱夏哺熱乳亦成

此證治宜寬氣化痰丸

寬氣化痰丸

大黃 三分 杏仁 百合 木通

桑皮 甜葶藶 天冬 石膏 各五錢

外科證治全書

卷三 胸部證治

十一

右爲細末蜜丸黍米大食後臨臥白開水送下

六君子湯通用二十一 紫元丹通用五十一 陽和湯通用五

陽和丸通用六 加味二陳湯通用十八

龜背

由客風吹背傳入於髓故背突如龜或咳嗽久以致肺虛

腎無所生腎主骨風寒乘虛而入於筋骨致精血不能

流通故骨弓而駝治以松藥丹

松藥丹

松花 枳殼 防風 獨活 各一兩

麻黃 前胡 大黃 桂心 各五錢

右為末蜜丸黍米大每服二十九粥飲下外以龜尿滴脊背中縫即愈
按龜胸龜背乃先天大虛不足之敗證百中難救一二豈寬中化痰松葉丹遂可治乎姑附之

外科證治全書 卷三 胸部證治 三

乳部證治

乳癰 乳疽 吹乳 乳巖 乳懸 筋脈

乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經

乳癰

乳房內結一塊紅腫熱痛大則言癰小則言癰由忿怒鬱結或多食厚味致厥陰之氣不行竅不通陽明之血壅拂於內故也初起用開結散五錢陳酒送服一服即愈如潰用醒消丸一服酒送以止其痛外貼洞天膏如潰久或老年人氣血衰傷膿出反痛惡寒發熱者須用八珍湯補之自愈

開結散

香白芷炒 製乳香 製沒藥 浙貝母 當歸等分

右為末每服五錢熱陳酒調服專治乳癰乳癰一服即消

又方 存驗

紫河車草 貝母各三錢

右為末黃糖拌陳酒沖服醉蓋取汗

醒消丸通用 四十七 洞天膏通用 七十六 八珍湯通用 二十五

乳疽

乳房結腫一塊皮色不異堅硬木痛治法同流注倘遇潰爛之甚者按潰爛不斂治法七日後接服大棗丸日服收功

大棗丸 通用 五十五

吹乳

吹乳者所乳之子口氣熾熱含乳而睡熱氣鼻風吹入乳孔氣逆乳凝遂致結腫于初起時亟煎蔥湯避風熏浴忍痛輕揉令稍軟任孩吮令乳透自可消散否則成癰癰則按前乳癰治法

外科證治全書 卷三 乳部證治

乳巖

乳巖者於乳房結成隱核大如棊子不痛不痒肉色不變多由憂鬱患難驚恐日夕積累肝氣橫逆脾氣消沮而然積二三年後方成瘡陷以其形嵌坳似巖穴之狀故名巖至此則不可救矣須於初起時用犀黃丸每服三錢酒送下十服即愈或用陽和湯加土貝母五錢煎服數劑即可消散如誤服寒劑誤貼膏藥定致日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治再若皮色變紫難以挽回勉以陽和湯日服或犀黃丸日服或二藥早晚兼服服至自潰而痛則外用大蟾六隻每日早晚取蟾破腹連雜

將蟾身刺數十孔貼于患口連貼三日內服千金托毒散三日後接服犀黃丸十全大補湯可救十中三四如潰後不痛而痒極者無一毫挽回大忌開刀開刀則翻花萬無一活男女皆然

犀黃丸

通用 四十八

陽和湯 通用 五

千金托毒散 通用 三十八

十全大補湯 通用 二十六

乳懸

此乃怪證也亦偶有之產後兩乳伸長形如雞腸垂過小腹痛難刻忍急用芎歸各一斤先各取四兩切片水煎頓服以所餘斤半切大塊產婦面前置棹棹下放火鑪

外科證治全書 卷三 乳部證治

五

將芎歸入鑪漫火燒令婦伏於棹上口鼻吸煙如藥盡未痊再如前法煎服熏吸便可縮上倘不能復舊即取葶麻子粒冷水磨塗頭頂其腸即縮即時洗去乃愈但日後再產復發萬無救矣

按乳懸其痛難忍原係怪證至危之病也是胃虛血燥而致用解懸湯時服救之外用芎歸各一斤切大塊產婦面前熏吸

有人左乳內忽大如桃不覺痛癢色亦不赤身體發熱形漸瘦損此肝木不舒痰氣鬱結用加味逍遙散服十劑愈

解懸湯

人蔘 二兩 當歸 四兩 川芎 二兩 荊芥 三錢

益母草 一兩 麥冬 一兩 炮薑 一錢

水煎連服四劑而乳頭收再四劑全愈

加味逍遙散

柴胡 二錢 白芍 五錢 當歸 三錢 陳皮 五錢

甘草 一錢 白朮 三錢 茯苓 三錢 人蔘 一錢

川芎 一錢 瓜蒌 三錢 半夏 三錢

水煎服

和乳湯

治吹乳

外科證治全書

卷三 乳部證治

末

貝母 三錢 花粉 三錢 當歸 一兩 蒲公英 一兩

生甘草 二錢 穿山甲 五分或二錢

水煎服一劑乳通腫消

此方用貝母天花粉消胃中之壅痰痰壅而乳房之氣

不通化其痰則胃火失其勢用蒲公英穿山甲解其

熱毒利其關竅自然不攻而散矣又恐前藥過于迅

逐加入當歸甘草補正和解正氣無傷而邪退舍矣

腋脇肋三部證治

黯疔 狐臭 蝦蟆氣

筋脈

腋俗名肱 手太陰肺筋脈入腋手少陰心手太陽小腸筋

結腋足少陽膽筋走腋手厥陰胞絡抵腋

肘腋下為肘

脇為脇下足厥陰肝足少陽膽脈俱布脇手厥陰胞絡筋脈

俱挾脇

季脇也俗名軟肋 手太陰肺筋抵季脇足少陽膽脈乘

季脇

外科證治全書

卷三 腋脇肋三部

末

肘空陷軟處為肘 足少陽膽筋乘肘

肋為肋後足太陰脾筋結肋足厥陰肝脈布肋

癰疽就簡

腋癰腋疽在腋窩 淵疽在腋下三 肋癰肋疽一名夾熨在

脇癰脇疽生在肋下近軟肉 俱按陽癰陰疽則例治法

黯疔

生肱肢窩中堅鞭勢如釘頭其色紫黑痒而且痛寒熱往

來四肢拘急或煩燥作嘔痛引半背治法同疔

狐臭 一名體氣

患狐臭者腋中有梭紋數孔臭從孔出治之方法頗多鮮

能除根止堪塞竅耳惟用銅青好者不拘多少米醋調成膏先以阜角湯洗淨腋下用輕粉搽過將膏塗之內用蒜肚方時常作饌食之其氣味可漸而退

蒜肚方
公豬肚一具入大蒜頭四十九枚去殼入肚內以綫紮口水煮極爛用鹽醋蘸肚隨便食之

又法

用癩蝦蟆一箇同入肚內如前煮爛去蝦蟆大蒜用熱酒食之洗浴發汗避風三日其臭頓改

蝦蟆氣

外科證治全書卷三 腋脇肋三部 六

右脇有聲如蝦蟆常欲以手按之否則聲聲相接此因驚氣入臟而成鎮驚硃砂丸主之以利為度

鎮驚硃砂丸

硃砂飛

雄黃

附子

炮去皮臍各一兩 麝香一分

巴豆仁

二十粒去油

右共研勻細末蜜搗丸麻子大每服三丸不拘時以車

前草煎湯下數日必下利如不利更加三丸至七丸以利為度

肩部證治

筋脈

肩手陽明大腸手太陽小腸手少陽三焦筋脈俱至肩手太陰肺筋結前臑足少陽膽脈至肩上肩井穴足太陽

膀胱結肩髃

肩解

背兩角為肩解

手太陽小腸脈出肩解

肩胛

肩解下成片肉為肩胛

手陽明大腸手太陽小腸筋脈俱繞肩

胛

癰疽就簡

肩癰肩疽

生肩正中乾疽生肩前廉過肩疽生肩後廉膠疽生肩下腋之

外科證治全書卷三 肩部證治 九

縫肩風毒生肩梢樂疽生肩後前腋之上骨俱按陽癰

陰疽則例治法

膊臂手三部證治

病蝦 調癰 蛇頭疔 天蛇毒 蛇眼疔

蛇背疔 蛇節疔 蛇腹疔 泥鰍癰 代指

脫疽 癩瘡 狐尿刺 鵝掌風 鵝爪風

倒甲 丫指 血餘 孽蟹毒

筋脈

肩下曰膊膊下對腋曰臑臑盡處曰肘肘當背腕肘以下為臂臂掌交接處為手腕手腕以上大指本節後肥肉隆起處統謂之魚

按手大指一名巨擘屬肺肺脈自腋入臑至大指出其端肺筋

外科證治全書 卷三 膊臂手三部 三

起于大指端少商穴之次穴有大指內側去爪甲如韭葉為肺井循手掌直上大指本節後有魚際穴為肺榮掌後橫紋頭有太淵穴為肺腧太淵後有經渠穴為肺經手腕後一寸五分有列缺穴為肺絡背腕曲中有尺澤穴為肺合循內側上臑

次指一名食指屬大腸大腸筋脈皆起于次指端商陽穴之次穴去爪甲如韭葉為大腸井潤于本節前內側為二間穴為大腸榮注于本節後三間穴為大腸腧過于合谷穴為大腸原上側中有陽谿穴為大腸經腕後三寸有偏歷穴為大腸絡肘曲紋頭盡處有曲池穴為大腸合

由是歷三里肘膠五里三穴直上

中指一名屬心包絡之脈自腋循臑入肘背至中中指出其

端其筋即起于內側之末中衝穴之次穴去爪甲如韭

葉為心井心為天君其井喻等俱在包絡取勞宮穴為心榮

掌後兩筋之間有大陵穴為心腧去腕二寸兩筋間有

內關穴為心絡去腕三寸有間使穴為心經至肘曲中

央陷中有曲澤穴為心合循臑天泉穴而止

無名指即小指屬三焦三焦筋脈俱起無名指外廉闕衝

穴之次穴去爪甲如韭為三焦井潤于小指次指歧骨

陷中名液門穴為三焦榮注于本節後陷中名中渚穴

外科證治全書 卷三 膊臂手三部 三

為三焦腧結于手腕陷中之陽池穴為三焦原直上腕

後二寸名關外穴為三焦絡腕後三寸名支溝穴為三

焦經結于肘外大骨上陷中名天井穴為三焦合于是

上臑

小指內側屬心外側屬小腸心脈循臑下肘屬小指之端

心筋起小指之端內側少衝穴之次穴去爪甲如韭葉

直上入掌內後廉歷神門穴在掌後兌骨中又歷通里

穴在腕後一寸陷中又歷少海穴在肘後大骨外去肘

端五分屈肘上頭得之又歷極泉穴在背內側下筋間

小腸經脈俱起于小指外側少澤穴之次穴去爪甲一

分爲小腸井濡于小指外側本節前陷中名前谷穴爲
小腸榮注于小指外側本節後名後谿穴爲小腸腑直
上至于腕起骨陷中有腕骨爲小腸原踝下有陽谷穴
小腸經腕後五寸有支溝穴爲小腸絡肘下兌骨之後
有小海穴爲小腸合由是上臑

癰疽就簡

癰疽 生背之下 藕包毒 生臑後垂肉處 石榴疽 生肘
餘 肘癰 生手背腕 兒疽 生手背腕裏面橫 穿骨疽 生掌後
陷中 兩筋 手背發 生手背 掌心毒 生手背 勞宮穴若偏于掌
又名鴉癰有單方用新系 虎口疽 生于大指次指歧骨
葉不拘多少研爛卷之

外科證治全書

卷三 膊臂手三部

癰毒初起漫腫色白木痛堅韌者按疽例治若初起黃
色小泡麻痛根深隱隱有紅綫上攻腋內合谷穴須將
疔眼挑去當紅綫盡處用 手了發 生于骨縫間除大
鍼破斷按疔瘡用治法 同此名 俱按陽癰陰疽則例治法
病蝦 一名肉蟹癰

生于手背形勢如蝦高梗橫長赤腫疼痛用嫩桑葉七錢
生地三錢冰片一分搗爛敷之

又方

用食鹽酒糟香油同炒令香淬以滾湯淋洗患處即
消內服仙方活命飲如潰按陽癰陰疽則例治法
仙方活命飲 通用

調癰

患生手大指初漫腫漸如李青紫麻木痒痛徹心宜刺破
出膿血貼洞天膏服仙方活命飲倍黃芩
洞天膏 通用 仙方活命飲 通用

蛇頭疔 天蛇毒

此二證俱生手指頭尖初起小泡色紫疼痛堅韌如釘者
名蛇頭疔初起悶腫無頭色紅痛如火燎者名天蛇毒
其治法相同取白蘿蔔一段挖空以雄黃填入蒸半熟
套患指上或取烏梅搥碎去核肉只取仁研粉米醋調
塗皆可消如患色白者當作疽治小金丹服愈

外科證治全書

卷三 膊臂手三部

小金丹 通用

蛇眼疔 蛇背疔 蛇節疔

蛇腹疔 泥鯁癰

此五證名雖殊而治一也蛇眼疔生于指甲兩旁形如豆
粒色紫半含半露鞭似鐵釘蛇背疔生于指甲根後高
腫色紫蛇節疔 生于一名蛙 生于中節遠指俱腫其色或黃
或紫蛇腹疔生于指中節前面腫如魚膺色赤疼痛泥
鯁癰一指通腫色紫形如泥鯁熱痛連肘背五證俱
敷雄黃散內服仙方活命飲潰貼洞天膏即愈
雄黃散

明雄黃一錢 輕粉五分 蟾酥二分 冰片一分
右共研細末新汲水調濃重湯炖温敷于患指用薄紙
裹之日三次

仙方活命飲通用 洞天膏通用

代指

生於指甲之內先腫焮熱疼痛應心初宜用蔥葉烏梅仁
搥碎去核肉只取仁共研和醋浸之或用甘草撲硝各
五錢煎水浸之亦瘥若至三四日後指甲背上微透一
點黃白色此係肉膿已成但無頭路潰出急用錢鍼在
指甲身上就膿頭處鍼一小孔膿方得出捏盡餘膿以

外科證治全書 卷三 疔瘡 疔

膏貼之若失治或過敷涼藥致毒膿過鬱必潰浸好肉
爪甲脫落用洞天膏貼之一兩月方愈

脫疽 一名羌蠲

脫疽多生手指節中無名指上最多不紅不熱腫如蟾腹
疼痛乃少陰痰氣凝滯書云亟翦去其指可保其命遲
則腫延手足背救無術矣殊不知此亦疽也大人用陽
和湯小孩用小金丹最慢者用犀黃丸皆可消之若初
起色紅者則按泥鰍癰治法

陽和湯通用 小金丹通用 犀黃丸通用

癰瘡

生於指掌之中形如茱萸兩手相對而生亦有成攢者起
黃白膿泡痒痛無時破津黃汁水時好時發極其疲頑
用藜蘆苦葶各一兩猪油八兩將二味炸枯濾去渣入
製松香末枯礬末各八錢雄黃細末一兩攪勻候温塗
之以痊為度忌食動風雞鵝魚腥等物

狐尿刺

此證大成書名狐狸刺外臺總錄二書名狐尿刺乃螻蛄
當甚暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人手足誤觸之
即成此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫焮痛十日後
潰腐瘡口日寬宜服敗毒湯外以蒲公英連根濃煎洗

外科證治全書 卷三 疔瘡 疔

之如得鮮蒲公英搗汁塗患上更佳蓋螻蛄又名野狐
鼻涕此證取名乃本於此也

一云狐尿刺有孔刺痛有蟲用麴末和獨蒜杵勻納瘡
孔中蟲出愈

鵝掌風

手足掌心燥癢起皮堅厚枯裂者以豆腐漿沫熱洗之輕
者搽砒油每三四次至愈乃止如日久延及偏手枯裂
極重者用二礬湯

砒油方

紅砒一錢 敲細如粉

右用麻油一兩煎至砒枯煙盡爲度去砒雷油聽用凡患風之處先以火烘皮熱以油擦之日三次至愈乃止

二礬湯

白礬

阜礬各四兩

兒茶五錢

側柏葉半斤

右用水十碗煎湯先用桐油擦抹患上取紙燃蘸桐油點著以煙焰向患上熏之片時方將前藥湯乘滾貯淨盆內以架上用布蓋令湯氣熏蒸勿令洩氣待湯微熱蘸洗良久一次可愈七日忌下湯水永不再發
鵝爪風

外科證治全書

卷三

購臂手三部

素

即油灰指甲用白鳳仙花搗塗指甲上日日易之待至鳳仙過時灰甲即好

倒甲

爪甲忽然倒生肉內刺痛如錐食葵葉即愈

丫指

手生了指疼痛無奈用通草爲末雜子清調敷即愈
治丫指方

用石灰內未燒透石子澆生蜂蜜在粗石上椎融敷患處一夜即愈

血餘

十指斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸徧身緣毛名血餘用茯苓胡黃連煎服即愈

孽蟹毒

即手大指之間所生俗名丫指用活蟹杵爛塗之

外科證治全書

卷三

購臂手三部

毛

背部證治

筋脈

背從脊開一寸五分對第三椎曰肺俞對第五椎曰心俞

對第七椎曰鬲俞對第九椎曰肝俞對第十椎曰膽俞

對第十一椎曰脾俞對第十二椎曰胃俞對第十三椎

曰三焦俞對第十四椎曰腎俞對第十六椎曰大腸俞

對第十八椎曰小腸俞對第十九椎曰膀胱俞

從脊開三寸對肺俞曰魄戶故肺藏魄對心俞曰神堂故

心藏神對肝俞曰魂門故肝藏魂對脾俞曰意舍故脾

藏意對腎俞曰志室故腎藏志膏肓對四椎督脈主脊

外科證治全書 卷三 背部證治 未

手陽明大腸筋挾背手少陰心脈與脊裏細絡相連貫

足太陰脾筋著脊足少陰腎脈貫脊足太陽膀胱筋脈

挾脊分左右上頂

脊兩旁 脊日脊 足太陽膀胱脈循脊足少陰腎脈挾脊

發背

發背乃癰疽中大患因其患位對心對肺對臍耳偏曰手

搭發背因手可搭而名紅腫痛甚者屬陽以陽癰治法

初起用五通丸醒消丸早晚以散毒湯輪服則皮破痛

息再服至愈如潰即用內托散醒消丸亦早晚輪服外

貼洞天膏收功此陽發背之治法也色白腫痛或平塌

不痛者屬陰以流注陰疽治法初起用加味二陳湯加

陽和丸或即用陽和湯消之皮色稍變痛急難忍惟服

陽和湯以止其痛消其未成膿之餘地使已成膿者至

不痛而潰既潰貼陽和解凝膏內服陽和湯氣虛者兼

加味保元湯毒深兼犀黃丸早晚輪服至愈乃止愈後

或背上仍如負板舒轉不快者用小金丹十九丸每日早

晚兩進消其毒根自好此陰發背之治法也

再按背部之患如蓮子發蜂窩發陰陽二氣疽串疽連

珠發禽疽痰注發黃瓜癰諸書名類頗多概名之發背

洞曉陰疽陽癰變通治法則無誤矣

外科證治全書 卷三 背部證治 未

五通丸 通用 醒消丸 通用 陽和丸 通用

加味二陳湯 通用 陽和湯 通用 犀黃丸 通用

小金丹 通用 加味保元湯 通用 陽和解凝膏 通用

洞天膏 通用

腰部證治

腎俞發

紅癩毒

纏腰火丹

筋脈

腰即脊骨十四椎下十五

足厥陰肝足少陰腎脈入腰足

太陽膀胱脈抵腰

腎俞發

生腎俞穴在脊骨兩旁陷肉處按陽癰陰疽則例治法

紅癩毒

腰間發一紅癩如癰兩邊各生一紅綫纏至臍腹則死用

墨水磨濃調雄黃末塗之即愈

外科證治全書

卷三 腰部證治

三

纏腰火丹

生腰肋間纍纍如珠形有乾溼不同紅黃之異乾者色紅

赤形如雲片上起風粟作痒發熱屬肝膽風熱宜服龍

膽瀉肝湯溼者色黃或起水泡大小不等作熱爛流

水較乾者更疼屬肝脾溼熱宜服胃苓湯加山梔防風

石膏其小泡用錢鍼穿破外俱用糞桶箍炭火燒存性

研末香油調敷或用蛇蛻煨毛廁蹲板上泥等分麻油

調敷俱效此證不速治纏腰已遍毒氣入臍令人膨脹

悶嘔者危險須急治之

胃苓湯

蒼朮

陳皮

澤瀉

厚朴

豬苓

生甘草

右水煎溫服

除溼逐丹湯

治蛇串白泡

防風 五錢

蒼朮 三錢

赤苓 五錢

陳皮 一錢

厚朴 一錢

山梔 三錢

甘草 三分

白朮 三錢

薄桂 三錢

水煎服連服數劑丹退而愈

龍膽瀉肝湯通用

外科證治全書

卷三 腰部證治

三

腹部證治

橫痃 臍中出水 小兒臍溼臍瘡 小兒臍突

筋脈

臍人生胞 手少陰心筋足太陰脾筋結臍足陽明胃筋脈

挾臍

臍腹 臍之下曰少腹 足厥陰肝脈抵少腹

癰疽就簡

幽癰 寸上臍穴 中脘疽 寸中臍穴 疔疔 寸建里穴 衝疽 寸

上二寸 臍癰 神關穴 箭袋癰 左右同 少腹癰 疽 生少

海丹田關元 緩疽 左右同 俱按陽癰陰疽則例治法

外科證治全書 卷三 腹部證治 三

橫痃

生於少腹兩旁大骸界中形如腰子皮色不異鞭如結核

按之微痛是也初起每日取阜角刺六錢為末布袋盛

之同糯米二合煮粥頻食三四日即消或用子龍丸每

服三分淡薑湯下日三次至愈乃止切忌用刀鍼刺破

無膿惟出白膩漿主三百日內死自潰者亦然

一有自潰者用生料補中益氣湯小金丹日令輪服亦

有收功者少壯之人血氣未傷能自保攝雖潰猶可

救援十中二三也

一有身患楊梅又患橫痃者其間用藥最難惟用犀黃

丸每日空心時酒送三錢輕者十服重者加倍二證全愈

子龍丸 通用 犀黃丸 通用

臍中出水

臍中不痛不腫甚痒時流黃水或浸淫成片此腸胃積溼

宜服芩連平胃散外撒三妙散即愈忌酒麪生冷果菜

庶不復發

芩連平胃散

黃連 三錢 陳皮 三錢 蒼朮 一兩 生甘草 三錢

茯苓 一兩 厚朴 三錢

外科證治全書 卷三 腹部證治 三

右共研細末每服三錢白滾湯調下 按臍中出水不腫

用此方當去黃連加 防風三五錢為妙

三妙散

檳榔 蒼朮 生 黃檗 各等分

右共研細末乾搓臍上

小兒臍溼臍瘡

小兒沐浴不可久在水中任意洗濯既包裹畢宜時常留

意不可令尿溼浸臍如不知慎遂致肚臍浸潰不乾名

曰臍溼宜用枯礬龍骨等分共研細末乾撒臍上甚則

焮赤成瘡名曰臍瘡用蟬蛻散敷之

螵蛸散通用六十八

小兒臍突

嬰兒肚臍突出赤腫虛火是也用二豆散敷之日二次其

腫漸消

一初生旬日外兒臍忽腫如吹不紅捻動微響或驚悸

作嘔者此受寒溼也用白芍藥湯加以仁煎汁頻灌

嬰兒敷藥如前

白芍藥湯

白芍酒炒一兩 澤瀉五錢

生甘草一錢二分

肉桂一錢 剝薄者刮去粗皮

外科證治全書卷三 腹都證治

毒

右共研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心服如臍下

痛加鉤藤一錢薑一片食鹽五釐同煎

二豆散

赤小豆 淡豆豉 天南星去皮臍

白蘇各一錢

右為細末每用五分芭蕉汁調敷臍四旬日二次

前陰證治

跨馬癰

便毒

懸癰

囊癰

子癰

囊脫

腎囊風

膀胱氣

陰頭癰

下疳瘡

猴子疔

小兒莖腫

膀胱氣痛

陰蝨瘡

強中

陰挺

陰腫

陰痒

陰脫

陰冷

陰癩

陰疔

筋脈

前陰即陰器男女同

足太陰脾筋足陽明胃筋聚陰器足厥陰肝

筋脈結陰器絡諸筋

外科證治全書卷三 前陰證治

毒

毛際小腹下橫骨間叢毛之際也

宗筋會於毛際足陽明胃筋脈入毛

際足少陽膽脈繞毛際

跨馬癰

生腎囊之旁大骸根裏夾縫中腫如鵝卵墮壅重赤色

痲痛初宜服仙方活命飲消之潰後用托毒散犀黃丸

愈之如初起患白色而鞭則名冬瓜疽當按陰疽則例

治法

仙方活命飲通用一

犀黃丸通用四十八 托毒散通用三十八

便毒一名血疔

便毒者言於不便之處為患也按便毒生小腹下骸根上

摺紋縫中即橫痃之部位古書無橫痃之名故稱橫痃為便毒且謂因交感不潔遭淫毒而患者最多每每先起下疳下疳未已便毒繼之斯言誠是也然既稱橫痃又名便毒二者證治迥殊何堪混同以治法論之初起色紅焮熱腫痛大小便秘濇者此溼熱穢毒所發則為便毒用三黃丸每日熱陳酒送服醉取汗或兼龍膽瀉肝湯早晚輪服即消而愈如初起一核形微長如蛤色白不紅堅鞭木痛者乃勞損虛弱之證則為橫痃當按腹部橫痃治法或有兼下疳楊梅而發者亦屬虛損所致須二證皆宜之藥除犀黃丸外別無他法日令服之

外科證治全書 卷三 前陰證治 素

自可痊愈
一魚口即斯證潰後之別名也因生小腹下大骹根縫中其瘡口漸大身立則口必合身屈則口必張形如魚口開合之狀故有魚口之名最難斂口當問其初起色紅雪白按法治之兼服補益氣血之劑以冀獲倖

三黃丸 通用四十九 犀黃丸 通用四十八 龍膽瀉肝湯 通用九

懸癰 一名騎馬癰 一名老鼠偷糞

生肛門前陰根近後陰兩相交界之處初起細粒漸如蓮子數日大如桃李其色紅焮痛者急用生甘草熟軍各

三錢酒煎空心服一劑即愈如成膿則用醒消丸既潰兼以國老煎輪服以速斂為貴其色白堅鞭者用小金丹消之如潰兼以鹿角膠三錢清晨酒化下每日輪服或用溫補氣血之劑同小金丹早晚輪服亦妙至愈乃止斯證潰後一經走洩即生管成漏大小便從此滲出血脈瀝盡而死證同怯損諸漏可治獨此不能治治則漏管愈大遂成海底漏

外科證治全書 卷三 前陰證治 素

懸癰多有由忍精提氣而成所謂欲洩不洩化為膿血是也最難療治以其部位皮肉與他處不同蓋他處皮肉或橫生或直生俱易合口而懸癰之處橫中有直直中有橫一有損傷不易收功初起色赤焮痛者用逐邪至神丹銀花四兩蒲公英二兩人蔞一兩生甘草一兩當歸一兩大黃五錢天花粉二錢水煎服一劑消毒二劑全愈潰者三劑可以收功此方用銀花蒲公英佐之蔞歸又用大黃五錢攻逐虛人似乎非宜初起毒正盛乘其初起之時正氣未衰補而兼瀉之藥方為得宜倘因循失治或畏縮不前及至流膿出血正氣蕭索始用蔞者補氣往往用至數斤尚不能復原何不早用補藥於化毒之中正氣無傷毒又解散矣

國老煎

粉甘草

一兩截斷用酒內水浸潤慢火炙透

右一味細剉用無灰酒煎服

醒消丸

通用四十七

小金丹

通用五十二

囊癰

陰囊紅腫焮熱疼痛乃肝脾溼熱下注龍膽瀉肝湯加澤瀉主之如潰則按後囊脫治法

子癰

腎子作痛下墜不能升上外現紅色者子癰也或左或右故俗名偏墜遲則潰爛莫治當其未成膿時用枸橘湯

外科證治全書

卷三 前陰證治

美

一服可愈小兒偏墜腎囊子或一箇腫大一箇小用香

薹厚朴枳殼薑汁炒木通扁豆生薑甘草車前葉煎服或

用萬年青根五寸去黑皮搗碎白酒煎服不喫渣即愈

枸橘湯

枸橘 全箇

川棟子

秦艽

陳皮

赤芍

生甘草

防風

澤瀉 各三錢

右水煎食前頓服按此方當加柴胡一錢五分為安熱痛者更加梔仁一錢或黃芩一錢

囊脫

陰囊生毒破爛腎子落下臭氣難聞外用紫蘇煎湯日洗更取紫蘇連梗葉為末日敷以青荷葉裹之內服黃連

五分黃芩歸尾連翹木通各一錢五分甘草一錢煎服俟其爛孔收小肌色紅白服歸芍地黃湯敷生肌藥收功

腎子爛出老杉木燒灰存性蘇葉末各等分研細末敷上仍以蘇葉包之

腎囊腫如琉璃鏡樣用塘內水上無根浮萍以篩盛之下用水一盆置篩於盆上烈日曬乾為末每服二三錢即消腫痛如用鍋焙萬不能乾

歸芍地黃湯 通用三十七

腎囊風 一名繡毬風

外科證治全書

卷三 前陰證治

美

腎囊燥痒係膀胱風熱用合掌散以右手中指蘸滿香油黏藥塗入左手心合掌磨擦數次只有藥氣不見藥形為度將兩掌搓擦患處每日早晚擦二三次三日即愈再擦三四日不發

一有溼熱抓破成瘡者則用黃丹枯礬生牡蠣等分為末擦散即愈或以蛇牀子同白礬煎湯洗之亦愈

合掌散

硫黃 一兩 鐵鏽 二錢 紅砒 五分

右共研極細如麪取蔥汁調和塗入大碗內勿使厚薄以碗覆於瓦上取艾置碗下熏之待熏至藥乾敲藥

腕聲同空腕無異為度取藥再研極細聽用
膀胱氣

陰囊腫大如斗陰莖縮內小便不快此腎虛受邪五苓散

加葱白茴香鹽主之外取生蔓菁根即諸葛菜根搗敷奇效

五苓散

豬苓去黑皮一錢 茯苓一錢 白朮一錢二分 澤瀉一錢

肉桂五分

右水煎服或為細末開水調服

又方

用蛇牀子為末雞子黃調敷

外科證治全書卷三前陰證治

陰頭癰

陰頭紫腫疼痛名陰頭癰用鼈甲煨為末雞子清調敷

下疳瘡

下疳一證屬肝腎督三經之病諸書分下疳生馬下疳生

莖上袖口疳莖上生疳外蠟蠟笑疳久雞膽疳疳引

瘡疳痛而多痒潰而根疳馬口旁有孔如櫻眼楊梅

疳生楊梅瘡時誤用熏擦楊梅內疳生楊梅瘡時服輕

疳等藥以致腐爛如血楊梅內疳粉水銀打成劫藥

以致便溺尿等名其治不離乎內因外因兩法內因者

由慾火猖動不能發洩致敗精溼熱滯滯為患加味逍遙散六味地黃丸主之外敷蟬蛸散溼熱既清其瘡自

愈無足慮也外因者由娼婦陰器瘡毒未淨輒與交媾

致淫精邪毒感觸精宮為患最不易愈如治得法亦必

發出便毒穢瘡下疳以洩其毒始愈宜服龍膽瀉肝湯

三黃丸疼痛難忍者用聖靈丹五分數服奏功倘潰爛

日久真陰虧損須禁用苦寒惟用三黃丸六味地黃丸

早晚輪服為妙外以忍冬生甘草各一兩赤皮蔥三莖

槐枝六十寸煎湯日洗二次蟬蛸散敷之

近錄槐花藥一方治疳甚效不拘內因外因凡毒輕者

宜用之景岳先生云嘗治一少年因觸穢毒遂患下

疳始潰龜頭敷治不效隨從馬口延入尿管以漸而

深直至肛門逐節腫痛形如魚骨每過夜則膿結馬

口脹不得出潤而通之則先膿後尿敷洗皆不能及

甚為危懼余曾遇一山叟傳得槐花藥方法以治之

不十日而莖根漸愈半月則內達外退至馬口而全

愈疳愈後即現些微廣瘡復與五加皮飲十餘劑而

全愈

毒結龜頭生疳往往有腐爛連龜身爛落者世人多以

外敷藥治之雖外藥不可少然不先治其內遠用外

藥以止遏不啻如石壓卵也先用毒神散黃檗三錢

茯苓一兩生甘草三錢炒山梔三錢肉桂一錢水煎

服四劑則內證火毒從小便出疼痛稍止然後用生勢丹敷之炒黃檗三兩兒茶一兩冰片三分生草一兩大黃三錢乳香一錢沒藥一錢麝香三分丹砂一錢各為極細末和勻糝之糝上即止痛逢溼即糝不數日膿盡血乾肉筋再長如舊一月全愈但不能再長龜頭也愈後須補氣血用十全大補湯服數十劑則外勢仍然伸縮尚可種子

一有疔瘡初發多先病魚口苟不急治必遍身生瘡遷延歲月腐爛身體多不可救故必須早治為妙治法宜於補中藥內加消毒藥則毒盡出不致身體虧損

外科證治全書 卷三 前陰證治 聖

方用人蔞一兩生耆一兩當歸一兩遠志三錢生草三錢銀花一兩大黃一兩石膏一兩柴胡二錢白朮一兩天花粉三錢水煎服一劑而大便瀉出惡物臭穢不堪恐外人傳染須掘土埋之再服二劑惡穢盡洩不留於腸胃矣後去大黃石膏加土茯苓二兩同煎再四劑則一身上下與頭面之間必有隱隱瘡影現於皮膚之內再服二劑瘡影漸消再服二劑全愈永不發矣此方用大黃以洩其毒石膏以消其毒甘草銀花以化其毒柴胡天花粉以散其毒更助以大補血之藥此方余親試而取效也倘病人陰虛陽燥

方中可加熟地數兩或加元蔞一兩亦可餘藥不可亂加也

下疳明礬皂礬各等分為末裝一大五椀子內燒灰存性研細末再加冰片三分兒茶少許先用甘草水洗淨然後搽之百發百中橄欖核燒灰敷疔疔良

下疳陰痒生甘草煎湯熏洗用海螵蛸散搽之 又方龍甲為末雞子清調敷

附方 存驗

生甘草

右一味研細末蜜調塗疔瘡神效

外科證治全書 卷三 前陰證治 聖

加味逍遙散 通用 十六 三黃丸 通用 四 六味地黃湯 通用 四

龍膽瀉肝湯 通用 九 槐花藥 通用 四 海螵蛸散 通用 六

聖靈丹 見楊梅結毒

猴子疔

是證小兒多得之從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結疔或眼梢口旁亦紅若不早治必至爛死此證切忌洗浴只用軟棉帛蘸甘草湯拭淨用藥雖延蔓遍身可保立愈此方已屢試見效矣

綠豆粉 一兩 輕粉 一錢 漂砂 一錢 冰片 一分或五分 為極細末將金汁調鵝毛蘸敷上如無金汁雪水亦可

或甘草燈心湯亦可一方輕粉用二錢加牛黃一分內再服退毒散乳母亦宜藥戩分增減諒精神強弱服之

黃連 銀花 連翹 甘草

赤芍 當歸 牛膝 桔梗

黑山梔 薄荷 木通等分

用新汲水煎洋再煎食遠服

小兒莖腫

小兒莖腫莖即陽物如腫痛用黃連木通各一錢煎服即愈

外科證治全書 卷三 前陰證治

膀胱氣痛

膀胱氣痛凡小兒小腸氣痛與膀胱氣痛皆在臍下氣海兩邊筋腫到腎囊邊痛不可忍治用川棟子橘核小茴香荔枝核俱焙炒為末白酒熱調三四錢服之不數服即愈

陰蝨瘡 一名八腳蟲

前陰毛際內由慾後失洗不潔搏滯生蟲起疙瘡或紅或白瘙癢難忍用百部浸燒酒頻擦之即愈或以生白果仁擦之亦效如毛內如豆如餅發痒結如蠟皮者楊梅毒也當按楊梅瘡治法

強中 一名腎漏 一名如精

玉莖強鞭不痿精流不止痛如鍼刺乃腎滯漏疾也用韭菜子補骨脂各一兩炒為末每六錢水一椀煎半服接服大劑六味地黃湯

六味地黃湯 通用四

陰挺

陰戶中突出如菌芝或挺出數寸此因胞絡傷損或分娩過勞或熱鬱下墜治當升補元氣為主補中益氣湯加味逍遙散早晚輪服外用生豬脂調藜蘆末塗之

外科證治全書 卷三 前陰證治

陰腫

陰腫陰戶忽然腫而疼痛由肝脾傷損溼熱下注肝傷而翻突如餅如雞冠或潰爛四物湯加柴胡山梔丹皮膽草主之脾傷則悶腫墜痛補中益氣湯加丹皮山梔主之外用甘菊苗葉不拘多少搗爛以滾水淋汁熏浸洗之

四物湯 通用二 補中益氣湯 通用三十

陰痒 一名陰蝨 一名陰蟲

陰痒三蟲在腸胃因臟虛蝕陰微則痒甚則痛或外生疙瘡或膿水淋漓宜用加味逍遙散加槐實白斂外用蛇床子一兩白礬五錢煎湯淋洗用桃仁研膏和雄黃末

或用雞肝納陰中

此證亦有肝脾虧損溼熱下注而痒者補中益氣湯加

山梔丹皮芍藥

加味逍遙散通用 補中益氣湯通用

陰脫

陰戶開不閉痒痛出水由腎元不固陰分有火用加味道

遙散加味歸脾湯如產後得者補中益氣湯加五味子

醋炒白芍外俱用荆芥枳殼訶子五倍子各一兩煎湯

熏洗

陰冷

外科證治全書 卷三 前陰證治

哭

婦人陰冷有寒證有熱證寒由陽虛熱由溼熱溼熱者必

小便澀數黃赤大便燥結煩渴加味逍遙散主之陽虛

者必小便利腹中或痛畏寒八味地黃湯主之

加味逍遙散通用 八味地黃湯通用

陰癩 俗名癩胡盧

陰癩即婦人子宮脫出乃氣虛下陷小便先似有堵塞之

意因而努力久之隨努而下須令穩婆扶正胡盧患婦

仰臥以枕墊腰吹噓藥取噓收之倘不收用草麻子肉

搗爛貼頂仍如前法仰臥墊腰吹噓藥收之既收入隨

去草麻子肉令其緊閉陰戶以布帛將兩股並縛內用

補中益氣湯倍升麻黃耆大劑服之如因產而患者治

法亦同 補中益氣湯通用

陰疝

陰疝小腸兩旁頂起脹疼係肝腎寒邪逍遙散加木香沈

香檳榔主之

逍遙散通用

外科證治全書 卷三 前陰證治

哭

後陰證治

臟毒 痔瘡附痔漏 坐板瘡 肛門作痒 脫肛 截腸

筋脈

後陰門即肛 手太陰肺手陽明大腸所主之地

尻尾骶骨 足少陽膽經結尻

腎尻旁 足太陽膀胱脈貫腎筋亦結腎

癰疽就簡

鷓口疽坐馬癰生尾尻高骨尖處 腎癰腎疽生腎肉厚處 上馬癰下馬

癰生腎肉之上分左右 俱按陽癰陰疽則例治法

臟毒

外科證治全書 卷三 後陰證治 癰

臟毒者醇酒厚味勤勞辛苦蘊毒流注肛門結成腫塊其

證有內外虛實之別發於外者肛門兩旁突腫形如桃

李大便秘結小水短赤甚者肛門重墜緊閉下氣不通

刺痛如錐脈數有力此屬實熱易治用四順清涼飲內

消沃雪湯通利大小便外用田螺水搽之發於內者在

肛門內結腫刺痛如錐大便虛秘小便淋漓或咳嗽生

痰或寒熱往來遇夜則尤甚脈數無力此屬陰虛溼熱

滲注難治用四物湯加焦黃槩知母甘草木通兼六味

地黃丸調治自安元氣虛陷及潰膿水者用補中益氣

湯加地黃槐花天花粉或兼六味地黃湯早晚輪服

四順清涼飲

連翹 赤芍 防風 當歸

山梔仁 生甘草 檳榔 木香 各一錢

大黃二錢炒

右酒水各半煎

內消沃雪湯

青皮 陳皮 製乳香 製沒藥

當歸 丹皮 甘草節 廣木香

皂角刺 穿山甲 山梔 浙貝 各一錢

右酒水各半煎服便秘者加大黃

外科證治全書 卷三 後陰證治 癰

田螺水

用大田螺一箇刀尖挑起螺厖入冰片末五釐平放

瓷盤內待片時螺殼滲出漿水用雞翎蘸點患處按此

方治痔腫 外痛亦妙

四物湯通用二 補中益氣湯通用三 六味地黃丸通用四

痔瘡 附痔漏

一痔瘡有患肛門內者有患肛門外者其肛門邊生出數

瘡腫而突出膿潰即散者為牝痔肛門邊露出如珠狀

如鼠奶淋血流膿者為牡痔腸口顆顆發癩且痛且痒

血淋漓者為脈痔肛門內結核出血發寒熱登廁則脫

肛者爲腸痔肛門腫痛遇怒卽發怒息則安者爲氣痔酒醉卽腫痛流血者爲酒痔同房後卽腫痛發者爲色痔每大便注有血不止者爲血痔名類頗多總因醉飽入房筋脈橫解精氣脫洩熱毒乘虛下注或好淫強固其精以致木乘火勢而侮金或炙博厚味過多或勞傷元氣陰虛火熾皆成斯疾未破曰痔已破曰漏生管者難治久病咳嗽而生痔者多致不救皆宜戒房勞忌河豚海腥辛辣椒酒等物

一外痔用蘇合膏塗患處日二次至愈乃止內服杜痔丸

外科證治全書

卷三

後陰證治

辛

一內痔用枯痔散用時令患者登廁翻出肛外側臥其痔盡出勿使收入亦有痔自翻出者大如茶杯形如一蕈糞從菌心而出痛極上面如盆四邊高心陷下如菌根糞後用杜枸根搗爛煎汁熱熏溫洗或甘草湯葱椒湯俱可洗淨以洞天膏攤如菜碗大中剪一孔以四邊剪開通於孔孔烘鎔加於菌根貼放屁眼四邊圍護好肉誠恐上藥時致藥汁淋於好肉耳每取藥一二分入杯津調筆蘸拂菌之外面四邊各拂一次菌之中心通連屁眼大忌拂藥倘有流入大痛難當拂一兩日毒水流菌形漸縮而輒再拂一兩

日漸鞭而黑菌邊日有枯皮脫下換藥以椀盛湯用筆輕輕洗去舊藥再上新藥仍用護藥如前法三四日之後黃水出將盡可用藥一錢內增硃砂一分如前津調日夜照拂則菌縮小黑鞭再拂至菌根自落全愈內服槐花藥虛人先用八珍湯數劑然後用法治之

一痔已通腸污從漏孔出者用胡連追毒丸如服後膿水反多者藥力到也勿以爲懼待膿血追盡用黃連閉管丸

一漏有管者用黃連閉管丸早晚服一次重者四十日

外科證治全書

卷三

後陰證治

辛

可愈

一有血箭痔生肛門或成堵塞墜腫每逢大使用力則鮮血急流如箭不論糞前糞後由腸胃風熱所致生熟三黃湯主之如唇白面色痿黃四肢倦怠屬氣血兩虛宜用十全大補湯去肉桂加柴胡升麻倍蕩者服之外用自已小便洗之或童便熱洗更妙其血自止

一有痔大如拳貫於腸頭發則疼痛僵仆先用荆芥湯洗之次以艾灸其上三五壯如覺一道熱氣貫入腸中必大瀉鮮血穢血一時頓覺痛甚其疾乃愈

一有勤苦勞役之人及婦女輩不能外治則從內裏服藥惟用補中益氣湯隨證加減最妙此常治驗之方也其加減如結腫脹悶加槐角木香梔子之類作痛作痒加防風生地槐花之類下血加地榆烏梅黑荆芥之類潰膿加黃芩銀花生地之類因產而患者加桃仁紅花川芎之類瀉而患者加蒼朮車前熟地之類因痢而患者去黃耆加木香黃芩白芍之類各推病因以施加減在人神而明之不可膠柱鼓瑟痔漏世人治法多用刀鍼藥綫徒受苦楚而內毒未除外口難長經年累月難奏功效豈果漏瘡之不可治

外科證治全書 卷三 後陰證治 聖

乎抑酒色之戒不嚴而治之不得其法耳惟以補中消其溼熱之毒則何漏之不可痊哉方用青龜丸人有大便時先瀉血幾許而始便糞者人以爲便血病也孰知肛門暗生血痔日久變爲漏管流膿血不知受病不同而見證亦異此等之證多得之飲燒酒過多熱入直腸不得遠洩結成小痔不化久則皮破血流乃出於直腸之外非出於直腸之中係膀胱之血也用清源散

蘇合膏

蘇合油 槐花 研粉 一兩 一兩 程膽末

冰片末 各五錢
右研和入洞天嫩膏一兩五錢和勻固貯勿令洩氣臨用取塗患上日二次至愈乃止
枯痔藥

好白礬 四兩 生砒 四分

右研爲細末共入陽城罐內一法先將砒人罐底次將礬末蓋之外圍炭火煨之至礬鎔有煙起煙卽砒毒人立上風忌聞受其毒俟煙盡礬枯去炭冷定取出將礬研細末如粉每取一錢加入飛過硃砂一分研和聽用按此藥只是借砒氣於礬內又有硃砂以解之

外科證治全書 卷三 後陰證治 聖

杜痔丸

地骨皮 大生地 各三兩 黃芩 丹皮 各一兩

槐花 一兩 甘草 黃檗 各五錢 蒼朮 一兩

右爲末白蜜爲丸每早晚各服五錢

胡連追毒丸

胡黃連 切片薑汁拌炒研末一兩 刺蝟皮 炙切片再炒黃研末一兩

右共和一處研勻頓飯爲丸如麻子大每服一錢食前

開水送服

黃連閉管丸

胡黃連 淨末一兩 穿山甲 油炸 石決明 煨 槐花 各五錢

右研細末煉蜜爲丸如麻子大每服一錢空心清米湯下早晚服兩次至重者不過四十日愈可代刀鍼藥縫之力如漏管四邊有肉突起者加殭蠶二十一條研末入藥內按殭蠶一方作蠶繭

退管丹方 存驗

用黃荆條所結之子取炙燥爲末每服五錢黑糖拌空心陳酒服專治痔漏之管服至管自退出方止

生熟三黃湯

生地 熟地各二錢 黃連 黃蘗

黃芩 人蔞 白朮 蒼朮

外科證治全書

卷三 後陰證治

毒

厚朴 陳皮 歸身 地榆

防風 澤瀉 甘草各一錢 烏梅一個

右水煎溫服

青龜丸

龜一箇 茯苓五兩 羊躑後爪四副土炒

穿山甲五錢土炒 人蔞二兩 乾青苔一兩

當歸三兩 瓦松二條陰乾不用火焙 生黃耆八兩

白芷一兩 槐米一兩 苡仁六錢

各爲細末將龜用石臼搗死以藥末拌之飯內蒸熟將龜肉與甲火焙乾爲末用蜜爲丸每服二錢服之一

月而漏瘡乾服至二月而漏管滿服完全愈可不再發但服藥必獨宿戒酒色三月倘服藥時不斷酒色不能奏功此方治漏去溼而不散氣敗毒而不損血醫治多人實有神效非謬語也

清源散

黃連二錢 茯苓五錢 白芍五分 葛根二錢

白芷三錢 槐花三分 地榆三錢 人蔞三錢

山甲末一錢土炒 白朮五分 車前子二錢 三七根三錢末

水煎調末服三劑血較前更多三劑後減去黃連再服

三劑血止而痔愈愈後忌女色百日終身斷酒飲酒

外科證治全書

卷三 後陰證治

毒

卽發慎之

陳遠公治痔方

茯苓一兩 白芍一兩 地榆三錢

苡仁一兩 穿山甲一片土炒爲末

水煎連服四劑而肛門寬快又四劑內外之痔盡消再

將前方加增十倍修合爲丸每日早空心滾水服五

錢服一料卽愈此方利水去溼不傷脾胃服之立效

八珍湯通用二十 十全大補湯通用二十六 槐花藥通用四十二

補中益氣湯通用三十

坐板瘡

生腎股之間形如黍豆或如風癬色紅作痒破流黃水浸淫微痛甚則焮痛延及穀道由溽暑坐日曬几橙暑溼凝滯肌腠所致初用芫花川椒黃蘗煎湯燙洗即消如毒盛痒痛仍不止者用硃砂雄黃末各一錢輕粉枯礬黃蘗各五分共為末敷之愈如溼腫流水者用五美散敷

坐板瘡方 先用川椒煎水洗後再用敷藥

硃砂 雄黃各一錢 輕粉 枯礬

黃蘗 各五分

共為末敷之即愈

外科證治全書 卷三 後陰證治 五

五美散 通用六十七

肛門作痒

肛門作痒或兼赤腫微痛者蟲蝕也視其下脣內必生小

白瘡或耳之前後結小核如串珠者是經云脣有瘡蟲

蝕其肛蘆薈丸主之外用雄黃銅綠等分為末撒之

蘆薈丸

蘆薈 子青皮 白薔丸 白蕪蕒

川連 胡連 鶴蝨草 木香 各五錢 一錢

麝香 五分

右共研末蒸餅黏丸麻子大每服一錢空心米湯送下

又方

杏仁搗作膏敷之或研爛以棉蘸塗谷道中

脫肛

脫肛屬氣虛有虛寒而脫者有熱極而脫者寒則洞洩不瀉熱則瀉總以大補元氣兼升提為主補中益氣湯寒加蒼朮炮薑熱加芩梔槐花血虛倍歸身加熟地外用肥皂水洗五倍子末塗之

又方

赤石脂伏龍肝白礬為末敷之

截腸

外科證治全書 卷三 後陰證治 五

大腸頭出寸餘痛苦之極乾則自落落則又出腸盡則死初覺截時亟用器盛芝麻油坐浸之飲大麻子汁數升可愈

股部證治

貼骨疽 骱遊風 青骱牙疳 驛馬打破

筋脈

股筋循外股足三陰筋脈循陰股 詳見足部筋脈中

癰疽就簡

附骨疽生大骱 齧骨疽生大骱 伏兔疽生大骱 正而肛門

癰疽生大骱 箕門癰生大骱 俱按陽癰陰疽則例治法

貼骨疽一名環跳疽 一名縮腳疽

生跨骨白環穴皮色不異腫硬作痛甚者腰難屈伸宜用

白芥子搗粉白酒釀調塗或以大戟甘遂二末白蜜調

外科證治全書 卷三 股部證治 癩

敷內服陽和湯每日一劑四五日可消消後找服子龍

丸或小金丹以杜患根大忌開刀開刀則定成縮腳損

陽和湯通用 子龍丸通用五 小金丹通用五

骱遊風

兩骱裏外忽生赤腫形如堆雲焮熱疼痛治宜先施砭法

放去惡血隨服雙解通聖散一劑次用加味逍遙散加

荆芥外貼牛肉片以拔風毒

雙解通聖散

防風 荆芥 連翹去心 當歸

赤芍 白朮炒 梔子各一錢 黃芩

桔梗 各二錢 滑石 三錢 生甘草 一錢 石膏 三錢

右水煎溫服

加味逍遙散通用十六

青骱牙疳

此證方書罕載其名僅傳雍正年間北路隨營醫官陶起

麟頗得其詳畧云軍中凡病骱腫色青者其上必發疔

凡病牙疳腐爛者其下必發青骱二者相因而患推其

原皆因上為陽火炎灸下為陰寒閉鬱以致陰陽上下

不交為寒為熱自相凝結相近內地間亦有之邊外人

雖有不甚多惟內地人初居邊外得此證者十居八九

外科證治全書 卷三 股部證治 癩

蓋中國之人本不耐邊外嚴寒更不免坐臥溼地寒溼

凝結於下致骱青腫其證形如雲片色似紫如黑肉體

頑硬又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其熱與溼合

蒸痰胃膈毒火上熏致生牙疳牙齦腐腫出血若穿腮

破唇腐爛為危候相傳止有合服馬乳一法麟初到軍

營診視此證亦僅知投以馬乳閱歷既久因悟馬腦子

之力較馬乳為效倍速於是用馬腦子一箇竹刀挑去

筋膜放在碗內先攪勻再以滾黃酒沖令患者服之是

夜即能發出大汗而解諸病滅矣蓋腦性溫暖流通故

耳兼服活絡流氣飲加味二妙湯通其經絡宣其血氣

使毒不得凝結外用三棱鍼形如錐挺者向骹上之青處黑處不拘穴道量其黑之大小鍼一分深或十鍼或二十鍼俱可務令黑血流出以殺毒勢更以牛肉割片貼鍼眼並黑處以拔積毒如無牛肉即用芥菜子搗麪燒酒調敷黑腫處不數日而愈蓋黑血出則陰氣外洩陽氣即隨陰氣而下降兩相交濟上下自安也若病人形氣衰敗飲食不思者不治身齒俱落紫黑流血腐臭穢者不治滿骹大腫或細而乾枯者不治

活絡流氣飲 一名沖和既濟湯

外科證治全書 卷三 股部證治 李

蒼朮 羌活 獨活

木瓜 牛膝 生附子 山查肉 麻黃 各二錢

烏藥 檳榔 枳殼 乾薑

黃蘗 各一錢 甘草 八分 黑豆 四十九粒

右加生薑三片水四鍾煎一鍾服藥滓再用水三鍾煎

八分服如身疔盛減去乾薑附子加胡黃連二錢龍

膽草二錢身疔輕骹腫痛盛加肉桂二錢寒熱已退

減去羌活麻黃加威靈仙二錢五加皮二錢

加味二妙湯

黃蘗 生 蒼朮 水泔 牛膝 各三錢 檳榔 澤瀉 木瓜 烏藥 各二錢 當歸尾 一錢 五分

右加黑豆四十九粒生薑三片水三鍾煎一鍾渣再用水二鍾半煎八分

搽牙牛黃青黛散

牛黃 青黛 各五分 硼砂 二錢 硃砂 一錢

人中白 龍骨 各一錢 冰片 三分

右其研細末先以甘草湯將口漱淨再上此藥

驛馬打破

騎驛馬兩股打破用雞蜚青攤作膏貼之即愈如腫痛未

破用水洗淨在炭火上烤之即愈

外科證治全書 卷三 股部證治 李

膝部證治

鶴膝風 膝眼風 上水魚 八面瘡

筋脈

詳見後足部筋脈中

癰疽就簡

膝癰疽生膝蓋分紅白緩癰緩疽生膝兩旁委中毒生委中穴穴在膝後膈中央俗名鞍俱按陽癰陰疽則例治法

鶴膝風一名遊膝風一名鼓槌風

初起膝蓋骨內作痛如風氣一樣因循日久膝腫粗大上

下股脛枯細形似鶴膝總由足三陰虧損風寒溼流注

外科證治全書 卷三 膝部證治 奎

之為病也。大防風湯主之。不論已成未成已潰未潰但

逐日服之可愈。外用白芥子研細粉白酒釀調塗患處

至愈乃止。此證經久潰爛出水漸致偏枯或成漏證及

脈大消渴者不治

人有足脛漸細足膝漸大骨中酸痛身漸瘦弱此鶴膝

風證也。其證有二。一本於水溼之入骨。一本於風溼

之入骨。大約水溼之證入骨重難移風溼之證骨輕

可走至於酸痛則一也。然亦有微別。水溼之痛在一

處而不遷風溼之痛移來移去而無定。二者治法不

同。水溼用蒸膝湯風溼用散膝湯

又有瀉痢久而成此證者紅腫作痛成膿用補中益氣湯

一小兒患鶴膝風非必為風寒所痺多因先天所稟腎

氣衰弱陰寒凝聚於腰膝現於外可知其內也用六

味丸補腎中之水加鹿茸補腎中之火加牛膝引至

下部骨節而壯其顛裏之筋乃治本之良方也

蒸膝湯

生黃耆 八兩 金釵石斛 二兩 牛膝 五錢 苡仁 二兩

肉桂 二錢

水煎二椀先服一椀即擁被而臥覺身有汗意再服二

外科證治全書 卷三 膝部證治 奎

椀兩足如火熱任其出汗切不可坐起張風俟汗出

到腳底湧泉之穴始可去被一劑病減大半再劑全

愈

散膝湯

黃耆 五兩 防風 三錢 肉桂 五錢 茯苓 一兩

水煎服後亦擁被臥出汗汗出愈多病去愈速要知

邪由汗出而正自復也風溼用薏苡防桑湯亦效

薏苡防桑湯

防風 三錢 桑葉 二兩 陳皮 一錢 補骨脂 二錢

苡仁 一兩

水煎服亦必大汗而愈只消一劑也

白芷膏 存驗

用鮮白芷酒煎至成膏瓷瓶收貯每日取膏二錢陳酒送服再取二三錢塗患處至愈乃止此乃全生集專治鶴膝風之方也按鶴膝病多由氣血虛餒不能充灌經髓外邪乘而痺之治宜溫補血氣為主兼去其邪自無不愈白芷膏祛邪通經固妙而於扶虛澆枯之功無有也故必以天防風為主而兼服白芷膏為盡善之法

天防風湯 通用 三十五 補中益氣湯 通用 三十 六味丸 通用 四十三

外科證治全書 卷三 膝部證治 雷

膝眼風

在膝蓋下左右兩旁空陷中隱隱疼痛是也如風勝其痛則走注不定寒勝則痛如錐刺溼勝則外見胖腫屈不能伸者其病在筋伸不能屈者其病在骨動移不遂者沈寒痼冷之候也俱主以天防風湯治之外用蒜搗爛攤患處以艾鋪蒜上灸之蒜壞再易皮膚倘破不妨此證日久失治即漸成鶴膝風

一有因秋夏露臥為寒所襲拂熱內作而搏於肢節痛徹於骨遇寒尤甚以熱熨之則稍減者亦主以天防風湯

天防風湯 通用 三十五

上水魚

生委中摺紋兩梢腫如高鞭更似魚形色紫作痛由血熱猝遇外寒稽留滯結而成外用砭法向腫鞭上砭去惡血用大黃硫黃等分共研細末香油調敷即愈

人面瘡

此證傳為怪病多生兩膝或生兩肘腫類人形眉目口鼻皆全本草云瘡口能食諸藥無效惟敷貝母其瘡皺眉閉口自此日用貝母末和水調灌數日瘡消結痂而愈書又云素積冤譴所致須清心懺悔據所治之方辛熱

外科證治全書 卷三 膝部證治 李

疎散之品抑或因風寒溼三氣凝結之所化未必盡由冤譴之所致也其方未詳故不錄載 謹案未詳之方即

丸見外科金鑑茲附于後流氣飲人葠製厚朴桔梗防風紫蘇鹽水炒黃耆炒枳殼當歸酒炒白芍肉桂烏藥甘草川芎木香白芷檳榔引加生薑大苦蘆丸苦蘆蔓荆子赤芍山藥白芷荆芥防風白附子川芎生山梔首烏皂角白蒺藜泡川烏黃耆赤芍獨活羌活炮草烏細末麪黏丸

脛部證治

魚肚癰

膝瘡

爛骹

流火

腎臟風

熱毒流注

爪籐纏

腳氣

腳漏怪疾

鱗漏

骹瘡不愈

筋脈

詳見後足部筋脈中

癰疽就簡

三里發

生膝下三寸外側前廉兩筋間初腫形如

赤腫疼其形如流膿接骨發生骹下之接骨之上脛

如核桃其硬如附骨疽生內踝骨之上三寸係夾棍疽

物打近之狀如附骨疽生內踝骨之上三寸係夾棍疽

生足蹠近之狀如附骨疽生內踝骨之上三寸係夾棍疽

緩又名鞋帶疽在內外踝齊者名穿蹠疽如潰爛日

久形如驢眼者變為癰瘡以上諸證凡初起色赤高腫

治當問其初起紅白治法熱痛者用仙方活命飲醒消丸以解壅毒潰後用生料

補中益氣湯加川芎白芷銀花赤芍煎湯服或與六味

地黃湯早晚輪服至愈乃止或色白或黯色不甚痛者

用隔蒜灸法以行壅滯助陽氣服陽和湯大防風湯既

潰惟大防風湯最妙或與小金丹並進尤妙其外敷貼

藥俱按陽癰陰疽則例治法

魚肚癰

生小骹肚高腫焮赤此肉緊筋橫一身用力之處最痛難

忍外用草麻拔毒法紫上用則胎墮內以五通丸醒消

丸每日早晚輪服初起者即消如已成膿不可開刀須用藥絞潰庶無傷筋縮脚之虞貼洞天膏服內托散加乳香沒藥數劑收功若患色白者則按陰疽則例治法忌用前藥並紫法

洞天膏 通用 七十六

癰瘡

生於兩脛內外廉骨外廉屬足三陽溼熱下注外邪搏聚

易治內廉屬足三陰虧損虛邪纏綿難治初發先痒後

痛紅腫成片人薄敗毒散加牛膝木瓜苡仁主之熱加

酒炒黃檗痒加防風痛加乳香沒藥破流紫水八味道

外科證治全書 卷三 脛部證治 李

遙散加減如前日久腐爛膿水淋漓內熱倦怠或瘡內

出血不止或瘡色紫黯日輕夜重則用補中益氣湯加

茯苓酒炒白芍鹽炒黃檗兼六味地黃丸服之外用蔥

艾湯洗夾紙膏貼以輭帛縛定三日一易

一有年久頑瘡皮烏黑下陷起肛臭穢不堪輕則按後

爛骹法重則按翻花起肛治法

一有初起不紅但漫腫作痛或硬腫不甚痛或色黯肢

體畏寒飲食少思乃屬脾腎虛敗須用八味地黃丸

及陰疽治法若誤投攻伐清涼損傷胃氣則危矣

夾紙膏

黃蠟 五兩 黃丹 飛 鉛粉 各四兩 輕粉

乳香 沒藥 各五錢 冰片 三分 麻油 春夏二兩 秋冬三兩

右先將蠟油煎五六沸下沒乳末再三沸下輕粉隨下丹粉槐柳枝攪十餘次取起冷定後下冰片攪勻瓶盛浸水中一宿出火毒用時先以苦茶洗瘡將膏用薄油紙較患處長闊一倍以膏攤一面餘一面刺孔數十折束益膏以有孔一面向患處貼三日一換三貼即愈

又方 存驗

製松香 一兩 乳香 沒藥 各五錢 輕粉末 五錢

外科證治全書 卷三 瘡部證治 癩

右將松香乳香沒藥同入銅銚溶化傾水中候冷取出加輕粉研末真麻油調攤油紙上再用油紙一層鍼刺孔數十眼掩藥上貼之以軟帛縛定三日一易

又方

用修船舊油灰 煨 熟石膏鍊丹各等分研極細末先將豆腐溫水洗淨患處以麻油調藥敷之極厚三日一換無有不愈

又方

用生過三胎母豬糞燒灰存性入生桐油調擦瘡上神效

人淺敗毒散 通用 加味道遙散 通用 補中益氣湯 通用 六味地黃丸 通用 八味地黃丸 通用

爛骹

生於小骹血凝氣滯男人謂之爛骹女人謂之裙風初起或骹上抓破或生小瘡溼痒因經熱湯燙洗或食毒物或用瘡癬膏貼爛成一孔經年累月腐臭憎人宜用烏金膏照患孔大小剪如膏藥一方鍼刺二三十眼取光面貼孔日煎紫花地丁湯洗孔並洗膏二次三日內毒水流淨色變紅活以飛過伏龍肝撒上仍用前膏貼外收功戒多立行走房事發物凡婦人須待月信之後貼

外科證治全書 卷三 瘡部證治 癩

起

烏金膏

烏鉛 一斤 砒 三錢

右同入銚溶化次日鉛面刮下者名金頂砒再以鉛溶

化澆薄如紙片聽用

流火

生小骹紅腫放亮熱痛如燒不潰不爛多在小骹肚之下時醫惟知以刀鑷血出或以鱈魚血塗總無全愈之日時常發作復鑷復塗而已須用礬石灰化於缸內次日水面上結一層如薄冰者取起以桐油對調膩厚每日

拂上二三次數日全愈不復發忌食豬肉

附方 存驗

用馬車子磨水敷之一日數次其痛止

又方

用鮮鳳仙花鮮紫蘇二味洗淨連根葉搗爛放木盆內以滾水沖入腳架盆上熏至可洗以輭帛洗之立愈十餘年者不過洗三四次不發矣

腎臟風

腎虛風邪乘於膝脛皮膚如癬搔痒起久則成膿水淋漓漸延上股甚則延及遍身日輕夜重眼目暈花口燥吐

外科證治全書

卷三 腫部證治

七

痰腰酸倦怠發熱盜汗治法用六味地黃丸補腎水為主佐以四生散祛風邪若脾胃虛弱者兼服補中益氣湯外以蔥椒湯洗繡球丸擦之

四生散

黃耆

獨活

白附子

白茯苓

等分

右為末每服三錢用豬腰子一枚批開入藥末溼紙包

煨熟空心連腰子細嚼鹽湯下

六味地黃丸

通用

繡球丸

方見疥瘡下

補中益氣湯

通用

熱毒流注

生兩脛脛流行不定或發一二處色赤腫痛潰膿乃溼熱

下注內服仙方活命飲加牛膝以解毒壅外貼洞天膏

易愈如患色微紅或初起粟米漸大痒痛相兼破流黃

水浸淫成片甚至脛肉浮腫皆屬脾腎虧損難治須內

用補中益氣湯為主加防風獨活痛加丹皮山梔仁甚

者加炒黃檗兼服六味地黃丸外以貫仲煎湯淋洗五

倍子細末津調干逐瘡四圍塗之自外收內每日一次

漸漸自愈不可妄投攻發即如前溼熱下注之證服活

命飲後亦當接用補中益氣湯六味地黃丸以補精氣

為善

仙方活命飲

通用

洞天膏

通用

補中益氣湯

通用

外科證治全書

卷三 腫部證治

七

六味地黃丸

通用

瓜藤纏

繞脛結核數枚不紅微痛或不痛初起以子龍丸每服三

分淡薑湯每日服三次至消乃止或小金丹亦可若日

久腫痛腐潰不已者則必服犀黃丸兼服溫補祛痰之

劑外貼陽和解凝膏漸冀收功

子龍丸

通用

小金丹

通用

犀黃丸

通用

陽和解凝膏

通用

腳氣 一名壅疾

頭疼發熱惡寒狀類傷寒始必兩腳酸軟惟溼乃腳氣主

病溼傷脾胃外復感風寒暑溼內外相搏氣不行則痛血不行則腫又必察其足脛色赤者為溼熱黃白色者為寒溼又腫者為溼腳氣不腫者為乾腳氣腳氣壅疾也喜通惡塞宜用挾壅湯熱加黃檗寒加肉桂愈後接服六斤丸調補腳氣能令人死紅腫如雲根自足起上升入心則嘔血而死腎目與額皆黑則冲胸喘急而死一脚氣瘡脛足胖腫生瘡痒痛出黃水結黃痂類類黃水瘡惟身體壯熱心神煩躁經久難痊用挾壅湯加黃檗山梔外敷五美散

人兩肘忽然紅腫發熱兩脛俱浮作痛頗類傷寒證中

外科證治全書 卷三 脛部證治 三

原有腳氣之條然腳氣非傷寒也腳氣感染溼熱證從下受傷寒感冒風寒先從上受故傷寒乃陽證而腳氣乃陰病也夫熱下感宜從下治消其溼熱溼熱下行身熱自解若用風藥解之反溼邪上犯以風藥多陽升之藥也宜用消肘飲

挾壅湯

蒼朮 苡仁 木瓜 牛膝

川芎 羌活 獨活 木通

防風

右水煎熱服

六斤丸

木瓜 牛膝 肉桂 蓉 去甲膜 明天麻

枸杞子 鹿角膠 各一斤

右為末蜜丸梧子大空心黃酒下百丸久服腳氣可以除根

消肘飲

扶苓 一兩 茵陳 一錢 防己 一錢 炒梔子 一錢

苡仁 一兩 澤瀉 三錢 木瓜 一錢

水煎服一劑小便利二劑身熱解再用二劑而腳腫消再二劑全愈

外科證治全書 卷三 脛部證治 三

五美散 通用 六十七

腳漏怪疾

腳氣成漏跟有小孔深半寸其痛異常用初取溼人中白火煨有水出滴入瘡口

鱧漏

有人腳肚生一瘡久遂成漏百治不效自度必死一村夫見之曰此鱧漏也用石灰溫湯泡熏洗覺痒即是也洗不數次即愈石灰湯洗後用陳石灰敷之更妙按鱧漏生骸肚初起類溼瘡痒痛相兼破爛孔數處其孔深如鑽眼津流黃水絲絲不已復入瘡孔多致惡寒肌冷

骹瘡不愈

用生甘草五錢 黃豆腐一塊極老敷上一時許取去另用

血餘五錢 舊船底上石灰三錢 陀瀼一錢五分 黃槩四錢 生肌

散三錢 其末用麻油熬成膏多數即愈

外科證治全書

卷三

脛部證治

七

足部證治

足發

湧泉疽

脫疽

敦癰

四淫

厲癰

足跟疽

土粟

田螺泡

冷疔

牛程躩

臭田螺

甲疽

嵌甲

肉刺

足釘怪疾

無名毒

腳泡

女人裹腳方

附

遠行腳腫方

冬月手足坼裂方

筋脈

踝下曰足足背曰跗一名足趺俗名足面足後跟曰跟足

外科證治全書

卷三

足部證治

七

指曰趾趾者別於手也足之趾節與手指節同其大趾

之本節後內側圓骨形突者名核骨足大指爪甲後為

三毛毛後橫紋為聚毛足下面着地者為踵俗名腳底

版

足大趾外側屬肝內側屬脾筋脈皆起於足大指隱白

穴為脾并瀦于節後陷中大都穴為脾榮注於內側核

骨下太白穴為脾輸循大趾本節後一寸公孫穴為脾絡

歷內踝前三分陷中商正穴為脾經由是循經骨後結

於膝內輔骨陰陵泉之次為脾合從此直上至陰股結

於髀箕門穴之次肝筋脈皆起於足大指外側叢毛之

際大敦穴為肝井溜於指縫中行閒穴為肝榮行跗上注於本節後二寸動脈中太衝穴為肝腧結于內踝前一寸中封穴之次為肝經循踝上五寸蠡溝穴為肝絡直上內輔骨下橫紋盡處曲泉穴為肝合陰股五里陰廉之次

足二趾 即大趾之次趾

足三趾 一名屬胃胃筋脈起于足中趾內側厲兌穴為胃

井溜于次趾外側陷中內庭穴為胃榮注于內庭後二

寸陷谷穴為胃腧過于跗上去內庭五寸衝陽穴胃原

自足跗直上循足脛歷腕上繫草鞋處解谿穴為胃經

外科證治全書 卷三 足部證治

又歷外踝上八寸豐隆穴為胃絡結于膝下三寸三里

穴為胃合上膝循伏兔結于髀膝上起肉處為伏兔後為脾關其脈自

伏兔直下抵足跗入中趾內閒其支者別跗上入大趾

閒出其端

足四趾 即小趾屬膽筋起足四趾外端竅陰穴之次為

膽井趾歧骨閒有俠谿穴為膽榮俠谿上寸半有臨泣

穴為膽腧俠谿上四寸五分有丘墟穴為膽原外踝上

四寸陽輔穴為膽經外踝上五寸光明穴為膽合由是

上走髀分為兩歧前者結伏兔後者結于尻直者上季

脇其于自陽白直下出膝外廉循經抵外踝至足跗入

四趾之閒支者別跗上入大趾貫爪甲後

足小趾趾下屬腎外側屬膀胱筋脈俱起小趾之下斜趨

足心湧泉穴為腎井又斜趨內側內踝前一寸大骨下

有然谷穴為腎榮跟踵踵即跟上鞭筋處陷中有太

谿穴為腎腧自跟別至跟後踝中大骨上兩筋閒有大

鐘穴為腎絡踝上二寸復溜穴為腎經上臑足中肚出

臑內廉結於內輔骨下陰谷穴之次為腎合從是並六

陽之筋上循陰股

膀胱筋起小趾外側至爪甲一分至陰穴之次為膀胱井

歷本節之前陷中有通谷穴為膀胱榮本節之後陷中

有束骨穴為膀胱腧外側大骨之下有京骨穴為膀胱

原外踝後跟骨上有崑崙穴為膀胱經循跟直上至外

踝上七寸有飛陽穴為膀胱絡貫臑結於臑臑即在膝

腕內約紋中為膀胱合由臑直上結于臀其脈從腰抵

臑出小趾外側

足發 一名足跗發 足背上為足背發

凡脚赤腫痛潰膿足三陽溼熱可治微赤微腫膿清或出

水足三陰虧損難治溼熱者用仙方活命飲既潰用內

托散加金銀花外貼膏出膿而愈虧損者用補中益氣

湯六味地黃丸聽其漸愈蓋四肢皆稟氣于胃胃氣血

盛則善步胃血氣少則少肉善寒漸成痿厥足痺故足疾必用補中益氣湯不可不知若黑黯不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓者陰敗未傳惡證也急着肉灸之以行壅滯助陽氣內服十全大補湯八味地黃丸以壯脾土滋化源亦有生者

仙方活命飲通用 補中益氣湯通用 內托散通用

十全大補湯通用 六味地黃丸通用 八味地黃丸通用

湧泉疽一名足心發 俗名病穿版 又名穿窟天蛇

生足底湧泉穴乃腎經虛損之證當別紅白按陽癰陰疽則例治法

外科證治全書 卷三 足部證治 其

一凡足心或熱或痒痛或麻或腫脹皆腎虛六味八味消息用之

一有足心疼如中箭忽發忽歇此腎之風毒瀉腎則愈

六味地黃湯加獨活黃蘗

六味地黃丸通用 八味地黃湯通用

脫疽 敦癰

生足趾初起色白麻痛或不痛者名脫疽初起色赤腫痛如湯發火燎者名敦癰脫疽以手部脫疽法治之敦癰以脛部毒熱流注法治之

四淫 厲癰

靈樞云發于足上下名曰四淫其狀大急治之百日死發于足旁名曰厲癰其狀不大急治之去其黑者不消輒益不治百日死按此二證亦不外乎色紅色白癰疽別治

足跟疽古名兔囁俗名脚攀跟

足跟腫痛或瘡如豆粒當辨其色紅色白按陽癰陰疽則例治法但此乃二躄發源之處腎經所由之地若瘡潰不合則躄氣不發生腎氣從此漏洩須兼以補中益氣湯六味八味丸隨宜取用以滋化源蓋患先得於虛既潰膿水淋漓以虛益虛雖大補氣血猶恐不及若專治

外科證治全書 卷三 足部證治 其 此外務末忘本必不能愈

補中益氣湯通用 六味地黃丸通用 八味地黃丸通用 土粟一名琉璃發

生足跟旁形如棗栗色黃而亮腫若琉璃由行崎嶇之路勞傷筋脈而成初用仙方活命飲加木香宣通壅滯膿熟鍼之餘按陽癰則例治法

仙方活命飲通用

田螺泡

生足掌初如火燎隨生紫白黃泡悶腫鞭疼不能着地連生數泡皮厚難于自破三五日成片溼爛甚則足跗俱

腫寒熱往來此肝脾風溼攻注用苦蕒葛蒲野艾熬湯熱洗次用綫鍼將泡挑破洩去毒水貼洞天膏內服解毒瀉肝湯如溼重流水者則以五美散撒之更用膏蓋貼

解毒瀉肝湯

防風 山梔 石膏 黃芩

蒼朮 木通 生甘草 各二錢

右加銚心三十根水酒各半煎食前服

洞天膏通用 五美散通用

冷疔

外科證治全書 卷三 足部證治 全

初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫黑血水腥穢日久不愈宜用蔥湯洗淨鉛粉散敷之愈

鉛粉散

黑鉛四錢鐵杓內化開傾入水中取起再化如此百遍以鉛淨為度去水取渣者三錢

製松脂一錢飛黃丹 輕粉各五分麝香一分

右共為細末麻油調勻塗瘡口油紙蓋之

牛程躑一作牛乘躑

生於腳掌皮鞭高腫色黃疼痛不能步履由腳熱著冷水寒熱搏滯而成宜略去老皮以生草烏酒磨厚塗日數次至愈乃止若內已成膿則用鍼刺破出膿水每日米

泔水熱洗洞天膏貼之四圍頑皮浮起則輕輕剪去搽生肌藥而愈

洞天膏通用

臭田螺俗名爛腳了

腳了起粟米白泡極痒搽至皮爛津腥臭水覺疼時其痒方止次日仍痒如故經年不愈亦或痒痛出水腫焮脚而此皆陰虛溼熱下注三陰不足主治補中益氣湯六味地黃丸開服自愈外以五美散糝之

爛腳趾縫方

鮮鷺掌黃皮陰乾燒灰存性為末糝之極效

外科證治全書 卷三 足部證治 全

又方

好黃丹一味糝三五次即愈

補中益氣湯通用 六味地黃丸通用 五美散通用

甲疽

趾甲旁起一努肉突出潰爛浸黃水疼痛難忍常時學發者名甲疽用耆毒油日三次毒消口斂

耆毒油

黃耆二兩醋 狼毒 豬脂五兩

右微火上煎取二兩絞去渣退火氣以封瘡口效

又方存驗

用綠礬置鐵片上煨沸色赤如鎔金者為真沸定取
起研末以鹽湯調搽之

嵌甲

足趾甲入肉作瘡不能行履用陳皮濃煎湯洗之良久甲
肉自離輕手翦去以虎骨末敷之即安或綠礬煨末敷
之蝕惡肉生新肉細細翦去甲角旬日即效

肉刺 俗名雞眼

生於腳趾形如雞眼根陷內裏頂起鞭凸疼痛步履維艱
女子每因纏傷或著窄鞋男子因窄鞋遠行皆生此疾
用紫玉簪根搗塗

外科證治全書

卷三 足部證治

全

又方

用蔥剖開將有汁沫一邊貼之包住數次即消
足釘怪疾

兩足心凸腫上生黑豆瘡鞭如釘脛骨生碎孔髓流出身
發寒顫惟思飲食此是肝腎冷熱相吞用韭子煎湯日
服外以炮川烏末敷之

無名毒

一有指頭忽先發痒已而作痛指甲現黑色第二日腳趾
俱黑三日連足面俱黑至腳上脛骨此為無名腫毒因
多服春藥是火熱之毒非腳疽脫骨疽可比若脫骨疽

腳疽只黑在腳趾而不黑在脚面也治法必須大補氣
血瀉毒之味用顧步湯若已潰爛多服數劑無不愈也
顧步湯

牛膝

金釵石斛 各一兩

人蔘 三錢

黃耆 一兩

當歸 一兩

金銀花 三兩

右水煎服一劑而黑色解二劑而疼痛止三劑全愈

腳泡

凡遠行脚趺成泡用白麪水調塗之一夜即平

附方

女人裹脚方 名脫骨湯

外科證治全書

卷三 足部證治

全

杏仁 一錢

桑白皮 四錢

水五碗新瓶煎三碗入樸消 五錢 乳香 一錢 封口煎化

置脚於上先熏後洗三日一作十餘次後輒若束棉
矣其生瘡潰爛者荆芥末敷之

遠行脚腫方

草烏

細辛

防風

各等分為末鋪鞋底內以水拌溼布襯踏之行

冬月手足皸裂方 名黃蠟膏

清油 五錢

漫火煎沸入黃蠟一塊同煎光粉少許熬
紫色為度先用熱水洗患處火烘乾取藥填敷以紙

貼之其痛立止入水亦不落每臨用以火炙動挑敷
但藥內粉不可多多則艱

外科證治全書 卷三 足部證治 全

外科證治全書卷三終

外科證治全書卷四

環峯許克昌倫聲 同輯
木末畢 法蒼霖

發無定處證

疔瘡 楊梅瘡 結毒 遺毒

癘風 石疽 流注 痼發

惡核 癭瘤 疔 瘰癧

癩疽 痘毒 痘風瘡 痘癩

丹瘤 赤火瘡 天泡瘡 貓眼瘡

魚脊瘡 漆瘡 凍瘡 血風瘡

外科證治全書 卷四 發無定處證

癬 疥瘡 瘡癥 傲冬瘡

癰 疔癰 疔瘡 葡萄疫

赤白遊風 癩疹 癩瘍風 紫白癩風

白疔 血箭 血痣 五竅出血

血汗 痛風 小兒胎風 痒風

疔瘡

疔瘡者言其瘡形如丁蓋之狀也古方論疔有十種華元
化論疔有五色千金方說疔有十三種以至外臺祕要
治法神巧而其論相同然無非毒氣客于經絡及五臟
內蘊熱毒初起或如小瘡或如水泡紫黃青黑無定色

痒痛麻木亦無定候多生于頭面肩臂手足等處令人煩燥悶亂或憎寒頭痛或嘔吐惡心或肢體拘急治宜鍼刺擠出惡血見好血而止取拔疔散紙入以膏掩之其有瘡頭陷坳而鍼刺不痛無血者則鍼瘡四旁必令血出藥從鍼孔經入內服奪命丹或奪命湯汗之夫疔毒險證也其害最速生頭面耳鼻之間顯而易見生臂足衣遮之處隱而難明知覺早者朝醫夕愈遲者枉死甚多每每婦女而患暗疔者初時誤作傷寒至毒陷發腫神昏身緊遂成走黃多致不救黃即毒也疔毒內走攻心如在將昏之際亟用回疔散二錢白湯送服或以

外科證治全書 卷四 疔毒無定處證 三

奪命丹五丸為末葱汁調灌之少頃大痛痛則毒化黃水痛止病愈

一手小臂足小股生有紅絲如絲一條延走者名紅絲疔走至心腹或至喉內者難救治宜在紅絲始末兩端用鍼刺破出血以洩其毒亦以膏貼之服藥如前此疔皆因大喜大怒氣血逆行所致急刺出血後用浮萍草根敷之立愈謹案醫宗金鑑作紅絲疔不作紅絲遵改

一疔瘡用鍼刺出毒血後服拔疔散治紅絲疔尤效紫花地丁甘菊花各一兩 水煎服二劑而疔毒散三劑全愈若已潰爛亦用此方但加當歸二兩服之立愈

一刀鑷疔形闊如韭菜長有寸餘肉色紫黑忌行鍼刺用生礬三錢 蔥白七根 共搗爛作七塊另以蔥湯逐塊送下蓋被取汗再飲蔥湯催之汁出為度外取爛雞矢塗患上即愈遲治走黃致命

一人患疔須臾半面腫不知疔患何處用葱白七根蜜一兩 同搗敷之神效

奪命丹

乾蟾酥酒化 輕粉 麝香 各五分 枯礬

寒水石煨 銅綠 製乳香 製沒藥 各一錢

硃砂三錢 飛 蝸牛二十一箇連殼研 為膏如無即不用

外科證治全書 卷四 疔毒無定處證 三

右各研為細末取蝸牛蟾酥研勻入諸藥杵丸綠豆大每服三丸用蔥白五寸搗爛安手心內裹丸于中另煎葱湯送下蓋被取汗如無汗約人行五里許再進一服多飲蔥湯催之汗出為度

奪命湯

銀花 草河車 赤芍 各二錢 蟬蛻

僵蠶 防風 羌活 獨活

青皮 澤蘭各一錢 五分 黃連 甘草 各一錢

右水煎熱服暖臥取汗

回疔散

土蜂窩有子者蛇蛻一條

右用泥裹火煨存性為末研和聽用

拔疔散

硫黃 蟾酥 等分

右為細末蔥汁和蜜搗丸小米大宜帶長以便插入疔

瘡內

楊梅瘡

一名廣瘡因其毒出嶺南一名時瘡以時氣乖變邪氣湊

襲之故一名翻花瘡因其纏綿不已形如棉花一名翻

花楊梅因窠粒破爛肉反突于外色如黃蠟一名天泡

外科證治全書卷四發無定處證四

瘡因其夾溼而生白泡有形如赤豆嵌于肉內堅硬如

鐵名楊梅痘有形如風豆作痒名楊梅疹有先起紅暈

後發斑點名楊梅斑有色紅作痒其圈大小不一二三

相套名楊梅圈名形雖異要不出氣化精化二因氣化

傳染者輕精化慾染者重氣化者或遇生此瘡之人鼻

聞其臭或誤食其物或登園受其不潔之氣脾肺受毒

故先從上部見之皮膚作痒筋骨或疼或不疼瘡形小

而且乾此不過在皮毛肌肉之間每日用換肌消毒散

去木瓜加荆芥防風蟬衣汗之或更以龍膽瀉肝湯接

服清去溼熱自當全愈精化者由交媾不潔精洩時毒

從精道乘虛直透命門以灌衝脈所以內入骨髓外達

皮毛凡衝脈所到之處無處不有多有先患下疳次便

毒漸至筋骨疼痛下部生瘡或小水涇淋其瘡形大而

堅鞭為害最惡治之以化毒為貴熏為忌熏罨瘡者復

發難治醫方有升藥為丸雄黃為衣包裹吞服數日即

好或然藥條一根口含冷水諸法皆收毒入內掩飾瞞

人害人性命羞畏人知者多受其害復發則爛毒瞎眼

初起宜用三黃丸每日五鼓取四錢熱陳酒送服醉蓋

取汗或兼以龍膽瀉肝湯每日早晚輪服外用忍冬藤

煎湯日洗血餘散日敷漸漸取效其有瘡生頭面或遍

外科證治全書卷四發無定處證五

身不便處欲其速愈但用金霜散敷之則二三日可以

脫落亦神妙者也然此治標之法耳還須服藥消其內

毒稍有遺毒未消難逃後患如換肌消毒散槐花藥方

皆消餘毒妙藥

一有楊梅癬用水浮萍煎汁浸洗開日一次數次即愈

換肌消毒散

土茯苓一兩忍冬花三錢當歸各二錢白蘚皮各二錢

薏苡仁四錢阜鹹二錢木通一錢五白芷一錢五

木瓜不犯鐵器甘草各八分

右水煎服毒甚者加土茯苓至四五兩

血餘散

人指甲多研不拘多少 真血餘灰 各等分

右二味共研每兩加麝香一錢 再研和密貯磁罐內臨

用白蜜調敷

附 愈後退斑餅

用黑母牛糞捻作小餅炭火煨半熟乘熱貼患處一

時取去斑痕自退轉白

龍膽瀉肝湯通用

槐花藥通用

三黃丸通用

金霜散通用

附方

外科證治全書卷四發無定處證

一方用大蝦蟆一個肚上剖開將雄黃一兩填入用黃

泥包好放炭火內煨煉以泥紅為度取出埋土中一

夜將黑灰分作三服黃酒送下每日空心服一次毒

氣盡除如用消風散毒散一二劑則終身不發矣

一患楊梅瘡服輕粉一時收斂以圖目前遮飾豈知毒

藏於內必致外潰未幾而毒發于鼻自覺一股臭氣

冲鼻而出第二日鼻色變黑不聞香臭須速治否則

鼻柱自傾腐爛莫救急治亦須用大劑藥些小之劑

無效方用護鼻散

護鼻散

元蔞三兩 麥冬二兩 生草一兩 生丹砂末三錢

桔梗五錢 花粉三錢 銀花三兩

水煎調丹砂末一劑鼻知香臭連服四劑鼻上黑色散

去可免鼻梁爛落矣更用全鼻散

全鼻散

元蔞一兩 生甘草三錢 銀花一兩 當歸一兩

麥冬五錢 人蔞三錢

水煎調入丹砂末一錢 服十劑而一身之毒盡出方保

無虞前方勇猛所以救其急後方平和所以補其虛

而丹砂前後皆用者以輕粉之毒非丹砂不能去輕

外科證治全書卷四發無定處證

粉乃水銀所燒而丹砂乃水銀之母子見母相逢不

相離丹砂出而輕粉亦出儻鼻柱已傾肉腐不堪將

前護鼻散救之雖鼻不重長而性命可援不致于死

一楊梅瘡黃膿泛濫腐臭不堪世人皆以為毒盛多用

敗毒之藥孰知日敗毒而毒愈盛瘡愈多往往有腐

爛者須知此證于洩精時元氣大損故毒乘虛而入

不補虛以瀉毒烏能有濟乎方用二生湯

二生湯

生黃耆三兩 土茯苓二兩 生甘草三錢

水煎服連服四劑瘡色紅活再服四劑瘡盡乾燥又服

四劑全愈此方如毒重疼痛非常則加當歸一兩銀花二兩倍土茯苓便結燥者加紫草三錢

楊梅結毒一名瘋毒

一名楊梅癰漏

結毒者因患瘡時毒氣方熾誤用藥水熏蒸或輕粉內伏或點藥收斂以致毒沈骨髓闕竅之中積久外攻其始也先覺筋骨疼痛漸漸腫起發無定處潰破則腐臭不堪故有鼻崩唇缺目蝕喉穿手足攣拘等證治法初起者日服三黃丸再服取忍冬藤牛蒡草甘菊紫花地丁煎湯當茶時飲不得另飲茶湯如潰則以渣煎洗日兩度接服聖靈丹可祛毒盡色轉紅活以洞天膏貼收功

外科證治全書卷四發無定處證

蓋聖靈丹治結毒萬全之功無有出其右者但方內有犀黃珍珠價皆貴重又不可減去分釐需數十金方能合就貧者奈何又結毒紫金丹楊梅癰漏湯二方用之甚效即年深者亦效藥資無多又能取效如患久虛弱者更宜補助為妙忌食火酒豬頭糟物海味茶醋椒薑大蒜牛羊雞鵝豆腐麩筋鮮魚等豬肉不忌一結毒在咽喉者可用七神散吹之服藥如前

聖靈丹

珍珠 犀黃 冰片 琥珀 各一錢 色者佳
劈砂 滴乳石 各三錢 明者佳 石鍾乳

右各製研粉入飛羅麩四兩研和密貯每服取五分煎土茯苓湯調下再以湯送服

一方加肥阜子一個同土茯苓煎如結毒在鼻額者加辛夷三錢同土茯苓煎

結毒紫金丹

龜版放炭火上炙燥用新酒漿筆醮漿塗上反復多次塗三次以焦黃為度研細末二兩

石決明便內浸一夜為末硃砂明亮者飛末六錢

右共研極細末爛飯或米飲為丸麻子大每服一錢量

病上下食前後下筋骨疼痛用酒下腐爛用土茯苓湯下至重者四十日愈專治遠年近日楊梅結毒筋

外科證治全書卷四發無定處證

骨疼痛腐爛不堪咽喉唇鼻破壞諸藥不效者並妙功可代聖靈丹

楊梅癰漏方

黑鉛三兩溶化入水銀五錢乘熱搗為粉分作五分聽用後另

入煎藥用 土茯苓 五兩 忍冬 一兩 阜刺 一錢 鬱金 五分

右咀入葱一莖各煎去渣再入鉛粉分煎食遠服鉛粉

仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此

用水銀花柳黑鉛仍收引輕粉之毒從內出也每

以五劑為一料每料初一劑要取微汗取汗法以金銀花用藤葉一兩防風荆芥花椒各五錢煎湯二斗于不透

風處先熏後洗自然汗出即愈二三十年者只用四料作四次汗之無不全愈忌牛肉燒酒發物徐春甫專用此方以治病者一一獲效故詳載之

七神散
黃礬蜜塗炙九次 僵蠶新瓦焙燥 兒茶五分
製乳香五分 製沒藥五分 冰片五分

人中白煨末
右共研極細末吹之

三黃丸通用 洞天膏通用

小兒遺毒

外科證治全書卷四

遺毒者乃兒在胞胎稟受父母精血餘毒故既生之後熱湯洗浴或著烘熏衣服外熱觸動內毒發于肌膚之表先出紅點次成爛斑甚者毒攻口角眼眶耳鼻及前陰穀道皮肉破爛嘔叫不安治之宜早內用土茯苓湯調人中黃細末四五分服之日進數次外破爛處以蜜炙黃礬細末乾糝之或以滑石綠豆粉鋪席上令臥可救十三四嬰兒若毒延遍身日夜嘔哭不喫乳飲者此毒盛正氣衰弱無法援之

癩風一名癩大風
俗名大麻風

癩風者有毒之風也脾主肌肉肺主皮毛肉受溼熱氣濁

血虛外感酷烈暴悍之風寒內外皆毒惡凝滯而成癩風初覺遍身麻木次起白屑紅斑蔓延如癩形若蛇皮脫落成片久致四肢拳攣肌肉腐敗熱毒盛則面上起油光熱久生蟲蝕五臟則形有五損蝕肝則眉落蝕肺則鼻崩蝕心則聲啞蝕脾則足底穿膝虛腫蝕腎則耳鳴啾啾或痒痛如鍼刺蝕身則皮痒如蟲行治者急令戒酒色耐氣寬心一切發風動氣醬鹽椒醋葷腥炙煨及大寒大熱之物皆宜禁忌止食淡飯白粥白煮時菜而已方用如酒杯之蛇一條竹刀破腹去雜切寸段取瓦仰放炭火上以蛇段豎放瓦上蛇段跌倒者係無

外科證治全書卷四

毒之段棄之不倒者有毒用炙存性為末按蛇靈物也用白花蛇一條酒浸炙末代之雖不及生蛇之力猛而走竄搜風亦非遜品一次不愈何妨再用一次據云白是草拌入飯內覓通身白毛鴨一隻與食次日鴨毛盡脫殺鴨在鍋內煮爛勻作四五日食之食後切忌見風凡喫鴨第一朝其腫者更腫第二三朝收小喫完則愈不論初起已潰及潰久腐爛不堪者並效後接用易老驅風丸東坡四神丹常服不可間斷然斯證必戒色慾禁口腹辛辣發物愈後亦須守戒年餘否則復發無救矣

麻風病面生紫塊疙瘡治法在面部疔瘡內

易老驅風丸

黃耆 枳殼 防風 芍藥

枸杞子 甘草 大生地 大熟地

地骨皮等分

右為末蜜丸

東坡四神丹

羌活 元浸 當歸各二錢 大生地四錢

右水煎服

換肌散存驗

治癩風久不愈或眉毛落脫鼻梁崩壞其效如神

外科證治全書

卷四 發無定處證

十一

白花蛇 黑花蛇各三兩 地龍去土 當歸

川芎 赤芍 天門冬去心 甘草

何首烏不犯鐵 沙浸 胡麻子炒 天麻

紫浸 苦浸 白蒺藜 細辛

白芷 蔓荊子 威靈仙 荊芥穗

菊花 木賊草 不灰木 石菖蒲

定風草即草烏根 製木鼈 蒼朮各一兩

右各另為末過戩和勻每服四五錢食後溫酒調服加

飲數杯尤妙

浴癩方存驗

草烏 麻黃根 艾葉 地骨皮
樸消各一兩

右為末極細用水一桶椒一合蔥一斤同煎湯入醋一
鍾於密室中自用手巾圍搭四肢候湯可浴浴之令
汗透務使久浴面上汗如珠徐起或坐或臥片時汗
收著衣避風五日再浴如此三五次內服換肌散等
藥

石疽

石疽初起如惡核堅鞭不痛漸大如拳急以陽和湯犀黃
丸每日輪服紫元丹閒服可消如遲至大如升斗者亦
外科證治全書 卷四 發無定處證 十一

石鞭不痛又日久患現筋紋偶作抽痛雖按之如石而
其內已作膿矣現紅筋者其內已通血海不治現斑黑
者乃自潰之證潰則流血三日內死現小塊高低如石
巖者主三百日後必發大痛不潰而死惟現青筋者其
內已成黃漿尚可治今日服陽和湯外用活商陸根搗
爛加食鹽少許敷之數日作痒半月皺皮日敷日輟而
有膿袋挂下以銀鍼穿之用千金內托散加熟地倍生
者各一兩 同陽和湯煎服大劑補托十劑後以陽和解
凝膏隨其根盤貼滿獨留患孔再加繃縛法使其皮膜
相連易于膿盡生肌接用十全大補加味保元等湯浸

忌服至收功

陽和湯通用 犀黃丸通用 紫元丹通用

千金內托散通用 十全大補湯通用 加味保元湯通用

陽和解凝膏通用 繃縛法通用

流注

凡人之血氣晝夜流行周而復始自無停息或因寒痰或

因風溼稽留于肌肉之中致令氣血不行合而為患故

曰流注初起漫腫無頭皮色不異患無定處隨在所生

板腫微疼或兼身體發熱當未作膿時用加味二陳湯

入陽和丸同煎數服全消消後接服小金丹七丸杜其

外科證治全書卷四

續發如皮色稍變疼痛難忍者須用陽和湯以止其痛

消其未成膿之餘地使已成膿者不痛而潰此乃大疽

變小之法也如患頂輒已有膿即為鍼之膿多白色貼

陽和解凝膏但此證潰後定增毒痰流走患生不一故

初潰五日內仍服小金丹十丸以杜後患接用犀黃丸

陽和湯每日早晚輪服使毒痰消盡收功

孩子不能服煎劑者初起用小金丹化服至消乃止既

潰亦以小金丹日服消其餘輒之地至患不疼時鍼

之俟其毒盡用保元湯生用加肉桂五分日服收功

孕婦患之當問懷胎月數如未滿六個月犀黃丸內有

麝香不可服只宜陽和湯愈之愈後再服三四劑以代小金丹杜其流走

潰延日久病人脾虛氣滯者先服六君子湯加芎歸數

劑生用待其飲食復常再按前治

陽和丸通用 陽和湯通用 加味二陳湯通用

犀黃丸通用 小金丹通用 六君子湯通用

保元湯通用 陽和解凝膏通用

痼發

此證多生于手足掌心或腰髀臂下伸縮動處疼如痛風

漫腫無頭其色淡紅憎寒發熱四肢沉重煩渴由平素

外科證治全書卷四

好飲毒壅經絡治宜疎利溼熱用散消飲去川芎柴胡

加葛梗微汗之數赤豆散如表解則用加味解醒湯少

加乳香沒藥消之潰後亦然貼洞天膏

一由感受天地不正之厲氣壅遏肌表宜用不換金正

氣散煎送五通丸發汗解表外敷沖和散表退而作

膿潰者內托散醒消丸主之貼洞天膏

按幼科鐵鏡痛風之證即痼發也其書云四肢上或身

上一處腫痛或移動他處色紅參差成塊腫起按之

滾熱便是治用羌活獨活五加皮威靈仙秦艽防風

桂枝前胡如下身加牛膝各一錢煎服數劑即愈按此方甚

佳但遇好飲酒者患
此去桂枝易白芷

曾醫邑庠生方相幼子左手右足各曲貼肉處痛屈不
伸用前方煎服五劑愈如大人須用酒煮每夜儘量
飲每味一兩五錢煮酒五六斤飲畢即愈此子創方
屢效不爽

加味解醒湯

葛根三錢 茯苓二錢 木香五分 砂仁一錢

人蔘一錢 白朮生 陳皮 神麩炒

豬苓 澤瀉各一錢 五分

右水煎二次服 一方有枳椇子以解酒毒

外科證治全書 卷四 發無定處證 末

赤豆散

赤小豆

右一味磨粉葱汁調敷此方治一切癰毒以雞子清調

不換金正氣散 見後 瘡疽 五通丸 通用 散消飲 通用

千金內托散 通用 瘡疽 醒消丸 通用 洞天膏 通用

惡核

大者稱惡核小者稱痰核初起堅鞭不痛與石疽之起相
同然其寒凝甚痼毒根最深卻不易潰未潰之前忌貼
涼膏藥忌服涼劑宜用加味二陳湯入陽和丸煎服或
陽和湯犀黃丸煎服至消乃止大忌開刀開則翻花難

治如有翻花者用大蟾破腹刺數孔連腸雜葢患口拔
毒輒肛內服溫補托毒消痰之劑犀黃丸收功如孕婦
惟用陽和湯服之

外治方 存驗

用大田螺數個搗爛敷之即消

加味二陳湯 通用 十八 陽和湯 通用 五 陽和丸 通用 六

犀黃丸 通用 四十八

癭瘡

大者為癭小者為瘰癧證蒂小而下垂瘰癧頂小而根大
癭多生于肩項兩頤瘰癧則隨處可生諸書雖有五癭六

外科證治全書 卷四 發無定處證 末

瘡之名類要皆七情六慾臟腑受傷經脈乖變氣凝阻

逆所致瘰癧證易治瘰癧證鮮有瘡者瘰癧證內用開結散內

府神效方外用蛛絲纏法或甘草縮法緩緩消磨亦能

縮愈切勿輕用刀鍼致血出不止立見危殆

瘰癧證惟粉瘰最多其色粉紅多生耳項前後亦有生于

下體者乃腠理津沫偶有所滯聚而不散則漸成此

瘰也治宜鍼破擠出脂粉用生南星大黃等分為末

以白玉簪花根搗汁調敷之然每有愈而復發者乃

內有疔囊化淨膏貼生肌自愈

又有黑沙瘰多生臂骸其腫大小不一以手攝起內有

黑色者是亦用鍼刺出黑沙有聲輒輟不等

又有髮癩多生耳後髮下寸許輒小高突按之不痛亦

用鍼刺之粉髮齊出

又有蝨癩發後其痒微骨開破出蝨無數內有極大一

蝨出之方盡此三者皆同粉癩治法或用艾灸之亦

可

又有蟲癩每生脇下本憂鬱結成治難獲效

又有貼骨癩貼骨而生極疼痛用枸杞根連皮骨野菊

花根連皮骨切片曬乾以多為妙再加地丁根同煎

一服即愈

外科證治全書卷四發無定處證

又有胎癩初生小兒頭上胸乳間腫起大者如鰻首小

者如梅李乃胎中瘀血凝滯而成不可亂治法須待

兒滿三五個月外方可用鍼刺破出如赤豆汁內以

生地黃汁飲之即安

開結散

橘紅 四兩 沈香 木香 各二錢

珍珠 四十九粒小者加倍入沙罐內

豬厭肉子 四十九枚豚豬生

右為末每服一錢臥時酒調徐徐嚥下患小三五服愈

大者一料可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須擇除日

於靜室修合

內府神效方

海藻洗 昆布洗 海帶 海粉飛

海螵蛸 海螺 頂上者用長螺

右各等分研細末蜜丸龍眼大每臥時噙化一丸如神

係內府傳方

蛛絲纏法

取蛛絲撚成粗綫纏紮患根數日其絲漸緊癩根漸

細屢屢細不半月癩自脫按諸綫日鬆惟蛛絲

日緊物理之妙有當格致者

外科證治全書卷四發無定處證

甘草縮法

甘草煎膏以筆塗患四圍三次後另用芫花大戟甘

遂等分為末醋調另用筆塗患之中心勿近甘草

次日縮小復以甘草膏塗其中將芫花大戟甘遂

末塗其外二藥俱不可相近日日互塗自然縮愈

治癩妙方存驗

用麝香數釐重一整塊安放癩當中上加斬艾綠豆

大一丸灸之不起泡不破癩自乾退如舊

遍身癩癧作痒主治方

用肥阜角二斤去邊皮以滴醋十斤徐徐熬添成膏

攤貼

又方

用生南星末醋調或玉簪花根汁調敷之
疣一名枯筋箭

初起如赤豆漸漸微槁日久破裂鑽出筋頭蓬鬆枯槁如

花之葉多生于手足胸乳之間係肝虛血燥筋氣不榮

治宜滋腎水以生肝血潤風燥以榮筋氣歸芍地黃湯

加牛膝川芎主之或為丸常服外用銅錢一個套疣上

以草紙穢代艾作七糾灸之次日即落如疣大者則將

草紙醮溼套在疣上或灸十四糾斷無不下之理然不

外科證治全書卷四發無定處證

可專用外治雖暫愈亦必復發

附方 存驗

用牛口涎塗之自落

歸芍地黃湯通用三七

瘡疽

瘡疽者因受山嵐瘴氣伏藏筋骨之間初發黑色頑痺如

木石重按之微痛亟用不換金正氣散加附子服之自

可消散如遷延浮腫變青色如拳打之狀寒戰似瘧手

足厥逆此為敗證難治須用砭法令出惡血以熟附子

三錢生薑五錢煎服接按陰疽則例治法

不換金正氣散

蒼朮二錢 泔炒 藿香二錢 厚樸二錢 薑炒 陳皮二錢

半夏二錢 炙甘草一錢

右加生薑五片紅棗二枚水煎服

癰疽 一名蛇瘡

初起紅點次變黑色其形小者如粟豆大者如桃李發無

定處疼痛應心剝破膿如豆汁腐爛筋骨川廣煙瘡地

面有之用南星半夏白芷等分生研末菜油調敷內以

不換金正氣散加入仙方活命飲服之遲治妨命

仙方活命飲通用 不換金正氣散見前

外科證治全書卷四發無定處證

痘毒附痘風瘡 痘癩 痘癰 丹癰 痘後發斑

孩子因出痘服多涼藥血凝氣滯乘虛發毒漫腫不紅亦

無焮痛醫多以痘後火毒未盡治之致流走患生不一

久則生管成漏內生多骨凡遇此證宜按流注治法宜

小金丹消之然亦有火毒未盡而發者其發必紅腫焮

痛身熱口渴是不得不用清解敗毒湯加荊芥防風蟬

衣柴胡主之服一二劑外以三豆散敷之則紅退腫消

而愈如潰者用內托散貼洞天膏

痘後發瘡痒痛者三豆散敷之妙

痘後遍身瘡癬如疥如癩漸次延開脂水浸淫結痂成

片名痘風瘡先用升麻葛根湯一二劑接用解毒防
風湯苦澁丸每日輪進外以滲溼救苦散搽之兼避
風戒口自愈如日久失治膿血淋漓浸淫潰爛肌無
完膚即成痘癩須以大補氣血為主兼以解毒防風
湯苦澁丸隨宜酌用

痘後發丹癰紅腫作痛手不可近流移上下過心腎則
死小柴胡加生地黃湯主之外用砭法砭去惡血自
消

痘後發斑但紅不腫不痛者是也化斑湯主之
升麻葛根湯

外科證治全書卷四

葛根 升麻 白芍 甘草 各等分

右水一盞煎七分去渣服無時

解毒防風湯

防風二錢 地骨皮三錢 生黃耆 荆芥穗
牛蒡子 各一錢

右煎服或加升麻五分

苦澁丸

苦澁 一兩 白蒺藜 何首烏 牛蒡子
荆芥穗 各五錢

右水煎服

小柴胡湯

柴胡 人蔘 黃芩 各三錢 炙甘草 二錢

半夏 製 大生地 各二錢

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至半盞
去渣溫服

化斑湯

人蔘 甘草 各一錢 石膏 生地 各五錢

知母 元蔘 各三錢 糯米 一合

右水煎待米熟去渣頻頻溫服無時

三豆散

外科證治全書卷四

黑豆 綠豆 赤小豆 等分

右為粗末醋調如黏敷之乾則以鵝翎醮醋時時潤之
治痘癰其效如神

糝溼救苦散 一名滅斑散

蜜陀僧 生白芷 滑石 等分

右研細末乾者白蜜調搽溼者乾糝

小金丹 通用 敗毒散 通用 內托散 通用

洞天膏 通用 砭法 通用

火赤瘡 附天泡瘡

初起小如芡實大如棊子燎漿水泡色赤者為火赤瘡頂

白根赤者名天泡瘡或生頭面或生遍身焮熱疼痛未破不堅泡破毒浸爛不臭乃太陰陽明風熱所致宜服

仙方活命飲去阜刺山甲加片苓木通外以石珍散搽之自愈天泡

瘡由風熱毒氣客于皮膚搏于血氣而生始如湯燙作

泡一破漿出成瘡治用生地升麻山梔藍葉大黃各一兩

劉碎用豬油八兩文武火煎色變去渣瓷器盛之塗患處

石珍散

生石膏一兩 輕粉 黃礬 海螵蛸各五錢

右共研細甘草湯淨洗以此糝之

仙方活命飲通用

外科證治全書卷四發無定處證

貓眼瘡一名寒瘡

初起形如貓眼光彩閃爍無膿無血但痛痒不常由鬱熱

被外寒凝結而成宜敷真君妙貼散多食雞魚韭蒜自

愈

真君妙貼散

蕎麩一兩 硫黃二兩 白麩一兩

右共一處清水拌乾溼得宜趕成薄片微曬單紙包裹

風中陰乾取研細末麻油調敷

魚脊瘡

初起白鞭泡漸長形如魚脊多生筋骨之間乃陽氣虛羸

寒溼搏結故發常緩慢只在皮膚堅凝響痛破津黃水無論已破未破俱宜隔蒜灸之外敷真君妙貼散內服

小金丹

小金丹通用五十二

漆瘡

漆瘡由人腠理不密感漆辛熱之毒而生初痒而腫抓之

漸如癰疹色紅徧傳肢體焮赤皮破斑爛流水甚者寒

熱交作宜取杉木屑煎湯洗之用乾蟹黃滑石二味研

細末白蜜調敷或即以生蟹黃塗之不數次即愈

胃弱之人漆瘡浸犯中氣多有作嘔不能飲食者用六

君子湯加砂仁藿香酒炒白芍煎服自安忌水浴油

膩發物

六君子湯通用二十一

凍瘡

觸犯嚴寒之氣傷及皮肉致氣血凝結初起紫斑鞭腫疆

木不知痛痒名曰凍瘡宜用陽和解凝膏貼之若因暴

凍著熱或火烘或湯泡必致皮死潰爛亦用此膏貼之

三張可愈

有凍跟凍耳每遇冬寒則發者用茄楷同葱煎湯浸洗

便不再發

凍瘡經年不愈者用獨勝膏塗之效

獨勝膏

於六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中曬熱塗搽于凍發之處即于日中曬乾忌下湯水

陽和解凝膏通用十七

血風瘡

燥熱內淫風邪外襲風溼相搏發為疙瘡或如粟米搔痒無度破浸脂水津淫成片小便不調心煩口渴夜熱內熱日輕夜重治宜滋血潤燥驅風十二味地黃飲主之外敷雄黃解毒散或繡毬丸亦妙忌椒酒雞鵝動風等

外科證治全書卷四發無定處證

物

十二味地黃飲

大生地六錢 當歸 生黃耆各三錢 何首烏五錢
地骨皮三四錢 丹皮 荆芥穗 白芷各一錢
白芍酒炒 白殭蠶 白蒺藜 麥冬各二錢

右水煎早晚服

又血風瘡方

用土內桑根白皮桐油腳共搗敷之三四次神效

傷手瘡方

用黑豆熬水常常洗之即愈

雄黃解毒散

雄黃

寒水石各一兩 白礬二兩

右共研細末滾水調敷溼爛者乾撒

繡毬丸見後疥瘡

癬

初起如錢漸漸增長或圓或歪有匡廓痒痛不一其證有六一日乾癬搔痒則起白屑索然凋枯二日溼癬搔痒則出黏汁浸淫如蟲行三日風癬即痒久不愈之頑癬搔之瘡頑不知痛痒四日牛皮癬狀如牛領之皮厚而且堅五日松皮癬狀如蒼松紅白斑點相連六日刀癬

外科證治全書卷四發無定處證

輪廓全無縱橫不定總由風邪溼熱浸襲皮膚鬱久而化蟲是以搔痒無休矣宜用殺蟲溼逐風之藥輕者繡毬丸搽之重者槿皮酒搽之年久陰頑惡癬諸治不效者鮮角膏五倍膏隨宜敷之忌動風發物自無不愈

一吹花癬生面上如錢搔痒抓之如白屑發于春月故俗名桃花癬婦女多有之用綠豆搗碎將紙蒙碗鍼刺數小孔將豆放紙上以大炭火一塊燒豆灼盡紙將焦即去豆揭紙碗中有水取塗三五次愈又方生

白果仁切片頻搽之或用玉蓉散淨面亦妙

一胎癬俗名奶癬生嬰兒頭面或生眉端搔痒流脂成片臥

則延及遍身宜用紋蛤散搽之或繡毬丸亦效乳母須忌一切動風溼發物

槿皮酒

白槿皮

南星

檳榔各一兩

生木鼈

樟腦各五錢

斑蝥三十個

蟾酥三錢

右各為粗末其浸入滴花燒酒一斤聽用遇癬先用穿

山甲刮破以酒搽之一日一次至愈乃止

鮮角膏

五月初旬取新鮮阜刺數斤搗爛入鍋熬汁汁濃瀝

出易水再熬二三次去渣以汁其歸一處加醋慢

外科證治全書卷四發無定處證

熬成膏凡遇積年惡癬先刮破以膏敷之毒水流

盡再敷數次全愈

五倍膏

五倍子不拘多少研碎以陳米醋熬成膏遇多年頑

癬先抓破以膏敷上乾則加敷以不痒為度然後

去藥則其患處之皮一同黏起盡除根矣

紋蛤散

紋蛤四兩

川椒三兩

輕粉五錢

右先將紋蛤打成碎塊鍋內炒黃色次下川椒同炒黑

色煙起為度入罐內封口存性次日入輕粉研為細

末香油調搽一方有白礬五錢

繡毬丸

見後 玉容散 見面部 疥瘡 面塵

疥瘡

疥證有五乾溼沙蟲膿也皆由氣虛血熱榮衛不清之故

每先從手了生起延繞周身搔痒無度如燥盛則生乾

疥搔之皮枯而起白屑溼盛則生溼疥暴腫作痛破津

黃水甚流黑汁血熱凝滯則生沙疥形如細沙焮熱痒

痛抓之有水溼熱相搏則生膿窠疥形如痘粒頂含膿

水或稠或清痛痒相兼若蘊毒風溼化生則生蟲疥搔

徹骨撓不知痛夫疥雖似有餘之證而恆患于不足之

外科證治全書卷四發無定處證

人故治不可專攻其有餘尤當先顧其不足壯盛人初

發時可用荆防敗毒散透之若其形勢既成無憎寒發

熱之證則不用治乾疥沙疥以當歸飲子主之溼疥膿

疥以黃耆飲子主之俱洗以薄荷湯搽以繡毬丸其溼

爛痛甚者搽以二黃丹皆獲效至于日久生蟲皆因溼

熱所化清其溼熱則蟲不驅自滅內服苦瀉丸外敷金

銀散自愈即繡毬丸擦亦效

一有經久不痊體虛極而瘡之甚者內服神仙棗外敷

二黃丹可愈

一小兒疥瘡用藁本煎湯洗浴並浣衣最妙

一瘡愈後及年年發者用獨聖丸常服調理最妙

當歸飲子
當歸 三錢
生地黃 四錢
白蒺藜 去刺 荆芥

赤芍 連翹 去心
金銀花 殭蠶 各二錢
生研

右加竹葉五片水煎食遠服乾疥加丹皮 二錢 沙疥加

枯苓 一錢 五分

黃耆飲子
生黃耆 四錢
荆芥穗 雲苓 歸身 各二錢

忍冬 三錢 防風 白芷 香者 連翹 各一錢
去心

甘草 八分
外科證治全書 卷四 發無定處證 手

右加大棗十枚水煎温服溼疥加製乳香 一錢 五分 膿窠疥

加木通 一錢 五分
神仙棗

歸身 一兩 金銀花 一兩 甘草 三錢 白殭蠶

白芷 黃耆 各五錢 紅棗 二斤

右水六碗共煎三碗渣如前再煎共湯六碗去渣以湯

棗勻四五日食食完全愈

獨聖丸

荆芥 連穗
右一味為末用地黃自然汁熬膏為丸桐子大每服三

錢茶酒任下服此須忌魚蟹
繡毬丸

川椒紅 輕粉 樟腦 雄黃

枯白礬 水銀 各二錢 大楓子肉 另研 一百粒

右共研細末同大楓子肉再研勻加柏油 一兩 五錢 和藥攪

勻作丸如圓眼大先以鼻聞次搽患處

薄荷湯
薄荷 一兩 花椒 三錢

右用米泔水煎候温洗之洗後避風拭乾搽藥

二黃丹 孫真人方

外科證治全書 卷四 發無定處證 手

黃檗 五錢 輕粉 一錢
右共研末雞子黃熬油調搽凡疥瘡膿窠痛甚者宜此

搽之止痛立愈

荆防敗毒散 通用 金銀散 通用 苦薄荷丸 見前 痘毒

瘡癥

凡患瘡誤用攻劫之藥致毒氣入內腹大脹滿名曰瘡癥
棗蠶丸主之如痛勢危篤不及合丸者當覓大蟹四五
隻約重斤餘令其白湯煮食飲酒蒸暖而臥不兩時身
上發瘡更很于前則瘡全消矣再按瘡治蓋瘡瘡死證
也瘡易愈也不可畏其發而自貽伊戚也

棗蠶丸

白僵蠶 紅棗各四兩

右先用水煮紅棗一二滾取湯洗蠶棄湯以棗去皮核搗爛將蠶曬乾為末二兩同棗搗和為丸每服三錢早中晚仍用紅棗湯送服三次服完全愈
傲冬瘡

凡人每至秋冬項背或周身發瘡如疥如癬或如疔瘡作痒浸水結痂至交春暖即愈名傲冬瘡此寒氣收斂腠理陽氣不能發越怫鬱而作也宜以荆防敗毒散解表再以補中益氣湯實表外搽繡毬丸即愈

外科證治全書

卷四

繡毬丸見前疥瘡

癩

溼熱怫鬱先見紅暈次發腫痛患不滿寸名曰癩毒解暑湯主之初起以發麩一塊調稀貼癩上中雷一孔即消或以點毒丹點之亦消如潰膿作痛者貼洞天膏

一頭上軟癩大芋頭搗敷妙

一瘡癩久不收口用白木槿花煨存性為末糝上神效

又方用鼈甲燒存性研末摻之亦效

解暑湯

連翹 金銀花 赤芍 天花粉

滑石飛 車前子炒 甘草 澤瀉

右加淡竹葉十片水煎溫服無時

按此方清暑利溼凡男婦大小無論有癩無癩時逢酷暑俱宜服之

又按天時炎暑酷熱人未有不傷其正氣者故凡解暑用之更加蜜炙黃耆五七錢以助益元氣尤妙名為黃耆解暑飲如癩毒潰膿亦可加生耆與羣藥等分用

點毒丹

黃檗研極細末入雄豬膽汁調如黏凡熱癩初起未

外科證治全書

卷四

出頭用少許點癩中間即消

飛龍丹

寒水石三錢 血竭 沒藥去油 紅砒三分

乳香去油 膽礬 雄精 蜈蚣三錢

銅綠 穿山甲 全蝎酒炒 僵蠶各一錢

硃砂 枯白礬 阜角刺 冰片

輕粉各三分

右各製為末用蟾酥三錢酒化其搗為丸胖綠豆大金箔為衣每用蔥白裹一丸嚼爛酒下醉蓋取汗小癩

初起時即全消白疽忌用

癩癧 俗名癩子

夏月汗溼拂鬱毛竅發癩如疹用綠豆粉一滑石錢五輕粉

錢二研和勻以頓絹醮撲患處或以東壁土研細搽之

瘡癩 一名鬼飯疙瘡 俗名風乘疙瘡

初起皮膚作痒次發扁疙瘡形如豆瓣堆疊成片由汗出

乘風或夜受露風溼相搏而發表虛人多患之宜用荆

防敗毒散去前胡獨活加桂枝白芷石膏汗之謹避風

涼即愈外取百部根浸燒酒以藍布醮搽之

荆防敗毒散 通用

葡萄疫

外科證治全書 卷四 發無定處證

三

此證多生于小兒蓋感四時不正之氣鬱于肌膚不發發

成大小青紫斑點色若葡萄頭面遍身隨處可發身熱

口渴者羚羊角化斑湯主之不渴倦怠者補中益氣湯加

生地主之

一有邪毒傳胃牙根腐爛出血者內用羚羊角化斑湯去

蒼朮加升麻葛根服之外搽珍珠散

羚羊化斑湯

羚羊角 八分 石膏 三錢

知母

人蔘

甘草 元蔘

防風

蒼朮

牛蒡子 各一錢

右加淡竹葉十片水煎六分食遠服

補中益氣湯 通用 珍珠散 見喉部

赤白游風

肌膚初起霞暈由小漸大浮腫成片或高壘如粟發熱痛

痒相兼游走無定赤曰赤游風白曰白游風白屬氣赤

屬血得風則游行初俱宜荆防敗毒散疎解之赤者次

服四物消風飲白者次服補中益氣湯更加防風蟬衣

蘇葉鮮首烏外皆用廣膠燉鎔塗之塗至愈乃止如游

行太速者須用生麻油塗患處砭之以洩其毒凡從背

腹游散四肢者順從四肢游入胸腹者逆忌豬羊雞鴨

外科證治全書 卷四 發無定處證

三

魚腥一切動風燥血之物

一小兒赤游丹由胎中受毒多先患于骸紅腫成片游

走遍身必死治法必先用細瓷鋒竹箸破開夾瓷鋒

砭去毒血取哺雞蟹殼內臭水拂上一二次即愈或

以廣膠鎔塗亦可倘延遲愛惜不砭者不救服藥如

前

荆防敗毒湯 通用 四物消風飲 通用

補中益氣湯 通用

癩疹

紅色小點有窠粒隱行于皮膚之中而不出者是也屬心

火傷血血不散傳於皮膚四物消風飲去柴胡加連翹
木通主之

四物消風飲通用

癩瘍風

多生于頸項胸腋之間其色紫白點點相連成片如糙皮
卻不延蔓亦無痛痒由邪風入于肌膚居久不散而成
用加味二陳湯加荆芥防風蟬衣各二錢川芎一錢酒水各
半煎服外以荆芥煎湯洗之數雄蛇散即愈

雄蛇散

雄黃 一錢

蛇蛻 一條煨存性

外科證治全書卷四發無定處證

三

右共為末麻油調敷

加味二陳湯通用

紫白癜風俗名汗斑

初起斑點游走成片久之可延蔓遍身初無痛痒久則微
痒由汗衣經曬著體或帶汗行日中暑溼浸滯毛竅所
致白因氣滯紫因血滯俱用五神散薑醮搽之搽後漸
黑次日再搽至黑退便愈此證古方治法雖多取效甚
少得此證者忌食魚腥火酒動風發物

五神散

雄黃

硫黃

黃丹

蜜佗僧

南星

右為細末先用葱搽患處次用薑醮藥末搽之搽後漸
黑搽至黑散則愈

白疔 一名疔風

皮膚燥痒起如疹疥而色白搔之屑起漸至肢體枯燥
裂血出痛楚十指閒皮厚而莫能搔痒因歲金太過至
秋深燥金用事乃得此證多患于血虛體瘦之人生血
潤膚飲主之用生豬脂搽之

生血潤膚飲見面部面游風

血箭 一名肌脈

外科證治全書卷四發無定處證

三

血從毛孔中射出如箭由心肺火盛逼血妄行于外宜服
涼血地黃湯外用生豬肉一片貼之其血即止或以京
墨研末醋調塗亦愈

涼血地黃湯

生地 三五錢

黃連 一錢

當歸 一錢

甘草

梔子

元蔞

黃芩 各一錢五分

右水二鍾煎八分量病上下食前後服之

血痣

初起紅痣漸積大如赤豆觸破則血出不止欲死係肝經
怒火鬱血用五靈脂研末搽之即止內服加味逍遙散

加味道遙散 通用十六

五竅出血

耳目口鼻一齊出血藥不及煎死在頃刻先將水當面噴幾口急分開頭髮用粗紙數層醮醋令透搭在額門血即止次用當歸一兩煎汁磨沈香降香各五分加童便服血

自歸經然後以四物湯加人蔘五味為丸服愈

血汗 一名脈溢

周身毛竅汗出如血蓋心主血又主汗虛極有火則見血

汗脈溢湯主之如搔痒血出不止用糞桶穢燒灰敷之

凡人夾肢窩出汗衣服染黃者亦為血汗因虛而致

外科證治全書 卷四 發無定處證

脈溢湯

人蔘

黃耆

歸身

扶神

麥冬

石蓮肉

生地黄

五味子

硃砂

右或丸或煎俱可如煎則以硃砂和服

痛風

痛風即痛痺周身痺痛或手足不仁遍身麻木皆由血虛風溼凝滯用祛風逐溼散每服二錢好陳酒送下隨量飲醉暖臥取汗服至痛處更痛頭眩背汗昏沈片刻即定定則全愈服後不覺痛麻連服數劑至知覺乃止

祛風逐溼散

番木鱉 製淨末

穿山尾甲 製淨末 三錢

熟附子

桂枝

當歸

延胡索 各末 一兩

右一處研勻每服二錢陳酒調下盡醉取汗

小兒胎風 一名胎赤

嬰兒初生身熱皮紅狀如湯潑火燒由孕母過食辛香熱物致兒脾胃積熱乳母宜用清胃湯嬰兒亦用少許外用煨石膏研細敷之如不煨赤即屬胎母脾虛用白晚米粉乾揉或敷之忌服煎藥

一有兒大能食米麪而身熱皮紅者係臟腑熱蒸溼氣

外科證治全書 卷四 發無定處證

湯

清胃散 見齒部走 馬牙疳

螻蛄散 通用 六十八

導赤湯 通用 十

痒風

遍身搔痒並無瘡疥搔之不止肝家血虛燥熱生風不可

妄投風藥養血定風湯主之外用地膚子蒼耳葉浮萍

煎湯暖浴

養血定風湯

生地 五錢

當歸 三錢

赤芍 二錢

川芎 五分

天冬 二錢

麥冬 二錢

僵蠶 二錢 生研

鮮首烏 五錢

丹皮一錢五分
或二錢

右加桑枝二十寸水煎溫服無時或為丸服亦可

外科證治全書卷四發無定處證

罕

內景證治

肺癰 息賁 伏梁 痞氣

肥氣 奔豚 胃腕癰 腸癰

內景

肺 喉下為肺在咽前主出氣喉系堅空接連肺管為氣息之道路呼吸出入下通心肝之竅肺有兩葉白瑩謂之華蓋以覆諸臟虛如蜂窩下無透竅吸之則滿呼之則虛此肺之象也

心包絡 胸下鬲肝即心之位包絡捧護位居心之四旁即兩乳之中膻中穴是也凡筋脈由胸下鬲自鬲貫胸外科證治全書卷四內景證治

罕

如肺心包絡脾肝膽腎七經筋脈皆從此過三焦脈亦布膻中

鬲膜 人心下有鬲膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍著脊所以遮鬲濁氣不使上熏心肺十二經脈惟膀胱脈不貫膜

三焦 鬲下為胃上口在膈上五寸上腕穴即上焦膈上四寸為中腕即中焦肺脈起中焦在此膈上二寸為下腕即胃下口屬下焦

胃 胃者水穀之海五臟六腑之大源故胃氣為一身之本咽下柔空下接胃為飲食之路咽至胃長一尺六寸

統曰咽門下是鬲膜胃上口在鬲下曰賁門膈上二寸
即胃下口曰幽門傳入小腸

脾 脾在胃左與胃同膜而附其上聞聲則動動則磨胃
食乃消化

大小腸 小腸在胃之左胃下口曰幽門即小腸上口盤
十六曲至下口曰關門分祕別清濁即大腸上口大腸
即迴腸當腑之左亦盤十六曲至廣腸廣腸即直腸下
至肛門

肝膽 包絡下有鬲膜肝在鬲膜之中有獨葉者有二三
葉者其系上絡心包為血海下無竅肝短葉中有膽附

外科證治全書卷四 內景證治

焉膽有苦汁藏而不洩

腎 腎分左右一身之中有命門附脊骨對臍其右旁一

小竅乃三焦之氣所自出即先天無形之火曰腎間動
氣左旁一小竅乃真陰水氣所自出亦無形隨相火而
潛行周身以榮四末命門居於中各開一寸五分

膀胱 膀胱齊腰在廣腸左側乃津液之府五味入胃其
津液上升精者化血脈或骨髓餘濁流入下部至小腸
下口曰關門祕別其汁渣穢入大腸汁滲入膀胱膀胱
赤白瑩淨上無所入之竅止有下口全假三焦氣化施
行洩便注瀉三焦氣餒則閉隔不通而為病

肺癰

人身之氣稟于肺肺氣清肅則周身之氣莫不服從而順
行肺氣壅濁則周身之氣易致橫逆而犯上故肺癰者
肺氣壅而不通也其候咳嗽項強胸脇脹滿呼吸不利
咽燥作渴兩腳骨內痛而舌下生如細豆一粒再心口
之上隱隱內作微痛此皆肺中生毒之徵也即用甘桔
湯服之服下如覺稍安肺之患毒無疑矣以犀黃丸十
服分十日同桔梗湯早晚輪服全愈此是預識預治之
法若見腳痛醫腳咳嗽醫咳遷延日久膿成肺壞多致
不救且如舌下一粒患未成膿其色必淡患愈亦消患

外科證治全書卷四 內景證治

聖

篤其色紫黑倘用刀點立死此證吐出膿色皆白稠濁
腥穢速用犀黃丸治之立效 又方以陳年醃芥菜滷每
晨用半茶杯滾豆腐漿沖服服則胸中有一塊塞上塞
下塞至數次方能吐出惡膿日服至愈凡患此證者終
身戒食鴨蟹白鯢紅蘿蔔石首魚甲魚食則復發莫治
甘桔湯

生甘草 桔梗 各三錢

右水煎去渣溫服

犀黃丸 通用 四八

息賁

息賁肺之積也如覆杯氣逆背痛因肺虛痰熱凝結所致
忌服破氣辛熱藥調息丸主之

調息丸

海石 白豆蔻 橘皮 射干

紫苑 旋覆花 桑白皮 白芥子

桔梗

右爲末石碱水丸

伏梁

伏梁心之積也起臍下大如臂至心下久則令人心煩因

心經氣血兩虛以致邪留不去邪不外洩血與痰火鬱

外科證治全書卷四 內景證治

則積聚不散忌熱藥破血汗下宜活血涼血散熱通結

震伏丸主之

震伏丸

鬱金 乳香 去油 沒藥 去油 五靈脂

當歸 延胡索 赤芍 遠志

石菖蒲 茯神 牡礪

右爲末酒丸

痞氣 俗名痞塊

痞氣脾之積也脾虛血瘀氣鬱患居中脘患處皮膚定無

毫毛須看準以筆圈記用消痞膏貼之初起貼膏一張

可消年久須貼兩張方消內服尅堅酒至愈乃止

一有痞塊成形如龜鼈狀乃病者食鼈肉積毒所致當

用鼈甲膏醋炙脆和京三棱蓬朮青皮香附爲末烏

梅醋煮搗丸酒下其物化血水從大便出

尅堅酒

水紅花 三錢 淨末

右用火酒二斤浸之時時呷服或用水紅花子熬膏每

日取二錢酒化下

消痞膏

方有祕傳消痞膏香油斤許蜜佗熬兩六再入阿魏五

外科證治全書卷四 內景證治

羌活倍兩 水紅花子 兩 麝香 三錢 調退火攤膏隨患

貼積年惡痞化全消

肥氣

肥氣肝之積也在左脇下如覆杯痛引小腹由氣血兩虛

逆氣瘀血相並而成宜和肝散積行血瘳肥丸主之

瘳肥丸

川芎 一兩 當歸 一兩 肉桂 五錢 沈香 五錢

紅花 一兩 延胡索 一兩 香附 一兩 蓬朮 五錢

赤芍 一兩 青皮 一兩

右爲末酒丸或醋丸每服二三錢

奔豚

奔豚腎之積也其積無形發于少腹上冲至心欲死若豚
竄奔突之狀復還乃止上下無時雖係腎邪必從驚恐
得之蓋驚傷心恐傷腎兩藏交病也水能勝火腎水陵
心治宜瀉腎補心桂枝加當歸茯苓湯主之
桂枝加當歸茯苓湯

桂枝

白芍

甘草 炙

當歸

茯苓

生薑

大棗

右水煎溫服

胃脘癰

外科證治全書卷四 內景證治

胃脘脹痛心下漸高堅鞭拒按寒熱如瘧身皮甲錯飲食
不進或咳嗽或嘔膿唾血皆胃中生毒之證亟宜忍冬
湯犀黃丸早晚輪服愈之

忍冬湯

忍冬花藤 四兩

生甘草 三錢

右煎服能飲酒煎服

犀黃丸 通用
四十八

腸癰

患在小腹之內腹皮腫急按之如掌堅鞭而熱微痛小便
頻數汗出憎寒腹色如故或微腫脈緊實有力者是也

多因經行產後或七情勞傷飲食淤血積結所致用犀
黃丸薏苡仁湯輪服如膿成腹中脹痛裏急後重則以
薏苡仁湯加大黃一錢五分當歸三錢以下其膿接服蠟礬丸
收功患者若遇事驚恐動跳則腸斷而死坐臥轉側皆
宜徐緩防護少進薄粥靜養調攝庶可保生無虞臍間
出膿者不治

薏苡仁湯

薏苡仁五錢

炒

瓜蒌仁三錢

丹皮二錢

桃仁二錢

去尖

右水煎去渣溫服

犀黃丸 通用
四十八

蠟礬丸 備用
方

外科證治全書卷四 內景證治

腹内生瘡不可藥治者取阜鍼不拘多少好酒一碗
煎七分溫服其膿血悉從小便出極效不飲酒者
水煎亦可

水煎亦可

奇疾證治

血擁 棠梨泡 肉人 肢癢

肉蝶 肉綫 產婦腹中痒

氣旋 氣奔

血擁

周身忽然肉如錐刺既痒且痛不能飲食名血擁用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數盞即愈

棠梨泡

周身起泡如甘棠梨狀破則出水內有石一片如指甲其泡復生抽盡肌肉則死亟用三棱莪朮各二兩為末分三

外科證治全書卷四 奇疾證治

服酒調連進即愈

肉人

頂上生瘡如櫻桃有五色破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人逐日飲牛乳自消

肢癢

寒熱數日四肢堅硬如石擊之如鐘磬聲日漸瘦損用吳黃木耳等分煎湯頻服

肉蝶

因艾灸瘡癩退落後瘡內鮮肉作片飛如蝶狀騰空而去痛不可言是血肉俱熱用樸硝大黃煨各五錢為末水調

下微利即愈

肉綫

婦人產後垂出肉綫長三四寸觸之痛引心腹用老薑三斤連皮搗爛入麻油二斤拌勻炒乾先以熟絹五尺摺作方

結令人輕輕盛起肉綫使之屈曲作三團納入產戶乃

以絹袋盛薑就近熏之冷則再換一日夜縮入大半二

日盡入但不可使綫斷斷則殞命

產婦腹中痒

婦人產後腹中作痒用箭竿及鐵安臥牀席下勿令婦人知

外科證治全書卷四 奇疾證治

氣旋

瘡後口鼻中氣出盤旋不散凝如黑色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食用澤瀉煎湯日食三盞連服五日愈

氣奔

人忽然周身皮裏混混如浪聲痒不可忍抓之血出不能解用苦澆人瀉細辛青鹽各一兩水煎慢慢飲完即愈

怪蟲證治

號蟲

厲蟲

紅綫蟲

續命蟲

溼蟲

腐蟲

肉蛆

信蟲

月望蟲

號蟲

蟲形如蟹為筋肉所化走於皮中作聲如兒嘯用雷丸雄黃等分末摻豬肉上炙肉食之即愈

厲蟲

臥時忽渾身蟲出約至四五升致血肉俱壞每宿漸多痛痒不可言狀惟喫水臥牀晝夜號哭舌尖血出不止身外科證治全書卷四怪蟲證治

齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十餘日即安

紅綫蟲

遍身皮內有紅蟲如綫長二三寸時或游動瞭瞭可見痒不可當醫莫能治宜用水蛙為脯早晚食之月餘蟲乃自消

續命蟲

肚腹脹大肉中蟲出不斷斷之復生行坐不得用鶴蝮末水調服五錢自愈

溼蟲

腹中脹如鐵石臍中出水旋變作蟲行之狀繞巾周身扒

搔不盡用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮細末入麝香少許調服

腐蟲

口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食雞臙即愈

肉蛆

頭皮內時有蛆行用竹刀割破以絲瓜葉擠汁搽之蛆出盡愈

信蟲

婦人每臨經時腰腹脹痛玉戶淫淫蟲出如鼠黏子狀綠外科證治全書卷四怪蟲證治

色者數十枚後經水隨至蓋厥陰風木生蟲婦人血海

屬於厥陰此風木自盛兼脾胃溼熱而化正如春夏之交木盛溼盛之時而生諸蟲是也用酒製黃連為君白

朮香附為臣研末粥丸空腹吞之月餘則經至無蟲矣月望蟲

婦人月經流出皆作禽獸之狀欲來傷人先以棉塞陰戶用沒藥一兩白湯調頓服愈

外因雜傷證治

金瘡	金瘡	辟臭蟲
夾傷	跌撲損傷	石蛭傷
鏃木刺入肉	杖傷	辟蚊
犬齧傷	湯火傷	辟蝨
蛇齧傷	鼠齧傷	辟蛇蟻
射工傷	蜈蚣齧傷	
羊犂子螫傷	蝮蛇齧傷	
蜈蚣齧傷	蜘蛛齧傷	
馬蟻齧傷	天蛇齧傷	
蟻螫傷	壁虎齧傷	
沙蟲傷		

外科證治全書 卷四 外因雜傷證治 三

金瘡有刀斧箭鏃傷瓷鋒傷須看傷痕深淺總以止血定痛為主輕者皮肉破損出血不止用勝金散或必效散敷之重者筋斷肉飛血流不住或瘀血不散箭頭不出昏暈疼痛則先以花蘘石散糝之並以熱童便調服一錢其瘀血化為黃水倘血出過多其人面黃眼黑者則不可端攻瘀血宜用八珍湯急固根本加蘇木紅花調之可也更有血亡身體強痙口禁不能言似中風者只宜大補氣血按發痙治法救之若作中風治萬無一生

凡兵器所傷出血而渴甚者不可即與飲食恐痰毛在

創內須食乾物並油膩切忌食粥血沸心必死所忌

有八一嘆二喜三大笑四勞五安六熱七飲八酸八者

犯之未有不死者其不治之證有十一一曰傷腰戶

二曰傷臂中跳脈三曰傷心四曰傷尻五曰傷小

六曰傷五七曰傷腦八曰傷破聲九曰傷痛不在十曰傷

不止前十一曰臭腐有一于此皆不能治除此當診

其脈血未出脈宜洪大血既出脈宜虛細沈小者生

數實浮大者死血出過多而脈微緩者生動急者死

一殺傷未透膜者急用乳香沒藥皆去各末二錢和勻

以小便半盞酒半盞調末通口服患處以金瘡必效

散敷之

一所傷瘡口出血不止者用水調千腳泥敷出血處四

邊如傷頭面則敷頸周圍傷手則敷臂傷足則敷髀

可以截住其血令不來潮其傷口得以用藥敷貼

一金瘡久不合口用撮合散敷之

一箭入肉內鉗不出者用螳螂一個巴豆半個共研敷

傷處微痒忍之候急痒時乃撼拔之以黃連貫仲湯

溫洗海螵蛸末敷之或以花蘘石散敷患四圍鏃出

亦可

一毒箭傷人最惡有二種交廣蠻夷用燧銅作箭鏃人若中之纔傷皮肉便悶腫沸爛而死急服金汁外以金汁搽之若金汁一時難得卽灌人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種是草烏膏喂塗箭鏃名射岡人若中之見血封喉而死急用藍靛汁一碗灌之外亦塗抹傷處如無藍靛則以青布漬汁飲之一法用黑大豆豬羊血內服外敷解毒亦效

一金瘡腹破腸出者看其腸若僅一半可治先以大麥煮粥取濃汁溫洗其腸用桑白皮尖茸爲綫蘸花藥石散縫腸傷口急于縫處塗活雞冠血隨以清油塗

外科證治全書卷四 外科雜傷證治 毒

腸令潤將腸輕輕納入腹中外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉留外皮撒撮合散以待生肌斂口縫後勿驚笑以米飲少少飲之漸增待二十日再喫濃粥調理而愈

一耳鼻被傷落用人髮入陽城罐以鹽泥固濟煨過爲末乘急以所傷耳鼻蘸藥綴故處以軟絹縛定

一筋斷用白膠香一味爲細末敷之或以旋覆草根搗爛汁以筋相對而封之卽相續如故百不失一

一陰莖割去流血疼痛卽以所割之莖塗炙乾爲末酒服每一錢

一指斷用真蘇木末敷之外取蠶繭包縛完固數日指接如故

金瘡必效散

龍骨 煨 乳香 製去 沒藥 製去

花藥石 火煨紅放地上冷 真降香節 炒油乾 定後再煨凡七次

紫草 各五錢 白芷 紫蘇葉 兒茶 各三錢

白蠟 一兩 麝香 三分

右共碾細末研勻瓷瓶密貯聽用

花藥石散

花藥石 硫黃

外科證治全書卷四 外科雜傷證治 毒

右罐盛鹽泥固濟火煨自辰至酉從下生火冷一宿次早取出研細收貯每以未撒患處 研花藥石 忌鐵器

勝金散

參三七

右一味磨粉米醋調敷潰者乾敷立愈

撒合散

真降香 五倍子 製松香 各等分

右共研細粉收貯聽用

勿傷

凡看此證不傷氣噪者易治然氣噪在食噪之中後或原

生左後右後故有左手剖者多傷氣喉之說然左手用
刀不知用力不知輕重其傷更重未有氣喉斷而食類
不斷如二喉皆斷危險之證也治皆同法先用護管藥
及紮法如法治之可愈但其脈洪大疾而無至數者脫
證也若上護管藥後脈漸和平而靜者又屬可生大凡
始終宜脈小而四至者是有胃氣易愈其結喉之間割
在中三路若割在上下不能用紮法之處必死然上中
下及兩旁可以用紮法者可救但視其輕重若何重者
全在紮處得力上護管藥一復時方能接續此藥只可
上一次接不接生死判矣接之後能低聲言語進湯藥
外科證治全書卷四 外科雜傷證治 五

者生反此者莫救或半復時內湯藥漏出一半者俟次
日必不漏而管接矣倘仍漏急用手解去加上護管藥
亦必接矣總以頭一次上藥周密無滲漏之虞次日生
死方定第三日口中不知松香味則管縫矣雖能飲食
必以大便通過為穩內以續筋養血去痰消食散瘀為
主後三方逐次服之忌食花椒生薑大蒜肚肺蓋氣血
壅逆于肺宜瀉不宜補惟白水煮健豬肉腰子黑魚燉
鯽魚甜醬油其菜蔬總不可煎炒

紮法
用舊包頭一個紮一寸半闊要平正以厚皮紙搓軟布

二層于包頭上再挑護管藥布于紙上量刀口深淺
闊狹以藥布厚為妙再布天鵝絨一層于紙上使先
著喉管俟得暖而化黏貼其上以便連絡如無天鵝
絨則用金毛狗代之著有膽力三五人將患者扶起
正坐頭稍仰看其喉管端正上下相對將包頭之藥
對正刀口一合而上不可走氣吹去藥末要緊頭伏
稍低合定其藥不可搖動包頭連紮二道打結于項
旁包頭要平正不可陷動刀口陷則內管撐開不連
臨合口時以意消息內管對不對連不連方為合法
若偏脫則內氣不通矣又要先紮緊七八分少頃即
外科證治全書卷四 外科雜傷證治 五

鬆總要鬆緊得宜次用厚火紙半斤襯于腦後主扶
立端正以白布綁紮二道打結項旁使頭不致仰側
恐其項顛急臥于草地鋪上宜背後高枕頭中凹兩
旁高使項常曲而不直俟新肉生時漸仰直可也頭
漸有力去白布一道火紙輒翻轉再紮過大半日喉
管將續加上止血生肌續筋骨藥再布天鵝絨一層
于藥上如前上藥法紮法一樣亦止可上一次次日
口中不知松香味內管已實矣則上生肌藥俟有大
半新肉及新肉難生者上玉紅膏可望愈也然總以
先接內管為急其外止血生肌皆易耳

第一日服方

當歸 蒲黃 旋覆花根 續斷

山查肉 陳皮 牛膝 黃芩

劉寄奴 甘草 鬱金 生地黄

川芎 五分

右水煎

第二日方 防嗽

桑白皮 枇杷葉 黃芩 川芎

續斷 查肉 寄奴 生蒲黃

陳皮 川貝母 木瓜 薏苡仁

外科證治全書 卷四 外科證治全書

麥冬 三錢

右水煎 嗽甚 加白前 五分 馬兜鈴 一錢

第三日服方 調理

當歸 茯苓 遠志 丹皮

橘紅 條芩 川貝 薏苡仁

生地黄 麥冬 各三錢

右水煎 人虛 加玉竹 三錢 鮮石斛 北沙瀉 各一錢 五味子 三分

護管藥

松香 按法精 眞參 三七 切薄片曬

鈎藤 勾炒 茜草 末 天鵝絨

肉老鼠 無毛者三四個搗爛爲餅 貼板壁陰處風乾爲末

右各製細末聽用每料用製松香 錢一三七分 肉老鼠 分二

鈎藤 分二 茜草 分二 共爲細末 八分 再加天鵝絨 分一 入乳

鉢內以紙蒙上中畱一孔乳槌入內搗極細爲度瓷

瓶貯凡用時記加天鵝絨不碾碎者一層于藥上使

先著喉管連絡也如無天鵝絨則以金毛狗毛代之

此方藥止六味功效如神但上一次生死判矣不及

上二次也

止血生肌續筋骨藥

上好明淨雞骨炭 在銀炭內揀如中 指麤者爲極細末

外科證治全書 卷四 外科證治全書

生嫩松香 輕手研入金毛狗同 研多用毛則易連絡

右二末等分和勻用時亦布天鵝絨一層于藥上如前

上藥法禁法一樣在大半日後喉管將續則加此藥

亦止上一次

生肌藥

生嫩松香 不拘多少量加金毛 狗絨同碾細末一兩

眞瓜兒血竭 碾細末 乳香 碾細末 三錢

右三末共一處細研勻上法如前此藥可常用冬天二

三日一換如新肉難生者更上玉紅膏無不愈矣

金瘡出血不止

蒲黃 五錢

為末熱酒服或以牡礪粉敷之則止 又方 白蠟末敷之

血立止愈

箭鏃傷

海螵蛸末敷之愈

出箭鏃

白象牙末水調敷四圍自出花藥石末敷四圍亦出

玉紅膏

真麻油 二兩 煎滾去沫 二三滾後入老黃蠟 一兩或冬

季止用攪化勻再煎五六次取起盛瓷器內置冷水

外科證治全書 卷四 外科雜傷證治 本

中覽三五遍出熱氣急入後細藥

輕粉末 八分 飛丹 三分 珍珠 生研極細 黃壁末 三分

象皮 陰陽瓦焙微黃見風稍脆即研細末三分如無即以象牙末代之

右五味細末共一處研勻入前臘油內不住手攪勻俟

冷瓷器收貯臨用以桑皮紙薄攤貼

跌撲損傷

凡跌打磕壓落馬覆車墜屋閃肭諸傷大小便通者輕不

通者重初時不問老弱有無瘀血停滯及昏憤氣絕不

能言者俱宜服熱童便一大盃以酒佐之推陳致新其

功最大且不動臟腑不傷氣血萬無一失然後再看傷

之輕重按法治之如皮肉未破胸脇肚腹有作痞悶疼

痛者必是瘀血壯實人以復元活血湯攻之老弱人以

四物湯加桃仁紅花穿山甲補而行之外用生薑葱白

同搗爛和麩炒熱罨傷處仍多用炒熱者續易之止痛

如神如皮肉已破損傷筋骨血流不止而煩燥者名曰

亡血急用花藥石散或金瘡必效散乾摻止血內以八

珍湯加酒炒骨碎補紅花續斷補之其有痛傷胃氣作

嘔或不飲食者以六君子湯加當歸木香調之其有傷

輕別無瘀血等證而肌肉作痛者以復元通氣散宣之

蓋有瘀血不先行散而加補劑則成實實之禍設無瘀

外科證治全書 卷四 外科雜傷證治 本

血而妄行攻利則致虛虛之禍故凡治此證須察其所

患輕重有無瘀血及元氣虛實不可概行攻下致成敗

證焉 凡所傷筋斷骨碎等證另有按骨專科茲書不及詳載

一跌撲氣絕用仙人柴 即九里香葉 搗自然汁一杯灌下即

甦只心中微熱能受一點者無有不活

一骨節打斷離脫急取大生蟹搗爛熱陳酒沖入連服

數碗即大醉無妨外亦用敷傷處半日覺骨內有聲

按預收生蟹陰乾炙末酒服亦可

一跌撲筋斷用金沸草根 即旋覆草 絞取汁以筋相對以汁

塗而封之即相續如故百不失一須禁勞動二十七

日

一孕婦跌傷用阿膠二錢歸身一錢五分艾葉一錢生地黃三錢

續斷二錢砂仁八分川芎五分紅花三分酒水各半煎服

一跌打破傷風發熱高腫甚至牙關緊急者用羌活防

風蒼朮各一錢白芷川芎甘草黃芩生地各一錢細辛

二分加生薑三片煎汁外用杏仁搗爛入白麪少許汲水

調敷

一跌撲極重大小便不通乃危急之候宜先用通導散

行下蓄血然後再進他藥此證藥忌酒煎

復元活血湯

外科證治全書卷四外因雜傷證治

柴胡一錢五分當歸三錢穿山甲炒研天花粉各一

大黃三錢酒炒桃仁二十個甘草八分紅花八分

右酒水各半煎食前後服之以利為度

復元通氣散

木香 茴香炒 穿山甲炙研 陳皮

白芷 甘草 漏蘆 貝母去心

右等分爲末每服二三錢溫酒調下

通導散

大黃 生地黃 桃仁 枳殼

赤芍 當歸各二錢 陳皮三錢 木通

樸硝各一錢 甘草六分

右水煎熱服以通利爲度切不可用酒煎令人悶絕而

死

打傷眼睛方

打傷眼睛突出急揉進用生豬肉一片將當歸赤石

脂末少許摻肉上貼之去毒血即愈

內麻藥

生川烏 生草烏各三錢 鬧楊花醋炙七分半夏生五

黃麻花一錢 蟾酥酒化一錢 生南星五錢

右芋芡葉汁拌上藥曬乾爲末瓷器收貯每用八釐服

外科證治全書卷四外因雜傷證治

用淡鹽湯一杯即解

外麻藥名羊花散

生南星 生半夏各二錢 鬧楊花三錢 生川烏

生草烏各一錢

右用麻黃根芋芡葉汁拌上藥末或加蟾酥五分雄黃少

許

桃花散 凡用刀割血出不止用此止之

古石灰一升入牛膽內陰乾再入牛膽內陰乾如

此七次用牛膽七個方成俟陰乾用

大黃四兩切片同石灰入鍋內炒石灰桃紅色

取起去大黃放地上一夜收研末聽用

跌破頭腦方

真綠豆粉銅鍋內炒黑鋪地上退火氣再敷破處用

包頭布包好避風數日愈

跌撲神效散 存驗

川烏製

草烏 各二錢製

肉桂

紅花 各一錢七分

右其為細末每服二錢酒調下傷重者不過三分即愈

此方起死回生活人千萬

接骨丹 存驗

取路旁牆腳下往來人便溺處年久碎瓦片一塊

者洗淨火煨紅入米醋淬凡五次刀刮細末每服

三錢好酒調下飲醉無妨傷在上食後服在下食

外科證治全書

卷四 外科雜傷證治

毒

前服 此乃神方極能理傷續斷屢驗

六君子湯 通用

四物湯 通用

八珍湯 通用

花藥石散 見金

金瘡必效散 見金

杖傷

凡受杖後急以童便和熱酒飲之隨服邊城十二飲一劑

外敷七真膏或棒頭丹傷重者先用熱豆腐鋪傷處其

熱如蒸其腐即紫復易之令紫色散盡轉淡血色為度

再敷上藥即愈如初時失治日久潰腐疼痛及形氣虛

弱者則非補托不可宜用八珍保元之屬 者此等生用 大理

脾氣以托氣血脾健則元氣日復肌肉自生可保無虞

即或有瘀滯少加乳香沒藥宜之足矣

凡變證宜與跌撲傷損互參通用

一有情不得已事出不虞受害重刑難免者當預服鐵

布衫丸可以受刑不痛即縱有酷刑辱拷亦可無虞

又先一日前將生薑搽受刑處隨用生芋頭同半夏

南星末厚塗之則不甚痛

一杖癰用海風藤元薄防風荆芥等分煎濃湯洗之痒

甚者搽槿皮酒

一杖後發毒用五倍子 一兩 南星 三錢 半頁 一錢 血竭

一錢 其為末米醋調敷

外科證治全書

卷四 外科雜傷證治

毒

邊城十二味飲

歸尾

蒲黃

紅花

蘇木

桃仁

丹皮

乳香

沒藥

紫蘇 各一錢

生地黃

赤芍

酒大黃 各二錢

右酒水各半煎

七真膏

乳香 去油另研

沒藥 去油另研

輕粉

三七 焙

兒茶 各三錢

麝香 四分

冰片 七分

右各末共一處研勻瓶貯聽用 凡杖傷不可用湯水洗將此藥密調敷上薄棉

紙蓋之乾以蜜水潤之

棒頭丹

大黃 一兩 沒藥 去油 乳香 去油 樟腦 各五錢

兒茶 三錢

右共為末蜜調敷治杖重臨危即時止痛

鐵布衫丸

歸尾 地龍 製末 川芎 無名異

兒茶 各一兩 五錢 乳香 製 製沒藥 各五錢 血竭 一兩

麝香 一錢 木鼈仁 製末 一兩 五錢

右共為末醋丸圓眼大酒服一丸不杖以蔥汁解

打著不疼方 存驗

外科證治全書 卷四 外科雜傷證治 李

用白蠟 一兩 切細入碗內滾酒沖服

杖瘡方

用鳳仙花一棵連根帶蒂葉搗爛塗患處如乾又塗

一夜血散即愈無鮮的則秋開收起為末

保元湯 通用 八珍湯 通用 槿皮酒 見發無定處疥瘡

夾傷

夾傷即擠傷也初禁用膏藥敷及泥塗等法恐後必作腫成膿未受刑之先宜服護心丹既受刑之後宜將熱尿飲之亦服護心丹外用銀硃火酒敷之著一人以手十指尖輕啄患者腳心先覺痒次覺疼為止再著一二人

以筆管於患者腳面上輕輕趕之助通血脈候傷處坳

者突起四圍腫大為度即服瓊液散隨飲至醉次日指

去銀硃敷七真膏服代杖湯至愈乃止如復受重刑破

潰者及夾傷多年不愈者亦敷七真膏內服代杖散接

用大補氣血之劑如蕩者尤草歸地杜仲之屬方可收

功

一夾死者急將熱尿灌之再用生附子 七錢 泡去皮臍為

末服二分每服酒三盞煎一盞如無附子以生薑汁

半盞酒半盞同煎百沸并灌二服

一夾碎骨者用土髓 生多年 酒缸下生髓同搗敷之內服護心

外科證治全書 卷四 外科雜傷證治 李

丹

一預防夾棍用獨核肥阜二十個搗爛去皮淨搗極細

加川烏末 五錢 黃麻子末 八錢 草烏末 一兩 製乳香

末 一錢 製沒藥 一錢 和勻預敷受刑處緊包好次日解

去刑後亦可用銀硃敷之

人之骸受官刑皮肉腐爛死血未散疼痛呼號似宜用

膏藥末藥外治為佳然而受刑深重不急內消專用

外治則道遙膜外安能衛心使惡血不相犯乎今有

一方名衛心仙丹一受官刑即時煎服斷無性命之

虞服後再用外治內外調治則瘡口易愈

護心丹

自然銅醋煨七次木鼈子製無名異洗製乳香

製沒藥 蘇木 當歸 蚯蚓去土各等分

右為細末和勻蜜丸二錢重每用一丸黃酒化下一方

內有肉桂土鼈蟲

瓊液散

開羊花揀去梗蒂葉洗去灰沙曬乾砂鍋微炒

右為末每服五分壯者七分先飲醕酒至半酣次用調

藥服再飲至大醉為度靜臥勿語語則發麻麻至次

日其麻方解消腫止痛其功甚捷弱者間一日再服

外科證治全書卷四 外科雜傷證治

代杖湯

當歸 生地各三錢 製乳香 製沒藥

蘇木各二錢 川芎 枳殼麩炒 穿山甲炙研

甘草各一錢

右酒水各半煎服取微汗氣虛人加人蔘黃耆

衛心仙丹

大黃三錢 當歸一兩 紅花三錢 桃仁三十粒

生地一兩 丹皮三錢 木耳三錢 白芥子二錢

右水煎服一劑而惡血散矣然後以膏藥貼之

護心散

大黃一兩 沒藥三錢 乳香三錢 白蠟一兩

松香五錢 骨碎補五錢 當歸一兩 麝香五分

各為細末豬板油一兩將白蠟松香同豬油在銅鍋內

化開後將各藥末拌勻為膏藥貼在傷處外用油紙

包裹再用纏住輕者一膏即愈重者須貼兩膏夾棍

傷重大約四個即可行動無虞矣此二方至神至奇

內方惡血散盡外方使死肉回生

七真膏見前杖傷

櫻傷

凡櫻傷手指者用阜礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手

外科證治全書卷四 外科雜傷證治

熏洗良久血活痛止不致潰爛熱時忌銅鐵器其洗手

水過夜即臭惡不可聞傷重者更用銀硃訶子肉研末

蜜調敷之服代杖湯

代杖傷見前夾傷

踢傷

凡被踢青紫腫痛用冬青葉同醋煮數沸略滴麻油少許

在內取葉換貼患處即愈

湯火傷

湯火傷者乃好肉暴經湯潑火燒焮赤腫急用地榆磨細

如麩麻油調敷其痛立止如已起泡則將泡挑破放出

毒水然後敷之再加以乾末撒上破損者亦然功靈效速乃湯火傷之神藥也如失治潰爛不斂者取竈心黃土名伏龍肝入炭火煨紅水飛曬乾研細人乳調敷數次即愈此證最忌涼水涼藥浸敷致令熱毒伏內輕則皮內臭爛重則神昏氣喘多成不救

一凡被燙燒將死者用生蘿蔔汁灌之良久則活敷藥同上

一被花爆火藥烘燎者磨爆竹硝黃染火燒者服藥敷藥同上

一銃子入肉用蜂蜜沖好酒飲醉即出或用黃蠟沖酒

外科證治全書卷四 外科因難傷證治 卅

亦效敷藥同上

火藥燒傷方

急取鮮柏枝搗爛香油調敷神效忌七天不可見水

鐵木刺入肉

陳臘肉去皮取紅活美好者連肥切細將象皮末及人

指甲末拌臘肉內剝合一處厚敷四旁一飯頃其鐵自

出謹案葉氏種福堂本原刻作新象牙末又綱目象牙末治云諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出

一 出箭頭與鉛礮子鐵鍼以乾莧菜與沙糖塗之即出

一 鐵鍼刺入肉內無眼者不動有眼者隨氣遊走若走

向心窩胸腫者險急用烏鴉翎數根焙焦黃色研服

一二錢外用車脂蠶油不拘多少調活磁石末攤如錢許貼之每日二換其鍼自出又方陳臘肉皮貼之即出又方雙杏仁搗爛羊脂調貼亦出

一 葦刺入肉用栗子生嚼敷之

一 骨刺入肉用象牙刮末水煮白梅肉調敷自輒

一 竹木刺入肉嚼生牛膝根罨之即出又方草麻仁搗敷極效

一 刺傷水中腫痛用韭菜微煮湯之

人齧傷

人常食炙脯之物牙齒漬有毒初齧時急用熱尿傷處洗

外科證治全書卷四 外科因難傷證治 卅

去牙垢瘀血以白果生嚼塗之或更以人尿貯瓶內將

指浸之一夕可愈如失治則痛爛發腫亦必以尿洗淨

以龜版或鼈甲煨末香油調敷俟腫消痛止換上生肌藥

熊虎狼齧傷

熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者初宜用葛根濃煎內服一

二鍾外洗傷處或生鐵煮令有味洗之亦妙用青布捲

為繩然著納竹筒中注瘡熏之出毒水再用獨窠子生

杵塗傷處即愈

一 凡虎傷無論爪牙流血必多大約虎傷多在頸項必

有深孔或兩個或四個其孔一時即變黑色痛不可忍急用生豬油塞之無豬油即用生豬肉填之則肉入孔中隨塞隨化庶不致所傷之肉再腐然後急用地榆半斤為極細末敷其所傷之處血即頓止隨用湯藥解其渴蓋虎傷之處流血必多而虎有熱毒直來犯心故口渴之甚斷不與水飲萬不得已小便飲之

制虎湯

當歸 三兩 地榆 一兩 生地 三兩 三七根 末一兩 麥冬 三兩

外科證治全書 卷四 外因雜傷證治 三

水十碗煎數碗令其暘飲服完必安而臥明日傷處大痒又服一劑再臥如是五日瘡口生合而愈矣

馬齒傷

馬齒成瘡用粟子嚼敷傷處如毒氣入裏心煩嘔悶者馬齒莧搗爛煎湯頻飲之 又方 先用艾灸患處七壯後以人尿鼠矢曬乾煨末豬脂調敷效

犬齒傷

纔齧時便以米泔水浸洗傷處用番木鱉切片瓦上炙炭存性研末撒上一二日即愈如潰爛日久者半月愈 癩狗傷人必發癩如狂之狀世以為其人必生小狗于

腹中此誤傳也因其發癩有如狗狀見人則齧遇女則翹大小便必一時俱閉虛用努力似生產艱難且外勢急痛腰腹作脹而死急需用藥調治救命木鱉子 三個 斑蝥 七個 陳土 炒去 大黃 五錢 劉寄奴 五錢 茯苓 五錢 麝香 五分 各研細末和勻黃酒調服三錢一劑毒即全解至神之方也不必二服皆能奏功過七日外必須多服數次無不可救服藥切忌色慾兩月並忌發物諸豆及豆腐豆粉秋油凡諸豆造成者皆忌食餘無所忌

瘋犬傷最毒用糯米一撮斑蝥二十個去頭足翅先以七個入米內慢火略炒去毛又入七個炒令焦色變亦去毛再入七個炒米出赤煙為度去毛不用只將米研粉用冷水入清油少許空心調服一錢須臾又進一服以二便利下惡物為度未利再進覺腹痛急冷水調靛青服之以解斑蝥之毒或預以黃連甘草煎湯待冷服之亦可敷藥同上不可食熱物一年不食豆類並戒犬肉終身犯則復發不救

豬齒傷

豬齒成瘡用松脂煉作餅貼之或以龜版燒存性研末香油調搽

貓齧傷

傷處用薄荷煎汁洗之雄鼠矢煨研菜油調敷

鼠齧傷

鼠齧成瘡用貓毛煨存性入麝香少許香油調敷

蛇齧傷

凡被蛇傷即以鍼刺傷處出血以繩紮傷處兩頭庶不致毒氣內攻流布經絡用五靈脂雄黃等分研末酒服二錢外亦以敷之中留一孔令洩毒氣或取三七搗爛罨之毒亦消散神效如毒氣入腹腫昏憤者則急用香白芷一兩為末麥冬煎湯調灌之頃刻傷處出毒水毒盡

外科證治全書

腫消仍用白芷末敷之而愈

一蛇傷久潰不愈毒氣延蔓者先以淨水洗淨用白芷末膽礬麝香少許研勻摻之良久惡水湧出其痛即止日以敷之一月愈

一蛇齧牙折肉中疼甚勿令人知用荇菜即葢草覆其上以物包之所折牙自出

一蛇入七孔耳鼻等處割母豬尾血滴入即出內用雄黃硃砂共末煎人薄荷湯調灌之或食蒜飲酒內毒即解

一蛇纏人足令人尿之即解如纏腹即以熱湯淋之亦

解

一蛇纏人足令人尿之即解如纏腹即以熱湯淋之亦

解

一蛇纏人足令人尿之即解如纏腹即以熱湯淋之亦

解

一山居人被傷倉卒無藥者急以溺洗傷處以艾炙數壯鼠耳或搗蒜封之亦妙

蛇傷或在足上或在頭面或在身腹之間足腫如斗面腫如盤腹腫如箕三日不救則毒氣攻心而死蓋蛇乃陰物藏于土中初出洞時其口尚未飲水毒猶未解故傷人最毒治宜解毒為主用祛毒散

祛毒散

白芷一兩 生甘草二兩 夏枯草二兩 蒲公英一兩

紫花地丁一兩 白礬三錢

水煎服一劑腫消二劑毒盡從大小便出三劑全愈

凡被蚯蚓毒眉髮皆脫狀如大麻風但夜則蚯蚓鳴于體中為異耳宜用鹽湯頻頻洗之其毒自出更用牡礪煨粉津調敷之如被齧生瘡者鴨血塗之小兒多受蚯蚓

呵毒陰莖及囊俱腫如水泡亦用鴨血塗之或置鴨口含少時即消

蜈蚣齧傷

此傷取雄雞倒控少時以手蘸雞口涎抹搽傷處其痛立止或捕蜘蛛置齧處待吸毒完蜘蛛不動放水吐而

解

此傷取雄雞倒控少時以手蘸雞口涎抹搽傷處其痛立止或捕蜘蛛置齧處待吸毒完蜘蛛不動放水吐而

解

此傷取雄雞倒控少時以手蘸雞口涎抹搽傷處其痛立止或捕蜘蛛置齧處待吸毒完蜘蛛不動放水吐而

解

此傷取雄雞倒控少時以手蘸雞口涎抹搽傷處其痛立止或捕蜘蛛置齧處待吸毒完蜘蛛不動放水吐而

解

活之將蜘蛛放去傷盛者內飲生雞熱血

蝎螫傷

蝎有雌雄二種雄者螫之痛在一處雌者螫人痛牽徧體方用大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止如一時不得蝸牛則用膽礬末醋和敷傷處徐春甫云蝎怕膽礬親見蝎螫疼痛用膽礬搽之立消此制蝎第一藥也

射工傷 俗名沙發

溪澗中有射工蟲常含沙射人形影人中其毒則病如瘡狀或如傷寒瘡徧聚一處異於常瘡中之深者死急用葱白一握切豉半斤葛根二兩升麻七錢其末每以四錢水煎不拘時溫服移時再服外用大蜈蚣一條炙研醋和敷之

蠖蝮蟲傷 即多脚蟲 俗名蓑衣蟲

此蟲藏于壁間以尿射人則皮膚腫痛起泡狀如茱萸中夾白膿或初如糝粟漸大如豆如火烙漿泡疼痛之至繞身即死用鹽湯棉蘸塌瘡上數次即消或用犀角磨汁塗之或用雞矢塗之或以大黃末塗之亦效

蜘蛛咬傷

蜘蛛咬人成瘡用薑汁調糊粉敷或用清油和鹽搽之內飲羊乳本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之

可解

天蛇咬傷 即花蜘蛛

天蛇即草中花蜘蛛人被其傷與毒蛇無異復浸露中則皮膚似癩非癩宜用秦艽煎湯徐徐飲之外以雄黃白礬研敷甚效或用蒼耳草搗汁內服外敷亦效

羊薺子螫傷

此傷用蚯蚓泥乾搽或竈心土醋搓痛處俱妙又細嚼甘草敷之效

蜂螫傷

纔傷即用小便浸洗拭乾以香油塗之愈又方米醋磨雄

外科證治全書卷四 外科雜傷證治

黃塗之又方用井水調蚯蚓糞塗立止痛

蠶咬傷

蠶咬人毒入肉中令人發寒熱用苧根或葉搗汁塗之愈 按蠶怕苧麻故今之養蠶家以苧麻近蠶則不生發也

壁虎咬傷

此傷用桑葉燒灰水調濃漉汁調白礬末塗之或用青苔搗塗內服敗毒散加青苔三錢煎服 謹案綱目青苔類

松治瘋犬咬惟隔草類青黛治諸毒蟲傷或傳寫之誤

蝮蝨咬傷

醋和石灰敷之效

馬蟻咬傷

用鹽並香油調塗之

蟻螫傷

蟻鉗傷人以頭垢封之或反手取地上土敷之醋調亦可

沙虱傷

此蟲在水中人洗澡則著人身鑽入皮內初時皮上赤如小豆黍粟狀摩之痛如刺三日後寒熱發瘡若入骨則殺人嶺南多此用茅葉刮去搗苦苣菜汁塗之或以小蒜搗敷又方用斑蝥二枚以一枚末服一枚燒至煙盡研末敷之立愈

外科證治全書

卷四 外科雜傷證治

夫

石蛭傷

山中草木枝上有石蛭著人足則穿肌入骨害人凡山行宜以臘豬脂和鹽塗足脛趾即不著人

辟蚊

鱈魚骨夜明砂水上浮萍棟樹花曬乾燒一次七日蚊蟲不入家一方龍甲骨鱈魚骨棟樹花苦蕒藜蘆各等分末每晚取一撮燒之蚊自去

辟蝨

百部秦艽為末于竹籠內燒煙熏之亦可煎湯洗衣又方白果三十個去殼研爛入漿內漿衣則不生蝨

辟蛇蟻

樟腦雌黃鱈魚骨等分末燒煙熏之即以樟腦搽衣席極妙

辟臭蟲

番胡椒即大椒碎末放火上燒煙熏之人須離遠否則人間煙入鼻即出血一方用茱萸末灑入褥上即滅又方檀香芸香各一兩茱萸五錢三樣為末放炭火內燒煙熏之要屋內不透風方好

乩仙治臭蟲方

用硫黃數錢為末和棉花子燒棉花子重下二三

外科證治全書

卷四 外科雜傷證治

夫

即絕

外科證治全書卷四終

外科證治全書卷五目錄

外科

通用法

鍼法 砭法 灸法 熨法

拔毒法 繃縛法 洗滌法

備用法

神燈照法 騎竹馬灸法 麻油截法

洪丞相法 桑枝火烘法 牛膠蒸法

通用方

仙方活命飲 敗毒湯 人渣敗毒散

外科證治全書卷五目錄

荆防敗毒散 陽和湯 陽和丸

防風通聖散 四物消風飲 龍膽泄肝湯

導赤湯一十 散消飲 托邪飲

潤腸煎 小柴胡湯 逍遙散

加味道遙散 二陳湯 加味二陳湯

獨蔞湯 四君子湯二十 六君子湯

香砂六君子湯 四物湯 加減四物湯

八珍湯 十全大補湯 四物養榮湯

保元湯 加味保元湯 補中益氣湯

歸脾湯三十一 加味歸脾湯 當歸補血湯



當歸黃耆湯 大防風湯 和表八珍湯

歸芍地黃湯 千金內托散 代刀散

玉真散四十 護心散 槐花藥

六味地黃丸 加減六味丸 八味地黃丸

加減八味丸 醒消丸 犀黃丸

三黃丸 五通丸五十 紫元丹

小金丹 洞天救苦丹 保安萬靈丹

大棗丸 子龍丸 抑陽散

抑陰散 沖和散 烏龍膏六十

齧頭膏附一 消管錠 平安餅

外科證治全書卷五目錄

海浮散 鍼頭散 推車散

五美散 螻蛄散 二味拔毒散

金銀散七十 金霜散 五寶散

山蓮散 象皮散 六和散

洞天膏 陽和解凝膏七十七

備用法

紫金錠 蠟礬丸 千金化毒丸

呂祖一枝梅 瓊酥散 整骨麻藥

敷麻藥 沖和湯 完瘡散

外科證治全書卷五

環峯許克昌倫聲

木末畢 法蒼霖 同輯

通用法

鍼法

外科用鍼因癰疽膿成不得外洩毒氣壅遏瘡腫肌膚內潰故用鍼決之俾膿洩氣通而愈經云鍼鍼末如鋒銳以取大膿此之謂也用鍼之際雖云量其患之淺深九當隨其肉之厚薄如皮薄鍼深則反傷好肉轉增其潰肉厚鍼淺則毒膿不出反益其痛用鍼可不慎哉大抵用鍼以斜

外科證治全書

卷五 通用法

一

鋒偏鋒為善其法從刃刺入以防透膜欲大開口則將鍼斜出欲小開口則將鍼直出所謂順而導之也然用鍼自有其時果其膿熟不能自潰則用之若未成膿不必用鍼在膏梁怯弱之人及肚臍骨節近筋之處自有代刀散敲頭膏等藥備用不必用鍼也

砭法

凡赤遊丹毒疔瘡紅絲走散或時毒癩血壅實等證皆宜行砭法然不可太深內經所云刺皮無傷肉也法用細瓷器打碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用綫縛定兩手指輕撮筋尾令瓷鋒正對患處約懸寸許再用

重筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺即出毒氣自退若毒氣入腹膨脹者難治

灸法

經云榮衛稽留於經脈之中則血瘀不行不行則衛不通故熱大熱不止則肉腐為膿蓋癰疽瘡毒總由氣血壅積不行可知故通壅積鳴榮衛而灸法誠外科之要訣也竊有疑者諸疽白塌木腫本屬陰寒得灸之力回陽溫腠實為盡善若一切陽毒紅腫焮痛概用灸法雖云宣壅散結恐火攻反致逼毒入裏大痛大腫神昏痰涌吁吁作喘奈何既不敢以人試藥又不忍黏混相傳故特辨明此條以

外科證治全書

卷五 通用法

二

待高明校定閱諸灸法有用隔蒜灸者用蠟燭灸者用附子餅豆豉餅木香餅香附餅灸者其法不一總以通壅積鳴榮衛而已至於灸壯之大小則量瘡勢定也

隔蒜灸法

案陰疽流注及麻木痺寒溼痺痛等證以此灸之亦瘡生下部偏僻之處或可用

大蒜頭去皮切片約至三箇錢厚安患頂上用艾壯於

蒜上灸之三壯即換蒜片再灸每日灸二三十壯愈多

愈妙如瘡勢大以蒜搗爛鋪於瘡上將艾鋪蒜上灸之

蒜敗再換

附子餅

案潰疽血氣虛寒不能收斂以此灸之

炮附子去皮臍研末以津唾和為餅約三箇錢厚置患

口上以艾壯灸之每日灸數壯但令知熱勿令痛如餅乾再易餅灸之以患口紅活為度

豆豉餅案頑瘡惡癬以此灸之

江西淡豆豉為末量患大小唾津和作餅或黃酒和亦可約三箇錢厚置瘡上艾壯灸之餅乾再易如有瘡孔

勿覆孔上在孔旁四布鼓餅然艾灸之令微熱勿令肉

破日灸三度令瘡孔出汗瘥

木香餅案撲損閃胸血瘀氣滯以此灸之

以木香五錢為末生地黃一兩杵膏和勻量患處大小作餅置腫上以艾灸之

外科證治全書卷五通用法

香附餅案瘰癧痰毒或風寒襲於經絡結腫以此灸之

生香附為末生薑自然汁和量患大小作餅覆患處以艾灸之

蟻螬灸法案疔瘰惡瘡諸藥不效者以此灸之

取蟻螬翦去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者

凡艾灸火瘡不收口用瓦松陰乾為末先以槐枝葱白煎湯洗過然後以末搽之即收

熨法

凡流注痰核鶴膝肢體腫塊或風寒襲於經絡筋攣骨痛

及跌撲損傷用之止痛散血誠良法也或先用隔蒜灸法餘腫未消最宜用熨助血氣行壅滯用大蔥白細切杵爛炒熱敷患處熨之腫痛即止

一法用大蔥一握束作數節切為餅置患處以熱物熨之或鋪艾灸之必易餅多灸多熨為妙

拔毒法

草麻拔法此惟紅腫非常不得已而用之若胎前產後及患白者禁用

用草麻子仁搗爛如泥鋪絹上照患處大小取絹蓋上貼患處用布紮好痛止即去之

黃蠟拔法案潰瘡日久臭爛色黑翻花起肛及不痛頑瘡潰爛用之拔毒最妙

外科證治全書卷五通用法

用黃蠟為屑先以溼麪隨腫根作圈高寸許實貼皮上如井口形圈外圍布數重防火氣烘膚於是鋪蠟屑三四分厚於圈內次以銅漏杓盛桑木炭火懸蠟上烘之令蠟化透又添蠟屑隨化隨添以井滿為度去火杓噴冷水少許於蠟上俟冷取起蠟底青黑色即毒出之徵也

繃縛法

凡陰疽潰後敷貼藥外用絹帛四五層安蓋上面再用絲布八寸見方兩塊四角用軟絲紗細帶紮之以一塊繃實患處將帶縛所餘一塊預備洗滌上藥時更換不但無外

邪乘襲且使皮膜連屬融融然氣血流暢易生肌肉也
洗滌法

凡癰疽潰後膿水腥臭不洗滌之則毒遏延膚或穢積生
蛆氣血不能融舒安望其生新肌膚故洗滌亦為要事其
洗也或用解毒散或用集芳散或用蛇椒神效散洗藥不
一惟在臨證措宜重者一日一洗輕者間日一洗每次用
淘米第二次泔水糯米者尤妙六七椀投藥於內入鍋煎至湯
醋瀝去渣以新絲蘸湯淋洗患處湯冷再易并輕手捺患
旁令宿膿隨湯而出以淨為度洗訖用軟絲紙挹乾隨敷
貼以應用之藥蓋洗之以藥湯者以洗之疏暢榮衛一舉
外科證治全書卷五 通用法 五

兩得也煎之以米泔水者以泔之逐穢生新惠而不費也
人之氣血得香則行得臭則逆故洗藥中又當以集芳散
為最

解毒散 洗一切潰久惡腐甚者
先用此藥後用集芳散

白礬 四兩 雄黃 一兩 貫仲 二兩

研細末和滾水待溫洗之

集芳散 洗一切潰爛癰疽

官白芷 川芎 藿香 木香

防風 各三錢 甘草 三錢五分 葱 一大把

蛇椒神效散 洗風陰溼諸瘡

備用法

神燈照法

凡癰疽輕證初起七日前後神燈照法最宜能使未成者
消已成者潰實有奇驗其法用雄黃硃砂真血竭沒藥各
一錢麝香二分共研細末每用三分紙捲裹為撚約長
尺許以真麻油潤透點照離瘡半寸許自紅暈外圍週圍
徐徐照之以漸照入瘡口上所謂自外而內也更須將撚
猛向外提以引毒氣使藥氣從火頭上出內透瘡中則毒
隨氣散自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡熱漸
消可漸減之照罷隨用後敷藥如大膿已出則不必敷藥
外科證治全書卷五 通用法 六

敷藥方

用車前草稀薺草金銀花五爪龍草各等分鮮者搗爛
加陳米粉兩許飛鹽二三分共打為稠粘敷瘡上中留
一頂以膏蓋貼避風如冬月無鮮草預採陰乾為末醋
調敷亦妙倘五爪龍草一時難得即單用四味亦能奏
功不必一定拘執也

騎竹馬灸法

其法令病人以手肘凭几而坐男左女右將手臂豎起要
直用竹篾一條自臂腕中曲處橫紋間量起貼肉上至中

指尖盡處截斷為則不量指甲另用竹竿一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起令病者腳不著地仍使人扶定勿令僵僵卻將前呈臂從竹扛上尾骶骨坐處直則脊背量至篋盡處記之此取中之處非灸穴也又用薄篋單男左女右手中指節兩橫紋處截為同身寸法將此寸篋即安前脊中點記處兩邊各開一寸盡處即是灸穴各灸五七壯疽發左則灸右疽發右則灸左兩邊俱甚則左右皆灸此穴乃心脈所過之處凡癰疽皆心火雷滯灸此則心脈流通而毒自散矣有起死回生之功屢效

麻油截法

外科證治全書

卷五

備用法

七

凡癰疽一切惡瘡預防毒氣內攻真麻油一斤銀器內熬十數沸候冷用酒兩碗入麻油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之吳世安云吾家三世用之無有不效又聞獵者云凡中藥毒急飲麻油藥毒即消屢效

案此方凡大便秘結而毒畜於內者最宜用之以疏通其毒如陰疽及大便不實者卻非所宜

洪丞相蟻鍼法

凡癰瘍初作勢熾毒盛血凝不散者宜用此法以殺其勢取大螞蝗一條入筆管內以管口對瘡頭使蟻飲惡血其毒自散如瘡大須換三四條若吮正穴蟻必死矣屢試屢

效若血不止以藕節上泥塗之即止若瘡頭未明以井邊泥塗上先乾處即是

桑枝火烘法

凡陰疽發背流注附骨等證俱宜用之取桑木枝長九寸劈如指粗一頭然著少頃吹息其焰以火向患處烘片時火盡再換每次烘三四枝每日烘二三次未潰則解寒凝止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉如陰證痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消其日久用之雖潰亦淺且無苦楚

牛膠蒸法

外科證治全書

備用法

八

凡癰疽發背痔漏惡瘡膿瘡久頑不斂等證用牛皮膠一塊水熬稀稠攤厚紙上每剪一塊貼瘡口次用醃醋煮藥布二塊乘熱罨膠紙上蒸之稍溫再易蒸至瘡痒膿出用貫仲二兩煎湯熱洗去膠紙外用膏藥貼之次日再照前蒸洗直至膿盡瘡乾為度

通用方

以下內治方

仙方活命飲一

治一切陽毒未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也

穿山甲

炒粉

白芷

陳皮

當歸

製沒藥

防風

金銀花

皂刺

天花粉

甘草節

貝母去心

赤芍

右酒一盞煎數沸溫服

敗毒湯二

治癰瘍癩赤熱痛煩熱作渴

外科證治全書

卷五

通用方

九

連翹

赤芍

銀花

當歸

黃芩

天花粉各二錢

甘草節一錢

右酒水各半煎去渣溫服小兒減半凡紅癰初起及膿作未潰熱毒壅盛者以此方煎送醒消丸三錢立愈

人瘻敗毒散三

治四時傷寒瘟疫增寒壯熱風溼風眩頭強身痛等證

人瘻

雲苓

甘草

枳殼炒

桔梗

柴胡

前胡

羌活

獨活

川芎

薄荷各等分

右研粗末每用一兩生薑三片水煎服暖臥取汗

荆防敗毒散四

發散瘡疹及時氣風毒邪熱

本方即人瘻敗毒散去人瘻加荆防

陽和湯五

熟地黃一兩 鹿角膠三錢 白芥子二錢 肉桂一錢

甘草一錢 薑炭五分 麻黃五分

右酒水各半煎去渣入鹿角膠溶化和服

陽和丸六

即前方內肉桂薑炭麻黃三味照分爲丸

防風通聖散七

治三陽表裏實熱

熟軍

芒硝

歸身

白芍

荆芥

麻黃

桔梗

滑石加倍

外科證治全書

卷五通用方

十

石膏

梔子仁

黃芩

連翹

薄荷

川芎

白朮

甘草

防風各一錢

右加葱三根薑三片水煎去渣熱服案方內滑石石膏體重宜輕宜倍用

四物消風飲八

治血虛風熱皮膚遊風癢疹等證及勞傷骨風身熱口燥

生地黄四錢

歸身

赤芍各二錢

荆芥

薄荷

蟬蛻各一錢

柴胡

黃芩各一錢

生甘草一錢

川芎

龍膽泄肝湯九

治肝經溼熱小便赤澀或囊癰下疳便毒楊梅凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草 歸尾 防風 知母

木通 丹皮 甘草各二錢 連翹

黃芩 金銀花 天花粉 赤芍各一錢五分

右水煎去渣溫服或對陳酒一杯服

導赤湯 治心火及小腸熱 證小便赤澀作渴

木通 生地黃 甘草梢各等分

竹葉二十片

右水煎服一方加入薤麥冬

散消飲 消癰散表

羌活 荆芥 淡豆豉 當歸

外科證治全書 卷五 通用方

防風 川芎 製乳香 製沒藥

柴胡各一錢 枳殼 甘草各一錢 薄荷葉五分

右水煎去渣熱服覆臥取汗如兼燥渴加生石膏三五錢

托邪飲 十二

西黨 歸身三四錢 白芷一錢五分 防風二錢

荆芥穗 桔梗各二錢 橘皮二錢 甘草

川芎各一錢

右水煎去渣對陳酒一杯溫服取微汗如頭痛項強加

羌活

潤腸煎 治大腸乾燥或津液枯竭或風熱氣秘宜用此方通潤之

枳殼二錢 油當歸二錢 杏仁泥二錢 槐角二錢

橘皮二錢 火麻仁五七分

右水煎頓服

小柴胡湯 治邪在肝膽半表半裏寒熱往來喜嘔或日晡發熱胸滿耳聾鬱怒等證

人參 柴胡 黃芩 炙甘草

半夏 生薑 大棗

右水煎絞去渣再入火滾數沸溫服

逍遙散 治肝脾血虛鬱怒傷肝脇痛等證

柴胡 歸身 白芍 白朮 土炒各

外科證治全書 卷五 通用方

甘草五分 薄荷葉五片

右水煎 加味逍遙散 治肝脾血虛發熱等證

即前方加丹皮梔子仁各一錢

二陳湯 治痰飲嘔惡風寒咳嗽中脘不快脾胃不和等證

陳橘皮 陳半夏各二錢 茯苓一錢五分 甘草八分

右水煎

加味二陳湯 治流注癰核皮裏膜外之凝痰宜兼陽和丸用

即前方橘皮易薄橘紅五錢加白芥子二錢

獨瀉湯 治氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯入胃即吐凡諸虛垂危者

獨瀉湯 十九

人蔘二兩 如無人蔘則以真阿膠黨蔘蜜炙代之

右水一升煮取四合乘熱頓服日再進之兼以瀉煮粥食之更妙一方加大棗十枚

四君子湯二十 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實面黃體瘦等證

人蔘二錢 白朮二錢 炙草一錢 茯苓三錢

右加薑棗水煎或加粳米百粒

六君子湯二十 治脾胃虛弱飲食難化胸膈痞悶嘔吐吞酸等證

即前方加陳皮半夏各一錢五分

香砂六君子湯二十 治過服涼藥以致食少作嘔或中氣虛滯惡心脹滿等證

即六君子湯加藿香砂仁各八分

外科證治全書卷五 通用方 圭

四物湯二十 治血虛營弱一切血病當以此為王

歸身三錢 酒洗 白芍二錢 川芎一錢 地黃三錢 涼血用生地 補血用熟地

右水煎 加減四物湯二十 治血虛伏熱

即前方加山梔柴胡丹皮

八珍湯二十 治氣血兩虛 調和陰陽

即前四君四物合劑

十全大補湯二十 治氣血俱虛肢體倦困遺精驚悸嗜熱作渴真元損敗證

即八珍湯加肉桂一錢黃耆酒炒二錢

四物養榮湯二十

即四物湯加人蔘一錢肉桂五分甘草炒白芷各一錢 保元湯二十

人蔘 黃耆 甘草

右水煎 案本方補氣黃耆炙用托毒黃耆生用

加味保元湯二十

即前方生用加肉桂

補中益氣湯三十 治勞倦傷脾中氣不足清陽不升體倦食少氣虛不能攝血等證

人蔘一錢 黃耆三錢 白朮炒 歸身

橘皮各一錢 甘草一錢 升麻 柴胡各八分

右加薑一片棗三枚水煎去渣溫服 如病外證未痊者尤宜生用

外科證治全書卷五 通用方 酉

歸脾湯三十 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或怔忡驚悸盜汗嗜臥少食憂鬱不舒等證

人蔘 白朮土炒 歸身 黃耆 棗仁各二錢 木香各五分 遠志一錢 多汗燥

龍眼肉七枚 右水煎食遠服

加味歸脾湯二十 治脾經血虛 發熱等證

即前方加柴胡山梔各一錢

當歸補血湯三十 治氣血損傷肌熱口渴目赤面紅脈大而虛重案無脈者宜用

黃耆一兩 歸身三錢

右水一鍾煎八分食遠服

當歸黃耆湯^{三十} 治營衛損傷自汗發瘧及大疽潰後膿血過多等證

即前方當歸黃耆各一兩加糯米一合煎

大防風湯^{三十} 治足三陰虧損寒邪內侵鶴膝附骨下部等疽不論已潰未潰俱宜又治痲後脚膝軟痛

人蔘 白朮 防風 羌活^{各二錢}

當歸^{三錢} 熟地^{三錢} 黃耆^{三錢} 杜仲^{三錢}

川芎^{一錢五分} 肉桂 甘草^{各五分} 淮牛膝

附子^{各一錢} 白芍^{一錢}

右酒水各半煎

和表八珍湯^{三十} 治表虛自汗營衛不和飲食無味等證亦能托毒生肌

外科證治全書卷五 通用方

當歸身 黃耆^生 續斷^{各三錢} 白朮

白芍^{各二錢} 甘草 白芷^{各一錢} 川芎^{五分}

右薑一片棗二枚水煎溫服

歸芍地黃湯^{三十} 治肝腎真陰不足不能滋養營衛眼花耳鳴口燥舌乾津液枯竭

熟地^{三五錢或加至一二兩} 懷山藥^{三錢} 山萸肉^{二錢} 牡丹皮^{一錢五分}

澤瀉 茯苓^{各一錢} 歸身^{二三錢} 白芍^{二錢}

右水煎食遠服

千金內托散^{三十} 治癰毒內虛毒不起化或腐潰不能收斂及惡寒發熱

人蔘 黃耆^生 防風 厚朴

當歸 官白芷 川芎 桔梗

白芍 甘草

右酒水各半煎服陰疽酌用一方有金銀花

代刀散^{三十} 治癰疽膿熟不潰

鮮黃耆^生 皂刺^{各一兩} 製乳香 生甘草^{各五錢}

右研細末和勻每服三錢熱陳酒和服立潰

附經驗方

用黃葵子研一粒酒服則出一頭二粒出二頭

玉真散^{四十} 治跌撲金刃破傷風重者牙關緊急腰背反張蛇犬所傷

天南星^{湯泡七次如急} 防風^{各等分}

右研細末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張

外科證治全書卷五 通用方

者每服三錢童便調服雖瘀血亦愈

護心散^{四十} 治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐服此護心解毒

綠豆粉^{一兩} 製乳香^{五錢} 辰砂^{一錢五分}

右研末和以生甘草煎濃湯每調下三錢時時呷嚥要

使藥常在膈間凡大癰發在三日後宜連進十餘服使

毒氣出外可免變證即四五日後宜閒服解毒止痛護

心

槐花藥^{四十} 治楊梅下疳痔疾神方

新槐藥^{揀淨生用} 右一味每食前用清酒吞下三錢許早午晚每日三服

楊梅下疳初感或毒盛經久難愈者及痔瘡腸風下血等證服至二三升則熱毒盡去可免終身之患亦無寒涼敗脾之慮如不能飲酒即用滾水或鹽湯送下

六味地黃丸四十 治腎水虧損小便淋瀝頭目眩暈腰腿疲軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲倦失音失血水泛為疾病為腫脹等證此壯水制火之劑也

熟地黃八兩 蒸搗 山茱萸 山藥各四兩 丹皮三兩

澤瀉三兩 白雲苓三兩

右為細末和地黃膏加蜜九桐子大每服七八十九食前滾白湯或淡鹽湯送下 此方用煎湯即名六味地黃湯下八味丸同

外科證治全書卷五 通用方 七

加減六味丸四十 治腎虛夢遺 關元不開

六味地黃丸方內去澤瀉茯苓加蓮鬚龍骨錢膠各一兩

八味地黃丸四十 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思或下元冷憊等證

六味地黃丸方內加肉桂製附子各一兩

加減八味丸四十 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡癢汗憔悴等證

六味地黃丸加肉桂一兩五味子四兩炒用澤瀉切片蒸五次倍用

醒消丸四十 治一切癰毒壅腫血凝氣滯紅熱疼痛其效如神

製乳香一兩 製沒藥一兩 雄精五錢 麝香三分

右研和取黃米飯一兩搗爛入藥末再搗為丸蘿藦子大曬乾忌烘每服三錢熱陳酒送下醉益取汗待酒醒則癰消痛止矣

犀黃丸四十 治乳巖瘰癧痰核橫痃流注肺癰腸癰等證

於醒消丸內去雄精加犀黃三分如前法為丸每服三錢熱陳酒送下患生上部臨臥服下部空心服

三黃丸四十 治紅腫熱毒癰痛大癰楊梅瘡瘡結毒懸癰等證

製乳香一兩 製沒藥一兩 雄精五錢 麝香一分 熟大黃二兩 犀黃三分

右以熟軍酒浸透入椀隔湯蒸俟軍軟熟搗爛然後以外科證治全書卷五 通用方 八

乳沒雄犀麝五分和再搗干搥為丸如桐子大每服五錢或三錢

五通丸五十 凡大癰生於要緊穴道將發之際服此甚效

廣木香 五靈脂 麻黃 乳香去油

沒藥各等分 去油

右各為末和勻用飯搗為丸如桐子大每服五錢

紫元丹五十 治一切陰疽陰發背失榮乳巖惡核石疽貼骨流注龜背瘰癧等證凡初起皮色不異或微痛或不痛堅硬漫腫俱可用此消之

當歸 獨活 紅花 羌活

秦艽 穿山甲焙 川斷 殭蠶生

牛膝 延胡索 川鬱金 香附

蒼木 杜仲 川烏 草烏 薑汁製

麻黃 製乳香 製沒藥 全蝎 各一兩

骨碎補 四兩 蜈蚣 十條 蟾酥 五錢 共為細末

番木鱧 一兩 麻黃 綠豆 煎水浸透去皮心入麻油內

右將製過木鱧末同前藥末各半對和水法跌為丸每

服八分身弱者五六分臨臥熱陳酒送下出汗避風如

冒風發麻薑湯熱酒可解服法每間一兩日再服凡紅

毒及孕

婦忌此 小金丹 五十 治一切陰疽流注痰核

外科證治全書 卷五 通用方 九

白膠香 草烏 五靈脂 番木鱧 另有

地龍 各一兩 乳香 去油 沒藥 去油 歸身 各七錢

麝香 三錢 墨炭 一錢二 即陳年錠子墨 五分末

右各末秤足共歸一處和勻用糯米一兩二錢研粉為

厚糊和入諸末搗干搥為丸如芡實大此一料約為二

百五十九曬乾固藏臨用取一丸布包放平石上隔布

敲細入杯內取好酒幾匙浸藥用小杯合蓋約浸一二

時以銀物加研熱陳酒沖服醉益取汗凡流注等證初

起服消乃止如成膿將潰潰久者當以十九作五日早

晚服杜其流走庶不增出但方內五靈脂與人參相反

番木鱧 水浸半月 煮數沸再 浸熱湯中 數日刮去 皮心用香 油煎出即 入少透細 土粉內拌 至土粉油 透篩去土 另換再料 如此三次 油淨以木 盤用細土 再炒入盆 中拌卷一 夜去土用

不可與有瘻之藥同日服孕婦忌此

洞天救苦丹 五十 治癰疽潰爛不

蜂房 取露天 雄鼠矢 尖者 青皮 棟樹子 取立冬

右用瓦炙存性各為細末等分配準研和每服三錢陳

酒送服隔兩日一服

保安萬靈丹 五十 治風寒溼痺痰流注附骨陰疽及

茅山蒼朮 八兩 雄精 五錢 麻黃 羌活

荆芥穗 防風 細辛 川烏 湯泡去

草烏 泡去皮 川芎 石斛 全蝎

外科證治全書 卷五 通用方 辛

何首烏 當歸 甘草 天麻 各一兩

右共為細末煉蜜丸重三錢硃砂為衣瓷器收貯視年

老壯病勢緩急斟酌用之如風寒溼痺痰流注及瘡

疽初起狀若傷寒頭痛惡寒肢體拘急四時感冒傳變

疫證增寒發熱俱宜用之用葱白九莖煎湯調服一丸

蓋被出汗為效如汗遲以葱湯催之其汗必淋漓而出

令其自收不可露風若病無表邪不必發汗但用熱酒

化服多飲無妨服後避風忌冷物戒房事孕婦忌服

大棗丸 五十 凡憤爛不堪之證將見內膜者先用洞天

山羊矢 不拘多少取曬乾 大棗 去皮核

甘遂 每斤用甘
草四兩煎
湯三日
清水再淘
浸數日去
心澀乾麩
裏煨熟取
曬炒研用
大戟
去旁枝水
煮透去骨
切曬

右藥先將棗搗爛如泥然後入羊矢末搗至成丸如梧

子大每服三四錢仍用黑棗煨湯送服日二次

子龍丸 五十

甘遂 大戟 各案法精製為末 白芥子 炒為末

右末各等分煉蜜丸綠豆大每服三分淡薑湯送下日

三次忌與甘草之藥同日服

以下外治方

抑陽散 五十 一名洪寶丹治癰毒紅腫焮熱疼痛

天花粉 三兩 薑黃 香白芷 赤芍 各一兩

右生研細末雞子清調敷或醋調搽

外科證治全書 卷五 通用方

附集驗方 治一切陽癰

赤小豆 天花粉 等分

右為末米醋調敷

抑陰散 五十 治陰疽漫腫不紅堅硬木痛或不痛及筋牽骨痛一切陰寒凝滯冷證

草烏 二兩 南星 獨活 香白芷

狼毒 各一兩

右為細末葱汁調塗

沖和散 五十 一名陰陽散治陽中有陰之證初起不甚大腫微紅微熱發熱積日不消

紫荆皮 五兩 獨活 香白芷 石菖蒲

赤芍 各二兩

右為細末葱汁調敷

烏龍膏 六十 治一切癰疽瘰癧無名腫毒初發焮熱未潰者神效

陳小粉 不拘多少以錫炒之初炒如錫炒久則成黃黑色冷定放地上出火毒研末

右用陳米醋調成糊熬如黑漆以瓷罐收貯用時量毒

大小攤紙上剪孔貼之即如冰冷其痛即止少頃再瘥

不可揭動久則腫自消藥亦脫落此方果驗易而有功

案小粉能和血絡米醋能消癰滯癰破血和故癰疽初起可消而愈然癰疽由發一因熱壅一因寒凝不

兼治其寒熱之病源而徒仗破癰和血未為盡善不若

遇陽癰等證以此膏調抑陽散敷用遇陰疽等證以此

膏調抑陰散敷之則源流俱清其效更速特表於此

較頭膏 六十 治癰癧膿熱不潰

外科證治全書 卷五 通用方

製乳香 製沒藥 杏仁 木髓粉 生

草麻仁 銅綠 等分

右為細末另以巴豆不去油加倍同藥末搗成膏再加

白砒一分搗勻臨用取綠豆大一粒放患頂上用膏藥

掩之潰即揭下洗淨用膏貼胎前產後忌之

附財後方 六十二 敵頭

雄麻雀矢 名曰丁香頭 尖挺直者是

右研細以米醋調每用小豆大一粒乘溼安患頂上即

潰一方加膽礬

海浮散 六十 凡陽毒潰後宜以此敷極能止痛有提膿毒盡生肌妙品也

乳香 沒藥 等分

右研極細乾糝患上以膏藥蓋之

平安餅 六十 治惡肉毒根

烏梅肉 一錢 輕粉 五分

右研和不見粉亮為度如鞭用津少許不可用水研至

成膏照患口大小作薄餅幾箇貼毒根上用膏藥蓋之

日易一次俟毒根不痛落下方止

消管錠 六十 治瘡口久不合肉有膿管用此化之

阜刺尖 炙末 真蟾酥 一錢 榆麪 一錢

紅腹金錢龜 炙淨末二錢

外科證治全書 卷五 通用方

右研極細固藏每遇漏管先以豬鬃探其淺深後以絲

紙捲藥為條塞入日易日塞至愈乃止

鍼頭散 六十 治一切頑瘡內有膿管癩肉以此化之

赤石脂 五錢 麝香 各五分 乳香 三錢

白丁香 三錢 生砒 黃丹 各一錢 蜈蚣 一條 炙乾

右為末搽瘡肉上其肉自化若瘡口久不合內有膿管

者須用此腐之以糯粉黏和作細條陰乾經入管內以

膏藥蓋之內服托裏之藥

推車散 六十 治多骨

推車蟲 即液矢蜚螂 乾薑 細末

右蟲末一錢配薑末五分和勻研細吹孔內有骨欠

日不痛自出吹過週時無骨出則知內無多骨也

五美散 六十 治膿瘰惡瘡

皮硝 一兩 東丹 一兩 硫黃 三錢 雄精 三錢

輕粉 一錢

右研細末乾糝油調俱可或用洞天嫩膏調敷外以絲

紙掩掛不可揭動五日後揭下再敷一二次全愈如溼

痒極則先用金銀散敷上再用此藥加敷

螺蛳散 六十 治溼熱破爛毒水淋漓等證或下部腎囊足股腫痛下疳諸瘡

海螺蛳 浸不必 人中白 等分

外科證治全書 卷五 通用方

右為細末先以湯熏洗患處後以此藥撒之如乾者以

麻油或熬豬油或蜜水調敷如腫而痛者加冰片少許

如溼水甚者臨時對加五美散用

二味拔毒散 六十 治風溼諸瘡紅腫痒痛癩癧等疾甚效

明雄黃 白礬 等分

右為末用茶清調化鵝翎蘸掃患處痒痛即止紅腫即

消 金銀散 七十 治惡瘡痒微骨

硫黃 一兩 銀硃 五錢

右將硫黃打碎入銅勺鎔化再加銀硃攪和離火傾油

紙上冷定取起研末醋調敷止痒神效如破爛爛孔痒
極者白蜜調敷

金霜散七十 治不痒惡瘡楊梅瘰
疔火赤天庖等證

杏仁三錢 雄黃一錢 輕粉一錢

右研細末雄豬膽汁調敷

五寶散七十 治癰疽潰爛餘腐未盡肌肉
不生用此定痛化腐生肌

人指甲 象皮薄切 長髮各五錢 麝香一錢

冰片二分

右用紅棗去核逐枚包甲以長髮捆紮同象皮在瓦上

炭火炙溶成團存性研粉加麝冰研勻貯用

外科證治全書卷五 通用方

山蓮散七十 治一切潰爛不堪與內腑
止隔一膜者敷之立效

大活鱧魚一尾 山羊矢

右將魚破腹去雜以山羊矢打碎塞鱧魚腹放瓦上慢

火炙乾存性為末加麝香一錢研和貯用

象皮散七十 治癰潰久爛孔如掌之大者以此慘之至
孔收小後再用六和散敷此藥並治刀傷
跌損 出血

豬前躡扇骨十兩 煨炭研 象皮一兩 炙存性研

右共研極細聽用

六和散七十 治一切癰疽等毒痛止腐
盡破爛不收者慘上即愈

海螵蛸 龍齒 水飛 象皮炙存性 爪兒血竭

乳香去油 輕粉等分

右研極細末或乾糝或熬雞蠶油調拂

洞天膏七十 治陽癰瘡癤

香白芷四兩 木鼈子肉 草麻子仁 獨活各三兩

大黃三兩 乳香 沒藥各二兩 老葱三斤洗去泥

右用麻油三斤浸藥春秋五日夏三日冬七日用桑火

熬至藥枯用絹將藥渣濾去將油復入鍋內熬至滴水

不散遂離火少頃每油一斤入炒透黃丹研極 六兩旋

攪旋下下完攪勻再慢火熬至滴水成珠以兩手取珠

為丸不黏指為度離火置陰處俟退火氣以油紙攤用

外科證治全書卷五 通用方

如作嫩膏則每斤油內入黃丹三兩不用六兩熬黑取

用

陽和解凝膏七十 治一切陰疽潰爛癰癤凍瘡瘡溼
痰流注等證並可貼背心散腫

新鮮大力草連根葉三斤 白鳳仙花四兩 活者

右用香油十斤將二味熬枯去渣次日再入後藥

川芎四兩 川附子 桂枝 大黃

當歸 草烏 川烏 地龍無助用

殭蠶 赤芍 白芷 白薇

白芨各二兩 續斷 防風 荆芥

五靈脂 木香 香圓 陳皮各一兩

右熬枯住火片時油將冷用夏布濾淨渣將油稱準斤
兩用細絹將油入鍋內要清淨為度用火熬滾每油一
斤加飛過黃丹六兩五錢徐徐投入攪和文火慢熬至
滴水成珠不黏指為度即以溼粗紙罨火將油鍋移冷
竈上下後藥末

製乳香末 製沒藥末 各二兩 麝香末 一兩 蘇合油 四兩
右將三味研極細同藥合油入膏鎔化攪勻半月後攤
貼

外科證治全書 卷五 通用方 七

備用要方

紫金錠 一名神仙太乙丹 一名玉樞丹 一名萬病解毒丹

解除一切中毒積毒蟲毒蠱毒砒石菌蕈死牛馬河豚
等毒及時行疫癘山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣狂亂
迷死牙關緊急小兒急驚等證凡行兵興役之處尤不
可無

五倍子 搥碎洗淨 焙末三兩 山茨菇 去皮淨末 二兩 千金子 即續隨子仁 去油取霜二兩

紅牙大戟 去蘆焙乾淨末 一兩五錢 麝香 三錢 另研

右和勻用糯米煮濃飲為度分作四十錠每服半錠用
井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰瘍

外科證治全書 卷五 備用要方 夫

惡毒火湯蛇蟲大獸所傷以東流水磨服並敷患處如
治顛邪鬼氣鬼胎攣急疼痛以暖酒磨服 凡修合時
日須用端午七夕重陽或天醫天德月德日於淨室內
焚香修製凡奇怪之病屢用如神醫家大家均宜預配
應用

蠟礬丸 一名黃礬丸

治金石發毒一切癰疽托裏止痛
護臟腑神妙不問老少皆可服之

黃蠟 一兩黃色者佳 焙 開離火入礬末 白礬 一兩明亮 淨者為末
右和勻多人眾手急作成丸桐子大每服二三十九漸
加至四五十丸熟水或鹽湯送下日進二三服服至三

四兩之上愈見功矣此方不惟止痛生肌亦能護膜止瀉消毒化膿及內癰排膿托毒

千金化毒丸 治諸惡毒

明白礬

右爲丸每服三錢以葱頭七莖煎湯送下則痛腫俱退再用仙方活命飲二劑去其餘毒此方原用礬末以葱頭湯調服因難服故易爲丸 一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒之藥其效異常治芻蕘之人用此即退不用托裏藥亦愈若金石毒藥發疽者尤效蓋礬能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五

外科證治全書 卷五 備用要方 无

分熱酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蟲蛇咬傷熔化熱滴患處痛止毒消或熱酒服數錢皆效

呂祖一枝梅

凡男婦大人小兒新久諸病生死難定之間用此艾實大一餅貼印堂之中點官香一枝香盡去藥一時後視貼藥處有紅斑暈色腫起飛散謂之紅霞捧日病雖危篤其入不死如貼藥處一時後不腫不紅皮肉照舊不變謂之白雪漫野病雖輕淺終歸冥路小兒急慢驚風

一切老幼痲疾俱可貼之凡病用之皆可預知其生死也

雄黃 五錢 硃砂 三分 五靈脂 三錢 巴豆仁 五錢 不去油

草麻仁 五分 銀硃 一分 麝香 三分

右研細末於端午日淨室中時共研加油燕脂爲膏瓷合收貯勿經婦人之手臨用豆大一圓捏餅貼印堂中其功立見用過餅送入河中

瓊酥散 此藥藥也治一切腫毒等瘡服之開刀不痛

蟾酥 一錢 半夏 六分 鬧羊花 六分 胡椒 一錢八分

川椒 一錢八分 川烏 一錢八分 薑黃 一錢

外科證治全書 卷五 備用要方 丰

右共爲細末每服半分黃酒調服如欲大開加白酒藥一丸

整骨麻藥 此藥開取箭頭服之不痛

麻黃 胡茄子 薑黃 川烏

草烏 各等分 鬧羊花 倍用

右共爲末每服五分茶酒任下欲解用甘草湯服之即甦

敷麻藥 此藥敷於患上則麻木任割不痛

川烏尖 五錢 草烏尖 五錢 胡椒 一兩 蟾酥 四錢

生南星 五錢 生半夏 五錢

右為末用燒酒調敷 一方加蕁艾五錢 一方加細辛一兩

沖和湯 治瘡屬半陰半陽似紅非紅似腫非腫此因元氣虛弱宜補托消之

人蔘 陳皮 各二錢 黃耆 白朮

當歸 白芷 各錢半 扶苓 川芎

皂莢 製乳香 製沒藥 金銀花

甘草節 各一錢

右酒水各半煎服

完瘡散 治溼爛諸瘡肉平不斂及諸瘡毒內肉既平而口有不收者用此最妙

滑石 一兩 赤石脂 五錢 粉甘草 三錢

外科證治全書 卷五 備用要方

右為末乾糝或用麻油調敷或加枯礬一錢瘡者極宜

附中毒類

飲食中毒 中酒毒 中麪毒 中瓜毒

中果毒 中桐油毒 中牛馬毒 中肉脯毒

中狗肉毒 中魚毒 中河豚毒 中蟹毒

中鼈毒 中雞毒 中雉毒 中鴨毒

中烏雀毒 中斑鳩毒 中諸菜毒 中菌毒

中鈎吻毒 中砒毒 中巴豆毒 中附子毒

中烏頭草烏毒 中硫黃毒 中硃砂毒

中雄黃毒 中鍾乳石 中藤黃毒 中藜蘆毒

中木鼈毒 中蒼耳子 中阜蓉毒 中斷腸草毒

外科證治全書 卷五 附中毒類

一名水莽藤 又名莽草 中半夏毒 中狼毒 中花椒毒

中鳩毒 中斑蝥毒 中蜈蚣毒 中地龍毒

中青娘子 中狼煙毒 中輕粉毒

中鉛粉毒 中銀鋤毒 中煤炭毒 中煙毒

中杏仁毒 中烏梅毒 中諸藥相毒 中鹽鹵毒

中蒙汗藥及悶香毒 中丹石毒 中挑生毒

飲食中毒

凡食物經蛇蟲百脚遊過皆有毒人若中之覺熾熱脹滿者急用苦蕒兩三升苦酒半升煮半沸陸續飲之吐食出即瘥或甘草煎湯服吐十餘次或生韭汁服數升俱效

中酒毒

飲酒中毒者經日不醒是也用黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞即愈 中燒酒毒者用鍋蓋上氣汗水半盞灌下即愈或用葛粉冷水調灌之亦醒如燒酒醉死急以新汲水浸其髮外以舊布浸溼貼其胸膈仍時時灌之醒乃已

外科證治全書

卷五 附中毒類

毒

中麪毒

食麪後胃脘脹悶煩渴宜用蘿蔔生啖之或搗汁服之蓋麥麪大熱蘿蔔能解其性或用大蒜嚼食之亦善解麪毒

中瓜毒

食諸瓜及黃瓜中毒每多腹痛而泄以糯米煮粥飲之

中果毒

凡果品不時有毒中之以豬骨燒灰冷水下一二匙

中桐油毒

桐油令人嘔洩飲熱酒即解若清油則柿餅湯解之

中牛馬肉毒

急用甘草末四兩無灰酒調服儘量飲須臾當吐瀉苦湯不可飲水飲水必死又方用淡豆豉搗汁和人乳服之即解

中肉脯毒

凡肉經密器蓋過夜者為鬱肉屋漏沾著者為漏脯皆有毒誤食者殺人宜飲韭汁解之

中狗肉毒

凡食狗肉脹滿不消用蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煮汁飲之

中魚毒

外科證治全書

卷五 附中毒類

毒

凡食魚中毒煩亂者用橘皮煎濃汁服之即解或搗冬瓜汁飲之鱈毒食蟹即解

中河豚毒

毒之所在腹之子目之睛脊之血故浸血不淨有紫赤斑眼及誤破腸子或修治不如法及染屋塵者皆脹殺人中之用橄欖汁或蘆根汁及糞汁並解甘蔗汁亦解

中蟹毒

凡食蟹中毒用紫蘇葉煎汁飲之或藕汁或搗蒜汁俱可解

中鼈毒

凡食鹽中毒用豆豉一合新汲水一碗煎濃汁頓服

中雞毒

好醋飲之即愈未愈再服雞子亦然

中雞毒

犀角末新汲水調服

中鴨毒

糯米泔水熱服一二盞

中烏雀毒

豆汁飲之又生扁豆末冷水服之

中斑鳩毒

外科證治全書卷五 附中毒類 毒

葛粉二合薑湯調服或用生薑一味搗取汁將渣焙乾為

末即以薑汁糊丸日服案鳩常食烏頭半夏苗故中其毒以生薑解之

中諸菜毒

食後腹脹者是也以醋解之

中菌毒

忍冬藤葉生啖之即愈或煎濃汁飲之一方用地漿水飲

之一方用白礬少許溫湯服

中鉤吻毒

鉤吻生池旁與芹菜相似惟根有毛以此別之誤食則殺

人用薺芎即芎藭煮湯頓服一方服桂心湯效

中砒毒

凡中砒毒者其人煩躁如狂心腹絞痛頭眩欲吐不吐面色青黑四肢逆冷六脈洪數飲食中得者為易愈空心酒醋服者難救治宜掘地成坑以水灌注攪成渾水謂之地漿頓服之如吐出再服所謂洗淨腹中毒全憑地下漿是也或用明礬四五錢研末水化冷服亦解其毒如已服久急以黑鉛一塊不拘多少用涼水於石上磨汁旋磨旋灌如吐瀉交作則解後以甘草煎濃汁灌之醒後仍顛倒不語每日用生綠豆研粉冷水和飲之

中巴豆毒

外科證治全書卷五 附中毒類 毒

其證口乾兩臉赤五心煩熱下利不止用綠豆煮湯冷服之或甘草黃連煎汁冷飲之利止而安

中附子毒

凡服附子中毒頭腫面裂血流或見內熱諸證急用綠豆黑豆搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲之一方用田螺搗碎和水飲之

中烏頭草烏毒

甘草煎濃湯服之或米醋調沙糖服之俱可解

中硫黃毒

其證背膊疼痛作悶目暗漠漠用黑錫煎湯飲之或冷服

豬血或烏梅肉一兩焙沙糖五錢漿一大盞煎七分呷之

中礪砂毒

生綠豆磨粉水和飲一二椀

中雄黃毒

漢防已煎湯飲之 有用雄黃搽瘡或熏陰瘡而瘡受其毒者防已煎湯洗數次即愈

中鍾乳石毒

其證口渴下利不止食豬肉則愈

中藤黃毒

蘆粟葉煎湯人倒練西瓜汁一椀服之

外科證治全書卷五 附中毒類

中藜蘆毒

雄黃為末用水調服一錢或者煮葱汁飲之俱可解

中木鼈毒

生薑自然汁和熱酒飲之

中蒼耳子毒

蒼耳子不可同粳米飯食食則猝發心痛急燒倉米灰和蜜漿服如遲即死

中阜攀毒

麪糊一鉢急服愈

中斷腸草毒

一名水莽藤 又名莽草

黑豆一椀甘草五錢共煎濃汁服下登時即解又冬青樹葉冷水搗汁服下即解生羊血亦解

中半夏毒

其證口不能言倒地將死者速用薑汁灌之須臾甦

中狼毒毒

杏仁搗爛和水服之

中花椒毒

凡服川椒氣閉欲死者新汲水飲之即解地漿水更妙

中鳩毒

葛粉二兩水二盞調服口噤者灌之或綠豆粉三合水調

外科證治全書卷五 附中毒類

灌如已死但心口溫者可急灌之

中斑蝥毒

黑豆汁綠豆汁靛汁黃連濃茶葱汁俱可解

中蜈蚣毒

雄黃雞冠血浸舌吐嚙之

中地龍毒

鹽水飲之可解

中青娘子亭長地膽蟲毒

平胃散加酒炒黃連五分黑豆三十粒兩服可解或以豬脂和豆汁飲之

中狼煙毒

醋少許飲之

中輕粉毒

藥中有輕粉中其毒骨痛筋攣用出山鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固湯煮一日夜埋土中出火毒每早晚任飲數杯後用瓦盆接小便有粉出為驗服至筋骨不疼乃止 服輕粉口破者以三年陳醬化水頻頻漱之

中鉛粉毒

沙糖調水服或急搗蘿蔔汁飲之

外科證治全書卷五附中毒類

中銀鋤毒

飲黃泥水二茶杯即愈或用飴糖四兩做成小丸以真麻油吞下即愈又方用烏梅煎濃汁灌之

中煤炭毒

一時暈倒者急宜風涼處以清水灌之

中煙毒

沙糖調水飲之

中杏仁毒

籃子研水服即解

中烏梅毒

生白扁豆研末冷水服之

中諸藥相反毒

蠶退紙即出過蠶之故紙也燒灰細研一錢冷水服下或葶藶取汁調靛青服

中鹽滷毒

凡婦女有服鹽滷垂危者急取活鴨或活雞斬去頭將頭塞口中以熱血灌之可解如服滷多者必用數隻方足盡收其毒更宜熱豆腐漿灌之

中蒙汗藥及悶香毒

飲冷水即安每臨臥時食大棗一二枚或含口中便不致

外科證治全書卷五附中毒類

迷

中丹石毒

其證頭眩耳鳴發熱困篤恐懼不安用地漿服之為上或蚌肉食之良或用黑鉛一斤溶化投酒一升如此十餘次待酒至半升頓服即解

中挑生毒 即蠱毒

此淫術也嶺南閩廣有之而福之古田長溪為最乃於飲食中行厭勝之法魚肉能反生於人腹中人已死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生腹中矣故凡人有毒之鄉飲食當先以銀器試之有毒即黑或用犀角攪

試有毒則起白沫又驗中蠱之法吐津在水中沈則是浮則非又嚼生黑豆不腥嚼明礬而甘其人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也胸膈痛毒在上則服白礬升麻以吐之膈下痛毒在下則以米湯調鬱金末二三錢服以瀉之或將三味合服不吐即下宋李巽發侍郎為雷州推官鞠得此方活人無算載范石湖集

一蝦蟆蠱蝌蚪蠱其證心腹脹疼口乾思水不能飲食悶喘用車轄脂半斤熱酒漸漸服之其蠱自出

一蛇蠱飲食中得之咽中如有物咽不下吐不出心下熱悶用馬兜鈴一兩煎服即吐出

外科證治全書卷五 附中毒類

聖

一金蠶蠱用石榴根皮煎汁飲

一中蠱吐血或下血如鵝肝或心腹急疼如有物齧不即治者死用敗鼓皮燒灰酒服二錢或小麥麩三合分爲三服以冷水調下半日服盡下蠱即愈

附五種蠱毒方

雄黃 麝香 等分

右共末用生羊肺如指大以刀切開納藥末兩匙在內吞下

外科證治全書卷五終

附刻全生集醫案 王洪緒

諺云千學不如一見是以從師習醫必經師率視證見廣識多遇證始無疑惑余以四十餘年之臨證摘其一二奇險危篤者錄之於左以備詳察不必拘拘於師率視證云

喉證醫案

一壯年新婚百日妻往母家滿月方回時值酷暑因交接後貪涼五鼓時喉痛氣逆寒熱交作余問之則曰三日前喉閉畧有微痛今早五鼓腫痛更甚視其小舌腫如梅指知係心腎虛火交接後經風風火兩閉之恙若用發表虛上加虛若投寒劑風火被罨即用前胡蘇子連翹元浸赤

外科證治全書卷末

芍浙貝甘桔八味煎服立愈

無錫村婦年三旬忽喉痛難食彼地一醫以射干赤芍翹芩花粉牛蒡等煎服服即痰升滿口響若鼯聲痰不出齒余問始知驟起沉服涼藥增險此陰寒無疑但痰塞一口萬難進藥即取鵝毛蘸桐油釐許入喉一卷痰隨毛出吐有升許以肉桂炮薑生甘草各五分入碗內以滾水衝浸將碗仍燉湯中用匙取藥連呷三四口即愈
南濠一匠半夜請治喉證問之不能回答有人云昨喫夜飯睡著後忽喉痛而醒余以炙附如細糲一粒放其舌上嚥津數口全愈

髮疽醫案

興邑路姓七歲童頂門寸許並患三疽潰久不斂孔如碁子大淺而無膿乾而色灰人倦無神因服涼劑過多飲食不進余曰色似香灰乃氣血兩喪無膿乾枯精神已絕兼不能食難以醫治次日而夭

瘰癧醫案

楓鎮閩姓年十七頸患瘰癧爛成一片延爛耳腋及腰如手掌大者數處瘦弱成怯初以洞天救苦丹與服毒水大流十日後以陽和湯醒消丸每日早晚各服一次十日頂能舒轉飲食日增外貼陽和膏內服大棗丸並用荊芥湯洗以山蓮散敷九十日收功因未服子龍小金二丸其毒根未除後脈生惡核仍以子龍丸消之杜患

外科證治全書 卷末

二

王姓媳頸內瘰癧數箇兩腋惡核三箇又大骸患一毒不作疼癢百餘日後日漸發大其形如斗案之如石皮現青筋常作抽痛經治數人皆稱曰瘡余曰瘡輒疽鞭此石疽也初起時可消日久發大上現筋紋雖案之如石然其根下已成膿矣如偶作一抽之痛乃是有膿之證也上現青筋者其內已作黃漿可治如上現小塊高低如石巖者不治三百日後主發大痛不潰而死如現紅筋者其內已通血海不治儻生斑點即自潰之證潰即放血三日內斃今

所患現青筋能醫至輒為半功潰後膿變濃厚可冀收功也外以活蔞蔞搗塗內服陽和湯十日則一抽之痛十三劑裏外作癢十六劑頂輒十八劑通患輒其頸項之瘰塊兩腋之惡核盡行消散一無形蹤止膿石疽而起內膿袋下令服葭一錢因在筋絡之處先用銀鍼刺穿後以刀闊其口以紙釘塞入孔內次日兩次流水斗許大劑滋補托裏刪去人蔞倍增者連進十劑相安已極適有伊戚亦行外科道者令其者草換炙服不三日四圍發腫內作疼痛復延余治余令其照前方服又服二十餘劑外以陽和膏隨其根盤貼滿獨畱患孔加以布捆綁人問因何用

外科證治全書 卷末

三

膏貼又加細綁答曰凡屬陰疽外皮活內膜生故開刀傷膜膜爛則死所出之膿在皮裏膜外僅似空銜又不能以生肌藥放入故內服溫補滋陰活血之劑外貼活血溫暖膏藥加之以捆使其皮膜相連易於膿盡且又易於連接生肌果綁後數日內膿甚厚加葭服兩月收功

痰核醫案

婦項痰核三處年久生管延治以拔管藥插入日易半月愈兩惟有一管淺如一栖不意伊夫遠歸兩日管深如舊余曰此刻治定無功效容日商治伊母問余余曰俟令婿出外半月亦可收功數日後接女歸延治而愈又壯年臂

有二管問伊可有暗疾曰有夢遺以六味丸刪去澤瀉增
綾膠龍骨芡實蓮鬚爲丸鹿含草煎湯晨夕各送三錢服
半料而夢遺愈後即以拔管藥治之仍服前丸服完二
管皆痊

惡核醫案

洞庭秦卜年項腋惡核十二處服連翹昆布等藥病重又
被刺破爛經三載始來就醫以陽和湯犀黃丸輪服半月
十中愈八喜甚帶藥而回路見涼粉買食至家又食冷水
油麪次日二便皆閉第五日死此病者自不惜命故記以
爲病者之戒

外科證治全書

卷末

四

南濠客葉南高之弟耳下竝患惡核一被醫穿生管後大
如杯以陽和湯小金丹輪服未潰者全消彼問管可易愈
否余曰消管甚易管消即斂儻將斂一經走洩管即復生
愈期難訂其弟真誠果即斂

乳巖醫案

婦乳患一白疽寒熱痛甚余以陽和丸同二陳湯煎服得
睡痛息連進三服全愈又婦患者相若伊婦弟亦習外科
以夏枯花粉連翹橘葉等藥連服五劑號痛不絕延余治
因向白色今變微紅難以全消即書肉桂炮薑麻黃加二
陳湯令伊煎服今晚痛止能睡明日皺皮縮小服下果然

連進數劑患頂不痛而潰貼陽和解凝膏收功

一婦兩乳皆患乳巖兩載如桂圓大從未經醫因子死悲
哭發威形大如杯以五通丸犀黃丸每日早晚輪服九日
全消又男子患乳巖先用鯽魚膏貼上兩日發大如拳其
色赤紅始來就醫令其揭下與服陽和湯四劑儻色轉白
可拔色若仍紅無救矣四日患色仍紅哀懇求治以犀黃
丸陽和湯輪服服至十六日四餘皆消獨患頂潰用蟾拔
毒三日半月收功

發背醫案

山塘姚姓媳年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒
外科證治全書

卷末

五

周有尺五患後半月背脊添出一毒自上至下計長一尺
三寸上闊下尖皆白陷十日後始請余治其勢甚篤連服
陽和湯三劑人能坐起五劑自能大小便十二劑其續發
者全消先發之搭手餘地皆消止膿患頂有膿者如棊子
大膿足不痛而穿四日收功後言背上如負一板舒轉不
快以小金丹十九丸每日二進漸漸不板神色復元
本濱鎮談姓婦背患如碗初起色白近已轉紅痛甚時值
三伏余以陽和湯書畢旁人云此暑天緣何用麻黃發表
桂薑之熱劑余曰此陰疽也彼云患色轉紅陰已變陽余
因其說立令煎服服後不一時痛息接服四劑患平七分

有膿之三分不痛而潰五日收功

腰疽醫案

閻門龔姓腰患一疽根盤圍闊二尺餘前連腹後接背不紅不腫不痛不輒案之如木初延余治以肉桂炮薑書於方首別後另延蘇城內外三四名家眾視余方皆曰酷暑安可用此熱劑以余為非議用攻托清涼連治五日病者神昏無味復延余治患仍不痛色如隔宿豬肝言語不清飲食不進余曰能過今晚再商是夜即斃然其至死不痛不久伊戚亦患此證延余治以陽和湯服下次日覺鬆又服疽消小半纔以犀黃丸與陽和湯逐日早晚輪服第五

外科證治全書

卷末

木

日全愈後有背患相若者照治而愈

流注醫案

程姓母年七十膝下患一陰毒流注潰經數月患下及疔又起鞭腫二塊與舊患相連延一醫以新發之毒認為舊患旁腫不識流注意以托毒之劑與服服二劑致新發者被托發痛始延余治余以陽和湯與服三劑新發之二毒皆消接服小金丹十九後進滋陰溫補以杏仁散敷半月膿厚合服保元湯加肉桂十餘劑愈

宜興徐三梧之子纔歲半太陽一毒背上心膈對處一毒頸後口對處一毒腰腹二毒兩腋五毒共患十一毒皆皮

色無異其大骸二毒已經伊處醫者開刀聞余至請治以小金丹今日服二次第五日消其九毒消後又以小金丹日服一次因孩小令伊添一乳母十日後二孔皆紅潤以保元湯者草皆生加肉桂三分煎杯許另水煎薑六分服半月後以耆草易炙服愈一月收功

橫痃及楊梅瘡醫案

常熟趙太元長君患橫痃被醫家開刀延余往治余問其開刀幾日彼云已有半月余曰此患破則難治還有九月之壽即辭別別後三百日伊戚在蘇來云已死月餘

福建客滿身廣豆又患橫痃余想橫痃乃陰虛之證藥利

外科證治全書

卷末

七

溫補廣豆係火毒之證藥利涼解二證相背既利於毒定禍於疽必使二證皆宜之藥除犀黃丸外無他法令其每日空心時酒送三錢十服二證全愈後一人毒重倍服而愈

起肛醫案

宜興馮修也右足背連小骸轉灣處初起不過湯毒而成爛骸三十餘年四起鞭肛小骸足腫如斗爛孔可容大拳有時出血所流臭漿滿室難聞自以布包如甄一塊以填孔內否則空痛時年七十有四雍正六年延余治以老蟾破腹蟾身刺數孔以肚雜代包填入孔內蟾身覆蓋孔外

每日煎葱椒湯俟溫早晚各洗一次以蟾易貼內服醒消丸亦早晚二服三日後取地丁大力鮮草搗爛填孔外蓋烏金膏仍以醒消日服其肛口外四起鞭塊內有皮中滲出清水者以嫩膏加五美散敷內有發癢者以白花膏貼內有塊鞭如石者以生蒟蒻搗爛塗因孔內常有血出先以澆三七末撒內次用地丁牛蒡葉根搗填如此二十餘日腫消癢息其鞭塊鞭肛皆平皮色退黑內肉鮮紅患口收小平淺仍以地丁等草填口以五寶散撒上仍貼烏金膏因老翁精神不衰飲食不減始終不補收功

痘毒醫案

外科證治全書卷末

洞庭錢永泰之子患痘毒醫用清火解毒之劑以一毒醫增六七再醫毒生二十醫至第二年孔皆有管日流臭漿右足縮不能行坐臥三載始來就治以陽和湯小金丹犀黃丸等藥與服內用化管藥半月愈半一月管化有多骨者亦出彼欲領子回家纔以生肌散並調和氣血之丸與同詎伊任子恣意飲食不洗即止不敷即停日以酸橙石榴水果消閒嚴冬復臭難聞余曰臭則爛香生肌寒疽未斂日食酸滯領回三月患管復舊乃父母害之也

囊脫醫案

宜興一舟子腎囊形大如斗被走方人穿之不數日爛見

腎子如雞卵大有一筋六七寸長形若雞腸雙環隨腎子落出臭氣難聞令以紫蘇煎湯洗淨其筋爛下問其腎子莖物小肚可痛否彼曰皆不痛余曰此三處作痛則難治今不痛者可治日以紫蘇湯洗洗後以蘇爲末撒上用青荷葉包之內服黃連歸尾黃芩甘草木通等藥十劑五日後腎子收上爛孔收小此非患毒乃是損傷口既收小肌色紅活內服地黃湯外敷生肌散而愈

陰腫醫案

一鄰友余家飲酒二鼓而別次早伊僕云莖物腫脹痛難小便遣來索藥度其醉歸行房妻以前用未洗之絹抹之

外科證治全書卷末

九

此絹必經毒蟲齧過即取仙人對坐草以解蛇毒割人藤以解蜈蚣毒二草搗爛取汁調雄黃末塗上立刻痛止腫消下午全愈

湯傷醫案

一婦小骸經湯被醫者用冰片研入雪水敷之不一刻骸腫如斗痛極難忍請余治婦曰只求止痛死亦甘心余曰幸在小骸下身鞭地儻湯腰腹用此一罈火毒入腹難以挽回以地榆研細調油拂上半刻痛止令伊自拂一二次全愈一使女炭火湯足背爛一孔以伏龍散乳調敷不三日而愈又鄰家一孩鑪上滾湯澆腹因痛自手抓破腹皮

油拂上一次痛息以地榆末乾撒於破處次日肌生未破者全愈

全生集治法方藥此書採摭尤備其醫案雖文理粗淺然足相印證爰併錄之附於卷末俛侗氏識

外科證治全書卷末

十

附刻瘍醫雅言丹藥集方 曹崎著

一炆丹 消結潰堅

汞兩一 硃砂錢三 硝石兩二 礬砂錢三 白礬兩三

信分三 戎鹽兩二

大癰用丹一分小癰用丹半分置貼中心以紙刺

孔覆丹著腫上勿令著肉能作痛起泡

三仙丹 蝕膿去腐生新

汞兩一 硝石兩一 白礬各一兩

大升丹

汞兩一 硝石兩二 白礬兩二 皂礬錢六 雄黃 硃砂

外科證治全書卷末

十

錢各五

小升丹

汞 硝石 白礬 皂礬各一兩 硃砂分三 雄黃分五

白升丹

汞兩一 硝石 白礬 皂礬各二兩 青鹽錢五 鉛錢六

紫升丹

汞兩一 硝石 白礬 皂礬各二兩 鉛錢六 雄黃

硫黃 青鹽各五錢

紅升丹

汞兩一 硝石兩三 白礬兩二 鉛錢九 硃砂錢四 雄黃

錢三

大五毒丹

汞一兩 硝石 白礬各三兩 硃砂一兩 雄黃八錢五分

小五毒丹

汞一兩 硝石六錢 白礬一兩 硃砂 雄黃各五錢

大五毒丹

汞一兩 硝石一兩二分 白礬 阜礬 青鹽各一兩

小五毒丹

汞 硝石 白礬 阜礬 青鹽各一兩

拔萃丹

外科證治全書卷末

三

汞 硝石 白礬 鉛 青鹽各一兩

七星丹

汞 硝石 白礬 阜礬 青鹽 礪砂各一兩

硃砂二錢

金蟾丹

汞三錢 雄黃一兩 火酒二斤 煮 大蟾一隻 破腹去腸紙包

緊紫 硝石 白礬各一兩 研末覆蟾

降龍丹 提微瘡邪毒化為濁涎瘀血從齦滲出

汞 硝石 白礬 青鹽各一兩

每丹一錢配生綠豆粉三錢棗肉三錢研和黏丸

每服一錢松蘿茶下服至三日以牙齦腫出臭涎瘀血為度如不可支以貫眾黃連各一兩煎汁一日服盡則解

六白丹 用同降龍

汞 硃砂各八錢 硝石 阜礬 青鹽 食鹽各七錢

伏龍丹 微瘡點之即滅

汞一兩 硝石 白礬 阜礬 青鹽各二兩 雄黃 硃砂各三錢

硃砂各三錢

每丹一兩配白酒藥三兩研合清水和丸如豌豆

大用時清水研化攪澄去渣蘸點瘡上

外科證治全書卷末

三

五虎丹 用同伏龍

汞六錢 硝石二錢 白礬一兩 阜礬 青鹽各一兩

錢

五黃丹

汞一兩 硝石 白礬 青鹽各一兩 阜礬二錢半

升龍丹 點微毒爛臭

汞一兩 硃砂 硫黃 雄黃各三錢

四綠丹 用同升龍

汞 阜礬 硃砂 雄黃各三錢

大降丹 蝕腐

汞一兩 硝石三兩 白礬 皂礬 青鹽各二兩 膽礬
硃砂 雄黃各三錢 信五分

用法同一炆丹減分兩之半

小降丹

汞一兩 硝石 白礬 皂礬 青鹽各九錢 礪砂
硃砂 雄黃各三錢 信三分

白降丹

汞一兩 硝石 白礬 皂礬 青鹽各二兩 礪砂
錢五錢 硃砂 雄黃各三錢

紫降丹

外科

汞一兩 硝石二兩 白礬三兩 皂礬二兩 青鹽一兩
鉛五錢 雄黃 礪砂各三錢 信三分

升法

諸藥異研合和入小厚鐵鑊內中捺一窩安汞掩以餘藥取新椀覆鑊令密鐵錠壓頂稻柴灰封口築令稍

堅置三隅竈又火煅鍊以少許新棉著椀頂候棉色微黃

退火冷定揭開刮取蓋底飛上之丹

降法 諸藥研合用銷銀白泥罐置赤炭上徐徐入藥煅

令凝結捺窩安汞再入餘藥烘結成胎倒覆椀內稻柴灰

封口以瓦盆盛水置蓋水中外作三隅竈熾炭三斤布密

文煨至灰盡開罐刮取蓋底飛下之丹亦有不用水者名曰單降

凡丹竈背風則火文迎風則火武文則汞起徐緩而丹足武則汞飛不定而丹耗安鑪宜先熾赤炭於底勻鋪黑炭於面鋪傍密塞令無罅隙若一隅有隙透火則一隅色黑無藥炭先赤者亦然必至一炷纔香時綿黃火準早黃則病在火武而汞走遲黃則病在火缺而汞伏均令丹少凡煅鍊時封口灰上烟起有聲是硝礬性發待性定胎結自止守鑪者加灰輕築不可妄動俗傳混元合既濟鼎百眼鑪九轉還元顛倒升降七日夜金粟火三日夜文武火皆方士欺人之術造作艱難消耗貲本每鍊藥不成飾咎根基禁忌殊可恨也

外科

許氏之治多主全生集故亦不用升降藥以為霸道

其實丹方自古相傳確有師法庸醫誤投致敗非藥

之過近世曹崎菴神明其用集方至為切要採附於

此有平安餅消管錠不能奏功者將不能舍之他求

是亦生心化裁之法足濟此書之窮不必執矛盾之

說以相難也丁卯長至日易石生倥何氏重校竝識

余聽鴻先生編輯

外科醫案彙編

葉松泉題

蘇州綠蔭堂藏版
上海文瑞樓發行

同郡余君聽鴻以軒岐之術世其家後又諱成椿有聲一道咸聞即世所稱麓泉先生者也今陽羨士大夫猶能言之君既嗣其緒復執贄於費蘭泉藝益精會兵燹家中落家

平復既故業備居孟河孟河故多良醫君有孫一振寰曲為名公鉅卿所倒屣者有一時嘔藥舳舻銜接數十里者厥未嘗以君幼忽之先緒初君來游於虞始以施診試其術不數

載而道大行東北城鄉居民
尤崇信之辰午求診扶老挈稚
履闕為之穿山顧若自視歎
狀震哀致問績學靡倦於書
無所不讀心領神會盡晰其
理尤樂表章前哲雖片楮集

二

字零珠碎上必搜求擬拾擇其
精粹加以詮釋彙版行世先
大夫恆稱其致學謹受為近時
不多觀注歲有傷寒論翼之
刻先大夫既嘗訂其例而為之
序乃剞劂未竟而先大夫不

祿帝克見其成也今茲獲輯
外科醫案彙論四卷將殺青
乃以善論全由僕與子兩世交矣
辱先公不棄得備孝後問贖
味名論今已不可再而此卷實
先公之所點定且有評語在不可

三

以勿紀子盡其端以竟先志
可乎余不敏未嘗知醫恆惟醫
之為書自古迄今浩如煙海門
徑繁複窺窻深遠昔之所是
即今之所非此之所宗即彼之
所詬泛涉則靡所措歸精求則

步有正的易所謂失之毫釐謬以千里若棄敢以浮掠之見妄論其得失也顧稔若既久不可以不文辭又惟先大夫精究醫理著述滿楹成未及東輯登諸梨棗而此寶手澤可寄吉

光片羽首獲壽世感且不朽矣爰不揣固陋序其崖略如左聊表其抱守之志以會名君請抑之稔余罪戾云俞光緒甲午七月既望陽湖趙賓賜

諺云不為良相當為良醫良相治在良醫濟在道雖不同其功則一也陽羨聽鴻余君挾岐黃術壬午秋仲來游虞麓予過而訪之見其人樸誠溫厚紳宦鄉民就訟者慎思切問毫不異

視無詭譎驕傲之容絕時髦矜誇之習知非尋常醫傭所可擬斯真肯道之士也公慕殊深友交最篤見其曩昔註書傷寒論翼代書晰理辨疑醫家皆奉為圭臬又讀其外證醫案彙編名

家會集卓論紛披方經驗於前
人案皆徵諸寔事繁博者必其
門類奧妙者闡以釋詞碎玉零
金哀然成帙知其濟世之心肯
流露於字裡行間者矣式書經
陽湖 趙惠甫先生訂正加以

二

評註 余君雅不欲刻予力勸
其梓行去疥傷寒論翼刊成已
昭昭在人耳目今嘗索其外證
醫案彙編以付手民 余君正
色拒之者再曰式再刻書形跡
近於標榜豈竟欲使方家貽笑

吾等為好名者耶予以濟世之
言動其濟世之念責其濟世之
功 余君慨焉允許遂出書命
予執校讐之役予不諳醫理何
敢當此但好行其德予與 余
君夙肩同情 余君著書濟世

三

予勸其問世又贊其壽世存諸
前輩流風遺澤於無涯此書式
出定必紙貴式皆不經而走與
傷寒論翼註二書並傳不朽棗
梨刊竣匠氏請序於予予不得
不以不天辭謝責遂援筆誌緣

起於簡端峇在
光緒二十年歲次甲午仲冬月
上澣會稽孫思卷順齋氏謹序

四

醫書雖衆不出二義經文本草經方為學術規矩
之宗經驗方策筆記為靈悟變通之用二者皆並
傳不朽余多遭兵燹先人殉難孱弱多病舊業
盡棄不能奮志詩書繼先人遺緒嗜喜泛涉醫
集養難後餘生讀漢書藝文志醫學方技漢時尤尊
重之建安時仲聖恐去古日遠學術漸歧勤求古訓
博采衆方刪繁歸簡成傷寒卒病論為萬世醫方
之祖運移漢祚典籍散亡晉隋六朝並唐宋諸賢
維持醫學抱殘守缺畧而言之如王叔和葛稚川皇
甫謚吳普徐文伯陶宏景李鐺之業元方全元起
王冰蘇恭孫思邈王壽高繼沖陳藏器成無己朱肱
皆抱經濟之才以經文本性經方傷寒各專一家為學

好古述而不作雖有名醫經驗等方未尚以浮薄醫
案輕示後學不敢自矜為獨解也宋置醫書局於編
修院命儒臣較正歷朝醫書春間設科考醫太醫局
程文至今在人耳目集太平聖惠方聖濟總錄嘉祐
本州寺搜羅靡富為醫學大成宗前醫書賴其列徵
而存其目所謂重學術不涉浮華醫之學術不衰醫

十

案亦不多見自後宋許叔微將經驗方案彙成
帙名本事方金元明諸家皆效之著書繁雜皆將
前人經驗自己治驗方案載於節末甚至卷帙
浩繁各舒己見而為心得誇富闢奢遂成門戶醫
案漸多矣至薛立齋專刻醫案七十八卷孫一奎新
都治驗三都治驗宜興治驗周子幹醫案續刻醫

案繆仲諳之廣筆記喻嘉言之寓意性筆記醫案
雖多臨症方案未見至 國朝吳中葉天士先生
傑出具天縱才無書不讀名振寰宇終身未著書
雖有數種皆後人書賈偽託其名余讀唐書許肩
宗傳肩宗陳隋名醫終身未著書人求其著者肩
宗曰醫者意也在人思慮出而述別脈識症用藥

十一

之難不敢著書貽誤後學天士先生亦肩宗一流人
耶後錫山華岫雲輯其晚年門人所錄方案不
載稱呼不誇效驗但冠姓於年掃盡諸家浮習分
門別類都為十卷名曰臨症指南醫案讀其方案
審病處方詳慎簡潔不刻意於古而自繞古趣此
所謂宗學術規矩恭以靈悟變通隨筆所著之

書也收入四庫全書後仿其體例而刻醫案者接踵而起張氏輯葉氏遺稿合康作霖王子接為三家吳氏合薛雪繆遵義又為三家其後裔輯其遺稿四卷曰醫案存真王小林輯其遺稿兩卷曰徐批葉案真本琴川曾仁伯延陵弟子記如皋吳渭泉臨症醫案筆記丹徒王久峯日記醫案海

四

甯王立雄醫案如皋顧曉瀾吳門治驗錄余居孟河廿餘年集馬培之徵君費晉卿觀察益三馬君佩堂丁君沛三巢君日初馬君費蘭泉先生麓泉堂伯諸前輩舊方至數萬頁未得梓行余見醫案雖多惟外科臨症方案未曾見也後得青浦陳學山先生外證醫案讀之審病詳慎案句簡

潔雖不能與葉氏相抗聊可武其後塵余甚愛之間有初學外科者以成方而治新病恐寒涼溫補誤投外證未愈內證蠱起以致不可收拾內外推諉注棄而不治余寔憫之陳學山先生專於內而精於外合葉氏指南涉於外症者輯哀成帙與初學外科者開靈活之機化拘執之弊稿成乞趙惠甫鄉

五

丈閱之加以評語置之未行會稽順齋孫君余道義交也去秋慷慨助資刊余註傷寒論冀今春見此稿欲余問世余曰醫之一道靈素九經文辭質與通人尚難章句班固疾醫之以熱益熱以寒益寒醫之能辨寒熱者鮮矣瀉于意自云藥方試之多不驗則十全者難矣人每問余醫理惶愧不

敢答再一書貽美方家孫君索之再余笑曰史遷云君所謂富而好行其德者也未便固却情孫君校正增刪都為四卷名外證醫案彙編以付手民是書孫君贊助而成非余志也棗梨告竣索余并言於首余恐醫案日多學術日衰浮薄之風日盛善勦襲辭句方案為行醫之捷徑華其外

六

而悴其內恐不足恃耳余髫年失學自愧不文爰筆書此惟願吾道不涉浮華當重學術為是光緒廿年歲次甲午十二月中浣荆溪余景和聽鴻氏序於海雲寄舫

外證醫案彙編

凡例

一上古方書內外不分內經有癰疽篇金匱有瘡瘍篇千金外臺四子諸家無不講究外證今時內外各專其科外科專仗膏丹刀鍼諸內症者少內科專司脈息方藥諸外症者不多病家每遇大症或兼感冒寒熱疑外科不諳內病延內科用藥立方每至內外兩歧彼此相左當表反補宜托反清內症未平外症變端蜂起攻補錯投溫涼悞進貽害匪輕茲輯方案內外兼證者多俾司瘍科留心體會博考內症羣書如遇內外兼證始終一手調治醫者可得心應手病者亦受益多矣

外證醫案彙編

凡例

一內經曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆為癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來吳中地偏東南海濱低窪之鄉濕卑之地濕熱薰蒸食魚嗜鹹瘍症最多茲專輯吳中名醫方彙彙集成篇經曰四方有異治故他處名公佳作一概未錄一此案本為內外兩科合同起見惟青浦陳學三先生內外皆精聽存先生門診醫案草本惜言外症者不多今輯存四百六十八首又三家醫案內輯吳門薛生白先生三首繆宜亭先生十八首又臨證指南醫案內輯葉天士先生二百三十七首集成四卷分一十三部七十三門以便閱者易於查核夫外症從百會疽起湧泉穴止症名繁雜聽自愧不敏有者採之無則棄之

不敢私心自立一方。畫蛇添足。外症名目雖多。醫案本非全書。潛心默契。治法全神。俱在能治此。即能治彼。若刻舟守柱。豈能貫通其理。能意會於中。變通運用。決無固執之弊。黃帝曰。知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮。故外症無者。概不標出。一附案四十六首。吳江徐河溪先生。於時最近。精於瘍科。採入以廣見聞。先哲瘍症醫案。刊之甚夥。齊薛張王諸家。卷頁浩繁。徒亂心目。況有原本可考。概不採錄。聽妄附治案數首。或見聞確實。或偶爾倖功。皆實事求是。不敢虛誇。誕希邀名譽。願高明曲諒恕之。

外證醫案彙編

凡例

一各部後附論。聽愧幼年失學。鄙俚無文本。不敢輕於落筆。貽笑大方。因友相勸。曰。醫學與儒學稍異。不在措辭。治法頗繁。將諸經絡。挈其綱領。略為敘述。以便閱者有緒。姑不揣鄙陋。摭拾成篇。皆診餘抽暇。信手拈來。從中句讀。不明字理。錯誤。祈高明更正。初學之士。幸勿以句俚文淺。忽之。

一此案雖云外科。方案之中。內證十有七八。如骨槽風。失榮瘰癧。時毒風痰。耳目鼻唇齒舌咽喉。乳癆。脇肋。莖囊。痔瘡。肛漏。內癰。肺癰。胃癰。肝癰。大小腸癰。腎俞癰。肛癰。產後癰。癆。潰瘍。變症。俱內外合治之症。病家求治。內外相左。病豈能愈。內外推諉。又非濟世之道。內外同診。和衷共濟。刀鍼圍貼。立方用藥。融通斟酌。盡善盡美。按日奏功。自然聲名日上。積德於後。若內外妒嫉。各

執偏見。置病家性命於腦後。倘一敗壞。謗毀。盡起。名聲日下。不但損德。於己尤為無益。若遇不起之病。二豎深入。和緩難療。難免外人誹謗。今時總以成敗論人。不白之冤。勢所難免。決不可忿爭。怨尤。徒亂心思。只要仰不愧天。俯不愧心。外言又何足恤哉。余每遇此境。輒誦龍崗所云。吏治豈不與醫治同。實無法挽回。求其生而不得。死者與我皆無恨也。之言。自然心地甯魂。夢安。若從中稍有生機。或織貝不到。粗心浮氣。同道妨功。害能。求其生猶失之死。為醫者豈無過歟。

外證醫案彙編

凡例

一昔醫以和緩得名。乃左氏寓意。醫能和緩者。即為上工。今輯之案。皆瘍症和緩之方。輕可去實。弱正神奇。故外科駁雜。霸道單方。概未採入。惟願同志。皆歸醇正和平。王道緩治。雖無近功。不致一朝敗事。若不中病。誤亦不遠。余媿不知瘍科。惡瘍症與內症相同。症險者。用方不能不峻。症雜者。用藥不能不雜。此等症。百中難見一二。如內科大承氣。四逆。加人尿。麻黃升麻等。非常用之方。要平昔用功好學。臨症有處。稽考。若胸無把握。遇重症。妄施誤投。反有病輕藥重之弊。故駁雜。霸道。峻劑。單方。一概不錄。

一瘍科刀鍼圍貼。俱有衣鉢相傳。立方用藥。不出內科之理。臨證隨錄之方。皆臨時從心所發。錯綜變化。皆宗先哲本源。如儒家時藝。皆從先聖之書而成。醫學之內經。難經。傷寒。金匱。本草。經

即儒家六經語孟脈經甲乙經即左氏公穀策語唐宋金元諸書。即兩漢六朝唐宋之文。看臨證之方。如看時藝一般。將其神理體會得到古書之上。自知學有根柢。臨證取法用藥。自有左右逢源之妙。若不細心玩索。撻拾辭句。勦襲方藥。以病湊方。藉此為行醫之捷徑。大失輯書之意。貽誤後學之罪。吾豈能辭。

一方案雖分門別類。每類之中。各症俱有兼病。或內癱而兼外感者。或外症而兼內傷者。或實症夾虛。或虛症夾實。或外證日久而有感冒風寒。內停食滯。此外症虛內證實也。若久病體虛。驟發癱瘍紅腫。此乃外症實內症虛也。時令有寒燥。人體有強弱。年齒有老幼。或症同氣血時令不同。豈能一一考覈。以此類推。

外證醫案彙編

凡例

一方之中。自有一方之理法在焉。如作文以見症為題。單題截題。搭題。虛小題。大典題。全章題。半節題。一字兩字。三章。四章等題。醫臨症時。必有兼病。能心領神會。看清題情。如作文平淡奇濃。心隨意轉。無不中窾。所以臨症方案。如時藝不廢之書也。為醫者。豈可不閱哉。

一先哲存方案。與後讀人者本難。要讀書識症。立法定方。四事俱備。再合人事。天時。虛實。通融更改。遂能有至妥至當之方。後人請方案者。當知所立之方。宗何書。兼何症。用何法。辨其藥之性。細咀其味。自然醞疝立辨。融會貫通。用之不盡。自為古人知己。若妄批誤刪。徐河溪先生批葉氏案。尚不能知香巖先生底蘊。

何況識淺者。不須言矣。

一吾友曰。所編方案。不知後人信否。不知當時效否。余曰。萬事皆不出乎理。知醫理者。自然能辨。自然能信。不知醫理者。不但不能辨別。信亦徒然。況青浦陳學三先生之案。筆性簡明敏捷。他人亦學不到此。有居處地名者。皆陳氏方案也。葉天士先生之方案。有臨證指南可攷。薛謬二公亦有三家醫案可證。每方之下。故不註出何人手筆。讀者查對。明眼是能辨別也。

一聽本不知醫。豈敢妄編。此案因人以為外科易。每以成方而治。兼病余思陰陽虛實。總歸內科一理。若肺腎陰虛者。溫熱豈可妄用。脾胃陽弱者。寒涼豈得誤投。所以編集此案。而化初學拘。

外證醫案彙編

凡例

執之弊。開靈活敏捷之機。與瘍症中。未嘗無小補爾。

辛卯仲冬上浣荆溪余景和聽鴻氏識

瘍科論

徐大椿

瘍科之法全在外治。其手法必有傳授。凡辨形察色。以知吉凶。及先後施治。皆有成法。必讀書臨症。二者皆到。然後無誤。其升降。點去腐。生肌。呼膿。止血。膏塗。洗熨。等方。皆必純正和平。屢試屢驗者。乃能應手而愈。至於內服之方。護心。托毒。化膿。長肉。亦有真傳。非尋常經方所能奏效也。惟煎方。則必視其人之強弱。陰陽。而為加減。此則必通於內科之理。全在學問根柢。然又與內科不同。蓋煎方之道相同。而其藥。則有某毒主某藥。某症主某方。非此不效。亦另有傳授焉。故外科總以傳授為主。徒恃學問宏博無益也。有傳授。則較之內科。為猶易。惟外科。而兼內科之症。或其人本有宿疾。或患外症之時。復感他氣。或因外症重極。內傷臟腑。則不得。兼內科之法治之。此必平日講於內科之道。而通其理。然後能兩全。而無失。若不能治其內症。則和外症。亦不可救。此則全在學問深博矣。若為外科者。不能兼。則當另請名理內科。為之定方。而為外科者。參議於其間。使其藥與外症無害。而後斟酌施治。則庶幾兩有所益。若其所現內症。本因外症而生。如痛極而昏暈。膿欲成。而生寒熱。毒內陷而生脹滿。此則內症皆由外症而生。只治其外症。而內症已愈。此又不必商之內科也。但其道甚微。其方甚衆。亦非淺學所能知也。故外科之道。淺言之。惟記煎方數首。合膏藥。即樂幾料。已可以自名一家。若深言之。則經脈。臟腑。氣血。骨髓之理。

外證醫案彙編

瘍科論

外證醫案彙編

瘍科論

及奇病怪疾。千態萬狀。無不盡。其方亦無。病不。其珍奇。難得之藥。亦無所不備。雖遇極奇極險之症。亦了然無疑。此則較之內科。為更難。故外科之等級。高下懸殊。而人之能識其高下者。亦不易也。

外證醫案彙編目錄

卷一

首部

腦疽

方十八首 論一首

天疽

方三首

銳毒

論一首

骨槽風

方十八首 論一首 案二則

禿髮瘡

方六首 論一首

項部

猛疽

方一首 論一首

外證醫案彙編

目錄

夾喉癰

方三首 論一首

風痰

方八首 論一首

赤腮

方二首 論一首

燕窩瘡

方一首 論一首

失榮證

方五首 論一首

馬刀癰

方三首

瘰癧

方三十首 論四首 案三則

時毒

方十二首 論一首 案二則

面部

目瘍

方二十一首 論一首

耳瘍

方三十八首 論一首

鼻瘍

方二十首 論一首

卷二

口部

唇瘍

方九首 論二首

齒瘍

方三十九首 論一首 案一則

舌瘍

方三十三首 論二首 案二則

咽喉

方八十一首 論四首

爛喉痧

方六首

疫癘喉痧

方三首 咽喉總論一首 案九則

外證醫案彙編

目錄

卷三

外部

流痰

方四十九首 論一首

背部

發背疽

方十三首

蜂窩發

方四首

蓮子發

方一首

對心發

方一首

搭手

方三首

腎俞發

方一首

下背疽	方一首	
丹毒發	方二首	
肩井發	方一首	論一首 案九則
肩臂部		
肩疽	方一首	
樂疽	方一首	
魚肚發	方一首	
石榴疽	方一首	案一則
乳膏腋部		
乳癰	方二十六首	
外證醫案彙編		目錄
乳巖	方十四首	論一首 案二則
脅癰	方八首	
腋癰	方二首	
肋癰	方二首	論一首 案一則
腹部		
小腹癰	方三首	論一首
腹皮癰	方二首	
臍癰	方一首	
臍漏	方一首	
臍中出水	方一首	

前後陰部		
溺管痛	方六首	
子癰	方一首	
囊癰	方四首	論一首
肛漏	方七首	論一首
痔瘡	方十四首	論一首 案一則
股腿脛足部		
環跳	脊梁尻骨附	方八首 論一首
足膝	方五首	
足指	方二首	
外證醫案彙編		目錄
腳氣	方四首	論一首 案一則
卷四		
內部		
內癰	方九首	論一首 案二則
肺癰	方四十首	論一首
肺痿	方八首	論一首 案六則
胃癰	方七首	論一首 案四則
肝癰	方四首	論一首 案二則
大小腸癰	方四十一首	論二首 案八則
腎俞癰	方八首	論一首 案二則

疔 方四首 論二首 案一則

發無定部

疔 方一首

瘡 方二十九首

膿 方一首 論一首

熱毒 方一首

風疹塊 方二首

紅瘰 方三首

白癩風 方一首 論一首

產後癰瘍 方三首

外證醫案彙編

潰瘍 方十三首 論一首

目錄

五

外證醫案彙編卷一

上海圖書

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯
會稽孫思恭順齋甫校刊

首部

腦疽

常熟俞 腦疽督脈所主現象堅硬而不紅活恐流毒於下延至

棘手姑宜溫理托毒以參消息

鹿角霜 紫雲角 川芎 土貝 地丁草

生黃耆 銀花 甘草節

太倉朱 腦疽根堅平塌藥餌化毒兼提

外證醫案彙編

卷一 首部 腦疽門

生首烏 紫草茸 羌活 澤瀉 生黃耆

白茹蒂 鮮笋尖 川芎 陳皮

瀏河施 平素恹鬱陰分久虛腦疽陡發脈細不揚症屬陽陰

微加以年高胃弱若欲消散須延匝月

製附子 嫩黃耆 生首烏 甘草

又殭蚕 石決明 鮮笋尖

覆方 根盤雖縮膿腐未除四圍紅暈仍恐毒邪復陷未許克心

地也

生黃耆 當參 枸杞子 陳皮 甘草 銀花

炙黃耆 於朮 阜角鉞 荷梗

再覆方 毒去新生納穀稍健生機有慶矣

人參 補氣 金石斛 養胃 銀花 解毒 水炙黃耆 補氣 雲苓 補脾

製首烏 補血 枸杞子 補腎 甘草 補氣

苗墩趙 腦疽五六日高腫膿洩甚屬佳兆肥人多濕濕多痰感

而氣虛故膿色白滯不榮皆劫氣衰最防毒陷姑擬投托其

膿稠納增便為鬆候

半夏 燥濕 甘草 節毒 遠志 炭 補氣 生黃耆 提托 蠶 毒 提托

生首烏 補血 川貝母 潤燥 阜角 鐵 提托 雲苓 補脾 笋尖 提托

周莊錢 腦疽平塌色暗高年氣血兩虧以致不能衝突高腫膿

毒深厚難以化腐成膿姑擬托化以冀轉敗為功

外證醫案彙編 卷一 首部 腦疽門 一

生黃耆 提托 生首烏 補血 遠志 炭 補氣 甘草 補氣 紅花 破瘀

川貝母 潤燥 白蔻殼 潤燥 阜角 鐵 提托 桔梗 提托 笋尖 提托

覆方 大勢已鬆瘡頭起發腐脫脈大有力大有轉機仍以提托

治之

製首烏 補血 遠志 補氣 甘草 補氣 黨參 補氣 阜角 鐵 提托

生黃耆 提托 茯苓 補脾 砂仁 理胃

再覆方 寢食得安脈象和暢新肌溢然其瘡可待矣

用藥穩切 瀉科明筆

水炙黃耆 補氣 製首烏 補血 茯苓 補脾 殺芽 潤胃 健脾

水炙甘草 中川石斛 養胃 黨參 補氣 建蓮 補心 養脾

青浦孫 腦疽寒熱胸悶 痰核痛 痛引腮項紅活高腫症屬順

候與寬胸化毒治之

半夏 燥濕 陳皮 理氣 藿梗 開胃 厚樸 理氣 銀花 解毒

盧墟李 腦疽偏發是勝肺濕熱上蒸 痰核以太陽所喜故腫作

痛皮色紅活可期易清易斂擬與清解之劑

羌活 祛風 陳皮 理氣 土貝 消痰 遠志 炭 補氣 生甘草 補氣

防風 祛風 桔梗 提托 白蔻殼 潤燥 荷梗 提托 笋尖 提托

接服方 老年重症天氣酷暑客旅起居不便歸家調攝自易向

知姑擬接服方

外證醫案彙編 卷一 首部 腦疽門 三

生黃耆 提托 土貝 消痰 阜角 鐵 提托 白蔻殼 潤燥 六一散

忍冬花 解毒 厚樸 理氣 半夏 燥濕 蠶 毒 提托 扁豆 葉 健脾

太倉陳 腦疽愈後頸項忽起紅暈兼發水泡此係毒未盡洩法

擬清涼解毒治之

烏犀尖 清熱 西洋參 補氣 生甘草 補氣 遠志 炭 補氣 牡丹皮 清熱

天花粉 清熱 川石斛 養胃 鮮銀花 解毒 鮮荷梗 提托 二方清正

某 頭項疼痛腐爛高突四圍皆發細瘰係積熱上乘太陽濕熱

陽明濕痰互結化火姑擬清化上焦積熱 方缺

某 頭顛熱癩未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理氣血可

連翹 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
犀角 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
銀花 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
丹皮 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
元參 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
甘草 以上二藥俱首項之症皆濕熱風上飛
對口

光福金 濕熱上壅發為對口幸其紅腫高突督脈所司猶為易

治藥劑調和責惟余任起居調養總要自司邪毒不致下陷

羌活 陳皮 僵蚕 石決 銀花 防風

遠志 笋尖 甘草節

黎里毛 偏對口較於正者猶重是足太陽膀胱所主毒易下注

最難起發所喜紅活高腫可免內陷之憂然調攝起居尤宜自

慎

外證醫案彙編 卷一 首部 腦疽 對口 四

生黃著 阜角鍼 甘草 羌活 遠志炭

桔梗 僵蚕 防風

唐栖江 正對口雖較偏易治但平塌不高根盤散漫經所謂督

脈經虛從項發正此謂也姑擬托化

人參 毛鹿角 生黃著 金銀花 角鍼

川芎 甘草節 鮮笋尖

外症腦疽即是對口對口者腦疽之俗名外科金鑑集於項部
腦部通將對口另歸一門歸項部矣余思腦後發腦疽一
對口皆生於腦後髮際之間上下不通分寸之徑症名雖異所
過足太陽督脈經絡皆同有何別焉頭為諸陽之首非火不能
煖煉成膿骨多皮薄無肉化膿若化火太過與腦門最近極甚
腦氣不得流通腦為腎水之精華最怕熱燥化熱甚則髓熱腦
燥神志憤亂神去則死此症外科中大險症也余故將此方案

編於首部之旨謂者遇此症當
慎重焉非外仲冬余聽鴻謹識

腦疽對口發於正者反易治何也因督脈起下貫脊行於上故

毒氣得之反能衝突高腫使邪毒不致下流低陷乃為外發故

多易治督脈主一身之陽陽主通故易化易潰生於偏每謂難

治何也因膀胱之脈起於額上貫顛頂兩傍順流由項後而下

與瘡毒交合下流故瘡多平塌易陷因太陽膀胱主司寒水其

質多冷多沉寒主凝塞故瘡難起難發難化難潰余聽鴻註

○天疽銳毒

青浦吳 天疽生於左耳後是七情所發最忌毒不外達多成內

陷急投內托以冀紅活高腫為順

外證醫案彙編 卷一 首部 天疽 銳毒 五

製附子 陳皮 阜角鍼 姜半夏 甘草

遠志炭 僵蚕 白菴殼

長安周 右耳後銳毒形堅硬而頭伏是內發之症頗非輕淺倘

懷抱悒鬱雖有參苓亦奚以為

鹿角片 澄香 黃著 甘草節 遠志炭

炮薑炭 陳皮 紅花 半夏麩 角鍼

笋尖

覆方 疽頭得起內膿已化寒熱亦解大有鬆機所嫌根盤散漫

不收此元氣先虛未能載毒而出仍宜溫托助陽漸冀佳境

鹿角尖 枸杞子 川貝母 甘草節 陳皮

遠志皮 半夏麩 阜角鍼 笋尖

天疽生於左耳後一寸三分高骨處。天者天變之象。不得盡其

天年屬肝。銳毒生於右耳後一寸三分高骨處。銳者鋒利之器

也。屬肺。此二者頭多堅硬。未潰先黑。未膿先腐。臭穢易生。元氣

易敗。此者皆七情久鬱。膏粱厚味。壅熱而成。雖屬肝肺部位

在太陽寒水之經。其脈從頭下項。行身之背。終於足外踝。經脈

下注。最易內陷。在骨高皮薄。肉少空隙之間。而近腦髓。氣多血

少。無物成膿。毒不得洩。鬱火內燔。煎燥腦髓。故內經曰。天疽。癰

大赤黑。不急治。熱氣下入淵液。循少陽之脈。下胸脇。前傷任脈

內薰肝。肺薰肝。肺十餘日死矣。若瘍科臨症有決。急治得法。尚

外證醫案彙編 卷一 指部 天疽 銳毒 六

可十痊五六。倘狐疑不決。撓延時日。不救者多矣。余聽鴻註

○骨槽風 上海張 耳後顛項痛引項骨。是骨槽風也。飲食難進。寒熱時作。

但此症初則堅硬難潰。久則瘡口難合。宜先與灸法。繼以清陽

散火湯治之。

牛蒡子 防風 升麻 黃芩 連翹 荆芥

刺蒺藜 白芷 當歸 石膏 甘草節

江陰董 顛項堅腫。寒熱作痛。牙關拘急。此係風邪深入骨髓所

致。宜與疎解化痰為治。

煨葛根 前胡 青皮 杏仁 僵蚕

牛蒡子 桔梗 甘草 薄荷 茅根

蘆墟孟 骨槽風不斂。多骨顯露。證已經年。愈非旦夕。

刺蒺藜 川貝母 川石斛 鴉豆皮 夏枯草

生牡蠣 地骨皮 夫花粉 鮮蘆根

又丸方 沙蒺藜 黨參 川貝母 女貞子 旱蓮草

生牡蠣 白芍 申薑汁泛丸 申薑汁即骨碎補一名鮮毛

汁生牡蠣當水 兼清陽明治之 金澤姚 穿頭發破久積膿成骨。證屬肝胃二火所結。擬舒厥陰

外證醫案彙編 卷一 指部 骨槽風

北沙參 丹皮 黑山梔 花粉 甘草

旱蓮草 元參 川石斛 知母 申薑

嘉定吳 顛項抽掣痛引顛項。此骨槽風之始也。且擬祛風化痰。

令其內消為妙。

牛蒡子 防風 前胡 青皮 桔梗

荆芥 僵蚕 茅柴根

北圻孫 耳前顛項堅腫。痛徹筋骨。此手少陽足陽明風火所結。

始成骨槽風也。擬搜風清火法。

方缺

唯亭王 顛項時作抽掣。脈數而強。此屬肝風上擾。宜滋水柔肝。

佐以祛風為治

洋青鉛 熟地炭 鈎藤 懷牛膝

刺蒺藜 石決明 池菊

盛澤葉 骨槽風久腐孔深穢水不絕以致顛穿齒落是為瘍家
逆款勉以刀圭亦不過稍盡人事耳

川石斛 白芍 川貝 花粉 丹皮 知母

茜草根 料豆 銀花

青浦毛 左頰漫腫堅硬幾經兩月漸知隱痛此酒濕與肝膽之
火互相搏結而成骨槽風之所由發也治以清肝化痰法

青黛 川貝母 蘇子 天竺黃 甘草節

外證醫案彙編 卷一 骨槽風 八

桔梗 遠志炭 殭蚕 枳椇子

瀏河汪 顛頤木腫隱痛以致牙關不利此肝胃之火上循牙齦
為瘍是為骨槽風也

北沙參 川貝 川石斛 生牡蠣 蘆根

枇杷葉 桔梗 骨碎補

覆方 藥合病機仍從前法

北沙參 川石斛 骨碎補 生牡蠣 料豆

苦桔梗 枇杷葉 旱蓮草 蘆根

丹徒邱 骨槽風延久流膿不絕豈清涼散火所能療治老膿成
骨宜補托並施

黨參 茯苓 甘草 知母 元參

川貝 桔梗 瓜蒌仁

常熱蕭 骨瘤疽經年由五志鬱結而成春夏之交每每出血恬
淡其心自可延年如計收功必須仙手

北沙參 黨參 茯神 川貝 桔梗

海浮石 遠志 牡蠣 紫菜 此症部位相同故集與骨槽風內

嘉禾楊 骨槽風腫破日久不能盡消內已醱膿宜用中和湯托
之

黨參 白芷 藿香 白朮 麥冬 甘草

黃耆 桔梗 桂心 白芍 川芎 當歸

外證醫案彙編 卷一 骨槽風 九

南翔陳 骨槽風過投寒涼以致肌肉堅硬腫脹皮膚不仁古人
云非理中湯佐附子不能回陽非殭蚕不能搜風即此謂也如
法治之或可中的

人參 甘草 製附子 於朮 乾薑

川貝 殭蚕 蒺藜 艾葉

田涇戈 頰車穴堅硬不疼此係少陰不足陽明有餘久延難治
骨槽風之端也

沙蒺藜 天竺黃 川石斛 桑椹子

旱蓮草 女貞子 杜蘇子 絲瓜絡

某孩 週歲未得穀味精華溫邪吸入上焦先受頭面頤頰浮腫

邪與氣血混處。刀鍼破傷經絡。溫邪內閉。熱壅蔓延。三焦昏寐。痰潮舌刺。卷縮。小波點滴。渾濁。熱氣痼結在裏。但膏連。梳。芥。藥。性直降。竟由胃達腸。而熱氣如煙如霧。原非形質。可蕩可掃。故。牛黃產自牛腹。原從氣血而成。混處氣血之邪。藉此破其蘊結。是得效之因由也。夫溫熱時厲。上行氣分。而漸及血分。非如傷寒足六經順傳。經絡者。大抵熱氣鴟張。必薰塞經絡。內竅。故昏。躁。皆裏竅之欲閉。欲宣內閉。須得芳香。氣血久鬱。必致瘍毒內。攻。謹陳大意。聊奉末議。先用。

紫雪丹三分。微溫開水調服。此一藥本風溫時毒症。因骨槽風。有六淫外發。七情虛體。內發部位。相近。此條下並參。

外證醫案彙編 卷一 首部 骨槽風

夫骨槽風一症。有表有裏。有虛有實。外感六淫。內傷七情。膏粱厚味。肝膽火鬱。俱能成之。初生之時。耳前及頰。筋。骨。隱隱。痠痛。牙關拘急。漫腫無頭。或紅腫焮熱。皆少陽風邪。深入陽明。熱痰壅塞。水虧木旺。肝膽火鬱而成。從表邪外發者。尤為易治。祛風化熱。消腫化痰。可愈。如七情體虛。內發者。始則堅硬難潰。潰則瘡口難合。多骨漏管。易生元氣易敗。臭穢膿水淋漓。治不得法。不救者多矣。細思其故。少陽少血多氣。脈絡空虛。為肝之外府。內經云。風氣通於肝。膽附於肝葉之內。於手少陽合為相火。其脈皆行過頰。頰之閉。由頰下項。易招風邪入內。內經云。中於頰。則下少陽是也。陽明常多氣多血。陽明者熱氣盛大。上下牙

跟屬手足陽明。膏粱厚味。積熱於中。壅塞血脈。不得流行。風火互結。脈熱肉敗。則膿成矣。二經之脈。從頭走足。經脈下注。從陽入陰。或寒涼太過。凝結難以起發。久則頭穿齒落。莫可挽回。內經曰。癰腫筋攣骨痛。此病安生。曰。此寒氣之腫。八風之變也。曰。油之奈何。曰。四時之病。以其勝治之愈也。此數語。治法皆在其中矣。況風之為物。遇隙即入。遇物則張。其感遇火助之。流金燄石。遇寒助之。裂地凌冰。所集案中。初起有清陽散火法。疎解化痰法。堅硬有隔薑艾炙法。舒厥陰清陽明法。祛風化痰內消法。搜風清火法。有虛陽上擾。滋水熄風法。久延流膿補托並施法。久延不消。和中托裏法。過服寒涼凝結。之回陽搜風法。內閉熱

外證醫案彙編 卷一 首部 骨槽風

雖治法皆宗金鑑。若不精於瘍科。臨證不眩。心如夜光之璧。筆如分水之犀。豈能心隨意到。余之不敢為瘍科者。知其難耳。余鴻註

一婦三十餘歲。氣血素虛。內夾痰飲。咳喘時發。始以肝氣入絡。流走肢體。或痛或愈。後有氣從左脅。上竄頰車。引及項側。左額角。抽掣極痛。按之焮熱微腫。始皆疑體虛。外風引及內風竄絡。骨槽風之見症也。初服清解祛風化痰。胸中痰飲氣逆。咳喘俱甚。若以二陳。桂朮。甘干。姜。五味子。等服之。喘咳可平。胸膈舒暢。而頰頭痛之更甚。纏綿日久。余曰。肝為風藏。膽為相火。少陽

之脈絡為水火升降之道路陰分虛則肝熱虛風上擾故升則痛降則止肝血少木失涵養木旺剋土脾失運化飲食積蓄為停痰積飲若顧此失彼非其治也當柔肝抑木養榮健脾治風先治血血行風自熄之意用人參當歸身白茯苓沙苑製首烏阿膠煨牡蠣棗仁白芍廣皮半夏茯神蠶蛻炙草烏梅之類服五十劑而愈余聽馮誌

吾同道某始起吐瀉服理中止後舌絳遍體氣竅攻痛惟背脊兩傍痛最甚抽掣項後作強正在太陽之脈服桂枝法亦無效後竄至脅舌絳口糜服祛風平肝養血通絡少效後竄入牙齦頰車項側極痛牙關拘掣不利躁而不煩精神倦怠症頗危險外證醫案彙編 卷一 骨槽風 十一

即服人參歸身芡肉白芍龜版熟地阿膠參冬川石斛女貞等滋陰之品漸漸痛止後與余曰醫無成法此等症醫書皆未經見若此症作骨槽風治之危矣余聽馮誌

○禿瘡 上海近 髮者血之餘血不上朝以致髮落此謂禿髮瘡宜服補益之劑方有裨益耳

熟地 靈參 麥冬 白芍 潼沙苑 女貞子 黃耆 玉竹 歸頭 檮豆 刺蒺藜 又膏方 細生地 全當歸 旱蓮草 錢躑躅花 用麻油 將前藥入油內熬至枯黑色去渣加黃蠟二錢溶化

收器內用指蘸擦之

又洗藥方 干脚泥 白頭翁 卓英 黃連 懸龍尾

胡荽子 錢青松毛 兩錢 用陰陽水煎數沸布蘸藥水搽之

脚花即開陽花干脚泥即脚底泥懸龍尾即標上塵 懸註

湖州章 頭皮搔癢津水淋漓破結膿痂此禿髮瘡也宜搜風涼血治之

川芎 桔梗 防風 山梔 天麻 荆芥

黃芩 池菊 連翹 甘草

木漬李 因剃髮而成瘡此係腠理不密外風襲入漸漸毛髮脫落血不朝宗理氣補散並進庶頭童者而為黎首矣

外證醫案彙編 卷一 禿瘡 十一

熱首烏 白芍 黨參 歸身 佩蘭葉

白蒺藜 黃芩 荆芥 甘草 鉤藤根

橫川施 不甚痛癢漸次髮落未老頭童豈僅血虧亦屬風燥宜養血祛風

羌活 兔絲子 歸身 乾桑椹 枸杞子

川芎 宣木瓜 熟地 明天麻 白芍

禿髮瘡一症皆謂胃經積熱生風或謂肝經鬱熱生風或謂血熱生風每以清熱祛風殺蟲之劑治之實係皆屬肝腎不足三陽經督脈陽氣皆虛何也腎者精之處其華在髮女子七歲腎氣盛四七筋骨堅髮長極六七三陽脈衰髮始白丈夫八歲腎

氣實髮長。五八腎氣衰髮墮。六八陽氣竭於上鬢髮頰白。足少陽脈起目銳眦上頰角足陽明脈起於鼻之交頰中循髮際至額顙足太陽脈上額交巔其支從巔入絡腦還出別下項足厥陰肝脈與督脈會於巔督脈起少腹下過陰器反從脊上衝巔項內經曰腎氣盛則髮長腎氣衰則髮墮陽氣竭則髮白故禿瘡髮落治在腎與三陽也陽氣虛不能衛外腠理不密外風乘襲此為表症涼血祛風一法也血不上朝氣血不得流通物朽亦可生蟲大補肝腎外以鯉蠟花油加潤燥涼血殺蟲內外兼治一法也血虛風襲補散並施亦一法也未老頭童養血祛風一法也四方之中填補肝腎俱夾升陽散風之品養血分而兼

外證醫案彙編 卷一 首郡 禿瘡 古
通陽若不致穀內經列方豈能如此名人手澤傳後無慙余聽鴻註

項部
○ 猛疽

濮院徐 含下猛疽由外感風熱內傷酒濕勢必釀膿但此半月其鋒正銳苟得小膿便爾易治

枳椇子 杏仁 川貝 桔梗 牛蒡子
煨葛根 青皮 甘草 蟾蜍 茅根

猛疽俗名結喉毒生於項前結喉之上呼吸之要道皆屬憂鬱化熱或肝肺積熱膏梁炙燥壅熱而成其勢不拘大小先以散腫軟堅解肌化熱冀其速軟速潰膿洩可保若誤用寒涼或成膿不銷或腫硬太甚膿不得洩咽喉閉塞呼吸不通湯飲不入

外證醫案彙編 卷一 項部 猛疽 古
半日死內經曰發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞咽半日死其化為膿者寫則合冬膏冷食三日已內經取名猛疽者因其來勢太猛倘猛不可遏命立傾也豈可不慎歟輯存一方聊備治法余聽鴻註

○ 夾喉癰
青浦薛 捧喉毒漫腫無定根盤紅暈胸悶不渴似走散之意勉擬珠解毒以圖轉重為輕

柴胡 前胡 煨葛 甘草 防風 桔梗
燻蚕 枳殼 茅根
履方 珠解毒雖潰破胸悶依然此內陷之機也急宜寬胸以望

佳音。

蘇子 瓜菓子 桔梗 廣皮 天竺黃

杏仁 白菴殼 荷葉

再履診 腐雖未脫新肌已露四圍紅暈略減脈不數無寒熱口渴已見順兆一路調養得宜可望全愈。

黨參 川石斛 橘紅 陳小麥 黃耆

棗仁 杜穀芽 牡蠣

猛疽俗名結喉毒夾喉癰俗名捧喉毒又名鎖喉毒治法相仿其症大異何也猛疽在任脈之位任脈起中極之下從腹一直

上衝咽喉上頭入目其脈夾肝肺之積熱上升來勢猛烈恐其

外證醫案彙編

卷一 項部 喉癰

六

阻塞呼吸飲食之險較偏者易起易潰捧喉毒生於喉之兩傍

在手三陽足少陽陽明之位又兼足厥陰蹻脈過其間手太陽

脈從缺盆循頸上頰其病有頰腫頰腫手陽明脈過缺盆上頸

貫頰其病有頸腫手少陽脈出缺盆上項從耳後屈下頰其病

頰腫噎腫足陽明脈循喉嚨入缺盆其病有頸腫足厥陰脈循

喉嚨之後上入頰頰陰蹻脈由足上缺盆上出人迎之前頰傍

脈入頰與陽蹻而上氣并相還足少陽之脈下耳後循頸其加

頰車下頰合缺盆其病有頰腫夾喉癰足厥陰足陽明風熱毒

熱上攻而成因經過之脈太多氣血流散不聚每堅硬漫腫無

頭易於平塌若外感風熱在表者易治若膏梁厚味積熱於胃

或憂思鬱結厥陰肝血內虧少陽膽熱上升在裏者難治即與

失營馬刀瘰癧石疽等相似若誤服寒涼平塌內陷誤服補熱

毒火壅塞喉閉不通變成危症若寒涼凝結堅硬難消則難

合膿水淋漓延成瘡皆醫之過也今輯留一案始以柴胡疎

通少陽葛根疎通陽明加搜風解表一法也清後餘毒欲陷輕

劑化痰和胃一法也清後毒盡氣血並調清熱化痰和胃較堅

一法也存方雖三治法極密勿以方輕平淡忽之若不細考內

經臨症熟悉列此三方豈易哉余疎鴻註

○風痰

青浦孫 痰毒勢欲作膿胸頰口渴須防驚厥之變又值酷暑相

侵纖小之軀扶持不易姑宜末藥

真珠 牛黃 天竺黃 川貝 辰砂

為細末鈎藤湯下

德清龐 風痰毒

薑汁製天南星 竹瀝炒陳半夏

天竺黃 桔梗 防風 荊芥 白蒺藜

荷葉蒂

無錫吳 風痰發於少陽藥以和解

柴胡 鈎藤 防風 歸身 半夏 陳皮

杏仁 殭蚕 白芥子

劉女 年十六。天癸不至。頭項瘰癧。入夏寒熱。咳嗽。乃先天稟薄。生氣不來。夏令發洩。致病。陽氣不肯收藏。病屬勞怯。不治。戊己湯去白朮。

康氏 頭項結核。腹膨足腫。肝木犯中。痰氣凝滯。

牡蠣 二兩 澤瀉 一兩 夏枯草 三兩 半夏 二兩 厚樸 一兩

橘紅 一兩 神麴 二兩 茯苓 二兩 生香附 一兩 水磨汁 泛丸

氣鬱痰核。

夏枯草 生香附 丹皮 山梔 連翹

赤芍 鬱金 橘紅

王四 脈左數右長。頭項結癭。時切。

外證醫案彙編 卷一 項部 風痰毒 六

生地 丹皮 犀角 鮮夏枯草 鈎藤

山梔 炒 土貝 薄荷

因噴忿失血以來。致頭項左右筋腫。痛連背部。此鬱傷氣血。經

絡流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰膿。延綿之憂。治在太

陽少陽。

生香附 夏枯草 薄荷梗 鈎藤 丹皮

黑山梔 鮮橘葉 鬱金

頭項痰核。不外乎風邪入絡。憂鬱氣結。氣血夫於流通。凝痰於

絡。俱在陽明少陽部位。故輯存治表三方。治裏四方。質之高明

參酌。余聽鴻註

。疔腮

蘇州查 風痰交滯。結於兩頤。發為疔腮。腫痛幾及匝月。其勢必

潰。用加減牛蒡子桔梗湯。以得膿為效。

葛根 燻蟲 桔梗 赤芍 牛蒡子

前胡 甘草 橘皮 茅根

附 額上脹。鼻息不通。牙關頻車。開合不利。頤腫。此乃足陽明交

會之地。據述喉腫之後。始起。宜從陽明治。而開合不利。是挾風

使然。

葛根 犀角 生地 丹皮 杏仁

桔梗 連翹 山梔

外證醫案彙編 卷一 項部 疔腮 九

疔腮一名鬚發。一名含腮毒。在二陽明之界。手太陽亦過其間。

屬足陽明胃經積熱所致。或風熱所乘。與時毒風痰。皆屬風

症。同類異名也。若焮腫連耳下者。屬足少陽經。若連頤及耳

者。屬足少陰經。臨症諒人之氣血虛實。病之新久。宜散宜補。宜

涼宜熱。斟酌治之。立齋曰。此症而有不治者。多泥風熱。執用寒

涼之劑耳。採存二方。亦備一格。與項症中合而參之。余聽鴻註

。燕窩瘡

句容莫 燕窩瘡。色紅。熱痺微痛。搔破則黃水浸淫成片。由脾胃

濕熱而成。宜芩連平胃湯主之。

茅朮炭 黃芩 生甘草 橘皮 川黃連

薑汁炒真川厚樸

此即外科金鑑成方。色紅熱痒。岑連苦寒化濕熱。又苦以化燥殺蟲。合平胃樸朮苦以燥濕。橘皮健脾。甘草調中兼解毒。而和藥性。恐苦寒傷胃。脾健濕去。熱退癢止。濕盡流水收矣。以藥合之。不必加減。見是病。即用是方。可見其用成方之妙。能靜註

失榮證

元墓董 失榮已潰。愈爛愈堅。不時滲流血水。脈形皆現虛象。是謂敗症。但不可棄而不治。古人立和營散堅丸。最為洽妥。舍此別無他法矣。

人參 熟地 當歸 桔梗 升麻 茯苓

外證醫案彙編

卷一 項部 失榮 子

白芍 陳皮 昆布 紅花 白朮 川芎

川貝 海粉 甘草 香附

為末夏枯草膏泛丸

太倉陳 頸項痰核。推之不動。按之如石。失榮已成。

石決明 新會皮 滑石 甘草 連翹

川貝

江陰顧 症係失榮。由肝氣鬱積而成。消之不易。全憑耐養為功。

甜葶藶 瓜蒌 川貝 杜蘇子 澄香

橘葉

覆方 證似輕鬆。仍以散堅開鬱。

青橘葉 通草 萸仁霜 蘇子 川石斛

鈎藤 川貝 月石

又丸方

毛沉香 白芍 茯苓 甜葶藶 川貝

天竺黃 海浮石 杜橘紅 夏枯草湯泛丸

失榮一症。其名不可思議。大約與馬刀俠瘦類同。名異也。失榮皆屬少陽憂思鬱結者多。外感風邪者少。內損症也。失榮者。皆貴後賤。當富後窮。處先順後逆之境。失其尊榮。鬱結而成。故名失榮也。鄙見是否。明家教正。內經曰。嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。貴時尊榮。賤時屈辱。心懷暮暮。志結憂惺。病從

外證醫案彙編

卷一 項部 失榮 子

內生。血脈虛減。名曰脫榮。當富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所并。富而從欲。貧奪豐財。內結憂煎。外悲過物。然則心從想慕。神隨往計。營衛之道。閉以遲留。氣血不行。積并為病。內經雖概而言之。人處先順後逆之境。經曰。思則氣結。憂愁者。氣閉而不行。失榮等症成矣。方書所謂鬱則達之。如木鬱則達之也。達者。通暢流利之義。不獨木也。諸鬱皆欲達也。其起之始。不在藏府。不變形軀。正氣尚旺。氣鬱則理之。血鬱則行之。腫則散之。堅則消之。久則身體日減。氣虛無精。願正消堅。散腫。其病日深。外耗於衛。內奪於營。滋水淋漓。堅硬不化。溫通氣血。補托軟堅。此三者皆鬱則達之義也。不但失榮一症。凡鬱症治法。俱在其中矣。

若治不顧本。犯經禁病禁。氣血愈損。必為敗症。故輯五方質之。瘍科須究心焉。余聽鴻詩

○馬刀瘰

吳江徐 虛痰入筋絡。項側脹硬。形長如蛤。名曰馬刀。證由不足而發。除根非易。茲與煎劑。冀其漸漸消磨。

半夏

昆布

甘草

元參

川貝

夏枯草

左牡蠣

忍冬藤

白芥子

蘇州孟 咳嗽遺洩。頸項結核。證屬馬刀。最忌腐潰。診得脈寸關

微更尺脈如絲。其為陰虛可證。姑宜毓陰化痰治之。

生地

茯苓

麥冬

牡蠣

米仁

川貝

外證醫案彙編

卷一 項部

馬刀

主

北沙參 白芍

夏枯草

震澤倪 鼻淵已久。近加項下結腫如李。堅硬。此陰虛體質。又感

風熱所致。

牛蒡子

杏仁

荆芥

鈎藤

元參

桑葉

川貝

夏枯草

○瘰癧

太倉李氏 頸項結核。將成瘰癧。此症多因肝氣不和。須情懷寬暢。庶幾刀圭有益。

鱉甲

夏枯草

石斛

青黛

海浮石

川貝

天竺黃

料豆

荷梗

高郵繆 項頸結核。沿竅胸脇之間。羣累相連。沒此起彼。斂而復

潰。此乃腎陰虧。肝陽易動。致因脾土飲食漸少。宜調養性情。抑

肝扶土。慢期奏效。若專於消尅。必致虛怯矣。

黨參

川貝

牡蠣

穀芽

沙蒺藜

橘白

料豆

石斛

黃耆

嘉興譚 瘰癧破經久不斂。氣血虧弱可知。理應益補。但胸間又見

結腫。虛痰滋蔓。延久難圖。當益補化痰兼治。庶潰者斂。而腫者

消矣。

半夏

橘白

石斛

甘草

竹茹

參鬚

麥冬

黨參

枇杷

外證醫案彙編

卷一 項部

瘰癧

主

蠶野朱 燕窩瘰。且與丸方。

京山棧

橘核

連翹

薑汁製南星

天竺黃

海浮石

澄香

白礬

用竹瀝水泛丸。八角茶泡湯送下。

唯亭王 瘰癧串破久不愈。經止五月。潮熱脈數。此屬血海空虛。丹

溪謂瘰癧屬膽。有相火而且氣多血少。婦人見此尤忌。若月事

以時下。寒熱不作。方保無虞。若變潮熱。其症危矣。今擬滋養厥

陰。以冀熱退經至。為愈。

雞血炒丹參

羌蔚子

銀柴胡

白歸身

酒炒白芍藥

地骨皮

金石斛

天竺黃

川貝 紫菜

青浦周 瘰在耳後屬少陽所司。開鬱化痰為治。

羚羊角 元參 牡蠣 薄荷 海藻

夏枯草 蛤殼 川貝 連翹

常熱俞 先後天交虧以致表寒骨熱。頸項串瘰。防成虛勞。

地骨皮 海螺 鱉甲 米仁 石斛

天竺黃 海粉 茯苓 川貝 元參

北沙參

南京葉 血證時止時來。嗆咳忽緩忽甚。瘰瘍為能得愈。所謂用藥無效。一不治也。

外證醫案彙編

卷一 項部 瘰癧

北沙參 紫苑 石斛 茯苓 鮮藕

清阿膠 川貝 麥冬 牡蠣 芽鉞花

瓜蒞皮

張蔘陸 外體雖豐。內本不足。頸項結腫。近加膝脛痠楚。正合肥人多痰之論。痰盛而氣必虛。風邪易湊。搏於肺經。肝主筋。故令筋縮而腫。初如豆粒。後若梅李。連續不一。成為串瘰。藥難旦夕取效。擬清肝化痰。以消息之。

青橘葉 牡蠣 秦艽 羌蔚子 刺蒺藜

天竺黃 川貝 丹參

瘰有三。曰痰瘰。曰瘰瘰。曰筋瘰。筋瘰為肝木不舒。此名筋瘰。能

按服方 鈎藤 橘皮 八角茶 橘葉

川貝 桑椹子 秦艽 續斷

威澤吳 頸間痰瘰。久咳不已。怯症漸成。

地骨皮 川貝 牡蠣 元參 杜蘇子

北沙參 杏仁 紫菜

蘇州李氏素患痰瘰。有積有不積。總屬虛症。今見寒熱食減。經信

久睽。足三陰並虧。耐養方得延年。

生地 元參 地骨皮 夏枯草 嫩鈎藤

土貝 丹皮 石決明 芽柴根

婦人以血為主。足三陰者。太陰統血。厥陰藏血。少陰藏精。三陰

外證醫案彙編

卷一 項部 瘰癧

精血不足。血脈乾澀。經水不通。氣鬱不行。瘰癧成矣。臨鴻註

江甯彭 瘰癧有風熱痰三毒之異。與結核寒熱有殊。其症多生

於頸項胸腋之間。形名雖異。總不外志念鬱熱所致。遇怒脹甚

名曰氣瘰。宜息氣調理。今見增寒壯熱。咽項強痛。結腫不消。宜

散腫潰堅湯加減主之。

京山核 昆布 當歸 白芍 連翹

軟柴胡 海藻 甘草 黃芩 花粉

左牡蠣

此方用海藻甘草之反。古人立方每每有之。甘遂甘草取其反者。可攻蟠踞內之堅痰。甘草海藻取其反者。攻其凝外之堅痰。

外證醫案彙編 卷一

也如人參五靈取其相反正虛血凝三靈過人參其攻瘀之力

更速瘀去正安恐正氣不接故賴人參之力續之古人用藥如

用兵此激將法也激其怒烈性起萬軍堅壘之中搆其窟穴斬

旂梟帥立建奇功何懼堅硬不消也此東垣散腫潰堅古方化

德清袁耳下子母瘰癧串至缺盆推之動按之有根屬手足少

陽二經所發症在陰分又見潮熱咳嗽恐成勞怯

北沙參 茯苓 瓜蒞皮 元參 昆布

甜杏仁 穉豆 地骨皮 牡蠣 橘皮

常熟黃 項後兩傍結核日月已深屬太陰寒水所司外受風邪

與內濕凝結初忽不知後方知痛皮色泛紅有釀毒之兆理宜

外證醫案彙編 卷一 項部 瘰癧 三

溫托不可專事寒涼

法半夏 陳皮 香附 益智仁 川芎

製殭蚕 薑黃 甘草 夏枯草

瓜洲錢 脾虛失運肝膽氣滯濁痰注於肌肉成核成瘰消之不

易痰隨氣行氣順痰消宜通陽消濁法

旋覆花 茯苓 半夏 於朮 白芍

白芥子 海浮石 桂枝 歸身 甘草

無錫謝氏 瘰癧寒熱盜汗腕中瘕聚紅潮失信大便溏薄咳嗽食

減春深至冬未痊此乃鬱損成癆難治之症

香附 丹皮 歸身 白芍 牡蠣

川貝 茯苓 夏枯草 橘葉 竹茹

光福胡氏 頭項結核寒熱盜汗此乃憂鬱不解氣血皆虛倘若經

阻便難調治

當歸 白芍 甘草 橘皮 茯神 痰藜

鈎鈎 南棗 謝胡兩案與痰藜同病症相符未尚不可用

又丸方

生地 遠志 川貝 白芍 西洋參

蒺藜 川芎 茯苓 歸身

外用夏枯草 海浮石 南海藻 蛤殼 乾貝 石決明

液泛丸

外證醫案彙編 卷一 項部 瘰癧 三

嘉禾沈 瘰癧丸方

製首烏 元參 薄荷 黨參 生地

歸身 白芍 天麻 嫩防風 草節

川芎 肥阜 十錢炒黑十錢煎膏

煉蜜為丸 兩丸方以古酌今頗有意味謹誌

某 瘰癧之生膽汁不足也而木火因之上升失血欬嗽驚悸所

謂上傳及肺末傳寒中也滋則碍脾燥則碍肺兼顧方穩

人參 霞天曲 蓮肉 穀芽 淡菜

沙參 未仁 鮮藕

陳十瘰癧在出幼之年形脈生氣內奪冬月可延入夏難換由真

陰日燥。救陰無速功。故難治。

兩儀煎

朱三四瘰癧馬刀。都是肝膽為病。病久延及脾胃。腹滿便滯。舌黃微渴。非溫補可服。泄水火以疎之。和脾胃以調之。冀其脹勢稍減。

吳萸 川連 生於朮 川棟子 炒山查

厚樸 青皮 黑山梔 椒目

趙氏 瘰癧寒熱盜汗。腕中瘕聚。經期不來。大便驚澹。嗆咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附 丹皮 歸身 白芍 川貝

茯苓 牡蠣 夏枯草

外證醫案彙編 卷一 項部 瘰癧 天

胡氏 頭項結核。暮夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸 橘皮 白芍 炙草 茯神

鉤藤 南棗

沈氏 素有痰火氣逆。春令地中陽升。木火上引。顛頂腦熱。由清竅以泄越。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝膽。氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭而主治。

羚羊角 黑山梔 苦丁茶 青菊葉

飛滑石 夏枯草

又方 照方去滑石加荷葉生石膏

又 性情躁急。陽動太過。氣火上升。鬱於隧竅。由春深病加。失其條達之性。經言春氣病在頭也。考五行六氣。迅速變化。莫若風火。腦熱暗泄。而為鼻淵。隧道失和。結成瘰核。夫東垣升陽散火。丹溪總治諸鬱。咸取苦辛為法。然藥乃片時之效。欲得久安。以怡悅心志為要旨耳。

連翹心 土貝 海藻 昆布

黑山梔 川芎 香附 鬱金

屠三 秋痢半年未愈。瘰癧堅硬痛。瘍膿鬱久成熟。府經病淺。可冀其愈。

夏枯草 香附 茯苓 苡仁 川貝

外證醫案彙編 卷一 項部 瘰癧 天

陳 躁急善怒。氣火結癭。燥筋為痛。熱鬱化風。氣阻痺塞。則腹鳴。腕脹。木已起土當兼苟非開懷歡暢。不能向安。

土貝母 鬱金 海藻 白芥子 夏枯草

瓜蒌皮 山梔 昆布

瘰癧一症。其名雖多。不外乎外感六淫。風寒暑濕之邪。內傷七情。憂愁思慮之鬱。外感者氣血未虧。屬表屬經。陽症易治。內損者營衛已傷。屬裏屬腑。陰症難愈。丹溪曰。瘰癧皆起於少陽一經。余細考內經。惟少陽經有馬刀俠癭。曰其癭堅而不潰者。名曰馬刀俠癭。急治之。細思其故。恍然而悟。少陽者風火之府也。

而為相火。風氣通肝與少陽合。故風火先犯少陽也。如傷寒先犯太陽。寒水同氣相求易合。因少陽屬木。木最易鬱。木鬱不達。精血內消。水不涵木。相火易升。故瘰癧表裏虛實。皆始起於少陽一經耳。內經一言盡之矣。雖則起於少陽。如傷寒起於太陽。藏府六經皆可傳偏。不獨少陽一經也。故治瘰癧當分六經。有少陽之風熱氣鬱。太陽之寒濕凝結。陽明之濕痰壅熱。太陰之腹脹便澀。少陰之咳嗽內熱。厥陰之經阻腹痛。俱有兼症。外症皆由內發。治外當兼治內也。今輯三十餘方。治法雖未盡。亦可見其大概矣。方書曰。不犯經禁病禁。如傷寒太陽寒熱。誤投少陽柴胡。引邪入裏矣。太陰之下痢。誤投少陰阿膠黃連。即成敗症。

外證醫案彙編

卷一 項部 瘰癧

平

矣。藥一錯。悞豈堪設想。內經云。母虛盛。母虛損其不足。益其有餘。此二者醫殺之。即此意也。如病家調理。自犯經禁病禁。雖名醫良藥亦難愈。若有所誤。俱成敗症。豈可不慎歟。如外治薄貼。鍼砭。圓灸等法。各有師承。不在立方之內。不揣謏陋。聊作窮言。質之高明。余聽鴻註。

附案 琴川東鄉周姓農婦。早寡。嗣有田面四畝。出錢承種。完租者謂。刃面業主收。夫兄爭之不休。憂鬱而成脇。腕。項。側。兩。傍。起。核。堅硬。就診於余。曰。憂愁氣閉。不行。思則氣結。怒則肝火上犯。久則失榮。馬刀成後不治矣。幸經水極少未絕。猶可挽回。余勸其將田面讓於夫兄。勿因此多累也。紡織亦可度日。惜貧病相

連無資服藥。余勸伊無事行坐。默念南無阿彌陀佛。可解愁緒。而絕忿爭之念。使肝氣條達。虛火不升。而可苟延歲月。以鮮羊芍切片。晒乾二斤。川貝母二兩。薑半夏三兩。共為細末。用淡海藻二兩。昆布三兩。煎汁。泛丸。臨臥用雪羹湯。淡海三錢。大羊膏五枚。煎汁送下。三錢。再用歸脾湯原方。倍木香。加柴胡。白芍。三天服一劑。經三月餘。項塊消軟。脅痛止。信水依時。諸恙霍然。後送余紫花小布一疋。因其誠笑而受之。若不勸其讓產念佛。終日擾攘不休。未必不死於鬱症也。聽鴻記。

外證醫案彙編

卷一 項部 瘰癧

主

橫溼。有王姓婦。因其夫私有外遇。不顧家事。有兒女各一。男六歲。女三歲。夫妻反目。抄擾不休。氣鬱日久。左項堅硬。腕。脇。脇。痛。嘔吐腹痛。經阻三月。醫皆疑為妊。後就余診之。按脈堅硬而青。面色青黯無華。豈有妊娠之理。後其細述家事。氣血久鬱。防延變內熱咳嗽。不能治矣。問其夫偕來否。曰。在寺前買物。使之先來。停刻即至也。其夫來寓。余曰。症由鬱怒傷肝。非妊娠。乾血勞難治矣。察其夫面色。畧變傍徨之狀。尚有不忍之心。余曰。若能依我三事。尚可挽回。若不能依。延他醫治之。其夫問故。余曰。一要。三月不能出外。在家代其勞。二要。順其性。倘有加怒。不可違拗。三要。懇懇服侍湯藥。調理飲食寒暖。如能依此。一方可痊。其夫一一遵之。早服歸脾丸。三錢。晚服逍遙丸。三錢。再用歸芍六君湯。加二陳。香附。柴胡。一月服十劑。用海螵。紫菜等作羹食。調

理三月餘項間腫硬已消。月事以時下。夫妻反好如初。後借手
 余寓。擬一膏方。余見之欣喜。所以為醫者。固人骨。口。達功德。
 不可不積也。若七情鬱症。不順其性。十難愈一二。耳。余聽鴻誌。
 常熟。某。素性誠實。儉樸。完姻數載。起馬刀。失榮。從耳後項左側。
 脈硬如臂。潰破膿水淋漓。咳嗽吐血。便溏大肉皆削。諸謂不治。
 余曰。白髮在堂。極極在抱。若棄而不治。於心何安。然貧病相連。
 家窘不能服藥。孫真人謂一不治也。有其內姊丈某。解囊助藥。
 資。余壁診金。盡心調理。服甘溫調脾。便堅效甚。痰多即用甘涼。
 清潤。金土同調。咳減便仍溏。更番金土而治。如斯者。三月後。脾
 胃漸旺。大便稍堅。納增效減。後以歸脾法。加疎通氣血之品。再
 外證醫案彙編 卷一 項部 腫毒 五

以和榮散堅丸。兼服臥床。裁餘項腫潰爛亦斂。堅硬全消。起復
 如故。倘醫知難而退。親戚不肯解囊。亦不治之症。所以為醫當
 盡心。為親戚當盡力。絕症亦可勉力挽回。親戚中疾病相扶者
 余甚義之。臨鴻誌

○時毒

震澤崔 風溫熱將兩候。風陽上擾。以致面浮項腫。溫熱內熾。陽
 明熱結。而大便不通。熱蒸之氣上蒙清竅。神識不清。診脈左弦
 而數。右關洪大。舌苔糙黃。略帶灰色。此乃時毒大頭瘟也。議以
 疎風清熱。兼通陽明。以冀便通熱減。是為鬆機。

羚羊片 連翹 花粉 黃芩 枳殼

牛蒡子 薄荷 黑豆 象貝 知母
 黑山梔 蘆根 竹葉

覆方 熱勢已減。脈象數而稍緩。頭面紅腫未退。舌色乾紅。有
 時鼻衄。初起邪在氣分。熱久漸入營分。風乃天之陽氣。溫乃化
 熱之邪。兩陽薰灼。上焦先病。大便已通。神識亦清。再當清心營。
 清肺衛。自然漸安。

犀角 鮮生地 花粉 連翹 荊芥
 川貝 牛蒡子 馬勃 知母 蘆根
 桑葉 忍冬花露

荆溪張 風溫時毒。寒熱頭項腫痛。以其一瀉。證自鬆矣。
 外證醫案彙編 卷一 項部 時毒 五

煨葛根 柴胡 杏仁 馬勃 蟬蛻
 牛蒡子 前胡 桔梗 甘草 茅根
 上海金 胸項俱腫。寒熱無汗。此時毒也。宜祛風達邪為妥。

荆芥 牛蒡子 前胡 青皮 防風
 厚樸 貫衆 甘草

黎里徐 發成時毒。胸膈不利。咳嗽牽引則痛。痰熱交滯。肺肝受
 傷。法宜達邪行痰。佐以化痰托毒。

柴胡 枳殼 鉤藤 蘇梗 青皮 杏仁
 桃仁 桔梗 葛根 茅根

楓涇秦 風毒已有十餘日。毒尚不化。脈數無力。此正虛邪旺之

故宜散邪寓補

黨參 川石斛 僵蚕 生黃耆

桔梗 生甘草 角錢 青荷葉

唯亭朱 病因耳項浮腫是屬風邪寒熱胸滿神識不清是屬裏

熱擬清散之法以冀熱退神清

葛根 杏仁 防風 橘紅 牛蒡子

前胡 桔梗 蠶蚕

太倉龐 時毒法以疎散之

牛蒡子 荆芥 甘草 馬勃 杏仁

豆豉 防風 桔梗 蟬衣 貫衆

外證醫案彙編 卷一 項部 時毒 痘

西湖柳 茅根

張 溫邪自裏而發喉腫口渴舌心灰滯上焦熱蒙最怕竅閉昏

瘡苦寒直降攻其腸胃與溫邪上鬱無涉

連翹 黑梔皮 牛蒡子 杏仁 花粉

馬勃 瓜蒌皮 夏枯草 金汁 銀花露

史 頭形象天義不受濁今久痛有高突之狀似屬客邪蒙閉清

華氣血然常服桂附河車亦未見其害思身半以上屬陽而元

首更爲陽中之陽大凡陽氣先虛陰邪上入氣血瘀痺其痛流

連不息法當宣通清陽勿事表散以艾燭按法灸治是一理也

吾師曰項之上爲陽中之陽不可輕灸他要認病真切可灸則灸之聽鴻誌

熟半夏 北細辛 炮川烏 炙全蠍 薑汁

人 陽氣爲邪阻清空機竅不宣考周禮採毒藥以攻病藉蟲蟻

血中搜逐攻通邪結乃古法而醫人忽畧者今痛滋腦後心下

嘔逆厥陰見症久病延虛攻邪須兼養正

川芎 當歸 半夏 薑汁 炙全蠍

蜂房

史姓兩方因頭腫高突可知厥陰之脈與督脈會於顛恐見此

症作風溫誤投涼藥故特錄之以便臨症與時毒並參勿致溫

涼錯誤聽鴻誌

某 風熱毒閉項後腫

外證醫案彙編 卷一 項部 時毒 痘

竹葉 滑石 牛蒡子 蘆根 馬勃

薄荷 連翹 黑山梔 川貝 生甘草

經云上焦如霧而象天頭爲諸陽之首諸陽之脈皆聚於面風

與火爲陽邪上先受之元首爲陽中之陽與風火同氣相求易

合人在風中如魚在水中呼吸出入賴以養生賊風虛邪不能

避也時毒者四時不正厲疫之氣隨風而至肺合皮毛鼻爲肺

竅天氣通於肺地氣通於咽或皮毛受邪或吸之於鼻傳之於

肺或亢熱日久水中之毒蘊之於胃風氣通於肝少陽風木外

府與三焦合爲相火風毒鬱於上焦與諸陽之脈合而爲熱天

行時疫大頭瘟項腫時毒等症成矣腫中者清虛之處本不能

受邪而最易受邪者何也胞絡之中心肺居之心為君主肺為相傳心肺在上行一身之營衛風溫先犯肺衛熱阻上焦氣分所謂清陽之邪中上是也急宜輕清辛涼解上焦之邪若誤投溫燥熱邪相搏或大汗傷陰熱邪內陷傳入營分先犯心主宮城陷入手厥陰即神昏驚語瘧厥險症見矣疫邪屬毒隨人體質而化有夾熱夾寒夾濕夾風之殊又有上中下三焦之分傳經虛實之辨轉存一十二方熱在氣分者羚羊等微之傳營分者犀角地黄等涼之邪滯於膈未化熱者厚樸防風等開之滯者桃仁青皮等行之正虛邪旺參耆等托之熱邪蒙蔽金汁花露等洩之附厥陰頭腫二方非時毒症恐溫涼誤治也如陽

外證醫案彙編

卷一 項部 時毒

天

明之葛根少陽之柴胡桔梗之載樂上浮吞入各有妙用所以醫如上馬之將操舟之子無一定章程全在臨時變通也余註附案 常熟塔後孫姓嫗年六十餘歲始因寒熱子媳不暇問及至六七日頭腫如斗色紅滿面水泡大者如栗小者如豆兩目合縫舌黑神昏撮空囁語瘧厥皆欲承氣等下之余曰熱邪溫毒先犯上焦熱薰膈中如煙如霧無質之邪蒙蔽胞絡苦寒直達攻其腸胃不能及上焦膈中之病反使高年氣弱乘虛下陷何如先將細磁拷碎擇鋒利者夾在筋頭上紮好將面上之泡破盡用棉拭乾滋水將芙蓉葉青黛大青葉人中黃研末鮮菊葉搗汁調敷乾則以菊葉汁潤之先研至寶丹一粒井花水

調服再以犀角羚羊赤芍連翹中黃梔皮竹葉石膏紫草忍冬花露等輕清之劑服之一周時腫勢全消熱去神清再服白虎加入參湯竹葉石膏湯數劑而愈余詳鴻誌時毒風痰下腮蝦蟆脹大頭瘟等症大江之南春夏間最多治亦不知凡幾能致命未見惟癸巳冬見一異症是冬無雨雪亢旱而熱某宦上口唇忽起一瘰其醫以謂是疔用刀挑破折以藥條外痂結好後忽面腫漫延至頭皆腫羣醫集至有云大頭瘟有曰遊風毒有曰疔走黃有曰面遊風各執一見病家疑慮不決方亦不敢亂服換延數日胃氣日憊煙穀不進後又一醫曰此疔毒竄於絡中非大寒退熱不可犀角羚羊金汁玳瑁等

外證醫案彙編

卷一 項部 時毒

天

品另服梅花點舌丹四九有友與余言及此症余素不諳外症曰無論大頭瘟疔毒時毒溫毒則一也以輕重之間分之耳然人元氣有虛實體質有寒熱青梁之體必虛嗜煙之體必寒梅花點舌丹香竅必耗散真元寒藥過度必損胃陽熱雖退正氣必不支矣服藥後頭腫漸退元氣日敗毒陷不起兩目出膿耳鼻皆流血水口吐血痰而斃余思此症不知如何治法留質高明倘遇此症立定章程不致病者太慘耳是冬瘟症盛行種過牛痘者皆出天花服寒涼藥債事者多吾同鄉方孝廉令郎二人一十九歲一十八歲余俱以溫補養元托漿和脾胃上榮結痂皆順雖痘症要先去毒余思年長衰老出痘非虛不能受此

痘邪又兼深冬陽氣潛藏天寒秘蟄非溫補內托不可若在春
夏陽氣浮越小兒體質強壯有實熱寒涼亦必需也見病治病
隨症立方是為真的專信陳詔拘執寒涼偏於溫補非為上工
痘毒亦然余聽鴻誌

面部

○目瘍

崑山鮑 眼胞痰核堅硬不痛遷延已久皮色不變推之移動在
皮裏內外由濕熱痰氣鬱結而成擬二陳化堅法令其消散。

半夏 橘皮 甘草 石決明

殭蚕 茯苓 黃連 車前葉

菱湖曹 眼胞紅腫形如椒粒名謂椒瘡係脾胃濕熱所致姑擬
清脾涼血法。

防風 赤芍 白鮮皮 橘皮 厚樸

荆芥 元參 蟬退 連翹 甘草

金壇賈 目大眦睛明穴作痛微腫病出厥陰風火發在太陽經
穴瘡勢雖小根源甚深潰破多致成漏議疎風清肝務令消散。

黑山梔 歸尾 荆芥 薄荷 連翹

忍冬花 甘草 夏枯花

嘉善柳 睛明穴淚液過多以致目乾細濇時作抽痛羞喜外皮
未破姑與丸藥理之除根不許。

沙蒺藜 北沙參 稽豆皮 潞黨參

雲茯苓 女貞子 象牙屑 荷葉蒂

九製首烏

盧墟崔 脾胃濁痰肝經氣鬱結於兩眼胞成為結瘻形如豆粒。

九製首烏

不痛不癢。似手小恙。然久積不治。損目之端也。

川貝 天竺黃 苦桔梗 石決明 杜蘇子

桑葉 夏枯草 法半夏 新會皮 海蛤粉

桐鄉鄧 漏睛瘡。膿從大眇內出者。例難收口。

黨參 歸身 茯苓 炙草 熟地 白芍

於朮 麥冬 丹皮 地骨皮 桑椹子

毒豎莫 眼胞困毒。堅凝不痛。纏綿經年不愈。漸脹垂下。以致目

不能視。屬脾濕鬱熱而成。宜涼膈清脾飲主之。

生地 荆芥 連翹 黃芩 煨石膏 生梔

防風 薄荷 赤芍 甘草 燈心

外證醫案彙編 卷一 面部 目瘍 早

附清涼丸方洗 石菖蒲 歸尾 羌活

杏仁 地膚子 赤芍 膽礬 川連

共為細末。以薄絹包之。如櫻桃大。米泔水浸泡。乘熱蘸洗擦之。

勿見塵土為妙。

黎里陳 眉稜骨高腫。堅硬如石。名曰石疽。有失血之慮。宜聽其

自潰。可轉逆為順。

黨參 川貝 丹參 牡蠣 茜草

白芍 黃耆

附圍藥方 三稜 白芨 廣木香 鬱金

南星 蓬朮 青木香 土貝 半夏

覆方 眉稜較前愈。覺高腫。仍然硬而不軟。即使得膿。難免損

之虞。 黨參 川貝 阿膠 黃耆 參山膝

白芍 桑仁 茯神 膽星 天竺黃

嘉善范氏 右脈弦數而滑。衝任不足。痰液凝滯空隙之地。潰則

致成漏。時值酷暑。且與丸藥理之。

桑葉 川貝 丹參 香附 阿膠

牡蠣 茯神 丹皮

同里袁 睛明成漏。旋發旋平。以屬痘後餘毒。最難絕源流。

西洋參 地骨皮 甘草 陳皮 夏枯花

外證醫案彙編 卷一 面部 目瘍 早

川貝 桔梗 銀花

某 風濕上鬱。目赤。脈左弦。當用辛涼散之。

桑葉 夏枯草 連翹 草決明 赤芍

某 夫血後。復受燥熱。左目赤痛。當以辛涼清之。

鮮荷葉 冬桑葉 生甘草 赤苓皮

萊豆皮 穉豆皮

鮑 秋風化燥。上焦受邪。目珠赤痛。

連翹 薄荷 黃芩 山梔 夏枯草

青荷葉 苦丁茶 桑皮

顧 頭額悶脹。目赤。

羚羊角 夏枯草 草決明 山梔皮

連翹 生香附

潘 頭面風腫。目起星。是氣中熱。

羚羊角 夏枯草 薄荷梗 穀精草 丹皮

小生地 望月砂 連翹 山梔

某 肝火上鬱。目眶紅腫。

連翹 赤芍 鮮菊葉 黑梔皮 苦丁茶

夏枯草

某 目胞浮腫。不飢不運。

桑皮 茯苓皮 大腹皮 廣皮 薑皮

外證醫案彙編 卷一 面部 目癆

苧仁 通草

常熱陳 嗜煙太多。本屬陽虛。嗚呼。虛通。腎不寐。陰陽倒置。而目暈紅。色淡。晝昏夜明。視物有歧。內經云。目者。心之使。神之舍也。營衛魂魄之所常營也。故神勞則魂魄散。志意亂。故陰陽不得合而精明也。治宜益氣升陽。參固神志。安遠調理。可不致氣脫夫明之患。

黨參 黃耆 柴胡 歸身 炙甘草 遠志

桑仁 木香 茯神 蔓荊子 製首烏

問曰。聖人治病。本無專科。今人分科。反使各立門戶。大失內經本旨。師曰。列方本從內經。刀鍼手法。各有師承。故咽喉癆科。眼

科不得不分。答曰。內經靈素。先論九鍼。諸科之中。各有妙用。師曰。書者。規矩也。刀鍼手法。巧也。立方。可循規蹈矩。刀鍼手法。各有專歸。古時。倉公氏以診聖。仲景氏以方聖。華陀氏以鍼灸。雜法聖。即分專科之始也。大約治病立方。不出內科之範圍。譬如治傷寒。不循六經。鮮有不悞者也。目者。經曰。五藏六府之精氣。皆上注於目。為之精。精之窠為眼。骨之精為瞳子。瞳子屬腎。筋之精為黑眼。黑眼屬肝。血之精為絡。絡屬心。氣之精為白眼。白眼屬肺。肌肉之精為約束。約束屬脾。故瞳子黑。眼法於陰。白眼赤。脈法於陽也。屬上集。此數言。五藏六府陰陽虛實寒熱。標本皆在其中矣。若泥於五輪八廓。七十二問病。一百零八症。專於此。徒亂心耳。

外證醫案彙編 卷一 面部 目癆

余所輯十九方。眼胞痰核堅硬。以二陳化堅。椒瘡紅腫。以清脾涼血。厥陰風火。以疎風清肝。淚液過多。目乾抽痛。滋水養肝。熄風。肝脾結鬱。眼胞痰核。疎肝化痰。軟堅。漏睛瘡日久。填補肝腎。眼胞固毒。清脾涼膈。石疽堅硬。補托軟堅。痘後餘毒。清肝養陰。有風濕秋燥之辛涼。風熱氣分之清肺。肝火上鬱之涼肝。目胞浮腫。運脾利濕。晝昏夜明。益氣升陽。治法皆遵成書。臨症自有把握。治外兼乎治內。專科貴乎兼科。所謂循規蹈矩。使人巧也。不但質之癆科於內科。即專科亦有裨益。刀鍼手法。余少師承。不敢與聞耳。余臨瀉註

○耳癆

寶山鮑 肝氣挾濕。右耳脹痛。以疎風勝濕治之。

羚羊角 薄荷 鈎藤 連翹 滑石

刺蒺藜 荆芥 池菊 丹皮 竹葉

吳江管 虛陽上升。耳竅塞窒。時痛。是下虛上實。清竅不能流暢。用滋補下焦。使陰火潛伏。

製首烏 白芍 女貞子 靈磁石 料豆皮

沙羨藜 青黛 懷牛膝 石決明

覆方 加黨參 牡蠣 除石決明 青黛

周浦文 腎開竅於耳。心寄竅於耳。肝脈絡於耳。總賴腎水滋養。耳得之而為聰。但年已七十矣。失聰不得為病。所患者抽痛。未

外證醫案彙編

卷一 面部 耳痛

免肝風內擾。上干清竅。今擬滋水柔肝。以安心神。

北沙參 青黛 茯神 蒺藜 白芍

洋青鉛 遠志 磁石 石決明 熟首烏

乍浦盧 眩暈耳鳴。水不制火之候。以育陰和肝法。

黨參 茯苓 白芍 龍齒 料豆 棗仁

遠志 磁石

青浦蕭 稚年耳漏。防成聾疾。

生洋參 料豆 元參 石斛 粗藥珠

夏枯草 川貝 生甘草

揚州項 腎水虛怯。木鬱生風。兩耳模糊。時脹。先以清輕洩降。緩

商鉅陰。

煨葛根 橘紅 青黛 石決明 半夏

刺蒺藜 磁石 鮮荷葉

常熟李 腎陰虧損。肝陽上擾。右耳乾痛。失聰。宜肝腎並治。六味九加 黑山梔 新會皮 池菊

膽草 鈎藤

崑山馮 耳聾時脹。是腎陰不足。肝膽鬱熱上蒸。清少陽鬱熱。兼以養陰為主。

北沙參 懷牛膝 稽豆皮 花粉 沙苑

製首烏 左牡蠣 荷葉

外證醫案彙編

卷一 面部 耳痛

蘇州邵 腎開竅於耳。膽絡亦附於耳。凡元虛失聰。治在腎臟。邪

蒙閉竅。治在膽腑。乃一定之法也。今年逾六旬。脈形細數。屬腎

陰已虧。膽火肝風。又復上蒙清竅。致額痛耳聾。膿流不絕。成爲

聾耳。藥非苦寒能直降可效。治宜填補下元。滋水制木。徐圖見

愈。

製首烏 鈎藤 遠志 懷牛膝 磁石

稽豆皮 茯神 荷蒂 潼沙苑

周莊錢 暮年耳痔。形如牛乳。觸之則痛。徹巔腦。係肝胃之火。上

結而成。宜梔子清肝湯主之。

黑梔 白芍 丹皮 甘草 黃芩 歸身

川芎 柴胡 黃連 石膏

青浦槐 耳痔有年難期速愈。

青黛 白芍 蒺藜 磁石 山梔 槐豆

石決明 菖蒲 荷葉

覆方 耳痔努出耳外。脹痛破傷。猶恐失血。慎之。

生地 川斛 羚羊 遠志炭 丹皮

茜草 元參 川貝

平陽湯 耳後縫間皮色紅裂。時出黃水津津。名為旋耳瘡。此係

肝膽濕熱。擬輕清少陽。并滲脾土。

羚羊角 連翹 赤芍 青蒿 黃芩 池菊

外證醫案彙編 卷一 面部 耳癆 四六

丹皮 米仁 六一散 附穿粉散輕粉 隔紙炒

尖甲片 鉛粉 元黃丹 共研細末香油調搽

太倉吳 耳根腫痛。連及頸項。脈弦數。此肝膽之火。擬平降之法。

佐以舒鬱。

柴胡 梔子 連翹 歸身 小香附 青皮

黃芩 元參 白芍 川鬱金 撫芎

南瀝高 耳門赤腫。痛引牙床。屬上焦風熱。宜清胃辛涼散主之。

荆芥 薄荷 升麻 甘草 大力子 防風

池菊 白芷 桔梗 白蘆根

覆方 耳門痛勢稍緩。口乾脈細數。宗耳為腎之外候治之。

生地 元參 連翹 酒苓 麥冬 花粉

赤芍 黃連 欬炒枳殼

平湖王 耳內熱癢。出水屬肝膽風熱上壅。宜清輕涼散治之。

鮮薄荷 夏枯草 鈎藤 連翹 青菊葉

石決明 鮮荷葉 丹皮

陳墓張 耳鳴失聰。小便赤濁。此屬陰火妄動之候。宗內經腎氣

通於耳。

六味加知柏肉桂

石牌秦 耳垂後焮赤。腫痛。狀如伏鼠。寒熱間發。此手足少陽二

經風火搏結而成。名為耳根毒。擬仙方活命飲主之。

外證醫案彙編 卷一 面部 耳癆 四六

防風 赤芍 角針 甘草節 銀花 白芷

新會 花粉 炒甲片 連翹 土貝

覆方 耳根毒起發易潰。本為順證。今腐脫新生。理應補益。擬香

貝養榮湯主之。

黨參 熟地 白朮 茯苓 甘草節 歸身

白芍 川芎 新會 生香附 桔梗 川貝

紹興馮 脈弦。耳間腫連耳輪。痛生寒熱。名為耳發。已經五六日。

難以消散。姑擬托裏透膿法。

角針 甘草 青皮 黃芩 白芷 桔梗

當歸 銀花

復方 耳發腫痛已減寒熱得解病退之機此處氣多血少最難
腐潰今瘡頭孔眼不一形如蜂房膿亦易洩乃順證也當補益
清毒兼治之。

黃耆 歸身 茯苓 玉竹 廣皮 甘草

白芍 銀花 石斛 生地

嘉定沈 耳後毒失於托理誤投寒涼則毒不能外發耳遂攻耳

竅膿串耳內以致成漏宜煎丸並進可期全愈。

製首烏 女貞子 茯神 麥冬 北沙參

煨牡蠣 白芍 料豆 沙苑

再服十全大補丸

外證醫案彙編 卷一 面部 耳瘍

本城姜 風濕上鬱右耳時脹

薄荷 馬勃 桔梗 連翹 杏仁 通草

許聖開陸 風木之鬱耳脹欲閉

羚羊片 夏枯草 苦丁茶 連翹 薄荷梗

黑山梔皮 生香附

高郵畢 氣閉耳鳴

鮮薄荷 杏仁 廣皮 防己 苦丁茶

連翹 厚樸 木通

本城莊 暑熱上鬱耳時作脹咳嗽當清氣分之熱

白沙參 杏仁 連翹 竹葉 六一散

袁澤呂 頭痛耳鳴歷經三載脈來弦緊陰虧損肝陽上升兼之
夢泄理宜潛鎮

蒺藜 牡蠣 青鉛 鈎藤 首烏 稽豆皮

川斛 蓮鬚

某 濕溫長夏最多濕熱鬱蒸之氣由口鼻而入上焦先病漸佈

中下河間所謂三焦病也治與風寒食積迥異仲景云濕家不

可發汗汗之則痙濕本陰邪其中人也則傷陽汗則陽易泄越

而邪留不解濕蒸熱鬱發現為黃熏蒸氣隨之間正如暑熱之

比斯時病全在氣分連翹赤小豆湯可以奏效今經一月邪彌

三焦自耳前後左腫及右癰瘍大發夫癰者壅也 不惟氣滯血

外證醫案彙編 卷一 面部 耳瘍

亦阻塞蒸而為膿穀食不思陡然肉消殆盡胃氣索然矣商治

之法補則助壅清則垂脫前輩成法一無可遵因思濕熱穢濁

結於頭面清竅議輕可去實之法選芳香氣味使胃無所苦或

者壅過得宜少進漿粥便是進步經云從上病者治其上靈樞

云上焦如霧非輕揚芳香之氣何以開之

青菊葉 荷葉邊 金銀花 象貝母

萊豆皮 馬兜鈴 連翹 射干

煎好露一宿臨服加金汁一小杯

某 耳內流膿昔人為之醫瘡用六味丸加味治今用其法兼清

少陽

六味丸加 桑螵蛸 黃菊花 山梔

石決明 桑葉 黃柏 鹽水炒

猪骨髓 芡實粥為丸

某 舌白咳嗽耳脹口乾此燥熱上鬱肺氣不宣使然當用辛涼

宜薄滋味

鮮荷葉 連翹殼 大杏仁 白沙參

川貝母 豇豆皮

某 先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百日不愈此體質陰虧觸入

風溫未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起故入暮厥痛愈

劇當先清降再議育陰

外證醫案彙編 卷一 兩部 耳癆 辛

苦丁茶 鮮荷葉 金銀花 生菜豆皮

川貝母 益元散 鮮荷葉邊

某 風溫發熱左耳後腫痛

乾荷葉 苦丁茶 馬勃 連翹 杏仁

黑梔皮

某 左耳聾痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱宜用辛

涼輕藥

鮮荷葉 苦丁茶 黑山梔 飛滑石

連翹 淡竹葉

某 暑熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱

杏仁 連翹殼 淡竹葉 川貝 白沙參

六一散

安 頭痛耳聾目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上焦

連翹 羚羊角 薄荷梗 丹皮 牛蒡 桑葉

內經曰北方生寒在臟為腎在竅為耳南方赤色而通於心開

於耳手少陽三焦之脈而交出足少陽之後上繫耳後直上

出耳角其支從耳後入耳中足少陽膽之脈行手少陽之前交

手少陽之後其支從耳後入耳中走耳前所以耳為腎竅開竅

於心二少陽皆會於耳心為離火腎為坎水三焦為水火之道

路肝膽為風水之樞機二少陽合為相火人為一小天地火升

外證醫案彙編 卷一 兩部 耳癆 辛

水降如日月之東升西沒周流不息也火亢賴水滋酒水沈藉

火蒸動離中虛陽抱陰坎中滿陰抱陽也水火不得相雜者也

水火升降不調三焦水道路秘塞氣機阻滯雲霧不收龍雷

上騰於天少陽風從內煽遇火勢若燎原遇水勢如翻海故風

之性助物為威耳鳴耳聾耳根毒等各症見矣耳之疾虛

則治在心腎實則治於風火二言盡之矣今輯三十六方心腎

風火俱備雖曰外科皆出內科手筆若能心領神會舉一反三

臨症未尚無小補耶 余聽鴻註

○鼻癆

崇明程 手太陰蘊熱致生鼻癆理宜清肺

羚羊片 桔梗 桑白皮 甘草 黑山梔

石決明 黃芩 連翹殼 荆芥 白蒺藜

南潯宋 鼻嚏不利。按脈弦數。此肝陽擾肺。非小恙。最宜養性。

枇杷葉 桑葉 杏仁霜 通草 石決明

鈎藤尖 蘇子 桔梗 荷葉邊

覆方 鼻生旋螺。係屬肺熱。又增咳嗽氣逆。脈仍弦大。夏令伊過。

須防咯血。

羚羊 蘇子 杏仁 馬兜鈴 瓜蒞仁

青鉛 橘皮 蘆根 枇杷葉 鮮竹茹

青浦葉 鼻為肺之外候。風溫客腦。則額痛鼻淵。兼之痰火氣逆。

外證醫案彙編

卷一 面部 鼻病

姑擬養陰肅肺

北沙參 冬桑葉 辛夷 鈎藤 石決

白蒺藜 川石斛 料豆 枇杷葉

覆方 鼻流黃色。濁涕。有腥穢之氣。是腦熱未楚。仍從前法。但此

症久延。必致虛弱。當以奇授藿香丸煎服之。庶幾相須奏效。

羚羊片 桑葉 辛夷 半夏曲 北沙參

生石決 石斛 蒺藜 枇杷葉 青荷葉

附 奇授藿香丸

鮮藿香 八兩 研極細末。雄豬膽汁和丸。如桐子大。每服三錢。蒼

耳子湯送下。

盧墟俞 鼻管焮腫。兩傍色紫。膿汁浸淫。癢而不痛。此為鼻蠱瘡。係風熱客於肺絡。姑擬辛散治之。

羚羊角 連翹 黃芩 生牡蠣 夏枯草

青荷葉 池菊 滑石 甘草

北圻莊 鼻痔形如榴子。漸漸垂下。窒塞孔中。有碍氣息。此乃肺

經風熱鬱久而成。宜辛夷散肺飲主之。

辛夷 生地 知母 百合 煨石膏

黃芩 甘草 升麻 麥冬 枇杷葉

杭州金 右脈洪數。面鼻起癩。色紫腫痛。此屬肺經血熱。致發肺

風。但來已久。一時難得痊愈。且與辛涼清解。

外證醫案彙編

卷一 面部 鼻病

荆芥 防風 蟬蛻 白蒺藜 桑葉

桔梗 甘草 黃芩 牛蒡子 杏仁

覆方 面鼻皮色稍淡。紅腫依然。宗風淫於內。治以辛涼。

羚羊角 黃芩 生石決 連翹 枇杷葉

生山梔 甘草 白蒺藜 桔梗 天花粉

無錫揚 肺風。由手太陰血熱上壅。發於面鼻。延及頸項。色赤而

紫熱。盛入血且深。姑擬祛風涼血之法。

生首烏 秦艽 白蒺藜 花粉 桑葉

大料豆 甘草 細生地

覆方 肺風蔓延已定。色淡痛減。仿古人治風先治血。血行風自

熄之旨。

生地 桑葉 菊花 川芎 花粉 當歸

黃芩 赤芍 白茯苓

楓涇顧 肺風兼挾濕熱。治以涼滲。

製軍 白茯苓 連翹 玉竹 甘草

苦參 石決明 山梔 黃芩

周莊王 面鼻花刺。係肺熱上薰。治宜清肅肺熱。

冬桑葉 黃芩 白茯苓 桔梗 枇杷葉

地骨皮 山梔 石決明 連翹

覆方 粉刺播破。結成白屑。形如黍米。宜枇杷清肺飲主之。

外證醫案彙編

卷一 面部 鼻病

黨參 黃連 甘草 黃芩 枇杷葉

鮮鮮桑白皮

本城俞 咳嗽經時脈躁。此係肝火射肺。鼻翅腐碎。并防咯血。

代赭石 蘇子 地骨皮 桑白皮

瓜蒌霜 桔梗 枇杷葉

川沙陳 虛熱上蒸。鼻淵已久。酷暑之令。難期速效。

北沙參 麥冬 花粉 桑皮

白茯苓 玉竹 青鉛 料豆

豬野閱 肝火刑金。鼻竅鬱熱。久防腐爛。治以瀉肝潤肺。庶幾見效。

枇杷葉 黃芩 山梔皮 花粉

石決明 桔梗 白蘆根 甘草

徽州儲 鼻屬肺竅。又為氣主。鼻中起瘡。防碍氣息。古人云。肺經

濕熱。上蒸於腦。入鼻而生。瘰肉猶如地。得濕熱。上生菌草也。治

以辛夷散主之。

辛夷 白芷 防風 細辛 木通 升麻

菁本 川芎 甘草 茶葉

江 積瘀在絡。動絡血逆。今年六月初。時令暴熱。熱氣吸入。首先

犯肺。氣逆血湧。強降其血。血藥皆屬呆滯。而清空熱氣。仍蒙閉

於頭髓空靈之所。諸竅痺塞。鼻窒瘰肉。出納之氣。都從口出。顯

本證醫案彙編

卷一 面部 鼻病

然肺氣鬱蒸。致腦髓熱蒸。脂液自下。古稱燥物消物。莫如火。但

清寒直泄中下。清空之病。仍然議以氣分輕揚。無取外散。專事

內通。醫工遇此法。則每每忽而失察。

連翹 牛蒡子 通草 桑葉 鮮荷葉汁

青菊花葉 臨服入生石膏末煎一沸

張會卿曰。鼻病無他也。非風寒外感。則內火上炎耳。外感治宜

辛散。內熱治宜清涼。知斯二者。治鼻大綱。盡乎是矣。此治內症

之大概也。惟治外科者。亦不能出此範圍。鼻開竅於肺。五味絡

入鼻。藏於心肺。心肺有病。鼻為之不利也。屬陽明。位居中土。脾

熱者。鼻先赤。傷寒二日。陽明受之。陽明主肉。使鼻絡於口。鼻為

肺竅。膽移熱於腦。則辛額鼻淵。鼻淵者。濁涕下而不止也。相火司天。熱。衄鼻窒。君火司天。熱。衄鼻窒。肺之外症。屬火者多。風寒濕兼而有之。肺屬金。畏火。肺主氣。風寒濕滯。氣機至於鼻。疝鼻痔。鼻癰。鼻癭。堅硬難除者。或風寒鬱結。或喜食膏粱。燔炙。陽明化熱。經絡壅塞而成。陽明主肉。故肉堅而不易化也。屬陽明者多。肺。鼻。酒。鼻。赤。鼻。粉。刺。肺。風。或酒濕傷脾。脾。經。蘊。熱。熏灼於肺。屬脾肺者多。腦漏一症。其因有三。或傷於風。或傷於寒。或傷於熱。或肝膽之熱。上移於腦。傷於風者。太陽隱痛。其涕清。傷於寒者。額隱痛。其涕濁。傷於熱者。其涕黃濁。膩而臭穢者也。亦有腦髓不固。淋下無度。精氣不足。致成虛怯。今錄之方。雖曰

外證醫案彙編 卷一 面脚 鼻痔

外症皆屬內因。故治鼻須辨三因。內因。外因。不內外因。辨於指掌。治鼻之法得矣。余聽鴻註

外證醫案彙編卷二 上海圖書館藏

陽湖趙能靜先生閱 陽羨余景和聽鴻甫編輯 會稽孫思恭順齋甫校刊

口部 ○唇瘍 角里周 膏梁厚味。熱逼陽明。發為唇唇。不治則成中消之證。後難挽矣。

麥冬 銀柴胡 甘草 石斛 黃芩 茵陳 知母 中生地 枳殼 犀角 枇杷葉 夢生草堂亦取此方。此即清涼甘露飲全方也。能靜註

外證醫案彙編 卷二 口部 唇瘍

荆溪蒯 陽旺陰虛。膀胱寒水泛溢。脾濕與胃熱互鬱。鬱久化熱。熱氣薰蒸。滿口糜爛。延及咽喉。兼以泄瀉口臭。姑擬加味連理湯。合導赤散治之。

人參 白朮 乾薑 生地 茯苓 黃連 炙草 木通 竹葉 加味連理湯。合導赤湯。雖成方。用之極難。脾胃寒熱並治之法也。脾為太陰濕土。喜溫喜燥。胃為陽明燥土。喜潤喜涼。最妙一味黃連。苦降洩熱。可以引導赤下行。而清胃熱。苦以化燥。除濕而堅下。藉理中。辛甘升陽。助脾泄瀉可止。濕熱盡則口糜可除。仲景之半夏瀉心。附子瀉心。黃連湯。生薑瀉心等。之脫化也。其

中攻補兼施。寒涼並用。為醫者能於此法中講求其理。而推廣之。致究仲聖方解。探微在戒。用之如鼓應桴。知余熟鴻註

丹徒褚小兒鵝口瘡。乃心脾之熱。兼挾胎熱上攻。以致滿口皆生白色斑點。作痛連絡咽喉。重重疊起。難於哺乳。煎劑更屬難投。且與

冰硼散擦之。以去濁涎。

紹興范下唇發瘡。色紅作腫。日久破裂。流水漸起。黑蓋去之仍生。旋平旋發。此名唇風。乃足陽明風火凝結而成。擬雙解連聖散主之。

防風 當歸 連翹 川芎 麻黃 荊芥

外證醫案彙編

卷二 口部 唇瘍 二

白芍 白朮 薄荷 山梔 黃芩 桔梗

甘草 滑石 煨石膏

通聖雙解中加當歸 靜誌

塘棲蔡下唇結腫如核桃。此係唇疽。乃心脾蓄熱。宜與清涼。

犀角 丹皮 金石斛 遠志 蘆根

生地 白芍 茜草

東山潘唇齒由心緒煩擾。肝脾氣鬱而成。此證有失血之虞。不可妄動刀鍼。宜耐養為主。

川貝 石決明 石斛 青黛 蒲黃

天竺黃 甘草

梅堰陳陽明火毒。結腫在唇。已經兩月。作瘡。色黑腥穢。毒盛也。

右脈洪數無次。勢必穿唇落齒。殊難收斂。勉擬清胃散主之。

生地 鮮石斛 黑山梔 知母 銀花

黃連 旱蓮草 生石膏 白芷 蘆根

某濕邪發熱。津傷口糜。氣穢。

捲心竹葉 嘉定花粉 知母 麥冬

金石斛 連翹

秦久熱瘡。五六十年。環口燥裂。溺瀉莖痛。

鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 羌蔚子

銀花 地丁 紫草 共熬膏

外證醫案彙編

卷二 口部 唇瘍 三

唇瘍屬陽明太陰。脾胃最多。心肝稍有兼之。經曰。手陽明之脈。

俠口。足陽明之脈。環唇。陽明脈至齒唇也。脾為統血之藏。而主

肉。其榮在唇。陽明胃脈。上入齒中。還出挾唇。下交承漿。下膈屬

胃。絡脾。為病有口喎唇脣。脣即瘡之類也唇反。肉先死。太陰脾脈。入腹

屬脾絡胃。上挾咽喉。連舌本。所以十二經。三百六十五度。其濁

氣出於胃。走唇舌而為味。脾胃大腸小腸。三焦膀胱者。倉廩之

本。營之居也。名曰器。能化糟粕。轉味而出入者也。其華在唇。四

白。其充在肌。脾為濕柔之土。胃為燥剛之土。脾為之使。胃為之

市者。容受各物者也。使者。轉運各物者也。喜食膏粱厚味。容

受倉厚之中。久鬱陽明壅熱。太陰濕熱。或火風大。阻滯薰蒸。隨

經而發。唇瘍成矣。亦有兼於心肝者何也。腎脈貫心。入頤環唇。厥陰之脈。循喉嚨。環唇。肝脈上頰裏。環唇。心主血。肝藏血。脾胃飲食。中焦取汁。變化而赤。是為血。脾胃熱則血熱。累及心於肝也。今摘九方。陽明壅熱。以清涼甘露飲。脾胃濕熱。之連理導赤湯。小兒胎熱。之冰硼散。陽明風火。之雙解通聖。心脾積熱。犀角地黃。肝脾鬱熱。之清肝涼血。陽明火毒。之清胃散。溫邪口糜之甘涼清熱。瘡疾唇燥。涼血解毒。治唇瘍之法。不出脾濕胃熱。風與火也。唇瘍皆屬內因。臨症須考其根。勢立方定其法。度余塊不敏。理難盡宣。惟願高明。將先哲存方。發其精義。而正之。藏余之拙。鄙人之大幸也。余曉鴻註

外證醫案彙編 卷二 口部 唇瘍

○齒瘍
平望翁 風熱發為牙癰。宜祛風清胃。
羚羊 石斛 丹皮 元參 鮮生地
黃芩 荊芥 薄荷 鮮蘆根
南京表 牙疳唇破。陽明毒感之至。危如朝露。
香犀角 旱蓮草 黃連 生地 黑梔
忍冬花 人中黃 骨皮 天花粉
簡村張 牙齦腫脹。淡血滲流。虛陽上泛。法以滋降。
熟地 北沙參 石斛 旱蓮草 麥冬
懷牛膝 茜草 丹參 炒白芍

大倉楊 牙漏未得痊。又起乳蛾。喉肉宣腫。喜熱飲。惡涼。口不臭。右關脈大。兩尺細軟。此乃少陰不足。陽明有餘。邪熱稽留於齦肉之內。難免齒齦。當養性情。不可專取藥力。

沙羨葵 生地 石斛 麥冬 鮮蘆根
旱蓮草 丹皮 料豆 申薑
山西程 走馬牙疳。黑腐內嵌。牙落無血。勢必穿唇破腮。五不治中。已見二三。勉擬桂苓甘露飲主之。
瑤桂 茯苓 猪苓 知母 地栗根
石膏 石斛 澤瀉 骨皮
常州尤 少陰虧怯。陽明蓄熱。致成牙漏。擬玉女煎。
外證醫案彙編 卷二 口部 齒瘍 五

熟地 懷牛膝 麥冬 旱蓮草 煨石膏
沙羨葵 川石斛 知母
本城石 走馬疳。綠陽明毒感。以致肉黑糜腐。經云。穿腮破唇。症屬不治。勉擬煎劑。
犀角尖 牛蒡子 忍冬 煨葛根 鮮生地
鮮石斛 淡苳 薄荷葉 甘草人中黃
朱家角 癖積毒火。上攻牙齦。寒熱腐臭。不數日間。遂致穿腮。臍齒。現此惡款。且擬蘆薈消疳飲。以消息之。
銀柴胡 羚羊角 胡黃連 牛蒡子 淡竹葉
元參 甘草 山梔 薄荷 桔梗 石膏

泗涇唐 牙根腐爛。穢涎不絕。此屬走馬牙疳。非輕症也。宜清疳解毒湯主之。

人中黃 銀柴胡 知母 防風 犀角 石膏
牛蒡子 川黃連 連翹 元參 荆芥

崇明王 牙齦微痛。淡血時流。兩手脈象沈數。參此脈證。不獨胃火熾盛。而龍雷之火。亦復上騰。愚意宗益火之源。以消陰翳之治。

安南桂 懷牛膝 澤瀉 知母 石斛 竹葉
車前子 赤茯苓

履方 齧腐已定。切血亦止。引導之法。甚為妥適。仍宗前法。佐以鹹降。

申薑 車前 秋石 川石斛 懷牛膝
知母 青鹽 淡竹葉 此二方大有斟酌。應註

木漬倪 牙宣遲延。失治。腐清漸開。喜涼飲。不喜熱飲。此係邪風凝滯於齧肉之間。治宜清胃為主。

犀角尖 知母 粳米 甘草 人中白 血餘
鮮生地 青黛 丹皮 石膏 鮮蘆根

青浦崔 疳名走馬之稱。喻其速也。勿可緩治。

犀角尖 川石斛 麥冬 生地 知母
地骨皮 銀花 枇杷葉

餘抗春 牙疳。形似核桃。堅硬如石。由心胃之火。煎熬而成。不可鉞破。失血難痊。宜耐性調理。可免性命之憂。

鮮荷葉 遠志炭 丹皮 白芍藥
中生地 茜草根 丹參 川石斛

附未藥方
珍珠一錢 牛黃一分 黃連五分 蒲灰五分 蒲黃灰五分
橄欖核灰三分

寶山鍾 寒濕化熱。致成牙疳。頑腐難脫。失血如泉。脈來細數。法當清滲陽明。佐以潛降。

煨葛根 滑石 荆芥 茵陳 薄荷梗
外證醫案彙編 卷二 口部 齒疳 七

甘草 白前 丹皮
接服方 肉桂 石膏 茵陳 車前子 茅根

石斛 丹皮 知母 梧桐淚 淡竹葉
昆山李 鑽牙疳。毒腐未盡。新肌略露。病退之機。擬清胃解毒法。

胡黃連 地骨皮 金石斛 車前子 知母
銀花 山梔 甘草

青浦許 牙癰。堅硬作痛。寒熱口渴。以致頰頰浮腫。牙關不舒。係陽明熱毒。與風火相搏而成。姑擬祛風涼胃。使其漸漸收束。為妙。

防風 連翹 牛蒡子 石斛 荆芥

薄荷 煨葛 鮮竹葉 山梔 蘆根

丹陽曹 牙癰。餘毒未楚。經年復發。不可苦寒涼胃。姑擬腎陰調治。

沙蒺藜 料豆 川石斛 中薑 甘草

早蓮草 生地 女貞子

南翔劉 牙床腫痛。身發寒熱。此風火也。法以疎解。

煨葛根 防風 甘草 蠶蚕 元參 花粉

荊芥穗 桔梗 橘皮 茅根

陝西黃 牙漏。起已日久。失血過多。肝腎液虧。陽明積熱未清。理

宜培養肝腎。以解胃熱。可圖苟安。

外證醫案彙編

卷二 口部 齒病

八

懷牛膝 麥冬 女貞子 花粉 金石斛

大生地 白芍 沙蒺藜

青浦陸 牙疔。治以甘涼益胃。佐以滋降。

清阿膠 懷牛膝 白芍 川石斛 青鹽

蒲黃炭 料豆皮 茜草 早蓮草 棗仁

陳墓張 牙疔。月餘。膿肉宣露。補益解毒。兼施之治。

黨參 車前子 白芍 橘皮 川石斛

甘草 懷牛膝 茵陳 藕節

許聖聞董 牙漏久延。脈形弦滑。證係木旺水虧。陽明熱蘊。當顧

本為治。

逆志 懷牛膝 天花粉 鈎藤

料豆 青橘葉 金石斛 白芍

桑巖韓 牙疔不止。女子之血。薰於衝任。而衝任虛。繞於陽明。以致齦肉宣腫。治宜涼胃兼補納之法。庶幾血歸其經。不致妄行矣。

懷牛膝 懷山藥 茅根 川石斛

女貞子 北沙參 甘草 大生地

某 牙齦腫痛。左入弦搏之象。稍緩水中之火漸戢。

大補陰丸加 犀角 藕汁 生牡蠣

人中白 骨碎補 丹皮 蘆根

外證醫案彙編

卷二 口部 齒病

九

某 服藥後血止。而口中之熱亦去。亦稍見效矣。而食不加增。脹亦未除。詢其所得之證。則自齒中出血之日始。則非一日矣。使投六七劑。而掃除痼疾。恐扁鵲謝不敏也。今姑用王良詭遇之法。以試之何如。

炒熟地 夏枯草 黃柏 紅鈔

骨碎補 小赤豆 龜版 犀角

人中白 野菊根 蘆根 白朮

早蓮草 生牡蠣 查炭 黃蟬

陸 肝風陽氣乘陽明之虛。上冒牙肉腫痛。議和陽熄風。

生地 阿膠 牡蠣 天冬 茯神

石斛 早蓮草 女貞子

沈 脈細澹。入尺澤。下元精虧。龍旺火熾。是口齒齲腫。皆下焦之虛陽上越。引火歸窟。未嘗不通。祇以形瘦液少。慮其劫陰。致有癆癰起患。當預慮也。

虎潛去廣歸。鎖陽加山藥。從蓉青鹽。羊肉膠丸。

胡 厥陽上衝。心痛振搖。消渴齒血。都是下焦精損。質重味厚。填補空隙。可冀其效。

熟地 四兩 五味 二兩 茯神 二兩 建蓮 二兩 芡實 二兩 山藥 二兩

人乳粉 二兩 秋石 一兩 生精羊肉膠丸 早服四錢

蔡 惡進穀食。舌乾齲脹。不肌不知味。寤多寐少。皆由瘧汗。嘔逆。外證醫案彙編 卷二 口部 齒癆 十

都令諸陽交升。胃氣不降。則不食。陽不下潛。則無寐。肝風內震。則火升心熱。法當和胃陽。平肝氣。肝平胃醒。穀進能寢矣。

知母 北沙參 麥冬 新會皮 烏梅肉

新穀露 沖

胡 脈左弦數。右偏頭痛。左齒痛。

黑梔皮 羚羊角 夏枯草花 連翹

鮮菊葉 苦丁茶 鮮荷葉邊 薄荷

張 太陽痛連顛骨。耳後牙齦。夏令至霜降不痊。伏邪未解。治在陽明少陽。

連翹 羚羊角 牛蒡子 葛根 赤芍

白芷 鮮菊葉

某 陰虧體質。溫熱上蒸。齒痛連及頰。用玉女煎。

某 酒客牙宣。衄血痰血。形寒內熱。食少。陰藥濁味姑緩。

小黑豆皮 人中白 早蓮草 左牡蠣

川石斛 澤瀉

某 火鬱顛項。屬厥陰。項上結核。齲腫。

犀角 羚羊角 元參 生甘草 知母

連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

徐 脈細數上出。體屬陰虛。內熱牙癰。後頰車穴。閉口不能張。其病在絡。藥餌難效。擬進宣通絡痺方。

羚羊角 桂枝尖 殭蚕 煨天麻

粉丹皮 黑山梔 鈎藤

汪 風熱上蒸。齲腫頭痛。當用輕清上焦。

鮮蘆根 圓圓滑石 西瓜翠衣 生菜豆皮

連翹 銀花

齒牙之證。先究上下手足陽明。及少陰之經。再攻風火。蟲與濕熱。虛實之異。牙齒主少陰腎。牙齦主手足陽明。經曰。女子七歲。丈夫八歲。腎氣成。齒更。女子三七。丈夫三八。腎氣平均。真牙生而極長。五八。腎氣衰。齒槁。八八。陽氣竭。精氣衰。齒髮不堅。則齒

去矣。又云骨寒熱者病無所安。汗注不休。齒未槁。取其少陰於陰股之絡。齒已槁。死不治。骨厥亦然。齒者骨之所終也。邪客於足陽明之經。令人齟齬。上齒寒。足陽明之脈。下循鼻外。入上齒中。還出挾口。環唇。下交承漿。手陽明之脈。從缺盆上頸。貫頰。入下齒中。還出挾口。交人中。左之右。右之左。為病有齒痛。頰腫。故齒牙虛症。屬少陰者多。實症。屬陽明者多。虛症者。少陰水虧木旺。龍雷上騰。齟齬肉宣露。牙齦牙宣。牙漏。牙搖。牙齒之類。實症者。陽明濕火熱毒蘊結。牙床骨槽風走馬疳。牙癰。牙疔。牙毒之類。所以虛症。治在少陰。實症。治在陽明。此二語。治齒之大概也。今摘存三十九方。風火之輕。清解散。虛火之鹹寒。滋降。有清肝熱。

外證醫案彙編

卷二 口部 齒瘍

十一

而滋腎水。消陰翳。而制陽光。有玉女煎清陽明。而填少陰。甘露飲清胃熱。而滲蘊濕。清疔解毒。滲濕填陰。症候錯雜。方法之中。兼治合治。分治從治。專治各有妙用。雖云察其專科。而任之。然不能出內科之範圍。質之諸科。細攷先哲治法。融會變通。斯誠善矣。余聽鴻註

附治驗。常熟寺前毘陵人。木梳店。俞姓。年二十餘歲。齒齦如注。血流盈碗。面紅目赤。脈來虛浮。兼數重。按無力。神靜不煩。口不穢臭。言語輕微。余曰。此乃少陰龍火上燔。齒熱則齦肉離脫。齒縫血出不止。手足清冷。急用肉桂五分。研末。飯米搗丸。先空心服下。食以糜粥。使其壓之下焦。再進甘涼鹹寒。滋降。導龍入海。

再將生附子。麝香。作餅。貼左足心。湧泉穴。一劑。血止。兩劑。脈漸斂。手足轉溫。起復如常矣。聽鴻註

○舌瘍

常州馬。心脾蓄熱。循經上沖。舌本遂舌下。血脈脹起。狀如小舌。故名重舌。宜清胃散主之。

升麻 黃連 丹皮 生地 連翹

桐鄉張。痰包。由心脾不和。濕熱上壅。生於舌下。形如水泡。奕而微痛。鍼破出水。如蛋清。以二陳湯主之。

陳皮 半夏 茯苓 甘草 黃連

黃芩 薄荷 生薑

外證醫案彙編

卷二 口部 舌瘍

十二

外科正宗。加味二陳湯。即此方。生薑。乃學山先生所加也。夢生草堂。亦此方。能靜註

青浦卜。重舌。係心脾蘊熱。上延舌本。以致舌下脹腫。有妨飲食。症屬陰候。外用鍼刺。以洩血。內服涼劑。以解熱。漫莫轉敗為功。

犀角 生地 丹皮 連翹 山梔 牛蒡子

淡竹葉 甘草 人中黃

寶山胡。痰包。久延不愈。先後天並虧。法當脾腎雙補。

用六味四君並進

濮院徐。心脾有熱。以致上脰生癰。形如梅核。微有寒熱。此係實火。宜黃連解毒湯。佐以紫雪。喻化。此證。不可妄用刀鍼。

黃連 黃芩 黃柏 黑山梔 桔梗

青浦龔 舌疔。由心脾火盛。舌發紫泡。形如豆粒。堅硬作痛。微心。寒熱類瘡。宜瀉火清心為主。

黃連 黃芩 連翹 銀花 黑梔 地丁草

虎邱王 舌菌之形。頭大蒂小。突如蓮子。狀若雞冠。舌不能伸縮。或裂出血。仍然堅硬。有妨飲食。難治之證也。因心緒煩擾。則生火。思慮傷脾。則生鬱。鬱極火盛。則怒芽逆發矣。今以導赤甘露飲作支持之計。倘能悅性怡情。勝氣靈於藥石也。

犀角尖 木通 生地 知母 石斛

銀柴胡 茵陳 甘草 黃芩 麥冬

外證醫案彙編 卷二 部 舌瘍 十四

枇杷葉 淡竹葉

震澤吳 舌上生孔。細如鍼尖。大如筋頭。孔色紫黑。失血如泉。此係心火上炎。以致血熱橫行。而致舌幼。急擬升麻湯。兼搽必勝散。可免腐爛之慮。

升麻 小蘗草 生地 炒黑側柏葉

艾葉 寒水石 荷葉 茜草

附必勝散方

炒蒲黃 螺青 共研細末。搽患處。用鹽湯漱口。此症奇方。類編用。淡豆豉三升水。三升煮。沸服一升。日三服。又葛氏方。舌上血出如箸孔者。用巴豆一粒。亂髮。維才大。

燒研細末。酒下。能靜註。

松江俞 心火妄動。痰隨火結。舌下紅腫。作痛。生成痰包。以清火消痰為主。

川貝母 蒲黃炭 杏仁 桔梗 蘇子

天竺黃 遠志炭 石斛 竹茹

覆方 舌下紫泡已癰。惟脹痛不減。火結痰涎。驟難清楚。仍宗前法。

陳膽星 刮橘紅 川石斛 蘇子 川貝

瓜蒌仁 車前子 蒲黃炭 射干

宜興汪 平素好飲。濕熱上壅。遂令舌腫。名曰紫舌。脹形。弦火。外證醫案彙編 卷二 部 舌瘍 十五

濕燥難投。且議生津滋降。未識妥否。

大生地 柏子仁 瓜蒌皮 石斛

車前子 枳椇子 蓮子心 葛花

威澤金 上脛癰。心脾鬱結所致。成膿最易。收口極難。延久必成多骨。

川貝母 連翹 料豆 花粉 蘆根

夏枯草 甘草 桔梗 石斛

荻塘陶 舌本屬心。舌邊屬脾。二經鬱熱。則舌本作腫。發為舌菌。最難調治。姑擬清涼豁痰。未許必中病機。

石斛 天竺黃 川貝 遠志 茯苓

石決明 蒲黃

梅堰邱 上膠腫痛。纏綿半載。形如馬乳。下垂。堅硬不潰。係手足

太陰。濕熱而成。延久。怒鼻中流紅。使難治矣。

洋參 白芍 蓮志炭 茜草根 川貝母

珍珠粉 石決明 蒲黃炭

嘉善張 頷下腫痛。是風痰結聚。防發重舌。

防風 桔梗 前胡 杏仁 茅草根

荆芥 馬勃 麩炭 牛蒡子

德清蔣 衣鬱生風。舌本作痛。用柔肝苦泄之法。

羚羊角 連翹 石決明 杏仁 夏枯草

外證醫案彙編 卷二 口部 舌病 法

薄荷 黑山梔 池菊

附末藥方 珍珠 牛黃 青黛 燈草灰

茶若灰 共研細末。抹患處。

川沙張 舌裂起泡。遇夏即發。屬陰不制陽。

熟地 石膏 懷牛膝 麥冬

知母 金釵石斛

武康余 舌下吊痛。痛引頭角。乃心脾火鬱。上衝之症。最難調治。

沙蒺藜 天竺黃 車前子 遠志

靈磁石 青荷蒂 懷牛膝 蒲黃

某處近交秋令。燥氣如臨。先發於上。是為肺燥之咳。然下焦久虛。

厥陰透咽。少陰循喉。往帶口燥。舌糜。是下虛陰火泛越。先治時

病。燥氣化火。暫以清潤上焦。其本病再議。

白扁豆 麥冬 玉竹 白沙參 甜杏仁

覆方 夏熱秋燥傷津。陰液更傷。以幽咽喉受病。都屬陰火上

氣熱失降使然。進手太陰。清燥甘涼方法。甚安。其深秋初冬。調

理大旨。以清上實下。則風熄液潤。不致中厥。至冬至一陽初復。

再議。

燕窩菜 甜梨 人參 九製熟地 天冬

麥冬 黃耆皮 五味子 炙黑甘草 雲茯神

外證醫案彙編 卷二 口部 舌病 法

吳 脈弦小數。形體日瘦。口舌糜碎。肩背掣痛。肢節麻木。膚燥

瘡。頭目眩暈耳鳴。已有數年。此屬操持積勞。陽升內風旋動。燥

筋損液。古有壯火食氣。皆陽氣之化。先擬清血分中熱。繼則養

血。熄其內風。安靜勿勞。不致痿厥。

生地 元參 天冬 丹參 犀角

羚羊角 連翹 竹葉心

九方 何首烏 天冬 生白朮 黑芝麻

冬桑葉 女貞子 茯神 青鹽

張氏失血。口碎。舌泡。乃情懷鬱勃。內因營衛不和。寒熱再感。病鬱

延久為勞。所喜經水尚至。議手厥陰血分主治。

犀角 金銀花 鮮生地 元參 連翹心

李 老年情志不適鬱則少火變壯火知飢腕中不爽口舌糜腐
心脾營損木火劫燥精華肌肉日消惟怡悅開爽內起鬱熱可
平但執清火苦寒非謂情志內因鬱熱矣

金石斛 連翹心 炒丹皮 冬桑葉

川貝 茯苓

接服方 養心脾之營少佐苦降法

人參 川連 炒丹皮 生白芍 小麥

茯苓

外證醫案彙編 卷二 口部 舌癆 六

許 厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失暢所致藥
無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣外寒之偏耳

熟地 女貞 天冬 霍山石斛 茯苓

柏子仁

楊 濁飲頻飢漫溺渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔舌碎絳
赤乃陰不上承非客熱耳此乃臟液無存豈是平常小恙

熟地 芡肉 山藥 茯苓 牛膝 車前

唐 鼻煤唇裂舌腐頻與岑連熱不肯已此病本輕用藥重於攻
擊致流行之氣結閉不行鬱遏不通其熱愈甚上則不嗜飲不
納食小溲頗利便必管痛三焦皆閉神昏痰痰有諸

連翹心 鮮石葛蒲汁 川貝母 杏仁
射干 淡竹葉

唐 脈左沉小右弦兩足腰膝無力舌本腫脹齶頭轟然蒸熱痰
涎湧出味鹹此腎虛收納少權腎脈不司約束陰火上升內風
瘁煽久延痼厥沉疴病根在下通奇脈以收拾散越之陰陽為
法

虎潛去知柏歸加枸杞青鹽羊肉膠丸

何 脈沉目黃舌腫周身四肢疹發胃痛肢末皆腫強遇冷飲涼
即病此久伏濕邪陽氣傷損議溫氣分以通周行之脈發疹舌
腫能用

熱藥時
醫不多

外證醫案彙編 卷二 口部 舌癆 九

川烏頭 生白朮 桂枝木 茯苓

半夏 薑汁

父 上焦之病都是氣分氣室則上下不通而中宮遂腹熱氣蒸
灼喉舌疳蝕清氣之中必佐解毒皆受重藥之業瘁

銀花 川貝 馬兜鈴 連翹心 川通草

白金汁 活水蘆根汁

治病先按經絡虛實如用兵先按紀律陣法臨時變化出入皆
在於人內經云經脈者所以能決死生處百病調虛實不可不
通夫舌者心之苗脾之本也心脾腎三經之脈俱走其間此三
經為病最多手少陰心之別脈名曰通里循經入於心繫舌本

心氣通於舌。和則能知五味矣。脾氣通於口。脾和則能知五穀。心與脾雖分二竅。實合為一竅也。足太陰脾脈。上膈。挾咽。連舌本。散舌下。為病有舌本強。舌本痛。足少陰腎之脈。貫腎。繫舌本。足少陰腎之脈。上繫於舌。絡於橫骨。終於會厭。足少陰為病。有口熱舌乾。咽痛者。聲音之機也。懸雍者。聲音之關也。重舌。刺舌柱以披針也。膀胱移熱於小腸。高腸不便。上為口糜。故舌之症。皆從內發。為病最速。性命立傾。為內科者。豈能不慎。重舌。今輯舌症三十二方。雖不能分條晰縷。總不能離乎心脾腎三經。心經之熱。以苦寒折之。腎經虛火。以鹹寒降之。脾經濕痰。之滲濕化痰。營分血熱之清營涼血。在上焦者。用藥輕清。在下

外證醫案彙編 卷二 口部 舌病論 三

焦者。用藥柔膩。一方之中。有一方之妙用。先哲手澤。滿紙玲瓏。鄙人管窺之見。理難盡述。按經索治。割裂經文。而為之論。惟願高明心領神會。發其精義。斧削翻刊。亦鄙人之大幸也。余臨滿附治驗 常熟東門老塔後盧姓太太。是晚至寓就診。脈來浮數。滿口出血。盈盈。彼自謂出血齒縫。余燈下觀之。血凝滿口。不能清切。以齒切治之。投以玉女煎。陽明少陰合治。明日出血更甚。邀余就診其家。脈仍浮數。滿口血糜模糊。吐血滿地。余令其用涼水漱口。將血拭淨。細看其齒齦不脹。並無血出。見其舌上血衣一層。用箸撥開。舌如注。舌上小孔無數。如針頭。余曰。此乃心脾鬱熱。血熱妄行。舌如注也。急用蒲黃。槐花炭。研末敷之。

逆犀角地黃湯。加蒲黃炭。中白。青鹽。鹹寒滋降等品。合四生飲。一劑而止。所以診病若不細心。仍作齒齦治之。不效。血出過多。危險難說。
常熟沖天廟。貢某。先因濕溫漫熱不寒。脈來滯澀。胸膈痞阻。漫赤作嘔。邀余診之。以溫膽湯。加入淡滲苦洩之品。不能速效。病家又延某。即病者之至友也。病者商於醫曰。若能下去宿垢。腹中痞阻可鬆。某拘病人之情。即用涼膈散數錢於劑中。內瓜蒌仁。元明粉。下之。皆稀糞。明日漫熱不止。腹內仍痞不舒。某因下之不效。某代延其師診之。仍用瓜蒌。芒硝。枳實等下之。不效。後兩頓作脹。舌澀。言語不清。停二三日。湯飲不能下矣。舉家驚惶。

外證醫案彙編 卷二 口部 舌病論 三

其兄貢某來寓商之於余。余再往診之。已有瘍科某診過。方案中云。舌卷囊縮。鞭長不及馬腹。不治之症矣。余脫病人袴。視其腎囊。蹇而不收。並不縮。燃燈細視其舌。腫而且厚。雖短不痛。以指捫之。硬強無津。惟飲不能入。語不能出也。各人紛紛議論。或云。腎津告涸。非人參五味不可救。或云。非生地阿膠不能滋。余曰。此乃非津竭。如津竭。舌縮。其舌痛。皮皴。色紫。領下不脹。余捫其舌。強硬而厚。此乃熱陷心脾。重舌。舌疔之類也。內經重舌。刺舌柱以披鍼也。外科金鑑云。重舌等。將針刺其舌。血色紅者。生色黑者死。非鍼刺不可。阿膠。生地。人參。五味。有虛實膏壤之殊。他人皆曰。若云好刺。更妙。非君不可。余曰。事已在急。雖非外科。

且從權耳。將錢一枚。用竹箸一隻。劈開。夾在其中。用線繫緊。露鋒二三分。按舌刺之七八處。以紙拭之。血色尚紅。後再刺之。見舌上有白泡。以指捺出者。膿也。再儘力按之。膿漸清。此進清熱消腫之方。當夜喉間漸鬆。漸能進飲。數日漸消。能進稀糜。後起手臂伏兔等處。流痰數塊。余曰。即請瘍科治之。後延瘍科治。月餘。皆曰膿尚未成。有江陰戚彥卿先生。來常熟。薦其診之。曰。膿皆成熟。若不開。傷筋爛骨。彥卿一一開之。進以補托。數月而痊。所以若遇內外兼症。內外科各相推諉。拘延時日。鮮有不誤者也。余聽馮誌。

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉

蘇州張 腎陰素虧。肝陽上升。喉間紅腫。作痛。名曰喉珠。證屬延綿。最難速愈。

北沙參 稽豆皮 焯硼砂 青鉛 蔗漿

青橘葉 瓜萹霜 黑山梔 川貝

覆方 自服藥以來。胃氣頗健。喉痛得減。惟痰涎頻吐。總屬腎陰虧。而痰涎上泛。當舍標治本。庶有愈期。不可作喉醫治。

潼沙苑 洋青鉛 真青鹽 懷牛膝 川貝

瓜萹霜 稽豆皮 金石斛 焯化硼砂

慈聖陸 咳嗽聲嘶。咽乾。舌絳無津。會厭不利。難耐酷暑。名曰喉癰。擬用汁法。以延文秋。令生金。再商調補。

甜杏酪 糯米露 荷花露 梨汁
銀花露 茅根露 枇杷葉露 蔗漿
高酒陳 乳蛾紅腫。法宜清散。

前胡 防風 牛蒡子 花粉 杏仁

荆芥 桔梗 甘草

黃山鄒 喉痺多年。反覆不痊。當從脾胃清理。證可不復矣。

北沙參 麥冬 橘白 官燕 瓜萹霜

川貝母 茯苓 焯化青鹽

南翔董 喉間點雷。舌底紫泡。此屬君火不潛。虛陽上越所致。脈來並無數象。不可苦寒直折。擬清養滋降法。

北沙參 柏子仁 車前子 龜腹版

瓜萹霜 川石斛 蓮子心 川貝母

石門田 遠年足瘍。營衛兩虧。陰涸於下。陽熾於上。以致咽喉痛痺。妨礙納穀。咳嗽音啞。脈來細數。擬以潤降清肅。後商固本。

枇杷葉 竹茹 蘆衣 甜杏仁

瓜萹霜 石斛 蘇子 川貝母

覆方 陰損三年。入夏咽痛。拒納。潤降清肅之後。聲音稍亮。胃氣漸甦。以開音潤肺法。

南花粉 金釵石斛 蘇子 北沙參

蘆衣 國圖川貝 杏仁 鮮枇杷

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉

又覆方 清肅後咳。嗆喉痛。漸次平復。惟足癆未愈。乃血氣未充之故。仿甘緩一法。使陰陽和協。外癆自愈。

北沙參 石斛 苡米 桑白皮 生地

麥冬 龜版 甘草 茯苓 糯稻根鬚

杭州邵 喉間痺痛。濕火上升。乃平昔嗜酒所致。擬醒酒利濕治之。

枳椇子 葛花 花粉 陳皮 麻仁

石決明 槐米 茯苓 澤瀉

濮院唐氏 經漏帶下綿綿。腰膝痠軟。乃衝絡虛。手少陽三焦之火。上循於喉。結為喉癰。誤投寒涼。痛反甚。食物有碍。當以溫衝任。

外證醫案彙編 卷十 咽喉 五

喉疾帶下。可均治矣。

丹參 羌蔚子 川石斛 白芍 兔絲子

柏仁 女貞子 枸杞子 川貝

嘉善張 喉痺遺洩。水虧木旺。當以甘涼。益坎滋木。

生地 麥冬 茯苓 丹皮 北沙參

黃柏 芡實 知母 柏子仁

蘇州彭 英年內虧。腎液不藏。君相之火上越。以致喉間紅腫。蓄

斑密密。納物不利。成爲喉痺。最不易治。又兼課讀勤勞。心志愈

耗。即施鹹降之法。亦不過片時之效。欲得全瘳。以怡悅心神爲

要旨。

北沙參 稽豆皮 花粉 官燕 柏子仁

陳墓張 喉痺。

蘇子 川貝 鉤藤 薑汁 百藥煎

馬勃 竹瀝 童便

太倉周 咳嗽喉痺。

人乳粉三錢 川貝二錢 人中白三錢 梨汁送下

震澤倪 肝氣上逆。會厭不利。漸成梅核膈。

代赭石 遠志炭 月石 鉤藤 百藥煎

杜橋紅 蘇子 花粉

外證醫案彙編 卷十 咽喉 五

橫涇王 風痰結聚。咽嗑腫繞於外。喉間白粒。形如瑞雪。名曰肺

花瘡。治宜清肺熱。

羚羊角 連翹 花粉 牛蒡子 荆芥

薄荷 桔梗 甘草

蘆墟卞 穢濁上受。咽喉腫痺。擬芳香逐穢。

佩蘭葉 馬勃 山梔 牛蒡子 青蘘梗

捲竹心 連翹 桔梗

洋城沈 喉痺經年。藥難奏效。全恃怡情。勝於苦口。

枇杷葉 青橘葉 杏仁 柏子仁 花粉

北沙參 瓜蒌仁 青鹽

蔡里秦 咽喉紅腫微痛。不寒熱。口渴。此屬肝胃氣逆。當以清胃平逆治之。

青葱管 新絳 元參 橘紅 薄荷
白蘆根 連翹

常熟楮 少陰之脈。上循喉嚨。虛陽上亢。水不制火。喉腫如此。時現時伏。名為喉珠。此屬浮遊之火。姑擬滋水一法。俾龍潛火熄。

大生地 懷山藥 茯苓 川貝 人中白
柏子霜 北沙參 丹皮 麥冬

周莊威 溫痧咽痛。肺胃受毒。毒從風化。宜祛風肅肺。

牛蒡子 連翹 防風 馬勃 甘草
外證醫案彙編 卷二 咽喉 五

山豆根 杏仁 桔梗 荊芥 茅根

青浦毛 咳嗽微寒熱。音啞。喉痛。證屬風熱伏肺。法宜涼散。

牛蒡子 前胡 薄荷 杏仁 蘆根

山豆根 象貝 元參 甘草

唐栖姚 咳嗽咽痛。風痰閉肺。

山豆根 薄荷 元參 黃芩 杏仁

紫蘇葉 橘紅 薑汁
南潯張 咽喉。是少陰循經之處。乾而不痛。是為喉痺。非外感之症。未易圖治。

生地 熟地 甜杏仁 川貝母 麥冬

天冬 茯苓 瓜蒌霜 生雞蛋清
糯稻根鬚

蘇州蔡 風溫咽痛。清散為主。

牛蒡子 荊芥 薄荷 杏仁 橘紅
蘇子 連翹 茅根

東山孟 咽喉腫痛。形似蚕蛾。是肺胃風熱。久延不愈。宜滋養清散。不可過涼抑遏。

北沙參 花粉 杏仁 橘紅 連翹

萊豆芽 川石斛

吳江徐 雙乳蛾。較單雖易。然寒熱頭痛。脈浮胸悶。防發爛喉痧。

牛蒡子 花粉 荊芥 茅根 前胡
外證醫案彙編 卷二 咽喉 五

苦杏仁 防風 桔梗 甘草

無錫王 按尺脈無力。腎水虧損。虛陽逆衝於上。以致喉間腫痺。舌根芒刺。係少陰脈。循喉嚨。繫舌本。俱係心火所司。法擬滋水降納虛陽。俾漸漸向愈。

北沙參 麥冬 炙橘葉 川貝母

柏子仁 茯苓 蓮子心

附吹藥方 牛黃 五厘 珍珠 一錢五分 燈草 灰 五分

天竺黃 五分 珠砂 四分 川貝母 一錢二分 人中白 五分

青浦呂 喉蛾。

北沙參 麥冬 花粉 龜版 百藥煎
稽豆皮 川貝 丹參

附錄擬喻化丸方

珠粉 五分 梅片 三分 瓜萸霜 五分 孩兒茶 五分
月石 五分 青黛 二分 燈心灰 五分 烏藥炭 三分

橄欖炭 五分 煉蜜為丸

太倉沈 陰虛喉痺。

北沙參 麥冬 花粉 龜版 川貝

稽豆皮 柏子仁 元參

新市汪 真陰虛弱。津液不能上供。咽乾起瘰。妨碍飲食。是為喉

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 三

辭。非輕候也。

中生地 麥冬 花粉 石斛 玉竹

百藥煎 北沙參 柏子仁

桐鄉張 下焦陰火。上灼肺金。以致咳嗽咽痛。釀成喉癰。故宜清

肅降納法。

紫苑 石斛 杏仁霜 蘇子 通草

桔梗 蘆衣 瓜萸霜

蠶聖陳 陰火上浮。喉痺妨食。

沙蒺藜 川貝 茯苓 知母 丹皮

瓜萸霜 官燕 黃柏 蘇子 川石斛

安慶戴 老年。肝腎液涸。陽升無制。結草喉間。有翻花之勢。并防
失血。此係內傷心志。非寬解懷抱。難於奏捷。

製首烏 車前子 川貝 遠志 懷山藥

石決明 稽豆皮 蘆根

附吹藥方 珍珠 四分 金果蘭炭 五分 黃絹灰 四分

川貝 四分 牛黃 二分 橄欖炭 三分 蒲黃炭 五分

青黛 二分 冰片 二分 共研細末

南翔鮑 心脾實火。被外寒所遏。痰涎壅塞。咽喉作痛。音啞言寒。

舌出不收。時時攪動。常欲以手捫之。名為弄舌。喉風。外用鍼刺

少商。內以清咽利膈為主。

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 三

連翹 薄荷 元參 大黃 防風

桔梗 荆芥 甘草 黃連 黃芩

芒硝 山梔 銀花 牛蒡子 此涼膈散加味

南京凌 口内生肉球。有根如線。長計五寸。吐之乃能納食。搗之

痛徹心臆。此屬異症。治無成法。議清心開竅法。

犀角 連翹 薄荷 生地 丹皮

鮮石斛 當門子 甘草人中黃

此證載奇方類編。然則用麝香當門子。一錢。研細。開水服之。三

日自消。先生合犀角地黃意。加以清心解毒之品。云治無成法。

先生胸中早有成竹。何其謙哉。使余讀之。肅然起敬。鳴謝

嘉興陸 咽喉生瘡層層如蛇蟻魚鱗不覺痛楚日久有竅流出臭水飲食漸減證屬怪異本非順候姑擬煎劑以探消息。

臭橘葉 山梔 青黛 荷葉

臭橘。綱目名枸橘。是種為籬藩之橘。橙。此證載夏子益奇疾方。用臭橘葉一味煎服。先生治病每以成法成方。不敢私心自用。案中所以探消息。不此今時症未看過。妄書一方。以探消息。等語。大不相同。此二案先生學有本源。謙和謹慎。平高德進。豈虛語哉。余讀之。頓頭汗脊。聽鴻註。

本城易 肺胃蘊熱積久生痰。外受風邪。塞窒會厭。啞不能言。痛楚異常。漸漸牙關緊急。證屬至險。風波莫測。且先通關。方能下藥。

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 辛

牛蒡子 射干 山豆根 防風 荊芥 瓜蒌仁 薄荷 苦杏仁 連翹 竹瀝

震澤陶 風火相搏。咽喉卒然腫塞。痰涎上壅。聲如拽鋸。脈來洪數。名曰緊喉風。非肺絕喉痺也。法擬結者開之。鬱者發之之義。

牛蒡子 連翹 防風 薄荷 甘草 青竹葉 桔梗 枳殼 荊芥

此二案風邪閉塞於肺。鬱結不通。急喉風症也。治之在速。急宜宣肺化痰。祛風清熱。中病者。十中難救二三。如拘疑不決。立刻而危。切不可信張景岳肺絕服參之論。豈有卒然而起。有肺絕

症者乎。或久病咳嗽音啞。臨危起疾。肺絕。尚有一說。葉天士先生景岳發揮言之已詳。余毋庸多瀆矣。聽鴻註。

蘇州史 下痢咽痛。寒熱不渴。脈來虛弱。此為腎著。擬半夏甘桂湯主之。

桂枝 甘草 茯苓 米仁 補骨脂 乾薑 半夏 桔梗 澤瀉

半夏甘桂湯者。即仲景桔梗湯。半夏散及湯。茯苓甘草湯意也。腎為寒水之藏。膀胱為寒水之府。土為水之制。濕著於腎。土被水溢。土無生發之機。不得輸精於肺。津液不能上承。虛陽阻格。不潛故不渴。而咽痛也。水漬於腸間。而為之痢。仲景桔梗湯治

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 辛

喉痛喉痺。取半夏辛滑通陽。而降逆開痺。苓瀉米仁。滲利膀胱。泄表。即安裏也。取薑桂之溫通寒水。蒸動內積之濕。甘草之益土和中。土旺可以制水。濁陰降。水去。則痢可止矣。清陽升。津液上布。則咽痛可平矣。此乃少陰腎實之方。以尅之洩之。使其平也。與少陰腎虛之方。填之滋之。兩相對待也。先生立方。深得仲景之心哉。補骨脂。雖云溫腎。其性固滯。若易白朮一味。扶土生津。止痢為醋。外科正宗治虛火上攻咽喉乾燥作痛。腹疼。故用理中湯。經驗秘方。以桔梗湯。加入參黃耆。各人參甘草湯。治咽喉腫痛。若有腫痛。加生薑。鎖碎錄。有病喉痛。且患河魚之疾。一良醫。以紫雪裏理中丸。服之。二疾皆愈。蓋紫雪入喉即化。理

中入腹而温也。咽候呼吸之要。誤之最險。專於喉科者。臨症虛實寒熱。上病治下。下病治上。隔二隔三等法。三復思之。治病立方。可無遺憾矣。賈鴻註

慈谿李 喉間室塞。六脈虛數。係出水虧。津失上供。議以填陰鹹降之法。

熟地 玉竹 人中白 百合 柏子仁

龜版 甘草 枸杞子 麥冬 雞蛋黃

白容徐 歎久不已。喉痺音啞。日晡寒熱。脈形細數。當此燥石流金之候。焉得不增重也。議仲景少陰咽痛法。用猪膚湯主之。

猪膚油去淨 二泉驢皮膠 北沙參 麥冬

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 三

川貝母 知母 百合 花粉 建白蜜

長興胡 濕熱鬱蒸於中。陰液不能上供。遂致咽中。乾燥室塞。脈形沈細。當與開鬱洩蒸化濕之品。

乾佩蘭 茯苓 陳皮 竹茹 瓜蔓皮

黑山桅 米仁 砂仁殼 川鬱金汁

某 喉痺咳嗽。脈右大而長。

生扁豆 麥冬 北沙參 川斛 青蔗漿

周 怒動肝風。筋脹。脇板。喉痺。

阿膠 天冬 柏子仁 牡蠣 小麥

趙 右偏頭痛。鼻塞流涕。仍不通爽。咽候府腐。寤醒肢冷。肝出外。

邪頭風已留數月。其邪混處。精華氣血。咸為蒙閉。豈是發散清寒可解。頭顛藥餌。務宜清揚。當刺風池。風府。投藥仍以通法。苟非氣血周行。焉望却除宿病。

西瓜翠衣 鮮薑根 苡仁 通草

煎送蠟卷丸

陳 喉痺目珠痛。吸氣短促。曾咯血遺精。皆陰不內守。孤陽上越。諸竅當填下和陽。

熟地 枸杞炭 旱蓮草 菊花炭

女貞 茯苓

李 勞怯。形色奪。肌肉消。食減。便滑。兼痰。喉痛。知醫理者。再無清

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 三

咽涼肺滋陰矣。病人述心事操持病加。顯然內損。關係臟真。冬

寒藏陽。人身之陽氣升騰。陰陽失交。收藏失司。宜見病治病。膚

淺之見識。據述食進逾時。必有痛瀉。經言食至小腸。變化屈曲。

腸間有阻。常有諸矣。凡湯藥氣升。宜丸劑珠補。食後服資生丸。

方列後。

人參 坎炁 茯苓 黑殼蓮子 五味

艾實 山藥漿丸

史 輕浮苦辛治肺。咳嗆頗減。咽痛紅腫。塞室既久。瘞而成毒。益

乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分。佐以解毒。

雞子白 麥冬 大沙參 金銀花 蔗漿

菜豆皮

孫 脈搏大陽不下伏咳頻喉痺暮夜為甚先從上治。

生雞子白 生扁豆 玉竹 白沙參

麥冬 地骨皮

某 據血後咳嗽咽痛音啞少陰已虧耗藥不易治。

糯稻根鬚一兩 生扁豆五錢 麥冬三錢 川斛一錢五分

北沙參一錢五分 茯神一錢五分 早服都氣丸淡鹽湯送

下

某 夫音咽痛繼而嗽血脈來滑數已成勞怯幸賴能食胃強勿

見咳治咳庶幾帶病延年。

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 五

細生地 元參心 麥冬 細川斛

鮮蓮子肉 糯稻根鬚

范 氣燥喉痺失音少陽木火犯上。

生雞子白 冬桑葉 丹皮 麥冬

白扁豆皮

孫 久咳失音喉痺。

陳阿膠 雞子黃 炒麥冬 川斛 茯神

北沙參 炒生地 生甘草

毛 溫邪熱入營中心熱悶脇肋痛平素痰火與邪膠結致米飲

下咽皆脹老年五液已涸忌汗忌下。

生地 麥冬 杏仁 鬱金汁 橘紅

炒川貝

周 病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所云因於

濕首如裹此呃忒鼻衄皆邪混氣之象況舌色帶白咽喉欲閉

邪阻上竅空虛之所諒非苦寒直入胃中可以治病病名濕溫

不能自解即有昏瘧之變醫莫泛稱時氣而已。

連翹 牛蒡子 銀花 馬勃 射干

金汁

葛 噴怒喧嚷氣大逆飛致喉痺咽痛食物厭惡耳前後透肩閃

刺譏解少陽。

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 五

夏枯草 丹皮 桑葉 鉤藤 山柰

地骨皮

吳 脈弦滑數頭項結癭咽喉腫痛痺阻水穀難下此皆情志鬱

勃肝膽相火內風上循清竅雖清熱直降難制情懷之陽是以

頻藥勿效也。

鮮枇杷葉 射干 牛蒡子 蘇子

大杏仁 紫降香

某 燥火上鬱。眼腫咽痛當辛涼清上。

薄荷梗 連翹殼 生甘草 黑梔皮

桔梗 菜豆皮

某腎厥由背脊而升發時手足厥冷口吐涎沫喉如刀刺蓋足少陰經脈上循喉龍挾舌本陰濁上犯必循經而鼻仿許學士椒附意通陽以泄濁陰耳。

泡附子 淡乾薑 川椒 胡蘆芭
半夏 茯苓 薑汁泛丸
此方當留意切勿因循看過能靜註

陸 風火上鬱咽痛。

薄荷 連翹 射干 牛蒡子 馬勃
菜豆皮

邵 風火上鬱咽痛頭脹宜用草涼。

外證醫藥彙編 卷二 口部 咽喉
西瓜翠衣 滑石 連翹 桑皮 射干
杏仁

汪 左喉弦數咽痛脫頰陰虛體質不耐辛溫當以輕藥暫清上

蘇葉 生菜豆皮 白沙參 川貝
元參 川斛
徐 老勞咽疼

生雞子白 糯稻根鬚 甜北沙參
炒麥冬 川石斛 生甘草

楊 未病陰氣走洩為虛穢濁上受則實咽喉腫痺上竅邪蒙日

暮昏煩陰傷熱熾肌膚柔白氣分不足此醫藥雖宜涼解清上但不犯及中下。

連翹 鬱金 馬勃 牛蒡子 竹葉心
黑山梔 杏仁 橘紅

孫 腎液不收肝陽上越顛脹流涕咽喉微痛。

伍 六味加牛膝車前五味
咽喉痛痺發時如有物阻膈甚至痛連心下每晚加劇是陰液日枯肝臟厥陽化風火上灼法以柔劑仿甘以緩其急耳。

細生地 天冬 阿膠 生雞子黃
元參心 糯稻根鬚

外證醫藥彙編 卷二 口部 咽喉

陳 陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆病百脈皆損秋半天氣已降身中氣反泄越汗出喉痺陽不入於陰致自為動搏耳夫咽喉之患久則喉痺不宣妨於受納最不易治從少陰咽痛例用猪膚湯旬日喉痛得緩對證轉方。

張 陰損三年不復入夏咽痛拒納寒涼清咽反加泄瀉則知龍相上騰若雷光火灼雖傾盆暴雨不能撲滅必身中陰陽和協方息此草木無情難效耳從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之。

又 陰涸於下陽熾於上為少陰喉痛乃損怯之末傳矣用猪膚之甘涼益坎有情之屬而效今肉腠消燥殆盡下焦易冷髓空極矣何暇以痰嗽為理議滑瀉之補味鹹入將可也。

牛骨髓 羊骨髓 猪骨髓 鹿角膠 各四兩
用建蓮肉五兩 山藥五兩 芡實二兩 同搗為丸。
某氏氣逆壅熱於上。喉腫喉痺。胸悶腹腫。七月太陰司胎。法宜宣
化清上。

連翹 蘇梗 川貝 杏仁 花粉

菊花 橘紅 牛蒡子

爛喉痧

青浦沈 風熱伏於肺胃以致喉間紅腫作痛。寒熱脈數。治宜辛
涼。防成爛喉痧。

羚羊角 連翹 杏仁 薄荷 元參 馬勃

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 天

牛蒡子 象貝 山柰 蘆根 鮮生地

太倉查 咽痛發痧。四日不解。是為爛喉痧。擬清透法。

牛蒡子 防風 杏仁 前胡 蟬蛻

淡豆豉 荊芥 桔梗 馬勃 茅根

附洗足方 青蔥管 紫蘇梗 煎湯重洗兩足

光福王 溫邪內伏。痧發不透。咽喉痛腐。宜清肺胃之熱。

甘草 葛根 杏仁 荊芥 牛蒡子

馬勃 前胡 桔梗 淡豆豉 大豆黃卷

游擊關蔣 時痧寒熱不解。又增喉痛。防其腐爛。熱邪內陷之象。
姑與清理。

根生地 鮮地 大豆卷 黃芩 天竺黃 元參

牛蒡子 馬勃 銀花 甘草人中黃

南翔陳 素有喉痺。又感風溫。風乃天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩
陽熏灼。蒸鬱上焦。以致喉間腫腐。成為爛喉風。按脈浮數。熱
正感。擬祛風化痰法。

防風 杏仁 薄荷 葛根 馬勃

前胡 茅根 桔梗 牛蒡子

疫癘喉痧

外 疫癘穢邪。從口鼻吸受。分布三焦。瀰漫神識不清。不是風寒
客邪。亦非停滯裏症。故發散消導。即犯劫津之戒。與傷寒六經

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 天

大不相同。今喉痛。丹痧。舌如珠。神躁暮昏。上受穢邪。逆走膈中。
當清血絡。以防結閉。然必大用解毒。以驅其穢。必九日外不致
昏憤。冀其邪去正復。

犀角 連翹 生地 元參 菖蒲

鬱金 銀花 金汁

姚 疫毒。口糜。丹痧。喉啞。治在上焦。

犀角 銀花 元參 連翹 金汁

鮮生地 石菖蒲 至寶丹

譚 口鼻吸入穢濁。自肺系漸于心胞。初病喉痛舌燥。最怕竅閉
神昏之象。疫毒傳染之症。不與風寒停滯同法。

元參

連翹

鬱金

銀花

石葛蒲

旋葉

射干

牛蒡

沖入真白金汁一杯

顧

平昔腸紅。陰絡久傷。左脇下宿痰。肝家風氣易結。形瘦面青。

陰虛陽易胃。血絡不得凝靜。諸陽一升。遂為厥衝。氣自下犯胃。

為呃。症似蓄血如狂。奈脈細勁。咽喉皆痛。真陰枯槁。水液無有。

風木大震。此劑劑強鎮。不能熄其厥胃耳。

生雞子黃一杓。真阿膠二錢。淡菜五錢。龜板五錢。童便一杯。

某氏氣逆壅熱於上。喉腫。喉痺胸悶腹腫。七月太陰司胎。法宜清

化宣上。

川貝 牛蒡子 連翹

蘇梗

杏仁

外證醫案彙編

卷二

咽喉

早

花粉

菊花

橘紅

某 喉癢痛未愈。下體有漏。時有夢泄。

炒熟地

麥冬

魚鱗膠

黃明膠

人中白

山藥

胡蓮

某 喉痛原屬少陰。今痛止而猶腫。左關弦滑。陰虛有大升。挾熱

痰須滋其化源。佐以清熱之品。

熟地

山藥

茯苓

澤瀉

琥珀

濂珠

辰砂

燈心

人中白

石決明

阿膠化開和

某 脈弦數尺獨大。咳而喉痛。失音。乃數載失紅之後。其陰虛大

炎不可言喻矣。唯有至靜之品。引陽潛入陰中。庶近內經之旨。

然須作靜養工夫。使陰秘陽密。得坎離相交之力為妙。

熟地海石粉 金石斛 北沙參 茯苓

麥門冬 生白芍

某 素有喘症。形氣怯弱。咽喉不腫。時咳。此新感風溫在肺。氣不

下肅。尚宜清降。

桑葉 白沙參 塊茯苓 川貝母

杏仁 南棗肉

咽喉。其竅則一。其路兩歧。經曰。咽喉者。水穀之道路也。咽喉小

腸者。傳送也。喉嚨者。氣之所以上下者也。又曰。天氣通於肺。地

氣通於嗌。喉為肺之系。咽為胃之系。天之風寒。暑濕燥火。從喉

入肺。地之臊焦香腥腐。從咽入胃也。以此悟之。喉者。主氣之上

下。由肺入心。由心入脾。由脾入肝。由肝入腎。貫通五藏。藏而不

洩。使呼吸者也。咽者。水穀之道路。由咽入胃。由胃入小腸。化糟

粕。泌水穀。分入膀胱。大腸貫通六腑。洩而不藏。使傳送者也。以

此釋經文。咽喉顯然兩途矣。內經三陰三陽。皆任各有喉症。先

以經義述之於前。再以治法書之於後。庶幾臨症稍有把握。經

云。足陽明之別。上絡頭項。合諸經之氣。下絡喉嗌。其病氣逆。喉

痺。痺瘳。足陽明。其支循喉嚨。其病頭腫。喉痺。手陽明為病。頭腫。

口乾喉痺。手陽明少陽風逆發喉痺。噎腫喉痺。不能言。取足陽明能言。取手陽明。三焦手少陽也。是動則病。噎腫喉痺。邪客於手少陽之絡。令人喉痺。舌卷。口乾。少陽司天。三之氣。喉痺。目赤。善暴死。少陽司天。客勝則丹眇外發。喉痺。頭痛。噎腫。足少陽也。肝中之將也。取法於膽。咽為之使手。太陽脈入缺盆。循咽下膈。為病有噎痛。太陽在泉。寒淫所勝。民病噎痛。頰腫。足太陰之脈上挾咽。連舌本。為病有舌本強。舌本痛。太陰在泉。噎腫。喉痺。熱。故噎乾也。足厥陰之脈循喉龍之後。為病有噎乾。手少陰脈出心系。上挾咽。為病有噎乾。足少陰之脈循喉龍。挾舌本。為病

外證醫案彙編

卷二 口部 咽喉

三

有口熱。舌乾。咽腫。噎乾。及痛。少陰司天。噎乾。腫上。噎乾。口中熱。如膠。取足少陰。邪客於足少陰之絡。令人噎痛。不可內食。無故善怒。衝任之脈起於臍中。循背裏。為經絡之海。循腹上行。會於咽。喉絡於唇。口腎脈為病。噎乾。三陰三陽。及奇脈。皆有咽喉之疾。十二經。惟太陽行腦後。從背。其餘皆湊咽喉。內經獨云。一陰一陽。結謂之喉痺者何也。少陰君火。一陰也。少陽相火。一陽也。因指火而言之也。君火者。太陽離宮之火也。相火者。龍雷坎宮之火也。手少陰心脈挾咽。足少陰腎脈繫喉龍。三焦為水火之道。路君相。火假道相通。坎離既濟。水火平勻。咽喉本無疾病。二火獨勝。氣熱火結。三焦道路閉塞。陰不能上承。陽不能下降。

氣熱則結。結則腫。腫則痺。痺甚則不通。而危矣。咽喉各症。頭緒紛繁。治法。總不出虛實兩字而已。外來之火為實。內生之火為虛。有餘之火為實。不足之火為虛。夫外來之邪為實。即風熱犯上。溫疫流行。治之在急。緩則傷人。外來暴熱。若不傾盆暴雨。熱勢難消。治法不出。辛涼解散。鹹軟化痰。如疫癘喉痧。芳香洩濁。解毒驅穢。爛喉痧。辛涼解肌。清透化熱。風火鬱結之清。輕涼解急。喉風。纏喉。喉痰。如拽鋸之通。開化痰。開鬱。單乳蛾。雙乳蛾。輕清滋養。此治外邪之大概也。內生之火為虛。寒氣凝結。真陽閉鬱。虛陽雷電上騰。若不雜照。當空陰霾。不能消散。龍雷斷難潛伏。治法。故以熱藥導之也。如腎善不渴。咽痛之半夏。甘桂湯。心

外證醫案彙編

卷二 口部 咽喉

三

事操勞。陽氣升騰。之人。參坎。腎厥。喉如刀刺之。本事。椒附湯。此治內生之火大概也。有餘之火為實。何也。或酒濕熏蒸。肝氣鬱遏。厚味壅熱。皆有餘之火也。祇能因其病而治之。如嗜酒太過之醒酒利濕。心脾積熱。痰涎壅塞。弄舌喉風之清咽利膈。濕熱鬱蒸。津不上供之開鬱洩蒸。噴怒喧嚷。氣火逆飛之疎解少陽。氣逆壅熱。喉痺腹脹之宣化清上等法。皆治有餘之火大概也。不足之火為虛。何也。或久咳喉啞。喉痺。喉痺。喉珠。等是也。如水虧木旺。喉珠之甘涼鹹寒。喉間點黃。舌底紫泡之清養滋降。癆症氣血未充。喉痛之甘緩和陰。經漏帶下。喉癰之填納衝任。英年內虧。君相上越之寒鹹滋降。水不滋火。喉腫如虬之。

滋水潛陽老年喉草翻花之心腎並治陰不斂陽久咳音啞之
 猪膚粉蜜陰液日枯厥陽化火之地黃阿膠熱入營中高年液
 涸之甘涼養陰此等皆治不足之火大概也鄙愧愚昧妄列四
 條再以喉癢會厭不利之花露輕揚梅核膈之理氣鎮逆肺花
 瘡之清理肺熱肝胃氣逆之清胃平逆口生肉球之清心開竅
 喉中如蛇脫魚鱗之臭橘葉鼻塞咽喉疔腐之蠟卷丸精髓空
 極喉痛之猪羊牛髓糜膠厚膩填精腸紅厥衝喉痛之雞膽龜
 淡菜介類潛陽此等者四法中之變化也先哲用筆靈活難窺
 其奧隨方敷衍畧而述之質之高明細心研究考博羣書若能
 加意搜求咽喉方法金針暗度此篇不但他科專於喉科治法

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 五

無餘蘊矣 余聽鳴註

附治驗常熟南門鴻源衣莊查姓女九歲素係柔弱忽起喉風
 痰如拽鋸聲啞言不能出目眦微陷幸面色不青他醫治之已
 有兩日遂余治之曰如急喉風不過二三時多者一日而已既
 有兩日雖屬危險不致傷命因其肺中未曾阻塞尚有呼吸可
 通急將開關散吹鼻數次猶能得嚏二次噴嚏之後呼吸漸靈
 再將白蘿蔔四兩鮮梨四兩鮮荸薺三兩鮮薑一錢搗汁竹瀝
 五錢和入風化硝一錢頻頻呷之用牛蒡桔梗甘草中黃馬勃
 麴抱元參蘆根竹瀝川貝等服之時時用燈心稍鼻管使其噴
 嚏吹以珠黃中白風化硝等開洩化痰等藥如此兩日痰聲漸

平眼淚漸出三日微聞其音後以清宣肺氣養陰滋降三四日
 痊此乃喉風之輕症也

余在師處見治一施姓小兒喉中聲如拽鋸音啞涕淚皆無吾
 師曰馬脾風症也兩鼻扇之不息以麻黃芥子黑白牽牛大黃
 苦杏仁石膏等下之而痊太平洲人黎藿農家之子則可吾吳
 中膏粱柔脆之孩醫雖能用病家不肯服就病家肯服醫家亦
 不肯書也所以吳中喉風不治者多臨證最難若以此法使之
 輕病弱體不堪設想矣古人云藥必中病一言盡之矣如百步
 穿楊九十九步不及百零一步太過矣吾輩治病若云藥能中
 病天下而醫者不取言也

外證醫案彙編 卷二 口部 咽喉 五

余治常熟東門外柴場蔡姓女纏喉風音啞呼吸不通痰如拽
 鋸面青目腫涕淚全無吹以開關散噴嚏全無進以辛涼輕宣
 鹹軟化痰罔效余思景岳肺虛用參等說惟一日之恙斷非肺
 絕反復審詳總要吐去痰使其呼吸可通能救三更自己叫開
 城再去用稀涎散竹瀝等吐之吐出如膠之痰兩碗粘膩非常
 明晨再診呼吸如絲神氣稍清畧能安寐後延他醫亦以宣肺
 化痰法一日而斃喉風一症輕者可救重者十中難救一二質
 之博雅高明必中之法能救蒼生傳之於後積德非淺
 余見常熟東門外柴場子五歲猝起喉風痰如拽鋸喉中呼吸難
 道就余診之書麻杏石膏等開肺化痰之劑余以急喉風危症

乎。吸屬延專科。周姓醫治。用羚羊石膏等。又請沈姓醫。用洋參
坎燕等。然三人皆云不救。病家亦無主張。將三人之方。在城隍
神前拈起。沈某方也。藥未能下咽。人已斃矣。病不過二三時。何
其速也。細思咽喉湯藥總不及。專於此科者。非刀鍼末藥。救
人傾刻之間。若胸無成竹。通套之方。誤人非淺。斷斷不可為喉
科。余治風熱陰虛。失音咽痛。不下數千計。然真急喉風。見二三
而已。

余聞常熟東鄉。小孩喉風痰上壅。聲如拽鋸。歸姓醫。用桐油。雞
雞羽攪喉中吐之。而愈。此亦喉風之輕者也。真喉風。他醫亦用
此法。雖吐而無效。所以咽喉專科。斷不可缺。

外證醫案彙編

卷二 口部 咽喉

喉症之始。苦寒之劑。當慎。喉症在急。刀針不可不用。余同鄉某
宦。使女喉痛。瘍醫進以苦寒直降。猝然寒熱止。喉腫秘塞不通。
又以土牛膝汁等灌之。更不得入。飲不能入。言不能出。喉中痰
鳴。已一日夜。是日邀余診之。細視喉四圍。脹腫無隙。可通呼吸。
與其飲。搔手而已。問其語。點首而已。呼吸不爽。藥不得入。無法
可施。余即將喉鏡。露鋒一分半許。刺其兩傍腫處。十餘刺。出其
毒血。再用棉條。用之棉條。用篦兩只。將棉條頭夾住。捲緊。按上
用冷水濕軟。拭去惡血。再將篦連濕棉條。捲緊。探其喉。作嘔吐
出膠痰。半梳。再刺。再探。吐共刺三十餘。探吐三次。共嘔吐血
痰一梳。以涼水漱口。條去。飲以淡鹽湯。即可。下言語亦可出。

腫亦漸消。此乃腫秘痰塞。若不動刀針。探吐血痰。挾延半日。呼
吸不通。痰涎湧塞。豈有生理。喉科。刀針斷不可缺。專恃湯藥。點
滴不入。無所用耳。

閱西醫。治喉腫秘塞。不能通呼吸者。在頸傍喉管。開一孔。插入
銀管。在頸傍。可通呼吸。華人罕見。少聞。以為奇談。余謂呼吸不
在喉。而在肺。肺氣通。喉雖腫秘。有鼻可通。一二日不妨。若肺氣
秘塞。鼻中亦無呼吸。雖頸傍開十孔。插入銀管。亦徒然耳。然肺
氣之秘。在痰。或熱甚。肺氣不肅。寒鬱。肺氣不開。津液不能散。陳
六府。潤肌膚。澤皮毛。不能為汗。為溺。皆化為痰。上溢。肺脹。葉
呼吸不通。性命立傾。所以頸傍開孔。插入銀管。透氣。有病之人。痛

外證醫案彙編

卷二 口部 咽喉

不能受。未免債事。喉腫秘塞。不若刺去毒血。探吐膠痰。為穩。如
能飲藥。瀉其肺中之水。痰氣一降。呼吸可通。雖腫亦可無妨。所
以外病治內。不可疎忽。
某宦女。素係寒體。中陽不足。便溏氣弱。因染疫寒熱。咽微痛。余
進以辛涼微溫開解法。覺發熱畧重。喉脹較甚。即更瘍科。進以
羚羊山豆根。金鎖匙。梳等。苦寒清熱。寒熱即止。脈細。紅痧隱
於皮膚之裏。舌膩不渴。神煩昏憤。咽痛極甚。目珠上視。或目珠
轉旋。手足抽掣。脊脊角弓反張。言語不出。已成痙厥之險。邀余
診之。即以至寶丹。研細。以化痰開肺之品。合竹瀝薑汁。調勻。灌
之。痰止。厥平。後以化痰宣肺和緩。緩治之。七八日。喉中吐膿

血而痛緩始終二十餘日未能見一寒熱紅疹隱隱未得透發此早服寒藥失表之症後傳染數人余急先開表辛涼外解使其得汗用喉刀刺其脹處出血三四日得汗後熱止痧透咽痛亦平未有遺如此危險者所以瘟毒溫邪之始苦寒當慎恐熱逼不透變症厥也

余同鄉某假館廣東至京都朝考廣東嵐瘴濕熱疫毒熏蒸又兼輪船煤氣熏灼兼之飲食皆需煤火熱鬱咽喉腫痛京中之醫治以玉女煎重劑一服而平朝考畢回南咽喉又痛兩傍作腫余以輕揚解散普濟消毒加減飲之覺發熱較甚喉腫亦增病人云素體陰虛切不可服發散因京中服玉女煎一劑而平

外證醫案彙編 卷二十 咽喉 四

若不暇滋陰生地石膏等斷不得愈定非溫疫喉痧也余一時眩惑徇病人之情亦投以玉女煎去牛膝加甘涼之品自此寒熱止舌膩痧疹隱隱不出脈變滯晨清晡甚至夜嚔語煩躁不寐咽喉更痛雙蛾作脹濕邪蒙蔽有作瘰之勢余曰先誤於京醫之玉女煎過熱在裏再誤於余之玉女煎更秘其熱不出濕邪上泛病變濕溫一徇病人之情即遭此危險其權在醫豈可徇情疑惑哉即進二陳溫膽法加枳椇藿香苦溫芳香三四劑亦無大效再將喉刀刺出毒血將前方加以苦溫化濕淡以洩熱藥內沖生薑汁半酒杯服後喉痛即止後服燥濕洩熱十餘劑而愈用藥一誤挽回如此費力耳 余聽鴻注

外證醫案彙編卷三 上海圖書館

陽湖趙能靜先生閱 陽羨余景和聽鴻甫編輯 會稽孫思恭順齋甫校刊

外部

○流痰

宜興張 高年營血不足寒痰滯絡右臂漫腫無頭皮色不變此屬流痰和營化痰法

歸身 羌活 橘紅 瓜蒌 土貝 白芥子

薑夏 獨活 鈎藤 桑枝

覆方 流痰根盤漸收痰亦稍減肋痛依然乃高年血竭不能營

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰

養經絡所致再擬和血消痰順氣之法

歸身 半夏 川斛 枸杞 旋覆花 鈎藤 橘紅 新絳 青蔥 天花粉

平望翁 氣阻流痰由肝肺兩絡受傷以致胸肋刺痛不時氣逆治宜理肺和肝佐以化痰冀其鬆機以免潰毒之慮

春柴胡 青皮 旋覆花 枳殼 桑葉 半夏 烏藥 廣木香 蘇梗 通草

鮮佛手

無錫時 勤勞不節兼受六淫之氣血脈凝滯成為流痰脈花瀉背臂瘡瘡皆屬逆軟勿輕視之

附子 兔絲 石斛 廣皮 紅花

丹參 杜仲 木瓜

覆方 病情前述。今不贅語。今脈形皆見虛象。轉旋維艱矣。再擬生脈散意。以圖吉人天相。

北沙參 川石斛 橘白 稽豆皮 穀芽

五味子 麥冬

痛波韓 陰虛內熱。而患虛損流痰。脊椎六七節。骨形突出。已現瘡勞之象。收功難許。

人參 白芍 北沙參 黃耆 鱉甲

料豆 川石斛 浮小麥

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰 二

濮院朱 手腕流痰。

黨參 丹參 川貝 川斛 棗仁 茯神

橘紅 黃耆 浮淮陳小麥

楊州王 腰痛已久。按之有塊。防成虛損流痰。

虎骨 杜仲 當歸 黨參 兔絲子

續斷 製首烏 懷牛膝 枸杞子 胡桃肉

青浦龐 病後營虛。客邪乘入。肩背漫腫。作痛。此屬流痰。一經潰破。非計月可愈也。

雲茯苓 金釵石斛 洋參 黑料豆 木瓜

鱉甲 橘紅 沉香 大豆黃卷

松江任 勞傷筋骨。痠痛不已。延久必損。流痰頑證。

鹿角霜 木瓜 續斷 廣橘紅 杜仲

原紅花 茯苓

潯關范 寒熱傷營。脈來弦滑。誠恐流痰復起。有根之病。一時難效。

茅朮 廣皮 草薺 茯神木 秦艽

葛根 苦參 絲瓜絡

乍浦王 重感時邪。致發貼骨流痰。但年小症重。恐難勝任。法當溫通氣血為主。

枸杞子 廣木香 廣皮 蘇梗 丹參

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰 三

半夏 鈎藤

金華周 流痰腫堅且硬。日漸長大。皮色不變。起有兩月有餘。此係本原不足。風火挾痰。互結而成。治之最難消散。

鱉甲 夏枯草 昆布 茅茹 青蒿

萊菔子 海浮石 象貝

七保梅 三陰虛弱。氣機有阻。以致左腿漫腫。形如覆碗。成為虛損流痰。延綿半載。肌肉消瘦。節骨突出。已入瘡癆之候。姑擬毓陰。聊作保持之計。

北沙參 鱉甲 黃耆 黨參 女貞子

杜蠟 天橘葉 沙蔞藜

陽春孫 內股流痰

柴胡 青支 土貝 粉甘草 半夏麩

廣皮 連翹 忍冬藤

黃浦宣 流痰

鹿角霜 廣皮 土貝 連翹 青皮

當歸鬚 生牡蠣

湘潭王 先斷脊梁。後發流痰。勢必潰腐。乃素係本原虧怯。痰凝氣滯而成。診得脈來細數。胃氣呆鈍。漸入瘡瘍之例矣。難治之證。莫斯為甚。

黨參 茯神 焦神麩 鱉甲 川貝母

外證醫案彙編 卷三 外科 流痰 四

白朮 料豆 川石斛 扁豆 大豆黃卷

吳江唐 流痰由肝鬱所致。木腫堅硬。遲延失治。且多反覆。一經潰破。非計月所可愈也。

黃耆 廣皮 川石斛 杜仲 黨參

川貝 甘草 川續斷 煨牡蠣

柳橋陳 勞傷氣血。致患流痰。正虛邪實。以消為難。

黨參 黃耆 杜穀芽 川石斛 棗仁

茯神 宣木瓜 青藿香

覆方 脈數身微熱。胃氣困倦。急須扶正。冀其潰後。胃氣甦復。再無變證。方有回生之路。

黃耆 黨參 料豆 五味子 炙鱉甲

棗仁 白芍 川石斛

蘭溪朱 寒熱胸悶。飲食漸減。左有漫腫作痛。防生流痰。

半夏麩 枳殼 木瓜 石斛 鈎藤

沉香 茯神 絲瓜絡 川貝

震澤范 流痰已成。破之難愈。

連翹 蘇子 沉香 枳實 砂仁 柴胡

橘皮 烏藥 川石斛

宛平郝 氣血有虧。濕痰滯絡。左腿漫腫作痛。皮色不變。此為流痰。宜補元滲濕。佐以消痰。

外證醫案彙編 卷三 外科 流痰 五

黨參 炙黃耆 陳皮 半夏 木瓜

丹參 青木香 土貝 川石斛

覆方 痛緩腫減。頗有消兆。

黃耆 黨參 赤苓 冬朮 陳皮

土貝 青木香 川石斛

青浦顧 流痰發於腰下。此屬氣阻。法宜通導。

老蘇梗 查炭 陳皮 鈎藤 沉香

瓜蒌皮 橘葉 青皮 大麥芽

杭州金 先已脊斷。繼發流痰。內膿郁郁。聽其自破。係先後天不足所發。刻論證參脈。見象極虛。縱乞靈藥石。誠恐無補。

北沙參 川石斛 廣皮 鱉甲 川貝母

淮山藥 白芍 木香 扁豆

東山席 環跳漫腫。隱痛遷延已久。此三陰虛。濁痰凝滯。釀成虛損。流痰。不可使潰。潰則難痊。

洋參 石斛 地骨皮 秦艽 川貝母

料豆 棗仁 薏殼

金澤凌 虛損流痰。破經旬日。膿流脈數。鬱熱蒸蒸。盜汗淋漓。胃陽困頓。亢陽無制。又值酷暑之令。久病之軀。支持不易。且擬和胃。涵陰。以博轉機。

人參 川石斛 黃耆皮 橘白 穀芽

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰 六

料豆 五味子 小麥 大豆黃卷

覆方 胃氣稍甦。盜汗略減。身熱得涼。甚屬佳兆。惟脈來仍數。膿色原清。肢節痠爽。伸縮自如。未免津液消耗。當仍陰陽並顧。再候轉機為妙。

人參 黃耆 製首烏 鱉甲 銀柴胡

棗仁 甘草 川石斛 稽豆皮

上虞郭 流痰潰久。脂水淋漓。津液日耗。診得左脈。關弦而細。兩尺無神。甚屬虛象。始擬補元。徐圖收效。

製首烏 川貝 北沙參 珍珠粉 料豆

女貞子 茯神 丹參

黃柏坂子 骨蒸鼻熱。而患流痰。已屬虛損之候。一經潰破。便難調治。

北沙參 川石斛 鱉甲 青蒿梗 銀柴胡

橘白 川貝 稽豆皮

朱家角范 流痰潰破在通。宜補托兼施。

熟地 黨參 川續斷 白芍 歸身

棗仁 黃耆 左牡蠣

興化沈 背部漫腫。色白。頭發不一。症屬流痰。脈來細軟。盜汗不止。正虛邪實。急須補托。潰後如無變遷。徐圖收功。

鹿角尖 棗仁 川石斛 黨參 枸杞

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰 七

五味子 橘白 大麥芽 炙黃耆

青浦方 流痰。繞臂漫腫。潰頭不一。形脈皆虛。縱好調治。還須靜養。收效之期。以待來年。

黃耆 承仁 赤苓 穀芽 車前子

橘白 白朮 川石斛

湖州凌 三陰虛熱。腹痛。背脊漸高。恐發流痰。以平托治之。令其消散。

生白芍 穀芽 查核 料豆 生鱉甲

川石斛 麥芽 藿梗 青蒿梗

青浦柳 素喜膏梁厚味。熱聚於中。濕困於脾。痺阻經絡。始起左

肩臂痛。體則下引。腿足痠楚。且難屈伸。昨因刺鍼後。痛勢稍緩。頃診脈象。右手細軟。左手弦細。兼數。似屬氣血兩虧。痛久必成流痰。擬養血和絡。佐以清熱之法。

枳椇仁 茯神 木瓜 青木香

桑椹子 丹參 廣皮 煨葛根

陳墓穠 稚年弱質。左膝腫痛。步履艱難。有流痰之慮。宗大筋軟。短。小筋弛長之法。為治。

北沙參 秦艽 丹參 菟絲子 廣皮

懷牛膝 鈎藤 杜仲 左牡蠣 茯神木

太倉朱 流痰發於背脊。及環跳兩處。勢在作膿。法擬補托。

外證醫案彙編 卷三 外科 流痰 八

黨參 棗仁 川斛 牡蠣 淮小麥

黃耆 白芍 鱉甲 料豆

青浦舒 短足流痰。

宣木瓜 鈎藤 川石斛 白菟殼 蘇子

藿梗 橘白

覆方 煨木香 丹參 木瓜 半夏麩

穀芽 杜仲 川續斷

長安馬 流痰。脈弦濇。營陰虧損。議以和營化痰。

菟絲子 桑椹子 鈎藤 川石斛 生白芍

附洗藥方 全當歸 五茄皮 川芎 紅花

木瓜 艾絨 草解 獨活 桑枝 青木香

蘇州孟 寒熱久延。膝眼腫痛。膝為筋之府。能屈而能伸。係血虛。不能榮養筋絡。經脈空虛。寒濕著於肉裏。防發流痰。先擬疎解。

嗣商和益營衛。

羚羊角 川石斛 新會皮 青蒿梗

茯神木 忍冬藤 大豆黃卷

青浦曹 期門穴。漫腫作痛。脈象滑。乃肝膽蘊熱。濁痰凝滯而成。難以消散。

天竺黃 川貝 鈎藤 絲瓜絡 陳皮

枳椇子 茯神

外證醫案彙編 卷三 外科 流痰 九

覆方 蘇子 天竺黃 茯苓 真橘葉 川貝

新會皮 川石斛 絲瓜絡 黨參

虎邱顧 三陰虧損。虛熱不已。脊梁漸曲如弓。環跳形腫如椀。皮色不變。已成流痰。虛證。但期無潰為吉。潰則元氣愈虛。便難收效矣。

製首烏 鱉甲 鈎藤 桑椹子 川石斛

茯神 川貝 料豆皮

覆方 流痰高腫。緣正虛邪實。勢必潰破。破後損怯堪虞。議毓陰補托法。

金石斛 黃耆 洋參 扁豆 川貝

補托法。

金石斛 黃耆 洋參 扁豆 川貝

補托法。

金石斛 黃耆 洋參 扁豆 川貝

補托法。

五味子 茯神 棗仁 牡蠣

沈 年歲壯盛。腕有氣。瘦。噯噯震動。氣降乃平。流痰未愈。畢九腫

硬。今入夜將寐。少腹氣衝至心。竟夕但寤不寐。頭眩目花。耳內

風雷。四肢麻痺。肌腠如刺如蟲行。此屬操持怒勞。內傷乎肝。致

少陽上聚為瘕。厥陰下結為疝。衝脈不靜。脈中氣逆混淆。氣燥

熱化。風陽交動。營液日耗。變亂種種。總是肝風之害。非攻消溫

補能治。惟以靜養。勿加怒勞。半年可望有成。

阿膠 細生地 天冬 茯神 陳小麥

南棗肉

萬 診脈數。左略大。右腰牽絆。足痿。五更盜汗即醒。有夢情慾則

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰

遺。自病半年。脊椎六七節。骨形突出。自述書齋坐臥。受濕。若六

淫致病。新邪自解。驗色脈推病。是先天稟賦原怯。未經克旺。肝

血腎精受戕。致奇經八脈中。乏運用之力。乃筋骨間痛。內應精

血之損傷也。

人參一錢 鹿茸二錢 炒杞子三錢 當歸一錢 柏茴香一錢

紫衣胡桃肉 兩枚 生雄羊肉腎 兩枚

流痰者。方書皆云流注。流者流行。注者住也。人之氣血與天地

合同。周流不息。循環無端。內經云。天宿失度。日月薄蝕。地經失

紀。水道流溢。經路不通。五穀不殖。民不往來。卷聚居邑。則別離

瘧氣血猶然。氣滯血壅。則生癰腫。以癰疽概而言也。氣血注而

為癰發無定處。隨在可生。八九四五二三塊不等。無穴可以立

名。故曰流注。先哲已有深意焉。吾吳中皆曰流痰。更有精義。人

之津液。灌溉肌肉。經絡筋骨之間。如天地之水。無微不到。遇隙

即入。遇壅即歸。一有壅滯。阻而不行。經脈滯而不通。衛氣歸之

不得。復反肌肉。脈絡骨節骨空等處。一有空隙之處。津液乘虛

滲入。如水之遇隙而入。遇壅而歸也。如海道迴薄之處。蓄則凝

結。為痰氣漸阻。血漸凝。流痰成矣。痰阻於皮裏膜外。氣多肉少

之處。無血肉化膿。有形可憑。即成痰塊。痰胞。痰核。痰癧等症。痰

凝於肌肉。筋骨。骨空之處。無形可徵。有血肉可以成膿。即為流

痰。附骨陰痰等症。況流痰一症。脾虛濕痰。凝滯最多。或病後餘

外證醫案彙編 卷三 外部 流痰

毒稽留肌肉之內。或感後寒氣。襲於經絡之中。或因氣阻。或因

血凝。若正氣盛。陽氣宣通。隨阻隨散。正氣虛。經脈凝滯。隨注隨

壅。屢發屢止。或潰或愈。雖云外證。俱從內生。為內科者。不得不

究心焉。立方無一定章程。何也。天有寒暑。地有燥濕。人有虛實。

病有新久。部位有上下之分。經絡有藏府之別。年有長幼。強弱

症有陰陽。淺深。今數百方中。採擇妥善。醇正之方。四十九首。用

藥總總不同。寒者溫之。熱者清之。虛者補之。堅者軟之。結者散

之。損者益之。氣滯理之。血瘀行之。痰凝消之。臨時施治。隨證變

通。如作文之平淡奇濃。諸法悉備。潛心契默。滿紙玲瓏。開圓活

靈動之法門。化拘滯偏執之津梁也。質之高明。勿以平淡而忽

諸余德鴻註

外證醫案彙編

卷三 外部 流痰

十三

背部

發背

東山王 心火妄動。疽發於背。所慮瘡不起發。形勢平塌。法當內
外疎通。使毒氣分洩。庶不內陷。

黨參 茯苓 甘草 赤芍 地丁草

黃耆 杜仲 銀花 角鐵 連翹

同里朱 年逾六旬。背疽大逾徑尺。殊屬駭人耳目。幸脈數有力。
腐亦易脫。確為順候。調補得宜。指日可愈。

黃耆 茯苓 遠志炭 黨參 甘草

川斛 首烏 川貝母 穀芽 銀花

外證醫案彙編 卷三 外部 發背 十三

金澤衛 背部平塌。堅硬不化。是屬陰候。法擬助陽補托。以冀回
陽續絕。

黨參 枸杞 遠志炭 石決明

黃耆 陳皮 甘草節 皂角針

常熟秦 發背如盆。氣分大虧。所以膿不甚多。脈來細軟。高年得
此。決非輕候。

黨參 冬木 黃耆 官桂 皂角針

熟地 茯苓 甘草 筍尖 淡菴容

苗墩尤 老年忽發背疽。但腫不紅。此血氣衰弱之徵。非速愈之
症也。姑擬補托以進之。再察端倪。

黨參 茯苓 當歸 銀花 青蒿梗

黃耆 玉竹 甘草 角針 六一散

上海姜 背疽經旬。尚未化腐成膿。不甚焮腫。慮傳陰分。治宜開

洩回陽。以冀腫高毒化為轉機。

羌活 廣皮 厚樸 遠志炭 防風

青皮 藿香 扁豆葉

接服方 熟地 沉香 廣皮 白蔻殼

泡薑 艾絨 紅花 藿梗

橫淫嚴 勞力之體。風餐露宿。歷中六淫之氣。發疽於背。平塌不

起。寒熱胸悶。此乃邪毒內閉。法擬祛邪化毒。可望旦夕取效。

外證醫案彙編 卷三 背疽 發背 五

青蒿梗 遠志肉 黃耆 廣皮 白蔻殼

六一散 紅花 甘草 銀花 阜角絨

天花粉

木潰翁 肝氣內鬱不舒。鬱火內熾。致發背疽。肉色紫暗不榮。堅

硬漫腫。不痛無膿。破流血水。形如割雞。兼發餘癰不一。此乃肝

陽受傷甚矣。治之棘手。殊費調停。

澄香 青皮 遠志肉 石決明 廣皮

甘草 銀花 青藿梗 半夏麩

末藥方 硃砂 珠子 牛黃 川貝 萊豆粉

丹陽潘 胸悶不舒。脾不健運。乃生背疽。根脚散漫。外皮雖腐。內

堅不潰。膿血腥穢。不整納少。燥此屬脾土困。敗脾主肌肉之

生化之源。姑擬培養脾胃。以食進腫消為泰兆。

人參 茯苓 金石斛 沙米 穀芽

黃耆 甘草 川貝母 廣皮 筍尖

青浦易 年逾七旬。元氣已虧。背疽隱陷不起。殊為可慮。

梨附片 黨參 茯神 角鍼 黃耆

鹿角霜 枸杞 廣皮 甘草節 遠志炭

平望呂 背疽伏隱。神怯脈軟。溺痛淋瀝。乃陰虧陽微。溫邪與敗

精俱陷也。法擬滋腎丸意治之。未許必竟中機。

肉桂 熟地 琥珀 淡菴容 甘草梢

外證醫案彙編 卷三 背疽 發背 五

黃柏 黨參 茯神 升麻炭 草薢

○蜂窩發狀如蜂房 附註

八圻鄭 疽發於背。上至肩脊。下連腰脇。腫若瓜形。頭如蜂房者

十餘處。按脈洪大。尚於證合。可為順兆。擬托理消毒主之。

細生地 甘草 銀花 角鍼 赤芍

生黃耆 連翹 丹皮 土貝 筍尖

崑山馮 背疽形如覆盆。始以忽視。遂致燎原莫遏。脈來細軟無

力。膿腐難脫。界限未分。蜂窩未透。胃氣頗鈍。此藏陰虧。府陽易

困矣。勉擬助陽化毒。約食胃甦為轉機。

黨參 廣皮 紅花 枸杞 鹿角尖

黃者 川貝 半夏 筍尖 遠志炭

覆方 界限未半。蜂窩已現。膿腐略脫。按脈雖細有力。似有鬆兆。但胃氣未甦。痘色深滯。乃毒邪深固。驟難載之使出。所謂舟在

波中。收帆未定也。仍議溫托。以望納穀有加。方是佳音。

鹿角尖 生黃者 炙黃者 蘇子 茯神

潞黨參 棗仁 半夏 廣皮 砂仁

鮮穀子露代水煎藥

再覆方 腫收毒化。腐脫新生。飲食較前增納。是為順候矣。

人參 黃者 茯神 銀花 半夏

甘草 蘇子 枳椇 砂仁 花粉

外證醫案彙編 卷三 背部 蜂窩發 六

蓮子發 即太陰疽。腫積熱為多。生肩脾內。以其形而言也。

嘉善何 搭手疽潰。沖突高腫。上至肩項。下連腰脇。腐脫成片。膿

流作孔。形如蓮子。潰雖半背。尚屬順候。擬清化中。寓以補法。

黨參 甘草 穀芽 陳皮 花粉

黃者 銀花 土貝 赤芍 白朮

對心發 生於背。徑對前心者。是也。詳註

青浦褚 對心發背。其勢極重。所幸藜藿素居。可卜慶生有兆。

黨參 紅花 白蔻殼 陳皮 遠志

羌活 青皮 石決明 角鐵 藿梗

搭手 即偏發背。詳註

周莊成 年逾六旬。搭手疽。不能高發。頭雖腐。而膿未成。洩神識

昏潰。有內陷之兆。姑擬清理托毒。以參消息。

羌活 新會皮 藿梗 筍尖 石決明

甘草 遠志炭 青皮 蔻殼

覆方 瘡形得起。神識得清。是乃佳兆。惟皮色不變。板滯不潤。膿

毒未見蒸化。邪毒留戀於內。必須溫補化毒。方有鬆機。

黃者 首烏 砂仁 遠志 鹿角片

甘草 杞子 茯神 白芍 新會皮

再覆方 新肌已露。腐亦盡脫。元氣已虧。宜慎調理。

黨參 黃者 歸身 五味子

外證醫案彙編 卷三 背疽發背 搭手 七

茯神 白芍 砂仁 製首烏

腎俞發 即腰疽。又名連腎發。詳註

方基衷 腎俞發。由腎精虧損而成。毒其紅活高腫。猶為順候。擬

養榮湯。主之。

黃者 茯苓 白芍 白朮 陳皮

北五味 遠志炭

下背疽 即對背發。詳註

青浦唐 下背疽。平塌不起。法宜溫化。以望轉機。

沉香 陳皮 黃者 泡薑 蔻殼

枸杞 紅花 甘草 遠志炭

丹毒發 此症多服丹藥膏藥者方所歎也

周莊錢 背疽半腐半斂根脚紅暈防發丹毒切勿輕視

黃耆 棗仁 陳皮 川石斛 砂仁

茯苓 甘草 荷梗 淮山藥

南翔張 搭手腐未盡脫毒尚未清誤投溫補以致寒熱昏憤幸起丹毒不致內陷擬清解管分

忍冬花 赤苓 白芍 花粉 連翹

粉丹皮 犀角 小梳 紫花地丁 生地黃

肩井發 即上搭手也註

楓涇池 肩井及外股兩處發疽頭雖腐而毒未洩是以紅痛不

外證醫案彙編 卷三 背疽發毒丹毒發毒十八

減又見紅痢腹痛後重胃減脈軟此皆暑濕之邪內干脾胃外留經絡所致擬清暑和中并兼托毒

黃耆 赤苓 米仁 藿香 遠志炭

陳皮 甘草 六一散

背脊中屬督脈兩傍屬足太陽脈督脈從尻骨後上行背脊中直上顛頂足太陽脈從目內眥上額交顛至耳上角後行下項循肩髀內分二道一道俠脊傍開寸許一從腰下貫臂入胸中一道從肩膊下俠脊傍開三寸下過髀樞循髀外合胸中至足小指外側而終五藏六府之俞皆在脊之兩傍足太陽之部位發背生於正者易治生於偏者難治正者督脈為十二經之

統脈自下而上主一身之陽屬陽證者氣血上衝易起易斂

偏者屬足太陽脈為六經之首領北方寒水之位自上而下氣

血下流屬陰證者易陷易塌又兼藏府之俞皆在其間背疽

者皆由內而外發五藏根本皆繫於背唐太宗有免鞭背之刑

背上受傷關係藏府肺俞在第三椎生於上者則傷肺心俞在

第五椎肝俞在第七椎膽俞在第八椎生於中者則傷心於肝

脾俞在第九椎腎俞在十二椎生於下者則傷脾於腎汪省之

曰背疽令患者兩手上下左右摸之搭著者以搭手治摸不著

者正真發背余以兩手摸之滿背皆搭著豈滿背俱是搭手而

無發背耶發背者背疽之總名也搭手對心對臍腎俞蓮子峰

外證醫案彙編 卷三 背疽發毒 十九

窩椒眼者背疽之別名也臨證之時先驗其偏正上下左右部

位即知屬於何藏再思其發於何因或陰虛火盛或醞酒厚味

或怒鬱房勞或丹石熱毒或風寒滯絡再辨其證之陰陽虛實

紅活黯帶高突陷塌再診脈之虛實人之肥瘠胃氣強弱神識

清爽煩悶昏憤天時寒暑內外並參細心玩索隨證立方循理

用藥臨時施治辨症明了如能絲絲入扣巧自生矣今輯二十

七方管窺之論存待高明之士更從而正之鄙人之願者矣

馮註

余習業費蘭泉師處談及孟河巨富葉姓年近耳順素喜醞酒厚味身胖肉厚正值酷暑而發背疽長尺餘闊七八寸延費士

源首、吾師之祖也。服藥治內，延沙達周先生治外，治之而月
 膿潰腐脫，瘡沿漸平，新肌如蓮子色，嫩紅如珊瑚。胃氣甚強，惟
 瘡口不能收束。士源前輩服藥數十劑，皆和胃利濕清暑，極平
 淡之方。沙曰：瘡口不收，非用大補，難已。生肌奏效，費啜之仍以
 苓朮、苧米、藿梗、荷梗、二陳等類。沙急曰：若不用補，豈能速效？嘗
 笑曰：患者早食蓮子紅棗一椀，午飯海參煨肉一椀，正在濕感
 之時，利濕清暑和胃尚且不及，倘服參耆溫補，碍氣血壅塞，
 助火內燔，瘡色泛紫，胃氣一敗，神識昏憒，變症眉睫，禍且不測
 矣。况二人兼治一症，功過平分，幸勿憂也。先生治外雖精，內科
 未能講究，沙乃佩服，共服藥百餘劑，未服一劑，溫補而痊。孟河

外證醫案彙編 卷三 背部 發背案 于

沙達周先生瘍科名重一時，尚未講究內科。今時之瘍科，未知
 考究內科何如耳。所以人以胃氣為本，五穀為養，五果為助，五
 畜為益，五菜為充，五味調和，補益精氣，不可不知。余聽鴻誌
 孟河葉沛三先生橫橋看一開肉鋪者，身上流痰十餘塊，潰後
 口裂，黑色根盤內，瘡硬不知痛癢，無膿流水，肌肉皆削，胃氣索
 然。患者曰：我戒口多時，胃氣日敗，不知能補食葷腥。沛三先生
 曰：思食胃氣尚旺，肉鴨稍可食之。患者曰：若能開葷，死亦瞑目。
 看其病情，多服寒涼，凝結氣血所致。投以金匱腎氣湯，月餘，肌
 肉轉紅，漸軟作瘰，至兩月後，先生再至橫橋，見一人體肥貌豐，
 叩謝，送香銀廿枚，曰：再進之恩，終身不忘。先生覩面不識，問其

原委，從開葷之後，胃日健旺。一方服六十餘劑，瘡平肌復，所以
 外症以胃氣為本，胃以喜為補。若各物禁之，寒涼剋伐，戕胃或
 溫補壅塞，助火聖人云：盡信書，不若無書。臨症變通，方為上工。
 余壬午秋，至琴川，有張姓，身上數十孔，大如錢，色黯肉爛，流水
 無腥穢味，不知痛癢。肌肉瘦削，人皆謂楊梅瘡。余曰：寒涼凝結，
 出前醫之方，俱苦參、黃柏、木通、翹、梔、苓、連、土、茯苓等類。因戒口
 極盡，使其開葷。從先生金匱腎氣法十餘劑，後服溫通氣血之
 品，廿餘劑而痊。後遇數症，應手皆食。先生之德，故記於此，聊志
 感仰之意。余聽鴻誌

外證醫案彙編 卷三 背部 發背案 于

蘇州一小兒，甫九齡，頗聰慧，而患流注，肩背腰脇十餘處，百端
 醫治無效。余視之，曰：此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸，未破
 者消，已破者收口。更服補氣血之藥而愈。蓋流注一症，由風寒
 入膜所致。膜在皮中，旁通四達，初無定處，以所隨處作患。此真
 絡脈之病。故古人製大活絡丹以治之，其餘煎丸皆非正治。所
 謂一病有一病之法，藥不對證，總難取效也。徐泗溪
 本色劉近曾夫人，患虛痰流注，色脫脈虛，發無定處，病極陰危。
 非旦夕可奏功。余辭不能治。郡中一醫以百金包好，因留在家
 治之。聞余有不能治之說，笑曰：我醫好後，更請徐君質之。當無
 言可對耳。月餘，劉君之兄元谷招余診視。近曾出口，流注之疾
 雖向愈而未收口。託在相好，肯一觀否。余因視之，肩後瘡孔大

如錢內膜乾空。與皮不連。氣促脈微。診畢而出。近曾求方。余笑不答。書危在頃刻四字。劉不信。少頃。內呼劉父子入。已氣絕矣。羣執包好之醫。欲加以無禮。余曉之曰。此病本不治。非藥誤也。但不知生死為無目耳。乃釋之。蓋流注之證。其類不同。大段皆津液枯。而痰流膜內之症。當內外交治。而祛邪補虛。亦另有切病方藥。靈補無益也。徐河漢

嘉善張卓年。未弱冠。患流注五年。自脇及腰腿。連生七八孔。寒熱不食。僅存人形。歷年共服人參二三千金。萬無生理。父母先亡。只有慈母。其伯悉收其田產文契。專待其斃而取之。其從兄汪千。造余家。哀懇。余頗憐之。破格往視。半身幾成枯骨。此乃虛

外證醫案彙編

卷三 背部

發背案

三

痰流注。醫者不能治其經絡之痰。徒費重資。而一無中病者。則藥之誤。而非病之真無治也。余用大活絡丹為主。而外敷拔管生肌之藥。醫者聞之。大笑曰。活絡丹。平暴之藥。豈可入口。蓋彼惟知俗本所載。烏頭蚯蚓之活絡丹。而不知古方。五十餘味之。大活絡丹也。蓋流注之痰。全在於絡。故非活絡丹不效。以後膿稀肉長。管退筋舒。漸能起立。不二年。而肌豐肉肥。強健反逾於常。嗚呼。不知對病。徒事靈補。舉世盡然。枉死者不知其幾也。徐河漢

王孟英曰。大活絡丹。治虛痰流注。深為合法。而外科不知也。若實痰控。延丹最妙。

聖濟方五十味。大活絡丹。如無聖濟方。徐河漢醫書六種錄在。洞庭吳姓。從徐州經紀返棹。背起粟粒。深紫色。而痛應心。周圍軟肉。皆不仁。知非輕證。未至家。而就余治。余辭不能。再三懇求。姑用圍藥束之。稍定。病者曰。我尚未到家。當歸處分家事。求借一廛。如果不治。死無餘憾。歸二日。而復來。其瘡不甚大。頂微高。而堅黑。當用刀挑破。方可上藥。以洋刀點之。洋刀堅利。非凡竟不能入。用力挑之。刀頭折。乃用金鍼四面刺之。以洩毒氣。內托

外敷。其方屢變。然膿從四旁出。頑蓋自落。約深半寸。脊骨隱露其尖。腐去。急以生肌散填補之。內服峻補之劑。兩月而內滿皮完。此九死一生之證。不早為外束內托。則焦骨攻藏。無生理

外證醫案彙編

卷三 背部

發背案

三

周莊陸姓。疽發背。周徑尺餘。一背盡腫。頭以百計。毒氣內攻。沉悶昏迷。醫者以平塌無頭。用桂附托之。余曰。此瘡止宜收小。若欲加高。則根盤如此之大。而更加高。則背駘栲棧矣。此乃火毒用熱藥必死。乃以東根盤。提毒之藥敷之。一夕瘡頭俱平。皮膚亦潤。止有大頭如杯。高起於大椎骨之下。大三寸許。尚不思飲食。惟求食西瓜。醫赫以入口。即死。余縱其所食。一日之內。連喫兩個。明日知飢。欲求飲食。肉四兩。飯半碗。明日更加。始終用托毒清火之劑。而膿成口斂。余囑曰。此疽初起。盈背。背中脂膜皆空。非填補裏膜。必有他變。有庸醫獻媚曰。病已全愈。為此說者。

國厚謝耳。我力能保之。病家利其省費。從之。至來年三月。忽患
疝中。一細眼流血不止。放血斗餘。兩日而卒。蓋其前一背盡腫。
其中之脂膜俱化成膿。從大口出盡。庸醫安知治法。貪利誤人。
富貴之家。往往最信此等人。可不察耶。徐河漢

郡中。唐廷發。偶過余寓。時方暑。謂背上昨晚起一小瘰。搔之甚
癢。先生肯一看否。余視之。駭曰。此對心發也。唐不甚信。曰。姑與
我藥。余曰。君未信余言。一服藥而毒大發。反疑我誤君矣。含笑
而去。明日已大如酒盃。而痛甚。乃求醫治。余曰。此非朝夕換方
不可。我不能久留。君奈何。因就醫余家。旦暮易法。其中變遷
不一。卒至收口。其收口前十日。忽頭痛身熱。神昏譫語。瘡口黑

外證醫案彙編 卷三 背部 發背案 五

陷。六脈參差。余適出門。兩日歸而大駭。疑為瘡證變重。幾無可
藥。細詢其僕。乃貪涼當風。而臥瘡口對風。膏藥又落。風貫瘡中。
即所謂破傷風也。乃從外感治法。隨用風藥得汗而解。身涼神
清。瘡口復起。仍前法治而痊。若不審其故。又不明破傷風治法。
則必無效。惟有相視莫解而已。徐河漢

余幼時在孟河。見吾師曹秋霞先生。三弟名煥美。風寒虛痰入
絡。肢腿隱痛。彼因自開藥肆。妄自立方。以參耆鹿膠杞仲附桂。
熟地溫補之品。服三四劑。痛甚。服至十餘劑。四肢癱瘓。不能動。
肌肉如死。不知痛癢。二便遺之滿床。後延馬培之先生。及其大
少君。送亭兄診視。曰。風寒虛痰阻絡。被膩補碍塞氣機。營衛不

通。已成壞疽。不治之病。後延之市。遂骨節大肉。色既白。肉
潰。流粘水。肉如爛瓜。而斃。所以藥誦。此病死更速。更慘。余因流
注發背。為外科大症。錄醫案數首。以廣見聞。然溫補寒涼。細心
斟酌。倘一誤投。追悔莫及矣。余德鴻誌

外證醫案彙編 卷三 背部 發背案 五

肩臂部

肩疽

丹徒黃 肩挑傷絡。瘀凝為毒。與風濕治法不同。

柴胡

連翹 廣皮 青皮 歸鬚 半夏

土貝

甘草 木瓜 丹參 桔梗

肩疽生於足少陽膽經。負重氣血凝結而成。先生用藥從少陽進步。所謂引經之藥也。聽註

樂疽

休甯倪 腋上堅腫。痛引乳絡。由包絡血熱氣鬱而成。名為樂疽。

月餘不潰。頗屬頑證。

外證醫案彙編

卷三 肩臂部 肩疽樂疽

五

黨參

遠志肉 川貝 黃耆 川石斛

茜草

夏枯草 丹參 白芍 荷葉蒂

魚肚發

青浦顏 膈後垂肉。焮腫赤色。名魚肚發。擬行瘀化毒。

柴胡

桃仁 厚樸 杏仁 青皮

桔梗

廣皮 江枳殼

魚肚發生於心經之青靈穴。聽註

石榴疽

太倉邱 少陽相火。與外風相搏。肘尖患瘍。名曰石榴疽。以菊花

清燥湯主之。

生地

當歸 甘菊 麥冬 黃芩 川芎

白芍

知母 甘草 柴胡 升麻 土貝

地骨皮 犀角尖

肩臂瘡疽甚多。有羣書可考。縱不出癰疽治法。如治內症。傷寒不出六經。溫熱須辨三焦。外症亦然。今採四方。一經之症。皆有引經之藥。隨證加之。徒使發散托裏。誠恐無益。余時時註。

長興周某之子。臂生疽。經年膿水不乾。變為多骨。所食米粒。漸有從疽中出者。奄奄待斃。余為內托外敷。所服未藥。從瘡口出。

繼而膿漸減少。所出碎骨。皆膿結成。出盡之後。肌肉日長。口收。痂結而愈。徐泗漢

外證醫案彙編

卷三 肩臂部 魚肚發 石榴疽

五

乳疔腋肋部

乳癰

尤福徐 右乳紅腫作痛。脈數有力。此乳癰欲作膿也。擬神效瓜
羹散。

全瓜蒞 連翹 漏蘆 橘核 土貝

蒲公英 甘草 銀花 角鐵

木倉楊 乳房結核。由氣血相搏。因而成癖。以調和氣血。佐以清
解為主。

當歸 川貝 陳皮 川芎 山慈菇

白芍 蘇子 青皮 甘草 山查核

外證醫案彙編

卷三

乳疔腋肋部

乳癰

三

周莊錢 乳房紅腫。勢難全散。投以疎解。半托半化。

蒲公英 川芎 銀花 土貝 角鐵

青皮 甘草 橘葉

金澤宗 乳房作痛。惡寒發渴。此屬厥陰氣阻。

柴胡 赤芍 丹皮 萹仁 黃芩

連翹 枳殼 橘葉 蒲公英

陳墓李 乳傍木腫。已經半月。症屬外吹。以橘葉散治之。

柴胡 山柰 橘葉 陳皮 連翹

青皮 川芎 甘草 黃芩 蘆根

青浦朱 乳癰雙發。寒熱疼痛。但此毒令。以解毒利濕為主。

葛根 陳皮 厚樸 瓜蒞 枳殼

青皮 滑石 麥芽 扁豆皮

黎里施 乳塊雖鬆。姑置弗治。泛泛欲嘔。飲食漸減。是脾被肝賊。
且以養胃和肝為主。

半夏 白芍 茯苓 陳皮 伏龍肝

益智 金石斛 蔗漿炒竹茹

南翔周 肝胃不和。乳汁壅滯。結為乳癰。晝夜脹痛。正在蒸膿之
候。擬與清肝行乳。以冀膿洩痛減。

柴胡 新會皮 漏蘆 青皮 山查核

瓜蒞 蒲公英 麥芽 連翹

外證醫案彙編

卷三

乳疔腋肋部

乳癰

三

嘉定張 乳癰潰傳囊絡。穿頭不一。是肝胃之火。治宜清涼通乳。
指日可愈。

羚羊角 連翹 夏枯草 土貝

瓜蒞仁 銀花 大麥芽 甘草

崇明蔣 乳漏經年。膿水不絕。纏囊潰絡。脈形細澀。係產後血虛。
理宜補托。漏可愈矣。

洋參 石斛 丹參 川芎 充蔚子

黃耆 歸身 白芍 川貝

金澤許 乳中結核兩月。木腫不痛。名為乳癖。幸有哺乳。囊絡疎
通。法以化堅行瘀。該自消矣。

葛根 羌蔚子 青皮 夏枯草 麥芽
連翹 瓜蒌仁 陳皮 山查核 川貝
覆方 前方已過仍以此法繼進。

黃耆 青皮 夏枯穗 橘白 香附
上海金 乳裂愈而復發發而仍愈。小兒吮乳痛如鍼刺。乃肝胃
受熱之故。雖為小恙。治之非易。

生地 川芎 花粉 橘葉 熟羊角
當歸 白芍 白芷 藕汁 蒲公英

泗涇吳 右乳疼痛經旬。陽明氣阻。脈來弦急。欲作膿矣。擬托裏
外證醫案彙編 卷三 乳癰助部 乳癰
托毒。

煨芎根 川芎 鮮蓮房 王不留行
忍冬花 瓜蒌 蒲公英 角鐵
崇明葉 乳癰清後。膿出未盡。寒熱微作。屬陰虛生內熱。擬入珍
湯主之。

黨參 歸身 白朮 甘草 銀柴胡
生地 白芍 茯苓 川芎 新會皮

蘆墟沈 毓麟七月。乳上患癰。名曰內吹。破潰一月。膿水淋漓。四
圍餘腫未退。傳囊又發。治宜安胎化毒。
生地 瓜蒌 茯苓 甘草 銀花

荷葉 橘皮 川石斛
鴨村顧 懷妊六月。右乳嫩腫。作痛。名為內吹。宜安胎化毒。

柴胡 土貝 橘皮 蒲公英 甘草
黃芩 川芎 生地 製香附
湖州錢 乳癖。是肝脾二經氣凝血滯。結為癰毒。皮色不變。漫腫
無頭。宜和肝脾為主。

製香附 石斛 查核 丹參 廣皮
炙橘葉 川貝 白芍 竹茹

七堡陶 乳癰已久延不已。防其變漏。
黃耆 川芎 蒲公英 白芍 鮮荷葉

外證醫案彙編 卷三 乳癰助部 乳癰
三

花粉 廣皮 萱草根

咸澤周 乳癰作痛。肝火鬱也。
瓜蒌皮 橘核 夏枯草 川貝 枳殼
蒲公英 連翹 川棟皮 山梔 竹葉

震澤沈 肝氣抑鬱。宿患乳核。宜平肝解鬱。
川棟子 薄荷梗 香附汁 丹皮
瓜蒌實 青橘葉 夏枯穗 山梔

某 情懷悒鬱。肝氣不舒。患乳生癰。膿潰。血液大耗。氣蒸上逆。咳
嗽。左脇內痛。不能轉側。蓋肝絡少血內養。左右升降不利。清潤
治嗽無益。

炒桃仁 當歸 茯神 丹皮

柏子仁 阿膠

某 咯血後。左乳傍脹。愛氣始寬。是左升太過。右降無權。肝絡阻。塞氣為之痺也。

旋覆花 枇杷葉 新絳 一蠟

熟地炭 青蔥管 阿膠

沈氏 肝氣鬱遏宿痞乳癰。

川棟子 黑山梔 薄荷梗 香附汁

夏枯草 瓜蒞實 青橘葉 丹皮

劉氏 乳房為少陽脈絡經行之所。此經氣血皆少。由情懷失暢。而

外證醫案彙編 卷三 乳癰腫助部 乳癰 三

氣血鬱痺。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。竟成沉痾疾。非癰。膿之症。以脈不浮。數無寒熱辨之。

柴胡 夏枯草 歸身 白芍 川貝

茯苓 甘草

某氏 乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。恐產育。有年。釀為瘍症耳。

青蒿 丹皮 香附 橘葉 青菊葉

澤蘭 鬱金 當歸鬚

○乳巖

瀏河馮 左乳結核。積久方痛。肝鬱成巖。宜襟懷寬解。庶可帶病。

延年。姑擬益氣養榮湯。以觀機宜。

人參 茯苓 陳皮 川貝 當歸

川芎 黃耆 熟地 白芍 桔梗

於朮 甘草 製香附

臧澤許 乳中結核多年。不疼不癢。日漸高腫。脈來細澀。左關弦。甚。此乃肝脾氣鬱而成。難以消散。且以擬歸脾湯常服。庶不致潰。

黨參 冬朮 歸身 陳皮 遠志

黃耆 黃草 川貝 甘草 茯苓

嘉定林 乳癰之中。巖為難治。

外證醫案彙編 卷三 乳癰腫助部 乳巖 三

楓涇許 乳巖之症。皆由情志不遂。肝脾積鬱而成。現在潰爛。失血如壑。治之頗屬掣肘。倘能怡養性情。即延年上策。乞靈藥石。誠恐無補。

清阿膠 合歡花 棗仁 黃絹皮

金石斛 北沙參 茯神 白芍

許開孫 乳房為少陽行經之地。氣血皆少。加以情懷失暢。氣血。痺鬱。有形而痛。治當在絡。脈澀。無寒熱。非癰膿之候。恐年齒日加。必成巖症。

天葵 蘇子 蔓仁 夏枯草

黨參 白芍 芽菇 川貝 歸身

天葵 蘇子 蔓仁 夏枯草

柴胡 佩蘭 川貝 夏枯草

當歸 茯苓 甘草 白芍

吳江徐 乳巖潰腐。勉擬補益。聊作支持之計。

黨參 黃耆 川貝 遠志 川鬱金

白芍 當歸 冬木 茯苓 甘草

常熱張 三陰瘧後。兩乳堅腫。此由肝脾氣鬱。防成巖症。

柴胡 威靈仙 歸身 川石斛

白芍 製首烏 牡蠣 木樨葉

無錫秦 乳巖。多由肝脾氣鬱所致。不疼不癢。似乎小恙。然非輕

淺之症。宜情懷寬解。庶幾免潰爛之虞。

外證醫案彙編 卷三 乳巖部 乳巖

黨參 棗仁 丹參 茜草 清阿膠

黃耆 川貝 續斷 白芍

荆溪俞 乳巖四十載。潰爛如瘡。穢水淋漓。甚則出血。證屬棘手。

殊難圖治。且以止血。

黃絹灰 地榆灰 陳椽灰 絲綿灰

藕節灰 蒲黃灰 艾葉灰 馬尾灰

血餘灰 蓮房灰

各藥醋炙。為末。糯米湯下。

崑山王 年已五旬。乳巖經久。不能全消。宜條慮除煩。勝於苦口

藥石。

金香附 川貝 山查核 廣皮 白芍

山茨菇 當歸 煨牡蠣

南海宋 肝胃不和。乳中結核。始以澹然。漸致狂狃。書云。巖無愈

理。況素有氣惱。肝陽尤盛。宜屏閑家務。希圖漸消。

製香附 陳皮 黨參 白芍 山茨菇

川石斛 當歸 川貝

黎里陳 乳房結核。在少陽之絡。此經氣血皆薄。攻之非易。恐遷

延歲月。釀為巖證耳。

川鬱金 香附 丹皮 澤蘭 鮮菊葉

青橘葉 當歸 青蒿 蒺藜 鮮竹茹

外證醫案彙編 卷三 乳巖部 乳巖

震澤沈 乳房結核如拳。青筋暴露。脈來細滑。此因氣血不和。鬱

結成巖。證屬頑硬。無求速愈。擬煎劑。以和營衛之乖。連進丸劑。

以攻結核之堅頑。庶幾得中病機。

生洋參 茯苓 川芎 冬木 白芍

炙橘葉 歸身 甘草 生地 牡蠣

附丸方 製香附 神麩 茯苓 甘草 川芎

白朮 黑山柅 厚樸 橘紅 查肉

乳症。皆云肝脾鬱結。則為癖核。胃氣壅滯。則為癥瘕。乳頭屬肝。

乳房屬胃。男子乳房屬腎。此乃先哲大概言也。大匠誨人。與規

矩而已。況乳癆。證名甚多。有羣書可考。然治法之巧。在臨證施。

治之人余細思之胸中所過經絡甚多其症之始各有其源若不知經絡病因虛實如治傷寒不辨六經茫無頭緒聊將經絡病因錄之幸乞高明指正內經曰脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布胸脇胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出左乳下其動應衣脾胃之大絡皆布於胸中足太陰脾脈絡胃上膈足陽明胃脈貫乳中下膈屬胃絡脾脾胃二經之脈皆過其間足厥陰肝脈上貫膈布脇肋足少陽膽脈合缺盆下胸中絡肝循脇裏手厥陰心包之脈起於胸中循胸出脇下腋手太陰肺脈循胃口上膈橫出腋下經云衝脈任脈皆起於胞中任脈循腹裏上關元至胸中衝脈俠臍上行至胸中而散乳房之部位屬脾胃

外證醫案彙編 卷三 乳脹助部 乳症論 三六

乳之經絡屬肝膽胸中空曠之地而行氣血心主一身之血肺主一身之氣心肺皆在胸中殺入於胃以傳於肺五藏六府皆以受氣清者為營濁者為衛營氣行於經隧之內衛氣行於皮膚肉分之間乳汁生於脾胃之穀氣故其味甘味淡主於肝膽木氣肝主疎洩是也乳汁厚薄主於衝任之盛衰衝任為氣血之海上行則為乳下行則為經婦人哺乳則經止男子之乳房屬腎何也男以氣為主女以血為先足少陰腎之脈絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中水一點真陽直透三陰之上水不涵木氣不舒真陽不能上達乳中結核氣鬱無血液化膿比女之更甚雖云肝病其本在腎即見治乳症不出一氣字定

之矣脾胃土氣壅則為痞肝膽木氣鬱則為疝正氣虛則為癆氣虛不攝為漏氣散不收為癰痰氣凝結為癖為核為痞氣阻絡脈乳汁不行或氣滯血少澀而不行若治乳從一氣字著筆無論虛實新久溫涼攻補各方之中揆理氣疎絡之品使其乳絡疎通氣為血之帥氣行則血行陰生陽長氣旺流通血亦隨之而生自然壅者易通鬱者易達結者易散堅者易軟再辨陰陽虛實譬如內吹外吹乳癰乳疽屬陽者多乳巖乳懸乳痞乳勞等屬虛者多乳核乳癰等堅硬屬氣鬱者多何經之症參入引經之藥今採四十方皆內科手筆平淡中自有神奇當細心參而玩之採以犀書加以巧思臨症操縱有權治法自然可得

外證醫案彙編 卷一 乳脹助部 乳症論 三七

余曉鴻註

徐河漢先生治東洞庭劉某夫人患乳癰醫者不能消散成功之後又用力向乳頭上寸餘出毒瘡口向上膿反下注乳囊皆腐寒熱不食將成乳勞內外二科聚議無定羣以為不治矣延余診之曰此非惡證治不如法耳尚可愈也但須百日耳其家戚族皆少年喜事聞余言欲塞羣醫之口向病家曰我輩公懇先生留山中百日必求收功而後已如欲歸家備快船以迎送余初不允繼勉承之多方治之至九十日而未見功病者柔弱畏痛既不敢於乳下別出一頭而膿水從上注下頗難出盡故有傳囊之患忽生一法用藥袋一個於乳頭之下用帛束縛之

使膿不能下注。外以熱茶壺熨之。使藥氣乘熱入內。又服生肌托膿之丸散。於是膿復上泛。厚而且多。七日而膿盡。生肌果百。日而痊。後以此法治他證。無不神效。可知醫之為術。全賴心思。轉變刻舟求劍。終無一驗也。徐河漢。

余幼時在太平洲。治施姓。先有寒熱。後右耳後紅腫。如核桃。延外科某治之。謂耳後發。將耳後用刀挑穿十餘日。膿不能出。因其瘡口向上。膿從下注。漸漸灌注於項。至肩如負一囊。肌肉日削。胃氣日敗。後到吾師藥肆中。賣藥。余見憫之。問其情形。曰。外科某要包醫。索五十金。因催佃長工。每月七百文。亦則能待。覽而已。言之淚下。余忿極。曰。富貴之人。輕醫。亦不可貧窘之人。索

外證醫案彙編 卷三 乳胸臍部 治案 三八

重謝亦可惡。余雖未習外科。與你治之。按其瘡軟如綿。郁郁皆膿。內中澀澀有聲。若再遷延。內傷裏膜。即用釘書鐵鑽。用紙捲緊。露鋒六分。燈蓋火燒紅。在項後近肩井處。另燙一孔。使其膿可下出。當時插入紙捻。吞蠟卷丸。用圍藥。將醋調末其根。服提膿內托之藥。明日將紙捻拔出。膿出。流之滿背。有碗許。惜其新開之孔太小。出之不盡。再用舊絮捲好。臥後墊於項下。將枕頭抽去。上下兩孔膿漸出。內有腐肉。塞口不能出。用銀匠之鐵鉗。挾之。不能出。再從新孔之傍。離三分。另開一孔。藥線穿過。繫之。潰開。將腐肉取盡。再將生肌之藥。用紙條插之。圍以敷藥。吞琥珀蠟卷丸。服補托之劑。而月而痊。因一時之憤。數十日不。幸

而藜藿之軀。能受此痛楚。若柔肌嫩肉。斷難收功。余二十歲。之事。今十有九年。未敢與人治一瘍症。知瘍科不易為也。余臨。腸癰。

東山沈 腸癰。由鬱怒而成。七情為病。難以調治。不可以外證忽之。議與柴胡清肝湯。

柴胡 川芎 當歸 白芍 川鬱金

山柰 陳皮 甘草

德清韓 咳噎久延。左偏脇肋高腫。色紫作痛。係欲傷肝肺兩絡。遂發瘻瘍。此症最忌內潰穿膜。難以圖治。切勿輕視。

枇杷葉 杏仁 川貝 蘇子 天竺黃

外證醫案彙編 卷三 乳胸臍部 治案 三九

瓜蒌仁 桔梗 桑葉 蘆根 東瓜仁

看方 腸癰破後。日夕流膿無息。抑且腥穢。此元氣衰也。如以款。噲不減。胃氣困頓。甚非佳兆。當另圖謀。

黨參 白石英 生穀芽 桑葉 五味子

黃耆 陳淮麥 北沙參 橘白

蘇州張 脇次作痛。須防成瘻。擬運行之法。

澄香 絲瓜絡 陳皮 青皮 萸仁

半夏 川鬱金 歸鬚

南潯卞 氣逆脇肋作痛。治從氣分絡分。

枇杷葉 新絳 澄香 青皮 通草

吳橘葉 蘇梗 陳皮

吳 右脇有形高突。按之無痛。此屬痲痞。非若氣聚痰凝。難以推求。然病久僅阻在脈。須佐針刺宣通。正在伏天宜商。

真合粉 白芥子 半夏 鬱金

瓜蒞皮 黑扼皮 橘紅 薑皮

王 騎射馳驅。寒暑勞形。皆令陽氣受傷。三年來。右胸脇形高微突。初病脹痛無形。久則形堅以硬。是初為氣結在經。久則血傷入絡。系於臟腑外廓。猶堪勉強支持。但氣鈍血滯。日漸痲痺。而延痲癢。怒勞努力。氣血交亂。病必旋發。故寒濕消尅。理氣逐血。

總之未能講究絡病工夫。故仲景於勞傷血痺諸法。其通絡方

外證醫案彙編 卷三 乳胸脇肋部 痲痺 甲

法。每取蟲蟻迅速飛走諸靈。俾飛者升。走者降。血無凝阻。氣可宣通。與攻積除堅。徒入臟腑者有間。錄法。備未議。

蠅螂蟲 虻蟲 當歸鬚 生牡蠣

煨木香 川芎 生香附 夏枯草

用大酒麩末二兩。加水稀糊丸。無灰酒送下。三錢。

此從仲景大黃虻蟲丸。鱉甲煎丸。化出。輕者。金匱旋覆花湯。加味亦妙。能靜註

葛 酒客大便久瀉。脇上曾發痲癢。春夏脇下有形。腹形滿脹。此久蘊濕熱。癰膿自利。未能洩邪。腸胃氣壅。利頻不爽。法當分消。以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用丹溪小温中丸。早進二

錢五分。晚進二錢五分。分三兩

○ 腋癰

香山鍾 腋癰。漫腫無頭。疼痛寒熱。皮色不變。係肝脾二經。氣凝血滯而成。投以柴胡清肝湯。

柴胡 連翹 防風 當歸 山梔

川芎 黃芩 甘草 瓜蒞仁

奉賢程 有時鼻衄。此熱在營分也。加以兩腋腫痛。皮紅高起。內已醱膿。但虛體未便鍼刀。待其緩破。俾一擁而出。易於收功。

稽豆皮 鱉甲 川貝 川石斛

外證醫案彙編 卷三 乳胸脇肋部 痲癰 甲

地骨皮 牡蠣 陳皮

○ 肋癰

太倉朱 左肋硬腫。痛引右肋。綿延兩月。膿勢將成。近加噦嘔。飲食少納。此痛傷胃氣。以培中土為先。外瘍在次。

黨參 瓜蒞仁 甘草 川鬱金 茯苓

黃耆 半夏麩 陳皮 焦白朮 竹茹

黎里陳 肋癰。屬厥陰經。故小便近陰囊處。抽掣引痛。皆屬肝絡也。理宜和肝化癰為治。

柴胡 蘇梗 桃仁 元胡索 製香附

青皮 茯苓 歸鬚 甘草節

腋脇肋皆在身之側。手厥陰。胞絡之脈。過腋。足少陽。膽。足厥陰。肝。足太陰。脾。足陽明。胃。四經之脈。皆行於脇肋之間。骨疎肉薄之處。與裏膜最近。腋脇肋。生癰。皆由肝脾鬱積。氣滯血壅。或肝膽火毒。鬱怒而成。每生於體虛之人。先哲云。始終最忌寒涼。或云。始終當禁溫熱。鄙意思之。各有其因。身之側者。軀殼經絡之病也。寒涼溫熱。直入中宮。與經絡不得相調。脾為至陰。濕土之藏。寒涼易於敗脾。戕胃。而伐生生之氣。脾胃一敗。噦嘔泄瀉。變症百出。肝為風木。膽為相火。風性喜竅。火性善熾。誤投溫熱。不異抱薪救火。風火相搏。易氣易潰。倘裏膜一穿。立見其危。古人治法。壯胃氣者。藉穀氣而生氣血。即內托之法也。疎絡者。使其外證醫案彙編 卷三 乳癰腋肋論 五

血氣流通。即外消之法也。今採十一方。皆疎肝理氣。清熱消痰。和胃化痰等法。不犯溫熱寒涼之弊。再兼蟲蟻之搜求。絡中之凝滯。小溫中之利濕。分消。皆出神入化之思。臨症潛心體認。治法自有進階矣。余聽鴻註

壬午。余至琴川。有一興福寶餅糰者。膏骨生癰。瘍科謂外肺癰。開刀出毒。四十餘日。瘡口不斂。時流稀膿。家嘗聽其不治。余診之。脈來虛弦。兼數。咳。痰。白。痰。咳。則稀膿流出。漸成瘡。勞。幸裏膜未穿。與服蠟。葵。丸。先護裏膜。進以金匱旋覆花。千金葶藶法。旋覆。新。降。枕。杷。葉。生。冬。西。瓜。子。苡。米。淮。山。藥。石。斛。生。扁。豆。茯。苓。川。貝。鮮。荷。梗。橘。葉。鮮。百。合。毛。燕。之。類。肺。胃。並。治。服。三。十。劑。咳。減。納。

增膿出漸少而厚。先以提膿未藥提之。再以生肌等藥填之。兩月餘而愈。所以緩治平淡。久則自然有功。再服毛燕。月餘。咳止。瘡口平復。如此症。或醫藥寒涼。溫補亂投。或病家性急。不信服藥。每棄而不治者多矣。余聽鴻

外證醫案彙編 卷三 乳癰腋肋論 五

腹部

小腹癱

許聖關王 小腹漫腫堅硬皮色不變此腹癱也係七情鬱結脾虛氣滯而成擬和氣養營湯主之

黨參 陳皮 白朮 黃耆 茯苓

當歸 熟地 沈香 甘草 丹皮

丹陽田 小腹癱

官桂 艾絨 山查核 炮薑 木香

神曲 丹皮 薤白頭 枳殼

南溟董 小腹隱痛木腫不散脈來細數便秘食少殊屬虛候須

外證醫案彙編 卷三 腹中 小腹癱 胃

得膿洩方保無虞

黃耆 杏仁 生大黃 青皮 桃仁

角鍼 芒硝 大腹皮 苡米

少腹癱一症在臍下關元丹田等穴陳遠公云此處必無陽症因其屬陰部位也一用陽藥立可成功心法曰小腹癱由七情

火鬱而生又不能用熱藥不若見證治證為要如漫腫堅硬皮

色泛紅有熱為陽七情鬱火所結當以清化無熱不紅者屬陰

寒凝結血阻氣滯而成當以溫通若膏梁煎博或喜服丹砂鬱

熱內壅苦鹹速下亦不可少余採三方虛者補之秘者下之寒

者溫之先生用藥變化已見大概矣然腹部癱疽各症當用臥

針直針易穿裏膜耶聽鴻註

腹皮癱

嘉定姚 咳嗽血色痰濁不鮮此肺經伏熱加以臍旁皮裏膜外

隱痛不止日久腫發於外結成腹皮癱脈來沉數而細擬清解

肺胃佐以雙解貴金丸下之以參消息

蘇子 紫苑 茜草 桑葉 杏仁

桔梗 冬瓜仁 茅根

附雙解貴金丸 生軍五錢白芷二錢五分研末為丸葱酒送下

服之藥前

臍癱

外證醫案彙編 卷三 臍癱 臍癱癰毒 胃

蘇州呂 手少陰火毒移於小腸以致神關腫痛高突若鈴皮色

不變並無寒熱外用隔蒜灸內服清涼之劑以望消散

黃連 連翹 山梔 黃芩 檳榔 木香

甘草 赤芍 銀花

臍漏

臍漏 臍癱破後時流穢水面色晄白脈更無力瘡怯之漸也

擬固本育陰為主

生熟地 天冬 茯苓 山藥 黃耆 骨碎補

女貞子 麥冬 丹皮 澤瀉 此臍漏傷陰時火外越

臍中出水

吳江朱 臍中不痛不腫搔癢則黃津流出此屬腸胃濕熱宜黃連平胃散主之

黃連 蒼朮 甘草 黃芩 厚樸

陳皮 木仁 赤苓

少腹臍部五方如腹皮癱兼肺熱丸煎並行丸藥過胃至下焦而化下其已癰之痰而不傷胃湯劑輕浮治上不犯下焦內中一味桔梗更有深意

臍癰心為火藏小腸火府火鬱於內寒氣凝於外苓連苦先入心洩熱加以行滯理氣解毒再以隔蒜灸通陽治法極密臍漏傷陰固本育陰之六味滋腎水則火焰自熄矣臍中搔癢出

外證醫案彙編 卷三 臍部癰癢并論 巽

水之黃連平胃散之除濕化熱雖遵古法施治若不平時用功豈能到此腹部之癆用藥須保脾胃佐行經活血之品倘誤用寒涼剋伐脾胃一舉腫陷難潰潰後難斂裏膜一穿多致不救
余聽鴻註

前後陰部

○前陰

某 酒客淋濁必係濕熱之邪著於氣分故五苓八正俱用通利病數年不愈必由情欲致傷敗精血阻於內竅溺與精異路同門並中因敗精腐阻居多必通敗精一定之理
杜牛膝 一兩五錢 搗汁沖入麝香三分 虎杖散

某 寒入厥陰之脈結為氣疝痛則脹升氣消絕無踪跡疝氣下元已虧不可破氣攻疝尿管痛或溺阻溫養下元佐以通竅
鹿茸 麝香 韭菜子 蛇床子

茴香 歸身 覆盆子 青鹽

外證醫案彙編 卷三 二陰部并論 巽

某 脈象和緩小便時莖中痛連及上若溺長則不病也此係陰中有火宜以養榮合導赤用東垣法

熟地 黃耆 白芍 於木 歸身 陳皮

炙草 茯苓 生草梢 木通 淡竹葉

常熱沈 莖頭紅腫溺管澀痛小溲點滴難出係腎水不足陰中伏熱故暑天則發秋冬則瘥是內陰不勝外也擬知柏八味滋水洩熱

生地 丹皮 黃柏 知母 澤瀉 淮山藥

茯苓 麥冬 荷梗 萊豆皮

高 脈數汗出身熱吐血五日胸腕不舒舌色白此陰虛本質暑

熱內侵管絡漸有時瘡之狀。小溲莖中作痛。宜通腑經為宜。

鮮生地 連翹 滑石 竹葉 鬱金汁

甘草梢

福山褚 莖頭。腐爛作痛。小溲渾濁。溺管溢痛。舌白口穢。脾經濕

熱下注。擬利濕清熱。

白朮 黃柏 苡米 猪苓 赤苓 忍冬藤

滑石 通草 甘草梢 鮮荷梗

子癰

某 疝本肝腎為病。又挾濕熱下注。以致畢丸腫瘡。昔子和分導

濕熱。丹溪利氣辛芳。以二者兼治之。

外證醫案彙編 卷三 二陰 子癰 瘰癧 凡

草薢 白薢皮 茯苓 米仁 通草

生草梢

囊癰

陳 脈沉弦。舌灰邊白。腰跨氣痛。腎囊畢丸腫大。此濕熱為病。亂

喫發散消導。濕邪下墜。為疝。治當分清。

草薢 黃柏 山梔 茯苓 丹皮

防己 猪苓 澤瀉

湯 囊腫腹脹。此為瘡蓋。

茯苓皮 海金沙 白通草 大腹皮

厚樸 廣皮 猪苓 澤瀉

江 昨逢分消方熱。勢畧減。小溲畧通。所有濕熱穢濁。混處三焦。非臆說矣。其陰莖囊腫。是濕熱甚。而下墜入腑。與方書莖腫軟症有間。議河間法。

飛滑石 石膏 杏仁 厚樸 猪苓

寒水石 澤瀉 絲瓜葉

又 川連 淡黃芩 生白芍 枳實

六一散 廣皮白 生穀芽

內經曰。足三陰之脈逆行。皆從足走腹。濕氣自下先受。內經曰。

三焦者。決瀆之官。水道出焉。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。清者。藹洩之謂也。下焦者。別迴腸。注於膀胱。而滲入焉。下焦不治。

外證醫案彙編 卷三 二陰 瘰癧 凡

水蓄膀胱。將為水之藏。膀胱為水之府。莖為洩水之路。精之道也。脾為濕土。脾虛濕積。水蓄不能洩。肝主疎洩。莖為筋之宗。熱壅不能洩。腎為胃之關門。濁陰閉而不能洩。所以莖頭溺管腎囊之症。先以利濕為先。譬如脾藏濕熱者。五苓散等。取水以健

脾洩之。肝藏濕熱。龍膽瀉肝等。苦而洩之。腎經之濕。以通關滋

腎。知柏地黃等。兼養陰而洩之。所以下疝囊癰濕熱病也。先通

水通。使其壅塞濕熱腐精。敗血滌而清之。不致為患。倘躊躇不

決。發表攻裏。不能及病。如水迴薄。瘀蓄不通。滲入囊中。則囊癰

阻於莖中。則莖腐。若能早使其下洩。無決岸潰堤之患。雖生癰

難於成功。如囊癰下刀。燙火鍼。囊腫成膿。皮厚。須先按定頭在

何處用墨畫線將鍼用紙捲好露鋒幾許將畢丸推開臥鍼刺之可不損畢丸裏膜易於收功屢治皆驗余特鳴誌

○肛漏

王氏凡女科書首篇必論調經既嫁必究孕育結禱十載未能得胎病在至陰之藏延及奇經八脈迷經遲晨泄心若搖漾得食姑緩肛瘍久漏都屬下損

人參 紫石英 當歸 茯苓

鹿茸 補骨脂 藜艾湯泛丸

徐 虛損四年肛瘍成漏食物已減什三形瘦色黃當以甘溫培中固下斷斷不可清熱理嗽

外證醫案彙編

卷三 二陰部 肛漏

人參 茯苓 山藥 炙草 艾實 蓮肉

陳 春病至夏日漸形色消奪天地大氣發泄真氣先傷不主內守為損怯之症不加靜養損不肯復故治嗽治熱無效交節病加尤屬虛象脈左數甚肛有漏瘍最難調治

熟地 炒山藥 茯苓 建蓮 猪骨髓

曹 肌肉蒼赤脈小數疾童年真陰未充囊下肛前已有漏厄陽升失潛巔竅如蒙常與壯水制火猶慮變幻損怯

六味去萸肉加生白芍黃柏知母人中白蜜丸

王 少年陰火直升直降上則失血咳逆下墜肛瘍延漏皆虛勞見端食減至半胃關最要非可見熱投涼以血嗽泥治

肺與大腸為表

東肺移熱於下則成肛漏培土生金把握中宮之法

熟地炭 建蓮 霍石斛 茯苓

炒山藥 艾實

鄭 虛損四五年肛漏未愈其咳嗽失血正如經旨精不主上奉陽氣獨升降奈何見血投涼治嗽理肺病加反覆胃困減食夫精生於穀中土運納則二氣常存久病以寢食為要不必汲汲論病

生黃耆 訶子肉 黃精 白芨 沙仁

南棗 淡水煎膏不用蜜收畧飢用五錢參湯送

楊 驚惶念怒都主肝陽上冒血沸氣滯痰濁宜宣通以就下因

外證醫案彙編

卷三 二陰部 肛漏

誤投止塞宿痰不清新血又凝絡中而月屢屢反覆究竟肝膽氣血皆鬱仍宜調達宣揚漏瘍在肛得體中稍健設法

旋覆花 新絳 青蔥管 炒桃仁 柏子仁

肛漏者皆屬肝脾腎三陰氣血不足何以肛漏在三陰者足三陰任督之脈皆走前後二陰之間肺與大腸為表裏肛者肺之

使大腸之門戶也始因嗜酒辛辣醉飽入房疾奔久坐筋脈橫解臟腑受傷經云陷脈為癭氣虛濕陷為痔痔破久漏氣血皆

虛肺主一身之氣賴無形約束有形三陰漸虛肺亦隨之而弱

肺實則溫溫則內氣充而有所蓄肺虛則寒寒則內氣耗而不

能收蓄有形滋膏肺為五藏之首佈精諸藏諸藏一虛肺反受

諸藏之漸何也。脾虛土不生金。子不能受母之益。腎虛水不養金。子反盜虛母。氣金堪伐。木火反來刑金。肺之一藏受諸藏之創。氣虛不能收。肝漏滋水淋漓。若不杜漸防微。如一蟻潰。隄滄海漏。危難實。脾氣不固。則泄瀉。腎氣不固。則遺精。肝火刑金。吐痰嗆咳。久積成勞。如針之空。竟可傷。所以治漏之法。如堤之潰。如屋之漏。不補其漏。安能免乎。治漏者。先固氣血。為先。氣旺內充。而能收。使其不漏。可無害矣。津液日增。虛損可復。若專顧其瘡。插紅升白。降或線穿。翦割。使其小而致大。大而致潰。虛弱柔嫩之軀。痛苦萬狀。愴地呼天。莫之能救。將內之新肉。做成腐膿。敗血。再服苦寒。戕利濕。傷津。致成內熱。外證醫案彙編 卷三 二陰部 疔瘡 五

肌削喘促。腹膨泄瀉。而死者。誰誤之也。嗚呼。病者為一線之孔。願受剛割之刑。醫者竟將號痛極慘之。而神其伎。名重者。此皆然。致人於死地。庸庸者。無須言矣。今存六方。奇脈久漏。空虛者。以有情之品。填之久。漏胃弱。以甘溫之品。固之。陰虛陽亢。滋陰藥中。佐苦以堅之。土不生金者。甘溫培中。兼酸以收之。各方之中。蓮子。芡實。訶子。中白。固攝真元者。皆補漏之法也。質之諸賢。不以鄙言為迂談。余聽鳴。註。疔瘡。致人於死地。宜在。疔瘡。○疔瘡

曾二脈弦動。眩暈耳聾。行走氣促無力。疔痔下垂。此未老欲衰。腎陰弱。收納無權。肝陽熾。虛風蒙竅。乃上實下虛之象。質厚填陰。

甘味熄。氣節勞。戒飲。可免仆中。
 虎潛去鎖陽。知母。加大肉。旋蓉。煉蜜丸。
 某六冬。季咳嗽吐痰。漸至臥。則氣衝。喘急起坐。今三載矣。經以肺腎為俯仰之藏。是肺主出氣。腎主納氣。老年患此。按脈左弦右沉。為腎氣不收。主治。不必因痔患。而畏辛熱。
 腎氣丸。去牛膝。肉桂。加沉香。蜜丸。
 徐三。失血能食。痰嗽色蒼。脈數。可與甘涼。養胃中之陰。胃和。金生。痔血便燥。柔藥最宜。
 生扁豆 生地 天冬 麥冬 銀花
 柿餅灰 側柏葉
 外證醫案彙編 卷三 二陰部 痔瘡 五

祝四。中年已後。瘦人。陰虧。有熱。飲酒濕熱。下墜。精濁。痔血。皆熱走入陰。則陰不固。攝前方。宗丹。溪補陰丸。取其介類。潛陽。苦味堅陰。若用固澇。必致病加。
 水製熟地 鹹秋石 天冬 茯苓
 龜版膠 黃柏 知母 猪骨髓搗丸
 徐五。旬又四。勞心。陽動。陰液日損。壯年已有痔瘡。腸中久有濕熱。酒性辛溫。亦助濕熱。濕熱下注。為瘡。為淋。故初病。投入正五苓。珠氣中之。也。半平不痊。氣病漸入於血絡。考古方。惟虎杖散最宜。
 虎杖散 即土牛膝磨香

江 脾胃升則健胃宜降則和。蓋太陰濕土得陽始運陽明燥土得陰始安。以脾胃燥胃喜柔潤。仲景急下存陰治在胃也。東垣大升陽氣治在脾也。今能食不運醫家悉指脾弱是病。但診脈較諸冬春感大兼強據經論病。獨大獨小。斯為病脈。脾臟屬陰。胃腑屬陽。脈見弦大非臟陰見病之象。久病少食猶勉強支撐。兼以大便壅塞泄氣不爽。坐談片刻。噯氣頻頻。平素痔瘡腸紅未向安。適此脈症。全是胃氣不降。腸中不通。腑失傳導。變化之司。古人九竅不和。諸屬胃病。六腑為病。以通為補。經年調攝。不越參朮桂附。而毫之應效。不必再服湯藥。議仿丹溪小溫中丸服至七日。俾三陰三陽一周。再議治之義。

外證醫案彙編

卷三

二陰部 痔瘡

五

小溫中丸 二兩一錢 每日三錢 清晨開水服

某 能食腸血脈細色痿。肛漏下墜。議酸苦。熄風堅陰。

黃肉炭 黃柏炭 地榆炭 禹糧石

五味炭 赤石脂

某 凡有痔疾。最多下血。今因嗔怒。先腹滿。隨瀉血。向來糞前。近日便後。是木鬱於土中。氣滿為鬱。氣走為瀉。議理中湯。泄木佐之。

人參 附子 炮薑 芽朮 厚樸

地榆 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

某 內熱腸紅。發痔。當清血分之熱。

生地 炒丹皮 酒炒黃芩 黑山梳
元參 柿餅灰 炒黑槐花 銀花
支五痔血久下。肌肉痿黃。乃血脫氣銜。漸加浮腫喘促。再延腹脹。便不可為。此症臟陰有寒。腑陽有熱。詳於金匱穀疸篇中。極難調治。

人參 焦朮 茯苓 廣皮 炒兔絲子
木瓜 益智

徐六冬月嘔吐之後。漸漸巔頂作痛。下焦又有積疝。痔瘡。厥陰陽明偏熱。凡陽氣過動。變化火風迅速。自為升降。致有此患。

連翹心 元參心 桑葉 丹皮 荷葉汁

外證醫案彙編

卷三

二陰部 痔瘡

五

黑梔皮

戴九十痔瘡下血。濕熱居多。今色衰微顯。是虛寒無速效法。則當補脾胃。因痔瘡猶痛。腫勢尚存。佐以淡滲通腑。

生於朮 生兔絲粉 生象牙末 生白蠟

某 診脈右弦左濡。久痔注血。致納食不易。運化此脾營先傷。胃陽繼困。府氣不能宣暢。大便不爽。溫補未能通調。府氣疎滯。更損脾胃。生陽。東垣每以治土必先達木。不宜過投燥劑。仿古治中湯法。佐以疎肝解鬱。

人參 青皮 黑槐米 查肉 茯苓

木瓜 陳皮 益智仁

葉 徵寒汗大出下有痔漏左眼腫疼痛此陰傷火鬱不可作時邪泛治

六味去芎肉加芍芩荆子丹皮重用

痔漏者名異類同始則為痔久則成漏先哲或云當大補氣血或云足三陰不足風熱濕熱下注先祛風熱濕熱余以醫本不能拘執成法若拘於翻反被其困如作文千萬題曰洞悉題情

見題作文不解思索醫家亦然能洞悉病源見病治病心手相應此皆平昔工夫書亦不可少也今採之方先賢治病節節玲瓏如未老欲衰之虎潛法甘味熄風腎氣不納之腎氣法溫納

下焦肺胃陰虛之三才法甘涼養陰中年陰虧大補陰之苦味
外證醫案彙編 卷三 二陰部 痔瘡論 五

堅陰如濕熱入於血絡之虎杖散濕熱阻於腸胃之小溫中丸久痔下血之禹糧石脂堵塞陽明佐酸苦熄風木尅中土便血腹膨理中湯佐以升清泄水內熱腸紅清血分之熱藏寒府熱之利濕溫中肝胃偏熱之清肝化熱痔血日久用象牙白蠟填塞肛中之漏脾傷胃困用治中湯之扶土疎肝方雖十二無一雷同若非平日考覈羣書豈能到此足啟後人心智較動輒苦寒傷胃線繫剪割拔藥都不啻如霄壤之殊矣願為瘍科者平昔專心內科捨末求本而治蒼生之幸也 余聽鴻註
內經曰因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸辟為痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者而變成瘻

也五臟切宜保養勿令受邪所痔漏者當調飲食寡慾節勞皆可帶病延年如插爛藥刀割剪線繫余見已收功者鮮也余三十歲時肛側外如李潰膿後深寸餘插藥條逐日有膿中按有孔如豆大而深余即以海浮散膏藥貼之內服調和氣血之藥一月痊愈如故後逢房室勞碌即脹流水余即寡慾節勞今已十五六年未發若使外治穿肛潰腎亦未可知 聽誌

外證醫案彙編 卷二 二陰部 痔瘡論 五

股腿經足部

環跳

廉三診脈論體。從遺精漏瀉。繼而環跳穴痛。遂不堪行走。臟陰傷及腑陽。陽氣日加。室塞經脈。不司舒展。食入壅脫。欲吐。大便旬日不通。痞阻日甚。而為痿症。內經論治痿。獨取陽明。無非流通胃氣。蓋胃脈主平。約束筋骨。利機關。竅也。議用加味溫膽湯。又大便旬日不通。用更衣丸。取意小腸火腑。非苦不通。非下不奪也。

塗六痛起肩胛。漸入環跳。髀膝。是為絡虛。

黃耆五錢 於朮三錢 當歸三錢 茯苓二錢

外證醫案彙編

卷三

股腿經足部

天

防已八分 防風根五分 羌活五分

又 照前方。去防風羌活。加杞子沙苑。

何七腰痛。環跳穴痛痺。

桂枝木

沙苑

小茴

茯苓

炒杞子

桑寄生

胡氏懷妊六月。陽明司胎。閃動絡脈。環跳痛連腰脊。最防胎氣。

歸身

桂枝木

炒杞子

炙草

羊脛骨

茯苓

莊四督虛背疼。脊高突。

毛鹿角

切片

鹿角霜

一錢

杞子

三錢

歸身

一錢

生杜仲一錢 沙苑一錢

茯苓一錢

青鹽三分

某 尾間骨痛。以異類有情者補之。

猪尾骨

歸身

木瓜

新絳

環跳穴痛。瘍科皆云附骨陰炭。又云附骨瘰癧。實係足三陰經少陽氣宣通。體虛之人。寒濕所襲。流注骨節之間。氣痺血阻。所致。日久不治。寒鬱化熱。為膿。先宜溫通氣血。無不效驗。或夾風或夾痰。奉入祛風消痰。下焦溫則寒凝自散。余治亦不少。未見有釀成內潰者。至於脊痛。尻痛。皆腎督脈不足。以異類有情之品。補之。若兼症前溫膽湯。更衣丸。皆治法之變化也。此皆內症。錄入瘍科者。恐瘍科一見。即謂陰痰。或以大劑陽和湯。溫熱

外證醫案彙編

卷三

股腿經足部

天

助火。或發表攻裏。戕賊正氣。火賊亂刺。致成勞怯者亦多。若能

內外兩科。水乳交融。深思好學。筆無滯機。即內科之明哲。瘍科之上工也。余聽鴻註

膝脛足脚氣

蔣七足膝腫疼。久不止。內熱。

生虎骨

炒牛膝

草薢

金毛狗脊

仙靈脾

當歸

又 照前方。加生鹿角。黃柏。

汪三脈滿。腰髀環跳。悉痛。煩勞即發。下焦空虛。脈絡不宣。所謂絡虛則痛是也。

歸身 桂枝木 草薢 木防己 牛膝

沙苑 生杜仲 小茴

曹三 溫鬱 少腹痛引腰右脚痠

木防己 飛滑石 茯苓皮 厚樸

晚蚕沙 草果 草薢

某 診脈右部虛軟無力左足內踝腫漸大此足三陰經脈所行之處藏真虧損何疑議用峻補方

六味丸加 河車 杜仲 牛筋 鹿筋

菟絲子 川續斷 麥冬 黃柏

用黃牛骨髓羊骨髓猪脊髓精羊肉煎湯入淡菜同熬膏丸

外證醫案彙編 卷三 腹腿腰脚膝脚氣 六

○足指

某 遺由精氣淋由溺竅異出同門最宜分別久遺不愈是精關不攝為虛但點滴痛癢少腹堅滿此屬淋閉乃氣墜不通未可便認為虛况夏秋足指先腐下焦益有濕熱氣不流行膀胱撐滿遂致堅滿耳五苓散主治

五苓散

某 嘔逆吐涎衝氣攻心足大跗指硬強而痛

淡吳萸 熟附子 獨活 北細辛

當歸 漢防己

○脚氣

某 脚氣古稱南地多因濕熱醫用苦辛宣通開氣滲濕久進病未祛除而血液反耗心熱氣沖目黃嘔涎煩躁頭痛昏厥四肢筋縱掣痙大便堅滯顯然肝血衰涸內風掀越此風乃陽氣之化非外來八風同例而治分經辨治病在肝藏擾動胃絡由氣分濕熱延中血中枯燥靜攝小安焦煩必甚蓋內傷情懷草木難解斯為沈痼

石決明 稽豆皮 天冬 生地 阿膠

菟蔚子 九方 生地 白芍 天冬 丹參 杞子

阿膠 麥冬 知母 稽豆皮 菟蔚子

外證醫案彙編 卷三 腹腿腰脚膝脚氣 空

桂圓肉

某 脚氣行痺左右更代而痛宜溫通方

桂枝 獨活 秦艽 貝齒 茯苓

防風 附子 木瓜 草薢 木仁

晚蚕沙 海桐皮

倪 嘔濕熱脚氣上攻心胸腕中滿脹嘔逆乃濕上甚為熱化與苦辛先治在上之滿脹用瀉心法

川連 黃芩 枳實 半夏 薑汁 杏仁

吾吳地偏東南水多土少濕感土虛濕邪為害最多內經云中於濕者下先受之下焦如瀆水濕易積足三陰之脈從足走腹

足三陽之脈從頭走。濕之有餘從陽化者為濕熱。濕之日陰虛者凝滯。從陰化者為寒濕。外來之濕夾風者利濕中兼祛風之品。脾肝腎三陰不足血燥亦可生風。溫補肝腎亦佐祛風。足少陽足厥陰脈皆在足故易於生風也。脚氣亦有寒熱虛實皆要認清不可混淆。倘補遺一誤立見衝心悶絕者有羣書可考鄙亦不瑣言矣。余聽鴻注。

余於壬午至琴川治大市橋吳姓成衣匠二十五歲而色青黃腰重足腫至股軟而無力兩人掖之而行病起一年有餘服藥將及二百劑罔效按脈滯滯氣促余曰此症却未見過想其情即黃帝云緩風濕痺金匱云著痺濕著而不去腰中如帶五千

外證醫案彙編

卷三

肢體腫痛脚氣論

空

錢千金所云脚弱病也俗名濕脚氣甚則止衝心腹亦能致命濕脚氣誤投補劑氣閉死者最多即進活人檳榔飲一劑服後遍體汗出直至足心兩劑腫勢皆退復用本事杉木散三劑霍然藥不值百文愈此大症古人立方決不欺後學用之的當如鼓應桴今將二方錄後高明鑒政。

活人檳榔飲

檳榔末

一錢

橘葉

四錢

杉木片

一兩

陳酒

三兩

童便二兩 河水兩大碗煎之一大碗濾清調檳榔末飲盡劑覆以被汗出為度

本事杉木散加味方

杉木片

四錢

大腹皮

一錢

橘葉

二錢

橘皮

二錢

檳榔 二錢

防己 二錢

附子 四分

陳酒 二兩

外證醫案彙編

卷三

肢體腫痛脚氣論

空

外證醫案編卷四

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯
會稽孫思恭順齋甫校刊

內部

○內癰

江甯唐 咳嗽久延。肝肺絡傷。時吐穢痰。脈來洪數。防成內癰。際此酷暑。有日重之勢。

旋覆花 蘇子 蔓皮 桑葉 代赭石

新會白 杏仁 紫苑 生西瓜仁

覆方 脈數稍緩。胃氣較前。魁復。金水有生之兆。嗆咳亦稀。吐

外證醫案編

卷四 內部 內癰

痰仍穢。不可專治其肺。理宜培土。佐以清肅。可漸臻佳境矣。

紫苑 橘白 川貝 蔓仁 桔梗 米仁

蘇子 枳榔 梨皮 西瓜仁

青浦施 腹痛嘔逆。蛔虻盤踞中焦。兼挾積滯。防成內癰。

使君子 枳榔 臭蕪荑 山查 藿梗

蘆粟子 麥芽 六神麩 廣皮 枳殼

楓涇謝 腹痛氣逆。臍傍微腫。延久不散。恐成內癰。擬疎肝降氣

以圖徐效

沉香 烏藥 檀香 川鬱金 蘇梗

右藥為末。薤白泡湯送下

上海繆 平昔食物。恣意膏粱。以致火熱。與寒濕交阻。腸胃氣機

不通。火鬱成癰。自內發外。痛牽胸肋。防傷內膜。殊為堪虞。用疎導之法。以便通積。下為鬆候。

官桂 沉香 建麩 陳皮 冬瓜子

厚樸 枳殼 赤苓 枳榔 薤白頭

震澤倪 肝氣橫逸。脾土受戕。不能運行。左偏脇肋作痛。時作時止。但久痛必傷血絡。防其成癰。宜導瘀開洩。以望輕機。

夾橘葉 新絳 鈎藤 歸鬚 米仁

遠志炭 沉香 廣皮 蘇梗 桃仁

覆方 痰下痛減。病去七八。惟飲食甚微。理宜扶胃。佐以宣通。

外證醫案編

卷四 內部 內癰

枇杷葉 陳皮 穀芽 蘇子 木瓜

威靈仙 麻仁 川石斛

濮院李 內傷肝絡。臍旁作痛。較生癰更甚。不可輕視。

廷胡 沉香 枳殼 青皮 陳皮

歸鬚 丹參 新絳

金壇袁 氣滯。少腹逆痛。經旬。防成內癰。

焦神麩 蘇子 沉香 陳皮 青皮

炒查核 枳殼 木香 枳榔 蔥管

今另立內癰一門。在於腹部。皮裏膜外。或在絡脈。或六腑壅滯。

因其病在將成未成之間。無名可徵。故總言曰內癰。經云。五臟

不和七竅不通六腑不和留積為癰臟腑不和而瘡發於外也
榮衛稽留於經脈之中則血注而不行衛氣從之而不通
壅遏不行故大熱不止熱勝肉腐腐則為膿人之胸腹有十一
募募者各臟腑陰會之所發內癰內疽在何經本經募上肉必
浮腫募中時時隱痛浮腫為癰隱痛為疽根淺者為癰根深者
為疽即以治癰疽者瘰癧者血之壅也疽者氣之阻也故瘰癧色紅
屬陽疽色白屬陰氣血壅阻六腑以通為補六腑之症宜先通
之五藏屬陰血之壅者宜溫以消之內癰初起治法不出理氣
消痰通絡今輯九方皆內癰始起之時不在臟腑癰疽已潰之
例若乃因循不治恐其成膿內攻腐腸爛胃穿膜潰腹不可救

外證醫案彙編

卷四 內部 內癰

余曉鴻註

附治驗 常熱鐘樓頭潘姓賣熱火腿燻雞者是日陰雨挑擔
進東門路滑跌仆環跳作痛延傷科治之投附桂炮薑等大熱
藥三劑痛稍緩更方仍進附桂等一劑少腹猝然絞痛如刀刺
皆擬發痧就余寓診之脈數有力少腹大痛余曰此謂大熱不
止熱勝肉腐若不速下腸胃腐爛矣即用調胃承氣湯大劑服
後下五六次肛門灼熱不堪腹痛已減七八分明日又服大黃
三原方減半下三四次病已霍然
常熱縣南街朱益大火腿醃臘店內一童十三歲在樓上失足
墜下當時悶絕後延傷科治愈停八九日漸起寒熱延他醫治

此病以中
筋脈通以抽
仁小孔通以
五以居通以
下下下之
任下下之
皆行也

之進芥翹梔等服後腹膨如鼓氣促冷汗欲脫之狀邀余診
詢病始末余曰癰停氣阻被寒冷凝結不可遲下然下之又恐
驟脫進以桃核承氣湯重桂用大黃錢余曰若不下恐氣阻不
通危在頃刻若下又恐驟脫以屬兩難之勢服後不下再進一
劑下三四次氣平腹舒病已霍然所以治病不但藥誤就對症
進藥病重藥輕亦為甚誤此兩症皆屬氣血壅阻一因熱阻一
因寒阻一方寒下一方溫下如此皆在臨症權變也余曉鴻誌
肺癰附癰
唯亭徐 肺癰延久其將瘵矣
北沙參 冬瓜仁 茯苓 殺芽 丹皮

外證醫案彙編

卷四 內部 內癰

生米仁 地骨皮 鮮藕

湖州李 肝陽內熾肺金受灼以致咳嗽綿綿吐痰臭穢正屬肺
癰時值炎暑有日重之勢幸納穀仍健脈不數大可恃可以無
恐且與清肅之法

白石英 瓜蒌皮 川貝母 米仁 花粉

紫苑草 款冬花 西瓜仁 橘白
江甯周 咳嗽經久今交冬令氣不降納反傷陽絡痰中帶血癰
濁不鮮脈來洪數兩頰赤色此由素常好飲濕熱內蘊又加夏
秋暑熱夾滯肺臟受傷症為肺癰重候勉擬清肅止血後高益
補

洋參 懷牛膝 冬瓜仁 杏仁 米仁

茯苓 清阿膠 生蛤殼

太倉葉 風邪久鬱。肺藏蘊熱。咳吐穢痰腥臭。胸內中府穴隱隱

作痛。聽按此言其穴是屬肺癰。乘膿未成。急與疎散法。

煨葛根 丹參 杏仁 花粉 大豆黃卷

地骨皮 萹仁 蛤殼 薄荷 桑皮

樟堰王 咳傷肺臟。隱隱作痛。頻吐穢痰。成為肺癰。脈見洪大。理

宜清肅。佐以培土為主。

粉沙參 麥冬 米仁 茯苓 蔗漿炒竹茹

地骨皮 玉竹 杏仁 萹仁 稽豆皮

外證醫案彙編 卷四 內部 肺癰 五

木瀆周 咳吐久纏。痰色黃膩。上膈隱隱作痛。聽按以注言痰帶血腥。

右寸脈浮花。聽按此以肺氣虛言。明係肺癰。脾為肺母。急治其母。俾土旺

金生。聽按因脈浮花。補土庶幾肺也有附。

黨參 茯苓 川石斛 黃芪 川貝

冬朮 廣皮 甜杏仁 桑皮 桔梗

無錫湯 咳吐穢痰。肺癰已成。胃德聲嘶。深為可慮。

代赭石 蘇子 檳榔 通草 紫苑茸

旋覆花 杏仁 花粉 竹茹

巴城盛 久咳傷肺。肺為嬌臟。居於至高。中有二十四竅。行列分

布諸臟之氣。司清濁之氣。運化清肅。不能下行。遂致肺中清竅

蒙蔽。蘊熱成癰。臭穢膿痰。綿吐不已。夏秋深為可慮。所喜胃陽

未困。聽按看肺癰。胃氣最要緊。猶餘一線生機。

白石英 紫苑 瓜萹仁 桑葉 蘆根

馬兜鈴 川貝 冬瓜仁 竹茹

江陰梁 咳嗽痰稠。咽乾膚燥。腹肋刺痛。肝肺兩絡。氣分受傷。發

為肺癰。宜清肺鎮肝。冀咳減痰少。不致咯血。可望向安。

旋覆花 桑皮 萹仁 紫苑 杏仁

代赭石 蘇子 白前 沉香

唐栖王 咳出膿血。氣口脈數。聽按此以脈言。非肺癰而何耶。

淮小麥 甘草節 桃仁 米仁 天冬

外證醫案彙編 卷四 內部 肺癰 六

冬瓜仁 蘆根鬚 白前

橫涇宋 久嗽音啞。咽痛。近復惡寒。頭痛。風熱復傷肺絡。肺氣不

清。防成肺癰。

北沙參 桑葉 橘紅 丹參 蘇葉

牛蒡子 黃芩 元參 杏仁 茅根

南潯丁 咳噎胸膈不舒。厥陰內熾。又值炎夏。金氣堪燥。所致腥

穢膿痰。吐之不已。成為肺癰重候。喜其胃陽未困。治之猶可奏

功。

金沸草 蘇子 桑葉 橘葉 藕

西瓜仁 瓜萹 枇杷葉

金澤史 咳逆胸高隱痛不舒。肺氣閉鬱。鬱成則熱。熱久成癰。吐痰臭穢。兼之咯血。虛怯之症。難取效於藥力。

北沙參 川石斛 川貝 萹仁 花粉

馬兜鈴 枇杷葉 桑葉 嫩竹衣

覆方 聲音稍亮。咳嗽略減。飲食漸進。頗有鬆機。惟痰血仍吐不已。肺熱未退。不外肺鬱積滿之故。呆補有妨氣機。再擬汁飲法。冀其轉旋。

甜杏酪 蔗漿 鮮斛汁 藕汁 梨汁

枇杷露 穀露 茅根汁

肺居至高。其形象天。重藥不能及。用藥輕者。上也。露汁。藥中最

外證醫案彙編 卷四 內部 肺癰 七

輕者。治其最高之臟。肺金滋潤。則胃土柔和。胃亦能輸津於肺。所謂天氣下降為雨。地氣上騰為雲。金土生化。有機轉旋不息之妙。後人不可以其平淡。將金玉之加。棄如瓦礫也。疏註

北圻揚 肺癰自春至夏。丙火燥金。所以膿痰愈吐。膚燥咽乾。右寸脈花。約穀漸少。脾土增盛。顧肺無能。另有變證。倉猝禍起矣。

紫苑 地骨皮 茜根 萹仁 川石斛

米仁 冬桑葉 蘇子 川貝 藕

嘉興張 風溫襲肺。咳嗆兩月。未曾暢汗。胸膈隱痛。吐痰腥穢。肺癰之象已成。擬清理肺熱。

馬兜鈴 米仁 荊芥 橘白 蘇子

大豆卷 川貝 杏仁 石斛 竹茹

蘆墟卜 咳嗽脇痛。風溫久鬱。肺胃防成肺癰。宜清熱解表主之。

杏仁 薄荷 滑石 蘆根 枳殼

荊芥 連翹 赤苓 牛蒡子

東山屠 病因肝肺不和。去年夏季。曾患癩癩之疾。入秋咳嗽。自冬至春。胸滿氣急。吐痰黃膩。兼帶臭穢。證屬肺癰。所幸脈不細。數形質不尪。羸就病擬方。從肝肺主治。

桑葉 杏仁 川貝 蘇子 橘紅

茯苓 玉竹 甘草 竹茹 旋覆花

周莊李 風熱傷肺。咳嗽痰臭。音啞。防成肺癰。

外證醫案彙編 卷四 內部 肺癰 八

牛蒡子 薄荷 蘇葉 桑葉 杏仁

海浮石 川貝 橘紅 米仁 茅根

唯亭蔡 肺癰稍愈。復起水種。子令母虛。金土兩傷。勿輕視之。

煨葛根 新會皮 扁豆皮 冬瓜皮

桑白皮 車前子 地骨皮 地栗根

生穀芽 赤苓

浦東施 神怯胃減。痰喘氣急。盜汗脈軟。肺液衰矣。治擬順氣生津。

紫苑 馬兜鈴 米仁 石斛 川貝

杏仁 白石英 橘紅 茯苓 糯稜

附代茶方

枇杷葉 西瓜翠 芽根 鮮荖荷葉

扁豆皮 糯稻稭 蘆根 藕汁

右藥吊露代茶常服

覆方 形神稍健。胃氣漸開。咳減痰清。即有向愈之期。擬與調補。

黨參 黃芪 炙草 川貝 甜杏仁

於木 茯苓 橘紅 麥冬 五味子

崇明曹 勞倦失力。咳嗽咽痛。防成肺癆。

旋覆花 杏仁 薏仁 桔梗

桑白皮 桃仁 蘇子 通草

外證醫案彙編 卷四 肺部 九

宜興朱 肺癆。痰中見血。胸悶脇痛。肝肺絡傷。寒熱欲嘔。暑邪互

結於胸。正虛邪實。怕血傾吐。

青蘆梗 陳淮麥 厚樸 檳榔 橘紅

代赭石 旋覆花 葛根 杏仁 藕

覆方 服藥安適。暑邪已去。脇痛亦止。咳減痰清。漸臻佳境。胸悶

仍然不舒。此亦肺熱未楚。擬滋水清金。佐以降納。可免失血之

慮。

北沙參 杏仁 桑皮 通草 蘇子

白石英 枳殼 沉香 血餘 赭石

金澤衛 痰喘氣逆。咳嗽脇痛。肺癆之兆。已見。法擬苦以洩之。酸

以收之之義

桑皮 杏仁 川貝 橘紅 百合

白芍 蘇子 枳殼 知母 蘆根

烏鎮威 痰氣交阻。咳嗆氣短。所吐之痰。色綠而臭。右肋作痛。是

肺癆之重證也。

半夏 薏仁 新絳 枇杷葉 橘紅

杏仁 通草 蘇子 青蔥管 桑葉

蓋聖段 風熱是外感。濕熱是內傷。咳嗽痰中帶血。氣腥而臭。係

風濕閉鬱。濕熱薰蒸。成爲肺癆內症矣。平昔嗜飲。今當痛戒。

米仁 冬瓜仁 茯苓 蘆根 桑葉

外證醫案彙編 卷四 肺部 十

桃仁 苦杏仁

吳江朱 肺熱咳嗽。痰腥氣穢。防成肺癆。姑擬清燥熱之治。

羚羊角 薏苡仁 桑葉 蘆根 茯苓

白蒺藜 橘紅 川貝

洙涇衛 痰瘡未愈。又見嗆咳。痰膩腥穢。防成肺癆。理宜潤肺清

肅之治。

老蘇梗 瓜萸霜 桑葉 茯苓 鉤藤

杏仁霜 炒蘇子 橘紅 枇杷葉

某 氣鬱單脹。中空無物。則氣塞濁。飲上沖。漸有不得安卧之

象。問其起病之由。多是惱怒動肝。爲肝木鬱傷脾土。脾失健運。

氣阻成脹。延及百日。正氣愈虛。濁更堅凝。逆走攻肺。上咳。氣逆欲喘。脫中蘊熱。欬出膿血。病根固在肝脾。今已傳及肺部。丹溪曰。養金制木。脾無賊邪之害。滋水制火。肺得清化之權。目下至要。務在順氣。胸中開爽。寢食不廢。使可從容論治。不然。春分節近。更屬難調矣。先用宣通上焦法。

大腹皮 薑皮 厚樸 紫苑 黑山梳

茯苓皮 桑皮 杏仁 鬱金

服兩劑後。早服腎氣丸。晚服四君子湯。

某。久咳痰穢。膿血交作。並非肺癰。此褚氏所謂難名之疾也。病涉少陰。而陰火甚熾。以飲食消息之。

外證醫案彙編 卷四 內科 肺癰 十一

猪膚 蛤殼 海參 川貝 梨汁

米仁根

某。缺盆右痛。肺絡受傷。宜清補兼施。

生地 瓜蒌藤 川斛 川貝 白芨末

阿膠 側柏葉 蘇梗 牡蠣 大麥冬

沙參 藕節炭

用梨汁拌藥。三次柿餅搗丸。

吳。失血在五年前。咳頻嘔噦。氣自上衝。逆乃下元精血之虛。非外邪寒熱之欬。痰出腥氣。亦從下出。節慾勿勞力。胃壯可免勞怯。

都氣丸

某。脈數咳血。曾咯腥痰。若作肺癰。體質木火。因煩勞。陽升逼肺。肺熱不能生水。陰愈虧。陽愈熾。故血由陽而出也。當金水同療。為主。

熟地 兩四 生地 兩二 海參膠 兩二 石斛膏 兩四 女貞 兩五

龜版 兩三 麥冬 兩二 旱蓮草 兩一 淡菜膠 兩二 天冬 兩二

茯苓 兩二 北沙參 兩二 膠膏丸

陸。脈數血後咳甚。痰腥肢腫。陽升。內風鼓動。最屬難治。

生地 阿膠 天冬 麥冬 白芍

外證醫案彙編 卷四 內科 肺癰 十一

孫。用力。氣逆血亂。咳出腥痰濁血。用

千金葶苈湯。

某。邪鬱熱壅。咳吐膿血音啞。

麻杏石膏湯加桔梗。苡仁。桃仁。紫苑。

褚。溫邪中自口鼻。始而入肺。為咳喘。繼傳膈中。則咯血。乃心營肺衛受邪。然邪在上焦。壅遏阻氣。必聚為熱。痰臭嗆渴。是欲內閉。惜不以河間三焦立法。或謂傷寒主六經。或謂肺癰專泄氣血。致熱無出路。胸突腹大。危期至速矣。即有對症藥餌。氣湧沸騰。勢必湧吐無餘。焉望有濟。夫溫熱穢濁。填塞內竅。神識昏迷。脈閉欲絕者。須以芳香宣竅。佐牛黃金箔。深入藏絡。以搜錮閉。

之邪。今危焉若此。百中圖一而已。此素最易作神。應誤治。特此錄出。須知風濕熱。塵於肺一

紫雪丹

丙戌冬。大溫無雨。雪丁亥春。起咳。喘。常熱。專以蘆根。橄欖。湯。多。服。後。咳。愈。音。啞。吐。臭。穢。腥。痰。余。以。麻。杏。三。青。湯。合。十。金。華。並。青。渠。之。家。不。肯。服。
馬。培。之。先。生。與。余。言。曰。肺。癆。切。勿。用。外。科。全。生。集。之。犀。黃。丸。服。者。多。死。余。思。肺。癆。成。膿。芳。香。易。於。竅。絡。倘。膿。潰。之。後。填。補。之。劑。恐。不。及。多。服。芳。香。通。氣。泄。肺。癆。而。死。或。者。玉。鴻。結。因。風。濕。壅。塞。偶。用。應。手。故。傳。於。後。然。徐。河。漢。先。生。亦。喜。用。余。以。用。在。將。成。之。時。還。可。若。用。於。成。膿。已。潰。之。後。無。有。不。死。者。愚。者。千。慮。或。有。一。得。

肺痿

洪二 勞煩經營。陽氣弛張。即久溫。外因咳嗽。亦是氣泄邪侵。辛外證醫案彙編 卷四 內部 肺痿 三

以散邪。苦以降逆。希冀嗽止。而肺欲辛過。辛則正氣散失。音不能揚。色消吐涎。喉痺。是肺痿。難治矣。仿內經氣味過辛。主以甘緩。

北沙參 麥冬 飴糖 南棗

查二 脈細。心熱。呼吸有音。夜寤不寐。過服發散。氣泄陽復。為肺痿之病。仲景法以胃藥補母。救子。崇生氣也。

金匱麥門冬湯

徐 肺痿。頻吐涎沫。食物不下。並不渴飲。豈是實火。津液蕩盡。二便日少。宗仲景甘藥理胃。乃虛則補母。仍佐宣通。脫間之扞格。人參 熟半夏 生甘草 南棗肉

麥冬 白梗米

沈 積勞憂思。固是內傷。冬溫觸入。而為咳嗽。乃氣分先虛。而邪得外寒。辛散斯氣。分愈泄。滋陰非能安上。咽痛音啞。虛中邪伏。恰值春暖。陽和。脈中脈外。氣機流行。所以小效。旬日者。生陽漸振。之象。穀而暴冷。驟加。衛陽久弱。不能擁護。致小愈。病復。診得脈數而虛。偏大於右寸。口吐涎沫。不能多飲湯水。面色少華。五心多熱。而足背浮腫。古人謂金空則鳴。金實則無聲。金破碎亦無聲。是為肺病。顯然。然內傷虛餒為多。虛則補母。胃土是也。肺痿之病。議仲景麥門冬湯。

濮院孫 內外熱。蒸咳嗽。脈細而數。舌絳漸光。肺液暗耗。延成肺痿。非小恙也。外證醫案彙編 卷四 內部 肺痿 四

銀柴胡 地骨皮 蛤殼 穀芽 甜杏仁

浮淮麥 枇杷葉 石斛 橘紅

王 潰瘍。流膿。經年。脈細。色奪。聲嘶。食減。咳嗽。喉中梗痛。皆漏損脂液。陰失內守。陽失外衛。肺痿之病。諒難全好。

人參 黃芪 苡仁 天草 歸身

白芨

顧 久咳。神衰。氣促。汗出。此屬肺痿。

黃芪 八兩 生苡仁 二兩 白百合 四兩 黑甘草 二兩

白芨 四兩 南棗 四兩 水熬膏。米飲湯送。

湯 肺氣不降。咳痰嘔逆。

鮮蘆根 桃仁 絲瓜子 苡米

肺癰肺痿。雖同一肺經。治法大異。癰者。壅也。壅則不通。痿者。萎也。萎而不振。痿為邪實。癰為正虛。如肺癰之症。咳必暴。來必速。膈中隱痛。氣粗脈數。洪實。吐痰膿血。膩厚如豆汁。臭穢不堪。肺痿之症。咳必漸。來必緩。膈中不痛。氣緩脈數。虛大。吐痰白膩。柔如米粥。雖臭不甚。看肺癰肺痿。總以胃氣為先。有胃氣納穀。穀者。肺之穀也。米色白。屬肺。味甘屬胃。藉土生金。子有母依。雖重可治。若胃氣一敗。面紅膈熱。煩躁不甯。喘促嘔膿不休。或精神極倦。俱屬難治。金匱云。始萌可救。成膿必死。仲景使後人。肺癰

外證醫案彙編

卷四 內部

肺癰論

早治。勿致成膿。延久。肺痿葉敗。多致不救。然肺癰成膿之後。能胃氣不憊。正可支持。用藥謹慎。調理得法。十中可全四五。余見已多。未必竟為死症。治肺癰之法。如始萌之時。將一通字著力。通則壅去。壅去可消。肺葉雖壞無幾。元氣未傷。愈之亦速。故仲聖戒後學。即速通之。然通之一法。全在臨症之人。若風寒積飲。壅塞。以小青龍湯。微之水氣。溢肺壅塞。以葶藶大棗湯。瀉之火熱之毒。結聚壅塞。以早英丸。攻之。痰血相裹。壅塞。以澤漆湯。吐之。風寒襲肺。痰凝飲阻。氣機壅塞。以射干麻黃湯。開之。膿已將成。以桔梗湯。提之。風鬱化熱。積飲化熱。壅塞。肺脹而喘者。以越婢加半夏。小青龍加石膏湯。驅之。逐之。痰阻膿欲將成。壅塞。以

三物白散下之。以上之法。皆各分其因。從上。從下。從表。從裏。即

速通之。通則不壅之義也。如成膿已潰。治法亦要變更。潰後元氣已傷。肺葉漸壞。若專於通。攻穿裏膜。氣泄肺癰而死矣。故治法。不得不從緩而變更也。與肺痿之法相近矣。若已潰之後。膿血不盡。以千金葶藶湯。桃仁。消漸積之痰。葶藶。清肺熱。而通肺竅。改米泄肺熱。消久積肺中之水飲。瓜瓣。能生朽腐中之生氣。不致再潰。漸可暗生其肌。如餘熱未盡。胃氣不甦者。金匱麥門冬湯。取半夏滑利。佐以甘涼。肺竅中瘀血餘膿可去。助胃土。以生金。如氣已虛。熱毒未解。千金一味甘草湯。甘以培土。而兼解毒。此治肺癰之大略。肺痿者。萎而不振之象。痿屬氣虛。而津液

外證醫案彙編

卷四 內部

肺癰論

如草丹之痿。烈火薰蒸而藥寒凍凝。結亦能萎。或汗。或吐。或利。小便。或亡津液。肺燥則痿。金匱麥門湯。千金甘草湯。如肺中冷。多涎沫。上不能制下。焦陽氣不能上承。少蒸化之權。肺不能布精諸藏。下焦反不能蒸化津液。上供於肺。肺冷故也。以甘草乾薑湯。如氣阻涎凝。千金桂枝芍藥加皀湯。肺中冷。津液極少者。千金炙甘草湯。氣虛欲痿。黃芪甘草湯。肺冷氣虛。胃弱。千金生薑甘草湯。肺癰潰後。若不固正。亦可成痿。痿症始起。若變補亦可成癰。癰痿兩症。雖有虛實之分。實中夾虛。虛中夾實。臨時變化。用藥精當。如一有不慎。禍不旋踵矣。此皆金匱肺癰肺痿之大概也。然金匱方法。先聖之規模。方症合符。投之如鼓應桴。

如鍼刺若方症不合誤用則有毫釐千里之殊後賢無此力量不敢輕用先聖之方大有更異余思肺為嬌藏居於至高外合皮毛六氣之邪肺先受之肺被邪阻壅塞皆可為癆咳久肺虛皆可為癆癆癆始起各有其因若風溫襲肺壅塞不通以辛涼解之風寒鬱於肺中辛溫散之無病飲銀翅散麻黃杏子石湯麻黃湯蘇子降氣湯之類擇而用之若火熱刑金肺熱葉舉壅塞不通治以辛涼參以甘瀉清之泄之白虎湯瀉白散竹葉石膏湯葶藶湯若水氣上停積飲溢肺壅塞不通者治以苦溫淡泄小青龙湯葶藶湯二味來門冬湯清肺飲之類俱可斟酌用之若燥氣傷金津液煎熱膠結為痰粘滯肺氣壅塞不通治以清之潤之金匱麥門冬湯

外證醫案編 卷四 內部 肺癆 十七

清燥救肺湯天甘草湯三才湯桑麻丸三子湯瓊玉膏清燥湯五汁飲桑白皮等汁十味煎千金薑蜜丸玉竹麥冬湯玉女煎牛乳飲百合湯貝母瓜蒌散百花膏滋陰清化丸與久咳肺癆合而用之此等皆避重就輕杜漸防微早治之法因病進藥不致成癆倘成癆之後雖用金匱各法不亦晚乎若肺癆始萌之時又不能辨症由延時日聽其成膿內潰豈不更晚也余愧不敏隨錄各方治於未成之前惟願高明參酌今輯四十八方皆見症施治不拘金匱成法避重就輕實皆從古法中脫化而出初學之士能將此篇方論潛心默契再考博羣書肺經癆癆雖不求有功先可保其無過莫笑鄙言迂拙治病不求有功不如不藥然今看內癆者能六氣虛實癆瘵將成已成辨別清熱藥必中病能有幾人若能細心審症

用藥的當雖不能見速功而無大過都亦醫之上工矣余馳瀾

瓜蒌說

瓜蒌即瓜子總而言之余以內癆之要藥不獨治肺癆一症何也如瓜子在瓜中日久瓜已朽腐其瓜子生全能存朽腐潰爛中生之氣余內癆潰後無所不用肺癆用西瓜子取其形似肺天生白虎湯可清肺金肺癆用東瓜子取形象腹肺屬金胃屬陽明燥金俱色白肝癆用絲瓜子肝色青主筋絡絲瓜取其色青有絡也腸癆用甜瓜子取其質直色白大腸燥金色白質亦直而通也其餘內癆瓜蒌子均可酌用

葦莖說

外證醫案編 卷四 內部 肺癆 十六

葦葦一物兩種葦粗大而質鬆蘆細硬而質堅皆中空後人俱用蘆根取其色白味甘清肺胃之正藥如肺胃熱甚可用如肺癆潰膿之後正氣已虛熱勢已退多服寒涼敗脾戕胃肺之小管最多餘膿膠粘其中搜剔不淨千金用葦莖取其性中通可入通肺之小竅搜剔管內餘膿通其筋絡之氣通不致壅塞膿成後患若再用蘆根使虛陽上騰胃氣更弱余治肺癆潰膿之後正氣已虛餘膿不盡以乾葦梗頂上花下嫩管去節用如膿將成熱尚未盡用鮮葦梗頂上嫩管取其上也肺位最上葦性中空善通領桃仁入肺中搜剔瘀血敗膿使苡米洩其已蓄之水肺之清肅可行穢濁朽腐可藉瓜蒌生氣可生喻嘉

言先生曰。千金葦蕈湯。此方堂堂正正之師也。吾師曰。葦蕈湯。諸內癰成膿。俱可治。不獨肺之一藏也。此肺癰肺痿及瓜瓣葦蕈等說皆先師實蘭求也。盧之大者也。其葉附於葦。治肺癰用葦上嫩梗。即葦莖耳。願是。能詳註。

徐靈胎先生治蘇州錢復庵。咳血不止。諸醫以血證治之。病益劇。往視見其吐血滿地。細審之中。似有膿而腥臭者。曰。此肺癰也。膿已成矣。金匱云。成膿則死。然有生者。遂多方治之。病者亦始終相信。一月而愈。蓋平日因此證甚多。集唐人以來治肺癰之法。用甘涼之藥。以清其火。滋潤之藥。以養其血。滑降之藥。以祛其痰。芳香之藥。以通其氣。更以珠黃之藥。解其毒。金石之藥。填其空。兼數法而治之。屢試必驗。今治錢君。兼此數法而痊。強健逾舊。幾二十年矣。按徐氏存案。有法無藥。此皆然。此亦先從立法。不若葉香廉先生。臨症指南。方宗兼備。可採共意。可師其法。

外證醫案彙編

卷四 內部 肺癰案

九

時治驗常熱。西術徐姓。金陵人。年五十餘。因子動怒。兼鬱。咳嗽吐痰。延戴姓醫治之。進以木香、厚樸、豆豉、牛蒡等。咳更甚。面紅痰沫頻吐。起坐不安。前醫見其面紅煩躁。進以鮮生地、鮮石斛、麴椀、苓、連等。更甚。吾友仲鳴徐君。偕往診之。脈虛大無力。煩躁面赤。舌白底絳。頻頻吐痰滿地。白膩如米飲。雖臭不甚。余曰。燥傷肺金。再以苦寒。中陽阻遏不通。肺無肅化之權。清陽不能上升。下之津液不能上承於肺。肺之水蓄不能下行。愈吐愈乾。肺

將痰矣。即用千金炙甘草湯原方。取薑桂之辛。速開中宮阻隔之陽。引酸鹹柔潤之藥下行。化津液救上之燥。取參、草、棗、培土壯氣。使土氣可以生金。麥冬、麻仁潤肺。而柔陽明燥金。加苡米。洩上蓄之水。下瀉清肅。下降津液上承。後人畏用薑桂。何也不知大雨雪之前。天必先濕。一派柔膩陰藥。賴辛甘之味。可以通陽。藉其蒸化之權。下焦津液上騰。肺之清氣自可下降。雲蒸雨施。故無疑耳。照方服兩帖。痰沫已盡。咳嗽亦止。後服甘涼清潤。生黃芪、北沙參、百合、玉竹、川貝、枇杷膏、甘草。壯氣潤肺。清熱十餘劑而痊。今已五六年。強健逾昔。古人立方。不欺後學。人言將古方治今病。如拆舊屋造新屋。使後人擬古酌今。非使後學不用古方也。余曉鴻地

外證醫案彙編

卷四 內部 肺癰案

十

常熱。鼎山高渭榮。始春初咳嗽。至春仲。痰中帶血。味兼腥穢。延他醫治之。進牛蒡、豆豉、枳殼、厚樸等。服後愈甚。邀余診。脈細數無力。咳痰痰血。味臭。曰。肺癰膿成。胸有隱痛。絡瘀尚未化膿。尚有壅塞。肺葉所壞無幾。急速開提。使膿外出。不致再潰。他藥擬桔梗、甘草湯。金匱旋覆花湯。合千金葦蕈湯。因其膿成無熱。用蘆頭管乾者一兩煎湯代水。服三劑。每日吐血膿臭。痰一茶盞。至四日。膿盡。而吐鮮血。臭味亦減。未盡時。前劑去桃仁、桔梗。加枇杷葉、萊豆皮等。服五六劑。血盡。再進以金匱麥門湯。千金甘草等。加沙參、石斛、百合等。清肺養胃而愈。再以甘涼培土生金。

調理一月。強健如故。後有常熟白龍港某。於高涓茶友二人。酒肆中。同。日。咳嗽。亦。生。肺。癆。至。高。涓。藥。病。愈。往。探。之。即。邀。余。診。之。脈。已。伏。膿。血。臭。甚。傾。吐。滿。地。裸。體。臥。床。用。扇。扇。之。口。中。開。要。食。西。瓜。飲。冷。水。他。人。摸。之。體。若。寒。冰。眾。人。詢。問。何。如。余。曰。肺。已。爛。盡。一。身。之。陽。氣。俱。從。外。洩。危。在。頃。刻。盧。扁。再。生。亦。無。治。法。至。夜。而。歿。仲。景。諄。諄。誠。之。成。膿。不。救。使。人。早。治。然。成。膿。日。久。不。治。必。死。治。不。得。法。亦。死。者。多。余。聽。鴻。誌。

丙戌冬。溫不寒。常熱風氣。終年喜食蘆根。橄欖。至春初。驟寒。冬。溫。內。伏。經。春。咳。嗽。音。啞。咳。痰。不。能。出。漸。漸。痰。味。變。腥。臭。膿。血。甚。多。此。症。皆。以。麻。黃。甘。草。杏。子。石。膏。湯。大。青。龍。湯。加。半。夏。得。效。極。多。外。證。醫。案。彙。編。卷。四。內。部。肺。癆。案。

多有富貴之體。畏不敢服。延久俱成癆者。皆病家自誤耳。某寺和尚。冬溫咳嗽。每日飲橄欖蘆根湯。數十日。咳。嗆。口。欠。痰。臭。不。出。就。余。寓。診。脈。右。寸。關。數。大。而。硬。時。有。鼓。指。余。曰。喉。中。痰。少。而。臭。脈。見。右。大。鼓。指。肺。癆。已。經。成。膿。急。宜。開。提。使。膿。傾。出。免。潰。他。藥。以。甘。草。桔。梗。干。金。草。莖。法。服。後。吐。出。臭。膩。黃。色。膿。痰。碗。餘。因。其。膿。出。太。多。氣。短。納。少。余。曰。久。咳。膿。多。肺。葉。敗。壞。欲。痊。之。勢。進。以。甘。草。湯。他。醫。見。之。曰。此。是。酒。勞。被。其。誤。治。先。服。桃。仁。後。服。薑。桂。皆。非。治。法。不。知。古。人。立。方。有。奇。偶。佐。使。後。延。他。醫。治。之。遷。延。月。餘。吐。膿。不。止。而。歿。常。熟。東。門。某。姓。年。將。周。甲。素。喜。酒。痰。飲。咳。疾。有。年。余。每。以。橘。半。六。君。桂。苓。木。甘。等。服。之。皆。效。是。年。咳。

疾又發。有其某親者。亦讀書。實為關切。與服牛蒡。豆豉。枳。椇。等。六。七。劑。咳。吐。白。痰。不。休。漸。漸。神。昏。目。瞑。嚙。語。粘。衣。摸。床。舌。薄。白。不。渴。飲。是。晚。邀。余。診。脈。虛。緩。無。力。痰。如。米。粥。盪。碗。余。曰。此。肺。液。吐。多。肺。已。痿。矣。況。喻。嘉。言。先。生。曰。肺。痿。見。其。舌。白。恐。膽。用。燥。藥。令。其。竭。竭。自。焚。而。死。都。醫。羅。加。等。即。與。干。金。炙。甘。草。湯。服。兩。劑。痰。漸。少。稍。能。言。語。進。穀。神。識。亦。清。後。其。親。至。因。舌。白。不。渴。膩。藥。難。進。投。以。芳。香。甘。溫。砂。仁。棗。仁。木。香。之。類。兩。帖。而。逝。然。生。死。雖。有。定。數。冥。冥。中。自。有。主。司。不。過。我。等。落。在。其。中。一。呼。即。到。奔。如。牛。馬。稍。有。延。遲。病。家。不。悅。謀。衣。謀。食。作。此。賤。役。無。所。推。諉。凡。涉。獵。醫。書。之。人。溫。飽。自。安。親。朋。之。中。實。為。關。切。若。不。深。思。研。究。病。外。證。醫。案。彙。編。卷。四。內。部。肺。癆。案。

變百端。豈堪輕試。所云學醫貴人。能勿懼耶。徐靈胎先生醫論。中言之已詳。余不敢贅言矣。余聽鴻。長田岸。有孩六歲。正喫飯。被母打一下。大哭。飯。正。滿。口。有。飯。噎。入。肺。竅。中。後。見。咳。嗽。無。寒。熱。飲。食。二。便。如。常。就。余。診。服。肅。肺。清。散。之。品。五。六。劑。見。有。寒。熱。飲。食。漸。減。又。停。半。月。來。診。見。痰。中。血。絲。色。殷。而。少。胸。中。隱。痛。服。葦。莖。湯。合。疎。開。肺。氣。罔。效。細。詢。其。病。之。始。末。其。母。云。喫。飯。大。哭。噎。後。起。咳。嗽。月。餘。見。血。後。口。中。臭。穢。余。細。視。血。中。白。點。微。黃。膿。也。余。思。食。物。噎。入。肺。管。壅。塞。為。患。將。燈。心。刺。入。鼻。孔。使。其。噴。嚏。吹。以。皂。角。末。後。得。嚏。痰。血。稍。多。再。將。早。煙。噴。之。使。其。咳。更。甚。咳。甚。大。哭。作。嘔。嘔。血。塊。兩。枚。如。蚕。豆。大。

兼膿痂。余將血塊拈起。剔開。中有白色朽腐。如飯米形。服以葶
 苈湯。合金匱旋覆花意。另服早更丸。一日一粒。服藥三劑。丸三
 粒。膿血清楚。再服麥門冬湯。加枇杷葉。沙參。石斛。之類。而愈。故
 人飲食之間。不可多言喜笑。倘有物嗆入肺管。成癆。醫不能知。
 自不能知。釀成大患。此。咳幸是。藜藿農家。聽醫所為。若紳宦之
 家。嬌養柔嫩。就醫肯如此。病家不願。病家肯如此。醫亦避嫌不
 施。治病之弊如此。誤於醫者多。而誤於病者亦多。余治肺癆。皆
 宗金匱法最多。芳香金石之品。從未敢輕試。即鮮車前草。搗汁
 服。最效。余聽鳴註。

○胃癰

外證醫案彙編 卷四 內科 胃脘

丹陽柳 寒熱類瘧。中脘穴隱痛。聽按最微。腫不咳嗽。咯吐膿血。
 聽按與肺癆。是胃癰也。脈沉而數。仿立齋壯胃氣為先法。

川石斛 殺芽 米仁 黃芪皮 冬瓜子
 冬桑葉 萹仁 橘皮

田涇屈 中脘穴腫痛。不可忍。此食積與七情之火。互結陽明。不
 得宣通。成癆。有兆。擬理氣消積。以冀痛減。

半夏麩 枳榔 青皮 葛根 大麥仁
 范志麩 厚樸 萹皮 草果

楓橋姜 寒熱延久。胸膈隱痛不已。聽按此係食滯阻氣。不宣。並
 無咳嗽。聽按此以病言。嘔吐膿血。釀成胃癰矣。誤認肺癆。愈治愈劇。尤

恐毒氣內攻腸胃。其害非淺。

沉香 焦麩 枳殼 枳榔 陳皮

厚樸 瓜萹 薏殼 大麥仁

紹興張 脘痛作嘔。寒熱不解。此熱阻胃口。須防成癆。

煨葛根 枳榔 草果 青皮 厚樸

青藜梗 瓜萹仁

附製方 江枳殼 枳實 欬皮 酒藥

右藥為末。共炒熟。絹包。熨痛處。

韓 酒濕類聚。例以分利。診脈微。陽氣已敗。濕壅生熱。致胃癰膿。

外證醫案彙編 卷四 內科 胃脘

清熱則陽亡。即死。苓朮運中祛濕。佐附迅走氣分。亦治濕一法。

茯苓 熟附子 生白朮 左牡蠣

澤瀉 車前子

胃癰一症。內經。甲乙經。東垣十書。馮氏錦囊。全貴要略。立齋醫
 案。丹溪心法。外科正宗。諸書論症論脈已詳。毋須瑣述。然能識
 症知脈者甚少。內經曰。當候胃脈。其脈當沉細。沉細者氣逆。甲
 乙經作逆者。人迎甚盛。甚盛則熱。人迎者胃脈也。逆而盛則熱。聚
 於胃中而不行。故胃脘為癰也。脈息微。逆而盛則熱。聚
 於胃中而不行。故胃脘為癰也。脈息微。逆而盛則熱。聚
 於胃中而不行。故胃脘為癰也。脈息微。逆而盛則熱。聚

手不能逆。所為至難。若全憑脈息。指下辨明。七尺之軀。九分之
 脈。能分內癰。非易談也。惟內經云。本經募原。隱痛浮腫。即為何

脈。能分內癰。非易談也。惟內經云。本經募原。隱痛浮腫。即為何

瘕如此辨之。稍有二三分把握。然到此瘕勢已成。經云六府不和。留積為瘕。壅遏不通。則熱。熱勝則肉腐。為瘕。惟胃之為瘕。更甚於他府。經云胃為之市。百物聚集之所。太素曰胃者太倉也。咽大腸小腸膀胱胃之間。里門戶也。市倉所積。賴脾氣之運。間里門戶。轉運通調。太倉不致壅塞。市不致阻滯。胃實則腸虛。腸實胃虛。更實更虛。氣得上下。自然無病。經云飲食不下。腸塞不通。邪在胃脘也。鄙意思之。致胃脘瘕者。各有其因。或酒濕壅熱。或膿厚太重。或熱藥過度。或七情鬱火。或飽食奔走。或飽食喜臥。或擾攘動怒。俱可熱鬱氣逆。壅塞成瘕。胃為人之根本。人以胃氣為先。飲食藥餌。若有不宜。無不先傷於胃。胃屬中虛。兩頭

外證醫案彙編

卷四 內部

胃瘕論

三五

門戶最上。上口為贛門。下口為幽門。物聚類雜。最易壅塞。胃瘕有上下之分。壅於贛門。脘中阻硬成膿。則吐膿血。壅於幽門者。近臍隱痛。成膿。則便膿血。治胃瘕之法。將成之時。以通氣消積為先。六府以通氣為補。通則壅去。先保其不成。如熱勝已經成。膿以清熱排膿。達下。清熱則保其未受傷之地。攻下膿血。不致潰腐腸胃。膿潰之後。保養胃氣為先。倘胃氣一敗。飲食漸減。藥難運化。延成危症。若胃脘穴外生瘕。高突。按之有膿。即用火鍼。或用刀。臥而刺之。使膿從外洩。不致內潰。裏膜腐爛。藏府若膿日久。穿膜腐腸。多致不救。今輯七方。未成膿之前。理氣攻積一法也。已成膿之後。壯胃氣一法也。濕壅生熱。運中祛濕一也。

胃瘕初起。外熨溫通。一法也。其餘排膿。清熱。攻積。消滯。達下。諸方。有羣書可考。不待煩言矣。余聽鴻誌。

附治案 余叔岳祖陳順貴。年五十餘。是日家中會期。將衣飾向孟河典中質錢七八千。負之奔歸。約十二三里。到家正會酒坐席。負重狂奔之下。腹已飢餓。酒肉雜物。大啖之後。飲食加倍。腸胃已傷。飽食迎風。臥後。覺胃脘氣阻不爽。停數日。胃脘隱痛。即就馬培之先生診之。曰胃脘瘕也。服藥數劑。漸高大。培之先生曰。膿已成。再服內托等藥數帖。脘中如覆碗。即將火鍼刺之。插以紙捻。過一宿。拔出紙捻。洩膿碗餘。後服壯胃化濕生肌等藥。調理兩月而愈。余聽鴻誌。

外證醫案彙編

卷四 內部

胃瘕案

三六

邵鏡泉浙江甯波人。年五十餘。在常熟南門外開合興槽坊者。壬午。因徧體絡脈抽痛。余與其治愈之後。其二三年。終日坐一小樓。飽食喜臥。日久胃脘阻硬不舒。延某姓醫治之。云濕熱。延診十餘次。罔效。又延當時成名之醫治之。曰食滯濕熱。立方服藥二十劑。中脘高突。往蘇省就馬培之先生診。曰胃脘瘕也。當在蘇就停十餘日。服藥十餘劑。待膿成熟。鍼穿洩毒。可不穿膜腐腸。邵服藥兩帖。少效。旋常熟。五六日。亦不服藥。聽其脘中高突。吾友松雲張君曰。既上年徧體絡痛。是某治愈。何不邀診。余診其脈。來疾去遲。關寸見數。胃脘按之甚軟。高突如覆杯。余曰。胃脘瘕也。內膿已成。即向蘇就培之馬君處。或刀。或鍼。刺穿。待

其毒淺。免穿裏膜。腐腸胃。若遲則裏膜穿。胃腐不救也。病者以
余言太甚。怒色曰。胃若成膿。何以飲食二便如常。口中大便何
以不出膿。余曰。臟腑不和。瘡發於外。營衛稽留。經脈血泣。熱
勝。恐肉腐。膿向內潰。腐爛腸胃。若不早開外洩。不免後悔。病者
曰。腸腑未壞。先戳穿肚皮。不敢將命。試馬君之藝。君勿言之。余
曰。忠言逆耳。良藥苦口。事有定數。謝之不敏。後邀著名外科。治
之無效。經四十餘日。回甯波。延醫治之。不識何症。到甯波府城
中。著名外科視之。曰。胃脘癰膿成。二百金包治。病者亦願。不料
已經內潰。出頭三處。出膿數碗。漸漸胃敗而沒。嗚呼。醫學難全
者。即此也。內科不能刀鍼。尚可飾說。有一等著名外科。一見內

外證醫案彙編 卷四 內部 胃脘癰

癰刀鍼手法。毫無把握。即將膏藥敷藥。敷衍釀成患。往往腐
腸穿膜而斃。較內科方藥誤人何如。耶。惟願後賢開內癰之法。
不得不潛心致叢。耳。惟學內科者。內癰刀鍼不能不學。若逢內
癰。內外科各相推諉。遺誤者。不堪勝數矣。聽誌
甘露鎮。華姓。五十餘。脫中痞硬。中府穴高突。按之堅硬不痛。余
曰。此氣阻積滯壅塞。急宜化滯理氣。用枳。樸。檳榔。麥芽。神麩。木
香。括。萸。砂。仁。青。皮。之。類。服。兩。劑。脫。中。漸。平。再。將。原。意。加。郁。李。麻
仁。桃。仁。製。大。黃。服。兩。劑。下。燥。糞。甚。多。脫。中。平。軟。如。故。後。服。參。苓
白。朮。散。十。餘。劑。胃。瘳。而。痊。聽誌
李儀藩。常熟毛家橋人。城中龐氏戚也。胃脘中堅硬如盤。約有

六七寸。他醫皆謂胃脫癰。治之罔效。就余診之。脈來堅濇。飲食
二便。行動如常。余曰。飲食二便如常。中宮無病。此非胃脫癰也。
痞積症也。寒氣夾痰。阻於皮裏膜外。營衛凝滯。不通。沉煙體陽
虛。陰氣凝結。少陽氣運化。非溫補不可。進附。桂。鹿。角。枸。杞。杜。仲。
巴。戟。茴。香。當。歸。仙。靈。脾。參。木。香。薑。棗。等。溫。補。通。氣。活。血。外。貼
附子。玉桂。阿膠。丁香。細辛。山。棧。木。水。紅。花。子。麻。香。鹿。角。粉。木。香。麻。黃。等。品。研。末。攤。厚。膏。藥。貼。之。服
藥。五。十。餘。劑。貼。膏。藥。兩。月。餘。而。痊。消。盡。軟。復。如。舊。聽誌
福山塘謝姓。年五十餘。不咳嗽吐膿血。不甚臭。余曰。此胃癰也。
成膿之後。速達於下。用千金葦莖法。去葦莖。加瓜。萸。丹。皮。製。大
黃。甘。草。服。後。大。便。下。膿。血。漸。稀。後。進。東。瓜。仁。苡。仁。丹。皮。甘。草。白

外證醫案彙編 卷四 內部 胃癰

木。橘。白。生。扁。豆。石。斛。竹。葉。等。待。膿。盡。服。扶。胃。清。熱。十。餘。劑。而。愈。
聽誌
和按胃癰。胃脫癰。本有兩種。胃脫癰。生於中脘穴。皮裏膜外。氣
血壅塞。肌肉之中。胃癰生於胃之上口。或下口。在賁門幽門之
間。飲食不節。膏粱厚味。壅熱。或飲食過飽。壅塞不能展舒。化熱
皆能成膿。治法。保住裏膜。為要。務胃脫癰成膿者。即速用鍼刀
開之。膿洩於外。勿使內潰。胃癰成膿。即速排膿。達下。勿使外潰。
始終能護住裏膜不穿。雖重可以挽回。若裏膜一破。多致不救。
肝癰
東山范。寒熱延久。左偏脇肋。結腫作痛。時發時止。脈數而弦。此

風熱於肝氣相併為患。慮成肝癰。宜疎肝清熱。標本並治。

旋覆花 延胡 川棟子 新絳 丹皮

黑山梔 黃柏 青蔥管 當歸

青浦徐 咳倉久纏。交冬令來。左脇肋隱痛。聽按此以期門微腫。

聽按此以兩脇脹滿。側臥則驚。聽按素問曰肝癰兩脇便溺艱澀。

聽按肝絡顯係肝癰之症。議與疎肝洩肺為治。聽按學三先生

繫於二陰也。者此

枇杷葉 蘇子 紫苑 鈎藤 通草

廣橘紅 新絳 竹茹 瓜萹

嘉善周 脇下結腫。色白。不能轉側。重按覺痛。此肝癰也。大便燥

而秘。有瘀血在內。理宜疎降。

柴胡 桃仁 青皮 木香 生軍

歸鬚 香附 黃芩 延胡索

王 痛久屈伸不得自如。聽按徐靈胎先生評曰經脈絡脈呆鈍。

氣痺血瘀。鬱蒸化熱。旬日頻頻大便。必有血下。復喘促煩躁。不

飢不食。並無寒熱汗出。全是錮結在裏。欲作內癰之象。部位臍

左之上。內應乎肝。癰者壅也。血結必入於絡。吐痰口氣皆臭。內

癰已見一斑矣。

炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁

東瓜子 紫苑 金銀花

肝癰一症。因不常有人。皆罕見。故諸書少詳。經云。期門隱隱痛者。肝癰。其上下肉微起者。肝癰。期門穴又名肝募在乳旁素問曰。

肝癰兩脇滿。臥則驚。不得小便。余思肝為厥陰。內藏相火。膽屬

相火。火與木連膜同脂。肝為風藏。為將軍之官。謀慮出焉。膽為

中正之官。決斷出焉。肝之謀慮。取膽之決斷。人有謀慮不決之

事。肝鬱則氣結。血凝。膽不能決。火愈熾。風愈煽。氣血凝結。鬱則

火生。肝氣不能宣通。火鬱則化成膿。脇肋期門者。皆肝之外候。

肝絡布於脇。少陽膽絡行身之兩旁。脇肋作痛。生癰。皆在肝之

絡。非肝之本藏也。華真君曰。肝癰不可鍼刺。須用內消法。都

意肝氣逆於絡中。壅塞成膿。此乃外候軀殼之病。脇肋為肝膽

行經之所。期門。肝之穴。若聽其內消。不得外潰。反潰入裏。攻穿

裏膜。腐及腸胃。豈有不早刺外洩。聽其內潰。豈有是理。若生軀

殼之內。肝之本藏。癰成。速用內消之法。斷無在軀殼之外。刺穿

裏膜。能及於肝者。未之有也。故治內癰之法。一層裏膜。如用兵

之一座城垣。生於外者。始起之時。如暴寇初至。當先散其衆。不

能待其廂結。理氣消痰之藥。用之在速。使其絡脈宣通。自然消

散。若已癰膿。如賊已成。城中之軍。不能敵。不得不求救於外。

雖服內消。內托。亦屬無益。急用刀鍼。刺使毒外潰。如救至攻

開賊壘。城中軍心自安矣。生於內之本藏者。如左右之親。內

引內患。暗伏其中。急宜搜之。逐之。倘一時懈怠。失察。滋蔓難圖。

故內癭。鍼不可及。手不可近。若不杜漸防微。致成危症。陳遠公曰。肝遂癭。脹其勢似緩。然肝性最急。癭成而毒發甚驟。焉有脇痛數日而死者。此癭已久成膿。潰毒而死。如左右之患。起於不測。債軍敗。此皆醫不能預治而速延。病家疎忽不治而死者。不能杜漸防微。預治其患也。余以治內癭。腹部之癭。先保裏膜。如用兵。始終保住城垣。萬軍不致潰散。生死關頭。即此矣。肝癭雖屬罕見。肝非金石。豈有不生癭者乎。揀拾成議。質之高明。臨症之時。未尚無小補耳。余聽鴻誌

外證醫案彙編

卷四

內部

肝癭案

三

昔在業師處。施姓婦。素有肝氣。喪夫後。因應嗣愛嗣。爭產不能決。後脇肋刺痛。吾師治愈。後經阻三月不通。覺左肋內由臍旁引痛。腰脊肌肉不變。重按之內中極痛。吾師曰。此肝癭也。用延胡。柴胡。川棟。青皮。歸尾。木香。合。桃核承氣法下之。下血紫片如雞肝。一劑後痛減。再進消癭。理氣疎肝。解鬱。數十劑。經通痛止而愈。吾師曰。若肝經絡脈生癭。當用活血理氣之輕藥。取其輕可入絡。若癭生於內中本藏。當用破血理氣重藥。取藥重力。專直攻本藏也。肝為藏血之藏。血壅氣阻。葉脹成癭。故速下之。使肝中氣血疎通。腫亦可消。治內癭。雖屬理氣消癭同一法也。然各藏引經之藥。必須用之。倘不用引經之藥。反傷他藏氣血矣。

余聽鴻誌

丁亥六月。余治常熟大河鎮某姓婦。早寡。上有老姑七十一歲。兩代嬌居。携子耕讀安居。不料有某。暗侵其產。事至成訟。姑媳上堂質審。幸邑尊剖斷如神。產業未能被人所佔。結案後。鬱怒所致。左脇肋及少腹。臍旁作痛。大便秘結。小溲不通。他醫進以五苓。八正。導赤等。滲利之品。罔效。就診余寓。問病之始末。余曰。肝絡繫於二陰。肝主疎泄。少腹刺痛。是怒鬱傷肝。恐生肝癭。急宜疎肝達下。用川鬱金。金鈴皮。香附。延胡。柴胡。木香。橘葉。歸鬚。瓜蒌。厚樸。合。逍。道。散。等。一劑。另服通關丸。三錢。大解。已通。小溲亦暢。後原方增減。服兩劑。痛漸愈。據述其姑審後到家。即起痢疾。年逾七旬甚重。即晚開船回去。余細思之。此症日久。亦肝癭。幸而爭訟能勝。屈有所伸。怒有所洩。肝氣尚可展舒。若官長不明。或紳宦說情。曲護。屈無所伸。怒無所洩。孤孀廢婦。姑媳之命。未嘗不以此而危。所以與聞公門之事者。當三思行之。培德無涯矣。余聽鴻誌

外證醫案彙編

卷四

內部

肝癭案

三

○腸癭
劉河孫 去年產後。瘀積未楚。入春腹漸作痛。兩手脈來滯滯。此係絡脈有阻。隧道阻塞。以致腹形漸大。關元穴微腫。按之急痛。乃成癭之兆。法宜消積通絡為治。
製香附 柏子仁 延胡 米仁 麥芽

旋覆花 青葱管 赤芍 歸類 丹參 新絳

南澤宋 素患肥氣。近加少腹繞臍而痛。蓋厥陰脈絡並於小腸。又為水分穴之所。慮成腸癰。形脈皆現虛象。恐難支持。

黨參 琥珀 麻仁 黑芝麻 淡菴蓉 紅袖 人乳 青橘葉

覆方 水分穴較前愈腫。臍腹疼痛更甚。正屬釀膿之候。仍擬清潤。不致毒從臍出也。

黨參 大腹皮 橘紅 竹茹 殼芽 飴糖 伏龍肝 石斛 菴殼

外證醫案彙編 卷四 內部 腸癰

常州徐 產後敗瘀阻於腸募。少腹作痛。腸癰之所由作也。且擬溫通之法。以冀瘀下。積消。堪免成膿。

肉桂 蘄艾絨 丹參 麻仁 炮薑 琥珀 充蔚子 紅袖 薤白頭

覆方 積瘀稍下。一時未能蕩滌。腹痛依然。按脈細澀。元氣甚虛。扶元則積瘀難下。疎導則元氣愈虛。攻補兩難。平章不易。勉擬溫通。再候轉機。

肉桂 黨參 神袖 陳廣皮 苡米 丹參 艾絨 麻仁 威靈仙

丹徒楊 衝任脈虛。天癸不準。來時腰腹作痛。此係肝虛血滯。阻

於腸膜以致少腹結硬疼痛不已。有腸癰之兆。姑擬溫通導滯。以望紅潮準信。為入消之消。

製附子 花蕊石 桃仁泥 羌蔚子 敗醬草 查炭 丹參

附薰方 小白菜 棉花核 車前根 青葱管 大蒜頭 艾蓬頭

覆方 腹痛得緩。瘀濁已下。誠為佳兆。惟少腹腫塊依然未退。此積瘀未淨之故也。仍以前法治之。

製附子 肉桂 陳皮 查核 新絳

外證醫案彙編 卷四 內部 腸癰

花蕊石 丹參 羌蔚子

附摩汁代茶方

沉香 烏藥 降香 蘇梗 枳殼 鬱金 枳榔

青浦張 寒食互結。少腹逆痛。脈沉滯。非惟厥悶。防其成癰。

沉香 艾絨 枳榔 藿香 炮薑 椒目 草果 厚樸 炮淡吳茱萸

吳江朱 寒凝氣滯。少腹作痛。此腸癰之基也。

厚樸 蘇梗 枳殼 廣皮 葛根 枳榔 蒼梗 青皮 查肉 葱管

餘杭飲 小腸癰。延遲詒誤。內膿已成。破後必費曲折。急與補托。勿一候再候。向作痞治。何異隔靴搔癢。

黨參 瓦楞子 丹參 棗仁 米仁
黃耆 稽豆皮

梅堰湯 小腸癰破後。穢膿奪臍而出。盜汗脈軟。形體尪羸。瘡性已成。難許無虞。

黨參 北沙參 棗仁 五味子 木香
黃耆 范志麩 浮麥 稽豆皮 廣皮

瘡墟沈 小腸癰內潰。小便下疝十計。此乃內膜有傷。治之非易。製附子 琥珀 東瓜子 苡仁米

外證醫案彙編 卷四 內部 腸癰 三

敗醬草 川連 廣皮 瓜蒌仁
覆方 膿虵如故。藥石無功。

黨參 烏賊骨 陳皮 兔絲子 米仁
丹參 菩提珠 穀芽

嘉定閱 產後瘀阻。自冬經夏。少腹作痛。無著跡。急疎營絡。免成腸癰。

製香附 羌蔚子 艾絨 當歸 蘇梗
延胡索 澤蘭 丹參

崑山孟 專後體虛多臥。以致敗血失遂。流注腸中。釀成內癰。擬和以導之之法。

香附 陳皮 當歸 丹參 煨木香
白芍 艾葉 羌蔚子

同里張 微寒微熱。脈細而數。少腹急腫。臍突。轉側有水聲。內癰已成。擬溫以通之。

肉桂 羌蔚子 陳皮 澄香 艾葉
薤白 花蕊石

蘇州錢 恒業樞夫。急於奔走。致腸胃。傳送不能舒展。敗血濁滯。壅遏腸中。而成內癰。與憲以仁湯治之。

赤小豆 防己 薏苡仁 甘草 桃仁
粉丹皮 萹仁

外證醫案彙編 卷四 內部 腸癰 三

嘉定比印尼 小腸癰潰後。虛熱不已。臍中時流敗水。濁滯。此症起於素志不舒。經閉為病。難於調治。

黨參 米仁 穀芽 甘草 赤苓
丹參 花粉 陳皮

金澤錢 少腹攻痛。小便澀滯。兼以後重。防成小腸癰。

澄香 陳皮 枳實 艾葉 青皮
蘇子 烏藥 薤白 川棟子

附董方 大蒜梗 青葱管 艾葉
唯亭李 臍腹隱隱作痛。痛則氣衝於上。便秘脈花。小便赤淋。滑

痛顯係腸瘕非奔豚也宜大黃湯下之瘕去痛即緩矣

大黃 朴硝 桃仁 丹皮 青皮 以仁

丹參 木通 赤苓 芫蔚子

蠱野王 蟠腸瘕前擬導痰開洩法未見鬆機痰滯腑絡未能蕩

滌再以排痰潤腸佐以降氣

沉香 郁李仁 麻仁 新會皮 蘇梗

川斷 兔絲子 萹仁 青蔥管 丹參

太倉朱 惡寒發熱少腹脹滿脈有孔象左脚屈不能伸名縮脚

腸瘕宜破瘀行氣治之

延胡 陳皮 木香 歸尾 青皮

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕

枳殼 紅花 焦山查

淋涇周 臍腹絞痛轉側有聲腸瘕已成矣

焦神鉤 官桂 枳殼 艾葉 炮薑

山查核 川棟

吳江張 腸瘕

川棟子 澄香 白芍 烏藥 蘇梗

山查核 陳皮 艾葉

朱家角陳 少腹氣逆便秘脈花防成蟠腸瘕

葛根 沉香 青藿梗 厚樸 查核

艾葉 栝柳 扁豆葉 枳殼 陳皮

橫涇馮 半產後五十餘日惡露流入小腸以致腹痛且腫腸瘕
之新也擬夫笑散主之

五靈脂 蒲黃 川棟子 川連 芫蔚子

延胡索 丹參 薤白頭 查核

青浦朱 脾虛不能飢血敗瘀滲入腸胃之間以致臍突腹腫痛

勢日加此腸瘕欲作膿也法擬健脾行瘀以冀勿潰為妙

芫蔚子 兔絲子 穀芽 丹參 竹茹

川棟子 新會皮 白芍

太倉繆 腸瘕在將成未成之際擬運行以傳散

川鬱金 延胡 歸尾 申薑 陳皮

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕

絲瓜絡 紅花 桃仁 蘇梗 新絳

平望倪 腹中作痛脹滿難食小便澀滯此腸瘕也遵古法以薤

以仁湯主之

米仁 瓜萹 丹皮 白芍 桃仁泥

畢 濕熱由腑滯及腸中大便不爽食入不適半昔肝木易動厥

陰不主疎泄少腹形脹無非帶氣之壅久則凝瘀日踞

小温中丸 三錢十服

某 臍旁紫黑先厥後熱少腹痛如刀刮二便皆澀兩足筋縮有

腸瘕之慮

老蘆白 兩頭尖 小茴香 當歸鬚 炙山甲

某 舌焦黃。小腹堅滿。小便不利。兩足皆痿。濕熱結聚。六腑不通。有腸瘕之虞。

川棟子 丹皮 山梔 通草 青皮

小茴香

某 壯熱旬日。周身筋脈牽掣。少腹堅硬。小便淋漓。忽冷忽熱。欲

瘕膿血。乃腸瘕為病。仿孫真人牡丹皮大黃湯主之。大黃牡丹皮芒硝瓜

子桃仁金匱剛紫劉涓子

蔣氏帶下不止。少腹內踈連痛。全足不能伸縮。絡脈不宣。最有結

瘕。纏綿不可不慮。醫去肝氣。豈有是理。

桂枝 遠志 當歸 枳子 茯苓

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕 无

鹿角霜 生沙苑

朱十四產後冬月。右腿浮腫。按之自冷。若論敗血。半年已成腸瘕。針

刺泄氣。其痛反加。此乃衝任先虛。踈維脈不為用。溫養下元。須

通絡脈。然取效甚遲。恪守可望却病。此案本非腸瘕。最易誤治。故特錄出。以便臨症核對。

茯苓 當歸 肉桂 小茴 牛膝

茯苓 鹿角霜 鹿角膠 榕酒蜜丸

吳 產後十二朝。先寒戰。後發熱。少腹疔痛。腹膨滿。下部腰肢。不

能轉側。伸縮。小溲澀少。而痛。此敗血流入筋絡。延及變為癆症。

議用交加散。

小生地 炒查肉 生薑 車前 牛膝

五靈脂 調入琥珀末一錢

又 十六期。諸症稍減。每黃昏或亥時。衝氣自下而上。至胸中即

脹悶。肢冷汗出。右腹板實。此厥陰肝藏。因驚氣逆。今惡露未清。

重鎮酸斂。均為暫忌。擬和血調血為穩。

炒桃仁 歸鬚 香附 延胡 小茴

炒查肉 官桂 川棟

又方 人參 當歸 白芍 炙草

茯苓 香附 桂心 廣皮

經曰。天樞隱隱痛者。為大腸瘕。其上肉微起者。為大腸瘕。天樞

大腸瘕在臍旁開二寸 關元隱隱痛者。小腸瘕。其上肉微起者。小腸瘕。關元

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕 早

穴即小腸募 此指募穴而言也。余思致大小腸瘕。各有其因。或

膏梁厚味。濕熱壅塞而成。或終日急奔。氣血阻於下焦。飽食奔

走。腸胃失於展舒。負擔重物。逆傷腸胃。醉飽房勞。致傷精液。濕

滯痰凝。腸胃痞塞。飢飽勞役。腸胃受傷。飽食喜以。食積停滯。受

寒氣。腸氣不能宣通。或脾虛濕壅。濕滯流入小腸。或跌仆停瘀

腸膜。或婦人分娩。用力太過。氣陷阻滯。不外產後喜以。瘀流入

絡。或肝氣鬱結。暴怒憂愁。氣結不通。車馬疾奔。震動腸胃。膜絡

尼姑孀婦。室女。乾血停阻。有心經火毒。流入小腸。肺經之熱。移

於大腸。以上皆可成瘕。大小腸瘕。不外乎血瘀氣阻。寒凝熱壅。

己潰未潰。兼虛兼實。若能一見便明。治腸瘕不難。寒者溫之。

熱者涼之。氣滯者理之。於阻者行之。治大小腸瘕。始萌之大綱。領也。其中利濕消滯。化痰排膿。清熱溫通。解毒固正。和中養陰。各法者。四法中之變化也。雖有羣書可考。余今輯四十一方。潛心參玩。亦可增一隙之明。余德鴻註。

余思大小腸瘕治之法。諸先哲辨之極明。不如簡略。後人可取。為法。鄙見生大小腸瘕。小腸上口。即胃之下口。曰幽門。大腸上口。即小腸下口。曰闌門。又為水分穴。必糟粕化精液。澁便。即在此分清。糟粕歸大腸。澁溺歸膀胱。在曲變化之處。最易壅塞。如市井路狹人來。門巷之間。易壅易阻。腸瘕者。生此二處為多。瘕生於大腸易治。大腸為傳道之官。變化出焉。陽明多氣多血。魄

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕論 三

門為五藏使。水穀不得久藏。其氣本主下達。瀉之。其毒膿與糟粕俱出。生於小腸。治之較難。小腸為受盛之官。化物出焉。有毒難洩。太陽多血少氣。與心火合為表裏。雖瀉則熱從溺洩而出也。看腸瘕之法。先從少腹按之。皮肉輕按痛者。瘕生於外。腹瘕也。若輕按不甚痛。強按之內中痛甚。腸瘕也。若小便淋瀝。有惡寒發熱。身皮甲錯。少腹腫狀在一處痛者。脚屈難伸。腸瘕也。若少腹皆不痛。一處獨痛。瘕已成。若獨痛之處。按之熱。他處不熱。膿已成。若脈來遲緊者。氣滯血凝。未成膿也。脈見數滑。有寒熱已成膿也。服熱藥更痛者。已成膿也。服熱藥而痛緩者。膿未成也。膿非火煅煉不能成。故服熱藥痛更甚。生腸瘕者。要卧清靜。

之室。倘猶鼠竄器味。幼孩跌仆。防其驚跳。則腸斷不救。此皆屢次試驗而得之。未成膿之前。要分氣阻血凝。虛實寒熱。諸治法。有羣書可考。茲不多贅。然成膿之後。下之不得。吐之不能。不得不開之。使膿外洩。遲延腐爛腸胃。或膿奪臍而出。或少腹內潰出膿。或大便便膿。或嘔膿。婦女前陰出膿。內中腸胃無有不壞者。吾友少田胡君曰。以子所言。內瘕先保裏膜為要務。如此說來。腸瘕開刀動針。裏膜必穿。豈不誤人性命。余曰。君言却是。有理。然刺火鍼。肉未受傷。如鍼灸之法。焉有不傷裏膜。然其孔。易於收斂。若其內潰。其中腐爛已多。收斂不易。遲延日多。正氣已敗。生長更難。然刀鍼手法。各有秘傳。惟見孟河馬氏

外證醫案彙編 卷四 內部 腸瘕論 三

業氏。余屢見之。此皆衣鉢相傳。惟燙火鍼為最速。救人甚眾。其餘能開內瘕。都未曾見耳。若無師傳。點穴不真。認症不準。亂鍼亂刺。孫真人云。腸瘕妄治。必殺人。即此也。余不能刀鍼。惟瘕瘕不敢旁質一言。今有無師傳授。以外科較內科。易置書數種。合藥數方。竟為瘍科。倘遇內瘕大症。如之奈何。今聊質鄙言。瘕科高明。務必考覈。內瘕為救人之要事。諸公責我。罪我。余不敢辭也。余德鴻註。

附治驗 余臨症五年。遇腸瘕數人。始萌未成膿者。或理氣消痰。溫通服藥而消者。茫不記憶。有二人未能收功者。自愧醫學不精。刀針手法。缺少師承。聽其內潰而死。至今顧影自慚。故錄

出為後日之戒。余乙酉二月初六日。在孟河至琴川。余友仲鳴
徐君。過余寓。談及其店中學生某。姓其住南門外壇上。切紙坊
內。因腹痛已有三月未愈。煩子過一診。余即往診。得脈來數滑
一身肌肉盡削。發熱。少腹左角作痛。日夜哀號。余細將其少腹
按之。少腹左角。一處獨痛。細按掌下。惟痛處肌肉最熱。問其原
由。云服熱藥熱物更痛。服涼藥涼飲稍舒。余細按之最熱處。郁
郁有膿。濁濁有聲。看其兩足能伸屈。余曰。此內癰。經服藥三
月。未曾有言。內癰者。吳萸、薑、附、桂、熱藥過多。煨煉成膿。余不能
刀針。使膿外洩。此癰在腸外膜裏。若膿從大便出。腸必腐壞。若
膿從臍出。裏膜必穿。如有名手。能開膿從原處而出。可望生機。

外證醫案彙編 卷四 內科 腸癰案 三

若膿從大便臍中出。都俱屬不救。余寓牡丹皮散。合活腸散。毒
丹法主之。即辭曰。連延癰科開之。尚有生機。連則不救。當日即
延著名癰科視之。連日更醫。齊來和。延至十餘日。臍中潰膿。胃
氣漸敗而逝。嗚呼。癰科不能治內癰。其自潰而不早治。釀成
大患。何異用兵。聽人居危城之中。雖雀掘鼠。不能濟內之糧。又
不能衝突。救人性命於頃刻。聽其自斃。一棺。余思之。惻心自愧。
未習刀針手法。誤人性命。所以徐靈胎先生言。葉夫士先生曰。
內科不知外科。得醫術之半。余謂內科不能識症。外科不能刀
針。一遇內癰。皆如雲中觀月。霧裏看花。揆延日久。膿成。聽其自
潰而死。醫術之難全。徐靈胎先生已言之。余何敢實言。今誌之。

自警 余曉鴻

凡治內癰。婦女較男子更難。余憶在師處。有丹徒界某姓大族。
有新婦。經停三月。皆謂有娠。停至四月。少腹作脹而痛。皆云妊
娠。而挾肝氣。服金鈴。左金等痛更甚。後邀吾師。因天微雨。不願
過江。使吾代之。坐車十六七里。再江面坐船。顛播三四里。喘息
未平。宅門內呼請診脈。知上樓窗亦四面緊閉。病人坐在樓樓
之中。色不能望。音不能聞。問不能答。將手在樓中伸出。切脈連
緊。重按亦滿。余曰。此血氣被寒凝滯。問曰。腹中痛乎。旁人代答
曰。少腹左邊甚痛。舌又不能看。余再問曰。二便如何。少腹痛處
可硬。旁人皆不言。病者羞澀不答。余亦無可如何。沉枵腹汗出。

外證醫案彙編 卷四 內科 腸癰案 四

手軟無加。即請紙書。加余曰。少腹作痛。氣滯血凝。日久防成內
癰。即用桃仁承氣去芒硝。加歸尾。延胡。香附等。聞得旁有婦女
唧唧言曰。有妊四月。胎中尚方不出。反言內癰。余亦反疑。感不
定。明知此方決不服。知飯畢回寓。與吾師述及情由。曰。望開問
切。四字皆無。孫真人未診先問。扁鵲見色知病。如此隔靴搔癢。
余實不能從。延他醫。皆安胎養血。云產前宜涼。方皆不雜。黃芩
白朮。至經停五月。見寒熱。少腹腫硬。後膿竄入腿。延外科治
之。有曰。橫痃。有曰。便毒。雜藥亂投。膿潰淋漓。胃氣日敗。而斃。所
以病家如此。醫家如此。鮮有不悞者也。此悞不在醫家。悞在病
家。奉勸富貴之家。有病延醫。望聞問切。當盡其技。病家受益多。

多矣。余聽鳴誌。

徐河溪治長興朱季敏。少子。肅虎官。性極聰明。年九歲。腹痛。脚縮。抱膝。而臥。背脊突出一節。徧延內外科診視。或云損症。或云宿食。或云發毒。當刺突出之骨。以出膿血。其西席茅豈宿。為焉。余治。往登其堂。名醫滿座。豈宿。借余診視。余曰。此縮脚腸疝也。幸未成膿。四日可消。聞者大笑。時季敏為溧州牧。其夫人孔氏。名族之女。獨信余言。余先飲養血通氣之方。并護心丸。痛遂大減。諸醫謂偶中耳。和按。同通妙。明日進消痰逐毒丸散。謂曰。服此又當微痛。無恐。其夜痛果稍加。諸醫聞之。譁然曰。果應我輩之言也。 按。此平醫士。幸災。明早又進和榮順氣之劑。痛止八

外證醫案彙編

卷四 內部

腸疝案

星

九而脚伸脊平。果四日而能步。諸醫以次辭去。中有俞姓者。儒士也。虛心問故。聽在師處。師曰。若見同道。可問則問。不可問。則不問。自已當識口。少言。何也。我等寒士。今人或稍有家資。鄙爾貧士。或稱職銜者。鄙爾布衣。或高抬身價者。鄙爾早歲。故作勿忙者。鄙爾糾纏世盜名者。恐爾辨狀。各有習氣。若謙虛下問。人疑爾詐。反俯首受辱於人。故不必問。若果有長者。是吾三五之友。志同道合。何可不問。先哲云。我百事知惟一。不能知。吾問於人。彼百事不知。惟我一事不能知。彼能知者。即吾師也。余至琴川。五載。志同道合。有問必言。有長者。風溫淳和。予支婚。即幸修先生。老成持重。直言不諱。每違同診。受益已多。惜天不永。其毒傷吾益友。故謹錄之。以誌感佩。今續徐葉之儒士。俞姓醫。虛心問故。知泗溪先生。直言不諱。長者。而問之。知前輩醫之中。不可問。而不問也。余謂。雜藥亂投。氣血傷矣。先和其氣血。自得稍安。繼則攻其所聚之邪。安能

醫者。或作法弱。或作血痺。俱云不治。余診其脈。洪數而滑。寒熱無次。謂其父曰。此瘀血為疝。已成膿矣。必自破。破後必有變症。宜急治。與以外科托毒方。并丸散。即返山中。越二日。天未明。叩門甚急。啟視。則徐之戚也。云。膿已大潰。而人將脫矣。即登其舟。往視。膿出升餘。脈微膚冷。陽隨陰脫。余不及處。加急以參附二味。煎湯灌之。氣漸續。而身漸溫。然後以補血養氣之品。兼托膿長肉之藥。內外兼治。兩月而漏口方滿。精神漸復。月事以時。大凡瘀血久留。必致成疝。產後留瘀。及室女停經。外症極多。而醫者俱不能知。至膿成之後。方覓外科施治。而外科又不得其法。以致枉死者。比比皆然。徐河溪

外證醫案彙編

卷四 內部

腸疝案

吳

○腎俞癰
松江史 腎俞癰。灸後。腫收痛減。大有消息。此當坎位。地冷多寒。自宜溫補。
肉桂 延胡 茯苓 青鹽 熟地
枸杞 杜仲
宜興尤 腎俞癰。延久不愈。恐成瘡。怯。
西洋參 川石斛 車前 茯苓 蟹甲
北沙參 大豆卷 白芍
青浦蘇 背脊先曲。次發腎俞。其勢必潰。真陽虛損之極。加以脈數胃困。最難治療。

黨參 川石斛 茯神 料豆 扁豆皮

冬朮 五味子 神麩 蠶甲 川貝母

南瀝李 腎俞色白漫腫防其成癰此空隙之穴非此他處能令

消散為首務。先理寒熱。後商外瘍。

葛根 蒼梗 菟殼 蘇梗 木香

青蒿 陳皮 厚樸 丹參 扁豆

青浦查 腎俞發腫收腫化。可卜向安。另有變遷。未敢預決。

北沙參 忍冬花 黃芪 石決 花粉

製首烏 杜穀芽 廣皮

乍浦馬 腎俞內發。由真元虧損而成。勿泛視之。

外證醫案彙編 卷四 內部 腎俞癰 里

北沙參 人參 茯苓 神麩 黃耆

女貞子 甘草 淮麥 料豆

覆方 進補托之劑。平塌依然。神思昏頹。胃氣困憊。甚非佳兆。再

擬補托。以決成敗。

人參 白芍 女貞子 黃耆 甘草

冬朮 杜仲 大生地 茯苓

淮安程 腎俞堅硬如石。形如大桃。綿延半載。皮色泛紅。已有穿

象。流膿為吉。出血為凶。此血癭之流亞也。聽按此症。即是石瘻。

因皮色泛紅。故

川貝 杜蠟 紫菜 連志 連卷

蘇子 廣皮 夏枯草

俞為陽之穴。募為陰之會。諸經之俞在背。諸經之募在腹。藏府

不和。病發於外。發於陽者。在俞。發於陰者。在募。發於本藏府者。

在內。發於府者。屬陽。治之稍易。發於藏者。屬陰。治之極難。何也。

內經云。六府者。所以化水穀。而行津液者也。五藏者。所以藏精

神。血氣魂魄者也。又云。六府傳化物而不藏。故實而不能滿也。

五藏者。藏精氣而不寫。故滿而不能實也。六府之氣。本通。雖壅

阻。易於通達。五藏生癰。肺本中空。主氣之呼吸出入。較他藏治

之較易。其餘脾肝腎四藏之癰。生於本藏腹內者。鍼不可到。藥

不可及。手不可近。內科不識其症。外科不得其法。妄治而誤者。

外證醫案彙編 卷四 內部 腎俞癰 里

比比然也。夫腎俞癰者。名曰連腎癰。此腎經之外癰也。生於命

門穴。脊之十四椎。自下至上第七椎。即七節之傍。中有小心處

是也。此處其方在北。其卦在坎。本為寒水之地。內藏相火。如水

底暗蟄龍雷。陰陽相抱。為先天之本。性命之根。精氣神聚藏之

所。生生化育。壽夭榮枯。皆在於斯。又在骨多肉陷。空隙之處。非

裏膜最近。與腎為比鄰。此處生癰。故一經潰後。先自傍徨。先

哲皆云。房勞過度。致傷腎水。鄙思。老耄極。高僧節婦。皆有生

此癰者。豈皆房勞乎。其中各有其因。寒鬱則化火。陰虛則火生。

或者操勞思慮。有動子中。必搖其精。或以兒先天不足。或房後

腎經受寒。寒鬱化火。或強制亢陽。陰精內消。或春方丹。石忍精

入房慾火內熾或房勞不節淋濁不化夢遺滑泄婦人淋帶過
 度脂液內竭或膏梁厚味燥火熱鬱於中或跌挫停瘀腎臟或
 婦人漏經血崩產後亡血過多陰津內涸或肝陽獨旺內燥腎
 陰種種皆可腎俞生癆然此症治法最難天地水向東流腎本
 難實未潰之時難起難救已潰之後瘡怯易成元氣易敗此處
 督脈屬陽上行太陽寒水之脈下行二腎之中命門在焉真水
 之中相火藏焉若不補陰專治其毒則腎水更傷毒難速化若
 專補陰而不通陽則陰無以生毒且深藏不能外泄今輯八方
 譬如腎俞癆灸後腫消溫補之中夾熱地之填陰青鹽之引藥
 入腎參延胡之消其已阻之痰此陰陽並補兼消之法也虛損

外證醫案彙編 卷四 內科 腎俞癆 完

瘡怯之潮溫補養陰之中參以茯苓車前神曲豆卷暗泄腎邪
 去脾胃之溫防其胃困亦一法也如夾外邪先理寒熱後商外
 瘡亦一法也瘡症平塌神識昏頹胃氣困憊專於補托毫不夾
 消導滲泄之品亦一法也堅硬如石皮色泛紅化痰軟堅涼血
 亦一法也先生瘍科調理之法俱有層次絲絲入扣不但瘍科
 內科有幾人能望及先生之項背與 余聽為註

附治驗 余思腎俞癆皆屬虛症實症百中則有三四或其人
 正氣本實或膏粱煎燥辛辣飲食不節瘀血積於腎經膜外或
 有之然余未見也憶昔年在梁溪遇王君者香邊余診視脈來
 虛數咳喘多痰腎俞癆平塌已潰兩孔膿稀粘膩滋水淋漓問

其年將二十八無昆仲尚未得子他醫專以甘涼治肺止咳余
 曰水虧木旺木扣金鳴腎虛則水泛為痰當先治腎寒涼溫補
 宜並用一清相火一通腎陽坎離既濟陽隨陰長陰隨陽生以
 腎氣元加知柏猪脊髓為丸每日三服每服二三錢另服甘溫
 補劑戒以屏勞絕慾戒酒辛炙後至百日後此瘡肌肉已平瘡
 口亦合胃氣甚旺後竟宴客縱慾蒙飲膏瘡復發紅腫瘡口潰
 裂經瘍科服干茅銀花寒涼之品瘡色更紅高突以致胃傷面
 紅汗出痢下腹痛而殞腎俞癆將及一年服滋補而瘡因其縱
 慾陰傷龍雷外越余未見龍雷之火暴雨而能制之服寒涼虛
 陽更熾其脾胃生生之氣豈有不死者乎 余聽為註

外證醫案彙編 卷四 內科 腎俞癆 辛

附懸危治驗 余思外症與內症看法雖異理則同從中有假
 熱假寒最難明察譬如傷寒之戴陽寒極似熱面紅目赤口燥
 假渴索飲冷水仲景有通脈四逆加猪膽汁湯白通加入尿猪
 膽汁湯如溫病之熱深厥深陷入營分膚冷肢厥喜熱飲不喜
 涼飲反用紫雪丹至寶丹犀角地黃白虎竹葉石膏等湯此皆
 內科之假寒假熱也外症亦然有一等皮色泛紅陰分不虛
 陽外越服溫補腫熱漸平紅色漸退亦有色白堅硬平塌不起
 外顯虛弱乃是火毒凝結氣血不能通暢一服涼散皮色即紅
 肌肉漸鬆此外症之假寒假熱也此等症最易誤治然細心者
 斷不致誤治究竟有元氣脈息虛實可憑余憶十餘年前余姨

岳母素有便血。本屬早寡多鬱。後起懸癰。生於穀道之前。溺道之後。先起塊作痛。即至孟河診之。皆云濕熱。服苦參黃柏。苧米草解等。苦寒滲利數劑。後日見其甚。再覆診。服數劑。臥牀不起。日劇。著余婦代看之。云皮色泛紅。光亮如熟。按之甚熱。用田螺水。摩番木鱉。調冰片搽之。稍安。乾則更痛。再搽。後邀瘍科診之。曰懸癰潰後。為海底漏。死症也。合家驚惶。正在歲終有事。無可如何。余曰。素有便血。本屬脾虛。雖有肝氣兼濕熱。肝絡繫於二陰。補中益氣湯最宜。此方之外。麻柴胡。即是疎肝之品。當歸是養肝之品。東垣先生云。治脾不若治肝。木氣調達。土氣自舒。參草甘溫助脾。白朮陳皮調胃祛濕。余即將補中益氣本方。加茯苓。洩其已阻之濕。大劑三服。痛減紅退。而腫收。再服兩劑。而飲食漸增。腫漸收盡。痛亦止。後服歸脾五六劑。平復如故。至今十餘年。強健如昔。所以補中益氣湯。人皆云升清。不知東垣先生內中有疎肝扶土之妙。鄙言以謂何如。若依瘍科。用苦寒淡滲利濕清熱。此症決致不起。余聽鴻誌。

○ 肛癰

倪 肛癰潰膿雖愈。陰氣已經走洩。當陽氣弛張發洩。今加嗽血痰多。胃納減。於平昔脈數促喘逆。脫悶。姑清肅上焦氣分。

蘇子 杏仁 香豉 薑皮 降香

鬱金 桔梗 黑梔皮

外科醫案彙編 卷四 內科 腎命案 五

魏 脈數垂。淋濁。愈後。再發肛脹。大便不爽。餘滴更甚。

草薢 猪苓 澤瀉 白通草 海金沙

丹皮 黃柏 晚蚕沙

覆方 滯濁下行。痛緩。議養陰通腑。

阿膠 生地 猪苓 澤瀉 小梳

丹皮

王 病人述病。中厚味無忌。腸胃滯雖下。而留濕未解。濕重濁。令氣下墜於肛。肛墜痛不已。胃不喜食。陽明失閤。舌上有白腐形。色議切腸胃之濕。

生茅朮 人參 厚樸 廣皮 炮薑炭

外科醫案彙編 卷四 內科 肛癰 五

生炒黑附子

肛癰者。即藏毒之類也。始起則為肛癰。潰後即為痔漏。病名雖異。總不外乎醉飽入房。膏粱厚味。燻炙熱毒。負重奔走。勞碌不停。婦人生產努力。以上皆能氣陷。阻滯。濕熱。毒下注。致生肛癰。今另立肛癰一條。何也。肛癰藏毒。來之速。癰之甚。若不速治。潰後即成痔漏。倘有不慎。即此須命者多矣。肛癰何由而生。肛者。直腸也。肛門。即直腸之門戶也。腸胃自賁門之下。一過幽門。氣皆下降。飲食入胃。隨之下趨。直滋小腸。小腸下口為之爛門。屈曲之處。泌糟粕。化津液。即在斯矣。如能水穀分清。本無疾病。若厚味酒濕。熱毒壅滯。氣機。阻塞。膀胱。或負重疾。奔氣陷。

外科醫案彙編 卷四 內科 肛癰 五

血凝。小腸少運化之機。蓄積小腸。膀胱濕熱。壅阻不能從溺道而出。反趨於大腸之中。灌注肛中。魄門為五藏使。故閉有時。不此溺孔可時時而洩也。濕熱愈壅。氣機愈滯。肛之門戶更閉而不通矣。濕熱久滯。經云。氣血壅阻。即生瘰癧。熱盛則肉腐為膿。肛瘰生矣。若生於內而不早治。膿潰則腸穿。則成痔漏。痼疾生於外者。熱壅肛門。肛門外翻。秘結不通。若不早治。寒熱大作。口渴煩躁。竟有傷生者。若能預早防範。用藥使其壅塞速通。能保內消不潰者。為上工。既潰之後。肛門之內。有縱有橫。行走牽動。大便不時出入。最難收斂。能即填其孔竅。早生肌肉。生長完固。亦良工也。若用刀鍼繫線。安能遠長肌肉哉。日久漸虛。致成

外證醫案彙編

卷四 內部

肛瘰論

五

瘰癧而死者多矣。惟願瘍科。始萌之時。辨其陰陽虛實。當攻當補。理氣利濕。清熱解毒。溫通等法。俱有羣書可考。皆在臨證之權宜。非筆能盡述也。今輯四方。粗具規模。治之得法。皆在臨證之人變通焉。余聽鴻註。

荆溪張渚鎮。余君天培。四十未有子。體頗豐。嗜飲食。好厚味。余雖非同族。其祖父與吾先大父。式玉公。先嚴。臚卿公。有三世舊交。後紅巾竄踞江南。余年尚幼。避亂孟河。至同治甲子。同籍余一門二十餘口。均難。故居皆為瓦礫之場。余則能就孟河為家焉。同治癸酉。天培余君。偕一妾。僕從數人。來孟河就診於馬培之先生處。肛門已有漏厄四五。余因同鄉。過其寓。問詢其起病

之始末。據云。是年八月初旬。天氣尚暖。鄉人死羊肉。售於酒肆中。實不知也。最喜羊肉。飽啖。飲以膏粱火酒。當夜睡後。覺有寒熱。明日覺肛中大痛。如刀刺。壅阻秘塞不通。輾轉床褥。呼號七日。夜治之罔效。至第八日。有某醫曰。濕熱壅阻肛中。速宜下之。即與大承氣湯下之。下燥糞之後。即下膿血矣。不料臟毒內已成膿。肛已潰穿。後漸穿肛外。未及三月。已成四五漏矣。在孟河調理數月。已收三孔。行坐如常。後旋鄉。仍嗜酒縱慾。煩勞不節。瘡漏漸潰。竄至八九孔。停一年餘。至孟河。余看其肛中穿及肛外。竟能穿至臀。穿至股。滋水淋漓。不能起矣。是年余在荆溪運茶至蘇。屬秋仲。至孟河。一見其腹硬便溏。四末作腫。余謂其妾

外證醫案彙編

卷四 內部

肛瘰論

五

曰。即速催舟回籍。脾氣已絕。途中恐不及也。逾二三日。培之先生喚余到彼寓。當夜催舟送伊回籍。到奔牛鎮而歿。所啖羊肉。燒酒一次。竟能殞命人之飲食起居。豈可不慎歟。故錄出。與縱飲火酒。喜食濃厚。貪口腹之戒。余聽鴻誌。

腹內瘰論。古之醫者。無分內外。又學有根柢。故能無病不識。後世內外科既分。則顯然為內症者。內科治之。顯然為外症者。外科治之。其有病腹中內外未顯然者。則各執一說。各擬一法。歷試諸藥。皆無效驗。輕者變重。重者即殞矣。此等病。不特外科當知之。即內科亦不可不辨明真確。知非已責。即勿施治。毋至臨危束手。而委他人也。腹內之瘰。有數症。有肺瘰。有肝瘰。有胃

乾。有小腸瘕。有大腸瘕。有膀胱瘕。惟肺瘕。咳吐腥痰。人猶易辨。餘者。或以為痞結。或以為瘰癧。或以為寒痰。或以為食積。醫藥難投。及至成膿。治已無及。并有不及成膿而死者。病者醫者。始終不知。何以致死。比比然也。今先辨明痞積。瘰癧。寒痰。食積之狀。凡痞結瘰癧。必有所因。且由漸而成。寒痰則痛止無定。又必另現痰症。食積則必有受傷之因。且三五日後。大便通。即散。惟外症。則痛有常所。而遷延益甚。全遺云。諸脈浮數。應當發熱。而反淅淅惡寒。若有痛處。當發其瘕。以手按腫上熱者。有膿。不熱者。無膿。此數句。乃內瘕真諦也。聽按全遺之文。簡而易明。真金科玉律。惜癆科皆不留意。多者。又云。腸瘕之為病。身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。

身無熱是也。若肝瘕。則脇內隱痛。日久亦吐膿血。小腸瘕。與大腸相似。而位略高。膀胱瘕。則在少腹之下。近毛際。著皮即痛。小便亦艱。而痛。胃脘瘕。有虛實二種。其實者。易消。若成膿。必大吐膿血。而愈。惟虛症。則多不治。先胃中痛。脹久而心下漸高。其堅如石。或有寒熱。飲食不進。按之尤痛。形體枯瘦。此乃思慮傷脾之症。不待膿成即死。故凡腹中有一定痛處。惡寒倦臥。不能食者。皆當審察。防成內瘕。甚勿因循。求治於不明之人。以至久而膿潰。自傷其生也。徐洄溪

聽按。方書五藏六府。俱有瘕。然心為人身君主。而藏神。心雖有瘕。將成即死。心一生瘕。即時神昏志亂。故即死。脾為轉運水穀。

之藏。脾一生瘕。胃不能剋化。亦死。膽為清淨之府。出不納。外裹脂膜。內藏青汁。不能生瘕。沉藏在肝葉。膽瘕與肝瘕。治法同。仲景治肝。必治膽。膀胱外所一殼。脂膜不厚。內藏澁溺。時滿時虛。雖有其名。從未見過。治法於大小腸瘕。大同小異。三焦胞絡。本無定體。三焦皆屬人身軀殼之病。雖有其名。不得作內瘕。故有其名。而無其症。余今輯腹內瘕。惟肺瘕。胃瘕。肝瘕。大腸瘕。小腸瘕。腎俞瘕。肛瘕而已。其餘前輩未曾見過。無臨證之方。余亦不敢妄為臆說。故概未錄。

發無定處部

。疔

王 疔毒。咯血失血。都是暑入陰傷。

竹葉心 尤參心 鮮生地 黑穉豆皮

麥冬 知母

瘡瘻

某 足筋不舒。為濕邪所阻。以致絡脈壅滯。今發瘡。即是濕邪疎

泄處。此方今不欲取。備存一格

熟地 阿膠 桑葉 當歸 甘菊

木瓜 新絳 牛筋 牛酥 血餘

外證醫案彙編 卷四 無定處部 疔

絲瓜絡 白麻骨 黑芝麻 人乳粉 石決明

猪骨髓阿膠烱化為丸

胡六脈右勁。因疥瘡。頻以熱湯沐浴。衛疎易傷。冷熱。皮毛內應手

肺咳嗽氣塞。痰多。久則食不甘。便燥結。胃津日耗。不司供肺。况

秋冬天降燥氣。上加。漸至老年痰中之象。此清氣熱。以潤燥。理

勢宜然。倘畏虛日投。滯補。益就枯燥矣。

桑葉 甜杏仁 白沙參 麥冬 天花粉

玉竹 甘蔗漿 雪梨漿 熬膏

錢二脈來。右弦。左垂。陰虛濕熱。遺精瘡蝕。

黃柏 知母 熟地 葶藶 茯苓

達志 蜜丸

吳四父瘡不愈。已有濕熱。知機太早。陰未生成。早泄。致陽光易升

易降。牙宣。鼻血。為濁為遺。欲固其陰。先和其陽。仿丹溪大補陰

丸。合水陸二仙丹。加牡蠣。金櫻膏丸。

注 腫自下起。脹及心胸。偏身肌膚赤糜。溺無便滑。濕熱積水。橫

清。經隧氣機閉塞。呻吟喘急。濕本陰邪。下焦先受。醫用桂附者

未和。溫化熱。充斥三焦。以致日加凶危也。

又 濕邪留飲。發紅瘰。胸聚濁痰。消渴未已。用木防已湯。

木防已一錢 石膏三錢 杏仁三錢 薏仁二錢

飛滑石一錢 寒水石一錢 通草煎湯代水

外證醫案彙編 卷四 無定處部 瘡瘻

薛九腹滿。下至少腹。三陰都已受傷。而周身疥瘡。數年不斷。脈絡

中必有濕熱。就腹痛泄瀉。腑腸不通。不獨偏熱偏寒之治。常用

四苓散。

猪苓三錢 茯苓三錢 澤瀉一錢 生於朮一錢

椒目五分

何 煩勞之人。衛氣少固。霧露而濕。傷其流行清肅。瘡瘻外發。脫

脇反痺。乃經脈為病。無關腑臟。

白茯苓 鉤藤 鬱金 桑葉 橘紅

白菴仁

覆方 氣室熱鬱。仍治上。可以通痺。

瓜蒌皮 鬱金 香附 蘇梗 杏仁

黑山梔

孫 寒鬱化熱。營衛氣窒。遂發瘡癩。食入即吐。胃中熱灼。當忌進腥油。先用加味溫膽湯。

鮮竹茹 一錢 半夏 一錢 金石斛 三錢 茯苓 一錢
廣皮白 五分 枳實 一錢 薑汁 一匙

單 瘡毒內攻。所進水穀不化。蒸變濕邪。漬於經隧之間。不能由腸而下。膀胱不利。濁上壅遏。肺氣不降。喘滿。不堪著枕。三焦閉塞。漸不可治。議用中滿分消之法。必得小便通利。可以援救。

外證醫案彙編 卷四 瘡癩部 瘡癩 苦杏仁 桑皮 厚樸 茯苓皮

通草 大腹皮 猪苓 澤瀉

程 暑風必挾濕。濕必傷於氣分。斷瘡瘡發。即濕邪內發之徵。濕伏熱蘊。致氣壅塞。咽底脫中。及至進穀無碍。二便通調。中下無病。顯然。

白通草 西瓜翠衣 鮮蘆根 苡米

張 三瘡之邪在陰。未經向愈。春季洞利不食。想春兩外濕。水穀內聚。亦濕。即濕多成五泄之謂。瘡癩。僅泄經隧。濕邪未驅。長夏及受暑邪。上蒙清空。諸竅咳嗽耳聾。的係新邪。非得與宿病同日而語。

連翹 杏仁 飛滑石 嫩竹葉 荷葉汁

桑葉 象貝 黑山梔

張 瘡家濕瘡。忌用表散。

蒼朮白虎湯加草果

黃 久瀉兼發瘡癩。是濕勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升。胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 廣皮 炙草 於朮
羌活 防風 升麻 柴胡 神麩 麥芽

吳 二雨濕泛潮外來。水穀聚濕內起。兩因相湊。經脈為痺。治病繼以瘡癩。漸致痿痺筋弛。氣隧不用。濕雖阻氣。而熱蒸燥及筋骨。久延廢棄有諸。

外證醫案彙編 卷四 瘡癩部 瘡癩 大豆黃卷 飛滑石 杏仁 通草 木防已

李 痿痺在下。肝腎居多。但素飲必有濕熱。熱瘵濕滯。氣血不行。筋縮。肌肉不仁。體質重著難移。無非濕邪深沈也。若論虛。不該大發瘡癩。但久病非速攻。莫計效遲。方可愈疾。

細生地 當歸鬚 牛膝 黃柏 草薢

鹹菴蓉 生刺蒺 川石斛

吳 下焦痿痺。先有遺泄。濕瘍頻進。滲利陰陽更傷。雖有參耆。木養脾肺。以益氣。未能散下。即如畏冷陽微。幾日飯後吐食。乃胃陽傾衰。應手外胃失職。但下焦之病。屬精血受傷。兩投柔劑。溫

通之補以腎臟惡燥久病宜通任督通攝兼施亦與古賢四斤金剛健步諸法互參至於胃藥必須另用夫胃腑主手氣氣得下行為順東垣有升陽益胃之條似乎相悖然升陽連苦寒非苦降之味乎凡吐後一二日暫停下焦血分藥即用扶陽理胃二日俾中下兩固經旨為陽明之脈束筋骨以利機關諒本病必有合矣。

鹿茸 淡苳蓉 當歸 杞子 補骨脂

牛膝 柏子仁 茯苓 川斛 巴戟

楊 瘡癩四肢偏多長夏入秋懶倦欲眠乾咳無痰頗知味所納已少此陽明胃陰內熱致耗即熱傷元氣之徵當與甘藥養胃

外證醫案彙編

卷四

瘡癩

六二

陰以供肺如金匱麥門冬湯去半夏加黃耆皮

吳 脈不浮大非關外風初起右掌二指已不屈伸頭面身半以上常有瘡泡之形此乃陽明脈絡內留濕熱若非厲氣吸入定然食物中毒姑與宣解緩攻

連翹 犀角 赤芍 酒煨大黃 片薑黃

荆芥

又 能食二便通調臟腑無病初因膿瘡瘡愈有泡自面及肢體至於右肢掌屈伸皆痛為脈絡留邪以致隧道為壅前方辛涼入血先升後降已得小效今製清脈絡壅熱藉酒力以引導通營衛亦一法也

銀花 連翹 犀角 荆芥 生大黃

丹皮 黃芩 川芎 當歸 羚羊角

澤蘭 大豆黃卷 用無灰酒十斤浸

吳 瘡癩之後濕熱未去壅阻隧道水穀下咽亦化為痰中焦受病故不知飢痰氣上下漸至喘悶矣但服藥四十劑純是破氣消剋胃陽受傷痰氣愈不得去矣

半夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又 瘡癩大發營衛行動於脈中脈外可免腹滿之累矣第穀尚未安適猶是苦勞多進之故胃陽未復仍以通調利濕主之

半夏 茯苓 金石斛 茯苓 澤瀉

外證醫案彙編

卷四

瘡癩

六三

張 初因嘔吐是肝胃不和致病故辛香剛燥愈劇然久病必入血絡熱則久瘡不愈矣夫木火皆令燥液易飢易飽間有嘔逆斯胃病仍在凡呆滯藥味皆非對症

冬桑葉 茯苓 杏仁 三角胡麻 佩蘭葉

生首烏 苡米 鬱金 熬自然膏

楊 身瘦久瘡血分有熱精通之年最宜安養脈象非有病

生首烏 細生地 地骨皮 金銀花

生甘草 生白芍 丹皮 三角胡麻 搗碎水洗

蜜丸早服

王 脈來濡浮久瘡變幻未罷是衛陽疎豁不耐寒暄初受客邪

不解。混處氣血浸淫。僅在陽分肌腠之患。議升舉一法。氣壯斯風濕盡驅。

人參 川芎 當歸 防風 蠶蚕

蝉脫 炙草 生薑 大棗 生黃芪

鄒 痰因於濕久而變熱。變現瘡疾疥癬。已釀風濕之毒。混在氣血之中。邪正混處。搜逐難驅。四肢為甚。姑從陽明升降法。

連翹 防風 白藜皮 酒浸大黃

赤芍 升麻 白殭蚕 滑石

汪氏風濕既久未解。化成瘡癩。當以和血驅風。

當歸 赤芍 川芎 牛膝 牛蒡

外證醫案彙編 卷四 瘡癩 三

夏枯草花 製殭蚕

某氏兩進柔潤清補。頗投詢知病由乎悲哀煩勞。調理向愈。繼因

目病。服苦辛寒散太過。遂經淋帶。年前七八日始淨。今則兩旬

而止。此奇脈內乏。前議非証。據述周身果現癢疹。瘡癩。搔癢不

甯。想脂液入滲。陰不內營。陽氣浮越。衛怯少固。客氣外乘。凡六

淫客邪。無有不從熱化。內經以瘡瘍俱病。皆屬於火。然內症為

急。正不必以肌腠見病為治。刻下兩三日間。又值經至之期。議

進固脈實下佐。以東垣瀉陰火意。經至之先用此方。

龜甲心 真阿膠 茯神 生白龍骨

旱蓮草 桑螵蛸 人參 知母 早上服

。膿裏

某 初病濕熱在經。久則瘵熱入絡。膿瘍日多。未已漸而筋骨疼。痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則痠。數年宿病。勿事速攻。

夜服白痰藥丸

午服犀角 連翹心 丹參 野赤豆皮

元參 細生地 善黃 桑皮

瘡疥者。證治準繩。有大疥。馬疥。濕疥。乾疥。水疥。五疥之分。外科心法。有乾濕蟲沙。膿五種之異。又有心肺脾肝腎五藏之發。風熱濕虛實。五字之辨。如此治瘡疥微疾。不勝其繁。就有瘡疥專科。治之不易。部意治瘡癩者。乾濕二字定之。若肌膚乾燥。瘦

削瘡痛。搔破出血。或無血而起白屑。此乃血燥生風。風鬱化熱。經云。諸痛瘡癩。皆屬於心。心屬火。肝屬風。火微則瘡。火甚則痛。惟風能消物。火能燥物。故肌膚乾瘦。而能瘡痛也。治宜養血熄

風。清血中鬱熱。若肌膚腫脹。瘡痛搔破。滋水淋漓。或膿膿。此乃風濕相搏。稽留化熱。經云。熱傷皮毛。則痛。濕傷肌肉。則腫。汗

出見濕。乃生瘡癩。勞汗當風。汗出為酸。鬱為癩。如在表者。急宜

解之。經云。汗出則瘡。濕熱成者。治宜利濕清熱。瘡有蟲者。屬

濕物。濕則朽。朽則蟲生。濕熱清則蟲亦除矣。風濕熱邪。初來。脈

旺正盛。先治其表。瘡久正虛。脈弱當固其本。以上皆治瘡瘍之

大概也。惟挾內證。更宜思索。或先治內。或先治外。兼治專治。臨

外證醫案彙編 卷四 瘡癩 三

五六三

證須有把極藥劑誤投為害豈可勝言哉前案中云誤投桂附
參朮邪蘊化熱充斥三焦日致凶危多服破氣消疔胃陽受傷
瘡痍輕症立方不易今輯二十九方條分縷晰細心玩之自然
治外顧內之法日有進階矣余臆鴻註

○熱毒

尹 環口燥裂而痛頭面身半以上發出癰疹赤紋乃陽明血熱
久蘊成毒瘦人偏熱頗有是症何謂醫人不識

犀角地黄湯

○風疹塊

某 風塊癢癢咳嗽腹痛邪著表裏當用雙和

外證醫案彙編

卷四 無定症即錄

五

牛蒡子 連翹

杏仁

桔梗

桑枝

象貝母 煎藥送通聖丸

陳 脈左數實血絡有熱暑風濕氣外加遂發疹塊壅腫搔癢是
屬暑瘍

晚蚕沙 杏仁

連翹

滑石

防已

寒水石 黃柏

銀花

○紅瘰

某 病濕挾風身發紅瘰服搜風之劑外燥裏濕外燥風愈烈內
濕水益聚膚裂水漬始覺微癢豈非濕泄而衛氣得行之據乎
此症以治濕為本而禁風燥之品

乾首烏 石決明 生木 川斛 梨汁

黑芝麻 細生地 桑葉

李 發瘰熱腫獨見正面每遇九十月大發五六月漸愈七八年
來如是因思夏令陽氣宣越營衛流行無間秋冬氣凜外薄氣
血凝滯此濕熱漫無發泄乃少陽木火之鬱及陽明蘊蒸之濕
故上焦尤甚耳法以辛涼佐以苦寒俾陽分鬱熱得疎庶幾發
作勢緩

夏枯草 鮮菊葉 苦丁茶 鬱金 苡仁

羚羊角 黑梳皮 鮮荷葉邊

唐 麻木忽高腫發瘰必有風濕襲於皮膚乃軀殼病昔人每以

外證醫案彙編

卷四 無定症即錄

五

宣行通劑

羚羊角 片薑黃 川桂枝 白芥子

撫芎 薑半夏

○白癩風

某 鬚眉白落皮毛淖澤脈來浮濇此風也非哀白也三十六種
同出異名非淺可之疾夏月宜食香風蛇俗名即黑風蛇與雞
煮食之此藥耳食之學吃
蛇不知要吃幾條

白歸身 羌蔚子 白麻 殭蚕 銀花

旱蓮草 夏枯草 赤芍 生地

江南地卑濕蒸屬疫之氣最盛蛇比他省高燥之處更毒况烏

梢蛇罕有倘誤食毒蛇為害更烈豈堪同雜食乎不若服蘄州白花蛇種安此薛生白先生方也。細攷三家醫案薛生白微君繆宜亭進士二先生許吐詞高古筆力簡淨譏刻。舉用藥專以血內腥臭炫奇示異。當時文人墨客重其名者文也。論治病之法。藥語精切。用藥遵古。惟葉天士先生為最。喻嘉言先生曰雖醫學通於儒學實係醫儒兩不相關。徐靈胎王孟英二先生論之已詳。余不敢質言矣。余德鴻註。

○產後癰瘍

吳 產後十二朝先寒戰後發熱少腹疔痛。腹膨滿下部腰肢不能轉側伸縮。小溲短少而痛。此敗血流入經絡。延及變為癰症。

外證醫案彙編

卷四 無定處年清癰

議用艾加散。

小生地 炒查肉 生薑 車前 牛膝

五靈脂 調入琥珀末一錢

又 十六朝諸症稍減。每黃昏戌亥時衝氣自下而上至胸中。即脹悶。肢冷汗出。右腹板實。此厥陰肝臟因驚氣逆。今惡露未清。重鎮酸斂。均為暫忌。擬和血調血為穩。

歸鬚 炒桃仁 延胡 小茴 川棟

官桂 炒查肉 香附

又 人參 當歸 白芍 炙草 茯神

香附 廣皮 桂心

○潰瘍

挑 潰瘍久不壓。氣血耗盡。中宮營液枯涸。氣不旋轉。得湯飲則痰涎上湧。勢如壺膈。久病若是。藥餌難挽。勉擬方。

人參 炒麥冬 代赭石 化橘紅

某 服瘍科寒凝之藥。以致氣沖作脹。喘急不臥。無非濁陰上攻。

議

來復丹。

某 瘡瘍服涼藥。陽傷氣阻。脫悶不運。腹膨。最怕瘍毒內閉。急宜通陽。

連皮杏仁 廣皮 澤瀉 大腹皮

外證醫案彙編

卷四 無定處年清癰

突

茯苓皮 薑皮 厚樸 桂枝木

程 瘍毒熱症與參芪不效。即當清解。為是消導。亦是非合。今者身熱。至晡神識欲昏。便溏溺赤。煩渴。是暑氣攻入內侵脾胃。有瘰癧之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無益。然亦無害。若加黃芪。又屬相反。大凡熱氣蒙閉清竅。都令神昏。當以牛黃清心丸清痰氣之阻。使其竅開。况暑門中。大有是法。與解毒勿悖矣。此方

瘍科治內症。毫無把握。先以參芪。後以消導。再以宣肺解毒。又以黃芪。補來乾。陰時。已經如是。何况今時之醫。道日衰也。

胡 納食主胃。運化主脾。瘰癧痛潰。臥床不得舒展。臟腑氣機呆鈍。何疑外科守定成方。芪木歸地不能補托。氣血反壅滯於裏。

出納之權交失。且是症乃水穀濕氣下垂。而致結於足厥陰手。

陽明之界若濕不為盡驅。藉補托以冀生機。養賊貽害。焉能濟事。外科守定成方。堅牢難破之疾。故外科方藥至今未傳。就非立齋醫案大半皆有壯飾。陳修園曰。薛氏案說。研考不若臨症隨記方藥。曉暢之。

金石斛 金銀花 槐米 茯苓

晚蚕沙 寒水石

顧 脈微小。潰瘍半月。餘腫未消。濃水清稀。浮腫汗出。嘔惡惡食。此胃陽垂敗。癘毒內攻。欲脫。夫陽失煦。則陰液不承。元氣撤則毒愈瀰漫。清解苦寒。究竟斲伐生陽。議甘溫。胃受培植其本。冀陷者復振。余非瘍醫。瘍醫立方難。脫內科範圍。按色脈以推其理耳。

加桂理中湯

外證醫案彙編 卷四 無定處部 潰瘍

完

曹 因瘍漏過進寒涼。遂患腰痛。牽引脊脊。今晨起。周身不得自如。乃經脈絡脈之中。氣血流行失暢。久病諒非攻逐。議兩和方

法。 羚羊角 當歸 黃芪 桂枝 桑枝

白茯苓

顧 潰瘍不合成漏。脂液滲去。必腸絡空隙。內風暗動。攻胃則嘔逆。吞酸。腹痛。泄瀉。不食。津液不升。舌焦黑。不渴。飲內外兼病。難治之症。

人參一錢 炒烏梅肉五分 生淡薑五分 茯苓三錢
同煎 炒黑川椒三分 炒廣皮錢一

某 瘍潰。膿血去多。元真大耗。脈無力。不嗜食。惡心。中州不振。寐則驚惕。神不守也。以養營法。

人參 熟朮 廣皮 茯苓 炙草

歸身 白芍 五味 棗仁

顧 久損漏瘍。胃減腹痛。議用戊己湯意。

人參 茯苓 白芍 甘草 炒兔絲子

某 歲瘍損能食。身熱。六味湯加青蒿節。

徐 營傷心。辣納食無味。此瘍痛大虛。當調其中。

人參 歸身 茯苓 木瓜 炙草

熟朮 廣皮 炒白芍

外證醫案彙編 卷四 無定處部 潰瘍

辛

某 膿血去多。痛猶未息。胃傷不嗜穀。口無味。左關尺細弱無力。正虛之著。據理進藥。仍宜補托。

人參 熟地 玉竹 丹參 歸身

茯苓 桑仁 遠志 柏子仁

風熱火。其性善行而散變。濕性屬陰。善凝滯。外受風熱。或雨露之濕。中於表分。被風熱混處於氣血之中。故熱毒。風疹塊。紅瘰。發矣。肌表受病。尚淺。用藥看其偏於風。偏於濕。偏於熱。擇其要而治之。自然易解。不必重藥。擾其裏。反使表邪入裏。今輯六方。參酌。可得其深意焉。○白癩風一症。內經風論簡而易明。風氣藏於皮膚之間。內不得通。外不得泄。此二語何等寒客於脈中。

不去名曰厲風一厲字包括在表之風輕重各症皆在焉五藏五色風肺風診在眉
 上其色白肺色白主氣陳實功曰紫白癩風乃是一體而兩種
 也紫因血滯白因氣滯總因熱體風濕所侵凝滯毛孔氣血不
 行所致言分氣血之滯亦宗內經脫化金匱風論亦云風濕蘊於營衛經脈痺
 而不通之意皆以理氣養血之中參祛風之品仲聖有三味黃
 芪丸黃芪防風湯侯氏黑散越婢等法及各大家之方參酌盡
 善治風之法有餘多立名曰反致感亂內經除厲風之外皆內
 疝五藏風五色風首風漏風內風目風腸風泄風胃風偏枯等
 皆於外科不涉後人附會立名更多在外之風曰大麻瘋蛇皮
 瘋邪味瘋血瘋鵝掌瘋鼓椎瘋血痺瘋磁糕瘋痛瘋癩瘋軟癱
 外證醫案彙編 卷四 無定處部論 主

吃也照此論之他事當禁餘皆越二三年復作而死以此觀之
 肌肉毒風皆是惡疾徐靈胎曰更可駭者瘡瘍之症最重忌
 一切鮮毒毫不可犯無書不載乃近人反令病者專服毒物以
 為以毒攻毒夫解毒尚恐無效豈可反增其毒種種謬誤不可
 殫述治瘋之方不下數百見牛黃散氣炮三十八味中有香蛇
 一條去骨酒浸作丸桐子大每日服七十九服五日表汗一次
 忌牛羊猪雞鵝等有毒及動風果品速酒色戒憂怒慎寒暑等
 語薛公尚然白癩風之輕症縱人食蛇食雞何況後人效而尤
 之矣又惡病論疾風有四百四種更不能細言矣從中一症分
 數名重複可厭如宋太史朝作詩者云開門閉戶掩柴扉即此
 外證醫案彙編 卷四 無定處部論 主

瘋戴毛瘋歷節瘋金匱歷節痛並不言風紫雲瘋乾瘋刺瘋癩瘋白癩瘋
 泥壁瘋癩瘋症瘋冷瘋漏蹄瘋蝦蟇瘋核桃瘋熱瘋水瘋雁來
 瘋雞爪瘋蜈蚣瘋禪曳瘋蟲瘋疔瘡瘋疾瘋遊瘋癩瘋頑瘋順
 瘋癩瘋尚有內症雷頭風偏正頭風半邊風牽筋風四柱風繡
 球風脚了風牽沙內外題出許多名目故病名愈多治法愈亂
 今日市上另有瘋科專治七二般瘋氣雖云瘋科內外各風症
 皆能治者實屬寥寥不過捕影捉風之法耳孫真人曰厲風嘗
 治數百人終於一人不免於死者蓋無一人能守禁忌耳惟一
 婦人病愈後服加減四物湯百餘劑半年之上方得經行十分
 全愈朱丹溪曰治五人亦惟一婦得免以其貧甚且寡無物可

類也吾幼時看三家醫案及此吾師費蘭來先生言此一論吾
 師已逝十四年矣今兩憶無事追憶錄此以誌感慨師曰治風
 之法名目雖多將一風字放在心上譬如肌膚之風初起急宜
 解表取汗而驅其風若滯於氣宜理氣祛風若滯於血宜和血
 熄風若挾毒厲之氣宜解毒祛風挾濕者利濕祛風挾熱者清
 熱涼血祛風氣虛者壯其氣氣盛則風自行血虛者補其血
 行風自熄若中風亦要理會風字或夾痰夾熱等亦不能動操
 溫補風為陽邪風火易於相煽辛熱之品亦要謹慎倘溫補辛
 熱誤投多致不救吾師曰則此數語治內外諸風見其大概矣
 經云知其要者一言而終不知其要者流散無窮此之謂也師

又云治外瘋各方有用大腹蛇與火赤煉開過火龍人生漆斑貓等又楓茄花人牙齒蜈蚣樟腦鉛粉麝香之類不可輕用恐病輕藥重中毒而死或積毒臟腑致成痼疾此等方誤者亦多效者亦廣究屬是醫學中楊墨之學非孔孟之道大

瘋肉多服亦能傷即何況毒物乎此吾師諄諄訓誨之語實之高明以為何如產後癩癆本是內症今錄三方亦備一格余誌後錄潰瘍漏瘍等十三方案中言之已詳或過服寒涼陽傷氣阻或誤投芪朮繼則消導致暑內閉或多進歸地補塞壅滯氣機此皆瘍科誤治欲壞之症就診於內科亦不能推諉徐靈胎先生批葉氏藥云瘡瘍愈後治法合度方藥和平經正因非專

外證醫案彙編 卷四 無定處部論 三

家則尚無把握耳專科一切丸散外治有一定之法一有不備即不能建愈功內科精明不知外科得醫術之半余思內科辨症不明無醪醴湯液丸散丹針摩浴熨一定治法外科治法不精無刀針圍貼消散丸散丹一定治法皆得醫術半中之半不及耳余揣摩半生尚未得醫術半中之半每臨症後恐有錯誤痛懲已過抱影自慙今輯斯書欲內外兩科合而為一得醫術之全體蒼生之幸也此卷中胃癩腸癩門觀之自知醫術之難全耳

外科之有瘋科專治七十二種風氣今有專治傷寒科者妄立傷寒許多名目言之解頤聽之噴飯有漏底傷寒發癩傷寒豎

頭傷寒濕溫傷寒夾食傷寒夾經傷寒夾陰傷寒發狂傷寒夾驚傷寒扣頭傷寒則足傷寒瘟疫傷寒夾驚傷寒夾氣傷寒夾痧傷寒醫者不言此等偽名醫不得行對病家不言此等偽名病家不信相沿成習效而尤之病家問醫曰病者何病答曰傷寒病是何傷寒見其稍有下痢者曰漏底傷寒病家得意曰先生高明果然漏底傷寒若初病邪阻於膈不舒問曰何病答以夾食傷寒恐明日要變發狂傷寒若發熱噁語倘熱甚煩燥起坐不安曰發狂傷寒今又變整頭傷寒矣諸如此類余讀書不成商賈無資藉此小道為衣食計或出此詭識者可知有高明之士竟言之於書之於加豈非為識者笑乎又有小兒病之

外證醫案彙編 卷四 無定處部論 三

偽名有反弓驚蛇咬驚老鴉驚等數十種偽名幼科之外另立驚科專治一切急慢驚風病家問答以此類推即為行醫之捷徑致富之良箴惟願急挽此風若如三十六瘋數十種驚風等偽名已刊板行世倘各傷寒偽名附會成書行世後日害不勝言矣余誌鴻誌

瘡疥不能多搽水銀硫黃余幼時見鄰孩搽偏體疥腫氣阻而死又有藥肆夥身上有蟲搽水銀太多後齒縫出血腐爛臭穢不堪一尋解毒清涼罔效五六日即斃皮毛內應藏府外治之藥不可不慎也余誌鴻誌

一第 1011 丹 黃參日 卷 17 反之下

東三
書
大

癩風即癩風俗又名大麻風
天地間陰邪惡濁之氣

於骨髓而於肢體面貌
浸淫以及五臟愈久愈深遂
致不可療予嘗攷之唐孫真
人常治此症閱數百人得免
於死者二後朱丹溪治五人
得免者僅一婦人其治之難
如此然則癩遂不可治乎曰
是特未得其法百世之治此
症者於病之源流深淺及
藥方用藥未嘗確有所見

而溫涼雜投鍼石互用以冀
倖其有功是於病未有必蒙
之益而於人之正氣已有邱
山之損矣因念古來張劉朱
李諸家以及時賢著述咸
於內症闡發無遺獨風科

一門雖間有立論然未有
專門名家殫精竭慮勒成
一書如仲景之論傷寒者三
十年來每遇此症不敢強不
知以為知博考諸書其有所
得而奇方秘製驗者絕少未

嘗不以是為歎也客秋偶過
孫君敦伯齋中見藏書甚
富因出示解圍元藪一書皆
治風要訣縷析條分搜剔疑
以為古人之所未有孫君因
為予言此書作於前明沈氏
舉世莫傳先對祖位兩公獨
購得之寶惜甚至欲梓之
而力有未逮爰糾同志集資
以付剞劂非特良工苦心不至
湮沒而濟世壽物以廣厥傳
志仁者之事也予三十年來所

三

想望而不可得者至是而大
慰又奚翅衣珠之獲耶刻成
因識其緣起如此時丙子秋九
月樂亭黃鍾序

四

原序

風廼大病之元患者為害彌劇余祖氏怡梅公素好醫宦游閩洛燕冀得山林逸士海內高人之秘典施治獲愈甚多次傳於先君艾軒公又博而備之活人益眾三傳至於余廣求寰宇仙流江湖奇士沉潛究論每遇知風者即禮幣款迎研蒐討論韓子云先生於我者知而必師之後生於我者知而亦師之苟得一言善法即珍而筆之隨集隨証若干方旁搜考試驗而奇異者始錄焉皆奪天工神妙不亞還丹舒若

原序

雲錦發無不中余得之甚艱恐久湮沒編為章秩名曰解圍元藪以風癘正論著於首諸風癘論痿痺論贅其次藥品方法條貫而列之後凡學風癘者得是書可瞭然矣如遇同志之士授以濟人廣其積德之功若浪示非人則上拂天心下負三世之勤苦矣嗚呼昔嵇叔夜不遇至人則廣陵散無傳於世道相授受豈輕易哉彼廣陵散不過琴曲之調擇無良士尙不傳而絕音何況醫術關乎性命比之有霄壤之別焉得不謹而秘之余放浪江湖三十餘年未見仁人

故難以同洩非敢故匿而私擅也思得中行之士傾倒以盡余存誠惜命之意惜乎不遇為憾因秘而藏之以俟擇知已云

嘉靖歲次庚戌春三月花月無為道人沈之問自題

原序

二

解園元藪目錄

卷一

風癩論

受病所在經絡

三十六風六經分屬

大麻風

蛇皮風

脫跟風

魚鱗風

解園元藪 目錄

邪魅風

血風 以上屬心經

鷲掌風

鼓槌風

血痺風

餛飩風

痛風

癩風 以上屬肝經

半肢風

軟癱風

紫雲風

乾風

刺風

痒風 以上屬脾經

白癩風

截蛇風

歷節風

壁泥風

解園元藪 目錄

瘰風

啞風 以上屬肺經

冷風

漏蹄風

蝦蟆風

核桃風

熱風

水風 以上屬腎經

雁來風

疔瘡風

雞爪風

螻蛄風

鯁皮風

攣風 以上屬胃經

卷二

六經三十六風總論

藥病總說

癩症一十四種六府所屬

解圍元藪

目錄

三

火癩

蟋蟀癩 二症屬心

木癩

風癩 二症屬肝

土癩

狗癩 二症屬脾

金癩

麵癩

白癩 三症屬肺

解圍元藪 目錄

水癩

雨癩

烏癩 三症屬腎

酒癩

麻癩 二症屬胃

癩症總論

卷三

藥方計

卷四

解圍元藪

目錄

四

藥方計

解圍元藪卷一

明沈之問先生輯 錫山黃 鐘樂亭甫叅訂
風癩論

四時酷烈暴悍賊邪風也。為病最甚。殘害最劇。古人稱癩為惡疾之首。患之變敗形質。頑困不知所之。酷惡毒也。冽凶猛也。暴速也。悍罔也。皆風之質也。春夏多有旋風。秋冬多有颶風。各有嚴風。皆煞癩之邪氣也。經云。冬至之日。有疾風從東南來者。名曰賊風。最能傷人。犯之不可解。俛仰動作不可得。

解圍元藪

卷一

矣。按之應手而痛。烙熨則爽。時刻抽掣。擊剝痰火。衝蕩氣血。輕者結為癰癤。重者聚為偏枯。若遇熱鬱搏凝。則變為附骨癰疽。如寒濕凝滯。深入臟腑。久則積成風癩。人皆不知。陰陽和平。寒暑適時。則疾病不作。若天地變駁。風濕外逆。是為不正之氣。則人感而病焉。說文云。蟲入肌中曰風。故風動而蟲生。蟲無風而不育。諸蟲皆八九日而化。感八風之邪氣而成形也。靈樞云。從東南來者曰弱風。其傷人也。內舍於胃。外在肌肉。其氣主體重。從正南

來者曰大弱風。其傷人也。內舍於心。外在於脈。其氣主熱。從正西來者曰剛風。其傷人也。內舍於肺。外在於皮毛。其氣主燥。從正北來者曰大剛風。其傷人也。內舍於腎。外在於骨。與肩背之膂筋。其氣主寒。從西南來者曰謀風。其傷人也。內舍於脾。外在於肌。其氣主弱。從西北來者曰折風。其傷人也。內舍於小腸。外在於手太陽之脈。脈絕則溢。脈閉則結。而不通。若死。其氣主關格痿憊。從東北來者曰凶風。其傷人也。內舍於大腸。外在於兩脇腋骨下及肢節。

解圍元藪

卷一

二

其氣主強勁。洞泄從正東來者曰嬰兒風。其傷人也。內舍於肝。外在於筋。其氣主濕。乃煞癩之邪氣。非時暴悍酷烈之毒。中於人身。即生諸蟲。滋蔓為害。自古聖賢避色如避寇仇。避風如避矢石。鮮有大病。而人不畏避。妄肆縱慾。荒色內虛。惡風乘侮。而入。故多疾病。黃帝云。八風之毒。百花犯之無色。百穀傷之不實。草木觸之枯瘁。禽獸中之顛獠。水禦之狂越。土蓄之崩裂。人中其邪。則成麻癩。蟲生臟腑。啖肌髓。食血液。形貌醜惡。神思昏迷。遍身瘡。

一第... 丹... 反... 內

穢先儒曰癘卽此候也。中古分爲風癘二名。內駐曰風。所感深外著曰癘。所感淺風甚於癘而癘輕於風。形氣本源則一類也。又曰風入臟腑久注脈絡數年之後發於肌表由漸而變癘一傷人卽發瘡穢至見敗形故風病發遲死速癘病發速死遲大害皆然。江北燕巢呼癘爲炮瘡。南人擬其名而曰楊梅瘡。又曰廣東瘡。蓋聞廣間有室女過癘卽生螻蟲發爲惡瘡穢毒極盛其氣易於傳染殺人。因此滋蔓於世相感而生。

解園元藪

卷一

三

充塞脈絡之內輸散分肉之間榮衛不利肌肢臃腫。氣聚不通使血淤不流筋骨弛縮膚體腐爛膿穢淋漓。眉鬚禿落手足痿痺趾指墮折寒熱麻癢或筆筴或如聖牽如攀如縛如夾癘癘腫瘰茶毒疙瘡百惡駢集得之所由有五
充貯而滿也分肉腠裏也輸運納也臃結滯也臃脹悶也癢凝塞也弛渙散也縮拘急也穢汚濁也淋漓粘汚也罷敗脫也痿半邊罷軟不舉也痺頑痛也指手指也趾足指也麻不知痛癢也筆筴擊

解園元藪 卷一

刑也聖牽絞也聖以木爲刑牀傑住不容轉動也。變筋縮也縛繩縛也拶刑其手指夾刑其足踝此皆痛而難忍者言風癘有此異常之惡候也。癘手指屈倒不能執物也癘肌膚枯槁也腫高起也瘦骨節麻痛難動也疙瘡顆塊也此言風癘之形勢也。足少陽胆其榮在鬚足少陰腎其榮在髮衝脈任脈爲十二經之海謂之血海其別絡上唇口血氣盛則榮於頭面鬚髮美若血氣衰則脈絡虛耗不能榮潤故鬚髮頹落也風入榮衛關節壅閉

解園元藪

卷一

四

氣血不舒皮肉不仁膚腠浮腫虛脹自覺如堅厚之狀痛癢不知故曰大麻風病源曰風癘之相感皆由惡風寒濕房勞嗜慾醉飽露臥變駁所成二者病源無異患害之由五條明列於左
一曰風水陰陽所損
地脈方向吉凶之理曰風水星厯孤虛曰陰陽如脩築安葬豎造開鑿植伐之類皆有年命相關神煞禁忌犯於幽冥測然致病巫人云本命元辰爲害遍身痠痛走注痿痺金神七煞爲害偏枯口眼

歪斜半身不遂、軟弱痿困、白虎為害、渾身塊瘰、腫痛、臭惡、膿血淋漓、天罡大煞為害、蠱脹滿塞、迷悶癱瘓、八煞將星為害、奔走狂越、踰垣上屋、嗷號悲笑、無倫、暴惡持刀、鬪勇、五土猖鬼為害、噤暈昏迷、腹大肢軟、癰疽疫癘、太歲月將時、日星辰為害、變異不測、無所防禁、俗云、風水陰陽所損、不可醫治、其謬之甚、夫陰陽神煞、不可賣其無、而辟慢之、亦不可信、其有而諂媚之、皆惑於偏也、且妖邪之崇、若觸犯於人、不過一時之間、豈有終身隨而為禍、

解圍元藪

卷一

五

之理亦因人氣血不正、受其邪氣而病生焉、若調其氣血、清其思慮、則神正而復元、使邪氣漸消而安矣、故云、變理陰陽、以和元氣、大道君子也、醫家十三科之內、亦有祝由一科、以符水咒訣、禳辟邪魅、妖氛而歸、揖正氣、巢元方云、脉速遲伏、或如雞啄、或去或來、此邪物也、若脉來微弱、縣縣遲伏、不知度數、而顏色不變、此邪病也、若脉來乍大乍小、乍短乍長、為禍脉也、若脉兩手浮泛、細微、縣縣不可知者、但陰脉亦細、此為陰蹻陽蹻之脉也、其家

曾有患風病死者、乃若恍忽、亡人為禍也、若脉洪大弱者、社崇也、若脉來沉沉而濇、或四肢重、土崇也、若脉來如飄風、從陰趨陽、風邪也、若脉一來調一來速、鬼邪也、若脉有表無裏、邪崇為害也、以寸為表脉、以關為裏脉、有表無裏者、乃兩頭有而關中無也、曰隔絕不至之脉也、若尺脉上半不至、關為陰絕、寸脉下半不至、關為陽絕、故云、陰絕而陽微、死而不治、此名妖怪之脉、乃氣血神思受邪、而見於脉也、然皆虛妄之談、亦巢氏病源并諸典籍、

解圍元藪

卷一

本

考究者、姑書之以補不足之論、
二曰源流傳染所襲、
人稟父母精血而成形、受天地造化而為用、故觸天地不和之氣、則病焉、若父母素患惡疾、必精血有毒、交感于胚胎、傳至於兒女、凡風勞病人、皆有惡蟲於臟腑、代相稟受、傳染源流、故曰傳屍、須於幼年未曾發病之先、預常服藥、使蟻蟲內死、不得長養滋蔓、延育為害、若至長大婚配、耗散精神、虧損氣血、病作而難治矣、今人焉肯於未病之先、延

醫調治哉。故使病劇無療，臨危措手，咎在微時不治之故。若其人未染惡疾之時，所生兒女必無傳症。若既生惡疾之後，所生兒女定難免之。先君論之曰：吳中有一富翁，患癘病，吾治愈，久生一女。適人不久，其夫染大風，其妻終身無恙，而毒氣遺症於夫，實大異也。又有一人風病而死，其妻無病，再適於人，其後夫即患前夫之疾，無異數年而死。其毒不遺於妻，而婦人受毒在臟腑，於交感之中，移症男子以受害。想其毒初在交感淫慾中來，原在

解圍元藪

卷一

七

交感淫慾中去，可不畏哉。又有一人風癘而死，生三子一女，皆患風而死。又有一風病人之女，無恙適於人，生一子，幼即患風，此不傳於女而傳於甥也。古云：世有惡疾不娶，信可警哉。又有一徽商三代癘病而死，第四代之子於髫鬢時，即隨母舅往兩廣為商，並不回家。其父在家勞瘵，既死之後，半月其勞蟲飛至廣內，到其子店中。其子偶出赴席，其蟲徑入房門上鎖內，有一老僕竊見此蟲，即以物塞其鎖門，急報主人，忙將濕泥厚固鎖上，連門

枕擡下，烈火焚之，木皆成灰。鎖已迸開，其蟲猶活，取出搗爛，燬之後，方免禍。其傳屍之惡如此，宜預防之。姑錄以告將來君子。

三曰氣穢蠱症所犯。

他人之毒傳之間，人曰症，因其穢惡之氣觸感而成也。若人血氣虛，脾胃弱，偶遇惡疾之人，聞其污氣，或對語言，而病人口內之毒氣衝於無病人之口鼻，直入五內，則發為病。又如惡疾人登廁之後，而虛弱人或空腹人，隨相繼而圍，則病人泄下穢

解圍元藪

卷一

八

毒之氣未散，衝上從無病人口鼻直入於臟腑，其如清晨未飲食之時，犯之禍不旋踵，百難逃。一如汗氣相傳，痢疫相染者，亦一類也。閩廣之間，造成蛇蠱符水，魘瘴之毒，最能害人有患惡疾之人，乍死，毒蟲皆從七孔中出一，遇生人則飛蠹潛伏為害。昔人從古墓經行，內葬惡疾之人，已久屍骸腐化，其蟲疰人發為大癘而死，故有九疰之說。皆由體虛而受飛蠹傳屍之毒，或風寒暑濕之邪客於榮衛，注於經絡，陰陽失守，隨氣游行而成大害。一

曰風症乃人死三年之外神魂化作飛塵著人成病皮肉掣振游奕不定一年之後毛髮落頸項痛骨立鳴解目痛鼻酸齒蝕發為耗風則頑痺或如耗螫或癢或痛二曰寒症心腹滿悶懊痛嘔沫三年之後大便出血青白色腰脊強發為絕風則不覺絕倒三日氣症如失神機妄言謔語百日之後體重乍來乍去一年之後體滿失顏色二年之後變吐作蟲難治發為顛風則披髮狂走打破器物或發狂風則噉號語笑四曰生症心脇轉痛無常

解圍元藪

卷一

九

三日後體痛移易牽掣絞心脇一年顏赤目紅二年吐逆不利癩蟲難治發為糾風則身生瘡眉毛毳落若發罩風則舉身戰動或口鼻喎邪五日涼症心下乍熱乍寒一年四肢重喜臥噫酸體浮腫皮肉黑瘦生游目黃爪甲唇青發為寄風則口噤面喎肢軟六曰酒症體氣重熱氣從胃脇上下無處不痛一年四肢重喜臥善噦噫體酸面浮腫往來不時發癩大風則腦肉裂目系痛惡聞人聲七日食症心下^音鞠痛懊懣徹背一年羸瘦皮腫體

黑從脚而起臍內時常絞痛發為水風噉食眠臥汗出八曰水症手足腫百日體黃髮落兩目失明一年難治三年身大水盛生蟲不治發為濕風則頭痛欲却中發為柔風則手足眼鼻游腫九曰屍症體痛牽掣非常肉白血^音鞠喉如吞物發為汗風則骨節痛強此九症之病乃癩風毒之根華陀東垣諸先聖皆論之惟巢元方最微詳徹姑纂著於卷秩

解圍元藪

卷一

十

四曰保養失度所發。忍饑勞役醉飽入房縱慾毒怒憂愁思慮妄想貪嗜邪毒積穢濁外蕩樂佚內耗真元以致火熱之邪衝激臟腑凡烙肉生菜怪味之物入腹皆變為蟲水土不服沙冰嵐瘴皆為留毒久而不散積成麻癩發則變形養生禁忌云醉臥露濕必生癩疾又云魚無腮者食之五月生癩夫人為萬物之靈生於天地之間宜惜身命保養元神永延長命古之聖賢以道德奉天壽至百歲為常後世之人以六慾七情為事故多夭折殤殂忤違天地賦生

大恩矣。巢氏云：凡病四百四種，總而言之，不出五種。風毒所搦，一曰黃風，二曰青風，三曰赤風，四曰白風，五曰黑風。人身中有八萬屍蟲，共成人身，若無八萬屍蟲，人身不成。不立，復有諸惡病，橫諸風生，害人身。所謂有五種風生，五種蟲，皆能害人。黑風生黑蟲，黃風生黃蟲，餘皆倣此。此五種惡風生，五種惡蟲，害於人身，名曰疾風。入於五臟，蝕人臟氣，其蟲無數，在人身中，食骨髓，來去無碍。若食人肝，眉睫墮落，食人肺，鼻梁崩倒，食人脾，語聲變散。

或啞，食人腎，耳鳴啾啾，沿腦生瘡，或如雷聲，食人心，膝虛腫，足底穿爛，難治。夫心乃君主之位，不受邪觸，故應死。其脉來徐去疾，上虛下實，是其候也。

五曰感冒積鬱所生。風寒暑濕燥火之氣，為天地之六欲，若不避忌，感其鬱蒸，或逞勇悍，乘汗渡河，踏冰履霜，醉飽當風，房勞入水，露臥濕蓆，或時暑炎，喜臥簾竹，漆牀涼簟，柏木臺几，濕冷之氣，逢迎汗液，入於肌膚，邪毒漸深，剝榮衛，初起麻木，久變屍蟲，蠹肌體，則

風癩生焉，皆人自輕身命，縱性妄為，而犯天地陰陽五運六氣，積成大病，不惟煞癘之氣，宜避，即四時敷和之氣，亦宜謹守。若縱房勞，氣血弱而復犯之，即發為害。巢氏云：汗出入水，冷透肌體，或飲酒而臥濕地，或當風坐眠樹下，及濕草上，或身癢搔之以乘疾風，迅濕漸生瘡痞，經年不瘥，即變風癩。病機云：八方氤氳鼓邪害人，若客經絡久而不去，與血氣相擊，則榮衛不和，淫邪散溢，面色敗，皮膚傷，鼻柱壞，鬚眉落，八風者，西北乾方，尊之曰老公。

乃乾稱父之意也。名曰金風，一曰黑風，二曰旋風，三曰悞風，其發病之由，奄奄忽忽，不覺得之。七年後，眉毛墮落，東北艮為少男，名曰石風，一曰春風，二曰游風，三曰亂風，遇中此風，體頑肉堅，斑白如癩，十年後，眉目墮落，正東震為長男，名曰青風，一曰終風，二曰衝風，三曰行龍風。若中此風，手足生瘡，來去有時，朝發夕發，五年後，眉毛墮落，正北坎為中男，名曰水風，一曰麩風，二曰瓦風，三曰熬風，偶着肌體，春秋生瘡，淫淫習習，類如蟲行，游走無

定十年後眉毛墮落西南坤為老母名曰穴風一
日吟風二曰臚風三曰腦風初受此風不知痛癢
亦不生瘡漸成白癩十年後眉毛墮落東南巽為
長女名曰角風一曰因風二曰歷節風三曰膀胱
風此風有蟲三色頭赤腹曰尾黑三年後眉睫墮
落蟲出可治南方離為中女名曰赤風一曰火風
二曰搖風三曰奸風若中此風身體游游奕奕心
不安寧肉色變異十年後眉睫墮落西方兌為少
女名曰嬌風一曰缺風二曰明風三曰清風此風

解圍元藪

卷一

三

發時百日後體肉蒸熱眉髮能落皆由內傷七情
真元失耗氣血衰弱者感之如調養固密何由致
此哉

受病所在經絡

先中於手大腸足陽明胃經其次延及手足太陰不
發病者何也蓋肺主皮毛而遇風寒足太陰脾主肌
肉而逢濕熱百骸流注六經傳遍皆因三焦相火熱
甚制金不能平肝木肝獨勝而生風故相剋侮以致
肺金脾土皆虧風熱寒濕諸毒化生九蟲鑽嚙臟腑

手陽明大腸之絡環交口挾鼻孔出於迎香貫於
齒縫而下肺膈足陽明胃之絡亦在鼻額齒中而
行挾臍氣衝風氣皆由出入故先中焉手太陰肺
其竅在鼻主一身之皮毛足太陰脾其竅在唇主
一身之肌肉亦風氣之門戶故風病多見唇鼻爛
壞也是以金燥而惡寒土卑而忌濕故寒熱作也
風濕內扇諸火皆動金氣有虧木無所制木旺而
侮土脾乃受傷而肺無滋養子母俱弱則風木獨
旺心火炎炎血熱妄行其所積穢惡邪毒風濕火

解圍元藪

卷一

解受病經絡

十四

相扇化生九蟲啖蝕臟腑則為癩風食肝毛能食
肺鼻崩食脾聲變食腎耳鳴食筋節解食肉痛癢
食皮頑裂食脂起炮食心即死內經脩言腸胃為
市無物不受無物不包飲食不謹朝傷暮損積久
成熟濕熱相漬諸般奇蟲各從五行之氣而化生
亦如腐肉生蛆腐草化螢之理外臺秘要載有九
蟲食人臟腑一曰伏蟲長四寸許為諸蟲之首二
曰虬蟲長尺許人常生之多則貫心殺人三曰白
蟲長四五尺子母相生形勢轉大亦能殺人四曰

肉蟲食人之肉令人煩悶五日肺蟲其狀如蚕令人咳嗽六日蝟蟲狀如蝦蟇令人嘔吐欬逆善噦七日弱蟲又名腸蟲狀如瓜瓣令人多吐八日赤蟲狀如生肉令人腸鳴九日蟻蟲狀如菜蟲形至微細居廣腸內即胷腸也多即為痔瘻甚則為漏澀劇則為風癘因人瘡處已發癰疽癰瘻疥癬蝕若元氣壯實未為大害稍有虛損遂侵蝕之隨其蟲動而變生多病如隔噎癆瘵癩風蠱脹之類又有蜈鼠應聲蟲奇怪之類未易悉舉蟲之為害

解圍元藪

卷一 經絡

五

大矣哉

中於手少陰。面目舌赤。翕翕然發熱。瘖不能言。久乃生蟲蝕心。則足底穿。膝虛腫。渾身潰爛。涎膿腥穢者。榮血先死矣。

舌乃心之苗。君火妄動必舌枯。無津液也。火氣燥金故音啞而發熱。虛火下流熱毒注腎。直出湧泉。故腫痛循膝節而至足底穿爛。無可救療。心主血。火炎內泛。則渾身腥腐。皮肉傷殘。不能聚斂。毒入於心。血泛無制。七年不治。

中於足厥陰。面目多青。惡風自汗。左脇偏痛。久乃生蟲蝕肝。則眉髮焦耗。滿身生黑班。若指脛攣癢墮折者。筋死矣。

木泛形色於外。肝氣已敗。濕土無制。故惡寒自汗。其絡循陰器布脇肋。上入顛額。肝脈見左關。故左脇偏疼。眉髮焦耗者。血不滋養。氣不充潤。如木無水灌而枝葉葉落也。生黑斑者。乃腎水泛上也。指屈趾爛者。如木朽根枝死也。癘癩者。正謂肝木乾枯也。肝病多癢痛。風木動搖故也。三年成大患。筋

解圍元藪

卷一 經絡

六

死不榮為病已劇

中於足太陰。四肢怠惰。皮肉潤動。身體虛黃。久乃生蟲蝕脾。則音啞。膚癢。若麻木不仁者。皮死矣。

脾絡注心循臂。故四肢倦。土敗不能安堵。故肉瞤動振跳也。氣弱不磨穀食。故怠惰不思食味。或食息則四肢不收。血液阻滯。不能周濟。故啞而癢。脾屬土。惡濕。其氣既敗。不能運動矣。故發麻木。然麻乃不仁。與常皮肉不同。按之如隔一紙。木乃肉內唧唧然。不知痛癢。而瘦浙之至也。蓋麻是氣虛。木

是濕痰死血為病。既麻又木，乃氣虛濕聚，血絡枯
滯。晝夜不行，絕不充潤於皮膚也。經言濕生痰，痰
生熱，熱生風。丹溪云：濕熱必生風，風甚則生蟲。正
如腐草化螢，濕熱之氣乘風也。病入於脾，則腫脹
多水，非是濕熱生風，因有濕熱在內，則風乘隙而
入也。六載病成，十五年不治。

中於手太陰，面頰浮白，口燥喘急，久則生蟲蝕肺，則
鼻梁崩塌。若眼斷唇翻失音者，不治，乃骨死矣。

金性燥，故口乾，火熱熾之，故發聲喘急，其竅在鼻。

解圍元藪

卷一 經絡

七

蟲食肺，故山根崩折，劇則鼻柱爛落，金敗不能生
水，腎氣必虛，故目暗乾枯，皮急珊而吐痰，氣泛漫
於脾中，故唇厚而翻，熱氣聚於會厭，故失音聲也。
如金器碎則無音律，骨屬金，故髓枯而骨死，病入
肺經，皮枯不仁，三年之後難治。

中於足少陰，面耳黧晦，腰脊痛引小腹，隱隱不利，久
則生蟲蝕腎，則耳鳴啾啾，沿睛生瘡，或癢或痛，若割
切不知痛者，肉死矣。

腎水泛上，故變色或灰或黑，耳乃腎之竅，水枯精

乏，故耳熱生瘡，腰脊引痛者，虛極也。津液既絕，為
病痠麻，不知痛癢，腎邪最速，一年即成大患矣。
中於足陽明，額多汗，膈塞不通，飡寒則嘔，有嘔者久乃生
蟲蝕胃，散蠹週身，則皮癢浮游，若欬歔矇昧，食減倦
憊者，氣死矣。

胃絡循於目之上下，故額多汗，脾胃氣弱，五穀不
消，膈臆填滿，上逆嘔吐，氣血不通，皮膚自癢，神魂
離散，臆滿則欬歔不爽，陽氣既敗，疲倦惡食也。經
云：腸胃為市，無不包藏，熱積於中，必泛形於外，胃

解圍元藪

卷一 經絡

六

腑受毒，勢由蟲瘴，膚體脹腫，虛浮二十年不治。
癩風之害，根於六淫，中於六部，發為六邪，部各六種。
症名三十有六。

六淫，即風寒暑濕燥火，乃天地六欲不正之氣也。
六部，即心肝脾肺腎胃也。六邪，即痛癢麻爛脹憊
之六病也。胃居脾之下，為受盛之司，藏納五味，故
多受毒，與五臟同。風癩異名，六部每各六種，故有
六六三十六件，由八八有六十四卦也。

天時毒氣，臟腑混淆，互傷外症，癩症彌常。然肺病則

痛胃病則痿。腎病則麻。心病則爛。肝病則癢。脾病則

腫。金之氣燥，故作痛。土之氣濕，遇陽乘之則為沙塵，故痿。遇陰乘之為泥痰，則軟。水之氣寒，陽蕩之則麻。陰凝之則木，皆不知痛癢也。君相二火能敗諸物，故潰爛。風木之性動搖，牽引縮伸為癢。其五臟六腑榮衛肺絡，充貫人身，聯絡相繼。淫邪中人，則周身沿蠱，豈有止於一臟而別經不傷之理。其先中之經絡與後中者在輕重之間耳，但一臟受病，

解圍元藪

卷一 經絡

九

則餘臟難免其傷。且如麻木腎疾也，殊不知麻乃風氣乘之，木乃濕兼寒也。外雖不知痛癢，而骨肉間反知痛癢者，乃腎病重而肺病輕也。麻而軟痿無力者，脾腎相樂也。麻而足長短手攣者，水不滋木，肝受病也。麻而潰爛者，水火不相濟，上犯於心也。又痛乃肺病，如痛久而癱者，母不能顧子，脾氣害也。痛而麻木者，母弱難扶其子，腎氣虧而受毒也。痛而覺癢搔之則痛極難忍者，胃氣虛而毒氣入深也。痛而潰爛者，肺不能生水以制火，而金火

相刑也。餘可以此例推。

感於不測，貯於無稽。曰癩，曰風，異種類聚。

心主血，肝藏之，毒傷血分，則心肝發病。肺主氣，凡風癘皆因氣悶而生。腎藏精，色慾房勞為害脾胃，通連而藏穀氣，其醉飽五味之傷在此。故風之為病，惟在心肝脾肺腎胃之六經受邪，其餘六經不能容受，不被所傷，無所干犯。故風癘不由此而起，手少陰三焦乃無形之腑，厥陰包絡乃附系之經，陽明大腸太陽小腸為出入之門戶，足太陽膀胱

解圍元藪

卷一 經絡

三

僻居下元，少陽胆乃清淨幽間之司，邪毒之氣皆不傷犯而藏蓄，况肺之竅在鼻，氣從而入，脾之竅唇，味從而入，病始之由，多是氣味之感，故先見於皮毛之間。病源曰：六部各有風病六種，共三十六種，皆由六欲七情寒濕風熱邪毒之氣傳淫膚體，周流百節，絲絡交錯，凡中傷者非在一經，非發一症。故治法方藥，浩汗彌常，取効者惟靈寶大藥，各平分家產方，最為王道。治三十六種風，皆有全功。其次止東華玉髓水製黃香丸，又各黃龍丸小還

丹等數方而已。亦能治諸風。其餘一方止治一症。若以他治如水澆石。罕有取效者。而大風之外。又有癩瘡十四種。後世因其病勢顏色之多端。而巧立名色以惑人。上古止言風癩。並無奇異繁名。凡言臟腑如此。特論其先感之由耳。若病一發。譬諸風水隨處充滿。流蕩百骸。各經傳遍。無不至焉。

三十六瘋六經分屬

其大麻蛇皮脫跟魚鱗邪魅血風發於心經

大麻風

解圍元藪

卷一

三十六瘋 心大麻

三

夫大麻風者。乃諸風之長。初起時發於身手。按皮膚如隔一紙。洒浙不仁。或遇陰雨。或至夜間。則肌膚肉之內。如漉漉然。或痛或癢。漸至皮肉堅頑。剗切不知。身體虛腫。此症最易穿爛。手足拘攣。臭惡費弛。由於縱意忘為。不避風寒暑濕。六慾七情。使榮氣虛。衛氣實。邪入於肌肉。氣血滯而不通也。此症以大麻湯。并奪命丹。神仙換骨丹。珠雲散。奪命還真丹等藥治之。又云大風者。初則體氣動。熱氣從胃中上下。無處不痛。四肢重。喜臥善噦。噫酸。體面浮腫。往來不時。久而

腦轉肉裂。目系痛。惡聞人聲。危矣。

蛇皮風

此症起於手臂股腿之間。皮膚迸裂。形如蛇腹之紋。隔寸^{音寸}。斷流出血水。或痛或癢。漫延遍身。此症最速。勢迅而凶。若不卽治。禁戒十難救一。皆由性悍逞勇。暴妄太甚。觸冒風濕。蓄之不散。致犯心火。焰焚肺竅。遍敗五臟。耗蕩元氣。用火龍散奇效良丹等方治之。兼以大補之劑。大料上緊服之。如妄行點刺。薰蒸。卽死無逃矣。

解圍元藪

卷一

心蛇皮脫跟

三

脫跟風

此症初起。脚後跟并兩踝下。發水泡。或皸裂迸開。或生小瘡。或痛或癢。或生腫。久而穿爛。延至足底。俗曰草鞋風。遂至延於足趾頭上下。及趾了內生瘡。痛癢淫爛者。俗曰魚腮風。卽一類也。與漏蹄風不同。此由酒色太過。不避寒濕。敗傷氣血。或辛苦之人。寒濕疑滯。釀成熱邪。以致心火泛流。肝腎風邪。毒在臟腑。用苦參。凡大消風散。火龍散等藥。禁戒酒色。大補氣血。免成漏蹄之害。

魚鱗風

此症初起於遍身。乾白浮癢麻木。漸生小瘡。變成梅花大片。如刀刮魚肚之皮。或如蛇背之紋。癢而搔之則痛。或出黃滋水。冷熱皆怕。或如榆樹蛻皮。大小不一。俗又稱為榆皮風。久則延爛成瘡。渾身腥潰。膿血粘穢。皆由耗散氣血。元陽虛敗。寒濕風邪漫流肢體。又遇暴勇忿怒。房勞五味。乘其侮而深入臟腑。最能害人。宜以大消風散一粒金丹火龍散等藥治之。此乃心經毒疰胃腑之害也。

解圍元藪

卷一 心魚鱗 邪魅

三五

邪魅風

此症初時偶爾好悲如醉。狂言驚怖。向壁悲啼。錯詞歌笑。或不言語。夢寐喜慶。或與鬼交。乍寒乍熱。心腹滿悶。氣短不食。古云氣疰。又名狂風。走入神廟。妄言謔語。叫號嘻笑。體滿失色。久而癱瘓。身痛危頓。此由風水陰陽所損。偶為鬼魅妖邪驚恐觸心。或憂思妄想。以致邪迷心竅。損敗心液耳。速用搜風順氣丸。疎風散氣。鎮心補血。安養元神。兼以內助扶救氣血可愈。血風

此症初起於皮肉之間。如血灌周身。充滿肌膚。如被杖之狀。或生血皰浮腫。或朝夕來去。陽氣乘之。則早盛暮平。陰氣乘之。則晚凶早滅。或衄血吐血。咯血。或喜臥噦噫。或齒縫中時流血。面腫目疼。腦裂。或生紅片如錢麻痛。或腫處穿即流血不止。或大便出血。血虧則手足攣攣。血乏則形變神焦。漸死。乃心毒流於肝經。火炎血泛。邪熱太甚。風濕外馳。由於乘風行濕。醉飽房勞。好勇鬪狠。入水迎風。或忿怒飲酒。或忍飢竭力。以致邪毒攻擊。疲困倦軟。宜以補舊湯鉛

解圍元藪

卷一 心風 驚掌

三五

承膏一八濟陽丹等件。散邪降火。清氣養榮之餌。救之免死。

其驚掌鼓槌血痺。齧齧痛風。顛風發於肝經。

驚掌風

此症先於手心。并指了間。生紫白癬。麻癢頑厚。抓之有白皮鱗屑。搔後又痛。又癢。湯沃則爽。每於湯中爬破成瘡。或紅白垂癩。其形儼如鷺鴨脚皮。故以名之。或生於足面及穿鞋處。混如鞋面而生。俗云鞋帶瘡。又名鞋套風。其實即此風也。久則穿潰穢爛。膿臭延

及遍身。敗惡彌甚。乃因勞心焦思。飢飽肆慾。汗露縱力。風濕傷血。或暴怒冷食。火邪入肝。心肺戕害。日漸虛損。發於肝家。故先起四肢。四末次傷及根本也。不可輕視。最耗真元。以大消風散。二八濟陽丹。小棗丹。用心調治。另有一種指甲浮薄。隱隱如見血痕。不痛而作拘急不爽。名曰鷲爪風。久則爛去爪甲。指頭鼯落。大害難救。每日清晨未梳洗。取自己眼脂塗之。久則自愈。名曰還神丹。內治以清陽散氣。抑血之藥。久服可愈。除此再無他法。

解圍元藪

卷一 肝鷲掌鼓槌

三五

鼓槌風

此症初起於肘膝間痠痛。怕見寒濕風冷。行步艱難。俗醫皆認為寒濕脚氣。久則肢脛屈弱。骨節大痛。腿肉漸去。漸小。膝踝脹大。趾指痠麻。痛爛墮落。或皮肉紫黑。形如鼓槌。故有此名。由感冒雨露。勞倦臥濕。恣食生冷。喪敗氣血。風濕無制。邪傷榮衛。肝血無拘。流注脾腎。液竭精枯。致使筋骨不榮也。以神仙換骨丹。獨聖丹。棗靈丹等藥治之。另有一種怪症。四肢節斷。如脫。止有筋皮相連。不能舉動。此名筋癱風。風病之

內或多。襍之以黃蘆酒浸一宿。焙燥研末。名獨勝散。每服三錢。酒送下。久服自愈。

血痺風

此症初起時常疲倦。汗出。臥寐不時搖動。形體如被風吹。滯奕倦怠。或時攻擊而痛。久漸發出紫塊腫脹。痛極則癢。癢軟而麻。癢極則痛。或時穿爛。臭惡跛躄。敗形。日夜叫號。乃由體虛而風邪深入陰分。氣血為風邪所擊。肌膚弛緩。皮腠疎開。風邪暴侵。肝家受病。至心氣煽鬱。脾濕并注。故生毒蟲。蠹蝕肌肉也。以補

解圍元藪

卷一 肝血痺蝕

三五

蝕餅風

舊湯鉛汞膏。二八濟陽丹等劑治之。庶免變傳無治。此症初起於眉稜骨上。或起面頰間。發生痞癰。穿爛為瘡。開大如錢。或遍身先發小瘡。遂變為爛。其症但有膿水流出。變成乾堆。粘汚結穢。積厚甚腥。汗流涎粘着之處。即爛為瘡。從首至足。身癩眼珊。鼻折唇翻。又名眉風。由貪酒好色。不避風濕。肝血凝結。心火泛蒸。陽氣墮敗也。急以補舊湯。苦參丸。大消風散等藥。服之外。用淋洗擦藥。大補氣血為主。

痛風

此症初起於身肌骨節間。游奕抽掣疼痛。晝夜無所
休息。手足不能屈伸。坐臥不能轉側。或筋緩無力。或
伏牀癱瘓。陽氣虛則夜靜晝極。陰氣弱則日輕夜重。
病久則衣被不能着體。濕氣盛則湯沃少爽。但浴一
次則病增一分。風氣勝則火熾而暑緩。離火更凶。病
久則加浮腫。或噦嘔不食。或瘡爛不能收斂。乃由房
勞太過。憂思妄想。六欲七情。日損氣血。風濕邪毒。傷
愈。肝液邪傳脾胃。榮衛枯涸。以致精髓敗絕。或鬱蓄
私忿。不得發泄。激蕩氣血而成。或勇怒饑飽。傷感疾
風。迅雨逆寒。充漫四肢。經絡謂之行痺也。其痛轉展
不定。又名旋風。治以大定風丸。如意通聖散。陽起聖
靈丹。神釀丸等藥服之則可。

癩風

此症為狂病也。狂妄不情。筋攣作振。肢體牽掣。號叫
不已。或屋簷駭走。或歌舞哭笑。毛瘁色敗。皮肉腫脹。
寒熱交作。或噦嘔咳吐。氣疰云顛。風一發。跳入神廟。
妄言神鬼。披髮狂走。打破器物。百日之後。變吐作蟲。

解圍元藪

卷一 肝痛風癩風

三七

手足痿攣。屈曲痛麻。變症百出。經云。凡人身之氣血
為正。為內。天時之風寒為邪。為外。若居處失宜。飲食
不節。使臟腑內損。氣血內虛。風邪則外傷之矣。肝藏
血。主魂。悲哀慟忡。則傷魂。驚恐忿怒。積鬱恨毒。氣血
敗亡矣。以奪命還真丹。四魔丹等藥主治。再以養神
再血為要。

其半肢軟癱。紫雲刺風。癢風。發於脾經

半肢風

此症上下痿疼。或左或右。注於身之半邊。如瘦如痛

解圍元藪

卷一 癩風脾半肢

三五

如麻如木。如因如痴。倦怠廢弛。或虛腫。或作攣拳。或
骨髓抽掣。或遍身游奕。或振抖若驚。或痿敗若癱。在
左則死血凝滯。在右則痰涎淤積。或曰偏枯。或曰痿
痺。久則眼痞唇歪。背偻肢軟。叫號而死。乃寒濕疰於
骨節。風邪尅敗脾土。肺腎無根。賊邪自勝也。以救苦
回生丹。二八濟陽丹。兼以大補元陽。養血調氣。扶本
則愈。

軟癱風

此症初如痛風之狀。或作寒熱。或麻痺不仁。精神疲

憊。漸。漸。肢。節。倦。敗。怠。情。困。乏。骨。節。痛。緩。手。足。無。力。身。如。柔。絲。或。腫。或。癆。拘。縮。攣。急。或。節。間。鳴。响。或。怕。風。寒。遂。成。癱。瘓。水。疰。云。手。脚。游。腫。作。痛。四。肢。不。收。古。稱。骨。痿。卽。周。痺。也。山。風。冷。賊。邪。中。傷。髓。液。脾。土。不。固。五。臟。無。本。以。致。血。氣。虧。乏。以。神。仙。換。骨。丹。搜。風。順。氣。丸。二。八。濟。陽。丹。等。選。治。

紫雲風

此。症。世。多。有。之。身。生。紫。赤。黑。斑。如。錢。延。暈。如。雲。霞。之。狀。非。疥。非。癩。形。似。麻。癩。或。少。作。癢。人。不。為。怪。視。之。如。

解圍元藪

卷一

脾軟癱紫雲

无

常。久。而。腫。起。微。見。形。狀。漸。覺。麻。癢。抓。之。則。痛。或。有。皮。起。手。足。提。硬。嘴。唇。微。厚。眼。胞。微。腫。或。自。羸。瘦。或。時。腸。澀。隱。隱。口。眼。歪。斜。肢。困。力。倦。皮。肉。浸。淫。不。時。跳。動。間。或。幾。處。剗。切。不。知。毫。毛。毳。落。脉。絡。閉。澀。痿。軟。癱。瘓。癩。癰。曲。變。成。爛。麻。難。治。蓋。緣。危。敗。遲。而。人。不。為。異。耳。初。起。又。有。錯。認。為。汗。斑。忽。而。不。治。由。七。情。蠹。症。元。氣。損。傷。感。冒。穢。毒。積。久。蟲。鑽。五。內。酒。色。財。氣。鬱。忿。暴。怒。風。寒。暑。濕。煎。釀。成。之。脾。胃。肝。腎。精。血。衰。敗。也。以。搜。風。四。七。丹。二。八。濟。陽。丹。久。服。有。効。

乾風

此。症。身。無。痛。處。惟。生。灰。白。斑。點。與。常。皮。肉。畧。異。肌。膚。乾。燥。手。心。足。底。發。熱。身。體。漸。癯。血。液。乾。枯。初。視。輕。易。不。治。久。則。氣。消。血。枯。倦。困。氣。短。減。食。無。精。若。周。身。訖。癆。皮。肉。不。仁。已。難。治。矣。由。大。怒。大。忿。大。勇。大。怯。戰。兢。驚。恐。或。酒。色。過。度。或。抱。冤。不。舒。風。濕。不。知。而。自。中。寒。暑。不。避。而。暗。傷。忘。食。努。力。忍。飢。勞。神。以。致。脾。土。敗。壞。閉。塞。元。神。也。以。神。仙。換。骨。丹。二。八。濟。陽。丹。神。効。追。風。丸。救。苦。回。生。丹。升。天。腦。射。散。等。方。與。紫。雲。風。一。般。選。

解圍元藪

卷一

脾乾風刺風

三

用。此。種。又。可。用。蒸。洗。之。法。須。行。氣。補。血。大。養。元。神。以。活。膚。膜。

刺風

此。症。皮。肉。間。不。時。騫。然。如。錐。刀。所。刺。霎。然。掣。痛。尋。摸。則。不。知。甚。則。如。割。剗。皮。肉。搖。跳。振。躍。閃。然。走。痛。流。注。不。定。或。骨。節。間。如。火。燒。熨。烙。痠。痛。難。忍。久。則。不。能。動。搖。行。履。甚。則。衣。被。不。能。着。肉。眠。臥。不。能。翻。身。若。經。轉。側。刺。痛。幾。死。癱。困。而。憊。由。體。虛。腠。開。則。暴。風。入。裏。邪。氣。與。正。氣。交。爭。風。濕。擊。駁。急。服。迅。藥。逐。去。邪。毒。則。愈。

若少懈怠。則大病成矣。不治。宜以一粒金丹。小棗丹等方擇治。

癢風

此症渾身淫癢。蟬蟬不息。猶如腐木。細蟲行於肌膚。皮肉跳動。搔之不止。湯沃不息。久則氣血衰敗。津液耗竭。癢入骨髓。搔破成瘡。彌爛方止。又曰姪風。曰蟬子風。內有細蟲。着人甚癢。不見其形。由不擇居處。不節飲食。濕熱自熾。風邪併靈。脾胃虧乏。化生九蟲。鑽嚙肺肝。泛傷脾胃。以大消風散六神輔聖丸二八濟

解圍元藪

卷一 脾癢風白癩

三

陽丹防風通聖散。選治。另有一種。遍身皮裏渾渾如波浪聲。癢不可忍。搔之即血出不止。乃風氣復遇火熱而奔走。膚腠名曰氣奔。用人參苦杖青鹽細辛各一兩。水二碗煎。數沸飲之。連進愈止。又有血不榮於腠裏。以致體虛作癢。火熅湯沃。少息復作。丹溪以凌霄花末一錢。水萍末七分。四物湯加黃芩煎湯調服。其白癩。載音刺虵節壁泥。瘳風啞風發於肺經。

白癩風

此症初無痛處。但皮膚麻木。生灰白斑點。久如塗塗。

頑愆。又變亮赤色。即曰紫癩。患之不治。亦有終身無害。惟形狀怪異者。又多有損敗氣血。遍身皆然。神瘁精疲。減食增寒。壯熱佛鬱。困怠而死者。由淫毒傷肺。金氣泛於外。以尅肝血。毛髮枯萎也。以棗靈丹玉樞丹選治。又有夏日身生紫白斑點。汗出則癢。秋涼少息。年復增之。亦曰紫癩。名汗斑也。因酗酒房勞。感受風濕。邪熱搏於皮膚。血氣不和而發。又名癩瘍。又名汗黯。皆一類也。以雄雞內腎調射香浴。出敷之。用新青布衫緊着睡一夜。大汗出。明早熱湯沃之。其斑俱

解圍元藪

卷一 脾白癩載虵

三

能在湯內不發矣。

載虵風

此症偶然把搔。誤觸皮膚。卒然極痛難忍。正如夏間載虵蟲螫人之狀。久則轉側動搖之間皆痛。走注游奕如斜刀割刺肌肉。叫號不止。若及遍身。無可救矣。由乘汗入水。踏冰履霜。不懼寒濕。以致心火泛焚。肺經毒注脾絡。以致毫毛不舒。榮氣掣縮。毛尾拳曲。倒插肌肉。以太消風散棗靈丹等方治之。風症云。人死三年之外。人魂化作飛塵。着人成病。皮肉掣振。游奕

不定髮落頭項痛骨立鳴解目疼鼻痠齒蝕頑痺如
蚝螫也。

慙節風

此症於腰膝腿肘肩膊之間麻冷痠漸覺走疰抽
掣疼痛肢節腫大變癢舉足不能甚者手指足趾節
節痠痛俗名鬼箭風禱祀求神養成大病皆由妄性
肆慾保養失節感冒所致六淫蕩敗血枯氣衰之故
肺注骨肝注筋肺肝受傷血氣不運亦曰白虎風多
發於肘膝臂脚之間人喚為鶴膝風惟在節節間病
也又曰纏枝風其在肢節間病也古人稱為著痺宜
以定風散駐車丸救苦回生丹選治之

釋園元藪

卷一 肺載蚝慙節

壁泥風

此症身生灰白色片如陳壁土狀呆燥無光無所痛
癢人不驚心殊不知肉死不榮矣乃素性矯暴或積
忿勤勞不惜保養妄冒六淫寒濕風毒濫傷諸臟虛
火兢起剋伐肺金泛形於外以致皮毛枯槁形容憔悴
血液不通手足軟痿也若遍身皆然即死此為風
症之惡候故凡風之白色者皆不易治以補舊湯奇

効丹等方治之

疹風

此症初生癰癧形如麻豆疥癬之狀或痛或癢乃暴
勇之時或微醉之際乘風露臥或浴後肌膚疎暢即
被風邪所犯復有邪毒不正之氣并寒濕相乘注於
肌中則邪熱之氣結於腠裏逢陰雨即凶晴煖少緩
屢瘰屢發久則連片穿爛使肺毒併心戕賊氣血以
大消風散小棗丹玉樞丹等方治之又有一種面上
風癬初起痞癰似疥非疥似癬非癬多感於春夏之

釋園元藪

卷一 肺壁泥疹風

詩

時或癢或痛或作寒熱漸成細瘡黃膿腥穢滋水滴
流粘處即變成瘡延蔓條息名曰吹花瘡又曰吹花
癬婦女多生之此乃肺受火炎蘊積風熱毒穢之氣
陽邪上昇故發於面部如在眉額間起者凶但飄逸
俏俐愛潔者偏生之或暴妄偏執驕傲者或陰毒固
感者或醉臥乘風禦濕者或恣食糕菓油膩炙燥者
皆患之倘又使湯火賊風冲激則勢愈盛若不速治
被風火濕邪襲之變為癩風延入髮內則不能治矣
急以清心順氣散肺火祛風解熱而正淫邪久久方

可除根否則雖愈必發

啞風

此症音啞無聲。肺氣者音聲。五臟清明之氣皆貫於
聲而為五音。若溫融和潤。則陽氣調勻。其聲通暢。若
風濕陰邪搏於陽分。凝滯津液。使氣道不調。清聲閉
塞。會厭是音聲之門戶。懸壅為發音聲之關節。若風
邪觸於關戶。素鑰閉塞。激動痰火。輕則聲嘶而喉破。
重則語啞而失音。五火皆動。肺金傷敗。以救苦回生
丹奪命還真丹兼以涼血生津降火祛邪養氣和肺

解圍元藪

卷一

肺壁泥壅風啞風

三

之藥服之則可。

其冷風漏蹄蝦蟆核桃風水風發於腎經。

冷麻風

此症初時麻木。久漸堅頑。剗切不知。或冷痛。或節節
痠痛。怕見霜露。不能入水。汗液不出。或遇秋冬愈覺
抽掣不能動履。血閉不流。則生水胞。穿爛成瘡。手足
軟曲。肌膚弛緩。筋骨懈惰。由酒色過度。腎水枯竭。或
勞怒之時。不避寒濕。風邪中深。內氣不固。毒從外寇。
病極則癰疽痿敗。憔悴而死。以奇効丹二八濟陽丹

六神輔聖丹真方奪命丹等方選治。再以收濕補血
之劑佐之。

漏蹄風

此症於當脚底中央踏不着實處。乃是湧泉穴。內生
小水窠。淫癢搔破。則流黃水。疑是水窠疥瘡。視為微
疾。久漸成瘡。內生蠹蝕。爛穢不斂。漸至對脚背上穿
爛流膿。一身之毒。直注下流。無所關阻。津液氣血。下
敗不收。俗名穿心脚底風。死者多而活者少。因初不
速治之咎也。由勞役太過。風濕乘襲。色慾太盛。腎水

解圍元藪

卷一

腎冷麻漏蹄

三

耗竭。憊傷心主妄想。縱肆貪淫。無厭憂思。克念氣血
難聚之故。以苦參丸奇効丹火龍散等方選治之。

蝦蟆風

此症身生瘰癧。大者如拳栗。小者如彈丸。凸起高低
麻冷疼痛。肘後痠勁。或癩癩小瘡。紫黑腫脹。形似蝦
蟆之狀。俗名癩麻風。穿即成瘡。流膿臭穢。由酒色荒
淫無度。傷敗腎水。又遇水濕寒邪。聚損脾絡。周身敗
壞。以班龍八卽丹奪命還真丹二八濟陽丹神効追
風丸擇而治之。生疔云。名曰糾風。使心脇轉痛。體疼

移易牽掣冲絞心脇目赤吐逆眉髮禿脫身生毒瘡皮黑瘡瘰形如癩蛤蛇之狀南方呼為癩廝慕也另有一種頭面遍身肉內發起腫塊如蛇盤之狀名曰蛇核用雨濕磚上青苔為細末水調塗之

核桃風

此症初生疙瘡高低塊瘰紅紫纍纍大者如栗三五連串小者如槐實色如葡萄之狀粿粒皮間乃憂思過度房勞太甚邪傷腎水神無資助風濕妄肆於膚絡之表急用火龍散藥靈丹升天腦射散救治若仍

解圍元藪

卷一

腎蝦蟆核桃

三

不禁戒色慾則腰背屈曲手足痿頓指膝攣毀口面腐敗鼻崩眼塌骨蒸髮禿而多汗體常牽掣而強直皮肉隱痛喉如吞物者害則甚矣又名汗風亦名葡萄風又有一種或於手掌指膊或足腕股腹肋脇之間或頸腋頭面之上生細黑塊瘰若天明氣朗則隱而不見遇陰雨濕蒸則發之或上半日不見一交酉戌之時則發淫癢抓搔則痛或天氣晴明其色鮮紅或浮白作癢陰雨則晦黑紫痛者名曰妬痴瘡醫火風邪蕩注臟腑也速以祛風養血調氣清陽之劑治

之不爾則成大風矣

水風

此症初起如水腫四肢浮腫飽悶痿憊後漸周身發炮灌水穿則為瘡膿滋腥汚霎時潰爛若於肢節間發則軟癱不能行動鬚眉禿落手足攣折鼻崩唇翻趾掌毀墮又曰爛風若臍中時常絞痛飲食坐臥汗出漸漸羸瘦若腫從脚起者害甚急矣由酒色暴勇性狠偏狂怒忿氣鬱榮衛敗壞精液枯涸又被濕毒寒邪傷損五臟虧耗脾腎或怒入水濕滯凝畱之故

解圍元藪

卷一

腎核桃水風

三

此種多是風水陰陽所損年命神煞為禍以搜風順氣丸苦參丸升天腦射散兼以祛邪調氣養正扶神之劑方愈

熱風

此症初起目脫惡風寒戰鼻中常流黃濁涕或咳吐膿血或鼻崩眼塌耳塞而氣閉不通救遲則死又水疰云熱風即濕風體黃髮落兩目失明三年身大水盛生蟲內蝕五臟津液由勞役太過腎水枯竭肌膚不固暑濕風熱暴火之氣先從毛皮而入後傷氣道

肺液受虧。五火乘邪而起。此等正謂保養失節所致也。以搜風順氣丸。東靈丹。神效追風丸等方治之。兼服大補元陽之劑。

其雁來疔。雞爪。蜈。蝮。蟻。蠱。風。發於胃經。

雁來風

此症每起於七八月間。作時則手足乖癩燥癢。形如蝕癬。或白或紫。或頑厚如牛領之皮。搔破則血水流。出疼痛無時。交春則愈。交秋則發。按年如是。故曰雁來風。感受非時也。然腐之邪毒。蠱肺金。五火交作。風

解圍元藪

卷一 腎熱風胃雁來

三

濕乘之則發矣。若雁去時不愈。四季皆然。則成大風矣。以奇效丹。六神輔聖丹。升天腦射散治之。南人呼此曰社風瘡。蓋雁乃春社去而秋社來也。又有一種濕癬。名歷癩瘡。亦於春二月。秋八月雁去來時。發於四肢。與內漸大。熱痛亦各雁瘡。荆漢人多患之。與雁風同治。另有一種。每至秋冬。則手指或遍身發紅點。作癢。乃寒氣攻於腠裏。陽氣閉絕。不能發越。拂鬱而作。亦名雁風。治以人參敗毒散。解其表。補中益氣湯。實其裡。則愈。又有一種。每於二三月。乃手足生疥癬。

之類。名痺瘡。形如雁風。交秋風高則愈。名曰燕瘡。或發於頸項之上。與雁風同治。

疔瘡風

此症初發。瘡。五色。癢。遇熱則癢。逢寒則痛。搔之成瘡。久則寒熱交作。蟲。肌。體。形如蚤。蟲。瘡。痕。隱。隱。在內。復感寒濕。則斑。爛。癩。癩。難。治。若發於脚背。并趾頭。後跟。連片。紫白。其脚面。大。疔。骨。俱。無。名曰鞋帶瘡。又曰草鞋風。由寒濕風邪。客於皮膚。漸入榮衛。肺金受制。脾胃空虛。土衰水賊。又遭霜露。觸之即發。巢元

解圍元藪

卷一 胃雁來疔瘡

聖

方云。初生斑。癩。隱。隱。如。癬。或。紅。或。紫。或。黑。或。白。漸。大。變。形。或。腫。或。癩。或。癢。或。痛。久。則。成。瘡。筋。骨。痠。疼。冷。熱。抽。掣。膿。涎。臭。穢。肢。體。敗。爛。而。死。乃。酒。色。太。濫。荒。淫。無。度。或。陰。毒。微。慢。含。蓄。鬱。氣。傷。肝。之。力。勞。神。復。敗。腎。水。又。遇。風。濕。注。損。胃。絡。遍。延。臟。腑。致。成。大。病。以。六。神。輔。聖。丹。苦。參。丸。神。效。追。風。丸。治。之。如。發。白。燥。癩。瘡。從。手。足。起。者。名曰四末風。最難治。

雞爪風

此症手足自搖。振抖無力。不能持物。舉動艱難。牽引

寧縮。霎時殭直。或節斷麻木。大痛。腿肘轉筋。乃穢毒過傷也。肝胃太薄。濕熱已極。血涸骨枯。肺肝損壞。亦有地理陰陽所損成患。以大麻湯真弓奪命丹大消風散等方治之。兼補氣血。清陽養元為上。

蝮蝮風

此症漸生塊瘰。三五連串。大小相貫。肘膝先見者輕。頸項脇肋。先見者重。漸大成串。延長如土狗蟲鑽入地穴。身之病形。或作寒熱。或痛或癢。俗醫認為粟子治之。反速其禍。久則周身穿爛而死。乃犯惡毒臭穢。

解圍元藪

卷一 胃雞爪蝮蝮

四

不正之氣。暴觸胃腑。大毒伐脾。五內皆云。泛走膚絡。氣血虧弱。惡邪外鼓。九疰之蟲。毒蠹於肌表。須班龍八帥丹。苦參丸。真方奪命丹。玉樞丹等方治之。再加薰洗方愈。又有一種渾身生泡。如甘棠梨樣。破則出水。內有石一片。如指甲大。穿則石出方愈。其泡復生不已。抽盡肌肉。則死。以蓬朮三稜各五兩為末。作三服。溫酒送下。則愈。

彈曳風

此症或時不覺。強勁暈倒。手足無拘。或舞蹈牽掣。或

寧拳伸縮。肢冷臥地。俗名打鴛風。即此也。寒症云。即名絕風。心腹滿悶。懊痛嘔沫。久則大便出血。吐涎青白色。腰脊強時。不覺絕倒在地。與癩症相似。蓋人以胃氣養肉。貫漑經絡。肌膚若肆。慾醉飽房勞憂怒。使胃氣衰竭。以致經脈虛耗。則肌肉懈惰。肢體弛縱。不能收攝。風邪漸搏。氣血溟散。困乏痿頓。以一粒金丹奪命還真丹。真方奪命丹。四魔丹。兼以祛風降火消痰調氣之劑治之。免成大風穿爛癰瘻難治。

蠱風

解圍元藪

卷一 胃彈曳蠱風

五

此症初起。腹大肢瘦。形如蠱毒。眼赤唇翻。久則渾身脹腫。皮肉紫黑。浮大虛腫。毛髮先落。形貌醜陋。後則腐爛危困。或身戰動。口眼歪斜。寧屈。又稱為畢風。勢惡危速。而易於傳染害人。乃氣血虛損。以致九疰毒蟲入於胃腑。流蠱五臟也。或因寒濕太重。血滯脈絡。虛火擊搏而成。以救苦回生丹。搜風順氣丸。四魔丹。選治。此種亦有邪祟不正。陰陽所損之故。又有一種面上生瘡。如貓兒眼睛石。放光生彩。並無膿血。冬天自退。頸背皆然。名曰寒瘡。亦怪症也。由多食雞魚蒜。

非之故用溫補之劑自愈。

夫歷節。或蛇。或疔。或雞爪刺風。皆痛風之類也。魚鱗。或掌。或雁來。或瘰。或風乾。或風皆瘰。或風之類也。

痛症之類最多。如走疰而痛者。風與邪氣流行也。痛在一處。定而不動者。死血聚也。抽掣游奕。霎然如刀錐刺。尋之不知其所者。乃濕流關節也。夜劇晝靜者。陰邪侮陽也。暮甦旦甚者。陽邪侮陰也。如遇陰雨。或至隆冬。嚴風則發者。寒濕搏凝也。似痛非痛。洒淅不知其處者。勞傷氣血。濕痰散走也。皆

解圍元藪

卷一 胃 蠱風

四三

邪氣傷於內。與臟腑傳應而作也。若癢則不然。皮膚之上。浮游淫癢者。血虛火氣乘之也。外雖癢而內覺痛者。邪在表而毒注內也。烙之以火。沃之以湯。則爽者。勞傷瘀血凝滯而不散也。癢而搔之。又痛者。血虛熱氣聚也。癢處見湯。則腫者。元氣虛敗。諸火布於腠裏也。古云。痛無補法。又云。癢麻虛宜補。疼痛實宜瀉。又云。諸痛無補。諸癢無瀉。實乃邪氣充灌經絡。補則助邪。為害矣。虛乃正氣虧乏。瀉則引邪深入。而無救矣。

紫雲白癩。大麻核。桃啞風。皆冷麻之類也。脫跟。或蛇。或皮。或漏。或蹄。或血。或痺。或熱。或風。皆爛穢之類也。

凡似痛非痛。似癢非癢。或抓刺。或剗切。不知。或按於肌膚。如隔一紙之狀。或癢。或疥。或頑。或癩。之類。皆曰木。或而。或麻。也。凡瘡。或癩。或穿。或潰。或膿。或血。或淋漓。或濁。或水。或滋。或粘。或迸。或裂。或破。或皮。或肉。或腐。或惡。皆爛壞之屬也。

蝦蟆。或蝮。或蝨。或血。或風。或水。或風。或蠱。或風。或顛。或風。皆腫脹之類也。邪魅。或鼓。或槌。或軟。或癱。或壁。或泥。或半。或肢。或鞭。或曳。皆痿憊之類也。

凡身體虛浮。腹大如鼓。手足頭面腫大。皮肉如癰。

解圍元藪

卷一

四

而不穿。凹凸不定。或胸臆悶塞。脇肋脹憤。氣不升降。神不舒爽。皆腫脹之類也。凡手指。或攣。或癩。或腿。或趾。或跛。或腰。或背。或偻。或口。或眼。或歪。或斜。身體。或痿。或軟。或疲。困。左。或癱。右。或瘓。乾。或癰。或癩。或直。或廢。或弛。行步。或艱。或難。皆憊壞之類也。

解圍元藪卷之一終

解圍元藪卷一

明沈之問先生編輯 梁溪黃鐘樂亭甫校訂

六經三十六瘋總論

若夫嵐瘴蒸襲日月靈光

嵐瘴乃山川鬱薄沆瀣之氣。天道乖違。則彌漫充塞於六合之內。則日月蔽其光彩。如患癘風之人。濕熱邪毒之氣蒸襲。或服熱毒之藥。久則眼目昏暗。翳障注爛。自然失明也。

龍虎驕騰波瀾泛湧

解圍元藪

卷二

六經三十六瘋總論

一

雲從龍風從虎。乃陰陽物理之道。若龍虎失職。暴傲逞威。則風雲倏陡。雷電交掣。淫雨滂沱。颶颶嘯吼。其波濤湧躍。泛濫狂越矣。如風癘之人。不惜身命。冒犯賊邪。則氣血由之而蕩敗。惡證由此而變。更大病既成。將何救治。

火炎崑崗兮英華凋落

火焰崑崗。則玉石俱成灰燼矣。煙炎狂沸。草木豈能抵受。枝葉焦墜。根本傷殘。如風病之人。邪火內盛。則毛髮鬚眉。焦燥敗耗。髓液乾枯。面貌不榮。肌

膚黃瘁不澤矣。

神離元牝兮空谷傳聲。

老子云。谷神不死。是為元牝。又云。元牝之根。衆妙之門。人之泥丸丹田。元神守之。如元神不守。則精氣離散。病將生焉。神既不守於宮。精神渙亂。元氣無依矣。則聲何從而響應。神氣之音。元神有虧。橐籥關節危敗。則音聲變異矣。如風病之人。邪火熾盛。致使精神散亂。氣血敗亡。橐籥會厭無從。耳養則語言錯謬。音啞呆噤之病。變更健忘顛倒也。

解圍元藪

卷二

總論

二

蠶蠹花心而不實

草木果粟之實。由花以結成。花之精靈。乃心上之簇粉也。若花之粉箱有損。則不結實矣。如花發時。被蜂蝶之蠹殘蝕其心。則不成實。總結亦難肥大。由此知人之元神在於精氣。元神全以腎水所鍾。若風病之人。不惜身命。恣貪色慾。敗損精液。如花之損心。則性命不能延永。

鷹餒鸞截而爛腸

鷹餒鸞截而爛腸。鷹食諸禽之肉以養生。不食草木之類。宋王養一

鷹甚愛之意其食肉則肥健。日令庖人剛百鳥之肉。剝成團而啜之。恣其過飽。肉內又以椒辣之味和之。使其香而美也。鷹食過甚。不久腸嗝腐臭而死。如風病之人。宜節飲食。澹滋味。菜蔬調養。若不謹戒。而饒食肥甘香辛美味。猶鷹食糞餅。非惟不能養生。豈得苟延殘命。色如隨錦流霞。邪充五內。渾身遍發斑駁紅腫。赤色黑色五色之紋者。乃寒濕風邪毒氣。流注充滿於五臟。泮渙於脈絡百骸。

解圍元藪

卷二 總論

三

病勢已劇。內形於外矣。形似熏煤磊石。血溢六經。人賴氣血周流充潤。故肌膚滑澤。容貌光華。若面色如烟薰昏暗。或似煤炭晦黑。或塊壘高低。驚敗灰塵之比。則氣血不守。內涸枯焦。元氣泛傷於外。精神敗盡。離脫榮衛。大病已劇。若不速救。則夭折之患立至矣。風病之質。不過痛癢麻爛。僊脹六種也。古云頭面起者曰順風。腰足起者曰逆風。上部先見

上必盛下部先見下必多

人身十四經枝絡。絲系皆環於巔頂。交於百會。氣血周流。旦夕不息。五臟之竅。皆達於面。故面乃諸陽之會。獨能耐寒。諸氣相逼。故臟腑受病。先見於頭面。氣血皆向上。領毒上出也。若於腰胯之間。先發者。則氣血凝毒。搏滯關格。上下不舒。腿股厚實之處。不能藏蓄。若先見病。則氣血引毒垂下。而日益深沉。藥力難至。不易驅伐。經云。身半已上。同天之陽。身半已下。同地之陰。從上發者。陽中之陽。氣

解圍元藪

卷二 總論

四

從上出而為順。攻之易散。氣反下行。為逆。伐之難於奏效。上部先病。邪聚於上。下部先發。邪併於下。丹溪云。氣受之。則上多血。受之。則下多。蓋氣之性。冲上。血之性。流下也。故上多病者。氣必虛。下多病者。血必竭。風本屬陽。癘本屬陰。故癘瘡於下部。先見易治。在頭面起者。必凶。又有遺毒之患。陽明胃與大腸。無物不受。曰百納之倉廩。風毒之氣。皆蓄於此而發。如布囊盛物。一有穿孔。皆從而泄之。風在人身亦然。如有穿爛者。則不能速斂。毒氣漸出

也。

導痰去濕。利氣清陽。針委中。刺腫塊。耗泄毒血。治要之捷。萬類千方。不過如此。

屬濕中人。虛火隨起。痰因火動。氣滯不清。腫處則毒凝聚。針之使散。且如有治紫雲腫塊者。以小艾炷灸之。火氣透入皮膚。揖引邪入走出也。委中穴。在兩足對膝後。腦中央。曲脈兩筋中。即血郄穴也。三稜針出血妙。八風八邪穴。在手指趾本節背。後交叉中。虎口內。直針入三分。瀉多不入。經絡與

解圍元藪

卷二 總論

五

疔。疔脫經之委中。同治癰風麻痺不仁。彎曲無力之症。

蝟附輕粉砒霜。切忌不可妄投。參芩白朮芎歸。尚且宜擇而用。祛風瀉火殺蟲排毒為先。補血壯元導滯。堅筋相濟。血足風自消。氣清風自散。是聖賢確論。萬古之下。豈能改乎。

世有妄醫。用八將追魂方。內有砒霜與土狗蜈蚣等件。又有一等粗人。妄用烏梢赤蠅等蛇燬灰。暗投藥中。與病人服。乃云以毒攻毒。其害甚大。古有

醉仙散以輕粉為主。服之或一時苟愈。必使毒留臟腑。百節鑄痛。至死不已。又使腫塊痿頓。蓋毒犯心經。則肘膝腫大潰爛。筋節脫落。毒犯肝經。則眉髮脫落。皮色放光不澤。毒犯脾經。則貪嗜嗜食音啞。眼皮坍塌。垂失明。肉堅塊瘰。口喎頭暈。疼痛。毒犯肺經。則痰湧喉痺。鼻毀臭爛。手足彎曲。毒犯腎經。則腰跛膝蹙。骨節痠痛。腦裂陰莖爛落。毒犯胃經。則渾身疔瘡。膿穢腐臭。癰痿脹滿。或脾泄瀉痢。腹痛。終身為害。風癘之人。其熱必盛。故血液乾燥。皮毛

解圍元藪

卷二 總論

六

枯脫。若又加附子川烏等熱藥。猶抱薪救火。人之眼毛。扇掃塵埃。使不入目。故常閃霎。動若燥熱。能落。則塵埃無所祛掃。飛入目中。必常指拭。漸致眼紅坍塌。而成大害。且虛火暴虐。則真水必衰。若又以烏附謬言補陽。豈不助火邪而燥其陰。腎水乾涸。慾火熾盛。以速其死。又謬云用蛇蝎等藥。以毒攻毒。欲劫病於一時。以誘財利。不知癰風由毒積成。又遇毒藥。以火濟火。如寇遇夥。類聚混淆。反助賊邪。鑽透骨髓。盡戕元命。豈可用乎。蓋風病血

虛卽陰虛庸醫疑以大補爲主用人參黃芪不知黃芪乃補氣之劑服之反助陽邪而耗陰血經云血虛服氣藥則血愈虧病必日增過多則死如水在溝潭風捲必涸故血虛忌用氣藥人參益氣生津和中病後僅可服之又助太陰之火故肺熱者宜忌况多服必有參毒發喘湧痰總不如玄參耳血歸元祛五臟之游火爲風科之要濟白朮調脾去濕川芎爲血中之氣藥行血滯於氣分當歸爲血中之主藥活血各歸於其經始治必用之爲綱

解圍元藪

卷二 總論

七

領古云醫風須補血血足風自滅又云醫風須理氣氣清風自去極有旨趣壯元可不痿堅筋可不癱豁痰則氣自清降火則血可養此治風之要也須戒嗜欲絕女色禁食一切動風傷血敗氣腥鮮辛甘瓜果粉麩方可延生否則雖愈必發風病之人不忌毒食乃加重之端不戒女色實速死之兆故丹溪言治五人止一貧婦淺薄且寡得永天年禁戒之專也餘皆不免再發不守禁戒之咎也孫真人治四五十人終無一人免於再發非

真人不能治蓋無專心守戒者也其猪肉羊肉動氣發風牛肉驢肉沉疴頓起燒酒動火麪酒動濕肥甘美味皆且忌之惟烏魚功並蟬蛇蜈蚣殺蟲最勝烏鴨涼血補元食之又助藥力凡椒芥葱蒜姜茄大能發病猶當絕之若不嚴戒雖愈必尋毒而生疥癩蝕癬之類漸滋舉發爲喪命之機

藥病總說

三十六種風症不過痛癢麻爛腫癢之類一百八道方藥皆排毒殺蟲補血壯元理氣之劑諸賢秘論各

解圍元藪

卷二 藥病總說

八

檀門竊自古聖賢遇病立方議論悉詳各據一理癘風多種所由不一且如北人剛勇而地高燥南人風氣柔弱而地卑濕閩廣多有風瘴蟲毒之氣江淮常受汝水寒冰之傷海島風濤山嶺妖魅貽害無窮丹溪專攻外感理氣清陽利於南方東垣崇理內傷導痰去濕利於北方孫真人王好古許旌陽柳朴子等或以殺蟲排毒或專補血壯元或惟調氣清神各有大意而制方無不驗然諸家各有秘旨後人若能辨症用之自有効驗須博覽各家之術約而避之定有

待節如得一方便。誇能治。必無皆驗之理。且如五龍丸。有斬關奪帥之功。千年藥。有起死回生之妙。癱爛敗絕者。非東華玉髓不能復其原。斑爛舛錯者。捨馮夷瓊漿。烏能掃其跡。若合其宜。如弩發機。若違妄用。如水澆石。

黃龍丸。即水煮黃香丸。能治三十六種大風危症。烏龍丸。治風症內熱痰火上攻。并周身乖癩燥癢。作痛。白龍丸。又名捕龍丸。治上半身痛風極凶者。花龍丸。又名渾元丹。治腰半以下腿膝大痛者。赤

解圍元藪

卷二 總說

九

龍丸。即一粒金丹。治痛風遍身抽掣。日夜叫號者。千年藥。乃祖師逾過張真人遺下平分家產方。又曰靈寶千年大藥。治三十六種大風。十四般大癩。無所不効。東華玉髓。乃大風子油膏。治爛風瘡穢者。馮夷瓊漿。又名推雲酒。治五色疔瘡。雲顏麻木者。若對症用之。無不奏效。若亂投妄用。則不見功。必須脈藥相配。診視相參。對症施治。隨手獲功。執方膠固。彌奈何靈。

凡有一般症候。自有一般脈色辨診不同。古有形

診聲診色診脈診之條。欲觀其形貌而診驗吉凶。如頭為清明之府。若傾視則神將奪矣。背為胸臆之府。若胸曲肩垂。則氣將壞矣。腰為腎之府。若轉搖不能。則神將竭矣。骨為髓之府。若不能久立。行動振掉。則骨將敗矣。筋為血之帥。若彎曲不舒。則血將枯矣。此為望形之診也。欲聽其音聲而診驗吉凶。如語先輕後重。高厲有力。則外感有餘也。若語先重後輕。沉困無力。內傷不足也。此為聞聲之診也。欲觀其色而診吉凶。如青者欲如蒼壁。不欲

解圍元藪

卷二 總說

十

如藍。如翠羽者生。如草滋者死。黃者欲如羅裏雄黃。不欲如黃土。如蟹腹者生。如只實者死。赤者欲如綿裏硃砂。不欲如赭。如雞冠者生。如衄血者死。白者欲如鷺羽。不欲如鹽。如象牙者生。如枯骨者死。黑者欲如重漆。不欲如地蒼。如鳥羽者生。如煤莫者死。此為觀色之診也。脈經云。癩脈陽浮弦。關也。陰實大也。關下兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者易治。洪大而數。或沉實者難治。脈若沉者病反在上。浮者病反在下。皆不治。此為切脈至而診吉凶也。

故曰陰陽配偶方脈悉詳此理通徹則藥對症何憂治而不愈哉若執一死方以治諸症非惟無益反害于人

然導痰祛濕如蒼朮白朮南星半夏貝母皂莢茯苓阿膠厚朴玄明粉瓜蒌仁胡黃連青礬石銀柴胡之類

濕而肢脹痰結者非厚朴不消玄明粉止可為丸服不宜入湯液濕痰成塊者阿膠專主為末服之若水煎服則臭而無功皂莢打痰從大孔出甚速

解圍元藪

卷二 總說

二

銀柴胡治肺熱之神藥癘風聲濁痰臭者必用之止入丸散不入湯液若骨蒸寒熱者一見胡黃連即愈亦不入煎劑煎則無功矣

利氣清陽如沉香檀射腦乳沒木香縮砂豆寇益智遠志升麻犀角珍珠丹砂牛黃柴胡之類

氣閉則陽微氣結則血匿諸香皆能開導幽微僻之鬱通達關竅氣滯非提不起必須升麻柴胡之屬牛黃珠粉等件香劑能消氣聚之塊止宜丸散不入湯液者以火炒水煎則味愈苦令人嘔吐

噦皖况有諸香不宜見火之說

祛風散邪如羌活麻黃荆芥紫萍苦參風藤之類

病以風名皆由風濕寒暑之感若不發散邪氣何能消溶羌活之類皆不可缺苦參最殺風癘之蟲瘡癬皮內之蟲立死服之五臟蟻蟲立去方中必用之聖藥也

補血生液如當歸玄參紅花茜草根紫草血竭鹿茸夏枯草桑螵蛸原蚕蛾生地黃之類

玄參去五臟之游火耳血歸元紅花去死血生新

解圍元藪

卷二 總說

三

血為治風必用戴元禮云夏枯草為血虛所宜桑螵蛸之補陽填精比于人參有霄壤之功晚蚕蛾有再生精髓之捷血竭乃去積瘀血作痛之卒徒故多用之

蕩滌積滯如代赭皂莢雷丸蜂蜜人牙干金子人中黃之類

油膩脂膠之積礙腸胃非皂莢不去代赭石名血師專排血積凝善活血不使彎曲雷丸去積殺蟲止可用于男子婦人服之必脹悶腹痛發昏甚

則顛呆痰涎湧塞。故男子用雷丸。婦人用皂莢。劫殺蟻蟲。如錫灰、黃芽、雄黃、鶴虱、杲實、鷲翎灰之類。黃芽、糞中蛆也。于四月內未食茄子之前收者。方好。以濃茶滴養淘炙香。方無油泛。專祛蟲積。鷲翎灰。最殺風瘡中蝕蟲。若皮內癢疥蟲。非此不除。麻痺癱瘓。如菖蒲、天麻、草薺、防己、秦艽、蒼朮、胡麻、香蛇、漏蘆、石斛、蒼耳草、白疾藜之類。血枯必痛。血凝必麻。須用補血逐血之劑。故草薺之補陽。菖蒲之升陽。蒼朮草乃風病元氣虧乏之

解圍元藪

卷二 總說

三

聖藥。非止癱瘓者用之。筋攣肢軟。如苡仁、牛膝、杜仲、續斷、狗脊、萎蕤、白花蛇、仙靈脾之類。風注四肢。非萎蕤不能上下左右蒐逐。又能消燥。諸般毒物。陽痿筋攣。非仙靈脾不能興起。乃大補元陽之藥。實救本之妙藥也。愛食瓜果者。須倍射香。耽嗜麪孽者。必求枳椇。曾服汞粉。定用鉛磁。若進毒藥。急行和解。參芪之性。不及升柴。此特大畧博而約之。

治風之法。先散寒邪。次攻蟲毒。次調元氣。次養陰血。待風散蟲死。血足氣清之候。再拔瘡穢。舒其筋而伸其攣。滋生毛髮。則病愈不發。補益之藥。終身服之不可止。乃不刊之秘論也。若欲速不分次序。則隨得隨失。變駁反掌。非惟無益。必反害之。如升麻能使濁氣從右而上散。柴胡能令清氣從左而上達。參芪惟能助氣。而反附陽邪。以損陰血。風癩以養血清陽為要。故參芪不及升柴之提散。洞達經絡。開導肌表也。射香能消諸瓜果之毒。發渴者

解圍元藪

卷二 總說

古

乃瓜果之積。用之即消。枳椇即金鈎樹子。能祛酒毒。好酒之人宜服之。黑鉛、磁石、花椒。專收輕粉水銀之毒。恐庸醫暗投。故宜服之。以免發毒。此用藥之大畧也。近世專用大風子為良方。不知此藥性猛大熱。有燥痰劫血之迅力。製煉不精。則病未愈而先失明矣。大風子即海松子。又名丟子。因其專能治風。而名也。生於東海日出燥炎之地。故性大熱。能直入肌骨。殺蟲祛濕。夷人稱為丟子。當果食之。以治百病。

蓋海島之俗。食生物者。腹多蟻蟲之毒。服此以蕩滌之。如閩廣人食檳榔。以禦風瘴也。其肉上白膜。最能損目。其油最能敗血。如生食之。傷人臟腑。其性怕鹽。見鹽物即消之。無用。故服此者。必忌鹽醬。若得麻腐與之同服。則功愈。須專門用之。製度有法。則功勝於諸藥。若無傳授。而道聽妄用。非惟無功。反生他害。丹溪云。大風子有燥熱之毒。能敗血動痰。損人之目。信不誣矣。且據富翁陳善長。患風年久。求予先君治之。先君思善長耽於酒色。日

解圍元藪

卷二 總說

三

不間斷。必難治。固辭不藥。善長密賄予家老奴。盜傳製大風子之法。善長依法製度三年。共食大風子肉七十餘斤。其病脫去。絕無他患。一日持禮幣。至于家。請先君曰。昔年求治。力辭何也。先君甚赧。顏厚謝老奴而去。始知盜方之弊。想風病損目。難歸咎於大風子。蓋世之不食大風子而瞽者甚多。後人不可泥於紙上之語。

始以湯藥宣暢。次以膏酒灌融。丸散調護。王道之常。風癩之藥。煎劑奇方。最能速效。逐散風邪。通暢脈

絡無留毒之患。第恐蕩敗脾胃。故不宜久服。一見病勢稍緩。即進丸散。以厚脾胃。其毒甚苦。參耆耳。八寶歸木丁公藤等膏。提於却病補養。但恐傳授無脩煉之法。其藥酒雖人喜服。切不可施於初病之時。且風疾初起。病尚點滴。塊瘰。未曾散漫。若即用藥酒。迫排氣血。領毒遍透脈絡。則遍身皆病。難治矣。須待病愈之後。防其再發。宜服藥酒。使藥力鑽透肢體。把截毫竅。基固神堅。邪毒不能再犯也。其腦射牛黃金石香料。不入湯液。又忌見火。惟和

解圍元藪

卷二 總說

六

丸散服之。功力合宜。而順故治風者。先須湯液。次用丸膏。愈後方進藥酒。為治法之序。世有妄徒。盜習火劫蒸燒之術。愚人爭赴。戕害深可痛也。夫風病根於臟腑。既發於外。其勢已滅。何又煨逼。使毒氣復入。假火為禍。暫雖少爽。禍不旋踵。風癩之病。穢積蟲毒。先傷臟腑。延注筋骨。譬如寇入。驅出即禍。滅迫之為上。何故又加蒸熨劫之。復令毒氣回伏。膚腠潛入肌脈。假火鬱之勢。流毒既開之孔竅。仍傷臟腑耶。且人身毫髮孔竅。一見火

氣百孔皆開何氣不入。舊邪未息新邪又入。初則毒氣禦火暫離肌表。必然皮毛顏色頓改。骨節痠折。疑是愈而爽快。愚人喜以為美。非吉兆也。乃新舊邪毒入鑽之故。為加病之漸耳。夫病人血氣已弱。再犯火毒。則氣愈敗。血更衰。津枯骨燥。若至七七日外。火熾濕熱之氣。在內尋注經絡。充竈臟腑。必使皮肉堅硬而痠痛。瘦弱無力。精乏目暗。肢軟足蹇。步澁。再不避風寒。戒酒色。必至腐爛失明矣。宜速解救。以免大害。且風蟲因內熱而生。復得火

解圍元藪

卷二 總說

七

濕愈加滋蔓。仍傷髓液。至一百二十日後。其火鬱濕熱之氣。流遍周身。病勢反凶於舊。急宜用解藥。掃拔禍根。多有氣血衰弱者。隨蒸而斃。人猶不畏。何哉。若未曾服藥。便用蒸熨。則驅毒氣深入骨髓。滑蕩血液。若已服藥。既攻毒氣欲散。烏可復邀醫。聚初治行之。使毒氣勝于正氣。禍不旋踵。後治行之。使毒氣入於新元。禍仍僭亂。急則急危。緩則緩害。戒之戒之。故丹溪云。必先殺其蟲。瀉其火。然後生益涼血。祛風遏滯。降陽升陰。雖治法頗多。大都

不外乎此。夫丹溪尚如此。後人何可用蒸熨之劫。而害理殃人乎。

點刺鋒鏃。慘楚何益。針灸薰洗。緩泄還宜。

凡風癘所起之處。每難全愈。欲其全愈。必追毒併歸於此。然後以藥點之。使爛。而方迹熄。根滅也。若病未愈。不可周身塗點。其點藥之性。熱過於火。毒過於鳩。若點遍身。則熱毒圍攻。焉能當之。又每有妄徒。以針刺破皮內。用醋墨塗之。使爛。妄言攔阻病勢。不知病根鑄於腸胃。年深發見於肌表。先從

解圍元藪

卷二 總說

六

髓液透出。豈可於皮外刺爛。而能阻之乎。空受痛苦。而結痂痕。疔瘡。使形醜貌陋。其病反加。未見毫釐效驗。其或濕痒。痲腫。塊皮肉脹大。血死清實者。可以鋒鏃敗泄。如紫雲白癩。血癖等症。可以小艾炷團團灸之。使艾火引毒漸泄。雖疼痛一時。亦能提散毒氣。若乾風痺燥之症。氣血尚且不足。烏可又行鋒刺。愈加耗竭。肌膚之間。全憑血液轉使筋枯力乏。手足不能運用。其皮膚痲痺者。乃血液虧損之故。內頻服藥。外頻薰洗。內外應合。引其經

絡之間新血充足氣脈漸漸榮活而愈矣切不可驟用點刺鋒鏃暴虐慘酷割害膚體况風癩非一時可愈者總不如令其服藥緩緩奏功為上且風癩之人氣血必衰治風癩之藥無非克伐迅劑治之將半即宜用補劑扶其根本不可伐盡氣血致津液乾枯形神憔悴而損遐齡用藥尚然豈可妄下針鏃霸道之毒手以速其死乎

癩症一十四種六府所屬

大風症名考究諸書悉無遺失病源云風癩一症

解圍元藪

卷二 附癩症十四種

九

輕重之別耳其害則一也癩愈形猶可復風愈元氣難全癩死者少風死者多大都皆非善症輟跡一類

曰火曰蟋蟀心之癩也

火癩

此症初起如火灼之瘡大小不一或如癰皮裂斷肢趾愈又復發由心臟受毒七年病根方盛眉睫落大勢成手足痿又有一種遍身點滴紅紫生於皮膚之上形似癩痕之狀不過十數日漸自散去或五六日

亦自散後結心毒生瘡不能速愈亦能傳注於人

蟋蟀癩

此症乃火癩之後餘毒內結變成形如蟋蟀蟲紋內泛鑽鬪百節諸竅皆欲出血額爛鼻朽口唇毀斷齒牙脫落癰癩難動或時驚跳戰兢多懼或眼赤爛泪疼乃心火燄烈也

曰木曰風肝之癩也

木癩

此症初起如蟲癬之狀大小不一其色赤白不一或

解圍元藪

卷二

心火癩蟋蟀肝木癩

十

連錢高低不定俗稱棉花瘡久則連片腐爛腥穢眉睫落面目痒愈而又作或去或來無時定息三年始成大害肝敗難治又有一種如棉花之核其粒高起硬痞者火變成蝕癬不愈

風癩

此症乃木癩之後毒蓄肝經則四肢骨節筋骸掣痛甚者叫喚不能轉側皮毛枯槁肘膝大小狀如鶴膝白虎風腐穢癰癩聲變形異或結於脇肋腹肚上爛至腸胃或爛去耳瞞皆癩之毒也

曰土曰蛇脾之癩也。

土癩

此症初生塊癩。先發潮熱。或嘔吐。或黃腫。大如雞卵。小如彈丸。或如麻豆。穿即成瘡。膿滋腥穢。由脾受賊邪。灸燻毒味。禽獸魚鱗。久而成之。急治則可。若至六年。病成禍速。人聞其氣息。即染成病。遺害甚大。

蚶癩

此症乃土癩之毒。潛注脾臟。流於四肢。則垂重難舉。手足肘膝腐爛。膿血臭穢。或指趾毀落。腫大如車軸。

解圍元藪

卷二 肝風癩脾 土癩 三

癩痺注爛。直見筋骨。痛憊而死。或發於胸臆肋背。先腫如痞。後又穿爛。日久叫號刺痛而死。

曰金曰麵曰白肺之癩也。

金癩

此症初發如楊梅之狀。上無蓋殼。內泛碎突出。紫赤色。爛花凸起。儼若楊梅。由毒入肺經。不久眉睫翳落。三年鼻柱崩倒。眼翻唇斷。此乃天付之咎。陰空神祟之禍。定有遺毒。久治方可挽回。夫意不比他種。可以速愈。

麩癩

此症乃金癩既愈。餘毒難消。毒存肺臟。致生如麩細蟲。舉體艾白斑駁。周身或如痺癢。儼如泥壁風狀。惟外加熏洗。則能取效。

白癩

此症乃寒暑濕熱之氣。邪毒醱襲。瀰漫肺竅。積生惡蟲。蠹嚙肺管。使聲破目暗。肢體頑痺。骨節中如火燃。心胃燥熱。手足背脊拘緊。肉如剗劈。以致身體手足癢癢。鼻生息肉。氣塞不通。濁涕流涎。山根高腫。腦門

解圍元藪

卷二 蚶癩肺金麩白癩 三

時痛。或目生白翳無光。多為鼻癩。外不發瘡。人皆不識此癩。故治之無效。

曰水曰雨曰烏腎之癩也。

水癩

此症必先得水病。因而停留。又為風濕觸激。或生陰莖疔蝕。或陰囊兩傍發起腫塊。長絆腿腰。形似橫痃。寒熱交作。脹痛難舉。上下漸大。如潰。即變成瘡。遍身腐爛。一年眉髮落。病劇難治。

雨癩

一第 冊 續修四庫全書 第 10 反 亥 內

此症乃水癩愈後。餘毒在腎。以致生蟲。其毒泛注。周身生五色斑點。垂癩眉鬚。脫落陰莖。痿爛。或陰囊破損。或陰莖蛀幹。皮肉流膿。漸漸爛去。輕則為下疳魚腮等瘡。久則唇鼻耳疔皆爛。毀腐腥臭。與廣症同。

烏癩

此症乃邪毒入腎。變生惡蟲。食嚙精髓。下虛無救。若胃脇肋腿臀股間。生如李奈桃梅狀。顆塊軟泡。穿爛腐臭難治。或如漏瘡。或癰癤赤黑。手足頑痺。針刺不知。或脚不能踏地。或飲食時則開口而鳴。或兩肘如

解圍元藪

卷二

腎水兩烏癩

三

繩縛。或穿處則腐爛流膿。粘着即生腐瘡。或皮肉淫癢。怕見風濕。或平時骨間浙浙瘦响。皆當大補氣血為主。

曰酒曰麻。胃之癩也。

酒癩

此症因酒色之時。汗出體虛。迎風入于胃腑。遍身生瘡。大者如錢。小者如豆。不赤不白。灰黃變形。膿膩粘堆。或有不飲酒之人。素受寒濕風邪。微見酒氣。汗出迎風亦然。或有好罔性急燥暴色慾過度之人。多犯

此症久則眉髮脫落。令人惶懼難治。

麻癩

此症由酒癩之後。毒留胃腑。遍生毒瘡。如癬疥。淫癢難忍。或手足掌背頑痺不仁。黑白不等。形如雁來鵝掌風之狀。或如牛皮血癬。時痛時麻。蟲蝕脾胃。或發肉疔。頭硬而碎。形如蟻木。遍身皆然。人呼散頭木觸之則大痛。冷汗一二時而息。

癩症總論

夫治癩之方。與風少異。尤散點擦。各有秘傳。切忌熏

解圍元藪

卷二

胃酒麻癩

三

錄輕粉

凡患風癩。決非一種。或二三種者有之。甚至有四五種者。先傷一臟。則注各經。故年久者。形色變駁。病勢愈甚。且如風病先染冷麻。而變紫雲黑色者。有之。先染痛風。而成半肢軟癱者。有之。先染火癩。腫大穿爛。手足廢弛。筋骨痛癢者。有之。故治難以一定。方藥不能驟攻。愈一症而他症變駁。反見其勢凶也。又有風癩同患一人者。若先染風病。後患癩症。曰風癩。先患癩病。致成風病者。曰癩風。此等

最多癩風則先治其癩。癩愈方治其風。風癩則用治風之藥。後加治癩之劑。此是大意。治至半愈。即服解毒大補氣血元陽之劑。勇進三年方可。經云。逐五臟之邪。鬼開門方死。瀉膀胱之濁穢。淨府始潔。倒陽絕慾。勉強矯揉。內養靜脩。仙機妙運。魂魄屍神之竅。日鬼門掃蕩臟腑之穢惡。則清氣得以升降運育。自然形容潤澤。若穢濁之滓沉滯下元。則九竅不清。十四經晦塞。祛滌其穢。則源清流遠。陽氣舒暢。而精神爽快。上下清明矣。故制烏

解圍元數

卷三 癩症總論

三

龍丸之劑。一進以靖內汗之濁。風癩之人。五火俱盛。陽事易舉。若不愛命而近女色。則服藥斷無功效。欲其不舉。不得已以藥倒之。病雖可愈。又恐斷人生育之根。陰陽相關。若已有子者。則全其現在之命。絕其喪命之端。未為不可。若未有子嗣。則宗祀為大切。不可行之。然倒陽之秘。有用藥者。有用功者。妙在心傳。此理非庸人可知。若病人聰達。授以元門內事。靜脩導引之功。使內固丹基。外安神役。再進藥力併攻。則其壽無疆。此方得英敏之士

方可行之。若愚妄利徒。非惟不能盡術。反使冒瀆聖賢。再針灸之法。前後無忌。點藥止。可用於愈後除根。墨刺之端。始終不可用。若鋒鏃一有不當。則刀口引風入內。令人殘廢枯敗。戒之戒之。吁。醫司民命。藥有良毒。不讀方書。情然無據。死生關係。陰陽非輕。患風癩者。當保惜天賦。毋從愛憎毀譽之口。自宜揀擇醫之良拙。治風癩者。當敬畏天譴。毋貪欺詐。苟且之財。害人之命。人患風癩。命懸旦夕。求醫調治。死生攸關。務得高

解圍元數

卷三 癩症總論

三

明仁厚之人。方可倚托。往往見人不擇醫工之精粗。但見其自逞矜誇。不讀方書。盜襲死方。欺罔奸狡。惟貪輕信。或倩人薦拔。粧點巧譽之言。即從而治之。豈不殺人不乎。且風癩之科。一症有一方。其人止學得一二方。豈能悉治諸症。如紫雲之藥。不能治爛風。痛風之藥。不能治癩。麻漏蹄之方。若治癩。則反為害。庸俗何知之。病者既欲延生。而求醫若不揀選。實輕命也。痛哉惜哉。夫癩風乃十三科之首。此論亦十三科中妙訣。反覆精詳。不為不備。

後之君子得之則瞭然無所窒碍矣。夫城池受困於寇。即如人身受毒於風癩。形質一也。以兵攻賊。如以藥攻病。籌猷一也。寇不退。則城池崩陷。風不消。則元命傷殘。患害一也。欲救城池。必運神機。欲救人命。必行妙術。妙用一也。所論風癩之理。皆明此書所治風癩之藥。皆備此書。更無遺隙矣。用藥如用兵。保釐如救命。療人之病。如復元命。解城之圍。以活蒼生。輕重之殊。實元命之妙法。深淵之大澤也。故曰解圍元藪云。

解圍元藪

卷二 癩症總論

三

解圍元藪二卷終

解圍元藪卷三

同文方藥目次上

東亞圖書印

大藥煎方一

心風丸方二

肝風煎方三

肝風丸方四

脾風煎方五

脾風丸方六

肺風煎方七

肺風丸方八

腎風煎方九

腎風丸方十

胃風煎方十一

胃風丸方十二

通經利竅湯 十三。共十方

白玉蟾遺方 十四

解圍元藪

卷三 方藥目次

一

白玉蟾丸方 十五

白玉蟾末藥方 十六

白玉蟾浴湯方 十七

白玉蟾蒸法 十八

白玉蟾擦藥方 十九

大瓢李遺丸方 二十

大瓢李末藥方 二十一

人參固本丸 二十二

煎方 二十三

孫思邈真人煎方 二十四

孫思邈真人丸方 二十五

遺瀝張真人靈寶手年大藥 云云又真分家產方

神效奪命還真丹 二十七

東華玉髓 二十八

神效追風丸 二十九

搜風四七丹 三十

神效換骨丹 三十一

六消風散 三十二

救苦回生丹	三三	班龍八帥丹	三四
奇效良丹	三五	一粒金丹	三六。又名赤龍
搜風順氣丸	三七	保真丸	三八
二八濟陽丹	三九	六神輔聖丸	四十
四魔丹	四一	火龍散	四二
棗靈丹	四三	小棗丹	四四
守中丸	四五	祖傳玉樞丹	四六
煎藥方	四七	補舊湯	四八。又名救苦湯
神釀丸	四九	神守散	五十
解圍元藪 卷三 方藥目次 二			
雄漆丸	五一	參翎丸	五二
吳氏苦參丸	五三	調榮丸	五四
大定風丸	五五	駐車丸	五六
如意通聖散	五七。又名麻黃赤芍湯	八將驅邪散	五八。又名八將追魂丹又名三厘散
退藥	五九	補藥	六十
陽起聖靈丹	六一	鉄魔丹	六二
保命丹	六三	搜風無價丸	六四
八仙丹	六五	射老丸	六六
利藥方	六七	小還丹	六八

六和定風散	六九	饒轡丹	七十
長春丸	七一	固命丹	七二。又名飛步丹
五子芥風丸	七三	順氣散	七四
二九還元丹	七五	二聖散	七六
戒止丸	七七	參靈丸	七八
烏龍丸	七九	洞虛丹	八十
清平丸	八一	蒂菴丸	八二
胡麻丸	八三	獨聖散	八四
跨鶴丹	八五	靈芽蕊珠	八六
解圍元藪 卷三 方藥目次 三			
雄漆丸	八七	蓬萊棗	八八
聖散子	八九	花龍丸	九十。又名濕元丹
白龍丸	九一。又名捕龍丹	香身丸	九二
大衍丸	九三	仙花膏	九四
水製黃香丸	九五。又名黃龍丸	治鷺掌風雁來風方	九六。共五方
白癩風方	九七	三分散	九八
四物湯	九九	人參敗毒散	一百
補中益氣	百零一	方藥目次下	

參朮遇仙丹	百零二	子和方	百零三
第一神效散	百零四	第二清氣散	百零五
第三大皂丸	百零六	第四消風散	百零七
第五順氣丸	百零八	大風丸	百零九
大麻三方	百一十	發表攻裏散	百一十一
丸方	百一十二	奪命丹	百一十三
丸方	百一十四	擦方	百一十五
洗方	百一十六	遠年大風煎方	百一十七
丸方	百一十八	洗方	百一十九
解圍元藪 卷三方藥目次 四			
萊藥西江月	百二十	草方	百廿一
既濟丹	百廿二	除根方	百廿三
甦骨丹	百廿四	擦方	百廿五
藥酒方	百廿六	黃白丹	百廿七
漱風散	百廿八	養龍湯	百廿九
脫胎丹	百三十	苦參丸	百三一
定風酒	百三二	碧霞漿	百三三
無憂酒	百三四	甘醴	百三五
神仙酒	百三六	烏茶酒	百三七

推雲酒	百三八	浴藥方	百三九
治冷痛麻風	百四十	苦參膏	百四一
仙黃花膏	百四二	希發膏	百四三
鉛汞膏	百四四	百花膏	百四五
烏飯膏	百四六	太乙神漿	百四七
四聖膏	百四八	五灰膏	百四九
黑雲膏	百五十	通天膏	百五一
九子油膏	百五二	長肉膏	百五三
坎離膏	百五四	三白膏	百五五
解圍元藪 卷三方藥目次 五			
小春膏	百五六	青白膏	百五七
二聖膏	百五八	雁來風	百五九
佛手膏	百六十	千槌膏	百六一
呼膿膏	百六二	水成膏	百六三
升平散	百六四	雲翎散	百六五
雨霖丹	百六六	雷公散	百六七
牙霜丸	百六八	紅玉散	百六九
珠雲散	百七十	輕哈散	百七一
半夜散	百七十二	四魔粉	百七三

香兒粉	百七四	香珠散	百七五
四聖散	百七六	香蒲丸	百七七
擦方	百七八	生眉方	百七九
治口眼喎邪神效方	百八	附雄散	百八一
掃雲丹	百八二	白雄散	百八三
紅玉散	百八四	消斑散	百八五
飛白散	百八六	消毒丹	百八七。又名太白散
舒寧湯	百八八	虎跑泉	百八九
蘭湯	百九十	烏龍湯	百九一
解圍元藪 卷三 方藥目次 六			
仙授方	百九二	五草六木湯	百九三
濕風痛風方	百九四	三宣湯	百九五
八葉湯	百九六	倒陽方	百九七。又名石垂散
蚺蛇油	百九八	敗猪血散	百九九
生瓜散	二百。又名敗花散	蒸法	二百零一
熨法	二百零二	洗薰法	二百零三
治癩瘡法	二百零四	擦方	二百零五
煎方	二百零六	雙根沙皮飲	二百零七
丸方	二百零八	煎方	二百零九

七聖散	二百十	白通湯	二百十一
荆神飲	二百十二	火珠漿	二百十三
黃龍髓	二百十四	杞頭湯	二百十五
香白飲	二百十六	八仙湯	二百十七
三川神應湯	二百十八	三分散	二百十九
黃白大丹	二百二十	坎離丹	二百二十一
聚靈丹	二百二十二	三母五子丹	二百二十三
定痛飲	二百二十四	七神湯	二百二十五
歲桃漿	二百二十六	胡麻飯	二百二十七
解圍元藪 卷三 方藥目次 七			
蟬凡丸	二百二十八	糖岸散	二百二十九
天塵丹	二百三十	保真飲	二百三十一
虛鳴湯	二百三十二	乳酥湯	二百三十三
胡麻飲	二百三十四	肉核油	二百三十五
治結毒方	二百三十六	又方	二百三十七
雷公散	二百三十八。即再造散	醉仙散	二百三十九
神仙紫花丸	二百四十	芥硫丸	二百四十一
奪命丹	二百四十二。又名九龍丹	活血丹	二百四十三
羌活愈風湯	二百四十四	防風通聖散	二百四十五

加減通聖散 二百四六
 烏龍順氣散 二百四七
 五積散 二百四八
 小續命湯 二百四九

解圍元藪

卷三

方藥目次

八

解圍元藪卷三

明沈之問先生輯 錫山黃 鐘樂亭氏校訂

六經湯丸秘方

心風 先傳肺經外證損目

煎方一

防風 細辛 南星 白茯苓 薄荷 大茴香

桔梗 山梔 各二兩 當歸 首烏 羌活 牛膝

牙皂 蟬殼 枳實 玄參 川芎 附子 各一兩

加姜棗水煎服十劑如有痰再加薄荷一兩 右

解圍元藪

卷三

六經湯丸心

一

藥分兩均作十劑

丸方二

羌活 防風 黃連 柴胡 獨活 全蝎 去頭足用土炒

白芷 各一兩 當歸 谷精 地骨皮 各二兩 白茯苓

芍藥 熟地 茯神 遠志 各一兩 乳香 沒藥

檀香 各六錢 細辛 七錢 姜蚕 八錢 射香 三錢 甘菊 三兩

丟子肉 半斤 風藤 二兩

右爲末蜜丸或黃米飯丸如桐子大飛硃砂爲衣

每服三錢用煎藥送下日服三次

肝風 先傳脾經外證發紫胞

煎方三

防風 半斤 玄參 當歸 牛膝 柴胡 芍藥

蟬殼 兩 各一 胡麻 草烏 兩 各四 白芷 官桂 各一兩 五錢

有痰加乾葛二兩 右藥均作十劑服

丸方四

防風 荆芥 葛根 手子 四兩 胡麻 當歸

草烏 玄參 麻黃 附子 兩 各一 蒺藜 乾姜

皂角 桔梗 牛膝 川芎 羌活 甘草 各二兩

解圍元藪 卷三 六經湯九心肝 二

全蝎 一兩 苦參 五兩 右為末蜜丸桐子大青黛為衣

脾風 先傳腎經外證遍身頑癬或時刺痛

煎方五

防風 當歸 風藤 兩 各三 玄參 川芎 甘草節

枳實 陳皮 白芷 桔梗 枳殼 烏藥 各一兩 五錢

木香 一兩 有痰加半夏一兩五錢均作十服

丸方六

玄參 枳實 當歸 陳皮 白芷 胡麻 乾姜

厚朴 滑石 兩 各二 防風 半斤 川芎 甘草 姜蚕

芍藥 麻黃 草烏 蟬殼 羌活 全蝎 木香

各一 右為末蜜丸用鬱金黃柏末為衣

肺風 先傳肝經外證眉鬚髮焦髡

煎方七

玄參 川芎 知母 滑石 半夏 蒺藜 牙皂

黃芩 牛膝 胡麻 羌活 乾姜 桔梗 木香

當歸 兩 各二 有痰加防風三兩右均作十帖

丸方八

當歸 牛膝 防風 蟬殼 獨活 羌活 各四兩

解圍元藪 卷三 六經湯九脾肺 三

胡麻 石膏 首烏 兩 各三 荆芥 兩 姜蚕 全蝎

南星 白芷 兩 各二 玄參 五兩

右為末蜜丸滑石半夏末為衣

腎風 先傳心經外證脚底穿爛

煎方九

甘草 麻黃 防風 羌活 薄荷 茯苓 桔梗

各一 川芎 當歸 厚朴 半夏 知母 黃柏 各二兩

獨活 大黃 苦參 兩 各四 滑石 五兩 有痰加石膏

三兩均作十貼服

九方十

桔梗 川芎 白朮 丟子各四兩 當歸 甘草

厚朴 木香 乾葛各一兩 牛膝半斤 人參 乾姜

白芷 全蝎 麻黃各二兩 天麻一兩 白花蛇五錢

右為末蜜丸用百草霜為衣

胃風 遍傳五臟外證渾身潰爛

煎方十一

羌活 澤蘭 藿香各二兩 蒺藜 柴胡 防風

細辛 白芷 薄荷各三兩 荆芥四兩 獨活 木瓜

解圍元藪 卷三 六經湯九腎胃 四

牛膝 連翹 黃芩 生地 山查各二兩 菖蒲

枳實 陳皮各一兩 麻黃五錢 有痰加貝母石膏各

一兩均十劑

九方十二

荆芥二兩 蒺藜 天麻 白芨各一兩 獨活 柴胡

羌活 木瓜各三兩 風藤 皂莢 厚朴 前胡

貝母 蒼耳子 金銀花各一兩 射香二錢 乳香

檀香各三錢 紫背浮萍四兩

右為末蜜丸甘草大黃末為衣

通經利竅湯 此藥三十貼按日服之但風瀉

初服藥起須以此開經絡

第一日十三

大黃 荆芥 桔梗 歸尾 黃芩各一錢 羌活

防風 連翹各一分 防已 白芷各八分 牛膝七分

甘草五分

第二日

大黃 羌活 防風 桔梗各一錢 白芷 防已

歸尾 獨活 荆芥 牛膝各八分 甘草五分

解圍元藪 卷三 通經利竅湯 五

第三四日

羌活 桔梗 防風 黃芩各一錢 白芷 荆芥

防已 獨活 牛膝 歸尾各八分 甘草五分 腹中有積

作痛加製大黃一錢心痛大腸不利則用生大黃一錢

第五六七八日

羌活 獨活 防風 荆芥各一錢 歸尾 芍藥

防已 連翹 黃芩各八分 甘草五分 如腹痛大便不

利加大黃一錢

第九日

大黃 荆芥 羌活 獨活 防風 川芎各一錢

當歸 牛膝 黃芩 白芷 桔梗各八分 甘草

十日至十八日同惟大黃用二錢

十九日

大黃 黃柏 連翹 羌活 苦參 荆芥 黃芩

各一錢 黃連 防風 防已 甘草 當歸各八分 第二

十日如有白蟲從大便出藥與十九日同如無再加白丑末虛弱者不加

二十一 二日

解圍元藪 卷三 通經利竅湯 六

黃柏炒 大黃蒸 苦參 羌活各一錢 連翹 防風

黃芩 牛膝 防已 獨活各八分 甘草五分 黃連一分

二十三 四日

芍藥 羌活 黃芩 荆芥 牛膝 白芷 大黃

連翹各一錢 獨活 當歸 防已 桔梗各八分 甘草五分

二十五日

苦參 連翹 獨活 當歸 防已 桔梗 牛膝

芍藥各八分 防風 大黃各一錢 黃連七分 首烏一錢

川芎 甘草各五分

二十六 七日同上

二十八日

首烏 芍藥 羌活 荆芥 防已各一錢 川芎

當歸 桔梗 牛膝 白芷 苦參 防風各八分

甘草五分

二十九 三十日同服此倘痕色不退再服此方

三四劑 右藥三十貼俱水煎早晚服温酒過

口如腸澀加大黃一錢

白玉蟾遺方治痺麻諸風癱瘓爛癩腫危併

解圍元藪 卷三 通經利竅 白玉蟾

大麻 雞爪 彈曳 螻蛄 冷麻等症

防風 黃連 黃柏 苦參 牛膝 草烏 麻黃

紫風藤 荆芥穗 蔓荊子 升麻 川芎 大黃

當歸 藁本 山梔 右水煎服大劑十服內竅俱

通其外油光紫黑疙瘡皆退隨服丸方

白玉蟾丸方十五

川胡麻 川牛膝 木瓜 山梔 黃柏 蒼朮

明天麻 白蒺藜各五兩 五加皮 風藤 羌活

苦參 當歸各十兩 水銀 水菴 硃 車米麩包

射香三錢香蛇兩代石醋煨新鮮丟子肉四十兩此即大風子肉

先將大風子肉用水二十碗煮至二三碗濾干入

臼搗爛以硃汞赭米四味共研不見星收磁器內

用香燭花果供于八仙元壇神前忌婦女雞犬觸

汚再將各藥末稱准以煮大風子汁加陳米糊丸

如桐子大於卯午酉時各服三錢酒送下病輕者

只服二錢或一錢五分至四五日反覺病凶口內

齒根麻木精神恍惚過後漸痊面色紅活再不沉

重惟要戒守則永不發

解圍元藪 卷三 白玉蟾丸 八

白玉蟾末藥方十六治癰瘕軟痿冷麻困痺大

有奇功

草烏 白朮 硃砂 細辛 雄黃 白芷 防風

蒼朮各五兩麻黃半斤川烏一個右為末每服一錢用葱

白頭七枚陳酒一碗煎滾送下重者用二錢先以

藥湯洗再進此藥臨臥服取汗避風

白玉蟾浴湯方十七將各藥燒湯洗滌如爛者

日洗一二次

蒼耳子 防風 荆芥 馬鞭子艸 紫蘇 苦參

金銀花 白芷 遍地香 澤蘭

白玉蟾蒸法十八

先以湯藥洗滌再用蒼朮一觔煎酒五六碗將地鋪

稻柴再用藥薦鋪四五十斗米醋十餘杓拌勻蒸熟

鋪在薦上用蓆蓋糠令人睡之上以棉被蓋之待出

臭汗毒氣已盡漸去衣被須于無風處蒸之

白玉蟾擦藥方十九

白芷 草烏 南星 半夏 丟子 杏仁 白芨

白薇 蛇床各等分右為末手足及遍身有瘡塊成

解圍元藪 卷三 白玉蟾末洗蒸擦方 九

瘡或冷麻者以生姜蘸藥擦之待皮活病退方止

當先用洗法次服末藥次又行汗法隨時擦之隔

三日再洗再汗再擦一連五六次如病不減不得

已方行蒸法劫之但丸方要服數年

大瓢李遺丸方二十治鼓蛙蛇皮刺風痒風雞

爪疙癢歷節等風併麻木冷痛手足屈折痛

痒不知痿癱癩腐爛危篤等症

琥珀五錢天麻一錢真珠 冰片 硃砂 胆星

血竭 姜蚕各二錢蟬退 細辛各四錢川芎 羌活

防風各六錢 遠志五錢 茯神八錢 犀角三錢五分 菖蒲六錢五分

錫粉三錢 雄黃六分 牛黃各四錢 蛇寒石四錢 射香六分

白附子五分 半夏四分 射香四分 蘆薈四分 烏梢蛇各五分

牙皂一兩 壬子霜半斤 青礞石四兩

右為末酒糊丸桐子大每服一百丸空心酒送下

如覺恍惚困倦麻木委厥者以葦簽蒼耳金銀藤煉膏服之

大瓢李末藥方二十一 治男婦癘風癱瘓口眼歪

邪面如蟲行身痛如切或皮肉淫癢難忍久

解圍元藪 卷三 大瓢李末藥方 十一

而手足反張

當歸 防風 川芎 白芷 細辛 麻黃 荆芥

全蝎 天麻 藁本 雄黃 羌活 甘草各五錢

硃砂 人參 白花蛇 大茴香 兩頭尖各三錢

香蛇七錢 川烏 草烏 蒼朮各四兩

右為末每服五六分漸至一錢臨臥以無灰酒調

服忌一切熱物或有汗麻木身癢乃藥力至也服

此後用鳳仙花梗煎湯洗浴汗出為度

人參固本丸二十二 治手足癱痛晝靜夜劇歷節

大風腰腿痛口眼喎邪

白朮四兩 沒藥 沉香各五錢 天麻 青皮 人參

白芷各一兩 蒼耳子二兩 烏藥三兩 紫蘇一兩 甘草五錢

右為末酒糊丸桐子大每服百丸用後方煎藥送下

煎方二十三

白朮 桂心 防風 人參 柴胡 甘草 川烏

當歸 防己 芍藥 赤茯苓 姜棗煎服

孫思邈真人煎方二十四 治核桃紫雲等風

解圍元藪 卷三 人參固本丸煎方 十二

防風 苦參 薄荷 芍藥 黃芩 連翹 山梔

知母 柴胡 大黃 麻黃 天麻 半夏 花粉

甘草 紫蘇 香附 白芷 當歸 羌活 加細

茶一撮煎服五六貼退斑十服效臨臥服忌見風

孫思邈真人丸方二十五

牙皂 苦參 蒺藜 防風 當歸 荆芥穗

蔓荊子 牛蒡子 胡麻各一兩 黃柏三兩 白花蛇

壬子霜各四兩 射香二錢

右為末黃米飯丸桐子大硃砂為衣每服四十丸

人參固本丸二十二

日服三次清茶送下忌食鹽物止食淡鴨妙

遺選張真人靈寶千年大藥二十六治三十六種

大風後人稱平分家產方

羌活 蒼朮 烏藥 風藤 防己 白芷 防風

大黃 五加皮 獨活 藜本 桔梗 草烏

柴胡 黃芩 明天麻 細辛 甘松 蔓荊子

白蒺藜 川續斷 芍藥 南星 大腹皮

皂角刺 薄荷各三兩 槐角 荊芥 升麻各五兩

紫萍 鬧羊花各二斤 麻黃 十斤 天雄 一箇 當歸 半斤

解圍元藪 卷三 孫思邈方張遺選方

苦參皮 二斤 紅花 玄參各六兩 仙靈脾 葶藶各三兩

草烏頭 四兩 用陰陽水各一桶春浸五日夏三秋

七冬九煎去渣煉成膏

人參 白朮 沉香 川芎 木香 乳香 牛膝

紅花 磁石醋服七次 沒藥 香蛇 血竭 松脂

姜蚕 檀香 安息香 雲母粉 柝香 鷲管石

菴蓉 各一兩 茯苓 雄黃 砂仁 青礞石 萎蕤

胡麻 各二兩 蟾酥 射香各五錢 冰片 二錢 花蛇 一條

人牙 炙黃香 五兩

右為末以前膏和丸彈子大硃砂為衣金箔包裏
遠年病服十九近年病五七丸用麻姑酒磨服汗
出則病愈 方中若加桑螵蛸原蚕蛾末各一兩
五錢尤妙

神效奪命還真丹二十七治三十六種風如癘麻

彈曳大麻啞風癘風立效

全蝎 姜蚕 黃芩 陳皮 熟地 肉桂 生地

蔓荊子 地骨皮 黃連 甘菊 防風 茴香

芍藥 知母 枳殼 柴胡 甘草 石膏 當歸

解圍元藪 卷三 神效奪命還真丹

半夏各一兩 明天麻 木香 川芎 藜本 兔絲子

白朮 人參 獨活各一兩 羌活三兩 桔梗 麻黃

薄荷各二兩 細辛 五錢 蛤蚧 一對 茯苓 二兩

右為末蜜丸彈子大金箔為衣每服一丸細嚼

中風癱瘓大風癘病茶酒下 遍身筋骨痛及心

氣痛不省人事熱醋湯下 頭風暗風茶下 驚

癩口吐涎温酒下 婦人胎前產後經水不調香

附湯下 冷風寒濕氣頓抽掣走注叫號日夜不

安黑豆炒焦烹酒下 又有一方加射香牛黃水

片更妙

東華玉髓 二十八 尹蓬頭真人傳以壬子油為君

壬子生東夷島故以此名

大風子依法取油四兩沒藥 滴乳 血竭各二錢 牛黃一分

射香五分阿膠一錢琥珀 珍珠各三錢雄黃五錢

地龍火炙去冰片三錢芒硝八分

右研末隔湯化油藥攪勻每服一錢內熱者柿餅

湯下內寒者花椒湯下平常者溫酒下其大風紫

黑委痺癱瘓屈伸邪臭爛危篤者不過一料全

解圍元數

卷三 東華玉髓

十四

愈須絕慾戒性避風忌一切腥鮮鹽物五辛諸毒

只宜食淡方能見效 紫雲風去牛黃芒硝加血

竭一錢乳沒各四分 雲顏成形不退腫起以艾

作小炷四圍團團炙每炙五七團泄其氣即愈

蛇皮風魚鱗風加白花蛇末一錢冰片二分有細

瘡垂癩同治 漏蹄白癩風加牛黃三分 真加

水飛雄黃末三分五厘 冷麻風加羌獨活歸尾

各五分 瘦弱者去芒硝加人參五分地骨皮柴

胡各一錢 丙熱者加川芎白芍黃芩山梔各一

錢歸尾一錢五分

爛瘡用枯礬四兩硫黃人言煨各一錢花椒三兩

生礬五錢蛇床二兩共為末用猪油調敷 手腿

大爛不收斂用黃占一兩東丹五錢膩粉二錢乳

香沒藥車米各三錢桐油調油紙攤貼 爛瘡用

蘆甘石五錢龍骨三錢乳香沒藥雄黃各五錢研

細乾搽 風癩用蛇床子雄黃砒等分為末醋調

青布包之重重頻擦 癩塊用車米硫黃各一錢

大風子一兩樟冰雄黃各二錢為末以生芝蔴二

解圍元數

卷三 東華玉髓

十五

合炒黑研和如泥以生布包擦塊上四五日愈爛

者不用其破者皆屬脾經毒已從破處出內服追

毒則自愈 起泡者用相粉車米石膏乳沒等分

研末敷之 眉落者用荆芥防風白芷蟬殼天麻

首烏羌獨活各五錢壬子肉四兩牛旁子大黃各

六錢 眼赤加菊花五錢 兩眼痛去大風子二

兩加全蝎七錢蜜丸桐子大臨臥以方中止去大

風子將各藥剉劑煎之送下五七十九 生眉用

牙皂炒加射香少許雞蛋油調生絹包擦眉稜上

二十日可出 黑斑用皂角鹿角菜白附子等分
 為末姜汁調惟塗久脫常州吳氏亦以此方得名
 每油四兩用乳沒六分血竭二錢芒硝八分牛黃
 三分服之雖效總不如前方有奇功 如夏暑油
 不肯凍不能成膏以米仁炒熟研末加入為丸服
 餘時以藥放酒盞內每日在飯上炖化服以助
 胃氣服至十日其毒必追至于足處發出或腫或
 瘡即將草麻子江子丟子打成膏貼之其臭水消
 出滋延敗惡不可聞以菖蒲草根炒末卷上即乾

解圍元藪

卷三

東華玉髓

六

癩如臭水流盡則愈急服補氣血藥三年方保全
 生 神效追風丸 二十九 治癩麻疥瘡熱風乾風一切
 危篤等症
 當歸 麻黃 羌活 白朮 各伍錢 荆芥 二兩 白芍
 黃芩 姜蚕 川芎 各一兩 人參 三錢 蒺藜 胡麻
 防風 各二兩 乳香 沒藥 各二錢 射香 四分 苦參 皮六兩
 大風子肉 四兩 右為末黃米粉酒糊丸桐子大每
 服五七十九早晚溫酒下

搜風四七丹 三十 治紫雲白癩紫癩等風
 防風 川芎 當歸 芍藥 麻黃 各五錢 黃芩
 山梔 連翹 白朮 甘草 薄荷 桔梗 全蝎
 蟬殼 羌活 獨活 胡麻 乾葛 升麻 各六錢
 荆芥 一兩 人參 三錢 牛膝 滑石 各一兩 木香 七分
 射香 五分 石膏 八錢 大風子肉 半斤
 右為末黃米粉酒糊丸桐子大每服五十九空心酒
 下 茶亦可

解圍元藪

卷三

追風丸搜風四七丹

七

困倦敗等症
 大黃 白芷 槐花 川芎 防已 各一兩 乳香
 沒藥 木香 沉香 各三錢 蒼朮 二兩 細辛 苦參 各
 兩五錢 紫葳 三兩 射香 五分 草烏 五錢 炒黑共一兩一錢
 右為末用去節麻黃半斤煎膏加蜜丸彈子大約
 重二錢硃砂為衣每服一丸臨臥葱酒磨服避風
 又一方去蒼射加當歸防風花蛇
 大消風散 三十二 治雞爪癢風脫跟魚鱗驚掌
 齧載疔癩風等症

防風 茯苓 荆芥 苦參 各十兩 乳香 沒藥 各二兩
射香 五錢 當歸 黃柏 各半斤 黃芩 胡麻 各一兩
丟子肉 一斤 煮一晝夜

先以一料去丟子沒射乳均作十貼煎服再用一

全料不見火為末酒米糊丸桐子大辰午戌時各

服三錢溫酒下 如面上病重加白芷風麻蟬殼

各四兩升麻五錢 口眼喎邪加白姜蚕四兩

四肢重加羌獨活各四兩 如服此藥須用細辛

蒼耳草蒺藜草遍地香馬鞍子草煎湯不時洗浴

解圍元數 卷三 換骨丹 大消風散 六

待汗透神爽方止久則脫愈

救苦回生丹 三十三 治歷節半肢紫雲啞風蠱風

乾風走注遍身寒濕麻痺癱瘓等症及中風

不語口眼喎邪

乳香 沒藥 當歸 川芎 各一兩 五靈脂 松香

松香 自然銅 醋威靈仙各一兩 虎骨 炙 地龍 草烏

各五錢 天麻 七錢 全蝎 射香 各三錢 荆芥 白芷

苦參 各一兩 番木別 三十箇 冰片 三分 京墨 一塊

黑豆 炒 開羊花 五錢 姜蚕 六錢

右為末糯米飯丸如龍眼大硃砂為衣金箔飛裏
薄詩酒磨下一丸如昏迷則病愈若婦人血暈經
閉胎衣不下用炒焦黑豆淋酒服之如神

班龍八帥丹 三十四 治螻蛄蝦蟆癰腫等症

姜蚕 炒 花蛇 炙 香蛇 炙 蜈蚣 炙 蜂房 炙 川山甲 炙

全蝎 炙 蟬殼 鹿角 煨

右各等分為末每服三四分酒下或以此藥加在
各方丸散中服之無不立效

奇效良丹 三十五 治歷來漏蹄冷風壁泥蛇皮一

解圍元數 卷三 回生丹 八帥丹 五

切大風服之皆效

胡麻 木瓜 山梔 黃芩 牛膝 蒼朮 天麻

五加皮 蒼耳子 風藤 羌活 獨活 細辛

黃柏 茯苓 各五兩 苦參 當歸 各十兩 麻黃 紫萸

防己 姜蚕 草烏 各三兩 甘松 蟬殼 紫葢 各四兩

乳香 沒藥 香蛇 各二錢 代赭 磁石 各二兩

荆芥 八兩 川芎 一兩 丟子 十二兩 射香 一錢

右為末蜜丸桐子大硃砂為衣每服五十九酒下

一粒金丹 三十六 又名赤龍丸又名一錠金治遍

身軀曳魚鱗刺風遠年寒濕手足痿痛走注

叫喚者

射香二錢五分乳香六錢沒藥各七錢當歸各七錢地龍

白膠香各二兩木別子五錢草烏五錢靈脂各二兩

京墨各二兩線膠各二兩麩炒各二兩紫萍各二兩

右為末用去節麻黃二兩煎汁煮大米飯九龍眼大硃砂為衣每服一丸酒下至黑汁從足底出乃為驗日進二服

搜風順氣丸三十七治軟癱風邪魅風熱風蠱風

解圍元藪

卷三 奇效良方 金丹 辛

併腰腿腹痛氣悶冷熱寒濕脚膝少力男婦怯弱此能和三焦潤五臟厚腸胃中風者服之大有功

製大黃 麻仁 山萸 山藥 枳榔 兔絲子

枳殼 防風各三兩牛膝二兩郁李仁 獨活各一兩

車前子二兩五錢

右為末蜜丸桐子大每服百丸或酒或茶下壯精神消百病癰瘰腸風並效

保真丸三十一治大麻邪魅半肢軟癱等風麻痿

痿痺不能動止者

人參 川芎 草烏 川烏 白芷 當歸 槐角

五加皮 羌活 獨活 紫背浮萍 防風 荊芥

首烏 枳殼 連翹 風藤 烏藥 杜仲 桔梗

肉桂 乾姜 姜蚕 石楠藤 甘草 芍藥

升麻 虎骨 花蛇 防已各一兩乳香 沒藥

沉香各五錢麻黃二十斤

右為末用麻黃煎膏丸每丸重五錢酒磨服一丸神效避風為妙

解圍元藪

卷三 搜風順氣丸 保真丸 三

二八濟陽丹三十九治軟癱癘麻血風癢風乾風

冷麻半肢血痺驚掌風血枯氣敗等症

玄參半斤酒漿三斤苦參一斤姜汁酒漿各浸犀角

當歸 蒺藜 熟地 白芷姜汁炒獨枝防風

全蝎去尾牛旁子 乳香 沒藥 石楠藤 紅花

各二甘草五錢姜蚕炒去絲尾一兩五錢

此藥前二味各八兩後十四味二十八兩共十六

味故名二八丹共為末蜜丸桐子大每服四十九

陳酒下日進三次

六神輔聖丸 四十 治疔瘡，雁來冷風，癢風，麻痺，痛風。

草烏 一斤白嫩者佳 麻油 一斤 甘草 半斤 荆芥 羌活 紫蘇 風藤 各四兩

用無灰酒煮一晝夜，另用一鍋煎滾汁浸之，方可擠去烏皮。如用冷酒浸，則烏皮擠不脫矣。將草烏擠淨，搗爛為丸，每服二十九，溫酒下。

四魔丹 四十一 治癱曳，顛風，蠱風，癱瘓，委頓者神效。

解圍元藪 卷三 濟陽丹六神輔聖丸 三

敗龜板 煨白 番木別 麻油煮三沉三浮 鬧羊花 酒拌九蒸晒各二兩 蒼耳子 一斤白蜜一斤

右為末，煉蜜和均，入竹筒內，掛當風處，七日後，初次服五分，三四日服六分，漸加至一錢，空心燒酒下。

火龍散 四十二 治脫眼，蛇皮，魚鱗，漏蹄，核桃癰爛，麻木，委敗等症神效。

人牙 一兩 雄黃 辰砂 大黃 酒蒸 代赭石 醋煨各一兩 共為末，每服三錢，臨臥用防風，荆芥煎湯洗浴熱。

酒送下，即睡，則皮內毒蟲追出，肌膚然後用雄黃，硫黃，硃砂，代赭石，車米各等分，研末，香油調，重擦，遍身，捷愈。

棗靈丹 四十三 治核桃壁泥，截蚝，白癩，鼓椎等風。

毛子 一斤 防風 荆芥 牛旁子 苦參 首烏

風藤 各三兩 桔梗 枳殼 川烏 草烏 香附

大黃 黃芩 木賊草 白附子 角刺 兩頭尖

白芷 檳榔 烏藥 石膏 薄荷 滑石 山梔

芒硝 葶藶 木通 木香 沒藥 胡黃連

解圍元藪 卷三 四魔丹火龍散棗靈丹 三

車前子 黃柏 各一兩 甘草 蒺藜 羌活 天麻

白朮 柴胡 菖蒲 藿香 蔓荊子 天花粉

姜蚕 厚朴 陳皮 橐本 威靈仙 遠志

麻黃 枸杞 甘菊 蟬殼 血竭 乳香 各二兩

胡麻 四兩 梧桐皮 淚 黃連 花蕊石 辛夷

射香 青皮 各五錢 牛黃 一錢 冰片 五分

右為末，東肉丸，菘豆大，每服五七十丸，春白湯，夏

茶，秋鹽湯，冬酒下，忌油膩生冷。

小棗丹 四十四 治鷲掌風，刺風，癩風。

防風	姜蚕	首烏	全蝎	羌活	獨活	芍藥
威靈仙	生地	蔓荆子	牛旁子	苦参	胡麻	
大黃	黃芩 <small>各二兩</small>	枸杞子	薄荷	南星	天麻 <small>各二兩</small>	
荆芥	柏枝	山梔 <small>各四兩</small>	炙甘草	五錢	白朮	一斤
姜子肉	一斤	兩頭尖	者為生	錢要大		
右為末	棗肉	丸桐子	大每服	六十九	薄荷湯下	
守中丸	四十五	治雁來	鼓槌	核桃	紫雲	水風此係
山西張守中	所用故名之					
防風	荆芥	苦参	連翹 <small>各二兩</small>	當歸	胡麻	
解圍元藪	卷三	小柴丹	守中丸	三		
牙皂	蔓荆子	蒺藜	牛旁子	各三兩	白芷	甘草
硃砂 <small>各五錢</small>	羌活	獨活	各一兩	陳皮	黃芩	
胡黃連	山梔	升麻	天麻	各一兩	乳香	沒藥
牛黃	一錢	射香	三分	冰片	三分	
右為末	米糊	丸每服	三錢	鹽湯下		
祖傳玉樞丹	四十六	治白癩	蟻蝨	癩風		
苦參皮	荆芥穗	當歸	元參	蒼朮	各八兩	烏藥
羌活	川胡麻	藁本	白芷	防風	白蒺藜	
川芎	獨活	麻黃	蒼耳子	甘草	各四兩	紅花

牛旁子	天麻	姜蚕	風藤	薄荷	各三兩	草烏
半夏	貝母	桔梗	大黃	姜蕤	各一兩	射香
牛黃	一錢	木香	檀香	沉香	乳香	沒藥
血竭	各一兩	琉璃灰	二兩	爛者方加	桑螵蛸	一兩
銀柴胡	各一兩					
不見	蚕蛻	玄明粉	秋石	蘇木	夏枯草	虎骨
旱蓮草	犀角	各二兩	仙靈脾	一兩	大風子肉	四兩
右為末	陳米糊	丸桐子	大硃砂	為衣	用後煎藥送	
下百丸	早晚服	如怕服煎藥	以酒代之	在密室中		
睡三四時	方可行動					
解圍元藪	卷三	玉樞丹	另附煎方	三		
煎藥方	四十七	水煎送前丸藥				
黃芩	大黃	羌活	獨活	防風	防已	連翹
黃柏	桔梗	荆芥	當歸	山梔	木通	白芷
甘草	半夏	紫蘇	薄荷	升麻	麻黃	川芎
烏藥						
補舊湯	四十八	又名救苦湯	治飢餓	壁泥	血痺	
血風						
苦參皮	一錢	牛旁子	人參	首烏	山梔	各一錢
姜蚕	白蘇皮	防風	連翹	天麻	蔓荆子	

黃芩各五分 全蝎 黃連 甘草各四分 薄荷 羌活
 獨活 荆芥各三分 乾葛 黃柏各七分 威靈仙 蒺藜
 各八分 仙靈脾性弱者加五分

先用酒煎十貼服再用水煎須儘量飲酒服至百貼其眉鬚復生腫塊漸退手足痿頓者有力須戒色省勞避風忌口方能有功再以每味加十倍爲末再加乳香沒藥血竭沉香各一兩冰片牛黃各一錢射香二錢用米仁糊丸桐子大硃砂爲衣每服百丸酒下三年身固絕根臨服時每服加威靈

解圍元藪 卷三 三
 仙末三分效速

神醖丸四十九 治歷節痛風筋骨走痛
 蒼朮八兩 草烏三兩 杏仁 川芎 白芷 半夏各三兩
 右剉片用姜二斤葱一斤搗汁拌濕以藥鋪入瓶內封好埋土中春三夏五秋七冬九日取出晒乾加猴姜木香牛膝紅花各二兩當歸草薜茄根各四兩共爲末老酒糊丸桐子大每服六十九酒下日進三次神效 又一方有乳香沒藥射香地龍各五錢尤奇

神守散五十 治蛇皮魚鱗邪魅癢風顛風一切危急之症

番木別用銅刀刮去粗皮將麻油入瓦罐內煎滾漸投下木別煎之待三沉三浮發泡焦黃取出晒乾爲末每服一分臨臥白湯下避風待汗乾方可起服至百日眉生指直斑退瘡消瘡斂如病熱反增乃內毒發出甚妙此方亦治痰火服之則痰從兩脇滾下又治顛癇量入強弱服一方藥末一兩加甘草末五錢更妙如藥力凶以黑豆湯解之菜豆湯亦可

解圍元藪 卷三 神醖神守雄漆參芎 三
 雄漆丸五十一

嚴漆一兩 蟹黃五錢 拌勻晒漸去面上汗水待盡又加水飛雄黃牙皂末各五錢爲丸不可見日晒則不乾每服三分溫酒下
 參芎丸五十二
 隔年純白鷺一隻男用雄女用雌擣其毛不可失一根炒爲末用苦參皮一斤酒煮爲末黃米酒糊丸桐子大每服百丸空心酒下服完病愈
 吳氏苦參丸五十三 此方胡僧傳於車塘吳氏今

以養生一料共三十六筋治三十六種風病
不知其由

苦參 十斤 草胡麻 九斤 防風 荆芥 蒺藜 各五斤

丟子 二斤 俱生用為末酒水為丸每服一二合日

進三次似覺傷人臟腑姑集之以備叅攷能治漏

蹄蠹蝨蝨脫跟疔瘙等風惟黑色痿爛併初起

年少者服之方好若久病血衰氣弱老年俱不宜服

調榮丸 五十四 治大麻癩麻痺曳啞風顛風諸癩

川芎 蘇木 丹皮 蒲黃 乳香 沒藥 草烏

解圍元藪 卷三 吳氏苦參丸 調榮 三六

血竭 烏藥 菖蒲 黃芩 各一 益母草 生地

敗龜板 夏枯草 熟地 枸杞 當歸 各四兩

阿膠 苦參 菴蓉 各二 知母 地骨皮 人參 各

兩五 瑣陽 五錢 牛膝 銀柴胡 藁本 升麻 各三

錢 桃仁 芍藥 柴胡 紅花 各一兩 右為末蜜丸

桐子大卯午酉時各服百丸乳酪湯下

大定風丸 五十五 治痛風麻痺寒濕走注疼痛

南星 白芍 木瓜 官桂 甘草 荆芥 川烏

姜蚕 白芷 牛膝 當歸 枳榔 天麻 人參

首烏 各一兩 羌活 桔梗 獨活 白朮 防已

全蝎 木香 半夏 厚朴 杜仲 黃芩 各二

陳皮 枳實 麻黃 各三 白附子 防風 各二兩

蒼朮 一斤 川烏 一兩 乳香 沒藥 沉香 血竭 各

右為末酒糊丸桐子大每服七十九酒下

駐車丸 五十六 治歷節痛痺寒濕脚氣抽掣

獨活 川烏 沙參 生地 蒺藜 白芷 木瓜

海桐皮 各五 米仁 羌活 防風 細辛 甘草節

牛膝 各一 右為末用五加皮浸酒煎汁為糊丸桐子

解圍元藪 卷三 大定風駐車如意通聖散 三六

大每服七十九酒下

如意通聖散 五十七 又名麻黃赤芍湯 治白虎

歷節痛風寒濕手足不能舉渾身走注抽掣

叫號等症

罌粟殼 丁香 麻黃 赤芍 防風 荆芥

當歸 川芎 羌活 獨活 白芷 甘草 黃芩

威靈仙 草烏 炒黃 桔梗 葛根 各二錢 入乳香 沒

藥末各三分煎熱服蓋被取汗如病在肩背上加

白芷末二錢如用乳沒芷末待前好冲服

八將驅邪散五十八 卽八將追覓丹 又名三厘

散 治大風癱爛敗症

射香三分 川山甲兩 蜈蚣去頭 土狗各三錢 地龍壹

杏木別酥炙 金鼎砒 雄黃各五錢

右爲末每服三厘温酒下服七日停七日服退藥

一月又服之如人素弱只服三日就服退藥五日

服補藥三日再服之不然使人牙齒浮爛昏潰疲

敗飲食不進幾于無救矣

退藥五十九

解圍元藪

卷三

八將驅邪散退藥

三

乳香 沒藥 血場 硃砂 當歸 元參 胡麻

桑寄生 半黃 沉香 各等分爲末蜜丸服

補藥六十

桑螵蛸 晚蚕蛾 銀柴胡 仙靈脾 牛膝

防已 紅花 破故紙 柏子仁 天冬

右爲末蜜丸桐子大每服五十九酒下日進二次

陽起聖靈丹六十一 治痛風不舉伏床者

當歸 枳殼 川芎各四錢 虎骨酥炙 牛膝 木瓜

生地 桑寄生 補骨脂 天花粉 烏藥 麻黃

陳皮 山藥 蒼朮 自然銅各二錢 赤芍 姜蚕

白芷 桔梗 黃芩 紅花 黃芪 甘草

陽起石 龍泉香各三錢 防風 荆芥 連翹

風藤各一兩

右爲末用不見水鷲掌二隻酒煮焙乾又用狗蹄

四隻燒灰用鷲血煮酒各半碗不見水狗血一碗

加麩少許爲丸桐子大用葱酒送下七八十九早

晚服一月全愈

鐵庵丹六十二 治諸般風症

解圍元藪

卷三

補藥 聖靈丹

三

大風子一斤用麻黃開羊花各四兩酒煮一晝夜 苦參皮酒拌九蒸

荆芥穗淨末 白蒺藜微炒 狗虱胡麻微炒淨末

春加柴胡 升麻 川芎 藁木各四兩 夏加桔梗

黃芩 半夏 銀柴胡各四兩 秋加石膏 甘草

元參 當歸各四兩 冬加知母 生地 五加皮

地骨皮各四兩 心經加茯苓 硃砂 遠志

山萸 蒲黃 當歸各四兩 肝經加荆芥 白芷

風藤 羌活 白芍 甘草 地黃各四兩 脾經加

荆芥 白朮 陳皮 蒼朮 獨活 乳香 沒藥

血竭 <small>各四兩</small>	肺經加天麻	桔梗	半夏	貝母
柴胡	沙參	巴戟	胡麻 <small>各四兩</small>	腎經加黃柏
知母	茯苓	當歸	升麻	草烏
胃經加枳殼	霍香	蒼朮	半夏	厚朴
柴胡	益智	草果	白豆寇 <small>各四兩</small>	
右為末酒糊丸桐子大每服百丸溫酒下日進三次				
保命丹 <small>六十三</small>				
若參皮	荆芥穗	羌活	蒺藜	胡麻
明天麻	風藤	元參	獨活	連翹
白芷	厚朴	紫葳	解圍元藪	卷三 鐵庵丹保命丹
牛膝 <small>各四兩</small>	蒼朮	烏藥	桑木	麻黃
甘草	紅花	蒼耳子	川芎	升麻
薄芎	半夏	牛蒡子	木瓜	姜蚕
桔梗	大黃	蒲黃	巴戟	防風
葶藶	蟬殼	牙皂	全蝎	續斷
蔓荆子 <small>各二兩</small>	石斛 <small>二兩</small>	甘松	猴姜	菖蒲
草烏	貝母	木香	檀香	沉香
銀柴胡	柏子仁	硃砂	浮香	沒藥
遠志	元明粉	血竭	雄黃 <small>各一兩</small>	射香 <small>一錢</small>
秋石 <small>一兩</small>	黃芽 <small>二兩</small>	手足攣痛加黃連 <small>半斤</small>	香蛇 <small>一條</small>	陽痿加仙靈脾 <small>六兩</small>

身浮腫加白花蛇 <small>一條</small>	紫萍 <small>八兩</small>	黑班 <small>加廣零陵香</small>
地骨皮	血見愁 <small>各四兩</small>	眼赤爛加珠粉
知母	胡黃連 <small>各四兩</small>	破音加木通 <small>十二兩</small>
呵子 <small>六兩</small>	右為末用甘草膏和陳米糊丸桐子大每服八十丸酒下日進三次	
搜風無價丸 <small>六十四</small> 治諸癩風		
全蝎 <small>四兩</small>	苦參 <small>三兩</small>	防風
當歸	川芎 <small>各三兩</small>	蟬殼
荆芥	羌活 <small>各二兩</small>	柴胡
獨活	牙皂 <small>各二兩</small>	丟子 <small>十兩</small>
解圍元藪 卷三 保命丹搜風無價 三		
右不見火為末早赤米糊丸桐子大土硃為衣每服五十丸茶酒俱可下		
八仙丹 <small>六十五</small> 治新久一切大風		
巨勝子	麻黃	苦參
荆芥	防風	獨活 <small>各十兩</small>
大風子肉 <small>八兩</small>	蒺藜 <small>四兩</small>	
右晒為末赤米糊丸桐子大土硃為衣每服七十丸茶下		
射老丸 <small>六十六</small> 治癩風變形敗體一切惡症		
蟬殼	當歸	柴胡
荆芥 <small>各二兩</small>	苦參 <small>三兩</small>	

防風 三兩 全蝎 四兩 川芎 一兩 獨活 一兩 羌活 二兩
石晒為末。每藥末一兩。加大風子肉一兩六錢為
末。赤米糊丸。桐子大。西洋珠為衣。每服八十九白
湯下。日進三次。三日後。其腿下黑紫塊上汚皮漸
好。十日後。即服利藥一次。每月利三次。

刊藥方 六十七

江霜 一錢 牙皂末 三錢 飯丸 荀子大 每服二九 白湯下

小還丹 六十六 治癩風眼爛昏花 眉髮能落 鼻梁
崩倒 肌膚瘡癬 穢破臭惡 癰爛勢危 不救者

解圍元數

卷三

八仙丹 射老丸 利藥方 三十五

可用

皂角制 三斤 酒拌濕 大火 蒸半日 取出 曬乾 白鷺毛 一隻 微火炒 苦參 酒浸一日 夜
右為末 用大黃煎酒打糊 丸 桐子大 每服三十九

酒下 服至旬日 眉髮生 肌膚潤 眼目明 一料全愈

六和定風散 九 治癰瘻 風寒濕痺 歷節 白虎等
風

蒼木 四兩 草烏 二兩 杏仁 一兩 錢 當歸 牛膝 各四錢

乳香 沒藥 各一錢 以生姜 胡椒 搗自然汁 各一碗 浸蒼木 待蒼木泛

白晒乾。又加去節麻黃末一兩。每服三四分。酒下。重者五六分。其病根從元府汗中泄盡愈。

者

細辛 川芎 黃芪 防風 金毛狗脊 菖蒲

獨活 丹皮 牛膝 米仁 各一兩 山藥 藜耳實

當歸 巴戟 秦芫 各二兩 藁本 漏蘆 牛旁

天麻 虎骨 各二兩 菱麩 三兩

右為末 酒糊丸 桐子大 每服五十九 酒下 以粗藥

解圍元數

卷三

小還丹 六和定風散 三十五

末加柴胡煎湯浴

長春丸 七十一 治風癩困頓者

苦參 獨活 荆芥 蒺藜 紫萍 蒼木

風藤 各六兩 木通 三兩 草烏 二兩 大風子 一斤

巨勝子 十二兩 仙靈脾 四兩 俱不見火

右為末 水滴丸 每服五十九 茶下

固命丹 七十二 又名飛步丹 治風癩既愈之後 氣

血虧敗 過服 尅伐藥 未免 神枯 陽痿 憔悴 昏

倦 腰脚 痠軟 四肢 不暢 服此 可使 如舊 無病

人五十以外者若常服延齡却病行步如飛
妙難盡述

人參 熟地各四兩 枸杞 麥冬冬六兩 白茯苓

當歸各一斤 仙靈脾取葉一斤去毛酒拌蒸

右為末蜜丸桐子大每服四十九米湯酒俱可下
如陽痿不起加真陽起石原蚕蛾各四兩甚妙

五子芥風丸七十三 治大風症

胡麻子 蒺藜子 車前子 澄茄子 大風子

荆芥 防風各二兩

解圍元藪 卷三 鞭驢丹長春丸圓命丹

右為末酒糊丸桐子大每服百丸或茶或酒下

順氣散七十四 治風癘之人元氣枯滯鬱悶不寧
常服之清爽

陳皮 桔梗 白芷 甘草 枳殼 川芎各二兩

姜蚕 麻黃 乾姜 烏藥各一兩

右為末每服三錢姜棗湯下

二九還元丹七十五 治風癘危篤惡症

胡麻 苦參 荆芥各半斤 防風 升麻 羌活

獨活各二兩 風藤 木通 黃柏 當歸 白芷各四兩

柴胡三兩 姜蚕一兩 蟬殼五錢 川芎各一兩 蒺藜二兩

大風子十二兩

右為末酒糊丸桐子大硃砂射香為衣每服五十
丸温酒下日進三次避風戒色

二聖散七十六 治癘風痿爛

大粉草 大柴胡 各等分為末每服三錢或酒或

湯下日進三次服至百日自然病愈

戒止丸七十七 治穢爛黑腫臭惡癘風

荆芥 白芷 防風各十兩 苦參 一斤 丟子 八兩

解圍元藪 卷三 五子芥風丸順氣散二九還元丹

白蒺藜 胡麻 牛旁子各十兩 當歸 紅花

川芎各四兩 開羊花四兩酒蒸晒二次

右為末酒糊丸桐子大每服百丸早晚茶下腹中
響動不安兩三時即定

參靈丸七十八 治大風腫爛癱瘓抽掣凶頑大有
奇功

奇功

苦參 一兩 荆芥 防風 牛膝 咸靈仙各四兩 蒺藜

胡麻各一兩 丟子 八兩 開羊花 五錢

右為末黃米糊丸桐子大每服六十九白湯下日

進三次

烏龍丸 七十九 治癩風遍身瘡癬癢疥腫爛臭惡

服此消風散熱利隔化痰又治肺氣不和能

推陳致新去腸垢滌臟腑穢毒大有功

肥皂角刮去皮筋子水浸槌爛絞去渣取汁入瓦器

煎膏用黑丑末共搗為丸桐子大每服五十丸白湯

下如氣虛者服二三十丸無病之人氣若實服一兩

利用三五次不傷正氣身體輕健肌膚光澤永無風

痰疥癬

解圍元藪

卷三 聖散戒先參靈丸

三六

洞虛丹 八十 治惡風麻木走注抽痛者

藜本 天麻 川芎 細辛 各一兩 牛膝 羌活 各三

大風子 四兩 蟬殼 胡麻 防風 獨活 姜蚕

荆芥 蘇木 風藤 石膏 蒺藜 山梔 芍藥

菖蒲 石蚕 黃芩 連翹 草烏 紫萍 升麻

紅花 麻黃 白芷 石斛 當歸 威靈仙 各二

右為末酒糊丸桐子大每服百丸用羊躑躅草根

一觔四兩打碎以酒二十觔煮去渣每以一盃送

下一月病愈忌食鹽物

清平丸 八十一 治大風中風跌撲打傷咽喉等症

有歌為證

天生靈草無根幹 不在山間不在岸

始因飛絮逐風飄 泛梗青青浮水面

神仙一味去沉疴 採時須是七月半

癩麻疼痛立時消 寒熱瘡癩及癰疽

任從癩癩暴中風 些小微風都不算

黑淋酒化服三丸 鏡幘頭上也出汗

七月上旬採河中紫背浮萍晒乾為末每觔加草烏

解圍元藪

卷三 烏龍丸洞虛丹清平丸

三六

萎蕤 風藤 麻黃 各二兩 射香 二錢

共為末蜜丸彈子大以草烏煎酒磨服一丸重

者以烏頭煎酒磨下輕者以黑豆炒香煎酒磨服

葶藶丸 八十二 治肝腎風氣四肢麻痺骨節痠疼

腰膝無力癩風癢爛濕痰中風口眼喎邪手

足屈曲癰疽等症

於五月五六月六七月七等日採葶藶草葉拭去毛

沙土曝乾以老酒并蜜酒層層和酒以柳木甑蒸透

晒乾共九次加乳香沒藥沉檀降木真射等香當歸

血竭各等分共為末蜜丸桐子大每服三錢無灰酒下神効

胡麻丸 八十三 治大風大癘中風乃風科之妙方

胡麻 一斤 苦參皮 五斤酒 荆芥穗 四斤 蒺藜草葉 淨

蒼耳草葉 淨 紫背浮萍 二斤蒸 透晒乾 先將蒺藜蒼二味

蜜拌蒸一伏時晒乾後共為末酒糊丸桐子大硃

砂為衣每服百丸茶酒俱可下日進三次

獨聖散 八十四 治鼓椎風手指攣癩足趾腫爛脫

落腿肘曲折腫痛難忍

解圍元藪 卷三 蒺藜丸胡麻丸獨勝散

蓖麻子肉 二兩碎 黃連 二兩 同貯瓶內加水浸之春

五夏三秋七冬九日取出每晨朝東南方以瓶中水

一鍾吞蓖麻一粒漸加至四五粒若微泄無妨如手

指足趾節間腫疼諸病即愈戒食動風辛辣毒物

跨鶴丹 八十五 治雞爪風

五加皮 海桐皮 川烏 川芎 赤芍 各五錢

乾姜 肉桂 各一錢

右為末每服三錢用水二盞將青錢一個入清油

浸三日同煎服

靈芽蕊珠 八十六 治爛風癢頓臭惡疔瘡

人雖以水養淨再以濃茶養三日夜炙香為末每兩

加射香一錢酒糊丸彈子大每服一丸熱酒磨下眩

暈周時自醒病若脫去重者五七丸全愈

雄漆丸 八十七 治爛風瘡穢臭惡者

透明雄黃水飛淨 八兩 淮熟地 八兩 乾漆灰 一兩

右為末醋糊丸桐子大每服七十九酒下服藥一

料全愈

蓬萊棗 八十八 治癱瘓痿癱臭惡困頓者

解圍元藪 卷三 跨鶴丹靈芽蕊珠雄漆丸

北紅棗 一斤取肥 五臺草 取自然汁十碗一名

透骨草 即馬鞭 左纏藤 即金 夏枯草 透天龍 即若

土風藤 即九 蒲公英 各取汁 黃花根 一兩

右各草於二月中旬收採加白酒漿二碗入砂鍋

內文火慢煎汁盡用千年葉川椒煎湯洗去棗上

泥陰乾如病人手指攣癩屈倒五年者服二筋十

年者服四筋二十年者不治服時要在靜處避風

端坐養神先吃一個三日外增三枚五日外增五

枚常服之仍以扁柏川椒湯洗手外用沉香射香

末爲衣更妙其煮過棗汁爲瘡疽圍藥極好或以
金銀花簾蒸晒爲末和丸外科服之甚妙風科服
之亦好

聖散子 八十九 治諸風痠困攣曲臭惡危爛者

開羊花根 老酒拌 缸岸 即坑近要多年露天者 人牙
雄黃 水飛各 牛黃 一錢 蟾酥 三錢 硃砂 五錢 射香 一錢
右爲末每服四分沙糖調濕酒下

花龍丸 九十 又名混元丹治風濕腰背以下腿
肢癱瘓寸步不能日夜抽掣伏床不起

解圍元藪 卷三 養素聖散子良丹 聖

蒼朮 四兩 黃柏 酒浸 靈殼 酥炙 牛膝 當歸 草薢
防已 茄根皮 各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服百丸姜鹽湯下

白龍丸 九十二 又名捕龍丹治風濕腰跨以上肩

背大痛肘膊彊軟匙筋難舉偃僂脊高

乳香 沒藥 川烏 草烏 地龍 南星 各等分

右爲末酒糊丸每服四十九或酒或荆芥湯下服

至四兩除根外以石楠葉煎湯洗沃

香身丸 九十二 治大風腥臭穢人不能近者

白芷 香附 當歸 桂心 檳榔 益智
甘松 各三兩 檀香 二兩 射香 韶腦 各五錢 木香

沉香 各二兩 香蛇 二兩
右爲末甘草膏丸桐子大臨臥含化五丸大能祛症

大衍丸 九十三 治諸風癱痿變形脹腫困敗者
羌活 當歸 白芷 防風 粉草 連翹 熟地

牛蒡子 姜蚕 各二兩 蒺藜 六兩 玄參 半斤酒
苦參皮 一斤酒浸 右爲末酒糊丸桐子大每服百

丸滾湯下日進三次外用 甘草 黃柏 荆芥
解圍元藪 卷三 捕龍丹香身丸大衍丹 聖

苦參 槐頭 椿頭 防風 大風子殼 葱煎
湯洗浴

仙花膏 九十四 治大風惡症神效

開羊花 八兩酒 蒼耳子 八兩 敗龜板 煨白如 番木別
酥炙 右爲末用蜜一觔熬去水氣調之入竹筒內

掛當風處病人初起酒服五分弱者服一二分不
飲酒者沙糖調下

水製黃香丸 九十五 又名黃龍丸治諸風危困無
藥可治將斃者

船上硫黃黑色者曰雌黃色者曰雄各半打碎溶化傾入醋內

取出裡面牛油取淨者一筋用竹筒一箇削去青入

硫在內以蠟封口投入無水糞坑中浸一年取起放

長流水中四十九日明亮松香溶化加燒酒煮六

七沸傾入冷水內抽扯去內苦黃味再煮再抽一連

七次拔淨細白無脚方用三兩茅木米泔浸刮去

者一紫檀香俱不茅香俱不自膠香川烏炮去川芎

各四惡實頭末草烏炮去明天麻各三一方加地龍

二兩各黃龍丸右為末陳米糊丸梧子大每服五十九滾

解圍元藪 卷三 大衍九仙花膏黃龍丸 湯下如皮膚發熱加番木別五錢以麻油煮熟忌

猪肉房事

治鷺掌風雁來風方 九十六

銀杏肉打爛搓擦如乾摸去查不可水洗再加冰片

射香各三分研勻桐油調塗上以艾火薰之

又方

用真平胃散桐油調塗于炭火上薰之頻塗頻薰

又方

用烏骨白雞勿使犯雌另高一處收其糞曬乾加入

蛇床子末煎湯入瓶內薰之待溫即洗 一方加雄黃皮硝尤妙

又方

用蒼木 艾 煎湯瓶內薰之俟溫洗之

又方

水銀三錢鉛二錢化開投入水銀為末用硫黃三錢

研細將茄蒂蘸擦 一法以滴酒洗二三次則愈

白癩風方 九十七

用麻油半筋生柿柅兩箇打爛和勻入鍋內熬黑去

渣煎在患處自變好肉

三分散 九十八 治諸惡風痲困癱爛危篤者

開羊花酒拌丸用生漆每兩加樟冰二錢雄黃二錢

攪勻隔湯炮化拌蒸曬乾又以茜草根搗汁拌蒸晒

乾為末每兩加雄黃三錢射香五分蟾酥二錢研勻

每服三分沙糖調溫酒下半日不可見風

四物湯 九十九

川芎 當歸 白芍 大生地

人參敗毒散 一百

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 荆芥 防風
桔梗 川芎 枳殼 茯苓 生甘草 生薑
大棗

補中益氣湯 一百零一

升麻 柴胡 人參 細黃芪 當歸 茯苓
白朮 炙草 薑棗

解圍元藪卷三終

解圍元藪

卷三

獨活參散補中益氣湯

解圍元藪卷四

明沈之問先生輯 錫山黃 鐘樂亭氏校訂

參朮遇仙丹 百零二 治三十六種大風諸惡危症

人參 白朮 各一兩 川芎 皂角刺 藁本 蟬殼

天麻 各二兩 羌活 獨活 細辛 紫參 丹參

沙參 知母 各三兩 元參 當歸 荆芥穗 紅花

蒼朮 各四兩 川山甲 姜蚕 蜈蚣 漏蘆 草蘇

石斛 秦苑 各一兩 乳香 沒藥 血竭 各七錢

射香 五分 木香 一兩 地龍 八錢 苦參皮 半斤

解圍元藪 卷四 參朮遇仙丹子和方

右為末蜜丸桐子大每服五十九丸温酒下忌牛羊
猪肉野味雞鷺燒酒房事避風為上

子和方 百零三

五經風症少人知 金肺傷風損兩眉肝木不仁身

紫色 土脾受濕癰斑皮 火心傳遍傷雙目 水

腎生災漏兩蹄 識透五般風病症 纔堪世上作

良醫

又云

蟲入肺經先落眉 蟲入心經手拳蹠 蟲入脾經

身麻木 蟲入腎經穿脚底 蟲入肝經眼目反
蟲入胃經蟬痒皮

第一神效散 百零四

黃柏末 皂角灰各三錢研勻作一服温酒調空心
服晚勿食至二三更必下蟲大小長短者甚多

第二清氣散 百零五

枳殼 枳榔 青皮 陳皮 厚朴 澤瀉 半夏
茯苓 猪苓 當歸 水煎服

第三大皂丸 百零六

解圍元藪 卷四 神效散清氣散大皂丸 二

皂角 二十刮去黑皮 另以十觔搗取汁煉膏丸梧子
酒炙黃研末 大空心酒下三十九

第四消風散 百零七

白芷 全蝎 人參 各一兩
右爲末每服一錢空心温酒下

第五順氣散 百零八

苦參皮 斤 烏藥 防風 各四兩 右爲末每服三錢酒下
大風丸 百零九 治眉目遍身穢爛者

大風子肉 三十兩 防風 川芎 各十兩 蟬殼 羌活

細辛 首烏 獨活 苦參 當歸 牛膝 全蝎
黃芪 薄荷 各二兩 白芷 河脊 牛黃 血竭 各五錢

右爲末米糊丸桐子大每服十五丸茶下空心服
日進三次外以桑條灰二斗滾湯淋汁洗頭面有
瘡者以汁調灰塗之或用黑豆漿豆浸取豆漿三
日煎湯浴一次仍頻洗脚

大麻三方 百十 治一切大麻風危者大有功效

當歸 川芎 熟地 桃仁 防風 荆芥 紫蘇
薄荷 芒硝 連翹 赤芍 桔梗 紫葢 麻黃

解圍元藪 卷四 消風散順氣散大風丸 三

紅花 蘇木 大黃 白木 厚朴 山梔 黃芩
丹皮 石膏 甘草 各一錢 滑石 一錢 水煎服十劑

重者加全蝎 上部加升麻 下部加木瓜牛膝
射香獨活 發熱加乾葛柴胡 面部加白附子
氣滯加木香磨酒冲服

發表攻裏散 百十一

老人牙灰 四箇 牛虱 三十條 桑葉 四條 川山甲 虎骨
酥炙 鹿角灰 各一兩 蜈蚣 三條 敗板 象 蜂房 各
射香 五分 牛黃 三分 蛭蚰 四條 血餘灰 雞鷲鴨卵殼

射香 五分 牛黃 三分 蛭蚰 四條 血餘灰 雞鷲鴨卵殼

煨各一兩 右爲末每服三錢酒下

九方 百十二

苦參皮一斤酒浸 皂角八兩 花椒四兩

右爲末酒糊丸桐子大每服五十九空心温酒下

奪命丹 百十三

苦參 桔槔 升麻 當歸 白芍 連翹 荆芥

防風 羌活 蒼朮 獨活 茯苓 黃芩

川芎 蛇床子 薄芎 大黃 白芷

陳皮 半夏 乾葛 枳殼 甘草

解圍元藪 卷四 大歷芳陰表裏散奪命丹

山梔 半斤 芒硝 三兩 右均作十貼水煎服

九方 百十四

防風 當歸 牛旁 荆芥 蒺藜 胡麻

荆子 苦參 大風子肉 血竭 牛黃

射香 水片 辰砂

右爲末蜜丸梧子大每服八十九空心酒下

擦方 百十五

瓜子 三錢 杏仁 二十粒 蛇床子 檳榔 防風 荆芥

苦參 風藤 川槿皮 威靈仙 茅香 藁本

菊花 藿香 甘松 射香 細辛 水銀 車米 硫黃 枯礬 白芷 共研末擦之

洗方 百十六

荆芥 防風 菊花 枳殼 金銀花 大風子

蔓荆子 苦參 元參 沙參 煎湯洗之

右方治心肝二經受病其色青遍身紫綠色或有泡初起眉毛未落面目癢癢如蟲行之狀者神妙若加桃柳楮桑槐嫩枝在內煎湯洗更妙

遠年大風煎方 百十七

解圍元藪 卷四 奪命丹九方擦方洗方 五

升麻 川芎 枳殼 陳皮 天麻 黃連

黃芩 前胡 連翹 地骨皮 麻黃

全蝎 薄荷 木香 瓜子 一斤

眼昏加菊花 黃柏 麻木加木通 滑石

爛瘡加雄黃 苦參 紫泡加紅花 蘇木

身痛加羌活 防風 蒼朮 面癢如蟲行加

白附子 一兩 右均作十貼水煎服

九方 百十八

防風 六兩 羌活 升麻 菖蒲 連翹 牛旁子

前胡 枳榔 厚朴 蒼朮 各四兩 苦參 八兩 胡麻

花粉 蒺藜 各一兩 姜蚕 枸杞 木瓜 天麻

菊花 川芎 各二兩 丟子 一斤 如紫色 加硃砂 五錢

脚軟 加牛膝 防己 各二兩 脚腫 加木香 五錢 瘡爛

加雄黃 二兩 遍身爛 加白花蛇 一條 身痛 加羌活

獨活 各二兩 右為末米糊丸桐子大每服百丸白

湯下日進三次 洗方 百九

首烏 荆芥 防風 槐枝 苦參 馬鞭草

解圍元藪 卷四 遠年大風丸方 洗方 草方 六

金銀花 楓樹皮 煎湯洗之

末藥西江月 百二十

雄黃南星半夏 川烏草烏硃砂 更加一味白天

麻 每服半分酒下 七味皆為細末 分兩稱准

無差 渾身出汗住疼麻 萬兩黃金無價

草方 百廿一

荔枝草 箭頭草 黃花地丁草 忍冬草 各等分

晒乾為丸酒下 既濟丹 百廿二 治三十六種危惡大風

白砒 一錢 漿草 日 人中白 六兩 醋 明雄黃 五錢 硃砂 四錢

右為末每服半分以大黃黑牽牛各五分煎湯空

心下七日後追出異蟲從大便出用荆芥湯洗澡

則蟲皆墜缸底如身上覺癢將白芨煎湯服藥二

七日則面上黑癭皆退如愈後即服下除根方

除根方 百廿三

白砒 一錢 地骨皮 丹皮 當歸 生地 各一兩

右為末蜜丸桐子大每服十九或酒或茶下日進

三次則永不發服此之後要服甦骨丹一年

解圍元藪 卷四 既濟丹除根方甦骨丹擦方 七

醒骨丹 百廿四

漢防己 三兩 風藤 四兩 甘草 二兩 松香 一斤

酒煮一日傾水抽扯五七次白淨細膩俟冷共為

末米糊丸桐子大每服七十九白湯下則筋舒血

足矣 擦方 百廿五

水銀 胆礬 明礬 各等分 右研至不見星以三

分擦手足心先服前末藥五七日再服甦骨丹三

五日然後擦二三日又服末藥如此間行之

藥酒方百廿六

石六軸子 四兩 烏蛇 一條 當歸 四兩 甘草 八兩

先以水六碗煮甘草汁三碗方入燒酒一筋併三味藥隔湯煮三炷香埋地七口每早飲一盃

黃白丹 百廿七 治大風攣斃敗絕危困者

白松香水煮淘五七次又以煮酒或火酒煮白占各等分爲末紅棗肉丸每服百丸酒下

漱風散 百廿八

甘草 百斛 藁本 麻黃 乳香 各一兩 當歸

解圍元藪 卷四 藥酒方黃白丹漱風散 八

蒼木 細辛 荆芥 川芎 全蝎 去硝 泥炙 牙皂

兩頭尖 升麻 白芷 川胡麻 各三兩 草烏 一兩 六錢

川烏 兩箇各重二兩 童便浸煨

右爲末每服五七分酒下麻木者三四服即愈

養龍湯 百廿九 治大風癱攣眉翳

歸尾 白芷稍 全蝎 姜蚕 蟬殼 風藤

菖蒲 木瓜 若參 荆芥 甘草 薄荷 紅花

生地 連喬 蔓荆子 首烏 米仁 角刺

牛旁子 白蒺藜 威靈仙 金銀花 五加皮

胡麻貳 養骨龍 水煎加乳香沒藥服

脫胎丹 百三十 治三十六種風症

紅朮 四兩 羌活 獨活 黃連 山梔皮 各五兩 砂

甘草 各三錢 瓜子 斗斤 大皂莢 六兩 共研勻水煮

一晝夜微火炒乾加樟冰各一兩五錢入確封固

打火三炷香取昇起靈藥四兩用青布包之以童

便浸山梔皮搗爲餅包藥七日取出研末聽用每

藥三厘用姜一片荆芥一撮泡湯下七日後身發

癢煎白芨湯飲之則止再服苦參丸收功

解圍元藪 卷四 養龍湯脫胎丹 九

苦參丸 百三十一

苦參三筋剉片童便浸七日以長流水漂淨曬乾加

甘草 黃連 山梔各三兩共爲末水法丸每服百

丸酒下日進三次

定風酒 百三十二 治痛風寒濕痿困諸症

檀香 羌活 防風 牛膝 杜仲 芍藥 當歸

木瓜 天麻 白芷 川芎 麻黃 陳皮 荆芥

半夏 黃芩 官桂 蒼木 首烏 各一兩 沉香

木香 乳香 沒藥 血竭 紅花 各五錢

右均作三貼。用無灰酒一罈。入藥一貼。封固隔湯煮五七沸。不拘時隨量飲。

碧霞漿 百三

羌活 獨活 白芷 川烏 細辛 菖蒲 蒼朮

風藤 苦參 當歸 防風 升麻 藁本 蒺藜

荆芥 木瓜 薄荷 茄根 防己 天麻 川芎

射干 麻黃 水萍 胡麻 萎蕤 首烏 木香

檀香 沉香 仙靈脾 威靈仙 蛇床子 藜蘆

金銀花 羊躑躅花 各五錢

解元元藪

卷四

苦參九定風酒碧霞漿

十

酒漿一罈。入藥五兩。隔湯煮透。俟冷。每飲一盃。避

風二時。朝夕飲。

無憂酒 百四 治濕痺諸般腫痛

防風 牛膝 羌活 鼈甲 炙 虎骨 炙 松節 蚕沙

白朮 各二兩 草薢 當歸 各三兩 秦艽 四兩 蒼耳子

枸杞 各四兩 茄根皮 八兩 杜仲 一兩 紅花 藁本

香蛇 各一兩 酒漿一罈。入藥四兩。煮熟。隨量飲。

甘醴 百五 治麻痺不省人事

羊躑躅花 一兩 北紅棗 五十枚 風藤 二兩 燒酒 五六碗

共入罈內。糠火煨。飲半小盃。令人昏迷。一週時。酒未完而病已脫。

神仙酒 百六 治痛風遍身疆腫及半身不遂併

外廣瘡寒濕皆效

開羊花根 三斤 生姜 四兩 紅棗 六兩 醇酒 二十碗

酒漿 十碗 將藥浸入酒內煨熟。去渣。臥時服一小杯。

烏茶酒 百七 治痛風痺症癘風疔瘡黑腫癰瘻

等症

烏茶草 即七葉連根草 當歸 五加皮 川芎 生地

解元元藪

卷四

無憂酒甘醴神仙酒

十一

芍藥 升麻 白芷 防風 各二兩 甘草 五錢 元參

蒼耳子 各三兩 烏藥 羌活 獨活 前胡 秦艽

金銀花 開羊花根 各一兩 千金草 即麻草乃首頭香。糯米菊。回回草。二兩

好酒一罈。入藥隔湯煮透。隨量飲。醉醒痛止。

推雲酒 百八 又名馮夷瓊漿 治紫雲疔瘡癰

困麻木剝割不知者

川烏 三兩 苦參 羌活 防風 胡麻 甘菊

荆芥 風藤 連翹 粉草 白芷 黃連 當歸

川芎 黃芩 芍藥 牛膝 獨活 姜蚕 蟬殼

生地 首烏 威靈仙 金銀花 各五錢

右均作二貼。用酒漿一罈入藥一貼。密封蒸之。每日三進。每進一盃。重者四罈全愈。輕者一料。飲酒時以藥湯頻浴為妙。藥湯方備下。

浴藥方 百二十九

菊花 乾荷葉 藿香 白芷 甘松 麻黃

沙參 各等分為末。每水一桶入藥末三錢。加桃柳

枝各一把。煎四五沸。睡時于無風處熱洗。久出忌

猪羊肉房事勞役。惟鯁鱷烏魚白鴨。啖之方効。

解圍元藪 卷四 烏茶酒堆雲酒浴方 七

治冷痛麻風 百四十

開羊花根 四兩 北紅棗 一斤 燒酒 五斤

右藥酒共入罈封固。煮一日。每飲一小盃。一週時醒頓愈。

苦參膏 百四十一 治大麻風癩癧癰瘰癧等症

新鮮苦參十觔。剉片。老酒一罈浸之。春五夏三秋七冬九日。取出曬乾為末。加紫萍末五兩。用蒼耳草自然汁十碗煎熟。加白蜜五六觔。同煉成膏。入參萍末和勻。磁瓶收貯。每用一匙。以白湯或酒化下。

仙黃花膏 百四十二

三四月間收羊躑躅草。連根搗取自然汁。煎煉。漸加白蜜成膏。量加射香冰片松香。收貯磁瓶。每服一匙。酒下。昏沉一二時。醒後自覺爽快。其風癩麻痛頓愈。

葦莖膏 百四十三

六七月間收葦莖草。水洗淨。拭去毛刺。搗取自然汁。文火慢熬。不住手攪之。勿令粘底。加白蜜煎煉。熟加當歸 蘇木 紅花 乳香 沒藥 血竭 木香 沉香 檀香 射香 冰片 姜蕤 各等分為末。

解圍元藪 卷四 冷痛麻風苦參膏仙黃花膏 七

煉成膏。磁瓶收貯。每用一匙。白湯下。一方取蒼耳汁對分煎之亦好。

鉛汞膏 百四十四

治風癩血枯手足攣攣身肉乾惟骨瘦如柴者。

蘇木十觔研碎。以水三四桶煎。試滴水不散。去渣。加紫草二觔。當歸紅花各一觔。剉碎入內。再煉去渣。再加乳香 沒藥 血竭 沉香 檀香 香蛇 人參 射香 各等分為末。白蜜二觔。同前煉成膏。收貯。任服。

百花膏 百四十五

透骨草 忍冬藤 蒲公英 鶴虱草 九龍藤

野天麻 旱蓮草 半枝蓮 地楊梅 希莪草

蒼耳草 紫地丁 地錦草 旱辣蓼 大小青

薄荷葉 靈芝草 魚腥草 見腫消 血見愁

淡竹葉 南天竹 枸杞頭 橘樹頭 枳椇葉

五茄葉 榜骨木 石楠頭 地蜈蚣 扁蓄草

馬齒莧 野芥菜 蛇床葉 長青草 慎火草

太湖葱 各等分 搗汁煎 加蜜煉成膏 再加沉香

解圍元藪 卷四 蒼蒼膏 鉛汞膏 百花膏 古

檀香 冰片 射香 各等分 爲末 入內收貯 磁瓶

勿泄氣 每服一匙 酒下 日進三次 脩合時 忌婦女雞

犬見

烏飯膏 百四十六 治大風癱曲者

南天竹 卽名烏飯時山 春夏收其枝葉 秋冬取其根

皮水 熬成膏服

太乙神漿 百四十七 治諸風癱大症

肥蟹十二隻 雌雄各半 去垢淨 剝爛入磁瓶內 好嚴

漆三十六兩 入內念咒六遍 以雲鶴馬包封 埋陰地

喜神方向 七七 日取出 日飲一杯

咒曰

天靈地靈 天地清寧 神仙和合 萬氣本根

祛邪療病 永保長生 吾奉太上老君天醫使者 誓

四聖膏 百四十八 治手指攣曲不舒 節間疼痛 攤在

紙上 貼之 漸漸痛止 伸直

姜汁 葱汁 各二碗 線膠 四兩 同煎煉 再入草烏末 四

兩 爲膏 如絞葱汁 須加火酒 再入乳沒 各一兩

五灰膏 百四十九

解圍元藪 卷四 烏飯膏 太乙神漿 并 四聖膏 古

桑柴灰 貓竹灰 荳棋灰 栗柴灰 蕎麥灰 各

淋取濃汁 文武火煉 俟凝 加明礬 一塊 礬灰 一塊

礬砂 白丁香 白附子 巴豆 附子 斑毛

各等分 爲末 和勻收貯 如冷麻大風腫塊 併手足

拘攣者 以刀刺破 皮膚塗之 爛去惡肉 以除毒根

黑雲膏 百五 大風大癩 紫黑腫塊 瘡癬惡形 塗

之 旦夕脫光

當歸 川烏 川椒 飛鹽 各二兩 赤芍 白芷

羌活 木香 姜蚕 杏仁 各五錢 黑豈 一升 芝蔴 二

蓖麻子一百 蒼耳子半升 白附子一兩 五錢

各為末和勻以棉花油四兩拌之入磁罐內築實以青槐枝數條插內通底生布包瓶口將地掘一

穴埋一潤口矮瓶在內將藥瓶倒入瓶內鹽泥封

固上面以棉花核二斗堆在瓶上以桑柴二百觔

燒半日去柴留炭火煨至午間則油滴在下瓶內

俟冷取出加雄黃 乳香 沒藥 血竭各五錢

牛黃一錢 射香二錢 共研末加入

通天膏十五 凡大風癩瘡癢疼乾爛疥癬塗之

解圍元藪 卷四 五皮膏 黑雲膏 通天膏 六

立愈

大風子四斤 川胡麻 蓖麻子 土木別 杏仁

山賴各二兩 芝麻四合

右搗爛入瓶內築實以柳枝三四根插着瓶底掘地潭埋一大罐外以水灌泥潭將藥瓶合在上口上以炭火打三炷香燻油下溜

九子油膏 百五十二

蛇麻子 瓜蒞子 牛旁子 棉花子 木別子

蓖麻子 胡麻子 大風子 各等分 右搗和入瓶內

倒轉炭火燻油加雄黃射香樟腦末塗癬瘡

長肉膏百五 如風瘡爛潭以濃茶洗淨將膏塞入不日長平

銀硃 雲母粉 象牙末 各等分 以雞子清調之

坎離膏百五 凡大風垂癩久爛無皮以甘草湯洗淨搽之三四日即愈

血竭三錢 冰片一錢 輕粉 水銀各二錢 大風子肉一兩 白占五錢

右研至不見星加熬熟香油調加射香一分冰片二分 如治鶴膝風再加開羊花根二兩

解圍元藪 卷四 九子油膏 長肉膏 坎離膏 七

川山甲末六錢

三白膏百五 凡風癩癬瘡乖爛塗二三次即愈

大風子白肉 冰片 水銀 車米 和研不見星

小春膏百五 凡痛風寒濕大風腫塊貼之如神

桐油一觔煎滾即下黃丹四兩隨下川山甲一兩又

下蜈蚣十條漸投白鷺毛二兩血餘五錢化盡傾水

內俟冷收盃內隔湯化開入乳香 沒藥 血竭

車米 韶粉 等末各一兩

青白膏百五十七

用白松香 青箱子各等分以葱頭同打為餅塞入爛潭即生好肉長平

二聖膏 百五十八

風瘡爛潭深久者以濃茶同甘草煎洗淨用杏仁七十粒半夏半粒同搗細塞之俟肉長平用搽藥收功

雁來風 百五十九

黃占 川山甲 炙車米 大風子肉 研細菜油調

塗日易

佛手膏 百六十

治諸風黑紫瘡核併手足腫大惡

瘡脹濕久爛者

班毛 七箇 巴豆 粒七十 杏仁 粒二十 砒 一錢 盆硝 一兩

紅娘子 箇十四 黃占 韶粉 各五錢 硫 丹 各三錢 瀝青

膩粉 各一兩 菜豆 一合 槐角 三條 清油 四兩 血餘 五錢

右以油煎髮化次下紅娘子巴豆槐角等逐件俟

焦枯漉出方下硫硝丹粉不住手攪滴水成珠為

度先將針刺破腫塊以膏貼之。二三日愈。

干槌膏 百六十一 治大風腫脹黑瘡手足脹大者

杏仁 江子 蓖麻子 各六錢 銅青 松香 各四兩

先將前三味搗干杵加後二味再搗成膏如乾加香油少許放水。中忌見火。

呼膿膏 百六十二

蓖麻子 大風子 白肉各搗干杵加松香再搗成膏

加乳香 沒藥 血竭 車米 射香 各少許 貼之

水成膏 百六十三 治諸風破爛及面手足汚瘡能令

生肉

陳皮 八兩 陳米 半升 藿香 馬蹄香 各一兩 射香 一錢

右為末冷水調敷有膿處如破用槐枝湯洗淨敷之

解圍元藪 卷四 雁來風佛手膏手槌膏 呼膿膏水成膏

升平散 百六十四

紫萍 黑豆 升麻 麻黃 各等

右為末酒糊丸菜豆大每服五十九酒下臨臥服

取汗三日再服三次愈。

雲翎散 百六十五

白鷺毛炒鍊色為末老酒下三錢再飲酒以醉為度

取汗必滋粘者三日後腫塊漸退。

雨霖丹 百六十六

當歸 川芎 沉香 甘松 各一兩 木香 一兩 乳香

沒藥各五錢 槐實 紫萍 白花蛇一條去皮 麻黃十筋去節根 右為末麻黃膏丸彈子大每服一九

水煎膏 麻黃酒磨下臥半日避風

雷公散百六十七 如服丟子丸當常服此以免害目

雷丸二錢六分 丟子肉一兩 板榔一兩 無名異二兩

錫灰五錢 右為末每服五錢酒米糊亦可壯人半

月一瀉瘦人二十日一瀉

牙霜丸百六十八

牙皂末一兩 巴霜三錢五分 飯丸菜豆大白湯下二九

解圍元藪卷四 升平散 雲翳散 雨霖散 震散 牙霜丸

利下黑物

紅玉散百六十九

東丹 象牙末各五錢 乳香 沒藥各一錢 孩兒茶

車米 韶粉 赤石脂 爐甘石煨 寒水石煨各二錢

白占一錢 血竭三錢 研末輕搽

珠雲散百七十

雲母粉 眞珠粉 敗龜板煨白 乳香 寒水石

象牙末 坯子粉 研細末用

輕蛤散百七十一

五倍子 車米 等分研末用

半夜散百七十二

用未生毛小鼠搗爛搭在壁上風乾焙黃香研細土別 蟲灰鑽糞蟲灰白占各五錢搽之一夜長平

四魔粉百七十三

硃砂 斑毛 江子 銀油 和為細末凡風症高

腫紫黑成塊堅頑者將楮葉擦損苦皮以藥搽上

貼膏即爛去

香兒粉百七十四

解圍元藪卷四 紅玉散 珠雲散 輕蛤散 半夜散 四魔粉

射香一分 兒茶五錢 冰片二分 輕粉 胎骨灰各二錢

研細摻臭爛深潭妙

香珠散百七十五 治大麻風足底穿爛者

木香 硃砂 車米 赤石脂煨 東丹 各等分研

細先以茶葉川椒煎湯洗淨搽上外用綿紙用麵

糊粘上七八層不數日肉長平

四聖散百七十六

牛黃一錢 射香三錢 胆礬四錢 明礬五錢 右為末香

油調如上身病重以二分擦手心一分擦足心下

身重反是。每度以四次均擦。三四日則吐出臭黑水。七日不可吃鹽葷。二七日以雄雞約一觔半重一隻煮熟。醬拌食之。其汁煮飯吃。三七日。用防風荆芥 蒼朮 石斛 蛇床 羌活 白芷 煎湯洗浴。四七日服。蠶礬丸半升。病愈。

香蒲丸 治大麻風諸藥不效者。服此除根。

松香 二十兩 水 草烏 八兩 光烏 四兩 此二味用水二

泥 鮮菖蒲 三斤 煎濃 防風 荆芥 蒼朮 甘草 各

兩 用水一桶 煎濃 先將三烏汁煮松香乾。次將防

風等汁煮松香乾。又將菖蒲汁煮松香乾。又將好

醋一碗煮松香乾。熬如鰍眼看。火候特起。俟冷。浸

水內。出火毒。再以火微溶。取起。晒乾。搗研末。上

部用陳米醋丸。下部用麩糊丸。起初三日。每服

一錢五分。次三日。每服二錢五分。日進二次。第七

日再起。周而復始。空心酒下。

五死加減

皮死麻木不仁。加天麻 二兩 屬脾

肉死刀割不知。加首烏 四兩 屬腎

解圍元藪 卷四 香珠散四聖散香蒲丸 三

血死臭爛成膿。加當歸 四兩 屬心

筋死手足指落。加葶藶 四兩 屬肝

骨死鼻梁崩塌。加骨碎補 二兩 屬肺

五經受病加減

肺經受病。面如紫藍。加養蚕 一兩 脾經受病。遍身紅

癬。加蒼朮 四兩 肝經受病。骨節筋痛。加皂角 二兩 腎經

受病。足底穿爛。加乳香沒藥 各五錢 心經受病。目中流

血。加黃連 一兩 虛弱人。加人參。和前加減。用酒煮藥

吞前丸藥。上身用黃芪 三錢 下身用牛膝 七錢

解圍元藪 卷四 五死加減 五病加減 三

疼痛不上。加乳沒 各三錢 水四碗煎。二碗服

擦方 百七 阿魏 二錢 樟腦 三錢 輕粉 四錢 大風子 一兩 花椒末

一兩 生桐油調。布包藥擦。生眉方 百七 治落眉

皂角 焙 鹿角 煨 灰 等分爲末。用生薑搗勻。頻擦眉稜

骨上。則眉漸生。治口眼喎邪神效方 百八

大全竭 酒洗淨。鹽焙 白姜 蚕末 七 竹節 白附子末 七

錢 鹿角末 七 錢

錢

稱准和勻每服一錢五分酒調服至三日加五分

附雄散百八十一

至附子一隻雄黃 白附子 樟冰各二兩 白芷

杏仁 草烏 南星 半夏 牙皂 蛇床子各五錢

白芨 白蘇 川椒各一兩 川烏 車米 山茨菰

五倍子各七錢 蝎尾 姜蚕各一兩 蟾酥三錢

右為末以姜蘸擦斑剝腫塊上須于密室內擦如

見風蝕之則病反凶如手指足趾皮肉麻木用藥

末一兩白芨一兩和勻先以秦椒透骨草煎湯擊

解圍元藪 卷四 醫方生身良藥神效方 附雄散

洗麻處再用栢葉薰蒸方用火酒調藥炖為膏子

搽上漸平復

掃雲丹百八十二 治遍身不可忍者

用草烏末生姜搗汁調麻布包擦自愈

白雄散百八十三

雄黃 一兩 白附子 五錢 皂莢炙去皮弦 筋三錢 共為末如

黑腫斑塊赤癬以老薑蘸藥一兩擦 若鷲掌雁

來等風用煨薑蘸藥擦 如爛風瘡用蟹黃調塗

極妙

紅玉散百八十四

文蛤 白芷 當歸 白芨 大黃 草烏各一兩

乳香 沒藥 兒茶 血竭 雄黃 韶粉

東丹各三錢 右為末如痒塊斑腫者香油調 黑塊

頑頓者姜汁調擦極妙

消斑散百八十五 去面上一切斑駁

白附子 花蕊石 川椒 南星 五倍子 牙皂

山茨菰 各等分為末姜汁調臨臥塗之

飛白散百八十六

解圍元藪 卷四 掃雲丹自羅散紅玉散 消斑散

用老姜切開作井將砒末夾在內以線緊縛定用山

黃泥封固晒乾入火煨候內姜收盡砒末取出將斑

毛末乘濕揩拭于上病人浴出以穿山甲刮去塊上

苦皮用此姜重擦則成瘡忌見風七日脫光重者三

次除根

消毒丹百八十七 又名太白散治牛皮血癬瘡更妙

明礬 十兩 白砒 五錢 蛇床子七合 硫黃 五兩 海螵蛸

五兩 各研末先將砒礬漸摻入鍋內俟礬化枯收

起又將些摻下如此待枯盡方同下三味和研細

○如血風臭穢成片濕腫黃水淋漓或膿血粘漬
太重加核桃殼灰一兩以菜油調塗四五日脫光

舒攣湯百八治手指攣曲者

薛荔枝葉梗每筋加川椒二兩側柏葉四兩煎濃汁

久洗自然伸直 又名過水龍須古橋上生者

虎跑泉百八

虎杖草 葶藶草 蒼耳草 防風 升麻 荆芥

金銀花 紫蘇 鶴虱草 五臺頭 煎汁洗浴

蘭湯百九

解圍元藪 **卷四** 飛白散消毒丹舒攣湯 三 虎跑泉

大風子殼 白芷 防風 荆芥 苦參 首烏

蒼耳子草 麻黃 川椒 葱 煎湯久洗取汗

避風

烏龍湯百九

蒼耳子一斗 烏魚一箇重 二味同煮取魚食之以

湯洗浴病重者二三十次即愈

歌曰 仙苗蒼耳野園中 非比尋常草類同 治

風用此如神效 救人真有大奇功

仙授方百九

凡風癘惡疾多因嗜欲勞傷動氣血熱汗泄不避

氣使淫氣與衛氣相併則肌肉不仁腑熱不利故色

敗皮癢鼻梁崩壞或自不仁極惡之業所致久則身

白皮脫如蛇皮之狀 用桑枝灰一斗熱湯淋汁洗

頭面次用大豆及毛豆漿添熱水三日一浴一日一

洗外用側柏葉蒸曬乾白膠香等分蜜丸梧子大每

服三十九白湯下日進三次隨浴隨服

五草六木湯百九

歌曰 椿槐桃柳乾茄柯 桑穀天麻總一鍋 蒼

解圍元藪 **卷四** 蘭湯烏龍湯仙授方 三 五草六木湯

耳金銀簾辣蓼 久年風癘自消磨

濕風痛風湯百九

石楠葉 馬鞭草 辣蓼 煎湯浸洗即愈

三宣湯百九

麻黃根 地骨皮 草烏頭各二兩 加朴硝二兩 研勻

右每用一兩水一桶椒一合葱三十根艾一兩煎

十數沸加入米醋一碗去查于密室中先以悅巾

袍搭四肢候溫即澡洗之令汗透身面如珠就於

室中睡一時汗解方出五日一浴

八葉湯 百九十六

桑葉 荷葉 地黃葉 皂角葉 蒼耳葉 蒟葉

菖蒲葉 首烏葉 各曬乾燒存性。淋汁搗洗

倒陽方 百九十七 又名石蚕散 凡大風瘡腫斑黑

頓消。必須戒色。方可保命。

用石蚕生研為末。酒下一錢。陽莖即痿軟不舉。

蚰蛇油 百九十八

用蚰蛇油塗在陽莖上。即痿軟不舉。

敗猪血散 百九十九

解圍元藪

卷四

風痛風湯三寶湯八寶湯

天

倒陽方 蚰蛇油

臘月內取殺猪流血盡時滴出者。貯陰自乾為末。以

猪腦調為丸。梧子大。飛鹽酒下三錢。則一月不舉。

生瓜散 二百 又名敗花散

諸菓皆先開花而後結實。惟絲瓜則先結而後開花。

若開狂花。則連瓜爛去。若好花。則花謝瓜長。看其蔓

上若有狂花謝下。即採此瓜乾之。各敗花果。以此為

末。與人服之。則陽事不舉。非惟絲瓜。但是先生本身

而後開花之物。服之皆可痿陽。

蒸法 二百零一

將地上掘一深坑。長六尺。濶三尺。深二尺。以桑柴火或炭火燒通紅。酒糟拌礬糖各五斗。先於甑內蒸熟。乘熱投于坑內鋪平。即用扁柏葉鋪厚。上以草薦蓋之。再攤一席。令病人臥在席上。以被蓋厚。勿使通風。睡一二時。底下火氣透過糟糠。焮其柏葉。自然出臭汗。遍身通泰。半夜後漸去被。待汗自乾。方出。至明日于無風處。以草木湯浴洗去其汗穢。如病人強壯。可服防風通聖散一二碗。或青風藤膏一二錢。方入蒸池甚妙。如虛弱者不可服藥。止蒸可也。

解圍元藪

卷四

敗猪血散生瓜散蒸法

天

熨法 二百零二

用晚蚕沙和鹽炒熱。布包。但有腫塊處。乘熱熨之。冷

即易。以醋拌炒尤妙。初起者即退。如無蚕沙。即太湖

沙泥。或珠子無名異。醋炒熨之亦好。

洗熏法 二百零三

川椒 川烏 胡葱 草烏 煎濃湯。加雄黃。石黃

末。浸洗。攪指一日。用側柏葉 松節 辣蓼 燒烟

熏半日。將乳香 沒藥 血竭 礪砂 川烏

草烏 射香 樟冰 白芨 為末。減水調煎一二

沸塗在癰指上。七日不可見湯。其皮自然退下。再
熏二三次即愈。

治癰瘡法二百洗方

威靈仙 首烏 菖蒲 甘草 防風 荆芥

劉寄奴 苦參各一兩

右剉碎入甕。滿水煎濃汁。清晨令病人飲食。晷飽
將藥湯放缸內。病人坐於缸上。架子安穩。令湯氣
熏之。如冷以燒火大磚投下。使熱氣冲上。如此三
四次。方入湯中洗澡。須在小密室不通風處。方好。

解圍元藪

卷四

熨法洗熏法治癰瘡法

三

早晨浴至午間方止。即以擦藥五錢。半于兩手心
擦。摩半于兩足心。擦摩以右摩左。以左摩右。手足
頻易摩之。午間浴罷。摩至申酉時。手心足底如火
熱。用紙條網縛兩手。足底心緊包。以免氣散。即吃
煎藥一大碗。如此縛定。三日不許解開。亦不吃鹽
醬。不可見風。如見風則久不肯變色。亦不肯退斑
痕。止吃煎藥一碗。第四日以生雞湯開腥。守戒七
日全愈。

擦方二百
零五

水銀一錢 明礬各八分 和研不見星。用麻油
調厚。再久搗之如泥。

煎方二百
零六

防風 荆芥 山梔 羌活 獨活 連翹
前胡 川芎 當歸 木瓜 花粉 黃連
風籐 白芷 皂刺 冷飯團 各等分。姜棗水煎。
服三服。分三日服之。

雙根沙皮飲二百 治初癰瘡 又治結毒下疳

蛙幹

解圍元藪

卷四

擦方煎方雙根沙皮飲

三

荆芥根二兩 麻黃根三兩 晚香沙五錢 白蘚皮
五加皮各三兩 防風 當歸 大黃各一兩 牙皂九片
天花粉 連翹各一兩 羌活 獨活各七錢 土茯苓一斤
右均作五貼。水煎加酒一半。溫服。先服十貼。

丸方二百
零八

金銀花 荆芥穗 防風各四兩 舊琉璃灰二兩 共為
末。熟地四兩 酒煮。再加冷飯團十兩 搗成糊。方加藥
末。為丸。桐子大。以煎藥送下。五十九。其冷飯團取
白肉為妙。

煎方二百零九

當歸 防風 風籐 生地 熟地 荆芥

木通 甘草 天麻 米仁 蜂房燒黃 桑寄生

赤芍 皂刺 金銀花 白蘚皮 大劑每貼加冷

飯團一兩 水煎送丸藥下 如頭面多加川芎

身上多加升麻藁本 手臂多加五加皮 脚腿

多加牛膝木瓜

七聖散二百

金銀花四兩 杏仁十四粒 皂角子七粒 牙皂七片

解圍元藪 九方煎方七聖散

姜蚕十四條 蟬蛻二錢 土茯苓一斤 水四碗煎二碗

作二三次服。輕者二貼。重者三四貼愈。

白通湯二百一

白朮 木通 木瓜 前胡 柴胡 羌活 獨活

花粉 金銀花 風籐 牛膝 甘草 陳皮

角針 蒺藜 薄荷 米仁 蒼耳子 皂角子

各等分每貼加土茯苓一兩。姜棗水煎服。

荆神飲二百 治癩瘡初起

荆芥穗四兩水五六碗煎去三之二。濾清服。又以一

筋煎湯先熏後洗。不過三四次即愈。無毒不發。

火珠漿二百 治初生癩瘡

用蛇卵草取自然汁。沖酒溫服數碗。一連四五次脫

愈。

黃龍髓二百 治癩瘡初起

取白頸蚯蚓于盆內搗爛加水研。淘澄清。取其清水

日服一次。二三日愈。

杞頭湯二百 治癩初起即服敗毒散三四貼

以枸杞頭二三筋煎濃湯熏洗。二三次愈。

解圍元藪 自通湯荆神飲火珠漿

番白飲二百

番白草 紫花地丁 當歸 木通 皂刺 風籐

皂角子 牛旁子 蛇床子 姜蚕十二個 桑皮

米仁 每貼加土茯苓四兩 水酒各半煎服。十貼病愈

八仙湯二百 兼治廣瘡結毒

人參三分 米仁一錢 花粉一錢 皂刺廿個 蜂房七孔

浮麥一握 冷飯團三兩 琉璃灰七分 水煎溫服七

貼病愈。

三川神應湯二百

川芎 牛膝各五錢 川黃連 土黃連各一錢 先以飯團一筋半。將竹刀刮去皮。止用白肉。不用黃色。打碎。不見鐵器。用水四大碗。煎至二碗。去渣。入藥。再煎去一碗。又用雄猪夾肝煎油三匙。入內。服三四貼止。

三分散二百九治癘風初起。

用黃花酒拌九蒸晒為末。温酒送下。三分酒儘量飲。麻木一晝夜。隨服補中湯三貼。第四日照前。又服三分。又服補中湯三貼。如此三次。初服發瘡。二服出水。

解圍元藪

卷四 番白飲八仙湯三川神應湯

盡乾。三服脫光。永不再發。

黃白大丹二百二十治全上。

用槐花半筋。以滾湯泡去石灰。焙乾為末。加白礬四兩。酒糊丸。桐子大。每服五六十丸。酒下。日進三服。服盡病痊。

坎離丹二百廿一

明雄黃一兩 明礬二兩 共為末。每服五分。熱酒下。如難服。用黃米糊丸。桐子大。服三七日。全愈。永無毒發。

棗靈丹二百廿二

敗龜板灰 馬薺草 地骨皮各一兩 槐實 川椒

油胡桃各一兩 如瘡大。加樺皮末一兩 右為末。北紅

棗丸。梧子大。每服三十九。茶下。七日愈。

三母五子丹二百廿三

益母草 知母 貝母 槐子 蒼耳子 蔓荊子

皂角子 牛旁子 等分為末。每一兩。加虎脛骨錢

煨存性。一錢。和白酒糊丸。桐子大。每服二十九。温酒下。

解圍元藪

卷四 三分散黃白大丹坎離丹 棗靈丹 三母五子丹

定痛飲二百廿四治筋骨疼痛。久不愈者。

茜草 麻黃 烏藥一根 細芽茶三錢 槐子炒焦

川椒各五錢 魚膘腸三錢 米粉和炒成珠 乳香一錢 生姜五片

葱五根 煎服。三劑全愈。

七神湯二百廿五

蜂房三錢 姜蚕二錢 角子五箇 淡竹葉廿片

燈心七寸長 土茯苓四兩 用蝦蟆一隻。刮去腹中

垢。風乾。切四塊。每貼下一塊。煎服。如服蝦蟆。左前足則愈。左手病。服左後足。則愈。左足病。右亦然。一

二貼發起三貼勢定四貼收功

歲桃漿二百廿六治癩瘡初起

用核桃按歲一枚取白肉監排砂鍋內每桃上放細茶一撮以酒煎嚼桃飲酒速愈

胡麻飯二百廿七

大棗二十一枚去核每枚入官粉填滿每日以三枚和米半升煮飯食之七日棗完瘡愈

蠟礬丸二百廿八

開羊花油拌九蒸晒草烏酒浸炒白礬溶化各等分黃占溶化各等分

解圍元藪 定痛飲七神湯歲桃漿 卷四 胡麻飯蠟丸

右為末加蜜少許丸荀子大每服五六十九酒下

糖岸散二百廿九

缸中岸半斤黑沙糖半斤拌勻分三次服又以雄黃研飛髮灰枯礬各五錢共為末每服三錢酒下

天塵丹二百三十

頭垢不襍婦人者雄黃各二錢硃砂五分均打作十八丸

先服一半七日退光不愈再服完則定好酒下

保真飲二百卅一

精羊肉四兩煮爛取汁六七碗入蟬殼四兩麻黃春秋

一兩冬用二兩夏用 再煮存四碗旋服完吃羊肉取汗昏沉一日醒後三日皆退盡無毒如筋骨痛者加上好點紅川椒一兩不痛不必加

虛鳴湯二百卅二

蟬殼四兩仙遺糧半斤荔枝草一兩麻黃春夏用七錢秋冬用二兩

作一貼水三碗煎一碗服三四日能光瘡多凶者不過三服即愈不發無毒

乳酥湯二百卅三

精羊肉一觔用水八碗煎至一半取起以酒送下肉

解圍元藪 糖岸散天塵丹保真飲 卷四 虛鳴湯乳酥湯

存汁加蟬殼四兩川芎一兩威靈仙一兩麻黃春用九錢

裏頭必出臭汗用荆芥湯洗浴其瘡俱發出不過三四日能光無毒不發

胡麻飲二百卅四

金銀花 赤茯苓 明天麻 胡麻各一兩 防風

荆芥 羌活 獨活 姜蚕 連翹 五加皮

地骨皮 當歸 黃芩 黃連 杜仲 牛膝

黑牽牛 米仁 角刺各五錢 均作十貼水煎服每

貼。加土茯苓一兩。

肉核油二百

防風 荆芥 首烏 花粉 苦參各三 冷飯團一

肥皂核肉四兩 猪膽油四兩 水一碗煎至半作五

六次服。如瘡多不效。再一服全愈。忌鐵器。

治結毒方二百

硃砂五錢 雄黃各七 硫黃各七 乳香 沒藥各二

共為末。以黃占一兩。溶化為丸。菡子大。每服四厘

土茯苓四兩煎湯下。日進三次。

解圍元藪 卷四 胡麻飲肉核飲治結毒方

又方二百

白砒四兩 雄黃一兩 黃占一兩 牛黃三分 共為末作

丸。重三分半。空心土茯苓煎湯下一丸。

雷公散二百 卽再造散。

鬱金 木香各五 大黃 朴硝 白丑半生 角刺各

右為末。每服五錢。清晨面東酒下。量人虛實病勢

輕重緩急用之。服此之後。或蟲如魚腦。魚腸。惡臭

之物而出。忌食一切毒味。發風動氣。鮮腥鹽物。半

月。其午馬。驢。雁。雉。禽獸。糟物。熏炙之類。終身忌

之惟鹿麝可食。

醉仙散二百

胡麻 牛旁子 蔓荊子 枸杞子各一 白茯苓

苦參 防風 瓜蒌仁各五 荆芥二兩 蛤粉 全蝎

藿香各七 射香 乳香 沒藥各六 車米一兩

壬子半斤 右為末。每服二錢。酒下。日進三服。先服

再造散。次服補劑。元氣復還。然後復此。忌鹽醬

油。醋。魚。椒。果子。燒炙之物。止可食淡粥。時菜。尤忌

茄。芥。惟烏。梢。蒸食最好。服之。身如醉。齒中出血。或

解圍元藪 卷四 治結毒方雷公散醉仙散

臭水。乃見功。

神仙紫花丸二百 服前二方完。卽服此方。三年

方保無虞。

白花蛇一兩 首烏 威靈仙 荆芥各四 麻黃二錢

胡麻一錢 蛇床子二錢 將六味剉碎。共蛇用無灰

酒一大碗。浸一夜。去蛇皮骨。通晒。乃還原酒內再

浸再晒。酒盡方止。為末。加人參一兩 木香 沉香

各二錢 當歸七錢 天麻 牙皂各五 麝香三錢

乳香 沒藥各一 雄黃 辰砂各五 肉豆寇一箇

定風草二錢五分還瞳子一兩俱不見火為末防風

羌活 甘草 細辛 川芎 獨活 蒼朮

芍藥 枇杷葉 蒺藜 金銀花 五加皮

白芷 苦參各五錢 胡麻 麻黃 牛膝 草烏

川烏 白附子 菖蒲各二錢五分 各為末用瓜子二

筋去設入瓶內以酒拌濕箬紙蜜包隔湯煮一日

夜黑爛梓成膏分作二分每分入第一號藥末六

錢第二號藥末八錢第三號藥末一兩五錢和勻

糯米飯搗膠丸桐子大每服一十九加至五六十

解圍元藪

卷四

神仙紫花丸

聖

丸雞鳴午夕三時各一服茶下 忌勞碌房事

醋糟鮮海味水果辛辣之物

芥硃丸二百四一治紫黑癰爛等症

青萍 荆芥 苦參 土硃 白花蛇各四兩

右為末皂莢熬膏丸桐子大每服六十九茶下毒

從毛孔中出

奪命丹二百四二又名九龍丹 治諸大風

草烏 首烏 沒藥 黃芩 禹餘糧 威靈仙

疾藜 菖蒲 天麻 草麻子各一兩 雷丸 川椒

荆芥 胡麻 麻黃 牛膝 白花蛇 赤芍 全蝎

烏梢蛇各一兩 乳香 車米各三錢 蜈蚣 一條 羌活

風籐各五兩 木別子一兩五錢 蒼朮 瓜子各半斤 皂莢一斤

無灰酒浸一夜去酒以新汲水一碗採取汁銀磁

器內熬膏丸桐子大每服六十九茶下面足覺痒

乃藥力至不月全愈

活血丹二百四三治筋骨痛甚

木香 乳香各一兩 射香 皂角各三錢 大風子 四兩

右為末飯為丸芡實大每服五十九茶下加至七

解圍元藪

卷四

芥硃丸奪命丹活血丹

聖

八十九

羌活愈風湯二百四四治肝腎虛敗筋骨軟弱語言

蹇澁精神昏倦大能安養精神調理陰陽

羌活 甘草 防風 川芎 細辛 枳殼 熟地

人參 麻黃 薄荷 甘菊 當歸 知母

黃芪 獨活 白芷 杜仲 秦羌 柴胡 半夏

厚朴 防已 前胡 地骨皮 枸杞子

蔓荆子各三分 黃芩 茯苓 芍藥各四分 石膏 蒼朮

生地各六分 桂枝一分 水二鐘煎八分 天陰加

生姜五片。欲利加大黃三錢。欲汗加麻黃一錢。姜五片。春冬加半真。夏加知母石膏。秋加白朮。

防風通聖散 二百四十五

川芎 當歸 荆芥 芍藥 蒼朮 大黃 芒硝 滑石 山梔 石膏 桔梗 甘草 黃芩

薄荷 麻黃 連翹 各等分 共為末。每服三錢。酒下。

如飲片姜棗煎服。以渣曬乾煎湯洗浴。

加減通聖散 二百四十六 病甚者服之。

解圍元藪 卷四 烏藥順氣散 四三

防風 川芎 桔梗 枳殼 石膏 柴胡 黃連

羌活 連翹 生地 熟地 芍藥 當歸

薄荷 甘草 麻黃 滑石 黃芩 各三錢 芒硝 一兩

角刺 二兩 風藤 三兩 荆芥穗 五兩 右藥分作八服。

每服用水二大碗。煎八分。空心服。日進三服。五六

日後方服紫花丸。

烏藥順氣散 二百四十七 初起先服二十貼。

麻黃 陳皮 烏藥 各一兩 姜蚕 川芎 枳殼

甘草 桔梗 白芷 各一兩 乾姜 五錢 為粗末煎

服為細末。姜湯送下三錢。

五積散 二百四十七 不拘前後皆可服。

蒼朮 一斤 桔梗 十二兩 枳殼 陳皮 麻黃 各六兩 厚朴

乾姜 各四兩 半夏 二兩 芍藥 白芷 川芎 當歸

日茯苓 甘草 官桂 各二兩 共為末。每服三錢。姜湯下。

小續命湯 二百四十九

麻黃 人參 黃芩 芍藥 防己 桔梗 川芎

當歸 附子 杏仁 甘草 石膏 各七錢 防風 一錢

解圍元藪 卷四 烏藥順氣散 五積散 聖小續命湯

如中風無汗。倍麻黃 防風 杏仁 中風有汗

惡風。倍桂枝 芍藥 杏仁 中風無汗身熱不


惡寒。倍黃芩 加乾葛 桂枝 中風無汗身涼

倍甘草 附子 加乾姜 中風有汗不熱。加桂

枝 倍甘草 附子 中風六經混淆。或肢節攣

痛。麻木。加羌活 連翹

解圍元藪卷四終





醫華陀遺書

普陀後學

外科灰餘集

南
京
秀

自序

外科十法者。予歸宗普陀時所得也。予自普陀生長天都。五十有三載。業醫者凡三十年。爰著醫學心悟一書。詳言內症。梓行於世。而外科有未及。壬子冬。還歸普陀修行。適奉

聖天子廣發帑金修葺我

隄行宮。前後寺僧以及工作人等。不下數千人。其中病患不一。予為調治。悉痊。復有患背疽者。有患疔瘡疥癬者。投以膏散。不半月而收功。因思予在天都時。僅著內科。而未及外科。灰餘集之靈驗也。乃復會聚精神。參悟外科。青囊約以十法。而施治之道。莫善於漢華公

外科灰餘集 自序

之神方約而效以之傳世庶幾其有小補乎
新安江子耀舟見是書而深喜之遂捐梓付
之剞劂將見華公一書當與前醫學心悟並
行於天壤間也

雍正癸丑孟夏日吉

旦歸宗普陀善財

國彭自序

外科十法總目

第一內消法

第二艾炙法

第三神火照法

第四刀針砭石法

第五圍藥法

第六開口除膿法

第七收口法

第八總論用藥法

第九詳論五善七惡救護之法

第十將息法

外科症治方藥

發背

對心發

腎俞發

手發背



子部醫家類 續修四庫全書 3 反文卜

足發背

遠志膏

普救萬全膏

銀花甘草湯

陳艾膏

蟾酥餅

菊花甘草湯

芎芷香蘇散

烏金膏

防風湯

海浮散

火照散

芙蓉膏

化腐紫霜膏

衛生湯

深

半

透膿散

參芪內托散

理中湯

參苓白朮散

補中益氣湯

藿香正氣散

十全大補湯

六味湯

八珍湯

歸脾湯

香砂六君子湯

八味地黃丸

紫金錠

腦疽

對口

偏對口

鬚疽

發頤

時毒

大頭天行

加味甘桔湯

普濟消毒飲

井口疽

六

半

脇疽

肚癰

穿骨疽

魚口

臀癰

護心散

九龍丹

胡桃散

疔瘡

喉痺

纏喉瓜

纏舌喉風

乳蛾

舌衄

懸癧

腮癧

喉癧

走馬牙疳

牙癧

牙齦

齒衄

牙痛

喉疔

齒疔

加減安神丸

加減七味湯

四

三黃解毒湯

清胃散

葛根湯

瘰癧

消瘰丸

鼻痔

鼻淵

礪砂散

柳華散

療牙止痛散

射香散

加味道遙散

古拜散

聾豆抵耳

百蟲入耳

紅棉散

眼丹

崇症

平崇散

白禿瘡

麥錢散

五

粉刺雀斑

改容丸

破傷風

天麻散

跌打損傷

澤蘭湯

韭菜散

乳癰

天下第一金瘡藥

乳岩

瓜蒌散

太乙膏

附骨疽

伏兔疽

蛇頭毒

脫疽

臁瘡

香附餅

腸癰

千金牡丹皮散

懸癰

臍毒

內痔外痔

脫肛

國老散

田螺水

生熟地黃丸

下疳

楊梅結毒

忍冬湯

大麻風

赤白遊風

斷蛇酒

湯泡火燒

疥瘡 天泡瘡

鵝掌風
爛腳風

金蟾脫甲酒

當歸膏

麻黃膏 黃柏散

頑癩

百部膏

救自刎法

竹木刺入肉

花蕊散

瘋犬毒蟲咬

白芷護心散

候服砒毒

野菌毒

救自縊

救落水

壓夢不醒

搐鼻通天散

總目終

外科十法

第一內消法。內消者。腫痛初起。隨即用藥消散也。凡病瘡。癰發背。疔。疔毒。其初起。增寒壯熱。有似傷寒。而痛偏着一處。飲食如常者。蓄積有膿也。當初起時。膿尚未成。不過氣血乖違。逆於肉裏耳。外敷遠志膏。或貼普救的。全膏。內服銀花甘草湯。即時消散。若係疔瘡。急宜刺破。或艾灸腫處。搽上蟾酥餅。貼以萬全膏。內服菊花甘草湯。隨即平伏。菊花連根帶葉皆治。

十

疔瘡之聖藥也。其中亦有挾風寒而發者。宜先用荆。芷香蘇散以散之。隨服銀花菊花等藥。即可內消。務須及早下手。不可遲滯。
第二艾灸法。隔蒜灸法。勝用刀針。書云。不痛灸至痛。痛灸不痛時。凡治癰疽。疔腫。流注。及一切無名腫毒。以大蒜切片。安瘡頂上。用陳艾炷。安蒜上。香點灸之。其艾炷大小。看瘡毒大小。為取裁。若癰疽之大者。以蒜搗餅敷上。灸之不痛者。灸至痛而止。痛者。灸至不

痛而止。若內已有膿，即將烏金膏塗灸處。外用普救萬全膏貼之。爛開大口，卸却瘀膿，易收功也。若口不收，或腐肉不脫，洗用防風湯，敷以海浮散。外貼萬全膏，腐自去，新自生，計日可愈。真神藥也。

第三神火照法。凡腫在頭面以上者，不宜艾灸。恐引火氣上攻。宜用火照法。神乎其神。法用火照散，安紙燃中，以麻油浸點。每用火三枝，離毒半寸許照之。自外而內，俾藥氣透入皮色紫滯者，立轉紅活。瘡勢平

外

王

楊者立轉高聳，仍須不時照之。則毒氣頓解，轉陰為陽，以收全功。且此法不止施於頭面，即如發背等毒，亦宜用之。其頭面患毒，亦有用艾灸而愈者。因其毒純陰，平場頑麻，非艾灸無功。但艾炷宜小，如麥粒樣。式二法乃瘡疽門之寶筏，宜互相參攷，以神其用。

第四刀針砭石法。凡毒有脹痛緊急，膿已成熟，無暇待灼艾火照者，即宜用刀法開之。但刀法須在的確膿熟之時，又須要淺深合度。以左手按腫處，先看膿

之成否。如按下軟而不痛，腫隨手起者，膿已成也。按下硬而痛，或凹陷不起者，膿未成也。已成膿者可刺。未成膿者宜姑待之。若脾虛氣弱者，宜托補之。又須看其膿之深淺，以手指按下軟肉深者，其膿必深。軟肉淺者，其膿亦淺。若膿淺刀深，恐傷好肉。膿深刀淺，恐毒不出而內敗。最宜斟酌。更有伏骨之疽，膿腐於內，皮色不變者，宜以刀刺入深處，放出瘀膿，或灸開大口，放出之，不得姑息。因循俾毒氣越爛越深也。其

外

王

小刀須利，勿令病者見，恐驚彼耳。砭法施於頭面及耳前後，因其漫腫無頭，急用此法以瀉其毒。取上細磁鋒，用竹箸夾定，緊紮放鋒出半分，對患處，另以箸敲之，徧刺腫處，俾紫血多出，為善。刺畢，以精肉貼片時，再用雞子清調乳香末潤之。此地不宜成膿，頭內中空耳前後更多曲折，提膿拔毒，恒多未便，故砭法斷宜早施。

第五圍藥法。書云：用膏貼頂上，敷藥四邊圍。凡腫毒

之大者。將以成膿。用烏金膏貼瘡頭上。然後用萬全膏蓋之。四旁用芙蓉膏敷之。貼膏處。取其出膿。敷藥處。取其消散。並能箍住根脚。不令展開。共作三層敷圍。法第一層用烏金膏貼瘡頭。若漫腫無頭。以濕紙貼上。先乾處是瘡頭也。第二層萬全膏貼之。第三層芙蓉膏圍之。然予嘗用萬全膏。徧覆腫處。連根脚一齊箍住。其中消處自消。潰處自潰。竟收全功。可見膏藥之妙矣。

四

第六開口除膿法。凡治癰疽口小膿多。則膿不出。或出而不盡。或薄膿可出。硬膿難出。以致癰不去而新不生。延綿難愈。法當爛開大口。俾癰膿盡出。為善。其爛藥烏金散最佳。祛癰肉不傷新肉。且不甚掀痛。為至妙也。若有膿管。以綿紙燃裹藥。經入頻換數條。即化祛耳。亦有頑硬之極。非烏金散所能去者。則用化腐紫霜膏搽之。然終不若烏金散為至穩。

第七收口法。凡癰瘡最難收口者。皆由瘡肉交雜。癰

膿不盡所致。庸王不識。妄用補濟之劑。勉強收口。恐他日內毒復發。更甚於前。惟予所用海浮散。堪稱至寶。以此敷上。瘡肉自脫。不必用刀。新肉自生。又不藏毒。萬舉萬當也。大法先用防風湯洗之。再上末藥。洗時須避風。為玉書云。頻將湯洗。切忌風吹。是日更有體虛不能收口者。須內服補藥以助之。

五

第八總論服藥法。凡癰疽服藥。宜照顧脾胃為主。不得已而用清涼。但期中病。切勿過劑。大法初起時。設有挾風寒者。宜先用芎芷香蘇散一劑。以散之。散後而腫未消。隨用銀花甘草以和解之。若腫勢掀痛。大便閉結。內熱極盛者。則用衛生湯加大黃以疏利之。若病勢雖盛。而元氣漸虛者。則清藥中須兼托補之劑。透膿散之。若膿水已潰。必須托補元氣。為主。參耆內托散主之。如或元氣虛寒。則托補藥中須用辛熱以佐之。脾虛者。理中湯。參苓白朮散。氣虛下陷者。補中益氣湯。胃經受寒。飲食停滯者。藿香正氣散。氣

血兩虛者十全大補湯加附子鹿茸童叢間亦有虛而挾熱者即于前方中去附子姜桂加參芩銀花丹皮等藥以收功是又不可不知也大抵有陽毒有陰毒有半陰半陽宜細辨之陽毒者瘡勢紅腫瘡頂尖聳根脚不散飲食如常口渴便結五心煩熱脈洪數陰毒者瘡勢灰白平塌頑麻少痛根脚走散食少便溏手足厥冷口鼻氣冷脈沉遲半陰半陽者瘡腫雖紅不甚尖聳飲食差減大便不結寒熱往來微渴喜熱

藥

六

脈虛軟此三者必須細辨俾用藥寒溫得宜方為合法治陽者清涼解毒治陰者溫中回陽半陰半陽之治清不傷胃溫不助邪如斯而已矣
第九復論五善七惡救援之法。或問瘡癰五善七惡何謂也答曰五善者飲食知味一也便溺調勻二也膿潰腫消膿水不臭三也神氣清爽動息自寧四也脈息有神不違時令五也七惡者太渴發熱泄瀉淋閉一也膿潰尤腫膿稀臭穢二也目睛無神語聲不

亮三也食少不化服藥作嘔四也恍惚嗜臥氣短乏力腰背沉重五也唇青鼻黑面目浮腫六也脈息無神或躁動不和七也古語云五善得三則吉七惡得四則凶余謂七惡之凶不待四矣然而拯救之法正不容以不講大抵熱渴淋閉喘急內熱皆真陰受傷宜用六味湯加麥冬五味如不應入八珍湯加麥冬五味更不應入十全大補湯兼服六味地黃丸此補陽生陰之說也若氣短倦怠昏憤乏力飲食不化乃

藥

七

陽虛之候宜用補中益氣湯若睡臥不寧宜用歸脾湯若飲食減少面目浮腫宜用香砂六君子湯若兼脾胃虛寒更用理中湯腎氣虛寒須用桂附八味丸兼用十全大補湯加附子此溫補回陽之法也若瘡癰潰後膿血去多變為角弓反張手足搐搦肢體振搖而發瘧者並宜用參芪歸朮附子等藥以救之如不應入十全大補湯間有可生者當此時勢性命急如懸縷司命者宜呵噀反覆熟思而審處之

第十將息法。凡病中設有挾風寒者。即宜斷去葷腥油膩。微服散藥。俟外邪祛盡。再用滋味調補。大抵將息。癰腫不可缺少滋味。以血肉能生血肉也。然又不宜過多。使肉氣勝穀氣。更忌生冷滯氣之物。恐反傷脾胃耳。並宜避風邪。戒嗔怒。寡思慮。少言語。兢兢保養為貴。至於病後將息。毒大者。三年內宜遠憚。慎。小者。期年內宜遠憚。慎。犯之則成虛損。或成偏枯。或陰滅。天年不可不慎也。其他戒怒。慎風。亦須常作有。

外

八

病時想

以上十法。乃治癰疽發背之大綱。大者可為小者。可知。已。子。生。平。善。治。外。症。其。心。法。全。在。於。此。約。而。能。該。確。而。可。守。也。至。于。周。身。上。下。所。患。之。病。名。備。載。於。後。以。資。參。考。

外科症治方藥

生於背。名曰發背。肺經火毒也。生於背下。與心相對。名曰對心。發心經火毒也。生於腋。名曰發腋。發腎經相火之毒也。生於肩脊。名曰搭背。右為肺火。左為肝火也。生于手背。名曰手發。生於足背。名曰足發。脾經濕熱之毒也。有如連子形者。頭多突起。有如蜂窠形者。孔多內陷。外結螺。此二種須防毒陷。大率此症。皆由膏梁厚味。或六淫外客。七情內鬱。所致積聚不散。以致榮氣不從。逆於肉裡耳。初覺

外

一

腫痛。即宜用藥消散之。散而不去。則用艾炙提膿等法。癰疽之症。始為熱中。未傳寒中。不可不察也。

遠志膏 凡一切癰疽腫毒初起之時。隨用遠志肉二三

兩。去心。清酒煮爛。搗如泥。敷患處。用油紙隔布。扎定。越

一宿。其毒立消。屢試屢驗。其效如神。

普救萬全膏 治一切風氣。走法疼痛。以及白虎。歷節。風

鶴膝。風寒。濕流。注。癰疽。發背。疔瘡。癰。跌打。損傷。腹中

痞塊。多年。瘡。頑。痰。癩。血。腹。痛。泄。瀉。小兒。疳。積。女。人。癥

癰諸症、並貼患處、咳嗽、瘡、疾、貼背脊心第七椎、予製此膏、普送、取效神速、倘貼後起泡出水、此病氣本深、盡為藥力拔出、吉兆也、不必疑懼、記之、記之。

藿香	木香	白芷	白欵	烏藥
生地	貝母	丁香	白芨	當歸尾
姜蚕	檀香	蜂房	苦參	五加皮
細辛	秦艽	防風	肉桂	大楓子
蟬退	丁皮	羌活	桂枝	蘿蔔子

全蝎	赤芍	元參	南星	草薢子
鱉甲	獨活	枳殼	艾絨	白蘚皮
荆芥	蘇木	連翹	藁本	高良姜
桃仁	紅花	杏仁	川芎	香附
牛膝	續斷	蒼朮	黃芩	威靈仙
麻黃	川烏	牙皂	草烏	金銀花
甘草	附子	半夏	紫荊皮	骨碎補
海風藤	黑山枝	以上各一兩	大黃	三兩
			蜈蚣	三十條

蛇脫 五條 槐枝 桃枝 柳枝 桑枝

練枝 榆枝 楮枝 以上各三寸

男人血餘 三兩以上 真麻油 二十斤

松香 一百斤 皮濾淨 百草霜 十斤 研篩過

冬浸九宿、春秋七宿、夏五宿、分數次入鍋、文武火熬、以藥枯油黑、滴水成珠為度、濾去渣、重稱、每藥油十二兩、下濾淨片子松香四觔、同熬至滴水不散、每鍋下百草霜細末六兩、勿住手攪、俟火候成、則傾入水缸中、以棒攪和成塊、用兩人扯拔數次、磁鉢收貯、治一切風寒濕氣、瘡疽等症、其效如神。又法治瘡疽、用血丹收、更妙。每油一觔、用血丹六兩。

銀花甘草湯 治腫毒初起時、皆可立消、內服此藥、外敷遠志膏、一切惡毒、無不消散、但宜早服、為妙、倘瘡已成、膿必須外潰、無從消散也。

全銀花 二兩 甘草 二錢 水煎、清酒沖服。若毒在下焦、加牛膝二錢。

陳艾圓 每歲端午日蓄艾一二三觔愈久愈良用時取葉為炷或加射香木香明雄黃末碾成團安罽上炙之名藥艾圓

蟾酥餅 治疔毒腫疔乳癰附骨疔瘰癧一切惡症或不痛或大痛或麻木用此敷貼瘡頭

真蟾酥 二錢 輕粉 五分 乳香 沒藥 明雄黃 各二錢 射香 三分 硃砂 一錢 朝腦 一錢 芭荳霜 二錢

外科症治

四

以上各為細末于五月五日午時在淨室中用蟾酥酒和藥丸如菜豆大每用一丸口涎調糊貼疔瘡上以膏蓋之

菊花甘草湯 治疔之仙藥也

白菊花 四兩 甘草 四錢

水煎頓服渣隨即再煎服重者不過二劑即消至穩至效一切消疔之劑皆不及此

芎芷香蘇散 凡毒多有挾風寒而發者宜先用此散之

如毒不消隨服銀花甘草等湯

川芎 白芷 紫蘇葉 赤芍 陳皮

甘草 各一錢 荆芥 香附 秦艽 各一錢

連翹葱白二寸水煎服。若兼傷食加山楂麥芽芫荽

若內熱極盛加連翹芩子

烏金膏 去腐肉不傷新肉最為平善

芭荳去殼新瓦上炒黑研爛聽用多寡看瘡勢酌量

防風湯

外科症治

五

防風 白芷 甘草 赤芍 川芎

當歸尾 各二錢 雄豬蹄 一節

加連翹葱白五根用水三大碗煎以絹片蘸水洗之拭

乾然後上藥其深曲處以羊毛筆洗之

海浮散 敷此腐肉自去新肉自生此外科回生保命之

靈丹也于治外症全倚之

明乳香 沒藥 等分

右二味安箬皮上火炙乾為極細末敷患處再貼膏藥

此散毒淨則收口毒不盡則提膿外出其神妙難以言喻。

火照散

硃砂 血結 沒藥 明雄黃 各三錢
射香 五分

右五味為細末用綿紙條長尺許每條裝藥三分真麻油浸點自外而內周圍照之瘡毒隨藥氣解散自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡勢漸平又漸減之。

外科症治

六

薰籠隨上烏金散貼以萬全膏若腫勢漫衍周圍用芙蓉膏敷之如再薰須洗去末藥其貼膏藥處藥油可不必洗。

芙蓉膏

見上方用法中

用赤小豆四兩芙蓉葉四兩香附四兩菊花葉四兩白芨四兩為細末每末一兩加射香一分米醋調塗住根脚雞子清調亦可。

化腐紫霜膏

治癰疽發背瘰癧肉不麻及不作膿者又諸

惡瘡內有膿而外肉不穿潰者。

輕粉 草蘇仁 研各三錢 芭荳 研白仁五錢 血結 一錢
朝腦 螺螄肉 各一錢 金頂砒 五分

共為末磁罐收貯臨用時麻油調搽頑硬肉上以萬全膏貼之至頑者不過二次即軟其力大於烏金散。

衛生湯 解毒消癰清熱活血止痛初起相宜。

白芷 連翹 花粉 各八分 荊芥 甘草節
旁子 各一錢 防風 乳香 沒藥 各五分 金銀花 三錢

外科症治

七

貝母 當歸尾 各一錢 五分
水煎服。若大便閉結熱勢極盛者加酒炒大黃二三錢。

透膿散 凡癰毒內已成膿不穿破者服此即破。

黃芪 四錢 皂角刺 白芷 川芎 牛旁子
穿山甲 炒研各一錢 金銀花 當歸 各五錢
酒水各半煎服。

參者內托散 丹溪云腫毒未潰以疎托解毒為主癰疽

既濟以托補元氣爲主。二語可爲外科樞要。

人參 一錢 虛甚者倍用 黃芪 三錢 酒炒 當歸 二錢 川芎 酒炒 五分

甘草 一錢 炙 陳皮 五分 金銀花 五錢 丹皮 一錢

木香 五分 遠志 去心 甘草 水泡 炒 一錢 五分

大棗五枚 水煎服。

理中湯 溫補中氣 挽回元氣。

人參 二錢 黑姜 一錢 五分 甘草 炙 二錢 白朮 三錢 陳

附子 姜汁 甘草 水製 一錢

外科症治方

八

大棗五枚 去核 水煎服。

參苓白朮散 健脾養胃

人參 一兩 茯苓 二兩 山藥 炒 苡仁 炒 扁豆 炒

蓮子肉 去心 炒 各三兩 砂仁 一兩 神曲 炒 黑 甘草 炒 各

白朮 四兩 陳 陳皮 一兩 微炒

共爲細末 每用三錢 開水下。

補中益氣湯 中氣下陷者 舉之 巔頂有病者 需此。

人參 炙甘草 當歸 各一錢 升麻 柴胡 各三

陳皮 五分 黃芪 二錢 白朮 一錢 五分

大棗二個 生姜一片 水煎服。

藿香正氣散 散風寒 消飲食 止嘔吐 瀉痢

藿香 砂仁 厚朴 茯苓 紫蘇葉

陳皮 各一錢 白朮 陳土 炒 半夏 桔梗 白芷 各七

甘草 炙 五分

生姜三片 水煎服。

十全大補湯 峻補血氣 乃扶危定傾之大藥 爲收功保

外科症治方

九

命之神丹。

人參 白朮 陳土 炒 各三錢 黃芪 五錢 茯苓 一錢

當歸 一錢 大熟地 二錢 酒炒 九 白芍 酒炒 一錢 甘草 炙 八

川芎 肉桂 去皮 各五分

大棗五枚 姜三片 水煎服。虛甚者 更加附子 鹿茸。

六味湯 壯水之主 以鎮陽光 凡腎經真水不足 虛火上

炎 脈數有熱者 宜此。

大熟地 四錢 山萸肉 山藥 各二錢 丹皮 茯苓 各一錢

澤瀉 一錢

水煎服

八珍湯即十全大補湯去黃芪肉桂

歸脾湯 治思慮傷脾、榮血不足、睡臥不寧

人參

白朮

當歸

棗仁 炒

白芍 各一錢

黃芪 一錢

遠志 五分 去心甘草 水泡洗

甘草 七分 木香 五分

元眼肉五枚 水煎服

香砂六君子湯

理脾化痰、溫胃進食

外科症治方

十

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏 各一錢

砂仁

藿香 各八分

姜二片、棗三枚、水煎服

桂附八味丸

益火之原以消陰翳、凡腎經真陽不足、火

衰不能生土、脈虛大無力者宜此

大熟地 八兩

山黃肉 各兩

山藥 各兩

丹皮

茯苓

澤瀉 各三兩

附子

肉桂 各一兩

用煉蜜丸、每服四錢、淡鹽水下

外科灰餘集

外科症治方藥

紫金錠 解諸毒、療瘡腫、主用極弘、立見奇效、凡居家出

入、遠遊仕宦者、不可缺此

山茨菇 洗淨 二兩

五倍子 搥碎洗 淨二兩

千金子 去壳去油 淨一兩

紅茅大戟 去蘆根洗淨焙乾 為末一兩五錢

明雄黃 三錢 水飛

硃砂 三錢 水飛

射香 當門子 三錢

以上藥於淨室中製為極細末、候端午七夕、或天月二
德日合起、以糯米濃粥湯和勻、杵干下、凡合藥、切忌婦
人雞犬見、每錠一錢、每服一錠、或半錠、開水磨服、病在

外科症治方

十一

上者必吐、在下者必利、吐利後、以溫粥補之

一治飲食藥毒、蠱毒、菌毒、河豚毒、自敗牛馬猪羊等肉、

毒人悞食之、必脹悶昏倒、急用水磨一錠灌之、或吐或

瀉、其人立甦

一南方山嵐瘴氣、霧露水濕、自人感之、即覺滿悶嘔噁、

憎寒壯熱、隨用開水磨服數分、即愈

一治瘰癧發背、對口、疔瘡、天蛇毒、楊梅瘡、並用無灰清

酒磨服、外用醋磨塗瘡上、日夜數次、覺痒而消

一治喉閉喉風喉疔乳蛾等症並用薄荷煎湯磨服一錠即見消散

一治絞腸沙烏沙脹通腹攪痛非常用清水磨服一錠即愈

一治婦人邪氣鬼胎用石菖蒲煎湯磨服一錠即消

一治自縊溺水壓夢鬼魅迷人但心頭溫者俱用生薑汁磨服一錠立甦

一治惡蛇瘋犬毒蝎溪澗諸惡蟲傷人隨即發腫攻注

外科症治方

三

走痛或昏悶喊叫命在須臾急用清酒磨下一錠仍取他人口涎磨敷患處再服葱湯一大碗被蓋出汗其人必活

一治天行時疫延門傳染用米醋磨濃塗鼻孔中仍以開水服少許即不傳及

一治傳尸勞瘵諸藥不效每早用清水磨服一錠三日

即下惡物有一女子患瘵症方士教服此片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓愈以此相傳活人不

計其數此真濟世衛生之寶藥也

生於腦名曰腦疽生於頸後名曰對口生於頸旁名曰偏對口正對口易治偏對口難治因其軟肉與喉相近也多因膏梁醇酒風寒壅遏所致宜用神火照法次用烏金膏搽之外貼萬全膏取其易潰潰後則用防風湯洗之摻以海浮散仍貼萬全膏頻患數次即愈矣

生於耳前後名曰鬚疽生於兩頤名曰發頤初起宜用銀花甘草湯加柴胡荆芥薄荷旁子以清散之若腫勢極盛

外科症治方

三

須用砭法若已成膿而未潰者以烏金膏搽瘡頭蓋以萬全膏自然腐潰潰後則用海浮散並貼萬全膏自應尋愈類下漫腫無頭名曰時毒俗名蝦蟆瘟是也頭面盡腫名曰大頭天行俗名大頭瘟是也此皆風火鬱熱所致初起宜用加味甘桔湯以消散之散而弗去則用普濟消毒飲以清之若腫勢極盛兼用砭法

甘草 桔梗各三錢 旁子炒二錢 荆芥 三錢

薄荷 五分 貝母 一錢 五分

水煎服。若兩頤腫盛者，加柴胡一錢五分，丹皮三錢。

普濟消毒飲

甘草 桔梗 黃芩 酒炒 黃連 酒炒 各一錢

元參 橘紅 柴胡 各五分 薄荷 六分

升麻 二分 連翹 牛旁子 炒各一錢五分

水煎服。便閉甚，加酒炒大黃一錢。體虛，加人參五分。

外科症治方

南

生於心，名曰井口疽。生於脇，名曰脇癰。生於腹，名曰肚癰。生於手脚腕，名曰穿骨疽。生於腿岔，名曰魚口。生於臀，名曰臀癰。施治並如前法。

護心散 患井口疽者，宜多用。他症亦宜用此。

遠志肉 二兩五錢 去心 菘豆粉 二兩 甘草 五錢

明乳香 一兩 上炙 辰砂 二錢 研水飛

共為細末，每服三錢，開水下。

九龍州 治魚口便毒，騎馬癰橫痃，初起未成膿者，服之。

外科灰餘集 外科症治方藥

兒茶 血珀 乳香 沒藥 青木香

穿山甲 炒各一兩

右各等分，為末，歸尾三兩，紅花二兩，酒煎膏。丸如桐子大，每服二錢，空心熱酒送下，數服自消。

胡桃散

以大胡桃剝開口，將全蠟二枚裝入，燒灰存性，研末。

熱酒沖服。

疔瘡初起如疥，形如粉刺，或小泡，堅硬如釘，故名曰疔。大

外科症治方

五

抵肉色紅腫，根脚不散者吉。若平塌漫腫，四圍灰白者凶。其狀不一，其色不同，有紅紫黃白黑之五種，以應五臟。若生兩足，多有紅絲至臍，生兩手，多有紅絲至心，生唇面，多有紅絲入喉，俱難治。速宜針紅絲出血，多有生者。若患於肢末之處，毒愈凝滯，藥難導達，艾灸之功為大。內服菊花甘草湯，至效。如妄用疎利之劑，耗散真氣，不惟無以去毒，而害反隨之矣。其治法即見前十法中。

喉間腫痛，名曰喉痺。古人多用甘桔湯主之。然有虛火實

火之分。外感內傷之別。不可不審也。外感者。暴發之症也。多屬實火。其症或因風邪鼓動其火。或因寒氣閉塞其火。或因煎炒厚味。醇酒椒姜。俾肺胃之火。結聚于上。其發至暴。甚則痰涎上壅。牙關緊急。湯水不入。語聲不出。古方多用蠟窩油和漿水吐之。導去痰涎。或用土牛膝搗爛。和酸醋灌之。或用刀針刺紅腫處。拔去膿血。立瘥。然後以甘桔湯。隨症加減治之。大抵挾風寒者。本方加荆芥。防風。蘇梗。薄荷之屬。挾火者。更加大力子。連翹。貝母。若火勢極盛。須

外科雜治

末

用姜汁炒黃連以抑之。或兼用三黃解毒之類。夾食者。須用麥芽。山楂。薤子。枳殼。因酒者。加葛根。痰多。更加金沸草。橘紅。九製胆星。瓜蒌仁。復有非時暴寒。潛伏于少陰而成。咽痛者。名曰腎傷寒。宜用本方。加半夏。桂枝。細辛。炙甘草。若因直中寒邪。逼其無根失守之火。發揚于上。其症手足厥冷。口鼻氣冷。下利清穀。腹中冷痛。宜用附子理中湯。加葱白。桔梗。但溫其中。而喉痛自止。不可悞作火論。凡此外感之治法也。內傷者。漸至之症也。謂之虛火。其症或因心

事勞神。或因怒動肝火。或因腎水不足。浮火上炎。或因腎經陽虛。火不歸原。大法。心事不寧者。宜用加味安神丸。怒傷肝者。宜用逍遙散。腎水不足。脉多細數而無力。宜用六味地黃湯。加生地。牛膝。麥冬。龜板之屬。若腎經陽虛。脉大無力。火不歸原者。宜用加減七味湯。如不應。更用八味丸。若中氣虛弱。勞倦傷脾。而火動者。宜用參朮歸朮以補之。若喉痛日久。涼劑過多。痰涎上泛。語聲不揚者。此為肺絕。喉痺。更宜倍用人參。古方多用參膏灌之。或救十中之一

外科雜治

末

二。如無力服參膏者。可用十全大補湯。不可悞作外感。而用清涼之劑。凡此內傷之治法也。夫症屬外感。有吐法。有散法。有清法。有吹法。若膿血凝聚。則有刀針法。症屬內傷者。有安神法。有開鬱法。有滋陰壯水法。有引火歸原法。有補氣回元法。咽喉關要之地。見症多端。性命急如懸縷。學者宜叮嚀反覆。熟思而審處之。纏喉風症。咽喉腫痛脹塞。紅絲纏繞。故名纏喉風。甚則腫達于外。形如蛇纏。探吐悉如前法。

纏舌喉風硬舌根而爛兩旁以羊毛筆蘸甘草水洗之吹以柳華散

乳蛾生喉間狀如乳頭一邊生者名單乳蛾兩邊生者名雙乳蛾以小刀點破乳頭出血立瘥吹以柳華散隨服加

味甘桔湯凡針乳蛾宜針頭尾不可針中間鮮血者易治血黑者難治凡用針血不止者用廣三七為細末滲刀口

上即止凡使刀針不可傷蒂下及舌下根切切

舌衄出血不止用六味加生地元參主之並吹柳華散

外 大

懸瘡生上脰如紫李宜針破用甘草湯洗之吹服如前

腮瘡生腮下先用吐法再針紫黑處去瘀血吹服如前

喉瘡命門相火也如灌膿以銀針挑破之吹服如前法

走馬牙疳牙齦腫爛漸變紫黑臭穢胃熱也牙瘡腫痛灌膿也牙齦牙根盡腫宜露于外也齒衄牙床出血也吹以

柳華散兼服清胃散牙痛宜用止痛散兼服葛根湯

喉癰生于喉旁形如圓眼血絲相裹不可用刀針宜吹射

香散並服加味甘桔湯

繭唇唇上起泡如繭初起即用小艾炷灸之貼以萬全膏加減安神丸 養心神降虛火

遠志肉 去心甘草才 茯神 去木 茯苓 蒸各一

石菖蒲 五錢 麥冬 去心 二兩 人參 四錢 甘草 炙三

用天冬八兩煎膏為丸辰砂為衣每服三錢開水下加減七味湯 治喉痛虛火上炎乃引火歸原之要法

大生地 水洗 細切 大熟地 各三錢 山藥 二錢 茯苓

丹皮 白芍 各一錢 牛膝 麥冬 各二

外 丸

肉桂 去皮 五分 澤瀉 一錢 秋石 三分

水煎服

三黃解毒湯 黃連 二錢 黃芩 黃柏 黑山枝 各一錢

水煎服

柳華散 治喉瘡並口舌生瘡走馬牙疳咽喉腫痛諸症

真青黛 蒲黃 炒 黃柏 人中白 各一

水片 五分 礪砂 五錢

共為細末吹喉極效

清胃散

升麻一錢 生地二錢 黃連 連翹 丹皮各一錢

水煎服

療牙止痛散

止牙痛神效

牙硝三錢 硼砂三錢 明雄黃二錢 冰片一分 犀角五分 射香 五厘 共為末每用少許擦牙

葛根湯

葛根二錢 升麻一錢 甘草五分 芍藥五分

水煎服。風勝加荆芥防風薄荷火盛加連翹丹皮生地旁子

射香散

真射香二錢 冰片三分 黃連一錢

共為末一日夜吹五六次

療癰頸上痰癭癭串也此肝火鬱結而成宜用消癭丸兼服加味逍遙散

消癭丸 此方奇效治愈者不可勝計予曾刻方普送矣

元參 蒸 牡蠣 煨醋 貝母 去心蒸 各四兩

共為末煉蜜為丸每服三錢開水下日二服

加味逍遙散 治肝經鬱火頭生癭癭並胸脇脹痛或作

寒熱甚至肝木生風眩暈振搖或咬牙發瘧諸症經云木鬱達之是矣

柴胡 茯苓 當歸 白朮 甘草 白芍 丹皮 黑山枝 各一錢 薄荷 五分

水煎服

鼻痔鼻生瘰肉也起於濕熱可吹礪砂散鼻淵鼻流濁涕不止也起於風熱可用古拜散

礪砂散

礪砂 五分 白礪 煨枯 二錢

共為細末每用少許點鼻痔上即消

古拜散

荆芥穗

右為細末每服三錢。生姜湯調下。有火者陳茶調下。
聾豆抵耳。耳內生疔也。乃肝經鬱火所結。可用紅棉散兼
服。加味逍遙散。加菊花百蟲入耳。以猫尿滴入。奇效。

紅棉散

白礬 二錢 臘脂 一錢 燒灰存性

右研勻。先用棉杖子攪去膿水。更另用棉杖子蘸藥。摻
入耳底即乾。若停豆抵耳。加射香五厘。

眼丹。眼旁生泡。潰而流水也。屬風熱。加味逍遙散主之。又

眼珠忽然腫脹突出。屬崇症。平崇散主之。

平崇散

黃連末 二分 甘草末 冰片 各一分 硃砂 三分

人乳調點兩眼角立消。

白禿瘡。此火旺血熱而生蟲也。麥錢散主之。髮落不生。骨
碎補為末。棘油調搽之。

麥錢散

用小麥一升。炒枯黃色。乘熱入鉢內為末。和硫黃末

四兩。白礬末五錢。攪勻。待冷取起。加烟膠半觔。川椒
末二兩。生枯礬各二兩。共碾極細。臨用。蔥湯洗淨。末
藥二三錢。麻油調搽。油帟蓋扎。三日一換。三次愈。
粉刺雀斑。風熱也。改容丸主之。

改容丸

大貝母 去心 白附子 防風 白芷

菊花葉 滑石 各五錢

右為細末。用大肥皂十筴。蒸熟。去筋膜。搗和藥為圓。早

晚洗面

破傷風。因跌打傷頭腦。而客邪乘之。以致手足搐搦。人事
昏憤。天麻散主之。

天麻散

天麻 生南星 炮去 防風 各一兩 荆芥 三兩

右為細末。每用五錢。連鬚葱白煎湯調下。

跌打損傷之後。凡大小便通利者。可用廣三七二三錢。酒
煎飲之。或服滑蘭湯。若大便不通。必加大黃。其破損處。可

用血結為極細末。摻之。非葉散亦良。余用天下第一金瘡藥最佳。可保無虞。

澤蘭湯 通二便。除腸中瘀血。乃活命之靈丹也。

澤蘭 當歸 各五錢 紅花 一錢 丹皮 三錢

青木香 一錢 去皮尖 五分 桃仁 研十粒 赤芍 一錢 五分

水煎。熱酒沖服。如大便不通。加大黃二三錢。酒炒。

非葉散 止血如神。

石灰同非葉搗成餅。沾貼壁止。候乾。細研篩下。聽用。

天下第一金瘡藥

毒

天下第一金瘡藥 凡刀斧損傷。跌撲打碎。敷上即時止痛止血。更不作膿。勝於他藥多矣。其傷處不可見水。予製此藥。普送。因路遠者。一時難取。故刻方。廣傳之。今並筆之於書。則所傳益廣矣。各鄉有方之家。宜修合以濟急也。

雄猪油 一觔 四兩 松香 六兩 面粉 四兩 射香 六分

黃蠟 六兩 樟腦 三兩 研極細 冰片 六分 血結 一兩

兒茶 一兩 乳香 一兩 箬皮上 煨去油 沒藥 一兩 全製

以上藥研極細。先將猪油松香黃蠟三味。熬化。濾去渣。待將冷。再入藥末。攪勻。磁器收貯。不可洩氣。

乳瘡者。乳房掀腫作膿。膿盡則愈。其初起。宜服瓜蒌散。敷以香附散。即時消散。若已成膿。則用太乙膏貼之。若潰爛。則用海浮散摻之。外貼膏藥。吸盡膿自愈矣。乳岩者。初起內結小核。如碁子。積久漸大崩潰。有巉岩之勢。故名曰乳岩。宜服逍遙散。歸脾湯等藥。雖不能愈。亦可延生。若妄行攻伐。是速其危也。

瓜蒌散

毒

瓜蒌 一個 明乳香 二錢

酒煎服。

香附餅 敷乳瘡。即時消散。一切瘰癧。皆可敷。

香附 一兩 細末淨 麝香 二分

右二味。研勻。以蒲公英二兩。煎酒去渣。以酒調藥。熱敷患處。

太乙膏 治一切瘰癧腫毒。用之提膿極效。

厚肉桂二錢五分 白芷 當歸 元參

赤芍 生地 大黃 土木條以上各五錢

乳香末二錢 沒藥末二錢 真阿魏一錢 輕粉一錢

血餘一團 黃丹六兩 五錢

以上各藥用真麻油一觔浸入。春五、夏三、秋七、冬十日。傾入鍋內。文武火熬至藥枯浮起為度。住火片時。用布袋濾淨藥渣。將鍋展淨。入油。下血餘再熬。以柳枝挑看。俟血餘熬枯浮起。方箒熬熟。每淨油一觔。將炒過黃丹

美

六兩五錢。徐徐投入。不住手攪。候鍋內先發青烟。後至白烟。叠叠旋起。其膏已成。將膏滴入水中。試軟硬得中。一端下鍋來。方下阿魏散膏面上。化盡。次用乳香沒藥輕粉末攪勻。傾入水內。以柳木攪成一塊。

附骨疽肉裡漫腫而皮色不變也。宜用艾圓灸之。俾其轉陰為陽。乃吉。若生於膝上三寸。名曰伏兔。法在不治。蛇頭毒。手足指腫大如蛇頭也。宜用艾炷隔蒜灸之。以雄黃白芷等分為末。全大蒜搗爛敷之。或嚼生栗敷之。亦效。

外科灰餘集 外科症治方藥

脫疽。生手足指。宜用艾灸之。若腫腐潰爛。搽以海浮散。貼以萬全膏。

癰瘡。生於足之內。外。宜服生熟地黃圓。並敷海浮散。貼以萬全膏。若濕熱甚。而潰爛不收口者。于海浮散內加入黃柏散同敷。立效。

腸癰。有生於腸內者。腹內脹急。大小便牽痛如淋。轉側搖之作水聲。潰後。則膿從大便出。有生於腸外者。當臍腫痛。腹皮脹急。潰後。則膿自臍出。甚則穿潰大腸。食蟲亦自臍

老

出。勢難為矣。初起宜用千金牡丹皮散以消之。既潰。則用參肉內托之劑。

千金牡丹皮散

丹皮五錢 苡仁一兩 瓜蒌仁去油 桃仁去皮尖 水煎服

懸癰。生于腎囊之後。肛門之前。又名海底漏。最難收功。膿生於肛門之兩傍。初時腫痛。繼則潰膿。總由濕熱相火。內灼庚金而然也。宜服國老散。加減地黃丸。並敷海浮散。

貼膏藥。此一定之治法也。內痔外痔亦並可服前藥。洗以忍冬、鱉、葛、蒲、草。兼用田螺水搽之。可以立消。脫肛屬氣虛。補中益氣湯。亦有血虛火旺者。四物湯加升麻。

國老散

甘草七段。用急流水一碗浸之。炙乾。又浸。又炙。以水盡為度。研細末。每日空心開水調下二錢。忌煎炒烟酒炙煨辛辣發氣等物。

生熟地黃丸

大熟地 九蒸

大生地 酒洗各三兩 山藥 乳蒸 茯苓 乳蒸

丹皮 酒蒸各一兩 澤瀉 鹽水蒸 當歸 酒蒸 白芍 酒炒

柏子仁 去殼隔紙炒 丹參 酒蒸各二兩 遠志 去心甘草水 泡蒸四兩

自敗龜板 浸去牆童便炙酥 研為極細末四兩

共為末。用金釵石斛四兩、金銀花十二兩、熬膏和煉蜜杵為丸。每早淡鹽水下四錢。

田螺水

用大田螺一個。以冰片摻齧中。仰放盞內。少頃。水流

出取擦痔瘡上。其腫立消。

下痢生瘡濕癢。或陰莖腫爛。或如菌如蛇。此濕熱之甚也。宜服九味蘆薈丸。並用加味逍遙散。氣虛者。佐以加味歸脾湯。

九味蘆薈丸

蘆薈 五錢 胡黃連 當歸 芍藥
川芎 燕黃 各一兩 木香 甘草 各三錢
龍膽草 七錢 酒浸炒焦

右為末。米粥糊丸。麻子仁大。每服二錢。或一錢五分。開水下。

手丸

楊梅結毒。不可搽輕粉。恐毒氣歸內。宜服忍冬湯。貼以萬全膏。並用金蟬脫甲酒。

忍冬湯

金銀花 一兩 甘草 二錢 黑料豆 二兩 土茯苓 四兩

水煎。每日一劑。須盡飲。

金蟬脫甲酒

一第 1014 升 賣 參 日 車 全 書 第 4 反 正 內

治楊梅瘡不拘新久輕重皆效。好酒五觔用大蠟蠟一箇浸酒封瓶口。煮香二枝。取起待次日隨量大小以醉為度。冬夏蓋煖出汗為效。存酒次日只服量之一半。酒盡瘡愈。又治楊梅結毒。筋骨疼痛。諸藥不效者。更妙服酒後七日不許見風。為要。忌口及房事百日絕根矣。

大麻風皮膚腫烈。搔癢頑麻。如樹皮吐汁之狀。此濕毒生。甚則眉毛剝落。鼻柱崩壞。事不可為也。宜服斷蛇酒。搽

手

以當歸膏。赤白遊風肌膚搔癢起皮也。鵝掌風手足心頑厚起皮也。爛脚風脚下濕爛也。並可搽當歸膏。內服避散。兼用生熟地黃圓。

斷蛇酒 烏梢蛇亦可川

斷蛇	去頭尾 一具	生地	二兩	黃柏	苦參
丹參	菊花	銀花	丹皮		
赤芍	當歸	枸杞子	蔓荊子		
赤茯苓	草薢	百部	各一兩	秦艽	

獨活

威靈仙 各五錢 桑枝 一兩 五錢

右煮好頭生酒五十觔。退火七日飲。

當歸膏 治癩風。並可搽赤遊丹鵝掌諸風。

當歸 生地 各兩 紫草 麻黃

木鱉子肉 去殼研 防風

黃柏 元參 各五錢 蘇油 兩 黃蠟 兩

先將龜九味入油熬枯。濾去渣。再將油復入鍋內。熬至滴水成珠。再下黃蠟。試水中不散為度。候稍冷。傾入蒸

手

碗內。坐水中。出火毒三日。聽搽。

湯。泡火燒。不宜見冷水。宜用白芨。蒜殼燒灰存性。研細末。

敷之。若患處乾燥。則用蒜油調搽。或用柏子樹皮為末。煎

油調敷亦善。

疥瘡有細小不作膿者。多屬風熱。有肥大灌膿者。多屬濕

熱。俱用麻黃膏搽之。十日可愈。而不隱瘡。仍多服金銀花

為妙。更有天泡瘡。腫起白泡。小者如菜豆。大者如蚕豆。

大連片而生。或生頭頂。或生耳前後。宜用胡柏散敷之。豆

瘡

麻黃膏

雄猪油 四兩 斑蝥 三個 麻黃 五錢 草薢子 一百粒去殼研爛
大楓子 一百粒去殼研爛

先將猪油化開，下斑蝥煎數沸，隨去斑蝥，再下麻黃煎枯，濾去渣，將大楓子肉和勻，聽搽。

黃柏散

黃柏一大塊，以猪胰塗炙酥，為末，麻油調搽。頑癬乃濕熱凝聚，盡行皮中，有頑厚堅硬者，俗稱牛皮癬。

是宜用百部膏搽之。

百部膏

百部 白鮮皮 草薢子 去殼 鶴虱
黃柏 當歸 生地 各一兩 黃蠟 二兩
明雄黃末 五錢 麻油 八兩

先將百部等七味入油熬枯，濾去渣，復將油熬至滴水成珠，再下黃蠟，試水中不散為度，端起鍋，來將雄黃末和入，候稍冷，傾入磁鉢中收貯，退火聽用。

救自刎法，凡自刎喉管未斷者，不可見水，急用麻線縫之外，以血結細末拚之，隨用天下第一金瘡藥厚塗之，綿帛圍定，然後用狹裏脚布纏住，線扎之，間日加敷藥，頭不可動，搖十日愈。

竹木刺入肉，拔不出者，用象牙磨水滴之，良久自出，或用蠟蚘搗爛敷之，亦出。若日久血凝腫脹者，以花蕊散用象牙水調敷，瘀血散而刺並出矣。

花蕊散 花蕊石為末，八兩，硫黃末四兩，和勻，瓦礫盛之。

封口鹽泥固濟

封口鹽泥固濟，晒乾，安風爐中，上下着火，煉二炷香，候冷，打開，研篩為極細末，收貯，此散瘀血之神藥也。

瘋犬咬用明雄黃末五錢，杏仁去皮尖，百粒炒研，每服二錢，虎骨煎酒送下，服盡必愈。外並用此敷患處，毒蛇蜈蚣咬，用明雄黃細末，用蒜搗爛敷之，內服白芷護心散。

白芷護心散

白芷 一兩 明乳香 三錢 明雄黃 五錢 甘草 五錢 灸

共為細末，每服四錢，清酒調下。

快服砒毒小薊根搗汁灌之。或用金汁灌之。或用明礬丸
黃為末。新汲水調灌之。得吐利為效。野菌毒亦用金汁解
之。紫金丹亦佳。

救自縊。抱下徐解繩索。用好肉桂三錢煎湯灌之。

救落水。以其人橫伏水牛背上。瀝去腹中之水。如無牛。以
橈代之。隨用搐鼻通天散。吹鼻孔中。得嚏則活。獨用半夏
末吹之亦佳。

壓夢不醒。吹以通天散。更用葱白生薑煎酒灌之。

搐鼻通天散

猪牙皂角去皮弦 一兩 細辛去葉 半夏各五錢

共為極細末。每用一二分吹鼻中。得嚏則甦。



癱科全書

癱科全書序

醫之爲任重矣天下之業醫者多矣善醫者固藥到回春如響斯應有回生起死之功不善醫者往往操庸劣手段以嘗試而卒以殺人間有一二醫者得最靈驗之奇方則秘而不肯示人藉口以方傳不效其實持金錢主義藉是方以博取人財惟吾鄉柘軒梁先生人本儒素術妙岐黃金匱玉函悉心研究凡遇內外奇難諸症靡不應手奏效而於癱瘓一科尤爲獨具手眼具徵心得夫癱分三十六症雖內傷外感原因不一類皆由於質體痿弱血液乾枯陰虧火燥氣滯痰凝其毒久伏於臟腑而一旦發於肢體必深蒂固牢不可拔中醫多用吊丹西醫多用剖割徒欲以霸術取速效卒之愈吊而毒終不散愈割而癱總叢生駭駭然臟腑內蝕肢體外潰遂致十癱而終不得一生是非死於症實死於醫耳先生於是症則神乎其技外治則類以藥點之化朽腐爲神奇具見

癱科全書序

一

癱科全書序

二

手法之高內治則審其寒熱虛實以施治取其潛消默化於無形尤徵心法之妙今復將其治癱全科書編成先論症後列方源源本本期若列眉俾天下後世之業醫者知所則倣而天下後世之患癱者亦得所生全蓋先生久以醫術名中外初則駐上海駐香港繼則遊歷南洋十餘島今則寄跡鮑江徵特霜晨雨夜暑日炎天有請則輒應從不過取人錢物且每日必限數點鐘以盡贈醫義務論者謂先生造福於人者大而天之錫福於先生者亦宏春回壽寓種佈福田先生哲嗣銳元以十二齡之童子果見賞於名公現入京師高等學堂肄業試輒高列前茅他日學成爲國家用將大有造於天下是則父爲良醫子爲良相利濟同功食報正未有艾也噫先生絞腦汁費心血而成是書先生濟世之心苦矣適遇敝族蘭汀由暹回國慨然擔任付梓以傳世先生濟世之心慰矣先生濟世之功亦不朽矣用是不揣陋聊弁數言以爲世之業醫贈醫兼

有秘方者勸是爲序

宣統二年春月古梅侯家驥序於品梅小築

癩科全書序

凡病必有治病之方而知其方者往往秘而不傳動曰傳則方不靈驗果如所言則古人傳世之方書其皆不靈驗矣乎嗚呼存射利之心忍令天下後世之人抱病而枉死者弗可勝計良堪悲痛吾州梁柘軒先生夙有不爲良相必爲良醫之志凡內外各科醫道莫不悉心研究而治癩尤爲所長夫癩危症也有二十四症三十六症之名而大抵陰虛火盛挾風痰而成此毒核其病源久伏於臟腑根深蒂固非內外兼治不爲功時醫不得其治之方爰有十癩九死之說先生攷求有素於外治得其獨一無二之點藥法內治則以辨寒熱虛實握其大綱藥到回春百試百驗固已中外揚名矣人本寒儒而心存濟世到處行醫每日必有數點鐘爲贈醫之時其胞與爲懷於此可見今復將其治癩之法利盤托出付諸手民爲天下後世之患癩症者廣開生路此其種福恩田醴

癩科全書序

五

癩科全書序

六

癩科全書序

三

癩科全書序

四

功德水實大而遠懿哉此舉猶足風世矣吾聞之積善必有慶餘今先生之哲嗣童年飽學名動公卿招入京師學堂肄業試輒領其前鋒他日學貫中西蔚爲國器意中事耳論者謂此爲先生仁心壽世之報其信然也然則利人卽以利己其利益莫大乎是合并誌之以爲業醫者勸偷天下業醫之人概如先生以利濟爲心凡有秘方悉爲傳世俾天下後世同登仁壽無復有抱病而枉死者夫非生民之幸乎哉夫非生民之幸福哉
宣統元年夏月嘉應張衡舉序於蛇江八屬會館

自序

千古文人之筆最懼雷同獨醫學則最患不能雷同耳未有患是症不用是方而能療是疾者歷觀諸名家醫書多是各立一說殊少定見其於花柳頸癭尤茫無善法即西醫亦然總不出強硬手段中材以上之人閱是書尙可活人中材以下之人閱是書非第不能活人甚且誤人多多不少矣噫醫之道最微微則不能不深究醫之方最廣廣則不能不小心差之毫釐失於千里孟子云術之不可不慎此之謂也故凡業醫者不特難以議目前實則最難辦善後今人於外科一門多行霸道不顧人命取求近功離醫之道益云遠矣僕之醫則不然專以王道爲事如頸癭也人多用剖割或用丹出核僕則專用潛消奏效雖久不特形質無損更可永保無虞如花柳也人多用吊丹或大攻大瀉僕則專用內解成功又速不特元氣無傷且無下漏癱瘓牙際湧血之慮至於內科等

癩科全書自序

七

癩科全書自序

八

症精微奧蘊言不勝言要皆以善後爲本務也所以僕於花柳頸癭兩門尤爲細心研究十餘年來盡得其中奧旨歷治多人發無不中久欲刊行於世利濟後人無奈力恒不逮輒爲中止嗟乎千古成事之難類多如是惟念僕自業醫數十年皆以方便爲事凡人之相延者從無貧富之歧視雖風雨必往星夜必往即嚴寒地凍酷暑炎天亦無不往且日雖無粒米之炊亦從未嘗苛取病家分文此則僕之所可深自信也以爲持是心而行僕之醫過久而必揚所以在外洋歷經數十島嶼凡遇此症莫不應效如神愈人何止千數從無或誤一人越至丁未在星嘉坡旅次果得 欽憲楊侍郎士琦及左總領事秉隆先後品題獎給匾額時(長男銳元十有三齡)在星洲養正學堂並得蒙 楊侍郎嘉其童穉篤志好學加恩特色栽培親提北上送往順天高等學堂讀書今年僕在汕頭復蒙馮警長駿委派汕頭檢察驗病所之職並兼得同濟延壽兩醫

院之聘其於贈醫施藥之念益遂初心嗟乎爲善之願豈可忘哉乃者侯君蘭汀過汕適僕之所編癩科全書告成見而大悅慨然出資爲僕刊板更得侯孝廉家驥張孝廉衡舉合爲更正即將是編先行佈告同人其中絲毫無隱願以後普天之下五洲萬國書史同文得是方而全是症者皆遇羅鉅商侯君之所賜亦侯孝廉張孝廉與僕之所大願也謹誌數言以爲天下之有秘方者勸亦爲天下之富有一方者勸焉時

宣統元年仲秋之月古梅梁希曾柘軒氏自序於鮑江之檢查驗病所

癩科全書自序

九

癩科全書自序

一〇

癩科全書目錄

點癩藥品

點癩法

辨癩治癩法

辨癩養癩法

癩家之忌食

癩家之宜食

癩科全書

清廣東嘉應梁希曾柘軒著

點癩藥品

新出窰石灰 八錢(是出窰未泡水愈新愈佳)

乾餅藥 四錢(又名梘砂潔白如雪者佳)

硃砂 五釐

計三味其法取石灰先臨風自化篩去粗粒將各藥秤足貯瓦餅聽用或
豫先製備多數將三味加增和勻封好切勿近潮濕隨帶出門極為方便
至硃砂一味原取其色紅易見痕跡以便復點非必需之藥也方中三味
共重一兩二錢零五釐即加減些亦可大約每料必如此之多方見有味

癩科全書

癩科全書

臨時酌用不必拘泥以下所列內服各藥品其輕重亦可隨時加減神而
明之存乎其人

點癩法

一點時將各藥秤足用有蓋幼羹器盛好然後取高粱燒酒開化極力攪勻至
恰好處何謂恰好以藥停脚後其上面約二分清酒浮出是為恰好然後取
小筆竿一枝蘸起其浮出清酒在癩之核外離三分處週圍點之每一點約
亦均離三分切勿一片塗去如有酒流下當用紙捲拭淨週圍點完頃刻點
乾照其原點痕處再點連點至六七次以痛為度初點二三次即微作癢至
五六次即微作痛如蟻咬焉並無大痛

一不可並渣點上如並渣點上必致破皮偷破皮亦無甚妨害二三日即自平
滿

一不可錯亂點去須次第照原點之痕處點之其藥味方能直達而制服其核外之根株使他潛消永久不能再發

一首次點後計首尾足五日須再依前法點之使其前次所點之藥力與後次之藥力可以相接方能奏功如未消盡越五日再點點至全消為止

一點時無分點數量核之大小而准數焉核之大者其點數即多核之小者其點數即少總以週圍點之爲妙長者照長式點之圓者照圓式點之核之奇正不齊即隨其奇正之式點之倘其核過大則並核內亦不妨點之且不妨週圍雙行點之使藥味猛而有力點至全消爲度如其核收小則點藥亦宜漸次移入步位勿拘其舊日所點之處也

一遇有昔時之破痕破口亦不妨隨其破痕破口外週圍點之使他垢穢不再成膿易以收口倘其舊痕腫脹不堪即痕內亦不妨加點之其垢穢隨結痂

癰科全書

三

癰科全書

四

處而乾亦易收口倘其痕如有欲破之勢則將藥渣點上立即破口並貼以拔毒生肌膏

一其核之大小長短方圓聯珠無論如何式樣皆可散去惟有舊痕之死核則不可散去點者須知

一倘無石灰之處即用煨蜃灰代之亦可亦取其鹹能軟堅之意其藥力雖無石灰之猛烈加之乾餅藥少許久點亦必自消

一倘或癰曲之處一時未便有高梁酒即用酸醋代之亦可蓋酒味則取其透徹經絡醋味則取其能收斂脛節也

一點至五六次猶不癢不痛者必其藥味洩而無力故也須換過藥粉仍開酒或醋點之大約此藥味調酒後未經點者仍可久藏乾後再將酒調開如已經點者僅可藏至十五六天至久一月即要更換大約攪至藥粉成團酒不

能清即無味矣

一隨其核之大小點之其核收小其點亦隨而減少收入總以離核三分爲妙不可過遠過遠則其藥力不能透其根蒂

辨癰治癰法

癰有一症初起僅一二核形同伏杯任指揉之不搖不動此名血癰日久失治雖未見增加粒數亦必漸次加大再爲失治必日加增矣當用調血化核丸或用溪黃(五錢)和猪瘦肉(四兩)水三大碗煲二點鐘煲至半碗停凍食時再煲熱去溪黃將肉并湯飯後溫食或三日或五日然後再煲食不妨多食外治照上所列點癰法治之

調血化核丸 當歸二兩 阿膠一兩五錢 真正冬葵子二兩(如春葵子不可入藥) 正杭菊花一兩 杭白芍一兩五錢 柴胡四錢 茯苓

癰科全書

五

癰科全書

六

一兩五錢 白芥子八錢 海藻一兩 昆布一兩 老熟地二兩 煨牡蠣一兩 煨龍骨一兩 山慈姑一兩(去皮毛)

右藥揀上品研細末鍊蜜爲丸如綠豆大切勿用火焙早晚飯後淡鹽湯送下三錢臨時加減水劑亦可

癰有一症初起僅二三核形同檳榔以指揉之環轉如丸愈起愈多此名氣癰當用疎氣消核丸外治同上如其人兼有實熱亦不妨酌加芩連等味然必須脈症相對方爲投之無害

疎氣消核丸 夏枯草二兩 桔梗一兩 柴胡五錢 廣陳皮五錢 半夏八錢 元參四兩 煨牡蠣一兩五錢 煨龍骨一兩五錢 白芥子一兩 花粉一兩五錢 生甘草五錢 茯苓一兩五錢 山慈姑一兩(去皮毛) 右藥揀上品研細末鍊蜜爲丸如綠豆大切勿用火焙服法如前加減作湯

劑亦可

瘰癧有一症頸際夾起大如卵形堅硬異常或一邊或兩邊或帶小核數粒此乃寒痰凝結而成名陰火瘰癧必其人體質羸弱或後天虧損所致當以溫補肝腎固脾為主如加減六味地黃丸之類再審其或唇舌常白面色痿黃並其脈沉遲無力必兼用附桂乃克奏功外治概如前法

加減六味地黃丸 茯苓一兩五錢 熟地四兩 澤瀉八錢 炙甘草五錢 枸杞一兩五錢(鹽水炒) 黃肉一兩五錢 青皮五錢(鹽水炒) 半夏八錢 粉丹皮八錢 煨龍骨一兩 煨牡蠣一兩 杜仲一兩(炒黑) 白芥子一兩

右藥揀上品研細末鍊蜜爲丸如綠豆大切勿火焙服法如前加減作湯劑亦可

瘰癧科全書

七

瘰癧科全書

八

瘰癧有一症驟然紅腫非色慾所致即癆瘵不謹此無定名隨症皆可致此急用消腫湯外治同上如其人素本虛寒仍當於虛寒症中參酌消息用之不可拘泥如腫退後仍照原症治法治之

消腫湯 夏枯草三錢 山慈姑二錢(去皮毛) 煨牡蠣二錢 海藻二錢 昆布二錢 生甘草一錢 桔梗二錢 元參三錢 花粉三錢 白芥子二錢

瘰癧有一症層疊無窮一名瘰癧又名老鼠瘰癧無論已潰未潰俱隨起隨治均照上點法隨核點之未收口者並貼以拔毒膏隨其人虛實寒熱而治之如熱之挾欬嗽者即於貝母瓜蒌散或紫苑散內酌加元參煨牡蠣等消息用之如挾虛寒欬嗽者則於二陳湯內隨其症之或陰或陽酌加四君四物加減消息用之各湯劑爲丸亦可

貝母瓜蒌散 川貝母二錢(沖服) 膽星一錢五分 黑山梔一錢五分 黃芩一錢五分 橘紅一錢五分

紫苑散 沙參三錢 紫苑二錢 知母一錢 川貝母二錢(沖服) 桔梗二錢 茯苓三錢 阿膠三錢 五味子二十粒 炙甘草一錢

四子君湯 黨參二錢五分 白朮二錢 茯苓二錢 炙甘草一錢 四物湯 全當歸三錢 川芎一錢五分 白芍三錢 老熟地四錢

二陳湯 廣陳皮一錢五分 半夏二錢 茯苓二錢 炙甘草一錢

瘰癧有一症自裸襪而至成童旋起旋消或凝結久而不化或時大時小此多由先天虛損所致或在其母腹內飲食不謹而來此名童子瘰癧又名乳瘰癧其在三歲以內不能施以點核之功如審其果係熱痰惟用蒜頭搗鹽貼之或黃花墨菜白花墨菜或燈籠草或野菊花或甜菜子取根葉和赤糖少許搗貼

瘰癧科全書

九

瘰癧科全書

一〇

或用蒼朮三黃散用白酒開塗內則服黃花墨菜白花墨菜和赤糖少許時時煎咽之或百合或花粉時俟瘰癧瘦肉食之均宜臨症消息用之如審其果係寒痰外則用消腫散或五將軍散調白燒酒敷之其在三歲以上者則於各條內參酌用之可也

消腫散 生南星五錢 生半夏五錢 生草烏五錢 凋竹五錢 生甘草三錢 細辛五錢 重樓一兩 共研末燒酒調敷

此方可治一切紅腫並可治天蛇頭等症

蒼朮三黃散 蒼朮五錢 黃芩五錢 黃柏五錢 大黃五錢 生南星五錢 豬脂粉(少許用豬前蹄骨火煨存性研粉用) 共研末燒酒調敷

此方能治一切濕毒已破口者用淨油調

五將軍散 生半夏(一撮連根葉共生搗爛) 生蚌(三四只如無蚌肉

或蜃肉螺肉之屬均可)丁香(少許) 粗鹽(少許) 飯粒(少許) 同搗敷
此方能治一切痰核惡毒等症

癰有一症無論因何而起誤被醫師用丹吊核或誤被西醫以刀剖核以致纏綿不休時而收口時而破口環頸皆是此名催命癰目見世人被這兩種醫生誤死者恆不乏人此症最爲危險分內外法治之內治必審其人果屬熱者則投以清熱化痰之品若兼欬嗽者並理欬嗽兼血症者並理血症兼花柳者則並解毒若其人近陽虛者則於化痰消核之內重用四君若近陰虛者則於化痰消核之內重用四物虛寒甚者則並用附桂要皆於前後各症門中消息用之不可拘執各湯劑爲丸亦可

外治則與上用藥粉開酒週圍點之其舊癰之大者並其核之大者無論癰內核內俱並點之即點至其舊癰至爛亦不妨使他惡核潛消即濁穢之

癰科全書

一一

癰科全書

一二

水亦可隨舊癰之口隨點隨爛隨乾自易收口倘有穢濁墜下勢欲腫脹可將其點核之藥渣點上立即破口隨腫隨破以抽乾穢濁之水爲止此等穢濁核不成核膿不成膿水不成水不能潛消不能拔毒不能解化只得用此隨腫隨破之法抽乾其水力能奏效否則無濟

癰有一症或挾吐血而來者或因患癰而至吐血者俱名絕命癰最爲難治又兼吐血則經絡臟腑內外俱傷焉得不死其因寒症吐血而患癰者多是五臟虛損須大補氣血靜養二三年或有生理內治則服補元消核丸切禁黃耆蓋黃耆提氣故也其因熱症吐血而患癰者多是飲食不謹或暴怒所致內治則加減四生丸或加減生地黃湯或加減犀角地黃湯或加減地黃丸凡湯劑爲丸亦可隨症選用外治同上如吐血不止可用生蓮藕搗汁服之或正安南桂亦可

補元消核丸 當歸二兩 枸杞二兩 白朮二兩 炒棗仁二兩 山藥一兩 茯神一兩 熟地一兩 煨龍骨一兩 鹿角膏二兩 半夏一兩 杜仲一兩(炒黑) 蜜丸服法同上

加減四生丸 鮮生地五錢 生荷葉三錢 生艾葉三錢 生側柏葉三錢 真鬱金一錢五分

加減生地黃湯 生地五錢 川牛膝二錢 粉丹皮一錢五分 麥冬三錢 煨牡蠣一錢 煨龍骨一錢 黑山梔一錢五分 丹參三錢 元參三錢 白芍三錢 真鬱金一錢五分 三七一錢五分 荷葉二錢

加減犀角地黃湯 正犀角二錢(磨水沖服) 粉丹皮一錢五分 麥冬二錢 (去心) 生地四錢 白芍五錢 花粉二錢 百合三錢 煨牡蠣二錢 煨龍骨二錢

癰科全書 一三

癰科全書

一四

加減六味地黃丸(見上陰火癰內)

癰有一症初起或在兩耳之下或環頸皆是或單在左耳之下或單在右耳之下無論核之多少色帶紅光即有欲破之勢或作痛或不作痛或寒熱交作此多由外感而來名風火癰失治則潰爛異常須內外分治

外則用燈籠草或黃花墨菜白花墨菜和赤糖少許取葉搗爛敷隨將其根連枝和赤糖煎服未潰者或用蒼朮三黃散白燒酒開塗已潰者用地棉根葉和赤糖生搗敷上拔去膿穢貼收口膏三五日即愈

內則服活絡疎肝散如陽虛潮熱則服加減五味異功散陰虛潮熱則服加減膏皮四物湯

活絡疎肝散 柴胡一錢五分 牛蒡一錢五分 淮牛膝一錢五分 青皮一錢五分 花粉三錢 山慈姑二錢去皮毛 生甘草一錢 土茯苓

三錢 防風一錢五分 葛根二錢 夏枯草二錢 審其人果有實熱酌加芩連等味

五味異功散 黨參三錢 白朮二錢 茯苓二錢 炙甘草一錢 廣陳皮一錢五分 有潮熱者酌加丹皮地骨皮等味

蒿皮四物湯 生地三錢 北沙參二錢 炙鱉甲二錢 當歸一錢五分 白芍三錢

蒼朮三黃散(見上童子癩條內)

癩有一症環頸破爛臭穢不堪久不收口愈發愈衆此乃根本虛極氣血兩虧之症名真元虛損癩外治則如上點法並貼拔毒生肌膏或用羊屎丸並搽羊屎散內服補天大造丸或加減十全大補丸

羊屎丸 用山羊屎一斤(焙研蜜丸服法如前綿羊屎則不可用)

癩科全書

一五

癩科全書

一六

羊屎散 用山羊屎四兩(焙研淨菜油調搽)

加減補天大造丸 黨參一兩五錢 白朮一兩五錢 炒棗仁八錢 當歸二兩 山藥一兩五錢 茯苓一兩五錢 枸杞一兩五錢 熟地二兩

鹿角膏一錢 龜膏一錢 煨龍骨一兩 煨牡蠣一錢 安南桂二錢

川焙附五錢 炙甘草三錢 蜜丸切勿火焙服法一如前

加減十全大補丸 熟地二兩 酒白芍二兩 川芎八錢 煨龍骨一兩

白朮二兩 茯苓一兩五錢 當歸二兩 川焙附五錢 安南桂二錢

炙甘草三錢 西黨參二兩 煨牡蠣一兩 蜜丸切勿火焙服法一如前

癩有一症其在婦人或因姑媳不和或因夫婦不睦或因子女不遂或寡而無

偶憂鬱內傷初則或經水不調久而或致閉而不通陰火上炎皆能生癩凝結不消此名傷肝癩百病叢生極為難治外治同上內服加減逍遙散兼服

加減八珍丸或加減調經飲或加減歸脾湯隨其人消息用之

加減逍遙散 柴胡一錢五分 炙甘草一錢 茯苓三錢 白朮二錢

當歸二錢 白芍三錢 丹皮一錢五分 黑山梔一錢五分 煨牡蠣一錢五分

薄荷三分 廣陳皮一錢五分 半夏二錢 白芥子二錢

加減八珍丸 熟地二兩 黨參二兩 白朮二兩 當歸一兩五錢 白芍二兩

茯苓一兩 炙甘草五錢 煨牡蠣一兩 廣陳皮五錢 半夏八錢

山藥一兩五錢 川芎八錢 虛寒者酌加附桂

加減調經飲 當歸三錢 川牛膝二錢 山查二錢 香附三錢 青皮一錢五分

茯苓二錢 白芥子二錢 白果二十粒 半夏二錢

加減歸脾湯 黨參二錢 白朮二錢 當歸三錢 白芍三錢 炒棗仁二錢

遠志一錢五分 茯神二錢 龍眼肉二錢 廣陳皮一錢五分

癩科全書

一七

癩科全書

一八

炙甘草一錢 半夏二錢 煨龍骨二錢 煨牡蠣二錢 倘經閉氣塞用

丹參一味約五錢 常服奇效或王不留行均妙

或用少腹逐瘀湯 小茴香七分炒 乾薑一錢炒 元胡一錢 沒藥二錢研 當歸三錢 川芎一錢 官桂一錢 赤芍二錢 蒲黃三錢 靈脂二錢炒

脂二錢炒

癩有一症挾頭風而來者名頭風癩多因肝氣鬱結而成此症男子少患女子

居多無論發在何處外治同上內服解鬱化痰湯兼服逍遙散

解鬱化痰丸 白芷二錢 羌活二錢 秦艽二錢 天麻一錢五分 茯苓二錢

半夏二錢 葛根二錢 夏枯草三錢 煨牡蠣二錢 杭白菊二錢 白芍三錢 爲丸亦可

加減逍遙散見上傷肝癩條內

癰有一症因咳嗽日久而來者名傷肺癰其症有一二由外感一由內傷由外感而成者或加減黃芩知母湯或加減甘桔湯隨症輕重斟酌選用由內傷而成者或加減八珍湯或加減左歸飲右歸飲隨其症之屬陰屬陽選用此症多挾氣膈損傷隨症酌用治傷各味外治同上

加減黃芩知母湯 黃芩二錢 知母二錢 桑白皮三錢 天花粉三錢 杏仁二錢去皮 山梔二錢 正川貝二錢(另包沖服) 桔梗二錢 生甘草一錢 煨牡蠣二錢 元參三錢 鬱金一錢五分 如挾初感風寒酌加荊芥防風

加減甘桔湯 生甘草一錢 桔梗二錢 正川貝二錢另包沖服 旋覆花二錢 百部二錢 白前一錢五分 茯苓二錢 元參三錢 鬱金一錢五分 煨牡蠣二錢 如挾初感風寒酌加荊芥防風

癰科全書

一九

癰科全書

二〇

加減左歸飲 熟地三錢 山藥二錢 枸杞三錢 茯苓三錢 廣陳皮三錢 半夏二錢 黃肉三錢 鬱金一錢五分 三七一錢 炙甘草一錢

加減右歸飲 熟地三錢 山藥三錢 枸杞三錢 川芎附八分 杜仲三錢 黃肉二錢 安桂三分另包沖服 炙甘草一錢 鬱金一錢五分 三七一錢 廣陳皮一錢五分 半夏二錢 白芨二錢

癰有一症無論在頸之左在頸之右初起只單一核圓若彈丸不癢不痛雖經十年八年仍不腫不痛亦無加增此名頑核癰皆因或氣或血為機觸動凝結而成不必施治惟謹戒食燥火生痰之物並少食雞肉及一切勿動肝火則得之矣

癰有一症審其果自花柳而來無論如何發起均名花柳癰內治皆以解毒為

先當用枯草慈姑化毒丸間服土茯苓膏如花柳各症尙未全愈須兼服另編花柳丸並多服解毒湯如有別症隨其症之屬陰屬陽分別酌治外治同上如破口則貼拔毒生肌膏破口之外仍用上外治之法點之如有欲破又未破者則用所點之藥粉連渣點之點上少許其口即破

枯草慈姑化毒丸 夏枯草五兩 正川貝二兩去心 山慈姑二兩去皮 毛 蒲公英二兩 廣陳皮二兩 生甘草一兩 全蝎二兩 枳殼二兩 桔梗二兩 山梔子二兩 白芷二兩 沉香一兩 半夏二兩 柴胡二兩 膽星一兩 銀花二兩 共為末米糊為丸如綠豆大服法晒法一如前

辯癰養癰法

一癰之成症虛實寒熱須辨分明何謂熱症實症望其舌胎黃唇色紅顏面有

癰科全書

二一

癰科全書

二二

火氣切其脈浮中沉三部俱堅實有力且其人雄偉異常全無虛寒體態則知其症之是由熱痰而起者何謂虛症寒症望其舌胎白唇色淡顏面無血色切其脈浮中沉三部俱沈遲無力且其懶弱無比語言坐臥俱無精神則知其症是由寒痰而起者

一癰之成症古人原分有二十二經絡或二十四節或三十六症等治此皆醫家各命名義實不必拘泥其名要之千種癰症總不外乎熱痰寒痰實症虛症而已其部位原無定體隨其氣之所阻血之所凝而成能辨其寒痰熱痰實症虛症則無訛矣

一癰之成症其結核最堅最實因其積染鬱結至深至遠而成故也所以治之者動輒累月經年乃能奏效大凡內外各症其發之易者治亦易發之難者治亦難願患癰症者毋以其醫治之時日久遠即輕信人言或任庸醫用丹

吊核或任西醫用刀剖割不知愈吊愈多愈割愈衆竟至纏綿層層環頸破爛腥穢不堪命在須臾皆是自誤

一瘰之成症其核之生如竹根焉如草根焉非他症結核者之所可比故其發也忽左忽右忽東忽西忽上忽下忽前忽後全無定體甚至或發連腋或發連胸前或兩手臂等處種種怪象實難盡言時醫不識則多用吊丹西醫不明則專用剖割以為其核為我取去豈有不善之理不知此纔取出彼核又生纏綿不休多致環頸皆是坐而待斃而已慘何言哉希會之醫治瘰症則以潛消為主隨起隨去隨點隨乾務絕其根蒂使他不得再延蔓而生論其藥亦最淡無味論其價亦最賤不貴無論貧富皆易施治誠千古五大部洲無過之至寶也

一瘰之成症總不外熱痰寒痰兩者患熱痰者居其六患寒痰者居其二其餘

瘰科全書

二二二

瘰科全書

二二四

如花柳風火並挾他症而生者亦有一焉全在審症分明其治自易

一瘰之成症原與癆瘵相表裏者也同一陰火也痰也其痰其火行之臟腑初則欬嗽吐血隨成癆瘵行之經絡則為瘰瘵有由先天而來者有由後天而來者先天之損由胎故其發多在童年幼稚後天之損由人故其發雖年至五六十猶不免焉是故善治者只理其肝脾腎三家之陰火而已

一瘰之成症多由肝氣鬱結或暴怒而成故其發生在兩耳之下頸之左右凡患瘰症者最宜戒腦怒並戒燥火生痰之味藏養肝氣勿使其動動則其瘰雖功在垂成之際必致反劇驟然腫脹異常不得怨望醫師之藥力無功患是症者切宜戒之即房勞亦所當戒否則治亦無濟

一瘰之成症最忌夜不眠不早眠則必致陰火暴發其他勞神各事之忌無須言矣

一瘰之成症除風火瘰一症之外無論初發久發多不瘰不痛所以人多為其所誤以為不甚關切每致忽治及至疊出無窮或致潰爛始恍然悔悟已禍不堪矣願患是症者早為調治貽免後患

一瘰之成症查古人所立方書尚茫無善法多致斃命其他剖割吊丹等法則益不堪言矣故諺云十瘰九死其信然矣希會自傳受此外治之方再為參考內治之法細心研究百試不差經希會親自醫治者可十瘰十生縱有不治者皆彼之自誤耳噫希會今年四十有八矣恐一旦棄世此法失傳千載下猶有憾焉茲敬屬所傳秘術全盤托出更將希會數十年來自己親臨各症測準治法並如何用藥一一筆之於書使後人照此醫治斷無失誤矣

一瘰之成症實變化無窮有可十天八天告愈者有可二三十天告愈者有三五閱月而告愈者有久至期年而告愈者總在其人之善為調養深信希會

瘰科全書

二二五

瘰科全書

二二六

此法醫治斷無不瘰之理不然縱醫治至三十年亦無濟也

一瘰之成症內外兩科相較此最難治希會所列宜食品內有粉藤根長藤胡練根兩味和猪瘦肉服食者此乃治氣血兩種瘰症之聖藥雖然彼不深信者斷不可輕易給瘰家食之何也蓋服此兩種藥根後必多服按症各丸藥以固其元氣庶不致傷損臟腑若不多服丸藥將來恐有吐血之病反為不美患瘰者須知之治瘰者須慎之希會恐後人不慎專用此藥根誤人性命故特摘出醫之為術可不慎歟

附長藤胡練根說

長藤胡練其葉一與練樹無異惟彼則藤生的有紅白二種其功用皆同有花開有子結其花與燈籠草相似凡人患惡核驟然紅腫者取此藤連葉搗赤糖少許貼之奇效並可貼對口瘡

癩家忌食之當戒者開列於左

雞肉 (雞性主動動則燥火癩之症多生自肝肝最忌燥故雞肉一味為癩家最忌食雖已全愈仍當切戒焉) 鵝肉 (有毒燥火忌食) 飛禽 (類多燥火忌食) 煎炒 (燥火忌食) 魚蝦 (生痰燥火忌食) 陳腐 (生痰忌食) 酸辣 (傷脛忌食非特薑與胡椒辣者等等味凡一切辛散之味皆當戒焉) 羊肉 (燥火忌食) 牛肉 (燥火忌食) 猪肝 (燥火忌食) 猪肝 (燥火忌食) 猪肺 (燥火忌食) 猪心 (燥火忌食) 猪脾 (燥火忌食) 猪胃 (燥火忌食) 猪膽 (燥火忌食) 猪腎 (燥火忌食) 猪膀 (燥火忌食) 猪尾 (燥火忌食) 猪鬃 (燥火忌食) 猪鬣 (燥火忌食) 猪鬃 (燥火忌食) 猪鬣 (燥火忌食) 猪鬃 (燥火忌食) 猪鬣 (燥火忌食)

以上所列忌食各品不過言其大略總不外乎其品之近燥火生痰發毒者皆當切戒焉癩家謹之

癩家之宜食者開列於左

猪肉 (滋潤宜食瘦者為佳) 連鯉 (即穿山甲破堅除毒宜食) 貓肉 (滋潤宜食)

癩科全書

二七

癩科全書

二八

潤除陰火宜食) 鴨肉 (清潤降火宜食) 團魚 (滋潤降火宜食) 鮑魚 (滋潤宜食) 海參 (滋潤宜食破爛者則忌食焉) 墨魚 (滋潤降火宜食) 蜥皮 (滋潤除痰宜食) 蟹肉 (滋潤宜食) 蟻豉 (滋潤宜食) 淡菜 (滋潤宜食) 海帶 (除痰宜食和猪瘦肉同煲更妙) 燕窩 (滋潤除痰宜食) 鴨蛋 (清潤宜食) 鹹蛋 (清潤宜食) 雞蛋 (清潤宜食) 百合 (清潤宜食) 紅豆 (清解宜食) 白豆 (清解宜食) 檸檬 (除痰宜食) 冬瓜 (清解宜食) 鹽菜 (清解宜食) 生菜 (清解宜食) 芥菜 (除痰宜食) 羅白 (清解宜食) 苦瓜 (清解宜食) 綠豆 (清解宜食) 黑豆 (清解宜食) 赤豆 (去濕宜食) 土茯苓 (清解去濕宜食) 可當茶飲) 優猪瘦肉更宜) 夏枯草 (清解平肝) 可當茶飲 粉藤根 (化痰解毒消腫化核) 須和 (猪瘦肉同煲食) 其法取根約(三四) 錢和(猪瘦)

癩科全書終

癩科全書

二九

肉(四兩)水(三大碗)二點鐘至) 半碗(停凍去渣) 藥根 再煲並湯食 長藤胡練根(其性服法一如粉藤根) 鳳尾草(清解當茶飲) 溪黃(化痰消核服食之法)一如粉藤根

以上所列當食各品大約多近清痰化火之味至其人虛寒又當因人服食臨時酌定可也無論寒熱各症上條所列之當戒者仍當切戒

霍君孔昭外科甲於長邑其損傷為尤著後楊氏略
得其傳遂大行於時欲求其術蓋秘而不傳焉吾友
黃君鶴林好學深思士也於霍氏親戚處覓其秘本
觀其治法之次序用藥之輕重并之有條因抄錄之
其在於活人壽世之道豈淺鮮哉不敢忘其所傳因
弁數言於卷首

乾隆四十六年歲次辛丑仲冬月抄錄



續修四庫全書 子部 醫家類

損傷科目次

總綱計廿四條

入骨

霍孔昭
計五條

秘傳

總訣
計三條

回生丹
麥壳散
加味四物湯
玉真散
鷄鳴散
桃仁承氣湯
洪寶丹
均氣散

八寶丹
血竭散
通血散
九味羌活湯
通滯散
熱痰散
化痰散
止痛長肉散

接骨散
熟粘皮散
一斗麥散
九煉丹
外敷麻藥方
收口方
護心散
刀傷敷藥
止痛生肌散
接骨膏

如聖散
導血散
麻藥方
一夜愈神丹
生肌肉方
潰膿散
生肌長肉散
出箭方
一捻金
接骨止痛方

即香黃散

一黑散

墜馬落地折傷筋骨方
補骨續筋膏
烏龍接骨丹
刀傷藥
硃砂指甲散
七厘散
上髻散
傷齒方
止血方
生肌散

接骨止痛方
跌打損傷散
接骨散
六厘散
七厘丸
八厘散
面傷青腫方
理傷膏
又方
鬼代丸

奪命靈丹
薰洗方
跌打煎方

清膿散
鹿灰散
歸芍湯
即清膿散

損傷科

霍孔昭秘傳

總綱

凡官刑杖打皮破肉碎痛苦難忍先服回生丸一服

小寶丹一服麥壳散一服

凡打縮頭板必生杖癰用小利刀細割碎以出毒

血用血竭散乾摻用布捲成一圈如杖瘡大高寸

許將葱白搗碎炒軟畧摻血竭散在內將葱填在

圈中平滿為度用烙鐵燒熱在葱上熨肉痛提起

痛止再熨至三四個時為度去葱再厚摻血竭散



油紙蓋定軟絹色好倘深重出膿水者用芋芋活
老鴉眼睛藤煎湯洗用川大黃松香等分為末摻
包好

凡棍棒杖打皮不破血不出青紅腫脹痛苦難忍先

用加味四物湯酒煎服外用半夏大黃末生薑汁

調敷用前葱熨法再用血竭散桐油調敷油紙蓋

加絹縛定再用通血散二三服童便下又有熨法

用粗紙捲如杖瘡大童便浸濕烙鐵火熨乾則再

浸至二三個時為度

凡治筋骨斷碎痛苦難忍內用加味四物湯二三劑

凡

外用葱熨法麥壳散三服三炷香時又用肥皂去
 梗火煨去筋打成餅子貼在患處棉花色好不可
 開泄令熱煖再服回生丸一顆八寶丹一服麥壳
 散一服俱熱好酒下
 手足骨斷痛苦難忍用回生丹一服八寶丹一服
 麥壳散一服再用通血散一錢小便調熱服外用
 雄雞一隻殺去血乾去毛剖去肚食烘熱石臼搗
 雞搗爛做成餅子用自然銅二錢附子二錢血竭
 散二錢研勻搽在雞餅上將餅貼在傷處用薄板
 皮細繩紮定夏一日一換冬二日一換春秋二日

一換

凡頭腦打碎天靈蓋破者須衣膜不破腦漿不出可
治先用血竭散搽傷處將葱白搗碎炒軟搽血竭
散在內貼在傷處一寸厚熨四炷香為度去葱用
刀傷藥厚搽軟絹包好不可見風開動倘有膿血
流出用葱椒湯洗去前藥將老松香川大黃等分
為末搽在傷處洗時忌風若被風進腫痛名破傷
風用玉真散并花水調塗瘡口內服玉真散二錢
好酒下以愈為度破傷風初發熱紅腫風邪傳涕
經絡未深入者用杏仁去皮尖研細飛麩等分新

汲水調勻成膏。敷傷處。腫消熱退。愈如傷重者。服
九味菝活湯。取汗。

凡刀傷肚腹大小腸流出。一人提取病人。兩手一人
提取。兩足其腸自入。用絲線縫好。用血竭散敷。用
葱熨法。四炷香為度。去葱。用血竭散厚敷。油紙包
好。不可開動。見風自愈。內服回生丸。八寶丹。麥壳
散。各一錢。

凡高處墜下。傷筋骨。瘀血凝滯。在內發熱。胸腹脹痛。
用雞鳴散一劑。老酒煎服。去瘀痛止。若瘀血不盡。
再用通血散。通滯散。各一服。至便煎服。如身強。瘀

重者可用桃仁承氣湯

凡遍身手足打傷青紅腫脹皮不破血不出痛苦難

忍先服雞鳴散再服通血散通滯散童便煎服如

重者用葱熨法以消腫再用粗紙小便浸濕熨二

炷香為度再服回生丸八寶丹麥壳散各一錢

凡刃傷喉先服回生丸八寶丹一服如傷開潤用絲

線縫好用花椒湯或茶用羊毛筆洗去瘀血敷刀

傷藥壁喜蛛窠蓋貼外用膏藥軟絹包法一法

先敷刀傷藥將葱白搗細炒熟厚敷用葱汁浸粗

紙包熨四炷香為度去葱用三七草口內呷如厚

凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	
腫痛身目俱黃	其人如狂或小便不利大便黑色胸前腹內堅硬	便不通乃瘀血不散邪熱傳裏瘀血蓄于膀胱經	跌打損墜刑傷蓄血青紅腫脹疼痛難忍或大小	或通血散通滯散選用	利譫語煩渴此畜血症用桃仁承氣湯血下自愈	跌打損傷青紫腫痛皮肉不破其人如狂小便自	老松香等分為末外用太乙膏二日一換	倘有膿水流流出用葱椒煎湯洗淨抹乾搽川大黃	塗刀口用血竭散搽上軟絹包好不可開動凡	

氣湯下盡黑血再服通血散若血自下不必服
凡夾傷筋斷骨碎先用四物湯酒煎連服三四劑再
服回生丸八寶丹麥壳散各一服俱酒下仍照前
用葱熨法又用肥皂去核火煨去筋膜打成餅貼
傷處將棉花包定不可開動見風令暖熱後服接
骨散八分導滯散三錢用童便送下
凡唇皮跌碎不能食者服回生丹一九八寶丹五分
用鉄鉗二把鉗住兩邊唇皮用小利刀隨鉗割去
兩邊碎肉盡去其血將鉗縛緊用竹片兩塊揀入
鉗內用線扎緊亦鉗又以三七口中嚼碎內敷

又用葱白炒軟貼患處熨至內熱去葱將刀仍藥
厚摻以絹包緊五日即愈

凡列頸斷喉見者人多驚走束手待斃不知其勢雖
凶死中有可活之機醫者須寬慰其心不論氣食
二喉急令人扶正其頸托湊喉管勿使氣出如傷
口潤大者用線縫一二針小者不必縫用川椒湯
以綿洗去瘀血敷刀傷藥照前用壁喜蛛窠同膏
藥封好軟絹包服回生丸八寶丹麦壳散自愈此
處見効甚速但食飽之人犯之則不可救此
傷不宜用摻藥夫氣必由之出入若復用燥烈收

欬之品吸入肺經阻塞氣道必發噎而血沫不止
立斃須慎之

凡手足骨斷碎先服回生丸八寶丹麥壳散隨用熨
法再上敷藥將杉木板或楊樹皮襯以燈草及棉
花絮扎縛令其煖而血易行若患者畏痛不肯令
人動手先將麻頭或麻索煎湯醫人用手和湯緩
緩捻之碎者捻必有聲良久痛漸減半急用左手
把定傷處不可讓其退縮即紮敷藥夏天一日
一換冬天三日一換換時解開須照前法不可搖
動其骨令少平又人以熱手摩其下段使血氣得

以活動

凡從高墜下輕者令其如僧盤脚而坐至一二時方
舉步行行走內服行氣活血之藥可以無恙如重傷
幾死止有一息未絕者令一人席地而坐輕者把
雙手抱患者于懷中倘手閉緊閉藥無所施急用
半夏末吹入鼻中稍甦以蘇油生姜汁調勻灌之
待醒却用奪命丹一服好酒送下若過咽喉即可
不死方視其或外傷內傷從容調治無不痊愈如
取藥不及之處急用童便沖熟酒灌之候再治
凡斬頸斷骨急扶正其頭用杉木板連胸綁定其頭

蓋元首其重此骨一斷頭必垂下故也外敷生肌收口等藥或先用熨法洗亦可內服接骨丹及生氣補血之劑多方調治庶可活命

凡肩頸骨斷頭必翹起先熨後貼膏藥再以紙或棉花鋪襯用性極柔軟之板壓之以長布帶穿縛在腋下緊拴定內服接骨丹及上部等藥

凡膝蓋骨碎或脫出若不治則終身不能站立以柔軟之物或牛皮諸色樹皮如骨大小做成一圈緊繫箍住其骨以長帶扎縛俾當內服接骨等藥如愈後去箍

凡斬斷指頭須即刻拈起裝上用頂好沉香蘇一為
細末少加輕粉敷所處外用蛋壳包好完固敷可
如故稍遲則不可接也

凡諸骨斷折出皮外者必甚尖利先以麻藥麻定然
後用極利之器剝去其鋒湊准捺入依接骨法扎
定藥亦如之脉絡相生自然堅固若患者畏痛醫
者畏難不去其鋒潦草捺入則方欲生肌遠一運
動而尖鋒復刺以致傷久可合遂成殘疾
凡囊裂卵出輕手送入以針縫之敷上生肌散外再
以青荷葉包好如無紬帕亦可若龜頭毀壞只以

粉霜摻之忌熨

凡鉛彈入骨肉刀鉗無所施須割開皮肉用象牙蠅
螂滴乳等分為末摻入白出或土狗七八隻共
搗汁滴入亦出如竹木刺入肉內用鹿角尖及象
牙尖燒螂末香油調敷自出如火箭恐毒氣攻
心須服金汁或糞清及柘葉汁皆可
凡骨突出或箭入骨不出及吊喉吊唇必須吃麻藥
方可下手

凡肚破腸傷取上好火酒灌之候斤時聞其傷處若
有些火酒及穢氣則腸破如遇此症且寬心傷

口有蛆亦耐

凡天靈骨碎或顛裂可陷或出白沫似髓見者畏之
多信是腦出而人即死其不死者乃衣外之醬也
先用法熨之膿水流去用川椒湯洗之將香黃散
敷上洗一次敷一次膿不淨不必洗切勿不可見風
內服玉真散酒調送下如或破傷風而頭面紅腫
發熱者服九味羌活湯

續修四庫全書 子部 醫家類

七二〇

入骹法

臂骨出臼

醫人用左手前掌托於被傷之處右手將下節拿定
切不可讓其退縮儘力一扯徐徐放入故位服行
氣活血之藥自愈

膝骨出臼

其骨從髌上出者用一二人決定脛拔伸節骨醫者
用脚捺入如從檔出者不治訣處脫臼可得以故惟
此十有九難不可不知

肩骨出臼

今患者坐于低矮之處醫者以兩手指錄入抱自膝上其膝湏並擺豎起將膝借力着寔拔寬節處輕輕鬆手放入故位 又法用梯二隻對縛取齊置一矮橈于梯下先令患者服回生力及八寶丹麥壳散立于橈上兩手憑之左右捧定令患者閉目聳而顛之曰自復矣若曰復而不時脫者宜多服強筋壯骨之藥方愈

頷骨出曰

先令患者坐定雙手抵臉數百遍使熱氣深入骨髓醫人方用大姆指入其口內拏定下頷之牙以心

手指將下頷往上，一兜便是。

鼻骨出臼

鼻骨有筍有臼，如破傷脫出，用手按入臼，鼻自正矣。若傷折者，須捺平其骨，灸之，先以空膏封貼，二眼以避其藥，再用硬物護之，以避其火。頭面諸處，諸要護之，熨後更換敷藥，內服接骨散。

醫家類

損傷生死訣

出血過多脉宜沉細若返浮速者是風熱所染必死
從高墜下等証內有瘀血其腹脹滿脉宜強旺若虛
弱者死命脉起者生出以一二日脉來洪大者二十
日死滑細者生內傷心肺二柱骨折衣破腦碎出腰
背腹物小腹受傷或糞出者俱不治

損傷不治訣

- 一 右傷入肺其人雖不死至二七日難過不治
- 一 左脇下傷透內者不治
- 一 腸傷一半者可治若左斷者不治
- 一 小腹下傷內者不治
- 一 如症候繁多者不治
- 一 脉來洪浮不寔重按無根者不治
- 一 年老之人壓碎左股者不治
- 一 腎子破傷者不治
- 一 如血出盡不止者不治

一或肩內及耳後傷透內者不治

損傷戒禁談

一戒房事 二戒暴怒 三戒寒涼藥 四戒食毒
物 五戒食空冷 六戒用布包凡敷藥外 須用油
紙襯然後以紬帕包使血不染包上 七戒冷水洗
八戒熱湯洗 九戒犯火氣 十戒與婦人同睡

續修四庫全書

子部 醫家類

七三〇

回生丸

乳香 沒藥 各一兩 全蝎 焙一兩 蚯蚓 去二兩 丁香

木香 無名異 各一兩 麝香 五分 自然銅 煅一兩

為不蜜丸如龍眼大 金箔為衣 黃占包裏 每服

一九好酒送下

八寶丹

丁香 七錢 木香 乳香 沒藥 血竭 檀香

沉香 各五錢 麝香 五分 鱉兒虫 五錢 加土鱉五錢 兒骨三錢

為末 每服五分 酒下

谷壳散

自然銅 古銅錢 醋各二兩 煅十次 驚兒虫 煨 錢 乳香油
沒藥 各三錢 麝香 五分

為末 磁器收貯 不可泄氣 每服五分 酒下

血竭散

千年石炭 四兩 風化炭 二兩 大黃 肉桂 各二兩
生半夏 四兩

將炭為末 炒黃 下黃桂二味 和勻 入風化炭末
和勻 如堊花 已焦 冷入半夏末 再研篩過 收貯
如治杖打 先將小利刀去毒血 此藥摻上 就用
此藥末 生能油調膏 貼其効如神

加味四物湯

川芎

歸身

白芍

地黃

丹皮

川烏

生一兩

丁香

五錢

檀香

榔

七錢

大黃

一兩

桃仁

二十粒

官桂

桂

牛膝

木香

各五錢

胡椒

一兩

老酒

煮服

作散

每服

二錢

通血散

治打傷

重者

皮肉不破

瘀血作痛

發狂

大黃

五兩

生半熟

當歸

二錢

大附子

五錢

為細末

每服

三錢

童便調服

重者

用二服

或用

伍錢

加桃仁

七粒

玉真散

治跌打

金傷

或破傷

風

南星 防風 白礬 各三錢

為末水碗半煮乾取出晒燥聽用如破傷風用

井水調敷內酒服一錢或童便服如牙關緊

閉角弓反張童便服二錢如顛狗咬傷口含

漿水洗淨抹乾敷上永不發亦不作膿

凡味羗活湯 治破傷風咳嗽面腫發熱

氈活 防風 白芷 乾葛 川芎 細辛

赤芍 桔梗 升麻 薑蔥煎

雞鳴散 治墮下及小石壓傷皮肉不破瘀滯作痛

川大黃 一兩 歸尾 五錢 枳仁 十一粒 去皮尖

老酒碗半煎至一碗冲童便七分頭一晚夜煎至
雞鳴熱服以下其血倘有發暈者熱童便灌之
或作末每服五分熱酒冲服
通滯散 治跌打傷重者二便不通瘀血攻心腹作

痛將死

大黃 桃仁 各三錢 紅花 二錢 芒硝 四錢
水煎冲老酒童便熱服只寒加乾薑肉桂

桃仁承氣湯

桃仁 二錢 去皮尖 一粒 大黃 三錢 芒硝 一錢 五分 甘草 一錢
薑 三斤 或加歸身 紅花 蘇木

水煎冲童便尤佳

熱瘀散 治天寒瘀血寒凝作痛

乾薑 肉桂 各三錢

為末隨病輕重服

洪寶丹 治傷在胸膈上血不得下服此其血即吐

出而愈

花粉三兩 姜黃一兩 白芷二兩 忌火 黃柏一兩

為末加紅藍粉水調服

化瘀散 治赤白攻心作痛

川大黃五錢 肉桂 桃仁 當歸各三錢 附子一錢

紅花二錢 蘇木三錢

為末 童便 煎服

一方 當歸五錢 太黃一兩 桃仁二十粒

為末 童便 酒下

地氣散 治從高墜下 跌撲損傷 胸脇刺痛

丁香 木香 沉香 各二錢 五靈脂三錢 枳殼

首烏 當歸 官桂 烏朮 赤芍 玄胡索 錢

紅花 紅麴 蒼朮 青皮 各二錢 檳榔 桃仁

各三錢 甘州 砂仁 各四錢 白芷 五錢 藿香 八錢

小茴香 破故紙 各六錢 川芎 七錢 蘇木 五錢

為細末酒服三錢童便服即好

止瘡長肉散 治打傷或破或不破服此不痛不爛

露天窖內磚片四五十年者佳洗淨炭火上醋煨

十次為度

為末磁器收貯每服二錢老米飯為丸童便老

酒各半食遠服不作膿漬不可多服多則骨

軟若要長肉前末二兩自然銅醋煨十次為末

凡末一兩加麝香一錢每服四錢童便老酒各

半調服

接骨散

如聖散	血自便出矣	化瘀散	同接骨散	八分	導滯散	五分	接骨散	五分	導滯散	一分	重者	痛止	次日	再進	接骨散	五分	導滯散	一分	重者	凡治損傷	用導滯散	三錢	老酒調服	服後藥到	為末	每服	八分	無名異	煨當歸	各五錢	生附子	六錢	骨碎補	七錢	煨	土鱉	五錢	煨	香	沒藥	去油	各三錢	血竭	三錢	自然銅	古銅錢	各五錢	醋煨	大半夏	五錢	煨
-----	-------	-----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	------	------	----	------	------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	---	----	----	---	---	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	---

治金瘡出血不止牙疳疔緊急搽在傷處四

邊圍轉其血自止
咬傷風酒調熱服一
錢凡風牙虫牙
痛搽痛處涎沫出愈
犬咬傷鹽水洗乾
搽酒服一錢重者服
二三次凡惡瘡煎
葱鹽湯洗淨敷之自
愈

蒼朮 川烏 川芎 白芷 各一兩二錢
半 艸烏
細辛 各七錢五分
防風 全竭 天麻 各三錢

為末每服一錢酒下

熟粘皮散
治今瘡出血不止
龍骨 三錢
五倍子 一兩
半生半枯
白礬 一兩
半生

乳香 沒藥 各二錢 無名異 三錢 煨

為末 敷

導血散

治瘀停積胸腹作痛

胆礬 三錢 茶子 一兩

為末 每服二錢 酒下 血從口中吐出

一斗麥散

治跌傷骨斷用藥一厘老酒熱服如重

車行十里許其骨接之有聲將骨整

理如舊紮定綿衣蓋好忌風寒

土鼈虫 一個 尾 悟 芭 莖 一 粒 去 殼 自然 銅 少 許 煨

生 半 夏 一 個 乳 香 沒 藥 各 一 厘

端午日製合忌婦人雞犬心每服一厘好酒下
不可服多

麻藥方

川木鱉三錢 川烏 草烏 牙皂 烏藥 半夏

紫荊皮 小茴香 各二錢 木香 五分

為末每服一錢酒下鹽水可解

九凍丹 治跌打損傷者

人中白 二兩 醋天九次 鱉兒虫 五錢 焙去足 乳香

沒藥 各五錢 血竭 一錢 辰砂 一兩

為末每服一錢用當歸紅花蘇木烏藥枳殼酒

煎調服

一夜愈神丹 治杖傷

輕粉三錢 冰片五分 水銀五分 血竭二錢 兒茶一錢

龍骨三錢 煨黃 一兩 白占 一兩 五錢 雞子油三兩

油髮灰一兩

為末用雞子油黃白占化開候冷入前末攪勻

水浸一晝夜取貼

若要收功加蟹蛭二錢 乳香沒藥各一錢五分

海螵蛸五分 麝香一分 赤石脂五分 灸自然銅

三錢 煨收口加龍骨

外敷麻藥方

川烏 草烏 川椒 細辛 南星 半夏

蝮酥各等分 火酒 熬熱 調塗 五六次 必麻木不痛

生肌肉方 即後生肌散

石膏三兩 煅黃丹一兩 煅乳香 沒藥各一錢

為末 刀斧砍傷 搽之即愈 如跌打者 加水片三分

一黑散 治刀杖傷 痛不止者

芩根 降香 老松皮 燒灰 百草霜 為末敷

收口方

麝香殼 一個 大蜘蛛 一個 鐵鏽 七錢 月石 一錢

龍骨五分 兒茶五分 輕粉一錢

將知蛛尾骨入麝香殼內泥塗裏糠火炙待冷

同前藥研細磁器收貯聽用

潰膿散 治傷後刀膿水者

老松香 川大黃 等分

為末乾摻外用膏貼

護心散

乳香 五錢 菜莖粉 一兩 五錢 雄黃 辰砂 各五分

甘州節 五錢

為末燈心湯下

生肌長肉散

白占五錢 輕粉一錢 五分 紅珀一錢 五分 龍骨一錢

兒茶一錢

為末填平瘡口內膏藥貼之待肉長平用收口

藥

刀傷敷藥

龍骨 血竭 乳香 沒藥 赤石脂 海蝶硝

等分為末敷

出箭方

花蕊石 凝 為末圍轉自出

止痛生肌散 治刀傷血出不止

乳香 沒藥 象皮炒 龍骨燬 石膏炙 黃丹炒

三七 兒茶 等分為末

一捻金

千年石灰同 莖根搗餅 陰乾為末 搽止血生肉最

接骨膏

好

當歸七錢 五分清膏 五錢 乳香 沒藥 各五錢

木香一錢 川烏四錢 骨碎補五錢 古銅錢三錢

黃香六兩 香油一酌半

為末和油成膏油紙攤貼

接骨止痛方 凡傷筋斷骨此藥止痛活血

月石 二錢五分 官粉 當歸 自然銅 各二錢

法製為末酒和丸酒煎當歸紅花川芎白芍枳

殼烏藥送下 如有損傷急切無藥用童便或

小便與老酒對沖熱服四五次好

陸馬落地折傷筋帶方

玄胡索焙燥為末酒服或黑荳為末酒服亦好

接骨止痛方

菜荳粉以新銚內慢炒紫色新汲水調厚敷外用

白紙杉木紮定

補骨續筋膏 專治筋骨損傷

當歸 二兩 川烏 艸烏 紅花 官桂 白芷

赤芍 飛仁 防風 甲片 補骨脂 羌活 各兩

麻油 二斤

入前藥微火煎枯絹濾清復入杓內下松香

一斤溶化將葱汁一盞燒洞一斤入松香內和

勻畧煎方入前油慢火熬成膏住火下乳香沒

藥麝香阿魏二錢不住攪勻攤貼貼用蓋擦

跌打損傷散

損傷科

乳香一分 梧子一分 狗骨一分 錫煤五分 灰麩五分
為末好酒調服 糊敷痛處不可敷傷處

烏龍接骨丹

鱉虫四十九個 玉狗四十九個 蘇木七錢 乳香
沒藥各六錢 麝香三分 自然銅五錢 硃砂三錢
為末沙糖拌酒下 每服三分七厘

接骨散

自然銅 無名異 麝香 紫木香皮 肉桂
丁香 猴薑 忌鐵
為末大人服五分 小兒服三分 沙糖下

151016 丹 續修四庫全書 子部 醫家類 7

刀傷藥

乳香

沒藥

赤石脂

海蝶峭

東丹

冰片

為末敷

六厘散

金毛

仙毛

乳香

沒藥

降香

蘇木等分

為末空心酒下

硃砂指甲散

治破傷風手足或掉

指甲六錢灸

硃砂

南星

獨活各二錢

為末熱酒服四錢

七厘丸

治打傷

乳香去油沒藥去油龍骨火沒血渴兒茶紅花

硃砂各二錢土螢火五培十個酒研末死芭莖五粒去

桃仁二尖十粒去生牛夏一錢蘇木三錢當歸五錢五

共為末黃米飯搗成丸酒服

七厘散治跌打

乳香去油沒藥去油各錢血竭歸尾各伍錢硼砂一錢

芭霜去油錢半夏五分錢土螢不拘多少

共為末好酒送下七厘以汗為度

八厘散治同七厘散

骨碎補去毛金毛狗脊去毛杜仲絲炒去川斷錢各五

乳香 沒藥 各三錢
土鱉 一兩
酒 醉
死火焙
自然銅 七醋
次

紅花 各三錢
共為末好酒送下
八厘
若小兒只用三厘

一方加歸尾一錢
一錢
一錢

上齧方 治骨脫節不能合

絲毛雄雞一隻 搗碎灰酢以糯米飯糊罨患處外

以布包盡量飲醉糖至半夜鼻聞雞香透出患

處內作响聲其骨自上

面傷青腫方

茄子種通黃又大者切作如荷厚片新瓦上焙乾

損傷科

傷齒方

為末臨卧時用酒調服二錢一夜消盡無痕

點椒五錢

天靈蓋

紅肉消

白芷各三錢

為末搽動處即安

理傷膏

治刀斧傷

黃占

猪油

乳香

沒藥各一兩蜜陀僧五錢

黃丹五兩

松節

蘇油

各一斤

先將松節入油內煎數沸溼去渣入蜜陀僧黃

丹慢火煎成膏次入黃占猪油溶化再煎至滴

水成珠入乳沒攤貼

止血方

毡帽一個要油膩頭垢及蟻糞末烟四兩炒黑
共為末敷之

又方

文蛤一兩炒黑降香一兩炒黑

共為細末搽上即止

生肌散即前生肌內方

石膏三兩火煨東丹水一飛炒五錢

共為末敷之

乳香 沒藥各二錢 俱去油

鬼代丸 治官刑夾打預服不痛

乳香 沒藥 各去油 無名異 害磚 醋 土 蟹

自然銅 煨 紅花 胆 礞 赤芍 各一兩 古 錢 酌 散

地龍 法 去 土 活 胎 骨 五 錢

用 密 丸 似 彈 子 大 每 服 一 九 臨 刑 細 嚼 酒 送 下

奪 命 靈 丹 治 被 重 傷 或 受 極 刑 有 起 死 回 生 之 妙

歸 尾 桃 仁 各 一 錢 黃 麻 根 三 燒 灰 土 蟹 焙 去 頭 足

大 黃 一 酒 錢 蒸 自 然 銅 一 煨 錢 乳 香 沒 藥 二 各 錢 去 油 兒 茶 錢 二

五 銖 錢 二 錢 錢 骨 碎 補 血 竭 辰 砂 透 明 雄 黃

川 斷 各 二 錢 麝 香 四 分 蘇 木 一 錢 骨 灰 二 錢

共 為 末 入 磁 瓶 內 封 好 如 人 雖 死 而 心 尚 溫 者

輕人扶起照從高墜下之法用好酒送下一分
二厘若能入咽即可不死^連數服自愈

清膿散 治有膿

老松香 一兩 道川 大黃 二兩

共為末乾摻外用膏藥蓋貼之

薰洗方 治打傷後遍身膿臭

麻黃 荆芥 白芷 桑皮 赤芍 藿香 各二兩

橘葉 紫蘇 老薑 各三兩 葱 五兩 如臭爛加

烏柏樹根 三兩 土烏藥 二兩 骨腫痛加枳殼 二兩

共為末煎湯乘熱薰洗切忌見風

鹿灰散 治竹木入肉

鹿角一隻燒灰研末水調敷上立出久者一夕出

跌打煎方

歸尾 五加皮 劉寄奴 烏藥 紅花 丹參

澤蘭 白芷 川斷 肉桂 蘇木 紫木香

猴姜

上部 葱 活川芎 中部 柴胡 青皮 下部 防己 膝木 瓜

手 桂枝 靈仙 破傷風 南星 羌活 防風 荆芥 蓄

血 大黃 熟仁 胸滿 枳殼 小水不利 車前木通

歸芍湯 治跌打氣血凝結

歸尾 赤芍 烏藥 香附 蘇木 紅花
桃仁 官桂 甘草 腰痛加 青皮 木香 脇痛加
柴胡 川斷 水酒各半煎服