

怪疴單

元朱丹溪著

明周履靖梓

治人鼻中毛出晝夜長一二尺漸漸粗圓如繩
痛不可忍摘去更生此因食猪羊血過多而
然也用礪砂乳香飯爲丸水下十粒早晚各
一服病去乃止

一人忽覺自形作兩人並卧不別真假不語問
亦無對乃離魂也用硃砂人參茯苓濃煎服

真者氣爽而假者即化

治遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血癰
用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數
盞即愈

治人眼前常見禽蟲飛去捉之即無乃肝膽經
爲疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子各一兩
爲末每水煎二錢和滓服日三服

治人眼珠垂下至鼻大便血出名肝脹用羌活
水煎數服即愈

治人腹中有物作聲隨入語言名應聲蟲服雷
丸即愈

一人飲油五升方始快意乃髮入胃血裹化爲
蟲也用雄黃五錢水調服

治人腹中有虫如蟹走於皮下作聲如兒啼爲
筋肉之化用雷丸雄黃等分爲末摻猪肉上
炙而食之即愈

一人因着艾炙訖火痴便落瘡內鮮血片片如
胡蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熟

用大黃芒硝等分爲末水調下微利即愈
一人臨卧忽渾身虱出約五升血肉俱壞而舌
尖血出不止用鹽醋湯飲十數次即愈

治人眼赤鼻張大喘渾身出斑髮如銅鐵絲硬
乃目中熱毒氣結於下焦用白凡滑石各一
兩水三碗煎至一碗半不住口飲盡乃效

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說
喫物謂之失說物望病如說某物即以其肉
與看不與食之失他物望也睡中流出饒唾

病即愈

治人手十指斷壞唯有筋連無節肉內虫出如
燈心長數寸遍身綠毛名血餘用茯苓胡黃
連煎服愈

一人遍身皮底渾渾如波浪聲痒不可忍抓之
血出不能止名氣奔用人參苦杖青鹽細辛
各一兩水二碗煎十數沸飲盡便愈

治眼內白皆俱黑見物依舊毛髮直如鉄條不
語如醉名血潰用五靈脂酒調下二錢愈

治人口鼻中氣出盤旋不散凝似黑蓋過十日
漸漸至肩與肉相連堅勝鉄石無由飲食多
因瘡後得之用澤蘭水煎日飲三盞五日愈
治頭面發熱有光色他人手近如火灸用蒜汁
半兩酒調下吐物如蛇遂安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一
片如指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣
急用三稜莪朮各五兩爲末分三服酒調下
治夜有醉者口渴誤吞水蛭腹痛黃瘦不進飲

食用小死魚三四箇猪脂煎鎔攪勻入巴豆
十粒碎爛和田中乾泥丸如菉豆大以田中
冷水吞下一丸泄下爲度

治人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆齒皆
搖動氣出轉大即悶絕名傷寒併熱霍亂用
大黃人參各五錢水三盞煎一盞服

一人口内生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方
可飲食以手輕捏痛徹於心水調生射香一
錢頻頻服之三日根化而愈

治人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自
愈

治人面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿
血冬則近脛名白寒瘡多食魚雞菘韭即愈
治人脅破腸出臭穢急以香油抹腸送入即不
出又以人參枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪
腎粥十日愈

一人小便中出屎大便出尿名交腸用舊幘頭
燒灰酒下五分愈

治玉莖硬不痿精流無歇時如針刺捏之則脆
乃爲腎漏疾用韭子破故帛各一兩爲末每
三錢水煎日三服即止

一人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔
一錢水調塗立消

治人大腸內虫出不断斷之復生行坐不得用
鶴虱末水調服五錢自愈

治蛟龍瘕用寒食飯三升每食五合日三服吐
出蛟龍而愈

治鼻腥臭水流以碗盛而視之有如鉄色蝦魚
如米大走躍捉之即化爲水此肉壞矣食雞
肉一日二次不過一月而愈

治兩足心凸如腫硬如釘脛骨生辟孔流髓身
發寒戰惟思飲酒此肝腎氣冷熱相吞用川
烏炮爲未付之內煎韭菜湯服之愈

治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用
黃蘆酒浸一宿焙乾爲末酒調下二錢多服
即安

一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有竅出
臭氣用臭橘葉煎服愈

有小兒身上發瘡初生如魚胞又如水晶碎則
水流用蜜陀僧羅極細摻之

一兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑卧一宿
即長皮又方白早米粉乾撲於上候生皮乃
止

治人項上生瘡如櫻桃有五色瘡破即項皮斷
逐日飲牛乳自消

治人寒熱不止四肢如石擊之如鐘聲日漸消瘦用茱萸木香等分水煎一二服即愈

一人大腸頭出寸餘候乾自退落又名截腸病用芝麻油罌盛坐之飲大麻子汁數升愈

治人腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀遠身匝皮痒痛不忍扒掃不盡濃煎蒼朮浴之又以蒼朮加麝香水調服之

一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食用蒜三兩取汁酒調下即愈

一人毛竅節次血出少間不出即皮脹如鼓口鼻眼目俱脹合各味溢用生姜汁并水各一二盞服之即安

人面瘡 昔人患此于臂上滴酒瘡口中即面赤與物食之即肉脹獨以貝母付之則斂眉閉口若有苦楚之狀乃煎貝母湯以葦筒灌之數日成甲而愈

一婦人年二十餘腮生一竅口中所效膿血與竅相應而出此肺痿也用人參黃芪當歸加

退熱排膿之劑而愈

治患蛇瘕乃蛇精及液沾菜上人悞食之腹內成蛇或食蛇亦有此証其人常飢食之即吐用赤頸蜈蚣一條炙爲末分二服酒下

鼈瘕痛有未止或食鼈即痛用雞屎一升炒黃投酒中浸一宿焙爲末元浸酒調下

雞瘕有病冷痰者醫曰因食白淪雞過多故也用蒜一枚煮服乃吐一物如升大痰褻開視之乃雞雛也再服吐十三雛而愈

治婦產後有傷胞破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白牡丹根炒白芨各末一錢水一碗煎至絹爛如錫空心頓服不得作聲作聲即不効

一人心漏當胸數竅血液常流二十年用鹿茸酥炙附子炮薑花棗肉爲丸每酒下三十九半月而愈

治婦人產後忽兩乳細小下垂過小腹痛甚名乳懸用川芎當歸各二斤內用半斤水煎服

餘用燒烟熏口鼻二料乃効

一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散數服次以帶皮姜三斤研爛入清油二斤煎油乾爲度用絹兜起肉線屈曲于水道邊以前姜燻之冷則熨之一日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣

治人手指攣曲節間疼不可忍漸至斷落以草麻子去殼二兩碎者不用黃連四兩貯瓶內

水二升浸之春夏三日秋冬五日每早面東以此水吞下草麻子一粒漸加至四五粒微泄無害忌食動風物屢驗

一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花腦摻舌上應手而收重者用五錢方愈

張子和治一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以針砭之五七度腫減三日方平血出盈斗婦產後忽生虫一對于地能行長寸餘自後月生一對醫以苦參加打虫藥爲丸服之又

生一對埋于土中過數日發而視之暴大如拳名子母虫從此絕根

一婦眼中忽有血如射而出或綠鼻流下但出血多時即經不行乃陰虛相火之病遂用歸身尾生地紅芍加柴胡黃柏知母條芩側柏葉木通桃仁紅花水煎食前服數帖而愈

一婦妳頭裂用秋後嫩茄子綻開頭者陰乾燒爲末水調服愈

治身

擊有青痕作痛以金銀花煎酒服

一人患腦疽面目腫閉頭焮如斗此膀胱濕熱所致以黃連消毒飲二劑次以槐花酒二碗頓退以指按下腫即復起此膿已成也於額額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更以托裏藥加金銀花運翹三十劑全愈

紅絲瘤東垣云李叔和問中年得一子一歲後身生紅絲瘤而死後四子皆然何也曰汝乃腎中伏火精內有紅絲故也俗名胎瘤汝試取精觀之果如其言遂以滋腎丸數服其妻

服六味地黄丸乃受胎生子前證不復作矣
蛇入人竅中急以手捻定以刀刮破尾以椒或
辛辣等物置尾以綿繫之即自出不可拔
一婦人產後日食茶粥二十餘碗一月後遍身
冰冷數塊以指按其冷處即冷從指下上應
至心如是者二年諸治不効以八物湯去地
黃加橘紅入姜汁竹瀝一酒鍾十服乃溫
一人頸項腫與頭相統按之堅硬用漏蘆湯一
劑服下發痒頃刻消散

治婦盤腸產者臨產即子腸先出而後產子產
子之後其腸不收以醋半盞冷水七分調勻
噴婦面三噴則腸收盡此良法也

丹溪治一婦產戶下一物如怕有尖約重一斤
却喜血不盡虛急與黃芪白朮升麻各五分
人參當歸各一錢水煎連服三劑即收上

夏月中寒一人暑月行百里渴而飲山水至晚
以單蓆陰地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀
刮而痛醫皆曰中暑也進黃連香薷飲不應

予診其脉細緊而伙此中寒也衆皆笑曰六月中寒有是事乎予以附子理中湯治之六服乃濟

冬天傷暑一婦冬月患洒洒惡寒翕翕發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆虛弱用滌痰二陳湯不效後請予治脉虛無力予曰類乎傷暑衆以爲不然予究之婦曰昨因天寒令取綿套蓋之因得此症予曰誠哉傷暑也汝之綿套晒之盛暑熱收箱中必有暑氣今躰

虛得之易入故病如是婦曰然遂用黃連香薷飲造二服其病瘳矣噫冬天傷暑夏月中寒病亦鮮見醫家問切之功活變之法不可不知也

一人耳內有丁如棗核大痛不可動一待詔用火酒滴耳內令仰上半時以針取出絕根一婦產後因子死經斷不行者半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之而痛不禁衆醫不識青林曰此石瘕病也用四物加桃仁

大黃三稜栲榔玄胡索附子澤瀉血竭爲湯
二劑而愈

一人左手無名指爪角生一小瘡初起脉_麻粒大
用小刀挑開瘡頭血出如濁不止一日夜長
肉瘤如菌叢指頂內開一孔如一眼目轉
動此疔毒也以艾灸四十壯不知疼痒復烙
之剪去肉瘤敷拔疔散外以膏藥貼之內服
解毒湯七日全愈