

〔清〕夏鼎著

幼科鐵鏡

中國醫學大成續集

## 幼科鐵鏡提要

清·夏鼎著。鼎字禹鑄。貴池卓溪人。其上卷。列九恨、十三不可學、十傳。治病不可關門殺賊。不可開門揖盜。湯方內更換藥味說。實驗推拿各法。卓溪真傳口訣。推拿代藥歌。辨臍風及各胎病。闡諸驚之謬。闡明發驚之由。兼詳治驚之法。辨驚有痰盛風盛熱盛之別。辨癇證、辨慢脾證、疰病。其下卷、列其他各雜證。從實驗中辨明俗醫治病之誤。如九恨之恨挑筋割肉。不辨病在何處。動手便挑。又恨一見有痰。動用牛黃竹瀝貝母。爲除痰要藥。不知痰有寒熱。熱痰見此。真似滾湯潑雪。寒痰見此。竟是雪上加霜。豈可概投。又恨俗醫退熱必用柴胡。不知寒熱有表裏之殊。柴胡專屬解表之味。若脾虛腎虛。氣血兩虛諸燒熱。亦用柴胡。豈不慎事。

等云。皆足爲俗醫當頭棒喝。凡爲兒科醫者。豈可不一讀是書。

貴池夏禹鑄先生手著

幼科鍼鏡

藜照書屋梓行

## 幼科鐵鏡序

自太極判而陰陽分。天地之間。有正氣卽有邪氣。正氣長則邪氣消。正氣衰則邪氣旺。消長衰旺之間。天地不能自主。而至人調燮之功出焉。人身一小天地也。方嬰兒在胎。特元氣渾淪耳。關節臟腑自然而然而成耳。一離母腹。卽納外氣。寒暑燥濕。感而疾生。或生於陰。或生於陽。陽受則入六腑。陰受則入五臟。而嬰

兒元氣漸損焉。若非保傅之力。藥石之功。幾何而不致澌滅耶。故古之至人。卽以調燮天地者。通其理於人身。自神農氏而後。學者大小不一。要不離乎扶正祛邪者。近是然。則醫之爲道。豈渺小哉。夏子禹鑄爲秋浦儒家世族。早登賢書。予於簿書之暇。每諮而訪焉。冲夷粹穆。有仁者風。間出其所著幼科錢鏡。予披閱一過。乃掩卷歎曰。信哉仁人之言。其利

溥哉。是集也。其學問邃。其理湛深。而於人身之中靡不洞燭。勿使有所壅閉湫底。正者扶之。邪者祛之。瞭然不差毫髮。雖古和緩諸人。何以加茲。况以吾儒而兼術若是。揆之和緩。古今人同不同。未可知也。昔范文正公爲布衣時。就相士卜曰。不得爲相。願爲醫。殆爲是欤。夫立德立言立功。古人稱三不朽。夏子之道德文章。固足標幟。而是集得於家學淵源。

以公於世。功曷有量。三不朽。蓋兼之矣。

昔

康熙乙亥端月遼陽梁國標正夫氏題於貴

池官署



跋

卓深先生爲吾儒碩望。而世研保嬰之術。先生推其仁愛之理於斯道。愈詣精微。故襁負臂挈。以造其庭。先生或爲撫摩。或投藥石。霍然而起者日難數計。復慮宇宙之不廣能遍及。著爲成書。鋟以行遠。壬午歲。先生送兩公郎赴試。秋闈枉顧。余於江上之浣林。手出是編。讀其九憾。十三不可學。十傳圖說。諸篇靡不條分縷晰。較夫青囊金匱之書。又有

足多者是宜與青囊金匱同驅并駕者矣因江舟之便亟請其版來而俾之印工印茲多本永廣其傳云

味冰王職識

跋

余與卓溪夏先生未締姻誼之先。只聞幼科之妙。然未得其所以妙。及己酉同應秋試。共朝夕雖數月餘。僅聆其大槩。亦未悉得其所以妙。承不忘車笠。得與菊江馮長源暨諸同志共親斯道之教焉。嘗以所得指示之精微。攻嬰兒之病患。未有不如發蒙振落之易者。今先生以兩代經驗之精神。著爲一書。公諸海內。余輩於中無有贊一辭焉者。能不愧與。幸皆攜

訣歸來。何敢忘所自出。因敬爲之跋。

眷弟穿山方任紹文氏

門人菊邑馮瀛長源氏

蘭水

葉一隆興伯氏  
何文垣斗維氏

桐城張

淡文山氏

郡城王

汲三氏

豐泉姪婿陳之仰觀文氏

羅邨子壻方泰來平階氏頓首跋

## 幼科鐵鏡凡例

凡治嬰兒病不望顏色不審苗竅故病不應藥是書惟以望顏色審苗竅六字爲大主腦

丹症俱有顏色可望苗竅可審獨驚癇瘻三症顏色苗竅俱非本來無處拿捉是書洞決死生俱屬先君從百千嬰兒中偵探出來的辨明形狀俱屬先君從百千嬰兒中體認出來的治法藥味俱屬先君從百千嬰兒中嘗試出來的故是書於此三症則冠以初明有曰

凡前輩圖繪各穴俱任意裁插鮮不差謬是書圖穴由兩代

老索毫不舛錯。

凡症所載推拿者俱屬必效。不准者如老漢扳繪猿猴摘果之類盡行刪汰。

凡症推三關必須少推腋上以應之。推六腑必須少推三關以應之。防補瀉太过。

凡症屬載明燈火艾灸俱起死回生秘法。

凡症下無湯散名只有藥味者俱卓溪自立方歷驗始載。凡有夏禹鑄曰其中多出已見發明至理亦從治效過立說。凡症立說引喻俱屬疑團不譬言不明。

凡症後間附效案。係症有疑難。傳以較核。

凡症初起不用丸散。因五臟病有輕重。臨症用劑必有加減。  
如丸散藥味分兩已定。倘內有一二味與症不宜者。抽不出來。模糊投入。反生別病。予於曹症必不肯用。若用丸散。  
殊是症屬一家。

凡口訣有古人舊訣。有卓溪新訣。新訣上註卓溪二字。

凡字句用夾圈者是大主腦。用尖圈者是認法。用單圈者是繁要。

一。熱癱認法。乃卓溪生平第一着得意處。自分亦能上繩矣。

武出以傳世。更當研究。

一。麻症大小方脉書獨不齒。及多因症屬至輕。邇來麻症爲患最重。余每臨症。只從脾肺兩臟看虛實。肺臟大腸探根苗。於中割出治法。一劑必效。用以傳世。此乃發造物未發之秘。補先輩不足之書。

凡推拿。古人以之代藥。後人竟以推拿爲兒戲。並不知推應何經。拿應何臟。所代何藥。以致輕症加重。匕症速死。予特賦出某推當某藥。某拿抵某味。使人曉得用推拿便是用藥。味藥味既不可悞投。推拿又何可亂用。

幼科鐵鏡目錄

第一卷

九憾

十傳

十三不可學

治病不可閉門揖盜說

湯方內更換藥味說

面各穴圖

掌面水底撈月引水上天河至洪池圖

掌面運八卦大指正面脾上位次并說及退下六腑圖

手背正面推上三閑採五指節圖

側手虎口合骨穴圖

脚各穴圖

全身正面用燈火圖

全身背面肺俞各穴圖

凡死症辨

卓溪真傳口訣

焦拿代藥賦

第二卷

闡明五臟生尅以知補母瀉子

望面色審苗穀從外知內

五臟各有所司從外治內

辨勝風以下各症未所附效案。俱屬疑難不常見之症。如無疑難者俱不附。

辨胎寒

胎毒發丹

胎黃

辨脾實熱虛熱

辨肺熱肺寒肺虛

辨心熱極似寒

辨燒熱

辨胎熱

辨胎驚胎風

辨蒸變

辨脾濕

辨心熱實熱虛熱

辨心熱昏迷似驚

### 第三卷

闡諸驚名之謬

闡明發驚之由兼詳治驚之法

驚癇死症辨

驚癇活症辨

辨驚有痰盛風盛熱

辨熱瘡似驚風

辨癇症

辨陽瘡似寒

辨瘡病

慢症

第四卷

麻症

辨傷風寒

辨來食傷寒

辨腹痛

辨吐

辨瀉

辨吐瀉

辨瘡疾

辨瘡疾附陰虛似瘧

第五卷

辨咳嗽

痘後

辨失血

辨中暑中熱

辨夜啼

辨疳疾

赤遊丹火

淋症

便濁

大便不通

小便不通

出汗

腫脹

辨三消

膀胱氣痛

呆笑

不寐多困

龜胸

龜背

解顱顛填顱陷

乾瘦似疳

天柱骨倒

五硬

齒病口疳瘡

口重脣重齶

耳瘡

重舌木舌

鶴膝風

痛瘋

冷水瘋

近雷所驚

大庖瘡

癰瘡

黃水瘡

惡核瘰癧

偏墜

莖腫痛

腎囊腫

霍亂

灸瘻母

灸脫肛

灸肚大青筋

久犬傷

灸蛇傷

疔瘡蠰瘡腫毒膏

貼骨疔口掛角各疔瘡發背腦癰乳癰大人小兒同治丹

第六卷

藥性小引

諸湯方

目終

幼科鍼鏡卷之一

貴池車漢叟夏鼎禹弟氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男邑庠之肖孟然全參  
郡庠之雲飛霧

九恨

一。恨挑筋割肉。五臟之病。豈盡在筋。挑斷不知當那一味藥。六  
淫之賊。豈盡在血。血出又不知退那一經邪。這一種挑筋的。  
死後定在阿羅地獄。如對予說出理來。予便不憾。

一。恨病見兒面。寒熱虛實茫然不知。輒曰死作活醫。藥之不效。  
死不在過。一藥偶中。活卽居功。死症能生。對予說出理來。于

便不恨。

一。恨見兒燒熱。並不知燒從何感。熱自何生。亂推亂拿。致兒大  
啼大叫。汗出熱解。偶爾撞著。便自稱神。旣自稱神。緣何有效。  
不效。對余說出理來。余便不恨。

一。恨不知症候。藥與病反。不曰自己用藥不當。且曰兒母有失  
護持。對予說出理來。予便不恨。

一。恨活症屢藥不效。明醫一藥成功。不曰自己不知。且曰他有  
時運。對予說出理來。予便不恨。

一。恨以丸散爲欺人之具。其實不值一文。且曰此丸此散。真是

無價。不論中病與否。解包投服。不偷則多方。以藥本爲辭。丸散既屬無價。投服病胡不瘳。對予說出理來。予便不恨。

一。恨動用牛黃竹瀝。貝母爲除痰要藥。痰有寒熱。七癰見此。真以滾湯潑雪。寒痰見此。竟是雪上加霜。不論寒熱。既投兒服。對予說出理來。予便不恨。

一。恨必用柴胡退燒。七熱有表裏之殊。柴胡耑屬解表之味。脾虛腎虛。氣血兩虛。諸燒熱亦用柴胡。對予說出理來。予便不恨。

一。恨用湯頭有內減外加之說。加減原在湯頭內看。臟腑之有

虛有實的藥味之宜多宜寡。間或清病之來路。塞病之去路。外加一二味。此是湊通妙手。如曰內可減。外可加。則四君子加兩味便成六君子。十全大補減兩味便是八珍。對子說出理來了。便不恨。

夏禹鑄曰。余生平來。凡嫉我。欺我。負我。餌我。以及無故加我者。輒過而忘。獨於幼科庸醫而恨之。但恨之有九。何也。常見艱於嗣息者。於穹蒼。於宗祖。於名山。禱無不至。一旦舉子慶也。如何。及病付醫。輕者重之。生者死之。其怨恨也。又何如。余挹公憤人也。遂引人恨爲已恨。然恨之正所以覺之也。覺之則

睡漢驚來。轉脚便步百尺竿頭。悟到醫家三昧。方見卓漢叟以九恨作醒人擘頭之一棒也。

### 十三不可學

- 一○殘忍之人必不惻怛。不可學。
- 一○馳騖之人必無前戒。不可學。
- 一○愚下之人必無慧思。不可學。
- 一○沾惹之人必不思未。不可學。
- 一○猶豫之人必無定見。不可學。
- 一○固執之人必不融通。不可學。

- 一。輕浮之人必多忽畧。不可學。
- 一。急遽之人心期速效。不可學。
- 一。怠緩之人必多逡巡。不可學。
- 一。宿怨之人借此報復。不可學。
- 一。自是之人必以非爲是。不可學。
- 一。慳吝之人必以此居奇。不可學。
- 一。貪婪之人必以此網利。不可學。
- 予以此十三種人爲不可學。非外之以爲必不可學也。苟抱此病。先能自醫。又何不可學之有。

十傳

一。見啼哭無聲。前輩批作死症。以爲肺絕故也。獨予先君子拿之無聲者。審出肺氣未絕。一藥即生。而予亦經驗過。歷七不爽。生死閑頭。何可秘而不傳。

一。驚風。一。傷寒。一。熱瘡。三種相似。前輩俱未能辨。悞醫悞死。不知凡幾。獨予先君辨出驚風的模樣。傷寒的光景。熱瘡的認法。透徹無遺。一經醫治。無有不生。而予亦經驗過。歷七不爽。生死閑頭。何可秘而不傳。

一。見左手之三閔。六腑。大指之脾位。五指之上下。兩脚之左右。

前輩無不悞傳。獨余先君悟出至理。闢盡各處差謬。闡出部位根源。推無不效。補無不應。瀉無不神。而予亦經驗過。歷七不爽。毫厘千里。何可秘而不傳。

一。兒脇風。前輩只知風入脇內。以致囁口噤口。卒不知風入深淺。死生有異。予獨悟出逆從至理。見外知內。治無不退。經驗過歷七不爽。生死開頭。何可秘而不傳。

一。兒慢症。前輩多作慢驚。推亂拿亂。掐亂火。以致汗愈亡陽。痛愈傷脾。獨予體貼慢字。不作驚治。惟補脾虛。經驗過歷七不爽。生死開頭。何可秘而不傳。

一。兒胃有實痰。藥解不散。惟有取法。前人取之。多有壅築喉內。不吐出。又不回去。因不敢取。予偶見修養家作神仙大睡法。眼翻氣築時。於氣海穴。以手指曲節抵之一。族卽活。予因悟及取痰不出。又不下者。以是法行之。果卽下。復取便出。經驗過歷々不爽。此因詩悟禮。觸類旁通。萬病俱可因端起悟。何可秘而不傳。取喚內痰。將兒中指將至尖數下。推湧泉穴。左轉不揉。以指對抵夾車穴。以耳空咬舌上。卽吐。

一。兒有驚風。痰熱虛實表裏。前人俱用推拿。且曰。小兒肚腸脆嫩。不可服藥。獨予先君云。急驚風痰。非推拿不效。臟腑下寒。非藥味莫瘳。此予兩代因病用推用藥。經驗過歷々不而好。

竽鼓瑟必不相宜。何可秘而不傳。

一。兒有病。前人以四季之五行。按五臟之五行。以藥味之四性。合天時之四季。其理固是。然不知棄輕從重之妙。如當夏宜用黃連等味以瀉心。不宜用棗仁等味以補心。理也。設使心經虛極。或怔悸不眠。或汗出如雨。補耶瀉耶。當夏宜用五味等味以救肺。不宜用桑皮等味以瀉肺。理也。設使肺經熱極。或大便閉塞。或熱血妄流。瀉耶救耶。此種學問。余從不固執。惟相其緩急。權其標本。棄輕從重。不拘時令。只照病醫。却無不好。經驗過歷。也不爽。深恐膠柱鼓瑟者。流不敢輕用藥味。

何可秘而不傳。

一。望見顏色不錯。証之苗竅相符。藥之又與病合。若服二三劑。病猶照常不除。又不加甚。切不可因人言藥不合症。半路一更方。蓋在我望色既真。辨竅既稔。效不見速。無非病深藥淺。藥力未到。譬之舟。人駕舟兩岸遼闊。一時難到。我旣認定風色。亦只把定船牙。活握蓬索。一在浪湧。兼天麿一麿。自然到岸。如把持不定。在半江中。或辭蓬轉舵。則斷無不覆之舟。予兩代經驗過。歷七不爽。似此成敗關頭。何可秘而不傳。

一。兒病患舉。世幼科皆於兒第二指面筋紋細摹細看。以形色

論症候。以透闇決死生。予兩代以醫術濟人。共約七十餘年。治活嬰兒不下百千萬數。皆以望面色審苗竅爲主。治無不神。間亦摹看筋紋。了無証驗。似此迷津道岸。何可秘而不傳。叟禹鑄曰。摹看手指筋紋乃醫家異教。蓋指面筋紋生來已定。豈因咳嗽而變爲反弓。驚積而化爲魚刺。膈熱而結爲流珠。肝氣粗而來蛇狀之理。卽曰能變能化。亦不過反弓知咳嗽。魚刺知驚積。流珠知膈熱。蛇來知氣粗而已。外有何知。况二指一面。僅大小二腸所屬。非五臟諸經並見之地。卽曰並見。一指長不過寸許。闊不過分餘。設也膈熱而兼氣粗。氣粗而

兼咳嗽。則流珠與反弓蛇來並相廝混。請從何辨。又訣曰。初關乍入宜支退。筋透三關命必亡。常見筋透三關竟無病者。亦有病時透三關而必不亡者。此種道理殊不知解。余兩代經過不驗。不忍隱而不言。見之者幸勿執迷不悟。

禹鑄曰。治病不可關門殺賊。臟腑之病必有賊邪。或自外至。或自內成。祛賊不尋去路。以致內伏。是謂閉門殺賊。如傷寒賊由外入。法宜表散。心火賊自內成。清利爲先。譬之祿山乃季唐外至之邪。三思武則天內成之賊。俱不閉門逐出。幾移唐祚。賊之爲害豈淺鮮哉。是知降心火而不利小便。除肺熱而

不引大腸。治風熱而不發表藥。夾食而不導消。痢初起而不通利。瘡始發而遽用截方。比此皆閉門之弊。不第不能殺賊。而五臟六腑無地不受其蹂躪。則閉門之害可勝道哉。有心幼科者。又不可不知也。

禹時。周病不可開門揖盜。若臟腑有虛外。雖傷感。悞爲表散分利。惹來別症。是謂開門揖盜。試以脾虛作瀉論之。脾虛惟恐補之不及。一用分利。則正氣日下。而脾愈傷。便來脾慢之症。譬之六國之病在弱。離橫合縱。乃季子補救之策。解約散縱。自開吞并之門。是亂臣亡國與分利崩脾無異理也。至於


肺虛悞爲發散。心虛利水。肝虛抑肝諸類。當從脾虛分利而類推之可也。

禹鑄曰。在湯頭中更換藥味。有宜不宜。猶文字上更換字眼。有妥不妥。一般更換字眼。有慧思鄙見之殊。更換藥味亦有鄙見慧思之別。如范希文作子陵祠堂記有歌曰。先生之德。時李太伯在座。以風字易德字。洵是慧思。李太白詩。人烟寒橘柚。而黃魯直以家園字易烟寒字。便是鄙見。至于醫家用四物湯以補血。內有熟地。若心有火而血熱。以生地易熟地。却是慧思。若心無火。血不熱。而亦以生地易熟地。便是鄙見。此

等學問。只可與知者道。難與不知者言也。業醫道者當留心焉。

禹鑄曰。凡小兒病有百端。逃不土五臟六腑氣血。症雖多怪。必不去虛實寒熱風痰。病縱難知。瞞不過顏色苗窺。症卽難辨。莫忽。暑青白紅黃。面上之顏色。苗窺乃臟腑氣血發出來的。顏色之紅黃青白。乃寒熱虛實獻出來的。業醫者能于此處做工夫。便得吾家之秘訣。

面



圖

推法。用蓼姜煎汁。浸染医人四大指。先從眉心向額上推至二十四指。次從眉心分推至太陽。太陰。九次再以代針法。再于太陽。太陰。或發汗。或止汗。又再將兩耳下垂尖捻而揉之。將兩手捧頸面搖之。以順其氣。再看寒熱。向手推三閑六腑及隨運入卦。再分推胸口及揉膀。推委中畢。揉井肩。至于別穴。看症再加揉法。


圖面正掌手

目録  
第一編  
上清少使

無剛旋推。從坎入艮。


精灵社拿。降吸由痰响。

以此處作六腑悞之極矣。



推三關。退六腑。運八卦。男女俱在左手。人以男右手爲女之左手。獨不思右掌无八卦。若亦有八卦。則震居西。兌居東。艮

居乾而坤居巽。豈後天八卦之定理而爲女子之推拿遂衰其位置耶。况男女心肝腎肺俱在左手。若女以右手爲左。則心肝諸脉可在右手不。



見眼翻上者。將大指甲在小天心向掌心下掐即平。  
見眼翻下者。將大指甲在小天心向總筋上掐即平。

夏禹鑄曰。大指面屬脾。画家画手掌不把大指画正面。乃画家之正法。前人只得以脾士字寫在側邊。後人誤認以訛傳訛。遂以大指之側面爲脾。余故將前掌圖大指移作正面。此因脾上画圖之權宜。又因口訣有曰。脾士曲補直爲推。見有曲字。便把兒指一曲着。則側面居正。故愈以側面爲脾。那曉得曲補之說。曲者旋也。子指正面旋推爲補。直推至指甲爲瀉。此前人一字之訛。遂成流弊莫救。今人推之不效。皆由六之不真。前人傳之已悞。後人幸勿再悞。

# 手背正面圖



夏禹鑄曰。五指稍尖俱屬下。前人作上。悞矣。譬諸草木。根是本。枝爲末。七下也。不辨可知。前人又每以左足爲右足。獨不想。到人在堂居中。朝上坐。却是西邊爲左邊。如此明白顯易的道理。胡爲乎还錯了。若女則右足爲左足。地道尚右也。

男左手直骨奇面爲三閔。屬氣分。推上。氣行陽動。故爲熱爲補。男左手直骨正面爲六腑。乃血分。退下。則血行陰動。故爲寒爲涼。其兩邊側裏屬陽氣陰血交界之地。以此處作三閔六腑。推之氣而無所適從。補瀉何可合用。

三閔。陽也。何女以推上爲寒。爲涼。所謂陽極陰生是也。女陰道。

故從陰生處推之。

六腑陰也。何女以退下爲熱爲補。所謂陰極生陽是也。故女從陽生處推之。


訣曰。腎水一紋與後溪。推上爲清下補之。小便閉赤清之妙。腎虛便少。補爲宜。禹鑄曰。四臟俱推上爲補。下爲瀉。何腎與四臟相反。蓋四臟居一身之上。而腎居下。腎虛則推四臟之氣往下以滋腎。故曰下補。腎水混濁則小便閉赤。若再往下推。則閉愈甚。一往上提。疏通水道而小便自清。故曰推上爲清。此上下清補有異。若不發明上下之理。恐人疑推腎之上下。

兩字有訛。則遺害不淺。故識之。

# 合骨口虎二穴圖

幼科鐵鏡

卷之一



夏禹鑄曰。前人因合骨穴。故画側手圖只能畫一面。不能畫三面。故以三閔六腑寫在兩邊。接圖雖在兩邊。而推画圖之情。兩邊原是正面。後人不體其情。以側手圖之側邊。遂執爲兒手正面之側邊。作三閔六腑。不大可怪哉。古人画圖繪穴。想無不真。多因彼讀書明理家爲醫道不足習。比之者皆俗子庸夫。不能揣情度理。一錯看過。以訛傳訛。相習不察。余力闢前謬。非故示異也。由幾番折肱體認得來的。後之君子當毋以妄誕目我。

# 足圖

幼科鐵鏡 卷之一




湧泉穴。男左轉採之吐卽止。右轉採之瀉卽止。左轉不採主吐。右轉不採主瀉。女反是。

驚不若急。大墩穴拿之。或鞋帶穴對拿。如嬰兒弱死。在大敦穴。按之無脉。又在解溪穴。再按又無脉。弱到十二分地位。不必醫。如兩處有脉。卽用人參一二分。服之自轉。不可多用。恐弱不能受。反加一死。醫者知之。

驚時若身往前撲。卽將委中穴向下掐住。身便直。若身後仰。卽將膝上鬼眼穴向下掐住。身卽正。

# 身面圖

臍風灯火。顙門。眉心。人中。承浆。兩手大指。少商。臍心。臍輪。共十三燫。




定驚元宵灯火。顙門。眉心。臍心。臍輪。合骨。鞋帶。各穴共十五燫。

# 身 背 圖

幼科鐵鏡 卷之一

三〇



## 死症辨

前輩有死症訣。然於中治之却有不死者。醫家不可棄而不治。大冲卽大敦無脈是弱症。屬不足。直視搖頭是風症。屬有餘。二者相兼。覺無此理。倘有相兼。不治症也。如止有一。斷非死症。魚口自動。忽作鴉聲。此脾有痰而肝有風。若祛風豁痰。覺非死症。蛔更盡出。不加燒熱。補脾卽安。亦非死症。面黃四肢腫。若黃有寶色。補脾行氣自消。却非死症。至于鼻門黑燥。兼以肚大青筋。手抱頭上。兼以汗似油淋。額門腫起。忽陷成坑。只犯一宗。猶非死症。若果並見。必死無疑。

卓溪家傳秘訣前輩相傳不效者刪之兩代經驗過者補之亦有訣傳不明者出已見以闡發之。補嬰兒十指冷如冰。便是驚風體不安。十指稍頭熱似火。定是夾食又傷寒。握之恐不真。再以兒手指貼吾面試之不夾。

以吾三指按兒額。感受風邪三指熱。三指按兮三指冷。內傷飲食風邪感。以上探病法。

一年之氣二十四閉額天門亦此義。自古陰陽數有九。額上分推義無異。天庭逐指至承浆。卓溪以指代針行血氣。此乃開額傷寒推法。上三關。臍熱專推六腑間。卓溪六腑推三關應一。三閉推十腑推三。推多應少爲調變。血氣之中始不偏。應。恐發熱如只推不

則動火過  
涼又有滯

啼哭聲從肺裏來。無聲肺絕實哀哉。卓溪若因痰厥聲難出。此在醫家用妙哉。

卓溪病在冒盲不可攻。我知肺俞穴能通。不愁瘻築無聲患。艾灸通神勝化土。

卓溪百會由來在頂心。此中一穴管通身。撲前仰後歪斜癇。灸灸三光抵萬金。腹痛難禁還瀉血。亦將灸法此中尋。張口搖頭并反折。速將艾灸鬼眼穴。更把臍中壯一艾。却是神仙最妙訣。

卓溪廿肩穴是大闢津。指此開通血氣行。各處推完將此指。不愁氣血不周身。

病在脾家食不進。重採艮宮妙似聖。再加大指面旋推。脾若初傷推卽應。旋字不可忽畧。

頭疼肚痛外勞宮。採外勞宮卽見功。疼痛醫家何處識。卓溪眉頭蹙古人只曰頭疼肚痛。哭聲雄。非比辨法。何以知之。

心經熱盛作癲迷。天河引水上洪池。掌中水底撈明月。六經生涼那怕痴。

嬰兒臟腑有寒風。試問醫人何處攻。採動外勞將指屈。此日黃

蜂入洞中。

採指五指瓜節時。有風驚嚇必須知。若還人事難甦醒。精威二穴對拿之。

膽經有病口作苦。只將妙法推脾上。卓溪。口苦醫人何處知。合口頻匕左右扭。古人只曰口苦。非此辨法。何以知其口苦耶。

大腸側推到虎口。止瀉止痢斷根源。卓溪不從指面斜推人。任教骨碎與皮穿。採膾兼要採謫尾。更用推揉到湧泉。側字不可忽。腎水小指與後溪。推上爲清下補之。小便閉赤清之妙。腎虛便少補爲宜。小指正面屬腎水。

卓溪 小兒初誕月中啼。氣滯盤腸不用疑。贍輪胸口宜燈火。木  
香丸丁勿遲七。身不燒熱。  
啼声雄壯。

目睛青色有肝風。鼻破生瘡肺熱攻。  
卓溪 祛風却用祛風散。指頭瀉肺效相同。

臍準微黃紫庶幾。  
卓溪 奇紅帶燥熱居脾。大指面將脾土瀉。灶土前湯却亦宜。  
灶土卽灶心焦土。名伏龍用。

太陽發汗來如雨。身弱兼採太陰止。太陰發汗文兒家。太陽止  
汗單屬女。

眼翻即滔小天心。  
鬯二首子下滔平。若是雙眸低看地。天心上

指卽廻睛。

卓溪。

口眼相邀扯右邊。肝風動極趁風牽。若還口眼頻掌左。定是脾家動却痰。腎水居唇之上下。風來焉不作波瀾。雙眸原屬肝家木。枝動因風理必然。右扯將兒左耳墜。左去瞻回右耳邊。  
下扯  
將耳垂

卓溪。  
三朝七日眼邊黃。便是臍風肝受傷。急將燈火十三點。此是醫中第一方。

卓溪。  
效見推拿是病輕。重時莫道藥無靈。療驚定要元宵火。非火何能定得驚。若用推拿須下午。推拿切莫在侵辰。任君能火

還能樂。燒熟常多退五更。叮嚙寄語無他意。恐笑先生訣不真。  
推拿代藥賦

前人忽畧推拿。卓溪今家一賦。寒熱溫平。藥之四性。推拿揉掐。  
性與藥同。用推即是用藥。不明何可亂推。匕上三閑。代却麻黃。  
肉桂。退下六腑。替來滑石羚羊。水底捞月。便是黃連犀角。天河。  
引水。還同芩柏連翹。大指脾面旋推。味似人參。曰尤瀉之則爲  
灶土石膏。大腸側推虎口。何殊河子炮姜。反之則爲大黃枳實。  
湧泉右轉不採。朴硝何異。一推一採右轉。藜木無差。食指瀉肝。  
功並桑皮桔梗。旋推止嗽。效爭五味冬花。精威拿敗。豈羨牛黃。

貝母。肺俞重採。漫誇半下南星黃蜂入洞。超出防風羌活。捧耳  
搖頭。遙過生地木香。五指節上輪採。乃祛風之蒼朮。足拿大敦  
鞋帶。實定掣之勾藤。后溪推上。不減猪苓澤瀉。小指補腎。焉差  
杜仲。地黃。湧泉。左採類夫。砂仁。藿葉。重採手背。同乎白芍川芎。  
臍風燈火十三恩符再造。定驚元宵十五。不啻仙丹。病知表裏  
虛實。搖合重症能生。不諳推拿。採捐亂用。便添一死。代藥五十  
八言。自古無人道及。雖無格致之功。却亦透宗之賦。

# 卷之一終

幼科鐵鏡

卷之一

四〇

幼科鍊鏡卷之二

貴池卓溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男 邑庠之日孟然

君 庶之雲飛霖全叅

卓溪夏禹鑄曰。萬物以土爲母。而人身亦然。陳非宋問曰。物賴土生。有形可見。人身亦以土爲母。何以知之。日。脾屬土也。而鼻屬於脾。彼孕婦成胎。先從鼻始。故人稱始祖曰鼻祖。以是知脾土爲一身之母也。有脾土而後生肺。金肺生腎水腎。

水生肝木。肝木生心火。心火生脾土。此五臟相生之序也。有生亦必有尅。不尅則太旺無制。故肝木尅脾土。脾土尅腎水。腎水尅心火。心火尅肺金。肺金尅肝木。此五臟相尅之序也。業醫者不明五臟生尅之定理。則治病兼補兼瀉之法從何而施。如脾家虛極法。唯用補。補之不足。必兼補心。苟不明相生之理。焉知補心以補脾。如脾家熱極法。雖瀉脾。然瀉之不克。必兼瀉肺。不明相生之理。又焉知瀉肺以瀉脾。生成者謂之母。尅我者謂之賊邪。如肝家虛極。則肺邪乘肝。補肝必兼祛賊。賊去而肝自安。不明相尅之理。又焉知瀉肺以補肝。舉

此兩臟餘臟皆可類推。

一望形色審苗窺知表裏之寒熱虛實

禹鑄曰。望聞問切。固醫家之不可少一者也。在大方脈則然。而小兒科則惟以望爲主。問繼之。聞則次。而切則無矣。經云。切而知之之謂巧。夫小兒六脉未全。切無可切。而巧亦無所用其巧。問而知之之謂工。小兒于未言時。問之無可問。卽于能言者。問之多不以真對。是問之不必問。而工亦無所用其工。聞而知之之謂聖。小兒初病之時。聲音或不失其常。至病久而氣喪。氣喪而聲失。聞之無可聞。而聖又何所見其聖。况書

有日哭聲不響赴陰君。而亦有不赴陰君者何。無非泥其聲而不得其肺之絕與不絕故也。吾故曰。以望爲主。日。五臟之體隱而理微。望從何處。日。体固隱矣。然發見于苗稊顏色之間者。用無不周理固微矣。乃昭著于四大五官之外者。無一不顯。中庸所謂費而隱顯之微者。不可引之相發明哉。故小兒病于內。必形于外。外者內之著也。望形審竅。自知其病。按病推拿藥石。見效之速。未有不如響之應聲者。內有臟。日心。曰脾。曰肺。曰腎。曰肝。五臟不可望。惟望五臟之苗與稊。舌乃心之苗。紅紫心熱也。腫黑心火極也。淡白虛也。鼻准與牙床。

乃脾之竅。鼻紅燥。脾熱也。慄黃。脾敗也。牙床紅腫。熱也。破爛。  
脾胃火也。唇乃脾胃之竅。紅紫。熱也。淡曰虛也。如漆黑者。脾  
胃將絕也。口右扯。肝風也。左扯。脾之痰也。鼻孔肺之竅。乾燥。  
熱也。流清涕。寒也。耳與齒乃腎之竅。耳鳴。氣不和也。齒如黃  
豆。腎氣絕也。目乃肝之竅。勇視而睛轉者。風也。直視而不轉  
睛者。肝氣將絕也。以目分言之。又屬五臟之竅。黑珠屬肝。純  
是黃色。凶症也。白珠屬肺。色青。肝風侮肺也。淡黃色。脾有積  
滯也。老黃色。乃肺受濕熱。疸症也。瞳仁屬腎。無光采。又兼髮  
黃。腎氣虛也。大角屬大腸。破爛。肺有風也。小角屬小腸。破爛。

心有熱也。上皮屬脾。腫脾傷也。下皮屬胃。青色。胃有寒也。上下皮睡合不緊。露一線縫者。脾胃虛極也。面有五位。五臟各有所屬。額屬心。離火也。左腮屬肝。震木也。右腮屬肺。兌金也。唇之上下屬腎。坎水也。五臟裏也。六腑表也。小腸心之表。小便短黃澁痛。心熱也。清長而利虛也。胃乃脾之表。唇紅而吐。胃熱也。唇慘白而吐。胃虛也。唇色平常而吐。年傷胃論。大腸肺之表。閉結。肺有火也。肺無熱而便閉。必血枯不可通。下脫。肝肺虛也。胆乃肝之表。口苦。肝旺也。聞声著嚇。肝虛也。膀胱腎之表。居臍下氣海之右。有名無形。筋腫筋痛。腎水之寒氣。

入膀胱也。面有五色。一日紅。匕病在心。面紅者熱。一日青。匕病在肝。面青者痛。一日黃。匕病在脾。面黃者脾傷。一日白。匕病在肺。面白者寒。一日黑。匕病在腎。面黑而無潤澤。腎氣敗也。望其色若異于平日。而苗穀之色與面色相符。則臟腑虛實無有不驗者矣。

### 五臟各有所司

心乃一身之主。通身皆心司之。一耑主血。一耑司神。如驚悸不安。屬心虛。泪。無因而泪者。心熱也。汗。身瘦。不動而汗者。心虛也。陽物也。腫者。心熱也。以上有病。俱從心治。

脾。

耑司元氣。

氣弱者。又分司汗。

脾虛。

消瘦者。

痰。

實痰動者。

脾溫也。

虛痰動者。

脾虛也。過則傷脾。

以上有病俱從脾治。

肺。

耑司聲音。

弱者。肺虛也有声不出者。痰癥也。

聲出在

肺氣不歛也。

無声者。肺絕也。

熱出在

肺。

內外皮內不

毛。

破癩者。肺燥。腠理密則汗出。

以上有病俱從肺治。

肝。

耑司血。

血弱者。肝虛。

以上有病俱從肝

治。

腎。

耑司骨齒耳。

以上有病俱從腎治。

脾肺內有傷皆從外入。如父母舔犢過愛。則飲食傷脾。護持疎失。則六淫傷脾。至乎心腎肝無有傷處。到成人後。生苦虛。

多房事傷腎。守錢虧去財。殺傷心曰畏掌。時忍憎傷肝。乃如之症。遠近儘多。卓溪雖有良方。惜乎鞭長莫及。

釋六淫

風寒暑

一辨臍風

夏禹鑄曰。三朝之內。便是臍風。如七朝之外。定然不是。前人只曰風由臍入腹。以致撮口噤口。並不曾說出一種理來。余思嬰兒出世。剪落臍帶。帶口有水。風固乘水。由臍入腹。然腹與唇舌相去甚遠。而唇撮舌強何故。把賊邪逆犯之理一悟。乃知風入于腹。始附于肝。七木也。風則對木而鳴。目肝之竅。兩

眼角故有黃色風入于肝必逆犯乎脾。鼻隼。脾之屬。故隼頭又有黃色。入于脾必逆犯乎腎。兩唇屬腎。故色黃口撮入于腎必逆犯乎心舌乃心之苗。故舌必強直。到此風火交熾。亡之必矣。予悟臍風顛未至此。自問亦不自知。語曰。思之思之。鬼神通之。殆此謂歟。臍風初發吸乳必較前稍鬆。而眼角挨眉心處忽有黃色。宜急治之。治之最易。黃色到鼻治之仍易。到人中。承漿治之稍難。口不撮而微有吹噓。猶可治也。至唇口收束。鎮緊。舌頭強直不必治矣。一見眼角鼻及人中有黃色而唇不撮緊者。曲兒小指探外勞。即用燈火于頰門。眉心。

人中。承浆。兩手大指少商各穴一燒。臍輪六燒。未落帶子。帶口火燒。旣落子落處一燒。共十三燒。風便止。而黃卽退矣。此火攻之法。何異呂祖壺中藥。盧公再生方哉。願普天下爲兒父母的。依予看治。卽十百千萬億中斷。無有一孩之死于臍風者。

余常見大方脉書垂效案。無一姓氏。似屬虛誕。卓渙叟附錄。必書姓氏。斷不敢謬。如有借名。是書一出。將何以對效案中諸君子乎。兩代效集。充笥不能盡載。聊取疑難一斑。約畧附之。各症之末。非矜已也。用以資事斯道者之相較驗云。

長山庠友儲二。有一日抵掌下。偶道及從前舉子俱不育子。臍風。予爲約曰。後弄璋三朝內。招余過望。此患可除。後果如約。將兒抱出兩眼眸黃色方興。用燈火十三燄卽退。此望臍風不爽之一驗也。

余邑中嶧桐居士劉伯宗先生乃郎佶三時值舉媛。臍風延至七日。口不吹噓亦不撮緊兩眼角黃色深集溶匕。鼻準並溝畔黃色淡匕。身上微燒。見之甚訝。從未有臍風能延至七日者。以眼角鼻上黃色濃淡揣之。知其脾土稟賦甚旺。風難遽入。以故爾。七余重揉外勞。用燈火十三燄攻救肝風。于鼻

上并左右溝裏加火三燁以截去路。用防風一錢煎服。立愈。  
此臍風異症之一驗也。

### 辨胎寒

胎寒下地後或半日一日內通面皆青如靛染。口不吮乳。先有啼聲。後復不啼而昏迷者是也。觀兜兩眼鼻準無黃色。口又不吹噓。定是胎寒。先于精靈。威靈二穴對拿緊。并將崑崙穴拿緊。其聲稍出。卽用十五元宵火斷之。或聲不出。亦用此火則聲必出。乳必吸。青色必漸退矣。然此症須防作吐。胎寒者臟腑皆寒。胃无納乳。胃寒不能納故必吐。治用人參一分。桔梗一錢。白朮

三分。霍香五分。服之自愈。亦有發之遲者。胎有寒而外無感冒。則遲之二三日之間。胎有寒而下地復感其寒。故卽發于半日。一日之內。面必青色。唇白瀉白。或昏睡或腹痛。或口不吮乳。四肢必冷。曲手握拳。或啼哭不已。皆胎寒也。治之切勿認爲臍風。當以辨臍風之法辨之。治宜用理中湯。再加附子。遲久或變爲盤腸內串。治宜用勾藤膏。此症由娠母好食生冷。坐臥貪涼所致。

一辨胎熱

胎熱者通面大紅。比雖赤子本色。恐人不能辨。蓋本色紅而淡。

淡而正。熱色深紅而燥。七而色雜。如滿口熱氣莽七。或舌腫而紅紫。口氣蒸手。或大便閉結。小便短赤。目內紅赤。此皆胎熱也。如牙齦腫硬。不能吸乳。用銀簪于牙上。下合骨處刺破出血。而乳自能吸。隨用連翹一錢。伏龍肝二錢。車前一錢。煎服。或用大連翹飲四。此症由娠母喜睡火炕。好食煎炒所致。

### 一 胎毒發丹

此症由娠婦常谷熱湯。或久臥火炕。或過食煎炒辛辣。其候丹發頭面四肢。赤色遊走不定。先用天保來薇湯二裹散。次用大連翹飲。或傷乳發丹。大便閉結。宜用四順清涼飲二十八。通之。

自愈。

一辨胎驚胎風

驚與風名異而症同。如面青搐搦。口噤身熱。背強者是也。若目直。氣視最爲難治。宜先拿精威二穴。并崑崙穴。少頃。卽曲兒小指。重揉外勞宮。隨用元宵火定之。卽服豬乳膏。六十七。此症由娠母性強。撒濺。顛撲。損傷心血。應之于胎。外復感挾風邪。相觸而發。

一辨胎黃

胎黃由娠母感受濕熱。傳于胚胎。故兒生下面目通身。皆如黃

金色壯熱便秘溺赤者是也。治用地黃茵陳湯七。

余同學庠友方孟居舉子。剛出世少項通面青如靛染。昧爽呼門。振袂往視。知爲胎寒之極。拿精威二穴無聲。曲小指揉外勞。隨用元宵火加肺愈二燁。少商穴一燁。卽乳余知必吐。預用藿香煎之。果吐。與服之早食。候天庭青退。至亭午通面皆紅矣。此孰色驗症之一徵也。

方姓有子通其人者。生子七日內不吮乳。適予在郡。請別醫。誤作臍風。予歸要路畱治。見其唇燥極。面色紅中帶烟。燒執亦甚。揣不吮乳之故。必是牙闊腫硬。用針于骨合處在一針。

血出。放手卽乳。用連翹一錢。灶心土二錢。木通五分。煎服。卽愈。此望色審竅之一驗也。

一余男之雲同年泮友胡增奇。生男四日。內地距四十里許。不便邀看來。與余說。面上黃色。身有微燒。子塗臍風黃色必不通面。因問眼內何如。渠說亦有黃色勢樣。予曰。定是胎黃。以地黃茵陳湯方授之愈。此望色知症之一驗也。

一辨蒸變

小兒生下三十二日一變。六十四日一蒸。變者。變生五臟。蒸者。蒸養六腑。長血氣而生精神。益智慧也。積五百七十六日乃除。

蒸變必燒熱。其狀似驚。耳尻焦紅。口內上唇有白點如魚目粟。大者是也。蒸變之候。口唇舌色俱照尋常無異。燒熱雖有重輕。精神却不喪失。口氣必不暴戾。輕則三四日解。重則六七日除。不可妄投藥餌。听其自愈。

一辨脾之實熱虛熱

脾實熱。鼻必紅燥。唇必紅燥而裂。牙之裏傍必掀腫而紅紫。大便色必深黃。或身熱不食。或精神疲倦。或熱吐熱瀉。治用伏龍肝五錢。熟石膏一錢。服之自愈。脾虛本無熱。所以熱者。虛使然耳。初由脾虛。而復傷飲食。其候身微熱。鼻微紅而微汙。口雖渴

而唇必慘白。口氣必微弱。以手按之而不蒸手。或食而不化。或見食而不喜食。或瀉或吐。此皆虛熱之病也。治宜補脾爲主。用六君子湯。五加藿香。有脾虛腹腫。或因傷食而起。以指彈之如鼓聲。以手捺之如綿軟。切不可用通藥。宜用六君子湯加厚朴。或腫脹。加大腹皮。如腹脹彈之不響。捺之鉄硬。有青筋。作肚大青筋論。四肢俱腫。作腫脹論。如脾虛腹腫一用通藥十有十死連用六君子湯十劑自消。

一辨脾濕

脾濕由脾弱不能制水。水反侮土。其候面閼而不澤。唇晦而不紅。或痰易動而不化。或食稍傷而即瀉。瀉下澄清如水。或身上

發熱。此脾濕症也。治用蒼朮。白朮。陳皮。白茯。半夏。甘草。如脾土傷食而生痰者。治用消道二陳湯加炮薑十九。

一辨肺熱肺寒肺虛

肺熱。右腮紅。至甲酉時其紅更盛。或大便閉結。或身熱。或喘急。而咳嗽。或嗽不出而面壅赤無痰。或口渴氣莽。或鼻門乾燥。且燥破生瘡。皆肺熱也。治宜用瀉白散三十九。肺熱面色慘白。外無感冒。治宜用五味子。白朮。白芍。陳皮。款冬花。甘草。肺寒治用參蘇飲三十六。其肺寒及寒極似熱。治法在後傷寒類。

辨心實熱虛熱

心熱。額色紅燥。或舌紅紫。或舌紅而腫。或小便赤。七而痛。或燒熱。皆心熱也。推法。運掌從坎入艮。退下六腑。水底撈明月。引水上天河。治用犀角解毒湯三。虛熱症。面白。唇舌慘淡。小便清利。口亦作渴。治用人參。白茯神。遠志。白朮。甘草。服三四劑。自愈。

一辨心經熱極似寒

額不紅。舌不紅腫。小便不赤澁。乃熱蘊于心。不形于竅。不傳于色。口氣如焚。睡中齒如錯鋸。口必狂言。啼哭泪多。此熱極似寒也。推法同心熱。藥用犀角磨水飲之。或大連翹飲四。

一心熱昏迷似驚

其候燒熱平常似有驚而不抽。昏迷無知。治用半夏。陳皮。桔梗各二錢。煎服。後用甘草三錢。連翹木通各一錢。服之自愈。

九思軒措大方遴萃。舉予纏兩月。症屬脾濕動痰。傳入肺竅。乃壺呼挑筋婦挑之。症加甚且日挑遲了。不可愈。余往視之。拿却無聲。審音知痰入肺竅。先用推拿兼使燈火。隨用半夏二錢。桔梗只壳。白朮各一錢。服之稍愈。遴萃聞予言半夏合症重用之。微動燥氣。予卽用赤芍等味解之全愈。此脾濕動痰。挑筋無濟。用藥輒效之一驗也。

余長女甫四歲。身上微熱。口說詭話。且無所不說。面色紫黃。唇色畧紅。舌尖獨燥。口氣如火。精神不弱。口不作渴。據面色。卻是中暑。但病值三月。暑非其時。以舌尖口氣并精神揣之。定是熱。極似寒。用犀角磨水一杯服之。少頃一吐即愈。此熱極似寒。審察探情之一驗也。

辨燒熱

夏禹鑄曰。燒熱之因。不可槩作風寒。今照症發明。人當採本。

肺部燒熱有五

一。感冒面色寒滯。兩頰或似水紅桃花。鼻流清涕。惡風痰壅。治宜芎蘇飲以表之。六十。

一。受暑面色慘淡。唇口舌皆淡白色。四肢困倦。神氣委靡。自汗煩渴。或說謠話。治宜用清暑益氣湯。六八。

一本臟發熱。鄰家有流行麻痘者。不可悞除。

一本臟有虛。面色白。口氣微。唇舌淡色。或發嗽。熱必輕微。治宜用五味子。麥冬。冬花。白朮。白茯。陳皮等味。服之自愈。

一本臟有熱而發燒熱者。面色紅燥。口中作渴。鼻門乾燥。或大便秘結。治宜瀉白散。三九。

心經燒熱有二

面紅狂燥。唇舌色紅紫。口氣莽七。小便赤。治用黃連。生地木通。  
甘草。竹葉。舌白。口氣微。小便清。驚悸。燒熱微七。此虛燒也。

脚家燒熱有三

一。實熱。舌唇牙床皆紅燥。或破裂。或碎爛。或大便秘結。或渴黃。  
或口渴氣莽。治用石膏一錢。牡心土三錢。黃芩。甘草。

一。虛寒。脾本無寒。虛則生寒。面色慘淡。唇口淡白。微渴。口氣微。  
上帶溫冷。燒熱勢微。治用六君子湯。九氣虛治脾全。

實痰燒熱。脾本有痰。因濕而動。或兼食傷而色黯晦。唇有晦。

色。喉內痰勢响滑。治宜六君子湯加藿香五。

肝經燒熱有一

一。肝經燒熱。面色青。目勇視。或驚。或轉筋。或兩手尋衣摃物。或多怒。治用瀉肝湯六。二。或天保采薇湯一。

時毒燒熱有一

一。時毒燒熱。或腫頸。或腫腮。或身有瘡毒。或頭瘡。搽藥瘡愈。毒氣歸內。氣喘。治用天保采薇湯一。托解瘡復出。仍用天保采薇湯一二劑。自愈。

血虛燒熱有一

一。血虛燒熱。面無血氣。下午至夜燒熱加重。唇口白淡。大便常滯而不出。出則溏瀉。治用四物湯四十。

予會試 都門有粵東某司張玉川乃姪。年十三歲。身極瘦弱。每食只能一茶鐘許。終日微燒熱。下午加甚。都中醫俱作重瘡治不效。延予一望。知爲血虛。血虛必腸胃無滋。以致容狹。故不能多食。用四物湯加厚朴。橘紅。服十劑。兼用熟大麥米爲飯。食半月愈。此望色審察而知血虛燒熱之一驗也。

幼科鍼鏡卷之三

貴池卓溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鑄禹懸

邑庠之日孟然

男

郡庠之雲飛霖全參

一闢諸驚之名之謬治之當從木病辨風

寒暑濕虛實痰熱。

夏禹鑄曰。小兒發驚。而村婦庸夫多以鍼針於兒手挑筋破肉。  
噫。異矣。此喪心之村婦。覓食之庸醫。不知驚之爲驚。而誤認  
爲筋骨之筋也。蓋驚者驚嚇也。由兒先有內傷。復來外感。肺

竅發迷心無所主。一着驚而卽發也。若不豁痰以療驚。祛風以止掣。只把手筋挑斷以免筋抽。不猶之止兒之啼而惟塞其口耶。况驚屬心。筋屬肝。苦挑筋以治驚。便與明紀上有云。女婿牙疼灸岳母的腳後跟。又何有異。推前人所稱蛇絲。馬蹄。鯽魚。烏鵲等驚名之意。無非爲後之痴人立其名色。告以病表。使易識耳。因見舌吐出如蛇舌。遂以蛇絲驚名。見手足擰踢如馬蹄。遂以馬蹄驚名。見口動如魚吮水。遂以鯽魚驚名。見身黑如烏鵲。遂以烏鵲驚名。如執此以治驚。則當用雄黃以治蛇絲。糾馬繩以治馬蹄。香餌以治鯽魚。穿楊箭以治

烏鵲方爲治病之藥。然筋亦有時而抽者何。蓋筋屬於肝。血行於筋。氣以行血。肝有賊邪。則氣血與賊邪交戰而不行。以致筋受風邪而抽掣耳。故豁痰以療驚。祛風以止掣。乃莫破之理。于妙法借傳。較之王宮紫府之仙方。枯木回春之造化。不相軒輊。凡我同人。萬不可以蛇絲諸詭名。孰爲正論。垂之以殺。有冤莫憇之禍兒也。

一、闡明發驚之由兼詳治驚之法

夏禹鑄曰。驚生于心。痰生于脾。風生于肝。熱出于肺。此一定之理也。熱盛生風。七盛生痰。七盛生驚。此賊邪逆寇必至之勢。

療驚必先豁痰。豁痰必先祛風。祛風必先解熱。而解熱又以何者爲先乎。肺主皮毛。皮毛爲賊邪入內之門戶。彼風寒暑濕燥火六邪之來。皮毛受之。卽入犯乎肺。匕本出熱地也。燥火暑邪一入。則熱與熱依而熱盛。風寒濕邪一入。肺竅爲之閉塞。則熱無所洩。而熱亦盛。若解熱必先祛邪。前書上只云解熱。並未說到祛邪。今以祛邪之法詳之。一用拿。一用推。一用燈火。一用灸。一用藥。

驚癇死症辨

先君初明有曰。如兒體不近肥。痰不甚盛。不省人事。張目視人。

者。在精威二穴對拿緊了。不知痛。竟無掙聲。模樣惟咬齒搖頭。此肺經已絕。肺金也。如鐘磬之類。空則聲亮。碎則聲無。治之無益。夏禹鑄曰。驚之爲症。七屬有餘。語云。寧醫有餘。不醫不足。既曰有餘。胡亦有死。我知之矣。此乃肺氣先弱。肺主皮毛。淫邪一犯。肺實受之。是已弱又加弱也。由肺犯肝。由肝犯脾。理應犯腎。奈腎只虛位。却無實地。亦且水鄉風則可動。而熱與燥火俱不得入。其勢又難中阻。只得又順傳入肺。嗟。七肺氣幾何。而能堪此重困耶。到此地位。須得聚窟中返魂樹。西域內更生香糜乎可活。

驚癇活症辨

初明曰。如驚癇築甚盛。昏比不省人事。手不抽掣時。把精威二穴對拿緊。不咬齒。不搖頭。不直視。人亦無掙聲的模樣。將兒面向我。以我兩手騎兒肩。大指握前。以第二兩指並狠匕採肺俞兩穴。聲雖不出。一挣一挣。拾似那喫在窠中喚化螟蛉。却不是開口叫類我類我。有聲有音的樣子。却是個緊閉着口。挣不出。聲如貫珠。有聲無音的樣子。此乃肺被痰築。如鐘磬中以物塞之。卽重扣亦不響。定是活症。急灸肺俞穴各三壯。只用天保采薇湯二錢。不必用推。若發驚。拿醒便知人。

生事。卽用後推法。并燈火及藥。

推法。開天門二十四下。從眉心。分陰陽九下。用兩大指從眉心分推至太陽。太陰。此不論寒熱虛實皆用。寒如感寒。在太陽上重揉發汗。體弱感寒亦揉太陽發汗。並揉太陰以留汗。使發汗在皮裏膜外之間。庶免汗失亡陽。更加虛弱之弊。女則揉太陰發汗。採太陽止汗。隨向天庭。眉心。山根。準頭。人中。承漿。各指一下。以代針法。男在左手三關推上三十。退六腑五六下。以應之。又將我兩手握兒在手。掌向上。于總筋穴分推六七下。又在左手掌上運八卦。從艮宮推往坎宮二三十迴。曲兒左手小指。重採外勞宮。名曰黃蜂入洞三十下。卽于五指

節逐一捻揉兩次。在左脚委中穴往下捋三十下。以上男女各推左手左脚。卽用元宵火定之。隨服天保采薇湯。邪卽解。驚卽退而燒熱卽除矣。此祛邪之法也。如症重燒極。再加一劑。從未有不效者。燒熱退定在五更鼓。以上法不論肺熱。肺寒。肝旺。肝熱。脾濕。並用。

辨驚有痰盛風盛熱盛

初明曰。痰盛發驚。一驚卽死。不省人事。抽掣輕而燒熱盛。此脾痰入肺。亦用天保采薇湯。內半夏倍加二四錢。前胡倍加二錢。蒼朮倍加一錢。夏月加香茹。

初明曰。風盛發驚。雖驚死。而精威二穴一拿卽甦。若手足抽掣不已。一日一夜竟發數十次。此肝風入筋。亦用天保采薇湯。內羌活。柴胡各倍加一錢。半夏倍加三錢。如在夏月。外加香茹。一不五分。

初明曰。熟盛發驚。其狀無異風痰。只口多作涓。此外邪入肺。亦用天保采薇湯。內乾菖。桔梗倍加二錢。除以上三症外。有心經發驚之症。舌必吐出。其色紅燥。此本臟有熱而發。推法。開天門。分陰陽。男在左手退下六腑。女推上三閨。男女俱在左掌心。運八卦。推坎入艮。掌中水底捞月。引水上天河。再用連

翹一錢。黃連五分。木通一分。防風各一錢。水煎服。如在夏月加香茹。

初明日驚症。或驚死一二日。或三四五六七日不甦。即甦亦不省人事。或抽掣。或不抽掣。宜急于肺俞穴用艾灸三燄。若一拿卽甦。不必用灸。只須天保火。天保采薇湯連服三四劑。重加半夏四五錢。從未有不活者。如在夏月。外加香茹一錢分五。初明日間亦有肺無痰塞。拿之無声者。不搖頭張目。亦是活症。此由病久亂醫。亂推亂拿。無所不至。哭喪肺氣以致無声。如此便知失声之由。切不可再推再拿。用火用灸。惟用天保采

薇湯等分服之。一劑便愈。如在夏月。外加香菇二錢。

初明日。又聞有發驚昏。沉七條。七直七而睡者。雖不省人事。

亦能自己翻身。手脚曲直自如。竟至十日內外不醒。却又不死。此症却與柔痉相似。不必推。惟用拿七精威人敦中。廉并肩井穴。并揉五指節及肺俞穴。以上諸穴各用燈火一燄。用

彌陀僧一字。原二厘半研細。醋製。用半杯水酒灌下。再服天保采薇湯。倍加枯梗。半夏。卽甦如在夏月。外加香菇二錢。

夏禹鑄曰。以上驚症。先君只說形狀。不言色竅。蓋因驚死之際。面目唇舌俱非本色。如云望色。必清濁難分。求其治法。必亂。

絲無緒。北適南轍在所不免。只得把形狀辨别方無有悞。

辨熟瘡似驚風傷寒

夏禹鑄曰。熟瘡之燒熱與傷寒無異。最難辨别。看時若無真傳慧眼。以熟瘡作傷寒。驚風治者十有其十。卽間之普天下醫家能辨此者。吾知其必無半個也。予考先君效案中。醫愈不下數十人。看法載之甚悉。治法亦覺平常。然治之必效。古所謂藥用當而通神者。此也。余道先君辨法。一見便知。自信不啻雙鏡照胆。一藥便愈。無不驗。曰奇症奇醫。然而無奇也。人惟辨之不真。以故藥之不效。今發辨瘡之秘。傳我同人。俾嬰

見不苦于熱瘡。庶可告無罪于盧醫。

傷寒燒熱。每日到晚。不減一分。不增一分。始終毫不間斷。只是平匕而燒。不抽不驚。此乃傷寒之燒熱也。驚風燒熱。似乎傷寒而多一抽掣。蓋由筋属于肝。匕風動故抽筋。肝風入脾。匕動夾故驚。此乃驚風燒熱之辨也。

熱瘡燒熱雖同。而症實有別。或食滾茶。滚湯。或大哭大叫。頭面上必有汗。一有汗。燒熱卽退二三分。少頃又照原。便是熱瘡。此一辨也。

目早至晚必有一時更甚。或眼泛去。或手足掣。一掣出汗。燒熱

卽退。獨腹上不退。少頃又燒。每自背然。定是熱瘡。此一辨也。  
喉內必有痰。一哭必嘔。卽痰出。定是熱瘡。若驚風之痰。盤踞  
乎肺。必不到胃。何得吐出。此一辨也。

醫家具有靈心慧眼者。不須辨此。只須一眼一望而知。面色非  
黃似黃。非白似白。精采似倦不倦。面皮慄七而無潤澤。毛孔  
夾七而不直樹雨。眼瞧人却像個無病的光景。熱瘡昭然。此  
症多發于五六七八九月之間。用清脾飲四七無有不效。發  
一二日者。定要服五六劑。發至五六日者。只須三四劑。亦有  
悞作驚風。傷寒治者。或至十日二十日。甚至一月不愈。只須

一二二劑。切不可以一劑不愈。遂作別症。更方而憤殺人性命也。不知者難怪。指鹿爲馬。在予父子兩代治之屢七。不啻黑白分明。今把金針遠度。何難乃繡鶯鶯。

又有熱瘧。一日一發。七有定期。其候不冷。一來只發熱。或自下午起至半夜。汗出便解。手心肚腹熱不盡解。或不自下午發。不可拘。亦用清脾飲四七。以上熱瘧。如小兒瘦怯者。熱退或弱死去。必要用六君子湯九以補脾。

後例雜症。余半出書傳。惟于疑惑處辨之。經驗者著之。不效者刪之。于書所未傳。見症想出治法。不過十之四五。獨驚類以

及熟瘧。勝風辨法。前所未傳。推拿傳法亦誤。予父子兩代于七十餘年中。因症生悟。由悟入神。一見便知。一藥便愈。倘所謂前無古。而後無今者。非耶。今出闡亭真本。慎勿視為楓落吳江。

片症用藥。不過一二三味。甚至八九味爲度。獨驚癇症用至十九味。何也。只因羣邪逞勢。各臟爲殃。深入內地。無不受害。上而顛頂。下而厥陰。手足腹心。到處波及。是以攻擊削亂之兵不可缺。一故王剪伐荆。預知非六十萬衆不克。正此之謂。凡我幼科。慎不可以天保采薇湯作八寸三分帽。盡人可戴也。

辨癇症

癇雖有七種。歷治惟從陰陽二癇治之爲驗。一癇卽死。咬牙抽掣。痰壅喉內。不省人事。在日發者爲陽癇。面色光澤。病在六腑。肌表如拿不甦。必灸肺俞各穴三壯。卽用天保采薇湯等分各一錢。連服二三下自愈。

癇初發。身無燒熱。手足青冷。口柴驚啼。吐舌搖頭。是爲陰癇。面色暗晦。或從夜發。病在五臟骨髓。此最難治。宜用固真湯。〔土加南星。〕

一陽癇兼癇

夏禹鑄曰。其症先有燒熱。一痛而死。拿之卽甦。汗出稍定。汗止又發。此乃陽瘧兼陽癟也。瘧是本病。癟是標病。急則治標。先用天保采薇湯表散。倍加半夏三錢。連服二三劑。再服清脾飲四七二劑。標本俱清卽愈。

### 辨瘡症

瘡病皆因風濕而成。濕乃本。而風則標。若面目赤色。無汗惡寒。牙關緊急。一身僵硬。痰壅盛。小便赤澁。一發終日不甦。先有謠語。名曰剛瘡。乃風性剛急。症屬於風是也。治宜小續命湯五九去附子。若四肢厥冷。有汗不惡寒。大便滑瀉。不渴不

語名曰柔症。是濕性溫和。症屬於濕也。亦用小續命湯五九去麻黃。

二症如痰壅氣盛。加南星。半夏。白茯以清痰。枳壳。陳皮。紫蘇以順氣。內熱便秘。用承氣湯二五以下之。柔症用附子理中湯五以溫之。六君子湯九以補之。如纏綿不已。則難治也。如病久而復手足抽掣。如角弓反張。此乃血枯不能養筋。治用四物湯四十加附子。防風羌活。切不可作驚癇治。恐悞則頑命矣。

余外孫與內姪孫兼患熱瘧。見之甚真。老妻見服清脾飲二

劑不愈。曰。世上有此瘡疾。敢是老眼昏花錯認了予。曰。能捱至四劑自愈。果驗。內姪孫亦以清脾飲方授持歸不服。作別症醫。病益甚。又來強予往視。予怒極。老妻慰之。行一到仍揜清脾飲三劑命服之。予老友方桓綏訝曰。有此奇症就有此奇醫。俱隨命服六君子湯三劑以防去路。此熟瘡認症既真。不聽阻撓之一驗也。

烏沙夾邑庠程抱公子九歲時得病。請予往治。羣醫在座。抱兒出。兩手挑破筋肉。膿血淋漓。慘不忍見。每日夜抽掣數十餘回。壯熱不退。予戲問曰。如此一症。諸位填門。治胡不愈。願

聞各用之藥。有以竹瀝塗瘻者。有以牛黃鎮驚丸言者。有以天麻勾藤定驚言者。有歸咎于排筋用火之爲害者。于不禁掩口胡盧。此症若輩不知也。交口請以症示曰。此陽瘡兼陽癆也。如此治法。症有萬于。吾不知從何處說起。中一人問曰。先生認法得自何書。子曰。唐許胤宗有曰。醫者意也。思精則得之。自我作祖。何書之有。衆皆默然。用天保采薇湯。各一錢五分。半夏倍之。共三兩許。一服抽定。燒熱減半。隨田清脾飲。一劑全愈。與諸醫解座。此挑筋無濟。望色通神之一驗也。鄰邑石埭沈蒼錫年五十餘。僅妻出一子。方二歲。患病。請救。

於予卽拿精威二穴。予不出聲。通身燒熱。面白雖慄。寶色丙存皮不輕浮。光溜據面色不應無聲。據無聲郤犯死症。因問前可醫過否。沈曰。初起時。蒙鄰嫗挑筋兩次。又別請拿推數次。昨有人將桃桺柔枝遍身推括。晚便無聲矣。予揣病人肺氣已虛。屢致慘哭氣喪。上氣以致無聲。惟照色用劑。以天保采薇湯外加冬花一錢。薄暮煎服。夜半熟退此熱瘡兼癟。望色審聲之一驗也。

徐聖緒子患驚癇。不省人事。約五六日。緣乃伯措大。伯孚曾與予同硯席。邀治精威二穴。拿之無聲。卽向肺俞重採。聲雖

不出却有纍々貴珠掙不出來模樣。火肺膾各三壯。用天保采薇湯倍加半夏。單向大方脉素與余友善。保仲石處。揜藥對聖緒云。在禹鑄人信。砒霜俱用得。然好也是這一服。不好也是這一服。予臨別云。服此一劑。雞鳴便退燒熟。果如期熟退。二服全愈。此陽癆已死。採肺俞探肺竅之一驗也。

痒友張孔邇。壻邑痒生。紹宗年可二十餘歲。一時癆死。不肖人事。約半月餘。他醫純用連芩之劑。毫不見瘳。邀予看治。予以症屬大方脈。固斷孔邇力迫之行。一見顏色。便知瘀患。拿精威三穴不應。于老龍穴一掐。直視乎予。有喚若壅裏音者。

用半夏四錢。桔梗二錢。枳橈防風甘草各一錢。一劑稍甦。五劑全愈。足見肺雖無聲。非金碎。何不可藥。此中痰。望形審竅。大小皆同之一驗也。

竹塘陳諱春者。一子十一歲。患病十餘日。不知人事。初入見其不醒。以爲驚死。于鞋帶穴人中搘咬破爛不堪。請予往治。見其唇口晦色如醬。不抽不掣。不渴。肢冷如水。沿用燈火十五元宵。隨服小續命湯去麻黃。一劑卽甦。此望色審竅而知爲柔症之一驗也。

慢症悟宗

人動曰慢驚。余獨曰慢症。蓋此症多成於大病之後。或庸醫一見病愈。遂不防守去路。或初誤汗。誤下。吐瀉久而脾胃虛極。故成慢症。慢字緩字。雖對急字而言。然所以成此症者。皆由父母怠慢之故。或有汗出不止者。聽之。吐瀉不止者。聽之。以致汗久亡陽。吐久亡胃。瀉久絕脾。成難起之疾。故曰慢症。慢症何驚之有。以慢症而云驚。皆庸醫見兒眼翻手掣握拳。形狀似驚。故以驚名之一。作驚治。或推。或拿。或火。是猶兒已下井而復落以石也。慢症者。脾虛也。眼皮屬脾。脾敗。故眼皮不能緊合。而睡則露睛。虛極則脾失元氣。故兩目無神而多昏。

沈脾敗則枯涎無統。故凝滯咽喉而有牽鋸之聲。手足脾胃所司。脾胃敗故四肢厥冷。虛慢必生寒。寒則大便瀉青。小便清利。便知爲慢脾之症。若療驚則無驚可解。祛風則無風可祛。除痰則無痰可除。解熱則無熱可解。惟脾間枯痰。虛熱往來耳。治宜固真湯<sub>干</sub>加天麻。鈎藤。或六君子湯<sub>五</sub>加炮姜。或理中湯<sub>五</sub>加附子。

凡兒一到慢症。十僅能醫六七。蓋症至此。肺心脾三臟俱虛。胃氣大腸兩腑俱敗。若虛而不絕。雖久能生。如胃氣將盡。萬不可活。卽強藥之。亦活活一二日。究非真活也。然非假活不足。

以見藥力之妙。余見之甚衆。如慨然領手者。其症必生。踟躇固謝者。縱藥亦死。此無他。惟於面上看寶色。胃間探消息。生死便燎然在目矣。

余幼女於壬寅冬。值先君辭世之會。麻症有失經理。冷瀉成慢。幼甥同症。熱瀉成慢。妹婿聞遠。波僧精於此道。呼治之。日索藥价。丸如綠豆大。每丸銀三錢。屢服症加重。余女眼閉。不開約十餘日。問乳母。幸吮乳不輟。面上寶色有存。余用固真湯加附子五分。服三劑。眼一開。頃又閉。揣之藥力未及。連服十劑。愈。甥慢雖同。寒熱迥別。知不可治。妹婿嗔余有親疏之

別藥名參附。與余妹反目。遠波僧見余甥光景強壯如故。滿口許其必生。余作色辨曰。爾以健壯爲生耶。獨不思熱則氣壯。况熱瀉明知肺熱。用參反傷乎肺。不用則慢無治法。將謂清肺。再用藥一清。則脾氣卽絕。清不得補。不得何生之有。遠波默然趨去。越三日死。此慢症雖同。寒熱迥異。不可不察之驗也。熱慢不多見。亦學者之所宜知。

幼科鉄鏡卷之四

貴池卓溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

邑庠之日孟然

男

郡庠之雲飛霖全參

麻症

夏禹鑄曰。痘出於臟。癰出於腑。麻乃大腸主之。毒氣蒸肺。故發咳嗽。先輩書未嘗齒及麻症。蓋以其輕而忽之也。邵不知表症雖輕。毒侵肺腑亦多與鬼爲鄰。子經塵甚衆。費手居多。因

不惜筆力。詳著于篇。以杜嬰兒麻症之患。流行麻症。其候燒熱。必發咳嗽。聲必稍啞。面皮微有腫樣。兩腮顏色微紅。此吉兆也。如出發不快。及不透發。或紅點見面。偶挾風邪而隱。或醫人不知。誤除燒熱。隱而不見腹內作痛。治之神莫神於天保采薇湯。聖莫聖於天保采薇湯。只須一服。卽發出。或有不盡發者。再加一服。從未有不效者。如肺臟先虛。又加大腸毒氣攻肺。面皮像澆薄的式子。慘白浮上。光上溜上。便是肺氣已絕。在精威二穴對拿。其聲不出。必是死症。藥之無濟。有痳方見點。隨卽收入。或瀉青水。審非風寒爲害。唇色慘白。口

氣微。此乃內虛不能送毒。不可分利止瀉。惟用八珍湯六九以托之外。用葱半斤許。白酒煎。遍身擦之。如再不透發。只額上稍見些微。惟用六君子湯五。循七調治自愈。

有癆初發熱時。心火盛極。刑剋肺金。致癆不出。必先用黃連木通等分服之。再用防風。荆芥。葛根。升麻。南星。枳壳。赤芍。桑皮。柴胡。桔梗。甘草。煎服之即發。

有病疾兼癆症。若癆見點急用香茹。桔梗。只壳。黃連。厚朴。木通。升麻。赤芍。車前。煎服。癆瘡透發。再治痢疾。此乘輕從重之說。不可不知。

本邑陶二公濟玉之子。麻症發熱方兩日。醫人悞爲除熱。麻伏不出。形狀似驚。差役請予治。面色花雜。喘急不噏。必有內毒。于太陽穴以口涎擦之。皮內隱有紅點。知是麻毒內攻。無燒不出。用天保采薇湯倍加升麻。乾葛。一服額上見點色不紅起。面色唇口慄淡無澤。知爲內虛。即用固真湯。一服通身發熱。陶公驚怖。予曰。麻非帶熱不出。仍服天保采薇湯一劑。通體透發愈。此見面色花雜。便知內毒之一驗也。

培繼樓同學庠友方恒綏一子。麻症隱而不出。形症甚凶。邀予治。見其面色慄白。口氣微冷。唇舌淡白。大便泄瀉。卽用八

珍湯一服。額稱見點。恒緩因姪前麻症殞。干泄瀉。力迫止瀉。予曰。分利更虛。不允。見口吻間覺以瀉閑性命。勉強用五苓散。果止。而額上紅點卽隱。又用十全大補湯內托。外用荔枝酒蒸引。卒不透發。予值事往郡。蹠後札示。皮上每發一泡。破卽成黑窟。附他醫攻毒方單。予札復曰。肌肉脾屬。破卽成窟。乃脾虛之極。何可攻毒。惟用六君子湯顧脾爲主。果效。此望色審察。萬無一失。分利虛脾。卽此可見之一驗也。

思誠堂同學友措大方薪衍。第五郎患麻症。初醫者不知麻候。用大一散以除燒熱。邀予過治。見其舌純紫。兩唇燥裂大

小二便皆秘。聲嘶不已。卽用黃連八分。木通黃柏各一錢服。下大便刮白如冷痢然。在座者口吻覺爲涼劑所致。予亦踟躇滿志。豈臟腑苗竅此症獨不相符。毫不首鼠。問前醫退熱所用何劑。新衍曰六一散。予便恍覺下元爲六一寒冷所滯。致火不降。灼無疑矣。隨以炒鹽久熨臍下。仍用前味。黃連倍加服之。方下大便燥結與黑棗無異。可見苗竅辨真。治定不爽之一驗也。

一辨傷寒附寒極似熱

小兒之十指俱冷。以三指按額俱熱。身壯熱。面赤而淡。不動必

掣。此傷寒之症也。表散法。開天門。分陰陽。推三閨。體厚則大。發其汗。揉太陽并外勞宮。運八卦。推艮入坎。症輕推之自愈。重則用元宵火定之。體弱隨發汗隨止。女反是。治用芎蘇飲六十服之。

有寒極似熱者。面色紅如水紅桃花。口渴而唇不乾燥。舌不紅紫。大便青色。小便青長。此寒極也似熱者。因面有紅色。口有渴形故也。治之與前法同。

如口作渴。大便秘。小便赤。是內有熱而外傷寒也。宜先表外而後清裏爲主。表用芎蘇飲六十。裏用白茯半夏陳皮連喬木

通枳壳甘草煎服。

本郡田三公祖之公孫方一歲抱風寒燒熱症。郡醫見燒有驚悸。便作驚症治。數日不愈。予以三指按額俱熱。兒十指俱冷。用芎蘇飲一劑。留飲席未解。內小童報曰。小相公熱退矣。此燒有表裏。不可不辨之一驗也。

予於癸丑科會試。盛京有鑾儀衛正堂許公。乃孫方歲半。患傷寒症。初延太醫院幼科。失表。後于朝房內予同里員外郎陳是菴。道及于予。卽日來貴池館親邀往治。但見身冷如冰。痕毛差上。面色慄晦。不知人事。知寒邪內伏。用天保采薇

湯一劑。囑曰。夜發熱則明日來治。不則莫可如何矣。夜果發熱。仍用前湯一劑。熱又解。許曰。發熱退熱。藥同效異。真出奇也。予曰。尋常症在表感。一劑便解。如令公孫邪被藥悞伏內。昨一劑攻邪。七到肌表。七見邪目是作熱。仍以原方加追一劑。表解熱除。無甚奇也。許曰。前是菴脩道年翁。乃幼科白眉。今若此。洵名下無虛矣。以百金壽子。辭曰。晚兩代。治救嬰兒。從不受謝一文。再四面壁。更欲

延請入太醫院。又辭曰。老母在堂。晚在都門。白雲頻望。承盛意。心領之可矣。許乃止。此閨門殺賊之一微也。

方伯張存儒初生有公郎抱驚風。患初。郡中醫作夾食。用消導劑。症加甚。後予用半夏四錢。生薑一錢。防風二錢。一服卽愈。遂拜予爲假父。此藥用當而通神之一驗也。

予邑張中尊嬪。患病。邑中醫曾治十餘日不愈。會余到邑中。尊得聞。接余治。婢方抱出。離座五六步外。望見面上光七浮七毫無寶色。余曰不須抱近。請回。中尊問症若何。余曰肺氣已絕不可治矣。明日果死。此望色而知爲死症之驗也。

一辨夾食傷寒

小兒十指俱熱。我按兒額三指俱冷。其候身熱或吐或瀉。或不

吐瀉。口必惡食。腹必浮脹。拍如鼓聲。或作痛是也。推法。開大門。分陰陽。男女同。男重揉太陽發汗。體弱揉太陰止之。女反是。推上三關三十。退腑六七。下運八卦。重揉艮宮。于大指面旋推補脾。曲兒小指重揉外勞。于第二指大腸位側推到虎口以止瀉。不瀉不推。重按指中指一節以止吐。不吐不掐。于左腳湧泉穴左轉揉之止瀉。不瀉不揉。少頤右轉揉之止吐。不吐不揉。女則右轉右揉止瀉。左轉左揉止吐。推畢即用燈火。脅輪四燋。胸口一燻。用水酒麪一枚。火煨黃色。研末白湯送下。卽愈。重則用消導二陳湯十九加柴胡紫蘇等味。煎服。

珩山孝廉方韵皇乃孫。發吐燒熱微掣。吐輕熱重。余子壻方平階初業斯道。投天保采薇湯一劑不效。邀予一見。知爲內傷飲食外挾風邪。用藿香正氣散一服卽愈。余以湯名曰天保采薇。取其治外治內之意。用之不當。雖多奚爲。在子壻以爲症屬內傷外感。湯屬內外並治。渠見不爲非是。然不知症似社風城狐。重鎮何可輕發。此學者之所宜知而宜慎也。

一辨腹痛

腹痛。脅以上屬火。脅以下屬寒。其因不一。有寒痛。熱痛。傷食痛。積滯痛。氣不和而痛。脾虛而痛。肝木乘脾而痛。蛔動而痛。數

種寒痛。則面白。口氣冷。大便青色。小便清利。痛之來也。遷緩而不速疾。綿々不已。痛時以熱手按之。其痛稍止。肚皮冰冷是也。推法曲兒小指。重揉外勞宮。推上三閔。揉脅五十。藥用干姜。肉桂等分。煎熟。加木香磨水入服之。自愈。

熱痛則面赤。口氣熱。口渴唇紅。大便秘。小便赤。時痛時止。痛來迅厲。腹形如常。不腫不飽。彈之不響。以熱手按之。其痛愈甚。肚皮滾熱。此真熱也。推用下六腑。水底捞月。蓋熱痛主心脾兩熱。用燈心。車前。伏龍肝。加木香磨水。稍許入服。

傷食痛者必惡食。眼胞必浮腫。或瀉下酸臭。腹必飽脹。彈如鼓。

聲或身作熱是也。如氣不旺者。不宜取瀉。只用消導二陳湯。

十九

積滯痛者。今日傷。明日傷。逐日傷之。而滯于脾胃間。不以飲食得其傷不痛。旣有滯。而後以乳食傷碍。故痛也。面色黃。噯氣酸。大便釀臭。便後痛減。足冷嗜臥。不思飲食是也。治宜枳壳。兵榔。木香下之。下後即以小異攻散。十六補之。

氣不和而痛者。見下地後。或地多濕。見臍受風。以裹肚束臍過緊。不知見體漸長。束帶未鬆。則上氣不通。下氣以故內氣不和。故作痛也。審其非寒非熱。問其母。而臍果有束繩之弊。則

氣不和之痛必矣。治以木香磨水服之。隨用燈火。臍輪六燶。  
臍下氣海一燶。心口窩一燶。其痛卽止。大兒之氣不和者。其  
候眼胞不腫。面色不黃。飲食如故。腹腫擊如鼓聲。搖其頭而  
喫氣是也。宜用木香。陳皮。枳壳。甘草服之。

脾虛痛者。其候面無血氣。微黃帶微白。大便少而色白。治以補  
脾開胃爲主。用六君子湯九加橘皮。

肝木乘脾痛者。用木芍藥。七虛不勝其芍。則肝氣無所洩。故乘  
脾之衰而作痛也。其候唇白。口中色淡。面多青色。痛則腹連  
兩脇。重按其腹則痛止。起手又痛是也。治用四君子湯三十

加柴胡白芍。

蛔痛者。腰曲撲身。口流青涎。痛久不歇。小頃又痛。或一時。或二時而止。或歇半日。又痛。面黃唇白。此蛔痛也。沿用史君子去殼火煨。吃十餘粒。少頃又吃。卽止。以上嬰兒腹痛。口不能言。何以知之。蓋兒痛必哭。無故而哭者。痛也。哭聲雄慘。而雙眉蹙皺是也。如使君子食之。不止。不妙於苦練子樹根皮。約一二兩許。水煎一茶鐘。吃下。虫卽盡出。但體弱者不可輕用。

又有一種奇痛。一痛只大叫幾聲。痛匕匕。卽抱胸暈死。子家一婢犯此症。先君在日。子見將婢面撲地。用冷水一盆。以婢

騰着水。上于委中穴澆水狠拍。粗筋腫起。用銀針傍筋打入二針。上出血流。叫一声痛。卽甦。隨用冷水滾水各半。連吃二碗。立愈。記先君曰。此急沙也。與轉筋火差似。如平常腹痛。從未有一痛而卽死者。急沙之辨。繫記在此。

夏禹鑄曰。嘗觀內經有曰。胃虛則吐。胃熱則嘔。此說殊屬大謬。何也。余屢々見吐。必固有虛。當亦有熱。嘔固是熱。郤亦有寒。此予匪非議。前人蓋見之多。而治之效也。二症各有虛熱。不可拘執。惟望面色唇舌之間。紅則熱。而淡則虛。斷無有悞。至于泄湯。出少而緩曰泄。出多而勢急曰湯。泄則症輕。湯則

症重。惟以所瀉之色驗之。治無不效。

一吐

胃虛發吐。其候面白神疲。不熱不渴。口氣溫和。面帶微冷。額前  
微汗。治宜助胃膏。〔三十二〕

胃熱發吐。面赤唇紅。煩渴溺赤。口氣蒸手。宜用熟石膏七分八  
分研細。末。神茶送下。

胃氣不和發吐。其候惡食。此由積滯在胃。復爲食傷。搖見之頭  
便噯氣。治用水酒曲一枚。火煨黃色。研細。白湯調下。用枳桔。  
木香。陳皮。半夏。香附服之。

有長夏外感暑氣而吐者。宜六和湯。王。

有霍亂而吐不出者。手足厥冷。腹脇之上绞痛。名曰轉筋火。治用滚水一碗。冷水一碗。相和飲不卽愈。

有內傷飲食。外感風邪而吐者。身燒熱。眼疲倦。治用藿香正氣散七士。

有傷風嗽吐者。治用清金飲五八。

一湯

夏禹鑄曰。吐從面色辨之不爽。瀉更宜辨所瀉之色。暴傾下迫屬火。水液澄清屬寒。老黃色屬心脾肺實熱。宜清淡黃色屬

虛熱。宜補。青色屬寒。宜溫。淡白色屬脾虛。宜補。晝色屬溫氣。  
宜蒼术燥溫。醜臭屬傷食。宜消導二陳湯十九。

脾虛作瀉。下白色。或穀食不化。或水液澄清。其候面白神疲。  
唇口慘淡。舌白。口氣溫冷。治宜理中湯五加附子。或六君子

湯九

脾熱作瀉。七時暴注下迫。便黃溺赤。口氣蒸手。煩渴少食。治宜  
五苓散十八加山梔仁。

有氣虛下陷瀉者。宜補中益氣湯。其候與脾虛差同。

有傷食兼滯瀉者。其候噦。醜氣。吞酸脹滿。一痛則瀉。一瀉痛減。

治宜用大腹皮。神曲。麥芽。山楂。白朮。木香。枳榔。如食已消。痛已止而瀉不止者。乃脾失清升之氣。宜補中益氣湯三七。若食消而腹猶痛。乃脾痛也。宜小異功散十六。

有肝瀉者。瀉青稠粘。乃肝木乘脾。治宜麥冬。桔梗。白朮。白茯。人參。木香。酸棗仁。甘草。

先瀉數日。已止又瀉。隨發驚。此症多不可治。蓋瀉而又瀉。脾敗之極。加之外邪。由肺克肝。七有動風。剋脾。上敗將死。不受肝剋。故肝風烈極。毫無泄處。如祛風解熱。元氣將盡。將謂療驚。不能救脾。將謂救脾。驚不能止。無法可治。

一吐瀉

夏禹鑄曰。內經有曰。胃虛則吐。脾虛作瀉。脾胃俱虛。吐瀉兼作。此言極謬。若先泄後吐。面白神疲。不熱不渴。額有微汗。乃脾胃虛寒也。宜理中湯。五或小異。攻散十六。或六君子湯。九若先吐後瀉。面赤唇燥。煩渴溺赤。乃脾胃有熱也。治宜五苓散十八加竹茹。前服又有積滯在脾。不能運化水谷而吐瀉者。宜用消導二陳湯。十九

有長夏夾暑吐瀉者。宜用六和湯。二十

余髫年硯席友陳公載嫂。患吐症。適余抱風寒。因延大方脉。

用溫胃劑。吐益甚。帶疾往視。口唇紅麗。氣出蒸手。舌色紅紫。  
用熟石膏一錢研碎。神茶一碗送下。稍止。隨加一錢。立愈。在  
大人苗穀尙驗。况嬰兒乎。後又患吐。色穀俱同。仍用石膏。卻  
不甚應。揣之下元。或有寒氣。用炒鹽熨腹。仍服石膏。卽愈。可  
見苗穀顏色從不一悞。

余于歲癸丑北上。到會館。適陳是菴幼郎。脾濕將慢。付予治。  
問曰。會服參。不見菴曰。如服一分。便爬了上壁。予心以爲南  
北或亦有異。轉思初到

都門。恐孟浪來。謂以六君子湯去人參。連服二劑。了無一效。辭

接別醫。及久。一醫擁輿至館去後。于請所發劑視之。劑屬消道。因問彼何人斯。是菴曰。此名震。

京都之鄭小見科也。予曰。久瀉將慢。尚可再用消導之藥。用之命不可知矣。乃止。予便不以是菴之言爲正。硬用六君子湯倍加人參。且外加附子五分。兩服卽愈。是菴歎曰。素聞妙手。今果然矣。此辨色審察。勿以人言爲信之一驗也。

### 一辨痢疾

夏禹鑄曰。丹溪云。痢無止法。以通利爲主。此言亦不盡然。何也。痢疾有寒有熱。白者虛寒也。紅者實熱也。治宜調脾爲主。若

染一二日間。身壯熱。膿血稠粘。裏急後重。腹痛者。宜用承氣湯。三五以下之。或用木香兵榔丸。二六若虛怯者不可下。病久身涼。自汙。宜用補中益氣湯。二七。挾熱而痢純血。宜用四順清涼飲。二八。或黃連芍藥湯。十七。挾冷而痢純白。或乳食不消者。宜用理中湯。五。有濕熱之毒。熏蒸清道上。致胃口閉塞而爲噤口者。宜用人參。黃連。石蓮子。有痢久。胃氣虛。則不能乳食而爲噤口者。宜用理中湯。五。或六君子湯。九。有積毒之氣。上冲而嘔惡者。宜用人參敗毒湯。一九。有胃氣虛寒而嘔惡者。宜用附子理中湯。五。有痢後。脾虛不能制水。而偏身

浮腫者。宜用六君子湯五錢。外加蒼朮厚朴。猪苓澤瀉。黃連芍藥。有痢久脫肛者。經日肺氣虛寒。由脾虛而金無所養。故大腸虛脫而下陷也。宜補脾溫胃。用固腸飲六五錢。有積盡而痢入不愈。乃脾氣下陷。宜用補中益氣湯一七錢。或四君子湯二錢。君初起。宜用姜茶散三錢。有夾暑熱而痢下赤白相兼者。用清暑益氣湯六八錢。加香茹飲五錢。

予長男之日五歲時。與幼甥同患痢疾。男素脾弱。痢起腹並不痛。痢下純膿白色。中帶藍色。口氣微冷。不用通利。卽以六君子湯服之。甥痢純紅。腹身有風疹。用四順清涼飲加防風。

柴胡兩藥。各器同爐煎。姻家以男藥與甥服之。風疹卽隱。  
氣喘促。唾軒。予急以天保采薇湯與服。疹復出。喘止。仍用前  
湯數劑愈。此可見脾虛之極。不必清利。硬用補劑。熱痢宜清。  
不可用補之一驗也。

一辨瘡疾

瘡疾皆由冒感風寒暑濕而發。丹溪有曰。若無汗。要有汗以散  
邪爲主。若有汗。要止汗以扶正氣爲先。此千古不磨之至論  
也。發時有一寒一熱。身重。骨節疼痛。自汗多嘔者。濕瘡也。由  
汗出脫衣。衝冒風寒。或渴極過飲冷水。或冷水浴身所致。有

食瘧者。食所傷。由飲食過度。傷寒所致。俱用柴胡。前胡。青皮。陳皮。蒼朮。白朮。白茯。甘草。猪苓。澤瀉。知母。貝母。厚朴。半夏。黃柏等分。姜棗引服一劑以清之。于發瘧日之五鼓。空心以前方加恒山。枳榔。草菓仁等分。煎服以截之。卽愈。如久瘧不止。致中氣弱極。名曰脾寒。用四獸飲三二加棗姜。服五六劑自愈。

夏禹鑄曰。有陰虛似瘧。竟作瘧治者。這般人卻沒有一毫心思。一綫想頭。夫謂之曰似。則兩症相去原是星澗。卽曰似瘧。亦祇似其瘧之脾寒。試問普天下人。可有瘧一起而就成脾寒。

者。是必始于清之無法。繼又截之無方。或從不服藥。相延日久。纔到脾寒之症。明匕有這一條來路。若一見每日下午身有潮熱。令狀颶匕。便作瘧治。獨不想到瘧有來路。况脾瘧由重減輕。陰虛由輕加重。兩症判然。竟不知別。此一種心竅。試取黑漆皮燈籠與之相況。當耶不。

陰虛似瘧。如潮熱稍重于作寒。治用四物湯四十加人參。如心肺肝有熱。雖湯內已有熟地。再外加生地。如作寒稍重于潮熱。四物湯外加黃芪。人參。甘草等分。參減半。如潮熱作寒俱輕。只用四物湯。不須外加。如女患此。加紅花二三分。

幼科鐵鏡

卷之四

一二六

卷之四終

幼科鐵鏡卷之五

貴池卓溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男 邑庠之日孟然

郡庠之雲飛霖全叅

一辨咳嗽

夏禹鑄曰。前書只說風寒暑濕燥火六淫之邪氣侵肺。皆令人嗽。又曰。五臟六腑皆有嗽。非獨在肺。此僅言咳嗽之太綱。卒未透發六淫侵肺之顏色與臟腑俱嗽之分別。予憶其故。必

從大方脈書上採來。惟照脈論症。故不說到六淫侵肺的顏色。亦未分疏臟腑致嗽的根由。卽言一二形症。俱屬模糊。予把六淫侵肺臟腑皆嗽這八個字上。一一體出形色。歷來不爽。若風寒濕三邪侵肺。其候面白而畏風。燒熱而無汗。或頭疼。或鼻流清涕。唇色晦闇。痰涎白色或滑而易出。小便清長。便知爲風寒與濕氣所侵。宜用疏風順氣湯。七二。或清肺飲。七二去白朮。加防風。便愈。

人侵肺嗽與火炎無制相同。方見後。若燥侵肺嗽。其候頭面汗出。寒熱往來。皮膚乾燥。皮瘡搔癢。大便閉結。痰涎膠粘。治宜

潤肺清金之劑。用麥冬、貝母、冬花、黃芩、防風、麻仁、甘草、赤芍、陳皮。暑氣侵肺而嗽，其候口渴唇淡，治宜香茹、厚朴、扁豆。加冬花、麥冬。至於六腑皆嗽之說，殊屬大概。予着實窮究六淫之外，嗽又有五一順傳、一逆尅、一反侮、一隔經傳染、一水火不相交濟。

順傳之嗽在脾。七不能生金，金無上養，故嗽。漢武帝金鑄自鳴。東方朔曰：土其母也。母喪則子鳴。山必有崩者。久之，蜀郡有奏山崩，以此悟之。脾虛肺嗽，乃一定之理。其候唇口慘白，氣弱神疲，小便清短，大便或溏瀉淡，白色，便知脾嗽。治用六

君子湯自愈无。

逆尅之噦在心。心火盛則金被火傷而噦。試觀治人燂金。人烈而金躍。息火則金安。嘗閱徐無猜地理闡宗書。有曰。如金星結穴。火星作朝。此外火尅內。不爲吉穴。須兩旁有水星山現。則制火以救金。始爲吉。因此悟火尅金。沸亦一定之理。其候舌紅唇燥。小便赤澁。口氣蒸手。便知心火尅金。法惟瀉心。用貝母陳皮甘艸黃連木通杏仁麥冬五味等分。燈心引煎服三四劑自愈。

弱尅之噦在肝。七有制伏。肝始不旺。如肺弱。木強侮金。則肺乃

被侮而嗽。星士家書云：我克者爲妻財，乃知肝猶肺之妻也。彼河東獅吼，必因夫主柔弱，便恃強侮夫。肝侮肺嗽，又一定之理。其候目勇口苦，宜用白芍柴胡冬花五味枳殼半夏甘草等分煎服。五劑自愈。

水火不相交濟之嗽。由腎水不能上升，則火炎無制，乃上刑肺金而嗽。猶之易之未洛，離火居上，坎水居下，水不得火而無功，火不得水而功亦無所施。水火不相交，故不各得其用。若既濟，則爲有用矣。况五行惟火最烈，故昔有慾火無制，口中吐出，祫廟俱焚者。由此觀之，豈止嗽耶？其症涕唾帶血，甚至

血溢。治用滋陰降火湯四五。二三劑自愈。屢治屢效。案難悉載。

隔經傳染之嗽在胃。上有熱。因染乎肺而嗽。肺胃各經順傳。不到逆逆。不及。又不相侮。胡爲亦嗽。乃由胃肺逼隣。胃司食入。肺司氣出。上入雖不同途。卻共呼吸門戶。胃熱熏蒸。波及肺竅。所謂矢火殃魚。亡猿災木者是也。其候唇紅口紅作渴。氣出大熱。治用石膏冬花麻仁五味甘艸。

以上諸嗽如喘。加麥冬。冬如咳有聲無痰。加杏仁防風。有聲有痰。加半夏枳橘。

余于本經咳嗽外。復將此五種旁引曲愈。無非爲嗽雖出自肺家。而卻有隔經之嗽。理實難明。故不惜多方以譬明耳。幸毋以危言罪我。

二平世業醫道。地距四十餘里。一孫咳嗽。自藥不應。以形色札白之。予併來藥單。乃瀉肺之味。據曰面舌唇口皆紅。小便赤色。予扎復。示以瀉心之劑。後聞三劑愈。此心火刑金。瀉心救肺之一驗也。

一痘後痘有專科。  
痘中症候不載。  
惟于痘後至緊要症附傳數方。唇口淡白。瘡壓平白。小便清。宜用六君子湯五。

痘瘡壓平白。宜用保元湯十一。

痘壓不落。已過者亦平白。宜用八珍湯六九。

痘中眼內生翳子。宜用免糞焙之爲末。每服三四錢。白水送下。服至升餘卽散。

痘後瘡壓或紅腫。紫腫。黑腫。急宜解毒。用生地。連翹。歸尾。甘草。赤芍等服三四劑。毒自解。

郡城孝廉危更原兩嫂。痘後一慾期不收。一收後痘壓平白。俱有微熱。邀予過治。見唇口慘白。氣出微微。并用十全大補湯。服二劑。熱除壓脫。俱轉紅潤。隨以保元湯十一調服之愈。

此望色審察。知血氣兩虛之一驗也。

### 一辨諸血

肺朝百脉之氣。肝統諸經之血。益榮血者。水穀之精氣也。脾胃有傷。榮衛虛弱。故血失常道而妄行。若氣虛氣弱。神疲。唇有血色者。治法宜用四君子湯三士。

血虛者。精神照原。唇舌無色。治用四物湯。四十加參术。糞前見血爲近血。用黃連解毒湯十七。糞後見血爲遠血。用清胃湯四二。久不止者用補中益氣湯三七加胡黃連。

吐血者。胃中積熱。宜麥門冬飲四二。或清胃湯四二。

衄血者。脾熱傳肺。而肺不能統血。從鼻出。宜六君子湯。加桔梗。當歸。梔仁。黃芩。

咯血者。腎虛也。咯如牝雞喚乳。雜聲。嬰兒無此症。

有咳嗽而吐血者。虧腎多以童子療治之。悞矣。此乃腎水心火不升降。火炎無制。治宜滋陰降火湯。四五。

夏禹鑄曰。諸般失血。有面色可審。俱屬尋常。惟血脫。嗽血二種。症不多見。用錄效案。以憑較證。予友陳公載。姪女七歲。血吐數升。身冷如水。通身筋現青色。平常撲跌處青更甚。唇口慘白。口氣微冷。此乃氣虛血脫。初大方脉作肺熱迫血妄行。

用梔仁黃芩等味。吐愈甚。此固照理用劑。卻不知看色之妙。  
後予用人參黃芪肉桂麥冬甘艸白芍三劑而愈。此氣虛脫  
血。望形審竅之一驗也。咳嗽帶血方見咳嗽類。用滋陰降火  
湯四五服。用屢效。症無疑二。故不附案。

一辨中暑中熱

夏禹鑄曰。前讖云。動而得之爲中熱。靜而得之爲中暑。此言甚  
是。然中暑與中熱病形無異。中暑作渴。中熱亦作渴。中熱說  
詭話。中暑亦說詭話。若不細審形色。雖得動靜二字。究何益  
也。如探中暑說詭話。乃低聲平七而說。中熱發狂雄壯而說。

此猶恐不得其真。只于口中一看。舌色慘白。唇無血色。口氣微弱而冷。便是中暑。宜用清暑益氣湯。六八。五愈。若唇舌皆紅。氣出如焚。小便赤澀。定是心經中熱。宜用木通薄荷煎。熟再以犀角磨水一杯。羚羊角磨水半杯。入煎藥和服。卽解。己亥歲。予從伯一孫方四歲。患病。初。伯與先君交惡已久。伯母呼予往治。舉至。阻撓且畏之曰。彼孫一死。禍來匪輕。予曰。具有兩眼。不煩過慮。視之。口氣微微。面色慘極。唇舌白淡。口道誕話。知爲中暑。用清暑益氣湯。一服愈。

穿山郡庠方紹文。僅一予。乃予壻十七歲抱疾。以予只知幼

利延兩方脉共治。彼見口說謊話。便作熱治。用盡犀角翹連芩膏涼劑。疾益加甚。急聞于予。予往見直臥如尸。口氣水冷。唇舌皆白。乃中暑之症。悞作中熱。大可怪也。用清暑益氣湯。一服立愈。此大方脉切脉。不如小兒科望色辨竅爲妙之一證也。

辨夜啼

啼有六。一面深紅多汎。無燈則啼稍息。見燈則啼愈甚。此心熱也。遇火兩陽相搏。故見燈而啼甚也。其候手腹必熱。小便赤。推用水底擣月引水上天河。退下六腑。及運八卦推坎入

良藥用導赤散三加梔仁。薄荷。天麻。

一哭多睡少。天明則已。面色青白。便亦清白。治宜溫下焦。用備急方七四。

一爲異物所使。自有所視。口不能言。但睡中驚悸。抱母大哭。面色紫黑。治宜陳皮。生姜。茯神。遠志。甘艸。服此仍啼。當審其果。不犯諸夜啼等症。可將雜色紙作一異物狀。令兒一視。卽對兒以火焚之。兒疑頓釋。自不啼矣。

有脾胃兩虛。吐瀉少食而啼者。治宜用六君子湯。五加炮姜。木香。

一。有心血不足而啼者。其候睡濃忽憒。舌色淡白而色不重。宜用安神湯四八。

一。有臍寒腸痛而啼者。以手按其腹卽不啼。起手又啼。此候面白必青。手必冷。口不吮乳。治用當歸。白芍。人參。甘草。桔梗。橘皮等分服之外。此而啼者必非病也。或夜醒時爲戲燈所慣。無燈而啼者有之。或乳母缺乳而啼者有之。

### 一辨疳疾

疳者乾而瘦也。此由寒熱失理。飲食不節。或因吐久。瀉久。痢久。瘧久。熱久。汗久。咳久。瘡久。以致脾胃虧損。亡失津液而成也。

心疳者。面黃頰赤。小便赤濁。口舌生瘡。煩渴。治宜寧心丸五錢。  
肝疳者。肌肉消瘦。目胞赤腫。翳生。泪多。白膜遮睛。瀉多青色。治  
用肝疳丸五錢。

脾疳。黃瘦腹大。或吃土。吃米。吃茶。宜調脾湯十三錢。

肺疳。潮熱喘嗽。鼻爛流涕。宜先用清肺湯七錢。次用化懶丸三錢。  
疳腫者。乃由疳久脾衰。不能制水。故頭面四肢發腫。脹甚者。褐  
一子丸五錢。大喘者不治。

丁奚。腹大項細。哺露翻食吐蛔。宜蘆薈丸十五錢。

赤遊丹火

此候由內有積熱。重蒸外被風熱所感。搏於血氣。皮膚赤腫。色如火灼。或注頭上。或發肢體。卻非輕症。入腹入腎。亦能殺人。宜速治之。用升麻。黃芩。連翹各一錢。大黃。朴硝各二錢。全煎。服四五劑自愈。

余同袍胡道生乃孫。頭患丹火。接余治。用前方。服二劑不退。又以介來請。余以札復曰。此症非輕。非一二服可愈。宜重用。各味五六劑。定然見效。後如數服愈。前歲余宗人有一女。患此症。余囑曰。此重症也。不可怠緩。不聽果死。

## 淋症

有沙淋者。腎水爲熱所結。化爲沙石。內塞水道。沙出痛止。治用五淋散。四六。氣淋者。小腹脹滿。小便澀滯而痛。用瀉白散。五。血淋者。心熱血散。治用五淋散。四六。加小薊滑石車前子。寒淋者。膀胱冷氣與正氣交爭。寒戰而後溺。治用六味地黃丸。十四。加附子。肉桂。有心熱者。用清心蓮子飲。五六。腎熱者。用六味地黃丸。十四。肝熱者。用柴胡梔子飲。六四。脾熱者。用連黃散。三八。肺虛者。用小異攻散。十六。肺熱者。用瀉白散。肺虛熱者。治用小異攻散。十六。加炒山梔。

以上心熱等七種淋症。辨法在辨脾心肺肝腎之款內求之。

便濁

屎白如米泔水。久則成瘤。用人參甘艸當歸木通猪苓赤芍赤茯青皮川草薢治之。

大便不通

肺與大腸有熱。七則津液少而便閉。治用四順清涼飲三八。血虛燥滯不通者。治用四物湯四十加柏子仁。松子仁。胡桃仁等分服之。

同邑紳徐梅宣公郎。痘後四十日。大便閉有七日。他醫以承氣湯單投之。予舅氏時在徐宅。力薦請予往視之。曰。血虛之

極幸未通利。通則不可藥矣。梅宣且幸且疑梗。用四物湯。一服便出。乃溏糞帶白色。梅宣拍案咄絕曰。一望卽知神何至此前庸手幾敗乃事。此望色審察。知非肺熱之一驗也。

小便不通

小便不通。由肺燥不能生水。當清肺中之熱。而滋腎水之源。治宜用黃芩。黃連。天花粉。知母。麥冬。茯苓。木通。甘艸等分服之。若脾濕氣不上升。當健脾生金。先用瀉黃散三八。隨用六君子湯九。若膀胱有熱。澁滯其流。治用五苓散十八。

出汗

汗者。寢中通身如浴。覺來方知屬陰虛。榮血之所主也。治宜四物湯四十加黃芪。浮小麥。黃連煎服。有自汗者。不時而出。動則乃息。屬陽虛。衛氣之所司也。治宜補中益氣湯二七加麻黃根。浮小麥。匕門冬煎服。有脾虛泄瀉自汗而汗出有時者。此症大虛。治宜六君子湯五。或附子理中湯五。姜棗引煎服。

### 黃疸

黃疸。其候色黃。屬脾。蓋小兒由飲食所傷。兼之濕熱之氣蘊積脾胃。故成此症。面白。指爪。小便遍身皆黃。疸症無疑。治用地

黃茵陳湯

辨腫脹

腫脹之症有二。一曰氣腫。先腫而後喘。由脾胃虛弱。脾主肌肉。肺主皮膚。土弱不能生金。虛氣上攻于肺。行于面目。遍身浮腫也。治宜調脾行氣爲主。用五子五皮湯三七等分煎服。輕則六劑。重則十劑。無有不愈。

一日水腫。先喘而後腫。因上焦煩渴。喜飲茶水。脾虛不能制水。水反侮土。上衝于肺。流走皮膚。而光腫也。治宜寔脾利水爲主。用胃苓湯三二。又湯後。痢後。瘧諸病後。脾虛發腫者。宜調

脾胃爲主。用六君子湯九。或補中益氣湯一七。切不可用通藥。如通萬不能活。如不因瘧痢諸病後。妄然而腫脹者。方從水氣二腫治之。此方卽大方脈家用之。亦無一不效。如通身不腫。只有腹腫。彈之如鼓聲。按之郤編軟。此脾虛也。宜用六君子湯九加厚朴。若腹腫彈之不響。按之如石。此單腹脹也。不治之症。

### 三消

三消之症。實熱者少。虛熱者多。不足之症也。若作有餘治之。慎矣。始而心肺消渴。或脾胃消中。或腎水消濁。傳染日久。則腸

胃合消。五臟乾燥。精神倦怠。以致消瘦四版。

消渴。心火動而消上。上消乎心。移熱于肺。渴飲茶水。飲之又渴。

名曰上消。治宜蓮花飲。七五爲主。次以生津四物湯。川芎八

分。歸身一錢。生地一錢。酒去知母一錢。白芍一錢。用冰糖色畏麥冬

錢。心火川連八分。鳥梅肉五分。天花粉七分。薄荷。石蓮肉。川

黃柏。蜜炒甘艸。火各五分。

消肌。脾火動而消中。七消于脾。移熱于胃。喜多食。七無足時。小便色黃。名曰中消。宜用石膏知母甘艸人參。倍加石膏。外加梗米。次宜生津養脾。

消濁火。動消腎。移熱于膀胱。小便渾濁。色如膏脂。名曰下消。宜用蓮子知母芡實麥冬。入四物湯服之。

瓦消症。務要養脾生肺。降火滋陰。病自除矣。

總治三消。以生血爲主。用黃連。天花粉二味爲末。藕汁。生地汁。生姜汁。人乳并蜜。共和二末爲樣。每次一指面大。白湯送下。

### 膀胱氣痛

嬰兒小腸與膀胱氣痛。在臍下氣海兩邊。筋腫到腎囊邊。痛不可抵。治用川陳子橘核小茴香荔枝核。俱焙炒爲末。白酒熱調三四錢一服。不數服即愈。

呆笑

兒無甚病。忽然見人呵叱而笑。卽不見人亦然。每日如是。宜用桔梗三錢。半夏五錢。木通一錢。甘艸五錢。煎服。隨于頂心百會穴艾灸二壯。卽愈。

不寐多困

嬰兒不睡。有一一心虛。一胆虛。睡中不聞人聲。忽醒而不寐者。此心血不足。宜用人参安神丸。四八。有睡中稍聞人聲。响動卽驚而不寐者。此胆虛之極。宜用參竹湯。七五。

多睡者脾氣虛弱。健運之合不行。而嗜臥也。治宜溫補其脾。用

四君子湯三十加木香半夏倍加白朮。

### 龜胸

由感風熱。凝注爲痰。停心滯胸。咳嗽喘促。肺氣脹滿。攻于胸膈。漸成龜胸。或乳母過食辛辣。夏哺熱乳。亦成此症。治宜寬氣化痰丸六三。

### 龜背

由客風吹背。傳入于髓。故背突如龜。或咳嗽久。以致肺虛。腎無所生。腎主骨。風寒乘虛而入于筋骨。致精血不能流通。故骨弓而駛。治宜松蕊丹六三。外以龜尿點看背中止縫。卽愈。

論解顱頸填顱陷

小兒生下頭縫不合。腎主骨而腦爲髓海。腎有虧故不合也。名曰解顱。治宜六味地黃丸十四。顱門之起。名曰顱填宜大連翹飲四。或瀉青湯五七。顱陷如坑者。由病久血氣虛弱。不能土充。治宜固真湯。又以狗骨參爲末。雞子清調敷之。

乾瘦似疳

兒父母平常節兒飲食。從不復脾。飲食不缺欠。又非病後。但見逐日消瘦。其症必由有所思想而難言。或二三歲四五歲貴。母又有所生。乳哺懷中。多有疼愛之聲。前兒從傍窺伺。見其

愛有所奪。不能入懷吮乳。惟朝思慕想久。則傷脾治之非藥所及。此症前所未傳。今不概見。余先君在日。余妹歸寧。見長甥乾瘦。審無他症。頃見妹哺次甥。長甥倚膝。覺神不在舍。因問子妹。瘦始十何日。妹曰。自得次甥後。經今月餘矣。先君命妹哺兒之時。勿令瘦甥得見。哺後陽抱入懷。以空乳喂之。且慰之曰。我只疼你。如此一月。果不藥而肥。追思先君妙。何如也。神何如也。

### 天柱骨倒

天柱骨倒乃項軟也。由真氣虛弱。客邪入腑。傳于筋骨。項則軟。

垂下而無力。治宜祛風散四四。或吐久。瀉久。病久而軟者。治宜六君子湯。五加肉桂。手軟者。宜用薏苡仁。當歸。秦艽。棗仁。防風。羌活。荆芥等分服之。足軟者。治宜六味地黃。十四加牛膝。五加皮。鹿茸等分服之。

予從弟鐸禹懸孫。方十個月。天柱骨倒。弟曰。弱極。即要用參。予曰。容邪入內。何可遽用。弟意不果。予作色拒之。用祛風散作煎劑。一服。頂稍直。即命用六君子湯。外加防風。五劑愈。

五硬

頭頸手足強直如木。乃肝受風邪。治宜小續命湯。五九。

齒病口瘡瘍

此病由胎中受熱而成。口瘡或牙床瘡生走馬。治宜導赤散。并清胃湯四二。如久病之後。瘦弱之極。難治之症。

重脣重齦

口中上脣皮腫起。如囊盛水。名曰重脣。牙牀腫起。名曰重齦。俱以大針刺破去血。用蒲黃敷之。

耳癰

耳內腫及耳外腫。耳外出膿。或間一日膿一出。或間二日膿一出。治宜用黃鱔。以刀斬斷滴血入耳數次。或用天保采薇湯。

重舌木舌

重舌者。舌下根復生。如小舌也。木舌者。其舌腫硬填口也。皆由心脾熱極。治用黃連。灶心土木通。連翹等分煎。犀角磨水和藥服之。用朴硝。紫雪。白鹽。每五分。用竹瀝調敷。即愈。

予于丙午科同從弟鐸。再從姪謨。鄉試曰下。姪忽患重舌。弟伴向外科。用刀刺破流出如雞蛋清。歸寓又腫。如此兩回不愈。予執舌乃心苗立方。用黃連。黃芩。木通。枳橈。甘艸。二劑。舌消一半。喉瘻忽壅。予揣必是悞用黃芩之弊。益心火刑肺。已不安。悞將肺瀉焉不痰壅。于是去黃芩。加五味二錢。一劑

並愈。此因苗治癓。照症立方。見藥不可悞用之一驗也。

### 鶴膝癰

此候由腎氣不足。兩腿細小。膝骨腫大如鶴膝之狀。治宜屈膝散六火。或用六味地黃丸。平四加牛膝。鹿茸。又有漏廩久而成此症者。紅腫作痛成膿。治用補中益氣湯三比。如腫硬不痛而色白者。治不愈也。

### 痛癰

四肢上或身上一處腫痛。或移動他處。色紅不圓塊參差腫起。按之滾熱。便是痛癰。治用羌活獨活五加皮威靈仙秦艽防

風桂枝前胡。如下身。加牛膝。各一錢煎服。數劑自愈。  
邑庠方玉相。幼子左手左足各曲貼肉痛。屈不伸。用前方煎  
服。五劑愈。如大人須用酒煮。每夜儘量飲。每味一兩五錢煮  
酒約五六斤。飲畢卽愈。此予創方。屢效不爽。

冷水癰

腳背上與指上。及解溪。鞋帶諸所。塊痛不可言。一痛幾死。用青  
磚一塊。火內燒紅。以木桶盛之。將老醋澆入磚上。以大人手  
伴兒脚懸于磚上。蒸之。氣莽則將脚稍遠。氣溫則就磚。桶口  
以綿絮之類圍塞。不令氣洩。一蒸卽驗如神。

迅雷所驚

其候抽掣。形狀與前驚無異。只手掌內橫直絞痕皆是深黃顏色。此因驚胆。其色故黃。拿甦。用鼓對兒輕七敲起。漸七加重。重擊二三聲。持去鼓以解疑。卽服參竹湯。七五以寧胆。

穿山林宅諱祥者。一子四歲腊月被爆竹驚死。拿甦。如父母喚聲畧重。又驚死。與飲食時。先以食示之。再做聲。便不驚。其父亦業幼科。投以棗仁。遠志等味。不效。至予告其頤末。余曰。此胆家受病作心家醫。悞矣。余授以參竹湯。二劑愈。

天庖瘡

此由風邪毒氣客于皮膚。搏于血氣而生。始生如湯盃作泡。一破漿出成瘡。治用生地升麻藍葉山梔大黃各一兩。剉碎用猪油八兩。文武火煎色亦變。濾去渣。磁器盛之。塗患處。

癩瘡

其狀如粟粒。色赤而癩。夏月多生頭面或遍身。用天保采薇湯三等分煎服。

黃水瘡

由濕熱與血氣相搏。其瘡初生碎小。後有膿汁浸淫成瘡。用雄黃雌黃川烏各一兩。松香三錢。爲末。亂髮一團。燒灰存性。猪黃。川烏各一兩。松香三錢。爲末。亂髮一團。燒灰存性。猪

油六兩。熬化。再入三味。煎至髮消盡。以綿瀝去渣。入一黃攬。勻盛器。塗瘡上。

### 惡核瘰癧

此患由風熱毒邪與血氣相搏。鬱結成核。如貫珠于耳項之間。腫硬白色。搖奪不動而有根者。便是瘰癧。或潰爛成惡。治如用藥。多有不效。不妙于用燈火。至易而至效。予亦曾患此。用燈燶兩次即愈。今故以燈火燶法垂于身之背面圖。如瘰癧左則燶左边。瘰在右則燶右边。前自頸上耳脚下起。離穴分地一點一點直下乳。次過脇上。至肺俞穴。到頸上耳後止。在

癩上周圍亦熾。第二次照原路空處補之。便愈。若只有核而搖得動者。便不是癩瘡。初起紅腫。便是癩瘡。不可作癩瘡治。

偏墜

腎囊子或「個腫大一個小。用香菇厚朴只壳。炒汁。木通。扁豆。生姜。甘艸。車前葉。煎服。或用萬年青根約五寸。去黑皮。搗碎。白酒煎服。不吃渣。亦愈。

莖腫痛并腎囊腫

莖卽陽物。如腫。用黃連。木通各一錢。煎服。卽愈。

腎囊腫如琉璃燈樣。用塘內水上無根浮萍。以篩盛之。下用水

一盆置篩于盆上。烈日晒乾爲末。每服二錢。卽消腫痛。如用鍋焙。萬七不乾。

灸霍亂

霍亂。灸肓俞穴七壯。起死神效。

灸瘧母

瘧母。灸肺俞穴各三壯。皆對臍穴三壯。神效。

灸脫肛

脫肛。灸龜尾穴。症暫用補中益氣湯。服此乃肺氣下陷。

灸肚大青筋

肚大青筋堅如鐵石于臍之上下左右離五分地各灸二壯卽消。

灸犬傷

犬傷用青磚上青苔和牛糞搗爛如被瘋犬傷于患處艾灸三壯卽愈。

灸蛇傷

蛇傷于患處艾灸三壯。

以上灸法俱用獨蒜截片遮患處盛艾于上灸之。

疔瘡惡瘡癰白膏異方

水粉。黃蠟各五。寒水石一兩。研細。用  
水飛過。乳香二錢。去油。麻油三兩。先入  
鍋滾過。入蠟化開。再入粉石。再入粉石。熬成。  
入乳香攪勻成膏。貼之即愈。

貼骨疔口掛角各疔瘡發皆腦癱大人小兒同治丹

疔瘡發背。腦癱。髮疽。乳癱。一切無名腫毒。用飛龍奪命丹服之。  
便有頭。先不痛不癢者。服之便痛便癢。未成者內消。已成者卽  
潰。其毒化爲黑水。從小便中出。此乃惡瘧毒中之仙丹。用蟬酥  
乾者酒化。二錢。胆礬一錢。海羊虫二十個。雄黃三錢。輕粉五分。蜈蚣一條。  
足。射香片。腦各五。共爲細末。酒爲丸如綠豆大。每服三丸。用  
去首。

葱白三根。長三寸。自嚼爛。吐在男左女右掌心。以前丸裹于葱內。熱水酒三四鍾送下。厚被蓋之取汗。約頓飯之時。再用熱酒催助汗出。其毒卽消。如汗不出。其毒乃重。再服三丸。汗出卽效。只是發背疔瘡。方可取汗。此方予于

都門許宅香火院住持小西天喇嗎僧處傳來。不論大小老幼。如有前患。用之無有不效。

卷之五終

幼科鐵鏡卷之六

貴池車溪叟夏鼎禹鑄氏手著

受業弟邑庠鐸禹懸

男邑庠之日孟然

郡庠之雲飛霖全泰

藥性小引

醫家治病。如經生制莊然。病有表裏重輕。猶題有大小搭截。病有來路去路。用藥有清源塞流之法。猶題有上文下文。作文有承上合下之規。藥味猶貢詮題面之字眼。藥性猶字眼義意之

淺深體認不明。便成差謬。不覩之卜子夏乎。於素以爲綯詩。只因一句滑讀過。便不解爲字之義。則醫家下學於百藥之性。可昧昧焉而不一爲之究耶。余前按症列單。因病用藥。固矣。然茫不知性。倘症變裁方。何所措手。爰約畧幼科常用百味之性。列於篇左。以便詳究。以供採擇焉。

藥性賦幼科摘要

寒性。犀角解乎心熱。羚羊清乎肺肝。澤瀉利水通淋而補陰。不足。薏苡能理腳氣而風濕堪除。車前子明目止瀉。能清小便。瓜蔞子潤肺止嗽。下氣寬中。黃柏泻膀胱而補腎。薄荷消諸腫。

以清風。寬中下氣。枳橈緩而枳實速。療肌解表。此胡次而葛先。柴胡瀉肝。止兩脇之痛。枳實削積除久滯之痰。百部治肺熱。於咳嗽可止。梔子涼心腎。而鼻衄最宜。升麻力消風熱。發散瘡麻。足陰引氣升陽。導藥遊經有四。麥冬清心解渴。專除肺熱。清肺隱伏之火。生肺不足之金。金箔乃鎮心而安魂魄。茵陳除濕熱而治胎黃。石膏墜頭痛。兼清脾胃。天冬定肺喘。又潤心肝。大黃能通閉結。朴硝降火通閉。前胡除內外之實痰。滑石利六腑之濫結。熟地黃滋腎水。補益真陰。生地黃涼心火。肺脾解熱。赤芍藥有血而療腹痛。煩熱亦解。白芍藥補虛兼瀉肝火。新血能

生香附子理氣。有消浮退腫之功。知母滋陰。乃瀉腎除蒸之用。貝母清熱痰而利心肺。寒痰愈滯。桔梗通肺竅而傳諸藥。肺部引經。黃芩瀉大腸之火。肺寒勿用。常山攻痰結之味。勦瘧九強。草薢子止肺喘以通水氣。水蘿節消瘀血而止衄紅。大黃朴硝乃脾虛送死之鳩毒。黃連貝母乃寒痰伐命之斧斤。

夏禹鑄曰。大黃猶之一員猛將。朴硝郤是偏裨。如賊勢猖獗。負踞要衝。用之舉旗折馘。一出成功。若民遭困苦之餘。平定安集尚恐不及。亦輕爲調遣。不惟無地樹功。而且賊梳兵籠。輕用之害。慘不可言。果肺火焰天。大腸毒結。一用則瞬息通。

關。至於臟腑俱虛。或氣虛腫脹。損用則掃盡元氣。不刃而殺人矣。嗟。七夜臺黑暗地獄之設。舍殺人者其誰。此種堅牢睛能解脫。一能筋斗翻來。斬新日月。縱有前番罪孽。是卽向世尊識悔。便作光明會上一位大菩薩。

熱性。生薑發散。除乎胃嘔。胃熱切不可用。五味止嘔。且滋腎水。初嘔不可遽加。川芎能祛風濕。清頭補血。紫蘇力能表散。亦可助脾。麻黃散寒邪以發表。根止盜汗而固虛。白朮消濕痰而溫胃。利水道以強脾。丁香快脾胃以止吐逆。附子療虛寒。大壯元陽。當歸補虛以養血。獨活祛風以治癰。厚朴溫胃且消嘔脹。

除痰亦驗。肉桂而療冷渴。止汗如神。橘紅皮開胃去痰。導壅滯之逆氣。山茱萸治頭昏暈上。下部之遺精。

夏禹鑄曰。附子之性有富貴的力量。用之貴小心謹慎。譬之富貴家凶年發賑。在細民之既飢且寒者受之。則雙眉喜溢。如枯木逢春。在廉介之士。雖橫窺無壁。壯氣不衰。悞爲過問。必髮直衝冠。以是知脾氣兩虛。元陽亡失。虛極生寒。體如水雪。口中寒氣逼人。一用如石投水。不特莫之逆也。且同流濕就燥。如只虛而不寒。卽寒不到陰極地位。形勢猶能自立。一用如水投石。不特莫之受也。而且水火參商。是知宜用不惟。

朝夕不宜郤。怕分厘。語云。恩不在大。貴期當尼。怨不在大。只怕傷心。可爲輕用。附子者作一箴規。

溫性。木香理平滯氣。半夏主於風痰。蒼术燥脾去濕。山藥脾濕能醫。藿香葉止吐溫胃。能消喉嚨之寒痰。秋冬花潤肺去痰。又定久嗽之壅喘。草菓仁溫脾胃以止瘧。威靈仙宜瘋氣以除疼。茴香却膀胱疝氣之痛。秦艽去肢節腫痛之瘋。檳榔墜痰逐水。治癆疾之後重如神。荊子生津潤肺。療滑瀉之沉疴似聖。防風祛風。杜仲益腎。橘核止腰疼。疝氣之急痛。麻仁潤肺及六腑之燥堅。黃耆實腠理。益元氣外固表虛之汗。肉豆蔻溫中止霍

亂更助脾臟之虛。生薑皮能消浮腫。鈎鈎藤專定驚風。

夏禹鑄曰。黃蓍之性溫內分。實腠理。益元氣外固表虛之盜汗。內托陰證之瘡瘍。乃脾家氣分之第一種固虛藥也。故仲景有曰。黃蓍。甘艸。以益元氣之內。人參。肉桂。調和榮衛之中。人動曰提氣。只知道一個氣字。那知道人身上氣有兩種。主乎脾者。氣之元也。主乎肺者。氣之發也。脾之元氣。猶每歲之爲生爲長。爲收爲藏。內運之氣是也。肺發之氣。猶山嶽之晴嵐。村落之烟霧。溪壑之陰雲。碧海之樓市。外發之氣也。不能分別兩種各有所司。猥曰提氣。嗟乎。黃芪何曾走着肺家。又

何曾埋着肺氣。把扶正氣的一味聖藥看壞了。致令脾氣弱。症卒不敢用。不亦深可悼哉。予推其故。多曰肺部有邪。氣喘氣促。那醫家不去清肺之邪。而遽爲扶脾之氣。適湊其會。氣愈喘愈促。便誣賴到黃芪身上。不然。黃芪與肺何涉。而亦亂道提氣耶。若以予言爲謬。試到明醫處。把黃耆溫肉分。實腠理。益元氣。固盜汗。這幾個字。幾種性細問一番。庶可脫離無間獄。步入明鏡臺矣。

平性青皮利脾胃。快膈削積。天麻定驚癇。燥濕祛風。甘艸調燮陰陽。解藥百毒。生用乃瀉心經之火。人參寧心潤肺。助胃開

脾生津扶氣。肺熱反來傷肺之憂。南星去驚風痰吐之苦。棗仁有補心去怔之功。大腹皮消浮下氣亦能和胃。遠志肉遺精能止而寧心。木通猪苓並爲利水之神。蓮肉醒脾更有清心之妙。白茯苓補虛勞。心脾俱到。曰茯神寧心臟。驚悸能安。麥蘖有入脾化食之力。脾虛莫用。小麥有止汗養心之功。浮者爲桂。神曲消食。恐傷脾氣。百合止嗽。兼斂肺虛。連翹渴六經之火。排郤瘡膿。大棗有健脾之力。中滿勿嘗。烏梅治便血。瘧痢兼用。竹瀝治瘻瘍。寒滯宜防。

夏禹鉢曰。人參是凡間一種仙丹。不肯救度惡人。只肯救度。

善類。若脾虛作渴。胃虛發吐。心虛驚悸。肺虛作嗽。津亡作渴。  
氣虛失血。病久成慢。諸類用之。如入芝蘭之室。蓋善與善相  
親也。肺熱氣旺。風邪熱邪。燥邪火邪。諸類用之。如入鮑魚之  
肆。蓋邪正不肯並立也。凡今之人。因前庸手悞用傷人。相沿  
視爲鳩毒。不深可恨哉。臟有活刑。不可遽用。邪去正衰。不可  
不用。遽用者傷人。不用者亦殺人也。後之君子。一能問經。夫  
悟作上乘禪師。堯囊普濟虛寒。不須淨上修因。卽井橘枝頭。  
杏林葉底。便結個花宮裏。天中天之大波羅蜜也。

幼

科

鐵

鏡

卷之六

一八〇

幼科鍼鏡湯方

二 天保采薇湯

羌活 前胡 半夏 嘴皮 柴胡 赤芍 白茯 川芎  
枳椇 厚朴 枳梗 蒼朮 升麻 葛根 合香 獨活  
甘艸

三 犀角解毒湯 治胎熱丹毒

犀角 赤芍 生地黃 白芷 甘艸 連翹 荆芥 防風  
牡丹皮 木通

三導赤散 治夜啼

木通 生地 甘草 竹葉 黃芩

四大連翹飲 治胎熱等症

連翹 赤芍 歸尾 木通 甘艸 防風 荆芥

五理中湯 治胎寒等症

乾薑 白朮 甘草 人參 若加附子。名附子理中湯。

六鈎藤膏 治內吊肚痛

乳香 沒藥 木香 姜棗 其爲丸鈎藤湯下

七地黃茵陳湯 治胎黃

生地 归尾 猪苓 天花粉 赤芍 赤茯苓 茵陳 泽

湯 甘艸

八秀藥湯

治夜啼泄瀉

白芍 澤瀉 甘艸 大茴 薄荷 木香 茶葉 生薑

九六君子湯

治脾胃虛寒等症

陳皮 半夏 人參 白朮 甘艸 白茯 生姜大棗引。

十 固真湯

治慢驚四肢冷不省人事

附子 甘艸 人參 山藥 黃蓍 肉桂 白朮 白茯

姜棗引。

十一 保元湯

治汗多寢慢驚

黃芪 人參 甘艸 生薑

三片大棗一枚水煎服。

〔十二〕姜半散

治吐不止蔣成慢驚。

半夏 生姜 肉桂

〔十三〕調脾湯

治脾疳

陳皮 白朮 丁香 人參 柯子 青皮 甘艸

〔十四〕六味地黃丸

治腎疳

牡丹皮 熟地黃 白朮 苍 山萸肉

酒蒸去核

白澤湯 淹山藥

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。空心滾水送下。

〔十五〕蘆薈丸

治丁奚瘡露

蘆薈

人參

白朮

白茯

山藥

木香

陳皮

青皮

麥芽

神麴

當归

各三  
個  
楨榔  
兩個  
麝香  
少許

右爲細末。猪胆打麵糊爲丸。如麻子大。清水湯送下。

十六

小異攻散

治先瀉後吐  
脾胃虛冷

人參

白朮

橘皮

白茯

姜棗爲引煎服

十七

黃連芍藥湯

治先吐後瀉

黃連

芍藥

猪苓

澤瀉

白茯

白朮

甘艸

十八

五苓散

治吐瀉

猪苓

白朮

白茯

澤瀉

肉桂

十九 消導二陳湯 導痰消食健脾

陳皮 半夏 白茯 白术 茯苓 神麴 香附 砂仁  
甘艸

三十六和湯 治暑渴

陳皮 半夏 白茯 甘艸 黃連 厚朴 合香 香薷  
加扁豆 木瓜

廿二 胃苓湯 治長夏暑渴

澤瀉 陳皮 甘茯 猪苓 厚朴 白术 甘艸 茯苓  
白朮

廿二 助胃膏 治胃氣虛寒嘔吐

人參 白术 白茯 甘艸 山藥 木香 丁香 合香

砂仁

廿三 柯附丸 治飧泄

柯子肉 灶心土 黑附子 爲末。米糊丸。如粟米大。米湯下。

廿四 十六味兒丸 治脾胃虛弱

人參 白术 白茯 山藥 蕎米 火實 蓮內 甘艸  
陳皮 山楂 麥芽 砂仁 黃連 澤瀉 荷葉 連翹  
右爲末。蜜丸如彈子大。米湯下。

廿五 承氣湯 治裏急後重。腹痛。痢疾。

朴硝 大黃 枇實 厚朴

廿六 木香檳榔丸

治食積

黑丑 檳榔 木香 神曲 大黃

右爲末。生姜汁糊丸。如粟米大。米湯下。

廿七 補中益氣湯

黃芪 人參 甘艸 陳皮 白朮 升麻 柴胡 當归

廿八 四順清涼飲

治中焦熱

白朮 當归 生地 甘艸 柴胡

廿九 人參敗毒散

治積毒嘔惡

柴胡 前胡 川芎 羌活 獨活 白芍 枳橈 桔梗

甘艸 人參 生姜引。

三十四君子湯治脾胃不調等症

人參 白朮 白茯 甘艸 姜棗引。

三二姜茶飲治赤白痢

陳茶 生姜 黃蠟 盐 車前葉

三三四獸飲治虛癰

白朮 人參 白茯 草果 半夏 甘艸 陳皮 烏梅

姜棗引

〔三〕人參養胃湯 治癥寒多熱少

陳皮 半夏 茯苓 人參 蒼朮 厚朴 蜀果 合香  
姜引。

〔三四〕清瘧飲

柴胡 枳殼 青皮 半夏 白朮 黃芩 厚朴 猪苓  
白朮 澤瀉 陳皮 甘艸 貝母 知母 全胡

〔三五〕隨用截方 加恒山草果梔榔。姜引。係加在前單煎服。

〔三六〕參蘇飲

人參 蘿蔔 桔梗 前胡 半夏 乾葛 陳皮 枳殼

杏仁 木香 甘艸 茯苓 姜引。

三七五子五皮飲

治腫脹

蘇子 山楂子 蘿蔔子 莩蕷子 香附子 桑皮 橘皮

大腹皮 茯苓皮 生薑皮

三八瀉黃散

治濕熱腫脹

赤茯 黃連 黃柏 黃芩 山梔 澤瀉 茵陳

三九瀉白散

治肺熱

甘艸 桔梗 陳皮 桑皮 地骨皮

四十四物湯調益榮衛

川芎 當歸 熟地 白芍

(四二) 麥門冬飲 治吐血久不止

麥冬 黃芪 當歸 人參 生地 五味子

(四三) 清胃湯 治糞後見血

山梔子 生地 牡丹皮 黃連 當歸

(四四) 茵陳湯 治黃疸

茵陳 梔子 黃柏

(四五) 祛風散 治天柱骨倒

防風 甘艸 羌活 細辛 黃芩 白芷 薄荷 當歸

川芎一不

四五滋陰降火湯治陰虛痰結

當歸不地黃不白芍不黃連不白茯不知母不天花粉不蓮子  
不黑玄參不甘艸不麥冬不燈心引。

四六五淋散治血淋

赤茯不赤芍不山梔仁不條黃芩不當歸不甘艸不柴胡不陳皮不

四七清脾飲治熱瘡或熱多寒少

青皮不牛夏不黃芩不甘艸不白朮不白茯不柴胡不陳皮不  
艸果不厚朴不姜棗引。

(四八)人參安神湯

治心血不足  
驚悸不眠

麥冬五不人參去心寒水石一兩白茯不牙硝各五不一

(四九)安神湯

治心血不足  
驚悸

人參不半夏棗仁不茯神不當歸不橘紅生地不赤芍不五味子  
不甘艸不姜引。

(五十)寧心丸

麥冬五不寒水石一兩白茯不牙硝各五不一  
砂砂一兩龍腦一字

右爲末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服半丸。砂糖水磨下。如慢症。

用人參白朮煎濃汁化下

〔五二〕肝疳丸

五靈脂不夜明砂龍胆草一个天麻一錢乾蟾頭不全蟾個  
蟬退不川芎不蘆薈不黃連一錢青黛不防風

右爲末。猪胆汁浸爲丸。麻子大。每服十丸。薄荷湯下。

〔五二〕化蠶丸

治肺癟

蕪荑不青黛不蘆薈不川芎不白芷不胡連不川連不

蝦蟆灰各等分爲末。猪胆汁浸糊爲丸。麻子大。每服二十枚。

歸臥杏仁湯下。

五三褐色子丸 治疳脹

蘿蔔子一兩 青皮不陳皮不檳榔一个赤茯一个黑牽牛不莪朶不五靈脂各五木香減半

二分

右爲末。糊爲丸。菉豆大。每服十五丸。桑皮。柴蘇煎湯。或蘿蔔湯下。

五四五味二陳湯 治奕暑傷寒吐瀉

陳皮不半夏不白茯不甘艸不厚朴不香茹不黃連不山楂不

麥芽不神曲不木通不澤瀉一不

五五香茹飲 治暑熱

香薷 厚朴 扁豆 黃連

五六清心蓮子飲 治溺血

麥冬 地骨皮 黃芩 甘艸 白茯黃芪 柴胡 車前  
石蓮肉 人參

五七瀉青湯 治顛填

羌活 川芎 梔仁 龍胆艸 當歸 防風各等分 大黃 咸半

竹葉引。

五八清金飲 治傷風嗽吐

前胡 杏仁 桔梗 桑皮 半夏 甘艸 旋覆花 薄荷

陳皮 水煎

〔五九〕小續命湯 治剛柔症病

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥  
防已 肉桂 附子

〔六十〕苦蘇飲

川芎 蘿蔴 陳皮 半夏 柴胡 桔梗 枳橈 乾葛  
白茯 甘艸

〔六十一〕瀉肝湯

畢前 木通 生黃 鹽尾 山梔 黃芩 龍胆艸 甘艸

分各五

六二松蘆丹

治龜背

松花 枳橈 防風 獨活各一兩 麻黃 前胡 大黃 桂心  
錢各五爲末。蜜丸。黍米大。每服二十丸。粥飲下。

六三寬氣化瘀丸

治龜胸

大黃三分杏仁 百合 木通 桑皮 甜葶苈 天門冬  
石膏各五錢爲末。煉蜜丸。黍米大。食後臨臥。白熱水化下。

六四柴胡梔子飲

柴胡 山梔 白芍 川芎 白芍 當歸 丹皮 半旁

甘艸等分水煎。子母並服。

〔六五〕固腸飲治久痢不止。

木香、黃連、當歸、芍藥、人參、白朮、白茯、甘艸  
調子肉。水煎。

〔六六〕屈膝散治鶴膝

防風、薏苡仁、牛膝、苦參女便浸酒、何首烏男便浸酒、各一錢、姜參  
天花粉、荆芥蕙錢各五、肥皂核肉一兩、鹿茸五錢

共爲粗末。每用三錢。同冷飯團四兩。牝猪油六錢。枯米。紫豆各一撮。水四碗。煎至一碗。分作二次温服。

〔六七〕猪乳膏 治胎風胎驚

牛黃不硃砂各少許。治取猪乳調抹兒口中。

〔六八〕清暑益氣湯 治傷暑煩熱

黃芪不升麻人參不白术陳皮不神曲澤瀉不黃柏當归不青皮乾葛不五味甘艸不木煎服。

〔六九〕八珍湯

人參不白术白朮不茯苓甘艸不川芎當归不熟地熟地不芍药姜棗引。

〔七十〕藿香正氣散 治傷脾胃外感寒邪

食香不紫蘇不腹皮不陳皮桔梗不甘艸茯苓不半夏  
不神曲不厚朴不白芷不薑棗引。

〔七二〕疏風順氣湯治風寒發喘

紫蘇不乾葛不桑皮不前胡不麻黃不杏仁不甘艸水煎服。

〔七三〕清肺湯

白朮不茯苓不陳皮不薄荷不南星不桑皮不細辛不甘艸不  
桔梗

〔七三〕備急方治夜啼內用

煎葱湯。淋洗其腹。又用艾絨烘熱。包熨脇腹十數次。其痛漸愈。

〔七四〕蓮花飲

甘艸

知母

蓮花鬚

胡黃連

瓜萎仁

五味子

人參

乾葛

白茯

生地

竹葉

〔七五〕參竹湯

麥冬

人參

竹葉

甘艸

半夏

小麥

粳米

陳皮

生薑

卷之六終

幼

科

鐵

鏡

卷之六

二〇四

## 後記

《幼科鐵鏡》六卷，清·夏鼎撰。鼎字禹鑄，號卓溪，安徽貴池縣人。爲儒家世族，學識淵博，通岐黃術，尤精於兒科。自稱兩代濟人七十餘年，醫活嬰兒不下百千萬數。是書集其兩代治療小兒之經驗，不落前人因循之彙臼，自成一家言。診病首重望色審竅，治療或用推拿，或用燈火，或用藥味，毫不拘泥，每多奇中。文字平實，頗切實用。書成初刻於康熙年間，代有翻印。迨至咸豐，因遭兵燹，書版無存，流傳漸少。光緒至宣統間，平湖沈應奎，貴池劉含芳、劉世等珩，均有校訂翻刻。雖訂正了不少原書訛誤，然擅改處亦多。故此次重印，以同治年間黎照書屋本爲底本影印，並加以圈點，以便閱讀。雖版面略浸染，但因其刻印較早，稍近原貌。

後附校勘表，以正其訛誤。底本卷三及卷六末略有殘缺，以宣統刻  
貴池先哲遺書本補入共三頁。

李繼明

校 勘 表

					頁 數	行 數	
					目錄四	二	似驚風 2
六一					日錄五	三	似驚風傷寒
二	九	四	五	九	一	辨(失)血	似驚風傷寒
消(道)	(生菩崖)	(瞻)回	9	不(而)	辨傷(風)寒	兼癟	誤
一	消導	一本作縱情慾	捨回	不爽	辨諸血	辨傷寒	正
四八	三七	一四	一三	九	治病不可關門殺賊說	治病不可開門揖盜說	

頁數	行數	誤	正
八五	六	肺(熱)	肺虛
一三三	五	二三(下)	二三劑
一五四	一	曲(愈)	曲喻
一六七	八	(貴)	時
一六九	二	(再入粉石)	四字衍
一七二	七	製(莊)	製藝
一九〇	六	(擎)旗	擎旗
(全)胡	前胡		

二

[General Information]

书名=幼科铁镜

作者=

页数=208

SS号=10858707

DX号=

出版日期=

出版社=