

卷六十四接外科古方

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章 下

須集

七卷

傷寒典 上 有目二張

八卷

傷寒典 下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒
附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡 上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡 中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡 下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄
上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章
下

須集

七卷

傷寒典
上

有目二張

八卷

傷寒典
下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒
附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

右爲末先用漿水洗拭乾傅

滑石散 一九七

治小兒天泡瘡

好滑石 黃栢

右共爲末傅之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青靛調前二味加泥用皂刺挑破泡水次敷藥神效

秘方仙遺糧湯 一九八

治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可

取效

土茯苓 卽名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石柏搥碎

用水三碗煎二碗去粗入後藥煎服

當歸

生地

防風

木通

薏仁

各八分

金銀花

黃連

連翹

各一錢

白朮

白蘚皮

各七分

皂刺

六分

甘草

四分

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土草解湯

一九九

治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋

骨拘攣疼痛皆妙

用土草解即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐

徐服之○若患人或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以

此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮飲

二百

治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結

毒

當歸

木瓜

生地黄

熟地黄

羌活

薏仁

各一錢

防風

荆芥

赤芍

苦參

大楓藤

各七分

五加皮

三錢

甘草

僵蚕

各五分

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎一碗食前

溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛肉茶酒醋所用

一土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散 二百一 一名單薺湯○治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓 五錢或一二兩

當歸

白芷

皂刺 各一錢半

木瓜 不犯鐵器

白鮮皮

木通 各一錢 金銀花 各一錢 甘草 五分

右水煎服 甚者土茯苓用至四五兩更妙

獨活消毒散 二百二 治時瘡肢節筋攣

姜黃 土茯苓 獨活 各五錢 白木

當歸 各一錢半

芍藥 一錢

白芷 五分

右水煎服

七貼方 二百三

治楊梅綿花瘡

防風

忍冬

皂刺

蟬退

去頭足

連翹

白蘚皮

五加皮

荆芥

穿山甲

炒各一錢

生地

木瓜

去心忌鐵

殭蚕

炒各一錢半

皂子

七個

薏仁

三錢

土茯苓

四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之 ●忌牛羊茶酒醋房

事

外科

茯苓膏 二百四

治楊梅瘡並治瘋毒

當歸

白蒺藜

羌活

生地

熟地

甘草

去皮

連翹

木通

各三錢

土茯苓

半斤

右為粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏晾冷
每服一大酒鍾日三服輕者五六料重者十料全愈熬藥須

用砂鍋



忌房事雞魚牛肉椒醋等發物

五寶丹

二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀

透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠 炒過三分半 一方用豆腐包蒸

硃砂 透明者三分半

鍾乳石 用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵 炒過三分半

冰片 半分臨時加

右俱爲極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前粗再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內爲一日之用○若病在上者加木香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓

苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時時飲之若飲湯半鍾加五寶丹二釐飲一鍾加四釐體厚者加六七釐一日內服盡此湯為度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒貼清涼膏或加摻藥收口若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也大忌房事輕者十服重者二七服全愈

醫統

楊梅癰漏方

二百六

不問年深者並效

土茯苓

五兩

金銀花

一兩

皂刺

花椒

牛旁

鬱金

當歸

各五分

黑鉛三兩 鎔化入水銀五錢乘熱搗爲粉分五分聽臨必

另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從頰而出也○此藥每以五貼爲一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風荆芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗自然汗出卽患二三十年者只用此四

料四汗之無不全愈忌牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳

徐春甫得之用以治人一一獲效故詳載之以濟人也

會膿散 二百七

治惡毒便毒初起之妙方也

白芷

僵蚕 炒

川山甲

煨各二錢

大黃

四錢

乳香

沒藥

各一錢

右為末以當歸四錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量人強弱

或全用或一半調服之○此藥若嫌太多則咬咀為飲大黃

生加煎服之尤妙

牡蠣散

二百八

治便毒亦各血疔

當歸

酒拌

甘草節

滑石

煨各錢半

牡蠣

二錢

大黃 三錢

木鱉子

五個并非有大熱者此味不可用當去之亦不必用

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未潰

膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大

小便秘發熱熯痛或交感時強固精氣以致交錯壅滯而結

為腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚熯痛大小

便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散

二百九

治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感強

忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便秘先用此藥涌

解更用調補之劑

肉桂

大黃炒

芍藥

牽牛杵炒

澤瀉

桃仁

去皮尖炒
各二錢半

炙甘草

乾薑

各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯

二百十

治腎癰腫痛兩尺脉緊按之無力者

羌活

黃柏

各二錢

黃芪

鹽水炒

防風

當歸尾

藁本

肉桂

連翹

各一錢

炙甘草

蒼朮

陳皮

各半錢

右水酒煎服

加味瀉肝湯 二一二 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮

脫翠丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草 酒炒 當歸稍 車前子 炒 生地黃

芍藥 炒 澤瀉 黃連 炒 黃栢 酒炒

知母 酒炒 防風 各一錢 甘草稍 五分

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散 二一二 治懸癰不消不潰

人參 鹽水炒 黃芪 鹽水炒 當歸 川芎

麥門冬 芍藥 炒 黃栢 酒炒 知母 酒炒

金銀花

製甘草

柴胡

各一錢

水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯

治懸癰潰而不斂或發熱飲食少

思

人參

黃芪

鹽水炒

白朮

炒

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

炒

茯苓

各一錢

甘草

炙

肉桂

五味子

搗炒

麥門冬

各五分

水二鍾煎一鍾食前服○莖腫加青皮○小便赤加酒炒黃

栢知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散 二一四

治婦人陰中突出一物長五六寸各陰

挺

當歸

黃芩

各二兩

牡蠣

煅一兩半

蝟皮

炙一兩

赤芍藥 五錢

右為末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應須以補

中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用當歸川山甲炒

蒲黃炒各半兩長砂一錢麝香少許俱為末每服三錢酒調

下尤效

婦人陰瘡 二一五

治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁炒

雄黃

白礬各五錢

麝香二分

右為末敷入患處

塌腫湯二一六

治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草

乾漆各三錢

生地黄

當歸

黃芩

川芎各二錢

蟹甲五錢

右用水數碗煎數沸去粗當洗患處

白芷升麻湯二一七

治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷

升麻

黃連

木通

當歸

川芎

白朮

茯苓

右水煎服○更用塌腫湯浴洗之

痔漏腸紅方 二一八

其效無比

黃連 去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起陰乾爲末

百草霜 用草茅燒者松柴者不用一兩研細

烏梅肉 一兩蒸軟卽用前浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處爲丸桐子大如太乾仍加前酒搗丸之
每空心用酒送下四五十九三日見效十日全愈

地榆散 二一九

治血痔

右用地榆爲細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭樗皮散 二百二十

治痔漏下血及膿不止

臭樗皮 微炒 酸石榴皮 黃連 去鬚 地榆

阿膠 炒珠各一兩 艾葉 三錢微炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯 二二一 治痔漏結燥大便作痛

秦艽 防風 當歸 酒拌 白朮

黃栢 陳皮 柴胡 大黃 煨

澤瀉 各五錢 桃仁 去皮尖 紅花 升麻

甘草 各五分

右水煎空心服

猪臟丸 二二二

治大便痔漏下血

猪大臟

一條 控乾

以槐花炒為末填入臟內兩頭札定丸器出

米醋煮爛

右搗和再加糕糊為丸桐子大每服五七十九食前米飲或

當歸酒下○此方用黃連猪臟二味亦名猪臟丸尤效○一

方先用海螵蛸炙黃去殼為末以木賊草煎湯調下三日即

效或後服黃連猪臟丸

痔瘡方

二二三

雄黃 五分

五靈脂 燒斷

五倍子 炒過各一錢

沒藥 三錢半明者

白礬 半生半熟三錢

右為極細末用紙托貼瘡口上

三品錠子 二二四

上品 去十八種痔

白明礬 二兩 白砒 一兩零五分

乳香

沒藥 各三錢半

牛黃 三錢

中品 去五漏及翻花瘡氣核血

白明礬 二兩

白砒 一兩三錢

乳香

沒藥 各三錢半

牛黃 二錢

下品 治瘰癧氣核疔瘡發背腦疽諸惡證

白明礬 二兩
白砒 一兩

乳香

沒藥 各二錢半

牛黃 三分

右將砒末入紫泥礮內次用礬末蓋之以炭火煨令烟盡取出並各藥俱研極細末用糯米糊和為挺子狀如線香陰乾
絛瘡內三四次年深者五六次其根自腐如瘡露在外更用
蜜水調搽乾上亦可○嘗有一老媪用此治瘰癧索重價於
青為治其方法乃是中品錠子絛瘡內以膏藥貼之其根白

腐未盡再用去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之凡見其
治氣血不虛者果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與
必效散相為表裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏 二二五

治痔漏下疳瘡

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時以涼水
化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯若得熊膽更佳
如眼痛者點之尤效

水銀棗子膏 二二六

治重痔痒不止

水銀 一兩
棗肉 二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中明日而
出若痛加^輕翻粉三分丸內之

熊膽膏 二二七 治痔痛極效

熊膽 五分 冰片 一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔上

蝸牛膏 二二八 傳痔痛極效

蝸牛 一枚負殼 有角者 冰片 射香 各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線 二二九 繫痔漏瘤核

用芫花一握洗淨入木臼搗爛加少水絞汁於石器中燉火煎成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當微痛候痔乾落以紙撚蘸膏納竅內去根當永除根也○一方只搗汁浸線一夜用不得使水

枯痔水澄膏 二百三十

治痔護肉

鬱金

白芨

各一兩

一方加黃連

右二味爲細末如患內痔候登廁時翻出在外用溫湯洗淨側臥於床其痔卽出用蜜水調藥得中以篋篋塗穀道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥搽痔上

仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散

好白礬

四兩

生信石

二錢

硃砂

一錢研極細

右各研為細末先將砒入紫泥罐底次將礬末蓋之用火

令烟盡其砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬為極細末

看痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用篋

篋塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑為效至夜有黃

水出切勿他疑水盡為妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥

三次有小瘡不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更

上新藥仍用護肉藥間用荊芥湯洗之三兩日之後黃水出

將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力卽緩三兩日卽可增
減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳藥厚薄方是活法
此藥只是借礬信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二
方在京治人多效致富一富商以百金求得之錄於子子雖
未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師已刊於青囊雜
纂如神千金方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方
也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有失

如神千金方

二三一

治痔無有不效

好信石

黃明者三錢
打如豆粒

明白礬

一兩
爲末

好黃丹

飛砂
五錢

蝎梢

七個洗淨瓦上焙乾為末

草烏

光實者去皮生研五錢

右用紫泥確先將炭火煨紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看確通紅烟起

為度將確掇下待冷取研為末方入黃丹草烏蝎梢三味再

同研極細以磁確收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗

淨患處然後用生麻油調前藥以鷲毛掃藥痔上每日敷藥

三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可

取盡日近者俱化為黃水連根去淨更搽生肌之藥九五痔

皆可去之此乃臨安曹五方為高宗取痔得效後封曹官至

察使

秘傳正骨丹

二二二

治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

此可續筋骨

降真香

乳香

沒藥

蘇木

松節

自然銅

醋煨七次

川烏

炮

真血竭

各一兩

地龍

去土酒浸烘乾

生龍骨

各一錢

土狗

十個浸油內死烘乾

右十二味共重八兩八錢同為末每服五錢隨病上下酒調

服覺藥白頂門而至遍身搜至病所則蠕蠕有聲而筋骨漸

愈病人自知之○服藥後仍服人參白朮黃芪當歸川芎肉

桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方

二二三三

治打折損傷

接骨木

半兩

乳香

半兩

當歸

赤芍藥

川芎

自然銅

炒醋煨
各一兩

右為末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熱飲之痛即

止

沒藥降聖丹

二三四

治跌打損傷接續筋骨

當歸

酒炒

白芍藥

川芎

生地黃

蘇木

川烏頭炮去骨碎補灸

乳香另研

沒藥另研

自然銅火煨醋淬十次
烏末各一兩

右為末生薑汁共蜜和丸每一兩作四丸每服一丸用米酒

各半盞煎至八分空心熱服○立齋日脾主肉肝主筋若肝

脾氣血虧損或血虛有熱而不愈者當求其本而治之

十味沒藥丸二三五

治打撲損傷筋骨疼痛或氣逆血暈或

瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

乳香

川芎

川椒

當歸

芍藥

紅花

桃仁

血竭 各一兩

自然銅 四錢 火煨 七次醋淬

右為末同黃蠟四兩溶化入前末速攪勻象手丸彈子大每服一丸酒化下○立齋日按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本為善

花蕊石散 二 三 六

治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死服之血

化為水其功不能盡述

硫黃 明者 四兩

花蕊石 一兩

右為末和勻先用紙筋和鹽泥固劑瓦罐一箇候乾入藥再

用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煨之候窰
冷取出每服一錢童便調下○立齋日前方若被傷已甚元
氣虧損內有瘀血不勝疎導者用前藥一服其血內化又不
動臟腑甚妙甚妙

△黑丸子 二三七

一名和血定痛散○治跌打損傷筋骨疼痛

或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛或手足緩弱行步不前
若流注膝風初結服之自消若潰後氣虛發熱與補藥兼服

白歛

百草霜

白芍藥

各一

川烏

炮

南星

各三錢

赤小豆

兩半

白欵

一兩六錢

白芨

骨碎補

當歸 各八錢

牛膝

六錢

右各另為末酒糊丸桐子大每服三四十九鹽湯温酒任下

孕婦忌服

封口藥 二三八

凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡蠣 煨

赤石脂

生研

紅丹

上好者等分

右為細末香油調塗瘡口○若欲消腫散血合口加血竭乾

疹之

當歸導滯散 二三九

治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不

通或喘咳吐血

大黃

當歸 等分

右為末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂

復元活血湯

二百四十

治跌打損傷瘀血流於脇下作痛或

小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡

半錢

天花粉

川山甲

炒各一錢

當歸

酒拌

大黃

酒炒各一錢

紅花

甘草

各七分

桃仁

二十去皮尖研

右水一鍾半加酒半鍾煎八分食前服之以利為度

金瘡方

二四一

九金瘡出血不止用牛膽石灰摻之卽止其方以臘月牛膽
入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七搗爛敷之神效
又方金瘡出血不止以五倍子生爲末乾貼之如不止而血
熱者宜用犀角地黃湯之類○大凡金瘡出血不止若素本
怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若因怒者當
平肝若煩熱作渴昏憤者當補脾氣若筋攣搐搦者當養肝
血不應用地黃丸以滋腎水

金瘡降真散

二四二

降真香

用節

松香

文蛤

三味等分爲末無論諸傷血出斷折摻破處夾縛定神效

金瘡灰蛋散 二四三

治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰 細研

雞蛋清 以和灰成餅爲度

右將灰蛋餅子煨過候冷研細遇金瘡摻之若多年惡瘡以薑汁調敷〇一方單以石灰摻傷處裹定亦血止而愈

龍骨散 二四四

治金瘡

龍骨

赤石脂

五倍子

黃丹

海螵蛸 各等分

右各研人麝香少許共研勻摻上如乾先以鹽水洗拭乾摻

之

○ 桃花散 二四五

治金瘡並一切惡瘡

黃丹

軟石膏

煨過
等分

和研勻如桃花色摻傷處甚妙

刀傷跌打經驗方 二四六

凡刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒熱敷患處
葱冷再易神效○一方以三七搗爛罨之神效

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證青腫不散
死肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內外所以合一也

損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分為末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

罨跌閃腫痛 二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之○如熱服而痛者用梔子加麵炒熱罨之

洗損傷方 二四九

凡傷重者用此淋洗然後傳藥

荆芥

土當歸

生葱

切斷一方
用生薑

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

有一方治竹刺在肉以蟻糟虫研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根罨之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同蜣螂研勻塗傷處俟

痒極拔出之

孫真人治箭鏃針刺杵蟻蛄塗患處自出

罨跌打夾棍傷 二五一

生薑 陳酒糟 各一斤

同搗爛炒熟罨傷處

治梭傷 二五二

凡梭傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手蘸洗良久卽血活疼止不致潰爛熬水忌銅鐵器其洗手水過夜卽臭惡不可聞

△ 杖瘡四方 二五三

用川大黃一兩加上好水片二分另研俱爲末和勻涼水調如糊攤杖處卽時止痛一日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃

白芷

生半夏

各七錢

右為末以鮮薑汁調敷乾即再敷以黑處血紅為度即換貼膏藥神效

又方

生半夏

松香

各一兩

右研一處蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈

諸骨諸物鯁

二五四

一治諸骨鯁用苧麻根杵爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下

一治魚骨鯁用細茶五楮子等分為末吹入咽喉立愈

一治稻芒糠殼鯁喉將鵝弔一足取涎徐徐噉之即消

一治吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥羊脂及諸般肥肉等

味必墮大便而下

一治吞鐵或針用錫糖半斤濃煎艾汁調和服之一服即愈

一治吞髮繞喉不出者取自己亂髮燒灰白湯調服一錢

破傷風敷藥 二五三

治打撲損傷風腫痛者

南星

半夏

地龍 等分

右為末用生薑薄荷汁調搽患處

稀蒼酒 二五六

治破傷風外邪初入或風入於臟者神效

凡頭面身體因破損傷風者頃刻發脹遲則不救速用稽茶
草一二兩酒水各半煎服被蓋緩臥少頃即可消散能飲者
純用酒煎尤妙

防風湯 二五七

治破傷風表證未傳入裏急服此

防風

羌活

獨活

川芎 等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服方在後二六四

白朮防風湯 二五八

治破傷風服表藥過多自汗者

白朮

黃芪

各一兩

防風

二兩

右每服五七錢水煎服臍已和而自汗出者可服此藥若

臟腑秘小便赤而自汗者急以後大芎黃湯下之

羌活湯 二五九

治破傷風在半裏半表間宜和解之急服此

湯稍緩則邪入於裏不可用矣

羌活

麻黃

菊花

川芎

防風

細辛

前胡

蔓荊子

黃芩

石膏

白茯苓

枳殼

甘草

各一錢

薄荷

白芷

各五分

右每服五錢薑水煎日二三服

羌活防風湯

二百六十

治破傷風初傳在表脈浮緊

羌活

防風

藁本

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛

各四錢

各二錢

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎八分熱服量緊慢加減用

之○熱盛加黃連黃芩各二錢○大便秘加大黃二錢○白

汗加防風白朮各五分

大芎黃湯

二六一

治破傷風邪傳於裏舌強口噤項背反張

筋惕搐搦痰涎壅盛宜疎導者急服之

川芎

羌活

黃芩

大黃

各一兩

右每服五七錢水煎服

本玉真散 二六二 一名定風散 ○亦名奪命丹 ○治打撲金

刃破傷風重者牙關緊急腰背反張並蛇犬所傷

天南星

湯泡七次如急用以濕紙裹煨

防風 等分

右為末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張者每服

三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者

速進二服亦可保全若破傷瘡口及風犬咬傷須用漱口水

或熱童便洗淨隨用生南星為末摻之或以水調塗之出水

為妙

養血當歸地黃湯 二六二

治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服

此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸 酒拌 熟地 各二錢 芍藥 川芎

藁本 防風 白芷 北細辛 各一錢

水二鍾煎一鍾食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散 二六四

蜈蚣 一對 鱉膠 三錢

右為末用防風白朮煎湯調下

破傷風灸法 二六五

治跌打損傷或虫獸傷破皮膚以致風邪入肉牙關緊急

背反張或遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸為善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患處去毒血如前法治之

海愈風丹 二六六

治癘病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及

癩風癰疹皮膚搔痒搔破成瘡並皆治之

皂角

一斤判寸許無灰酒浸一宿以水一碗按成汁去渣用砂礮文武火熬熟

苦參

一斤取末四兩

烏稍蛇

白花蛇

土花蛇

各一條去腸陰乾酒浸取淨肉曬乾為末

右為末入前二味和丸桐子大每服六七十丸空心煎通聖

散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出為度

二聖散 二六七

疎風和血去癘毒

皂角刺

燒存性
為末

大黃

半兩

右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服樺皮散于以升

麻湯下瀉青丸晚服二聖散

局方樺皮散 二六八

治肺壅風毒遍身癢疹瘙痒

樺皮

枳殼

去穰各四兩
俱燒存性

荆芥穗

一兩

炙甘草

半兩

杏仁

二兩去皮尖用水一碗煮
令減半取出晾乾為研

右共為末磁器收貯每服一錢食後溫酒調服

升麻湯 二六九

治諸風熱癩肌肉極熱身如蟲行或唇反綻

裂

升麻 三分

人參

茯神

防風

羌活

犀角 鎊

羚羊角

鎊各一錢

肉桂 五分

水二鍾薑三片入竹瀝少許煎八分不拘時服○或用下瀉

青丸

寶鑑醉仙丹 二百七十

治癘風遍身麻木

胡麻子 炒

牛旁子 炒

枸杞子

蔓荊子 炒各一兩

白茯苓

苦參

天花粉

防風 各半兩

右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調

晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿
血病根乃去仍量人輕重虛實以用之病重者須先以再治
散下之候元氣將復方用此藥忌一切鹽醋炙煨厚味止可
食淡粥時菜及諸蛇肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

和子浮萍散 二七一

治風癩疥癩

浮萍 四錢

荆芥

川芎

麻黃 去節

當歸

赤芍藥

甘草 各二錢

水二鐘葱二莖豆豉一撮煎服汗出為度

鑒寶換肌散 二七二

治癩風久不愈或着毛脫落鼻梁崩壞

效如神

白花蛇

黑花蛇

各三兩
酒浸

地龍

去土

當歸

川芎

赤芍藥

天門冬

去心

甘草

何首烏

不犯
鐵

沙參

胡麻子

炒

天麻

紫參

苦參

白疾藜

炒

細辛

白芷

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

菊花

木賊草

不灰木

石菖蒲

走風草

卽草
烏莖

草烏

炮去
皮臍

蒼朮

木鱉

各一
兩

右各另爲末和勻每服四五錢食後溫酒調服加飲數杯尤妙

通天再造散 二七三

治大風實熱內壅宜此攻之

鬱金 半兩

大黃 炮

皂刺 炒各一兩

白丑 頭末半生半炒六錢

右為細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下晚利下黑頭小蠱病輕者只利臭穢之物○忌葷腥厚味半年犯則再作不可枚此藥服三五次即愈

白花蛇丸 二七四

治癘風○丹陽荆上舍得癘疾一僧治而

愈以數百金求方秘不肯傳館客袁生窺知藏衲衣領中因醉之而竊錄焉用者多效

白花蛇 一條去頭尾連骨生用

烏梢蛇 一條去頭尾生用 蟬蛻 去土

防風 去苗

金銀花 去葉

枸杞子

槐花

苦參

生地 各二兩

全蝎 醋浸一日 去鹽味

黃芩

黃連

梔子

黃柏

烏藥

牛膝

川芎

牛蒡子

何首烏

不犯鐵

連翹

天花粉

白茯苓

威靈仙

荆芥穗

細辛

蔓荊子

金毛狗脊

胡麻子

炒各一兩

漏蘆

半斤洗淨去苗取四兩

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空心午前

臨臥各一服

白花蛇膏 二七五

治諸風癩疾遍身生瘡

白花蛇

肉四兩 酒浸

天麻 七錢

荆芥

薄荷葉

各三錢

右為細末用好酒二升蜜四兩以銀磁器熬成膏每溫服一

酒杯日三次前餅壓下於煖處發汗效

防風天麻丸 二七六

治癩風癩病此方應是仙傳一年中常

療數人初服藥有嘔吐者不可疑服而得愈其效如神

防風

去蘆

天麻

升麻

白附子

炮

定風草

細辛

去苗

川芎

人參

去蘆

丹參

去蘆

苦參

玄參

去蘆

紫參

去蘆

蔓荆子

威靈仙

川山甲炒

何首烏

另搗各二兩

蜈蚣 二條

右為細末同何首烏末拌勻外用胡麻一斤淘淨晒乾炒香
熟另研為細末乃入前藥末二兩又拌勻煉蜜和為丸十九
每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥
一百二十日大忌房勞並將息慎口

行藥方 二七七

治癘毒

大黃

白牽牛

檳榔 各一兩

甘草 三兩

輕粉 五錢

右共為細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙五更時調服
病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或
二十日一次以三五遍為度

皂角散 二七八

治大風

皂角刺

燒存性 一錢

大黃

一錢

輕粉

五分

右為末空心酒調服取下惡物○服藥數日齒縫出血甚臭

雷丸散 二七九

取大風虫

雷丸

貫仲

二味先 另研

阿魏

各二 錢

麝香

一分

水銀

硫黃

雄黃

各二錢半用乳鉢入醋 少許研令水銀盡為度

右為細末每服一錢天明溫酒送下

黑虎丹 二百八十

治大風諸癩惡瘡毒蟲內蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩

人中白

桃仁 炮去皮尖 各二兩

老皂刺 燒存性

穿山甲 炒各半兩 輕粉 二錢

麝香 五分

乾蝦蟇 二個去頭足燒存性

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九月首五更米飲連日服

取虫盡即愈○殺勞蟲通用

苦參酒 二八一

治癩風及瘡疹疥癬最多者

苦參 五斤 切片

右以好酒三斗浸三十日量飲一合日服不絕覺痺即瘥

硫黃酒

二八二

殺癘風諸蟲

明硫黃

研極細

右用酒浸空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前飲之

七珍湯

二八三

浴洗大風

青蒿

艾葉

忍冬藤

蒼耳子

桑條

槐條

柳條

三條俱搥碎用

右煎水一桶入炒鹽半斤間日一洗浴密室中以簾席圍之

洗出汗為妙不過十次愈

烏頭湯

二八四

治大風瘡癩

草烏

麻黃根

艾葉

地骨皮

朴硝 各一兩

一右為粗末用水一桶椒一合葱三十根同煎湯入醋一鍾於
密室中自用手巾圍搭四肢候湯可浴令汗透務使面上如
珠徐起或坐或臥片時汗乾着衣避風五日再浴如此三五
次每浴後更服換肌丹等藥

敷癩方 二八五

雄黃

硫黃

白礬

草烏

配床子 燒存性 等分

右為末用香油或濃蜜水調敷患處

直指洗癩方 二八六 浴洗大風瘡

苦參 荆芥 防風 白芷

羌活 獨活 藁本 各一兩 洛陽花 四兩火酒噴過一宿

石作三次煎水洗令出汗

梅花白癩 二八七

一用香油二碗入鷄蛋黃二枚熬將焦去相熬油至一碗許

外用雄黃一錢 白礬二分 花椒五分 上共為細末入

油內再熬熟收貯候用○每用猪毛湯熱洗瘡垢搽油三五

次即愈○愚按此方於蛋焦去粗之後入水銀五錢微火漸
熱之然後再加硃砂細末二錢並雄黃白礬等末攪熬勻熟
收用必妙

臘梨疔 二八八

用杏仁百枚炒為炭入葱白蜂蜜共搗爛先用花椒煎湯洗
淨然後用此藥搽之新舊疔瘡皆可用但勿見風方好

癩瘡二方 二八九

大楓子仁

木鱉仁

蛇床子

各半

水銀

三錢研
散於內

右先以刀刮去瘡痂花椒湯洗淨外用麻油熬成珠調藥敷

之八日即愈

又方 用猪骨髓和輕粉搗爛罨之過夜即愈

頭面黃水肥瘡 二百九十 治小兒頭面患瘡濃汁作痒痂厚

者名曰粘瘡當用此方或止用礬丹二味亦可○若作痒出
水水到即潰者名曰黃水瘡當用後一方

松香

枯礬

官粉

飛丹

右等分爲末麻油調傅或加香烟垢更效於香爐蓋上刮取

用之○一方用菘豆松香等分爲末麻油調傅極效或內服

荆防敗毒散等藥○又方用益元散加枯礬少半以麻油調

一敷大妙大妙

諸癬疥頑瘡 二九一

油核桃

大楓子

樟腦

水銀

右四色研勻擦之此治有蟲者大效○一丸無蟲而忽爾生瘡腫痛或濕爛者但以柏油搽之即可愈

白虎丹 二九二

發則頭面四肢眼目俱腫而惟額上指大兩

耳不腫及不見赤色者方是其證

先將馬桶洗淨用沸湯傾入蓋少頃傾出盆內浴之數次卽

退○再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗卽雁稜菜同搗調

和麻油遍身自上而下擦之○大忌鷄魚生冷炙煨日色小
光燈烟湯氣極須謹慎

又方 用生香附末冷茶調服一二錢即愈

又方 搗綠荳水去渣飲一二碗妙

紫白瘡風歌 二九三

紫瘡白瘡一般風

附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦

若經三度永無踪

又歌

紫瘡白瘡兩般風

水銀輕粉最成功

搗取生薑自然汁

只須一擦便無踪

又方 治紫白癰汗斑等風

雄黃

硫黃

黃丹

蜜陀僧

南星

右為末先用葱擦患處次用薑醃藥末擦之擦後漸黑次日

再探黑散則愈矣

又四神散

雄黃

雌黃

硫黃

明礬

各等分先浴令通身微汗以薑醃擦之再以熱湯淋洗當日

色淡五日除根

汗斑四方 二九四

大黃 二錢

枯礬

椒紅 各五分

右用猪脂沙糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數日即愈○或止用硫黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數

次即愈

又方

蜜陀僧

硫黃

各三錢

輕粉

二錢

雄黃

一錢

人言

五分

右為末薑汁調用茄蒂醮擦三日內不沐妙

又方

雌黃

雄黃

各一錢

硫黃

五分

麝

半分

浴後薑醮擦二三日勿洗

又方

硫黃一兩用醋煮半日海驪蛸三個共為末浴後以生薑

醮擦患處須避風少時數度即愈

漆瘡方

二九五

用香油調鐵銹塗之○胃氣實者內服黃連解毒湯○胃氣

弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六
君加砂仁藿香酒炒芍藥之類○又解漆毒法見因陣二三

五

手足甲疽 二九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上脚用綠礬
置鐵板上煨沸色赤如熔金色者為真沸定取起研末以鹽

湯洗搽

坐板瘡 二九七

腫痛多膿者

蜜陀僧

生礬

大黃

等分爲極細末敷之

神效膏

二九八

治賺瘡脚瘡

先看瘡形大小用綿紙裁成四方塊十二張四角用小擦釘
住聽用○外以好香油二兩用銅杓以文武火熬之先下花
椒四十九粒煎黑取起○次下槐枝長一寸者四十九節煎
黑又取起○再次下黃占一兩輕粉二分枯礬一分溶清却
入前紙浸油內令透不可令焦取起聽用凡貼瘡時先將槐
枝葱椒煎湯洗瘡令透拭乾乃此膏紙貼上外面再以油單
紙蓋護乃用軟帛縛定一日取下揭去一層復用湯藥洗淨

又貼之盡十二張無有不愈者

隔紙膏 二九九

治癩瘡神效

黃芪末 五錢

輕粉

乳香

沒藥 各二錢

銀硃 一錢

血竭 五分

銅綠 二分

右為細末真香油調成膏攤油紙上再用油單紙一層以鐵刺孔數十掩膏藥上貼之一日一易其膏

二味隔紙膏 三百

治癩瘡濕毒瘡

石膏 煨

枯礬 等分

一右為末用桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荆防敗毒散如

數劑不愈再服黃芪人參湯

爛腿瘡久不愈方 三百一

用米糖即膠飴也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒荆芥防
風等藥煎湯洗瘡淨乃將膠飴薄攤瘡上外以軟竹箬蓋定
用絹縛之數日即愈神效

凍瘡方 三百二

瀝青末

黃蠟 各一兩

麻油 一兩

右三味溶化搽患處

湯火六方 三百三

凡初被湯火所傷速用冷竈柴草灰一二升入鹽少許以涼
水調如稀糊嘗味微鹹爲度用以厚攤傷處覺熱則易之連
易數次則火毒皆拔於灰中必腫痛隨散結痂而愈誠神妙
方也

又方 治潰爛腫痛者 用生桐油調人中白敷之卽愈亦
妙方也

又方 用皂礬研細和以冷水澆傷處其疼立止其腫卽消
又方 用大黃芒硝等分爲末鷄子清調貼之神效

又方 用石膏末香油調敷卽愈

一 又赤石脂散 治湯火傷肉爛赤痛

赤石脂 寒水石 大黃 等分

一 右為末新汲水調塗

湯火至聖膏 三百四

治湯火傷瘡用雞子黃置銀石器內熬油調胡粉傅之○錦

一 衣楊永興厨下夜間回祿凡睡此房已死將死者灌以生薑

葡萄汁良久悉愈凡遇此患者以此治之其應如響

湯火止痛散 三百五 止痛生肌

大黃末 微 當歸末 分 等

右用麻油調搽或乾摻亦可

小兒丹毒 三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用前磁鉢
砥法使毒血遇刺皆出更以神功散傅之內服荆防敗毒散
或五福化毒丹若使毒氣入腹則不治或愈而復發皆因母
食辛辣炙博以致內熱宜於母藥中加漏蘆煎服或令自服
亦愈

小兒鵝口 三百七

凡小兒口內白屑滿口者為鵝口瘡則不能飲乳用髮或軟

絹纏指離并水拭舌上使淨如骨不能脫濃煮粟米湯以綿
纏筋頭拭洗却用飛過黃丹搽之

加味太乙膏 三百八 一切瘡瘍並宜貼之先用隔蒜灸更服

活命飲以收全功

當歸 生地黄 芍藥 玄參

大黃 各二兩 加甘草 四兩

用麻油二斤煎丹收

景岳會通膏 三百九 九諸癰毒疔塊風氣骨節疼痛無所不

治

大黃

木鱉仁

當歸

川芎

芍藥

生地

麻黃

細辛

白芷

防風

荆芥

蒼朮

羌活

川烏

甘草

烏藥

南星

半夏

香附

官桂

蒼耳

骨碎補

草烏

艾葉

皂角

枳殼

三稜

蓬朮

蘿蔔子

水紅花

巴豆

五倍

獨活

桃仁

蘇木

紅花

外科

續斷

連翹

梔子

苦參

槐花

皂刺

乾薑

草麻子

透骨草

晒乾

穿山甲

全蝎

僵蚕

蜂房

各一兩

蛇退

一大條

蜈蚣

十四根

蝦蟆

三隻

血餘

一團

獨蒜

四頭

右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘草麻木鱉桃仁

巴豆蝦蟆獨蒜待半枯然後入餘藥煎黑去滓丹收後下細

藥十味

阿魏

二兩

乳香

制

沒藥

製各一兩

木香

丁香

雄黃

硃砂

血竭

兒茶

各五錢

麝香

不拘一錢

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡熬成

油一斤下飛淨好紅丹八兩若欲微嫩則止下七兩五錢

神異膏

三百十

治癰疽瘡毒及收口甚效此瘡瘍中第一方

也

麻油

二斤

黃丹

十二兩

黃芪

杏仁

中玄參

各一兩

蛇蛻

半兩

男髮

如雞子一團

蜂房

子多者佳一兩

右先以黃芪杏仁玄參入油煎至將黑乃入蛇蛻蜂房亂髮

再煎至黑去粗徐徐下丹慢火煎收黃丹不必拘數但以得
中為度凡膏藥用久必至老硬煎時預留嫩膏少許如硬量
和之

清涼膏 三一

治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸 二兩

白芷

白芨

木鱉子

黃柏

白欽

乳香

白膠香

各五錢

黃丹 五兩
淨

麻油 十二兩
淨

右用油煎前六味以槐柳枝順攪油熟丹收然後下乳香等

二味

阿魏膏 三三二

治一切疔塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

川山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

紅花 各半兩

木鱉

十枚去殼

亂髮

一團

槐柳桃枝

各半兩

右用麻油二斤四兩煎藥黑去粗入髮再煎髮化仍去粗入

上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥即成膏矣

阿魏

芒硝

蘇合油

乳香

沒藥

各五錢

麝香

三錢

右凡貼膏藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨
斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加
蘆薈末同熨之

硃砂膏 三一三

治一切頑瘡破瘡杖瘡癰疽發背破傷者最

妙最佳

麻油 一斤

飛母 六兩

水銀 一兩

硃砂 佳者一兩半飛

好黃蠟 四兩

先下油熬數沸下雞子一枚敲開連殼投之熬焦撈去子退

火俟油定下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成

膏後下黃占再攪候大温下極細好硃砂一兩五錢攪勻磁
罐收貯

神效當歸膏 三一四

治一切發背瘡瘍湯火疼痛等證去腐

肉生新肉其效如神凡洗拭換膏必須預備卽貼之新肉畏
風故也如用白蠟尤好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉
相宜

當歸

生地黃

黃蠟

各二兩白麻油 六兩
蠟當減半

右先將當歸地黃各一兩入油煎黑去粗又將二味各入一
兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪勻卽成膏矣用途

患處以紙蓋之如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速

攻堅敗毒膏

三一五

亦名乾坤一炷膏○專攻痞塊諸瘰癧

痔漏

當歸

熟地

生地

白芍藥

赤芍藥

南星

半夏

三稜

蓬朮

木鱉

兩頭尖

川山甲

巴豆仁

肉桂

五靈脂

桃仁

續斷

玄參

玄胡索

草麻子仁

白芷

羌活

獨活

大黃

紅花

川烏

草烏

蘇木

川芎

防風

杏仁

各一兩

右用麻油四十兩浸諸藥三日桑柴火煎成丹收後下細蕪

乳香製

沒藥製各一兩

真阿魏

一兩半

麝香三錢

右方於細藥中加蘆薈木香各一兩蟬酥三錢即名消瘡大

成膏

消瘡膏三一大

三稜

蓬朮

川山甲

木鱉仁

杏仁

水紅花子

蘿蔔子

透骨草

晒乾

大黃 各一兩

獨頭蒜 四個

右用香油一斤入前藥十味煎油成以飛丹收之後下細藥

真阿魏

乳香

沒藥 各一兩

麝香 三錢

右先下乳沒阿魏三味後下麝香攪勻待冷傾水中浸數日

用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八九日

一換或見大便去膿血勿以為異亦有不去膿血而自愈者

若治瀉痢可貼臍腹忌房事生冷○凡貼癰積痞塊先用蕎

麥麪和作一團圍住患處四邊其塊上放皮硝二三兩蓋厚

紙以熨斗熨令熱氣內透然後去硝用膏藥貼之○右原方

用白花菜同透骨草另煎膏二兩攪入膏內收用但白花菜
惟西北方間有之求覓不易故余用獨蒜蘿蔔子代之其功
亦不減也

琥珀膏 三一七

治頸項癭瘰及腋下初結小核漸加連珠不

消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥或成漏證

琥珀

白芷

防風

當歸

木鱉子

木通

各

丁香

桂心

硃砂

木香

松香

各半

麻油

二斤

右先將琥珀等六味爲末其餘藥入油煎黑濾去粗徐入黃

丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

貼瘡琥珀膏

三一八

貼癥積痞塊

大黃朴硝各一面為末以大蒜同搗膏貼之

水紅花膏

三一九

貼痞塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量

痞大小用紙攤貼以無形為度仍將膏用酒調服忌暈腥油

膩不飲酒者白湯下

火龍膏

三百二十

治風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕痰流注

經絡壅痛不能行步並治歷節風鶴膝屈其效如神

生薑 八兩 取汁

乳香 為末

沒藥 為末 各五錢

麝香 一錢

真牛皮廣膠 二兩

右先將薑汁並膠融化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香

即成膏矣難貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

趙府膏 三三 專貼疼痛腫毒

乾蝦蟆 三個

全蝎

疆蚕 各一兩

蜈蚣 四條

斑蝥 四十個

商陸根 一兩 六錢

花椒 一錢

童子髮 六分

雞內金 二個

槐枝 三寸長者 四十根

細藥

外科

兒茶

乳香

沒藥

血竭

龍骨

黃占

白占

各五錢

麝香

一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

蜜陀膏

三二二

此膏治腫濕諸瘡瘋痛等證神效凡治疼痛

先以葱薑擦患處然後貼之

先用密陀僧一二斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便

氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛臍乾研極細如麩候

用

桐油不拘幾斤熬至將黑為度每熟油一斤用陀僧六兩

收之於將成膏之頃取起離火候稍涼諒膏多少入冷水點
碗徐攪之恐其泛出俟少定即逼去其水再上火熬化復入
水數碗攪逼如前或三次更妙然後熬淨其水每油一斤
入官粉二兩熬收其色方黑凡熬此者銅鍋須大方可用

八仙紅玉膏 三三三 治諸瘡

龍骨 赤石脂 兒茶 血竭

沒藥 乳香 各一錢 輕粉 五分或一錢 水片 二分

右用麻油二兩入當歸五錢煎枯去滓入龍石茶竭四味煎
煎一二沸次入乳沒畧煎勻後入黃占五錢溶化冷定入

冰攤貼

碧油膏

三二四

止痛排膿灸後宜用之

桃枝

柳枝

桑枝

槐枝

各二兩

乳香

另研

血竭

各五錢

黃丹

四兩淨

右用麻油十兩煎膏成後下乳香血竭

長肉膏

三二五

人參

黃芪

當歸

夜合樹皮

玄參

各一兩

血餘

三兩

老鼠

一個

細藥

血竭

龍骨

赤石脂

白臘 各五錢

右用麻油一斤煎飛丹收

保養元氣膏 三二六

此膏助元陽補精髓通血脈鎮玉池養

竈存精百戰百勝待婦人經淨之時去膏而泄則可成孕並

治腰膝疼痛五勞七傷諸虛百損半身不遂膀胱疝氣帶濁

淫淋陰痿不舉無不效者此邵真人進

御方也

麻油一斤四兩入甘草二兩先熬六七滾然後下諸藥

生地黄

熟地黄

俱酒洗

麥門冬

肉蓯蓉

酒洗

遠志肉

蛇床子 酒浸

兔絲子 酒浸

牛膝 酒洗

鹿茸

川續斷

虎骨

紫稍花

木鱉仁

谷精草

大附子

肉桂 各五錢

右熬成以煮過松香四兩飛丹半斤收之次下細藥

次下龍骨

倭硫黃

赤石脂 各二錢

又次下乳香

沉香

丁香

木香 各一錢

又次下陽起石

三錢

麝香

五分

蟬酥

鴉片

各一錢

天次下黃占五兩

右前成入井中浸三四日每用膏七八

錢紅絹攤貼臍上或臆眼間每貼五六十日再換

煮松香法 三二七 凡用松香收膏藥者必用水多煮一二遍

去其澁燥之性方可貼瘡不痛○若用貼癥痞血塊則當加藥如後法煮過用之方妙

麻大都松香三斤用皮硝一碗水紅花四兩

大黃當歸生地各二兩

蓬米各一兩

右藥七味用水一桶先熬汁去澁淨用煮松香徐徐添入以汁完為度收用之極佳○一收油之法凡煮過松香一斤入

熬熟藥油五兩卽成膏矣

以下通用方

四君子湯

三二八

方在補導一

治瘡瘍脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以
補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食
少思或食而難化或欲作嘔或大傷不實若脾胃氣虛瘡口
出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之
症宜於此湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用

沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起

六君子湯 三二九

方在補陣五

治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰飲宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

加味四君子湯 三百三十

方在補陣二

治痔漏下血面色痿黃凡諸氣虛脾虛不能攝血等證

四物湯 三三一

方在補陣八

治瘡瘍血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致補熱內熱煩燥不安皆宜服之蓋血生於脾脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾