

精校

張氏醫通

本經逢源卷四

出版 上海錦章書局

張氏醫通

全書十六冊
費另計

原編者：（清）張石頤

出版者

辟谷書局

上海(12)太倉路135號

印刷者

瑞文橡皮印刷廠

上海芝罘路30弄6號

經售者

上海圖書發行公司

上海山東中路128號

1955年5月重版
印數 0001—1500

1955年5月第一次印刷
定價一元零一角三分

本經逢原卷四

蟲部

長洲石頑張 路路玉父纂述

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。味酸者不堪入藥。不可與王孫葛同食。令人下利。凡煉蜜灰火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠為度。煉成每斤入陳酒四兩再熬沸。和藥為丸。則藥力易化。氣諸驚癇症。安五藏。補不足。益氣補中。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志。輕身不老。發明。蜂舉無毒之花醞釀而成。生則性涼清熱。故能治心腹之邪氣。熟則性溫補中。安五藏。諸不足。甘而和平。故能解毒。柔而潤澤。故能潤燥。緩以去急。故能主心腹肌肉瘡瘍之痛。仲景治陽明結燥。大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥而不傷腸胃也。凡滋補藥俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼潤脾胃不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金丸用米飲。牛黃丸用燕餅。黑錫丹用酒糊。慈硃丸用神鞠虎潛丸用酒。香連丸用醋。茸珠丹用紅棗。滾痰丸用水泛。各有所宜。令人修製丸劑。聚用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淩平無毒。本經主下痢膿血。補中續絕。傷金瘡。益氣不饑耐老。發明。蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見於本經之義也。淡為五味之本。胃為五藏之源。故能補中續傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動。下血不絕。故死。以雞子大一枚。煎三五沸。投美酒半升服立瘥。又能解毒。故蠟礬丸用之為君。華陀治下痢食人即吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼。先煎蠟苦酒雞子四味令勻。乃納連末髮灰。熬至可丸乃止。二日服盡神効。

露蜂房 苦鹹平有毒。本經主驚癇瘧疾。寒熱邪氣。蠭疾。鬼精蠭毒。腸痔。火熬之良。發明。露蜂房陽明藥也。本經治驚癇瘧疾。寒熱邪氣。蠭毒。腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛。及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蠣蠅一名果蠅。一腰蜂也。 幸平小毒。本經治久聾。敷頭毒氣出刺出汗。發明。詩言蠅蛉有子。蜾蠃負之。言細腰之蜂。

取青蟲之子。教祝變化成子也。大明治嘔逆。生研能普竹木利。卽本經出刺出汗。取其毒之銳。以出其刺也。蟲白蠍。甘溫無毒。發明。蠍樹屬金性。專收斂。堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食其葉而成。與桑螵蛸無異。為外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中。神效。令人治下疳服之。未成卽消。已成卽斂。以半兩入鯉魚腹中煮食。治腸紅神效。

紫鉢草卽紫草 甘鹹平小毒。發明。紫鉢乃驥驕竭樹上蟲壞聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出真蠍為上。波斯次之。古方治五藏邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。令人專治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草草呼之。實非紫草同類也。

五倍子卽川文蛤 苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過名百藥煎。每五倍末一斤。入桔梗甘草真茶各一兩為末。入喙槽二兩。拌和置糠中窖。待起如發麪狀即成矣。作餅晒乾用。發明。川文蛤善收頑痰。解熱毒。黃昏效嗽。乃火氣浮於肺中。不宜用涼藥。且五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽。及肺火實盛者禁用。以其專收而不能散也。故痰飲內盛者誤用。則聚斂於中。往往令人脹閉而死。為未收脫肛。及子腸墜下。百藥煎性浮。味帶餘甘。治上焦痰嗽。熱渴諸病。含噙尤宜。煅過主下血。烏鬚髮。消腫毒。斂金瘡。治喉痹口瘡。摻之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。本經主傷中疝瘕。陰痿益精生子。女子月閉腰痛。通五淋利小便水道。發明。桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收滯。故男子虛損。腎衰陽痿。夢中失精。遺溺白濁方多用之。本經又言通五淋。利小便水道。蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散治小便頻數如稠米泔。心神恍惚。瘦悴食少得之。女勞者。方用桑螵蛸遠志。龍骨菖蒲。人參茯苓。當歸龜甲。各一兩。卧時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者濃煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火人誤用。反助虛陽。多致溲赤茎痛。強中失精。不可不知。生研爛塗之出箭鏃。

雀癰一名點癰。俗名蟄毛 甘平小毒。本經主寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。發明。雀癰站蟄殼也。其蟲夏生葉上。背上又有刺蟄。人故名蟄毛。秋深葉盡欲老。口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹如蠶。至夏羽化而出。其形有似蜻蜓而翅黑。稍潤。故子葉上而生站蟄謂雀癰者。以雀好食其蛹也。入藥惟取石榴樹上者。連蛹炙焙用之。蘇頌曰。今醫家治小兒驚癇。用雀癰子連蟲同白僵蠶全殼各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服大效。藏器治小兒撮口不得

飲乳但先勞曰傍見血以雀甕打破取汁塗之

原蠶蛾 蛾溫小毒。取未交雄蛾，紙封焙乾，拌椒密藏，則不蛀。本經主心腹邪氣，起陰痿，益精氣，強志生子。卽別錄之益精氣，強陰道，交精不倦，亦能止精。若合符節，好顏色，令人面色好之互醉，補中輕身者，以其善補真陽。陽主輕捷故也。詳參經旨，洵為原蠶主治無疑。奈何集本草者，悍列樗雞之下，敢力正之。

白殼蠶 蛤辛平無毒。色白者良。入藥惟取直者為雄，去黑口及絲炒用。本經主小兒驚癇夜啼。去二蟲，減黑點。令人面色好。男子陰瘡病。發明 壞蠶蠶之病風者也。功專祛風化痰，得乎桑之力也。本經治驚癇，取其散風痰之力也。去三蟲，減黑點。男子陰瘡，取其滌除浸淫之濕。三蟲亦濕熱之蟲也。凡咽喉腫痛及喉痹，用此下咽立愈。其治風痰，結核頭風，皮膚風疹，丹毒作癢，疳蝕，金瘡，疔腫，風疾，皆取散結化痰之義。

蠶繭 甘溫無毒。發明 蠶繭治癰腫無頭燒灰酒服，次日卽破，煮湯治消渴。織絲湯及絲綿煮汁，功用相同。
蠶退即馬明退 甘平無毒。卽老蠶眠起所蛻皮。入藥微炒用。今以出過蠶之紙為馬明退非也。發明 蠶非桑葉不生。得東方水氣之全，故能治風病血病，而蛻治目中翳障。較之蟬蛻更捷，惜乎一時難覓。

蠶沙 甘辛溫無毒。微炒用。發明 蠶沙療風濕之專藥。有人病風痺，用此焙熟，絹包熨之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙二三宿，研末，塗患處，過宿卽愈。蠶沙置酒罇上，泥好，色清味美。然惟晚者為良。早蠶者不堪入藥。以飼時火烘，故有毒也。

九香蟲 蛤溫無毒。發明 九香蟲產貴州，治膈胱滯氣，脾胃虧損，壯元陽攝生方。烏龍丸用之。

雪蠶即雪蠶 甘寒無毒。發明 雪蛆生峨眉山北，積雪厯年不消。其中生此，大如瓠，味極甘美。故能解內熱渴疾。方物中之最益人者也。

靖蛉靖婷 赤者名赤卒。微寒無毒。發明 靖婷生水中，而能緩水藏，強陰蓄精。而赤者性猶壯，熱助陽藥用之。

樗雞卿子 味平有毒。不可近目。去翅足同糯米炒去米用。發明 櫛雞厥陰經藥也。能活血散血。治目翳。微雲膏中與芫青斑蝥同用。亦是活血散結之義。能通血閉。行瘀血。主癰癰。辟邪氣。療創大傷。治偏頭風。用紅娘子青娘子各七枚。去翅足炒為末。同葱薑搗塗痛處。周時起泡去之。孫一奎治血蠱。用抵當丸。以樗雞易水蛭。三服血下脹消。形神自復。與薛新甫治水腫。椒仁丸中芫青不殊。一走血而下瘀。一走氣而破水。皆峻劑也。綱目以本經原蠶蛾主治誤列於此。今正之。

芫青即青娘子 辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明 芫青居芫花上而色青。故能泄毒攻積。破血墮胎。功同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒故也。其治瘋犬傷。消目翳。刮偏頭風。塞耳聾。皆取其毒銳也。又治月閉水腫。椒仁丸方用之。

斑蝥 辛鹹溫有毒。去翅足同糯米炒熟。或醋煮用之。本經主寒熱鬼疰蟲瘡。疽蝕死肌破石癰。發明 斑蝥人獲得時。尾後惡氣射出。臭不可聞。其性專走下竅。利小便。故本經言破石癰。能攻實結。而不能治虛祕。不過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必澀痛。當以木通滑石導之。其性猛毒。力能墮胎。虛者禁用。瘋犬傷。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足炙黃。同蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處糊去惡血。小便洗淨。髮灰數之。服後小便當有瘀毒泄出。三四日後當有肉狗形。三四十枚為盡。如數少再服七枚。若早服雖無狗形。永不發也。

葛上亭長 辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明 亭長大毒。善通淋。及婦人經脈不通。以五枚研末服三分。空心甘草湯下。須臾臍腹急痛。以黑豆煎湯服之。卽通。此蟲五六月為亭長。頭赤身黑。七月斑蝥。九月為地膽。隨時變化其毒可知。

地膽 辛溫有毒。同糯米炒去米用。本經主鬼疰寒熱。鼠瘻惡瘡死肌。破癰瘕墮胎。發明 地膽有毒。而能攻毒。性專破結墮胎。又能除鼻中瘻肉。下石淋。功同斑蝥。力能上涌下泄。

蜘蛛 微寒有毒。其種類不一。惟用懸網者入藥。發明 仲景治陰狐疝。氣偏有大小。時時上下者。蜘蛛散主之。以其入肝。性善循絲上下。故取以治暎丸上下之病。別錄治大人小兒瘻瘍。又治乾霍亂。服之能令人利。其邪得以

下泄也。搗汁塗蛇傷效。

壁錢 無毒。發明 生壁間似蜘蛛而形扁。其膜色白如錢。故名治鼻衄及金瘡出血不止。取蟲汁注鼻中。及點瘡上。同人中白等分燒研治瘡。又治喉癰。

蠍 辛平有毒。被螫者以木梔合之即愈。去毒及足用亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹炒乾用。發明 蠍產於東方。色青屬水。治厥陰諸風掉眩。及小兒胎驚發搐。最為要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語言蹇濁。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無不用之。蠍尾膏治胎驚發搐。用蠍梢二十一枚。麝香少許。屢效。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香柴胡湯。方用羌活柴胡。當歸生地。丁香全蠍。益取以散血分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者勿誤用。泥蛭頭圓身濶者。服之令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水蛭曝乾。猪油敷裏。令研極細。倘炙不透。雖為末經年。得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內不活者方可用之。本經逐惡血瘀血月閉。破血瘕積聚無子。利水道。發明 鹹走血。苦勝血。水蛭之鹹苦。以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血堅積。本經言無子。是言因血瘕積聚而無子也。別錄云墮胎。性劣可知。昔人飲水誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血。同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。

蛆 苦寒無毒。漂淨炙黃搗細末。同糖霜食之。發明 蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置蟬內。取糞蛆不拘多少。河水清養三五日。以食盡蝦蟆為度。用麻布繫住蟬口。倒懸活水中。令汚穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上焙乾。治小兒疳積。腹大腳弱。腎膜遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

狗蠅 鹹溫無毒。發明 蠅食狗血。性熱而鋩。力能拔毒外出。故治痘瘡倒臘色黑。脣口冰冷之證。以數枚搗細。醋酒少許調服。聞人規方也。

蟾螬 鹹微溫有毒。本經主惡血。血瘀癥氣。破折血在脇下。堅滿通月閉。目中浮膚。青醫白膜。發明 蟾螬穴土而居。與蚯蚓不異。故本經所治皆瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃䗪蟲丸方用之。取其土脇下堅滿也許學士

治筋急。養血地黃丸中用之。亦取其治血瘻也。取汁滴目去翳障。散血止痛。千金研末數小兜臍瘻。加豬脂調治小兒脣緊。經驗方治瘻傷腫痛。肘後擣塗竹木刺蘇頌擣汁點喉瘻。得下即開。藏器塗遊風丹疹。又治麥芒入眼。以蠅蠿在目上隔布摩之。王耆布上即出。

桑蠹蟲 甘溫小毒。色白帶黃。而腹中無穢。按之無水者為真。若頭硬而腹中不淨者。即雜樹內蠹也。如一時難覓真者。則以蟻毛殼煅灰存性代之。 **發明** 桑蠹蟲食木。柔能勝堅。故治痘瘡毒盛。白陷不能起發者。用以絞汁和白酒釀服之。即起。但皮薄脚散。及世鴻畏食者。服之每致駁裂而成不救。不可不慎。千金治崩中漏下赤白。桑蠹燒灰溫酒服。亦治胎漏下血效。

桃蠹蟲 辛溫無毒。本經殺鬼邪惡不祥。 **發明** 桃實中蟲食之令人美顏色。與桃蠹不異。其蟲屎能辟溫疫。今不相染。為末水服方寸匕。

蚱蟬 鹹甘寒無毒。本經主小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。 **發明** 蟬主產難下胎衣。取其能蛻之義。聖惠治小兒發癩。有蚱蟬湯散九等方。今人只知用蛻而不知用蟬也。

蟬蛻 鹹甘寒無毒。去翅足用。 **發明** 蟬蛻去醫膜。取其蛻義也。治皮膚瘡瘍。風熱破傷風者。炒研一錢。酒服神效。痘後目翳。羊肝湯服二錢。則翳漸退。更主痘瘡發癩。若氣虛發癩。又當禁服。小兒夜啼。取蟬蛻四十九枚。去前截用後截為末分四服。鈎藤湯服之。即止。驚啼加硃砂二字。若用上截。即復啼也。小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。並用蟬蛻。取其利竅通聲。去風諭疾之義。較蛻更捷。

蟻 寒有毒。去足火炙用。勿置水中。令人吐。本經主小兒驚癇瘻癰。腹脹寒熱。大人癲疾狂瘧。 **發明** 蟻榔手足陽明足厥陰藥也。本經等治。總不離三經之證。其治暴嘔吐。食用二枚。入生薑內煨。以陳橘皮一錢。同巴豆炒過。去巴豆。將蟻榔陳皮為末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次。即愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蟻榔搗塗。痛定心癢。忍之待極癢不可忍。乃撼動拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。摻上托入。擣丸塞下部。引痔蟲出。盡永瘥。其蟻榔心貼疔瘡拔疔。貼半日許。血盡根出。則愈。然蟻榔最畏羊肉。食之即發。

天牛 甘溫小毒。發明 天牛乃木中蠹蟲所化。楊樹中最。桑樹中獨勝。長臂如角。故有天牛之名。利齒善齒。

是有嗜桑之號。其性最銳。取治疗腫惡瘡。出箭鏃竹本刺最捷。與蠻蛇不殊。一噉木而飛一穴土而出。其頭脫之性則一。如無嗜桑。他樹上者亦可。焙乾為末。蜜調傅之。

蠻蛇 鹹寒小毒。去翅足炒用。本經主產難。出肉中刺。去潰腫下哽噎。解毒除惡瘡。發明 蠻蛇性善穴上。故能治水腫。自腰以前甚滯。能止大小便。自腰以後甚利。能通大小便。取以治水最効。但其性急虛人戒之。本經治難產者。取其下半者湯服之。則下也。出肉刺潰癰腫惡瘡者。生搗塗之。肉刺即出。瘡腫即潰也。下哽噎者。炙末吹之。哽噎即下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉。以蠻蛇杵汁滴上三五度。自出。延年方治胎衣不下。以蠻蛇一枚。水煮數沸。灌下。入喉即出。小兒臍風。蠻蛇甘草等分為末。敷之効。

螢火即熠燿本經名夜光 辛溫無毒。本經明日。發明 螢火本屬草所化得大火之餘氣而成。入胞絡三焦。能辟邪明目。取其照幽夜明之義。務成子螢火丸。辟五兵白刃。虎狼蛇虺之毒。惡鬼疫癟之邪。麗安常亦極言其效。惜乎世鮮備用。

衣魚卽蠹 鹹溫無毒。卽衣帛書畫中之蠹。碎之如銀有粉者是。本經主婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強背起摩之。發明 衣魚主中風項強摩之。卽安驚癇天吊。口喎淋閉。服之卽愈。皆手足太陽經病。乃神農本經之藥。古方盛用。今人罕知。合鷹屎白僵蠶。敷瘡癰滅。

鼠婦卽濕生蟲 酸鹹無毒。發明 金匱治久瘡。鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱。去瘀積也。古方治驚癇血病多用之。厥陰血分藥也。千金治產婦道死。以鼠婦七枚。熬研溫酒服之。痘瘡倒醫。為末酒服一字。卽起。又解射干蜘蛛毒。

麁蟲本經名地蠶 鹹寒有毒。或去足炒用。或酒醉死去足搗汁用。本經主心腹寒熱酒洒。血積癰癥。破堅下血閉。發明 麁蟲伏土而善攻隙穴。傷之不死。與陵鯉不殊。故能和傷損散陽明積血。本經治心腹寒熱酒洒。亦是積血所致。金匱大黃麁蟲丸。用水蛭麁蟲。取其破堅。下積血耳。無實結者勿用。跌撲重傷。焙乾為末。酒服二錢。接骨神效。

蟲蟲卽蜚 苦微寒有毒。卽噉牛血蠅。去翅足炒用。本經逐瘀血。破血積。堅痞癰瘍。寒熱。通利血脉九竅。發明

蟲食血而治血。因其性而為用。肝經血分藥也。本經治癰疽寒熱。是因癰疽而發寒熱。與蟻蟎治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯。九水蛭蟲蠶。雖當並用。二物之純陰懸殊。其治經閉。用四物加蜚蟲作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血。血結不行者。以苦攻之。其性雖緩。亦能墮胎。

蟾蜍 皮平涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾泥固蝦存性用。其目赤嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者曰鼴。與此不同。發明 蟾蜍土之精也。習土道者賴之。其形大而背多扉瓦者是。土性厚重。其行極遲。土生萬物。亦能化萬物之毒。故取以殺疳積。治鼠瘻。陰蝕疽瘻。燒灰傅惡瘻並效。弘景治溫病發斑困篤。用以去腸。生搗一二枚。啜其汁。無不瘥者。治廩大傷。先於頂心拔去血髮三四莖。即以蟾蜍一二枚。搗汁生食。小便內見沫。其毒即解。又破傷風用二枚。生切如泥。入椒一兩。同酒炒熟入酒二盞。乘熱飲之。少頃通身汗出而愈。發背疔腫初起。以活蟾一隻。鑿定放腫上半日。蟾必昏憒。即放水中以救其命。再換一隻如前。蟾必踉蹌。再易一枚。其蟾如舊。則毒散矣。其金蟾丸。治腫脹腹滿。并治小兒疳勞。腹大脰細。方用大蟾一隻。以砂仁入腹令滿。鹽泥固酒。蝦存性黑糖調服一二錢。心下盡青黃積糞即愈。未盡過二三日再服。以腹減熱除為度。若糞不能灌注。而瀉淋不前者。此元氣告匱。不可救也。

蟾酥 辛溫有毒。發明 蟾酥辛溫。其性最烈。凡用不過一分。齒縫出血。及牙疼。以紙紝少許。擦之即止。蟾酥丸。治發背疔腫。一切惡瘡。拔取疔瘡最捷。入外科有奪命之功。然輕用能爛人肌肉。

蝦蟆 甘寒小毒。本經主邪氣。破癥堅壅。腫陰瘡。服之不患熱病。發明 蟾蜍蝦蟆同類異種。故其功用亦不甚相遠。服之不患熱病。即弘景治溫病發斑困篤之意。時珍言古方多用蝦蟆。蓋古人通稱蟾為蝦蟆。而蝦蟆不復入藥矣。

蠹俗作蟲 甘寒無毒。發明 時珍曰。蠹產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係濕生之物。其骨性復熱。食之小便苦。淋妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙多食。令人尿閉。臍下酸痛。擂車前水飲之可解。戴厚禮云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青蛙一二枚。去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟆瘡。以金線蠹搗汁。水調空腹頓飲。極效。

蝌蚪 發明 蝌蚪生水中。蝦蟆子也有尾如魚。漸大則脚生尾脫。因其所稟之毒未化。故藏器取治火颶熱毒。及

腫瘍瘡並搗碎傅之或化水塗之或配入敷藥中並效。又得效方多用蚯蚓乾待桑椹熟等分置瓶中密封懸屋東或搗汁浸埋東壁下百日化泥取塗鬚髮永黑如漆。

蜈蚣 辛溫有毒火炙去足用。本經主鬼疰蟲毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精除溫瘡去三蟲。發明 蓋行而疾者惟風與蛇蜈蚣能制蛇故亦能截風厥陰經藥也。嶺南有蛇瘡頭大腫痛連喉用赤足蜈蚣二節研細水下卽愈。又破傷風欲死研末擦牙邊去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒悉能解之。萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條去足炙黃入硃砂輕粉乳汁為丸服少許即安。雙金散治小兒天吊日久不下口噤反張。蜈蚣一條酥炙去頭足入麝香為末以少許吹鼻至眼合乃止。若眼未下再吹之。小兒撮口刮破舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃為末敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油搽之。直指方治療瘡疾痛。蜈蚣炙末入片腦少許唾調敷之。急救方治溫瘡洒酒時驚涼膈散加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦人趾瘡甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條去頭足焙研入麝香少許去硬蓋攤烏金紙留孔貼上一夕卽效。如有惡肉外以南星末醋和傅四圍其祛毒之功無出其右。

蚯蚓 龍即地 鹹寒小毒白頭者良解熱毒入鹽化水用通經絡火乾用。本經主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蟲毒殺長蟲。發明 蚯蚓在物應土德在星為軫水體雖卑伏而性善穴竈專殺蛇蟲三蟲伏尸諸毒解濕熱療黃疽利小便通經絡故活絡丸以之為君。地龍湯治痘瘡脾胃虛熱嬌紅五六日漸變乾紫伏陷者同茅齊搗和酒釀服之卽起若乾紫色黯皮堅為肝脾血熱卽宜犀角紫草黃連清解非地龍所宜。溫病大熱狂妄天行大熱和人尿搗絞服之熱毒從小便而去也。小便暴秘不通亦宜用之。入葱化為水療暴聾。

蝎牛 鹹寒小毒 發明 蝎蠅蝎牛生下濕地陰雨卽出至陰類也治諸腫毒痔漏制蜈蚣蠍薑諸毒研爛塗之取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣桑上者謂之緣桑蠅治大腸脫肛和豬脂塗之立縮此蠅諸木上皆有獨取桑上者正如桑螵蛸之義。

龍蛇部

龍骨 甘平無毒粘舌色白者良煅赤水飛用飛之不細粘著腸胃令人寒熱。本經主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癰瘕堅結小兒熱氣驚癇。發明 潛以可去脫龍骨入肝斂魂收斂浮越之氣。本經主心腹

鬼疰精魅諸疾。以其神靈能辟惡氣也。其治欬逆泄利膿血。女子漏下。取濇以固上下氣血也。其性雖濇。而能入肝破結。癥瘕堅結。皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇。亦肝經之病。為牛黃以協濟之。其祛邪伐肝之力尤捷。許洪云。牛黃亞龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏之也。其性收陽中之陰。耑走足厥陰經。兼入手足少陰。治夜夢鬼交。多夢紛紜。多寐泄精。衄血吐血。胎漏腸風。益腎鎮心。為收斂精氣要藥。有客邪。則兼表藥用之。故仲景治太陽證。火劫亡陽驚狂。有桂枝加龍骨牡蠣湯。少陽病誤下驚煩。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞失精。有桂枝加龍骨牡蠣湯。千金方同達志酒服。治健忘心忡。以二味蜜丸。硃砂為衣。治勞心夢泄。梅師同桑螵蛸為末。鹽湯服二錢。治遺尿淋瀝。又主帶脈為病。故崩帶不止。腹滿腰溶溶。若坐水中。止濇藥中功用之。止陰瘧。收濕氣。治休息痢。久痢脫肛。生肌斂瘡。皆用之。但收濇太過。非久痢虛脫者。切勿妄投。火惑失精者。誤用多致溺赤濇痛。精愈不能收攝矣。

龍齒 濁平無毒。煅赤醋淬七次水飛用。形如筆架。重數兩外。光澤如鏡。碎之其理如石。內如龍骨。舐之粘舌者真。亦有微里。而煅之色如翡翠者。為蒼龍齒。較白者更勝。其小如筍尖。或如指狀者。海鰻齒及骨也。叢生如貫眾根者。海馬齒也。舐之亦能粘舌。世多以等類偽充。不可不辨。 本經王殺精物。大人驚癇諸症。癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癇。 發明 龍者東方之神。故骨與齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂能變化。故遊魂不定者。治之龍齒。古方有遠志丸。龍齒清魂散。平補鎮心丸。皆收攝肝氣之劑也。又龍骨以白者為上。取固上氣以攝下。脫齒以蒼者為優。生則微黑。煅之翡翠可愛。較白者功用更捷。產後血量為要藥。取其直入肝藏也。予聞神龍蛻骨之說。初未之信。及從藥肆選覓龍齒。見其骨有變化未全者。半與牛骨無異。始知宇宙之大。無所不有。即如蛇蟲之屬。皆能蛻形化體。豈特雲龍風虎而已哉。龍稟東方純陽之氣。故能興雲致雨。東方木氣主乎生也。其耳獨不司聽者。陽坤別走於角也。春夏發現。而秋冬潛伏者。隨陽氣之鼓舞也。虎稟西方陰暴之性。故嘯則生風。西方金令主乎殺也。其項獨不能仰者。陰威併振於尾也。晝潛伏而宵奮迅者。乘陰風之暴虐也。以是推之。則虎骨能搜風氣。健筋骨。療疚。重睛能定人魄。魄者陰之精也。龍骨能燭精氣。收神識。止滑脫。齒能清人魂魄者陽之神也。然龍性飛騰。而骨獨粘者。正以其滯而欲蛻之。始得飛冲御天。非飛冲後而蛻其骨也。觀本經驚癇癲疾。結氣。僵權鎮心安魂魄等治。總

皆入肝斂魂。用以療陽神之脫。同氣相求之妙。許叔微云。肝藏魂能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。時珍曰。龍者。東方之神。故其骨與齒。皆主肝病。

龍角 甘平無毒。發明 龍稟東方木氣。而角又督脈所發。故治驚癇瘓癰。神魂不寧。龍火上逆。身熱如火。及邪魅不詳。深師五邪九用之。而千金治心病。有齒角同用者。

鼈甲本經名
鼈魚

酸微溫小毒。本經治心腹癥瘕伏堅。積聚寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死

肌。發明 本經鼈甲所主之證。多屬厥陰。其功在平肝木。治血殺蟲。與鼈相類。亦能治陰瘻。千金有鮀甲煎。今藥肆多懸之。云能辟蠹。亦殺蟲之意。

陵鯉甲俗名穿山甲

鹹微寒小毒。或酥炙。或黃土。或蛤粉炒。發鬆研用。尾甲更勝。發明 穿山甲入厥陰陽明及陰陽二蹻。通經下乳。瘧疾癰腫。發痘為要藥。蓋其穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡。達於病所。凡風濕冷癰之證。因水濕所致。渾身上下強直不能屈伸。痛不可忍者。於五積散內。加穿山甲七片。全蠍炒十個。葱薑水煎。熱服取汗。避風甚良。癰疽潰後不宜服。

石龍子 鹹溫小毒。綱目作鹹寒誤。產平陽山谷。荆襄等處。其類有四。一種生岩石間。頭扁身長。尾與身等長七八寸。大者尺餘。其狀如蛇而脚似梅花鱗。目五色者為雄。色黃身短者為雌。此物最惜鱗甲。故見人不動。捕之亦不蟄。人以其生岩石間。故本經謂之石龍子。以其善於變易。吞霍吐電。有陰陽析易之義。故字林謂之蜥蜴。楚人名為蠚。蠚實一物也。入藥雌雄並用。去頭足。酒浸酥炙用之。入傅屍藥。醋炙用之一種生草澤間。頭大尾短身粗。其色青黃。有傷則啞。草自敷。故謂之蛇醫母。能入水與石斑魚合。故又名水蜥蜴。不入藥用。一種生人家屋壁。形小身細。長三四十。色褐斑黑者。謂之壁虎。以其居壁而善捕蠅蠅也。或云飼之以朱點宮城臂。故名守宮。一種似守宮而頭圓身細。長五六寸。色白如銀。通身細鱗。雌雄上下相應而鳴。情恰乃交者。蛤蚧也。荆襄領澤皆有。而西川產者最勝。捕得成對。線繩炙乾。捲裕樹皮中者是也。以此明辨。方無悞用之失。發明 石龍子為本經中品。而綱目主治中。有別錄而無本經。豈本經之文有所殘缺歟。抑本經之文誤註別錄歟。其治五瘻邪結氣利小便水道破石淋下血者。以蜥蜴能吐電折雨。故治瘻淋利水道。是其本性。千金治癰結水腫。尾瘻留飲。有蜥蜴丸。外臺治陰瘻。

方用之皆取其長於利水道耳。按蜥蜴即是石龍今房術藥中用之以其興發助陽而無止瀉之患也。

守宮一名蝘蜓名壁虎鹹寒小毒。發明。守宮食蠍蠍蠍乃治風要藥詳守宮所治風症癰癧諸病猶蜈蚣之性能

透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍以毒攻毒皆取其尾善動之義麻城移痘方治痘出眼目及正面稠密用以移痘於不傷命處其効最捷觀術士以守宮尾杵為細末彈熟肉上其肉便翕翕蠕動移痘方得非從此悟出陶弘景云蝘蜓喜緣籬壁間以珠飼之滿三斤研乾末以塗婦人臂有交接事便脫故名守宮蘇恭曰飼珠點婦人臂謂說也張華言必別有術今不傳矣時珍曰守宮祛風石龍利水功用自別不可不知。

蛤蚧甘鹹溫小毒生嶺南城垣榕樹間及粵西橫州等處者長七八寸蜀中產者不過五寸頭圓肉滿鱗小而厚形似守宮鳴則上下相呼雌雄相應情恰乃交兩相抱負自墮於地人往捕之亦不知覺以手劈之至死不開取以曝乾為房中要藥卽尋常捕得者功用亦相髮鬚但驗其囫圠成對捲榕樹皮中者卽真無疑入藥去頭留尾酥炙用之口含少許疾走不喘者是其益氣之驗也發明蛤蚧味鹹歸腎經性溫助命門色白補肺氣功兼人參羊內之用而治虛損痿弱消渴喘嗽肺痿吐沫等證專取交合腎肺之氣無以逾之愚按蛤蚧龍子性皆溫補助陽而舉世藥肆中皆混稱不分醫者亦不辨混用龍子則剖開如皮身多赤斑偏助壯火陽事不振者宜之蛤蚧則纏束成對通身白鱗專溫肺氣虛喘乏者宜之虛則補其母也。

蛇蛇鹹甘平小毒火熬用之本經主小兒二十種驚癇蛇癆癩疾瘻飛弄舌搖頭寒熱腸痔蟲毒發明蛇蠍屬巽走肝故本經治小兒驚癇等病一皆風毒襲於經中之象其入藥有四義一能辟惡取其性靈也故治邪辟鬼魅盤瘻諸疾二能驅風取其性竄也故治驚癇癓駁偏正頭風喉舌諸疾三能殺蟲故治惡瘻瘡漏疥癬諸疾用其毒也四有蛇義故治眼目翳膜胎衣不下皮膚之疾會意以從其類也

蚺蛇膽即南蛇甘苦寒小毒發明蚺蛇產嶺南稟己土之氣其膽受甲乙風水其味苦中有甘所主皆厥陰太陰之病其治心腹蟲痛者蟲在內攻噬也下部蟲瘻者蟲在外侵蝕也濕熱則生蟲燥濕則殺蟲內外施之皆可取用更能散腫消血故直諫之臣受廷杖者臨服少許則血不凝滯於內又能明日涼血除疳殺蟲惜乎難得真者白花蛇甘鹹溫有毒產新州者良禁犯鐵凡用去頭尾酒浸酥炙炭火緩焙去盡皮骨此物甚毒不可不防膈有

方勝尾上有拂者真。發明 蛇性竄能引藥至於風癱處。故能治一切風病。其風善行數變。蛇亦善行數變。所以能透骨搜風。為大風白癲。風牌驚搐。癲癇惡瘡要藥。取其內走藏府外徹皮膚。無處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥切忌見風。開蟬時須避其氣。免致面目浮腫。凡驚風曾服過大楓子仁者。服白花蛇無效。烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。忌犯鐵器。發明 蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風頑痹。皮膚不仁。風癰癰癰。疥癬熱毒。眉鬚脱落。瘡瘍等瘡。但白花蛇主肺藏之風。為白癲風之專藥。烏蛇主腎藏之風。為紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。發明 諸蛇皆是卵生。惟蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。故以蝮名。其狀較諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故又名反鼻蛇。有頭斑身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。皆蝮蛇也。有頭扁與土同色而無紋者。土虺也。亦名曰蛇字。形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。蛇類甚多。惟虺中人甚急。卽時以刀割去瘡肉。投之於地。其熟如炙。須臾毒盡。人乃得活。一種形如蜥蜴。長一二尺者。千歲蝮也。年久脚生能跳上樹。噉人。噉已還樹。垂頭聽人哭聲。頭尾相類。大如搗衣杵。俗名望板歸。言被其噉必死。專望板歸以備殮具也。蘇頌以細辛。雄黃等分為末。內瘡口中。日易三四次。又以枯蓼根桂木著管中密塞。勿令走氣。佩之中其毒者急敷之。野談翁方。急以黃荆葉搗爛敷之。上皆解救之法。然有用其毒以攻急厄之毒者。別錄取蝮蛇肉釀酒以療痼疾。蝮蛇膽磨汁。以塗瘡瘍。總取殺蟲攻毒之用耳。竊謂攻毒急救之藥頗多。奚必藉此而為異端之術哉。姑存以備解救之法可也。

魚部

鯉魚 甘平無毒。其目能聰動者有毒。藥中有天門冬者勿犯。天門病後勿食。發明 魚性逆水而上。動關翅尾。其力最勞。且目不夜瞑。故釋氏雕木象形。以警世之昏惰者。鯉性跳躍急流。故取以治水腫之病。河間云。鯉之治水鷺之利水。因其氣相感也。黃輝脚氣濕熱。孕婦身腫。宜之。便血同白蠟煮食。腦髓治耳卒聾。齒治石淋。膽治目赤腫痛。取汁點之。鱗治產婦帶血。燒灰治吐血崩中。十灰散中用之。

鱗魚本名鰐魚 甘溫無毒。發明 鱗魚多蓄池中。飼草而長。與青鯉混雜。故名曰鱗。江湖亦皆有之。食品之長。

味也。時珍言：暖中和胃。此指池中蓄者而言。李廷飛言：能發諸瘡。此指湖中獲者而言。各有至理。膽味苦寒，能出一切竹木刺在喉中，以酒化二三枚，溫呷取吐即出。

青魚 肉甘平。膽苦寒無毒。發明 東方色青，入通於肝。開竅於目。故膽有點目治驗之功。肉有補肝逐水之用。同並白煮食。治腳氣痰腫。目睛生汁注眼，能黑夜視物。以其好噉螺蜆，螺蜆能明目也。乾青魚膽水磨點喉痺痔瘡，與熊膽同功。

鱸魚本名鯈魚 甘溫無毒。發明 池魚大都無毒。兼此魚恒食諸魚之遺，其毒雖少，不無助長濕熱之虞。有見白二種。見者頭大，白者腹脰，雖食品之下，而有溫中益氣之功，與鱈魚無異也。

澗口魚本名鮓魚 甘溫無毒。發明 鮓生海中，與石首同類。以之剖腹曝乾，亦與石首作養無異。以其頭下有骨擗，故有澗之稱。能開胃進食，下膀胱水氣。病人食之，無發毒之慮。食品中之有益者也。

鯿魚古名鰐魚 甘溫無毒。發明 鯿魚縮項，性不喜動。嚴冬善息土中，故食之能調胃氣，而無動風發熱之慮。與白魚之性相仿，但無利水之功耳。

白魚 甘平無毒。發明 白魚入肺利水，開胃下氣，金匱治淋病，小便不利，滑石白魚散用之。取其佐滑石以利氣，兼亂髮以破血，血氣通調，而淋渴止矣。同棗食之，令人腰痛。以其滲泄脾胃也。

石首魚俗名鯛魚 甘平無毒。乾者名白鲞。發明 石首魚生鹹水中，而味至淡。故諸病食之，無助火之虞。與河豚之性，稟陰毒，迥殊。腦中石鯪主石淋，腰骨為末，入有嘴壺中，薰腦漏然，惟暴患得效。刺疾切忌油膩，惟白鲞食之最宜。

鱠膠 素平無毒。凡用入丸，切作小塊，蛤粉炒成珠，方可磨末，煉蜜調劑。須待涼用，又不可搗。搗則粘韌，難為丸矣。發明 諸魚之鱠，皆可為膠。而石首魚者，膠物甚固，故名精丸，為固精要藥。丹方又以一味炒研砂糖調日服一錢，治痔最良。經久痔自枯落。燒灰治產後風搖，破傷風瘻，取其滋榮經脈，而虛風自息也。

勒魚 甘平無毒。發明 勒魚腹下有骨，勒人因以得名。以其甘溫開胃，有宜於老人之說。作養尤良。脊骨治瘧，以一寸入七寶飲酒水各半，煎露一宿服之。

鯿魚 甘溫無毒。發明 鮯魚性補。溫中益虛而無發毒之慮。其生江中者大而色青。味極甘美。生海中者小而色赤。味亦稍薄。觀其暗室生光。迥非常魚可比。其鱗用香油熬。塗湯火傷效。

鯈魚 甘溫無毒。發明 此魚食乳水功用同。乳食之令人肥健。腹中子性寒有毒。多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美。以其居濁水中。雖肥不無小毒。然此恒用食品。未嘗見其有毒傷人。發明 諸魚性動屬火。惟鯽魚屬土。有調胃實腸之功。故有反厚朴之戒。以厚朴泄胃氣。鯽魚益胃氣。故大明言溫中下氣。保昇言止痢厚腸。皆言其補益之功也。生搗塗瘻核。乳癰堅腫。以猪脂煎灰服治腸癰。合赤小豆煮汁消水腫。炙油調塗婦人陰瘡。同白礬燒研。治腸痔血痢。入綠礬泥固瘕。治反胃吐食。與胡蒜煨。治膈氣痞滿。凡煨俱不可去鱗。以鱗有止血之功也。

石斑魚 有毒。發明 石斑魚生南方溪澗水石處。長數寸。大不過尺。餘有雌無雄。二三月與蜥蜴交合水上。其子毒人。令人吐瀉。醫說云。用魚尾草汁少許解之。

鱠殘銀鮀 甘平無毒。發明 鱠殘出蘇松浙江。大者不過三四寸。身圓無鱗。潔白如銀。小者尤勝。鮮食最美。曝乾亦佳。作羹食之。寬中健胃。而無油膩傷中之患。

海粉 鹹寒無毒。發明 海粉色碧。微鹹。專行肝腎。云是海中介屬。得東南水土之氣而成。與蜂之釀蜜無異。土人採得而貨之。以供食品。能散癰瘤。解毒熱。但性寒滑。脾胃虛人勿食。

燕窩 甘平無毒。發明 鳥卸海粉作窩。得風日陽和之氣化。鹹寒為甘平。能使金水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。令人以之謂補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者為宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。

鱸魚 甘平小毒。發明 鱸魚鬆脆。與石首魚相類。補五藏。益筋骨。和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮮尤良。

鯔魚 甘平小毒。發明 鯔魚疎利。有補虛益胃。去腹內惡血小蟲之功。醫說有邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鯔魚。羹遂愈正。與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯔及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

臘月收大鱖魚膽懸北簷下陰乾遇有梗者用皂子大酒研溫服得吐則鱖隨涎出未出再服以出為度酒隨量飲無不出者如無鱖魚膽鯈魚青魚鯽魚膽用鮮者酒調服之亦出

鰨魚即鱖魚俗名里魚

甘寒無毒發明

鰨性伏土而能勝水故治水腫療五痔治濕瘻主脚氣妊娠面浮腳腫者合

赤小豆煮食甚效丹方治水腫腹大用活鰨魚去腹垢入獨顆蒜令滿外塗濕黃泥炭火炙食屢効有瘡者不可食令癩白

鰐鱖魚

甘平小毒潤嘴者為鰐尖嘴者為鱖發明

鰐魚雖有毒性能補虛益陰久病勞瘵宜之大便濡泄勿

用其功專在滋補真陰殺勞瘵蟲與蛇同類故主治亦近之

鱠魚

甘大溫無毒發明

鱠魚稟已土之氣能補中益血婦人產後惡露淋漓陽鳴濕痹並宜食之暴乾煅灰

存性治老人虛痢大鱠魚重効餘者能助勢力食後遍體疼脹盡力搥之大力丸方用熊筋虎骨當歸人參等分為末酒蒸大鱠魚取肉搗爛為丸每日空服酒下兩許氣力驟長鱠魚血力能助陽壯年陽道不長育龜丸用之方用石龍子蛤蚧生犀角生附子草烏頭乳香沒藥血竭細辛黑芝蔴五倍子陽起石等分為末生鱠魚血為丸硃砂為衣每日空心酒下百丸曾有人服此得以嗣續宗祧者不可以房術論也其尾血療口眼喝斜同麝少許右喝塗左左喝塗右正卽洗去其骨燒灰香油調塗流火甚效

甲魚鱉魚本名

甘溫小毒發明

鱉魚無鱗而有甲故俗名為著甲江淮黃河遼海水深處皆有之長二三丈逆上

龍門能化為龍味極肥美但發氣動風和養寒食令人失音其肝味勝河豚食之令人血膚乾脫亦動風之驗也

鱈魚本名鮒魚生江中長丈餘身無鱗鼻與身等亦鱈屬也

甘平無毒發明

此魚味雖美而發諸藥毒動風氣發一切瘡疥久食令人

腰痛服丹石人忌之勿與乳筍同食發癰瘍風小兒食之成欬嗽及癩瘕作鮮雖珍亦不益人

鯪魚本名鯪魚即鯪魚

甘溫小毒反荆芥發明

諸魚皆用翅尾游行惟鱈不勞翅尾逐隊齊行故以命名種類不一獨產江水中

唱斜切活鮎魚尾尖朝吻貼之卽止

黃鱔魚

甘平微毒反荆芥發明

無鱗之魚不益人發瘡疥不獨黃鱔為然

江鱠鱠魚

甘平小毒發明

諸魚皆用翅尾游行惟鱠不勞翅尾逐隊齊行故以命名種類不一獨產江水中

者應春而起。味極鮮美。性專降泄。故敗疽痔漏人忌食。諸鱗皆然。

河豚 甘溫有毒。海中者大毒。江中者次之。淡水中者又次之。有大小二種。大者謂之河豚。背淡青黑無赤斑。腹白而翅傍色黃者可食。小者名斑魚。背脊黑有丈點。多赤色。其毒最甚。以烹蛟龍之氣最甚也。海人言三月後斑魚得木氣全盛之時。尤不宜食。其雙尾獨目。翅赤嘴亦異常。背有赤印。領內無腮。腹中多血。獨腴無膽。皆大毒傷人。製食之法須去其子與嘴目。及脊中肝內惡血。并去周身脂膜。則不氣腥。煮忌煤火。乃煤焰落入。與荆芥桔梗菊花甘草附子烏頭相反。故食河豚一日內不可服藥。河豚子必久瀆石灰水中。而後煮食。曾見水浸一夜。大如芡實也。中其毒。則脣舌麻聾。頭旋目眩。足不任履。行步欹側。急宜探吐。隨覓救芽。或蘆根搗汁灌之。橄欖汁甘草汁皆可解。又槐花乾胭脂等分為末。水調服之。若腹中絞痛昏迷倒仆者。急用糞清灌之。遲則不救。 發明 凡物之美者。謂之尤物。靡不貢毒傷人。如妲己亡殷。夷光傾吳。蒙其禍而不自覺也。河豚嗜鹹。內藏信智。外顯文刺。窄口巨腹。陰毒內蓄。可知。凡陰毒之物。必藉陽氣而為鼓舞。得春升之令。而浮游水面。非信而孚。散子必入淡水。既生必歸巨海。非智而乎。得鹹則肥。得淡則瘦。所以淡水中者。其毒漸解。而不致傷人之甚也。以其味美。人爭食之。春初最為貴品。其腹腴呼為西施。乳南人有云。凡魚之無鱗無腮。無膽有聲。目能瞑者。皆有毒。河豚目能開闔。觸之則曳曳有聲。嗔怒則腹脹如毬。浮起水面。故人得以取之。其毒入肝助火。莫有甚於此者。患癰瘍。傷脚氣。切不可食。助濕發毒動風。其患最速。惟取其子。同蜈蚣燒研。香油調搽疥癬有効。抉其目。拌輕粉埋他中化水。拔婦人脚上雞眼瘡。可以脫根。江豚 鹹腥無毒。發明 江豚形如水牛。藏器雖有飛屍蠱毒瘡瘻之治。從未見有用之者。以之熬油點燈。照燭蒲則明。讀書紡織即暗。俗言嬪婦所化也。

比目魚 甘平無毒。發明 比目形如箸葉。故俗以是稱之。爾雅所謂東方有比目者是也。魚各一目。相並而遊。

今吳中崑山最多。孟說雖有補中益氣之說。而多食動氣。亦是助濕生熱之故。此必溺於伉儷者之所化也。

鮫魚一名沙魚 甘鹹平無毒。發明 鮫魚生南海。背皮粗錯。可飾刀靶。其肉作膳。補五臟。皮治屍疰蠱毒。燒灰解鰐魚毒。

烏賊骨即烏鰐骨。俗名海螵蛸

鹹微溫無毒。發明 烏鰐骨屬陰血分之藥。兼入少陰。其味鹹而走血。故治血枯血瘕。經

閉崩帶。陰蝕腫痛。丈夫陰腫下痢疳疾。厥陰本藥也。寒熱瘧疾。少腹痛。陰痛。厥陰經病也。目翳流淚。厥陰竅病也。厥陰為藏血之室。少陰為隱曲之地。故諸血病陰病皆治之。按素問云。有病胸脇支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液吐血。四肢清。目眩時。時前後血病。名曰血枯。得之年少時。有所大脫血。或醉入房中。氣竭肝傷。月事衰少。不來。治之以四烏鰡骨一莖。茹為末。丸以薤卵。大如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及傷肝也。觀此入厥陰血分可知。

鮑魚 辛臭溫無毒。發明 鮑魚腥穢可淡曝。而不可著鹽。乾則形如塊肉。而取腥穢。以滌一切瘀積。同氣相感也。入肝散血。煮汁送四烏鰡一莖。茹丸治女子血枯經閉。內經用以療傷肝利腸。而不傷伐元氣。惜乎世罕用之。今庖人用以煮肉。則胎床盡解。消除垢膩之驗也。秦始皇死沙邱。會暑屍腐。令輜車載鮑魚。以亂其臭。始皇本呂不韋萌孽。溷廁宮幃。非取其滌除遺臭之義歟。

海馬 甘溫無毒。發明 海馬雌雄成對。其性溫暖。有交感之義。故孕婦帶之於身。臨時煅末服之。并手握之。云易產。又陽虛房術多用之。可伐蛤蚧之功也。

鰐鰐作鰐 甘溫小毒。鰐無鬚。腹下通黑色者。食之傷人。發明 鰐性跳躍。生青熟赤。風火之象。生搗敷小兒赤白遊風。絞汁入藥。托腫吐風痰。皆取風能勝濕也。制藥壯陽。取熱能助火也。白者下乳汁。專入氣分也。

介部

龜板本經名神屋 鹹 甘平小毒。入藥取腹去背。酒浸酥炙。或熬膠用。色黑產水中者為水龜。其色黃出山中者為秦龜。秦龜不入補腎藥。一種呷蛇龜腹折。見蛇則呷而食之。其性最毒。不可誤用。方書皆用灼過敗龜之板。取其用過無關生命也。世以自死龜殼為敗。既死精氣已脫。取用何益。誤服反受其毒。以其為蛇虺所傷也。今藥肆所賣龜膠。每以鹿角膠脚。中入則易凝結。亦有以黃明膠和入者。凡製膠須去背甲以淨腹版。水浸去外衣。則膠無腥濁之氣。本經主漏下赤白。破癰瘕痃癖。五痔陰蝕。濕痹四肢重弱。小兒顛不合作。發明 龜票。票北方之氣而生。乃陰中至陰之物。善行任脈。上通心氣。下通督經。故能補陰治血治勞。大凡滋陰降火之藥。多寒涼損胃。惟龜版炙灰。則益大腸。止泄瀉。故漏下赤白亦能療之。其治小兒顛不合作。專取滋水堅骨之功。皆龜之所主。其破癰瘕痃癖。五痔陰蝕。濕痹。

重著皆秦龜之功用。以能入脾經治風濕也。時珍云：龜鹿靈而壽，龜首常藏向腹，能通任脈。故取其腹以補心補腎，補血皆養陰也。鹿角常反向尾，能通督脈。故取其角以補命門，補精補氣皆養陽也。觀龜甲所主之病，皆屬陰虛精弱，腰脚癱痿，可心解矣。燒灰酒服，治痘瘡。又合鹿角灰等分，入四物湯服，治血崩。炙末酒服，主風痹腳弱。燒灰傅小兒頭瘡，婦人陰瘡。鱗魚血調塗流火濕瘡。但胃虛少食，大便不實，及妊娠禁用。以其無陽生之力耳。膽汁苦寒，治痘後目腫。經月不開，取汁點之。良。漏滴耳治聾。點舌下治大人中風舌瘡。小兒驚風不語，摩胸背治龜胸龜背。欲取其溺，以猪鬃刺其鼻，即出。

玳瑁 即璠 甘寒無毒。入藥生者良。發明 玳瑁入心主血，有解毒解熱之功。故蘇頌以之磨汁服解蠱毒。日華破癩結，消癰毒。止驚癇。士良療心風解煩熱，行血氣利大小腸。時珍治傷寒熱結狂言，解毒清熱之功，等於犀角同犀角解痘毒。痘瘡黑陷，乃心熱血凝。用生犀玳瑁磨汁，入豬心血少許，紫草湯調服，則熱解血和而陷痘起矣。但虛寒而陷者勿用。

鼈甲一一名鵝甲。鹹平無毒。九肋七肋者佳。以其得陽數也。然多有摘去下肋，偽充七肋者。亦有半邊隻肋，半邊雙肋者。此團魚與鼈交合而生。不若純隻肋者為優。醋煅酥炙各隨本方。治瘧母淋。灰湯煮糜如飴用。龜用大者力勝。鼈用小者力優。妊婦勿食鼈肉。與蕷菜鴨卵合食尤忌。本經主心腹癩瘕。堅積寒熱去痞疾，息肉，陰蝕痔核，惡用。發明 鼈色青，入厥陰肝經，及衝脈為陰中之陽。陽奇陰偶，故取隻肋為肝經之嚮導。其所主者，痃瘶瘧母虛勞寒熱，癓瘕痞疾。經水陰瘡不出。本經主治也。凡骨蒸勞熱，自汗皆用之。為其能滋肝經之火也。與鼈甲同類，並主陰經血分之病。龜用腹，腹屬腎。鼈用肋，肋屬肝。然究竟是削肝之劑，非補肝藥也。妊婦忌用。以其能伐肝破血也。肝虛無熱，禁之。煅灰研極細，未煮湯火傷皮綻肉爛者並効。乾則麻油調敷，濕則乾掺。其痛立止。其解火毒，療骨蒸殺瘞蟲之功，可默悟矣。鼈頭燒灰，酒服療小兒脫肛。婦人陰脫下墜，取其善縮之性也。生血塗尤效。○沈聖符曰：食品中惟鼈最為叵測。其間多有大毒。不減河豚者。如三足兩頭人所共棄，項強腹赤，毒可傷人。予隣余子坦，曾見蛇盤屢跌而成鼈者。四生之中，物物皆有變化，無足異也。且有鼈寶生鼈腹中之說。說者以為誕妄。姑置罔聞。近日楓江吳氏買一鼈烹之，輒作人言。其家以為怪也。添火烹之，剖腹果得一物，約長三寸。鬚眉宛然。聖符邀子往看，驗其鼈形，背高

聳起稍異尋常。聖符屬筆命記以為嗜味傷生之警。

龜甲 甘平無毒。發明 龜甲炙黃酒浸。治療癰瘍殺蟲逐風惡瘡。痔瘻風頑疥瘡。功同鼈甲。俱鼈走肝而龜走脾。故其主治稍有不同。

蟹 臓寒小毒。未被霜者有毒。多食腹痛泄瀉。生薑紫蘇豉汁蘆根汁。並可解之。其性喜入蛇穴。得其毒則驟長。故重一動以上者。誤食殺人。又兩目相向。足斑目赤者大毒。不可食。本經主胸中邪氣熱結痛。喝辟面腫。能敗漆燒之致亂。發明 蟹之外骨內肉。主青熟赤。陰包陽象無疑。性善破血。故能續斷絕筋骨。本經主胸中邪氣熱結痛。喝辟面腫。皆是瘀血為患。性能敗漆。令人生搗治漆瘡。塗火燙。皆取散血之意。日華治筋骨折傷。生搗晝之藏器云。能續斷筋。去殼用黃搗爛微炒。納入瘡中。筋即連也。可知其功不獨散而能和血矣。凡物之赤者。皆熱。惟蟹與柿性寒。所以二物不宜同食。令人泄瀉發癥瘕。妊娠忌食。以其性專逆水橫行也。其爪為催生下死胎胞衣。專藥千金神造湯。治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出生者安神驗方也。但以一邊運動一邊沈著者。即是無疑。方用蟹爪一升。甘草一尺。東流水一斗。以葷薪煮至二升。去滓入真阿膠二兩。令烊頓服。或分二服。若人困不能服。灌入卽活。取蟹之散血。而爪觸之卽脫也。然必生脱者。連足用之。丹方治蓄血發黃。胸脇結痛。而不浮腫者。蟹殼煅存性黑糖調無灰酒下三錢。不過數服效。若浮腫者為氣病。無藉於蟹之散血也。婦人乳癰硬腫。蟹殼灰一服即散。又以塗硃燒烟辟臭蟲蠶之。卽斃。則殺蟲之功從可知矣。○蟹之相類多種。如蠅蟇擁劍不常見外。其蟛蜞蟛蜞春時甚多。蟛蜞螯光無毒。可醢而食。蟛蜞螯毛有毒。慎食令人吐下。又有一種生沙穴中。見人則避者。沙狗也。時珍雖言不可食。今海錯中用之。非蟛蜞之可比也。

蟹 車軸平微毒。發明 醫善候風。外殼內肉。與蟹無異。其血蒼色。其肉鬆脆。亦如蟹臍。能散肝腎結血。故產後痢不止。及腸風瀉。崩中帶下。用尾燒灰米飲服卽止。聖惠方治積年欬嗽。呀呻作聲。用蟹魚殼半兩。貝母桔梗入發明 牡蠣入足少陰。為軟堅之劑。以柴胡引之。去脇下痛。以茶引之。消項上結核。以大黃引之。消股間腫。以地黃

引之。益精收濁止小便。腎經血分藥也。本經治傷寒寒熱溫瘡酒洒。是指陽寒發汗後。寒熱不止而言。非正發汗藥也。仲景少陽病犯本。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱百合病變渴。有枯萎牡蠣散。用牡蠣以散內結之熱。卽溫瘡之熱。從內盛驚恚之怒氣上逆。亦宜鹹寒降泄為務。其拘緩鼠瘻帶下亦白。總由痰積內滯。端不出軟堅散結之治耳。今人以牡蠣治精。而治房勞精滑。則慮其鹹降。治亢陽精傷。又恐其斂滯。惟傷寒亡陽汗脫。溫粉之法最妙。其肉糟製。卽蠣黃醬也。

蚌 肉甘寒。殼鹹寒無毒。發明 蚌與蛤皆水產。而蛤則生鹹水。色白入肺。故有軟堅積化頑痰之功。蚌生淡水。色蒼入肝。故有清熱行濕。治雀目夜盲之力。蓋雀目則肝腎之病也。初生小兒啞驚。活蚌水磨墨。滴入口中。少頃下黑糞而愈。生蚌炙水。治湯火傷甚效。古方用方諸水清神定魄。以大蚌向月取水。是也。

真珠 鹹甘寒無毒。發明 珍珠入手足厥陰二經。故能安魂定神。明日退翳。解痘疔瘡。及痘瘡入眼。治耳聾聵。出水研細末吹之。待其乾脫自愈。煅灰入長肉藥。及湯火傷敷之。最妙。然不可著水。著水則反爛肉。

石決明 一名珍珠母 鹹平無毒。九孔者佳。麪裹煨熟水飛用。反雲母。發明 石決明味鹹軟堅。入肝腎二經。為磨腎消障之專藥。又治風熱入肝。煩擾不寐。遊魂無定。本事方珍珠母丸。與龍齒同用。取散肝經之積熱。須與養血藥同用。不宜久服。令人寒中。非其性寒。乃消乏過當耳。

文蛤 鹹平微寒無毒。卽蛤蜊之殼厚口。光有紫斑文者。用酸漿水或醋煮半日許。搗粉用。本經主惡瘡蝕五痔。發明 文蛤鹹寒。走足少陰經。為潤下之味。故能止渴利小便。別錄治欬逆胸痹。腰痛脇急。鼠瘻崩中。卽本經主惡瘡蝕五痔之義。取鹹能軟堅。入血分也。仲景傷寒太陽病。用水劫益煩意欲飲水。反不渴者。及金匱渴欲飲水不止。並用文蛤散。其治及胃吐後。渴欲飲水而貪飲者。則有文蛤湯。總取鹹寒滲飲之義。

蛤蜊 鹹寒無毒。案口者良。大都鹹寒之物。皆能清熱。開胃止渴。其殼煅赤杵粉。能清肺熱。滋腎燥。降痰清火。止欬定喘。消堅癰。散癰瘤。無不宜之。炒阿膠鱠膠用之。以其味鹹能發滯性也。單方治乳癰。每三錢入皂角刺末半錢。溫酒調服。治肺癰一味童便煅研。甘桔湯日進三服。屢驗。然須冬時取枯萎實。和穰子同搗。仍入殼中。懸當風處陰乾。以供一歲之用。否則難於取應也。

蝗 甘平無毒。發明 蝗生江湖中。與蚌蛤相類。閩人以田種之。謂之蝗田。其肉可為淡乾。腸鼻糟之。以充海錯。婦人產後虛熱宜之。

魁蛤殼俗名蚶子即瓦罐子 肉甘平。殼鹹平無毒。發明 蛤肉僅供食品。雖有溫中健胃之功。方藥曾未之及。其殼灰。則有消血塊散瘀積。治積年胃脘疾。血瘀痛之功。與鼈甲蟬蟲同為消瘡母之味。獨用醋丸。則消胃脘瘀積。觀製蚌餅者。以蚌殼灰泡湯。搜糲粉。則發鬆異常。軟堅之力可知。

車螯蜃一名 鹹冷無毒。發明 車螯是海中大蛤。以其吐氣成樓。故名曰蜃。所謂雀入淮為蛤。鵠入海為蜃者是也。其肉解酒毒。消渴。敘治瘡腫毒。燒赤醋淬為末。同甘草等分酒服。并以醋調敷之。日華法也。

貝子 鹹平小毒。燒赤搗細如麩。以清酒淘過。用白者入氣分。紫者入血分。花者兼入血氣。本經主目腎五癰。利水道。兔疰蟲毒。腹痛下血。發明 貝生南海。雲南極多。土人用為錢貨交易。因其味鹹軟堅。故本經專主目腎。其治五癰等病。取鹹潤走血之力。千金腳氣丸中用之。專取鹹能破堅之意。雖數十年之疾。靡不克效。以其透入骨空。搜逐濕淫之氣。和諸藥共熬作汗。次第而解之。古方點目用貝子粉。入龍腦少許。有瘦肉。加珍珠末吹點。亦入老醫諸方。紫貝治小兒癰疹目腎。令人用以研細。謂之研藏。大者曰珂。亦名馬軒螺。治目消翳。去筋膜。努肉。與貝子相類。分紫白煅灰用之。

石蜘蛛一名 甘鹹無毒。發明 石砌生東南海中石上。蚌蛤之屬。形如龜脚。殼似海螯。與吐蝶等同為海錯。而此稍遜。然其有利小便之功。吐蝶不如也。

淡菜 甘溫無毒。發明 淡菜生鹹水而味不沾鹹。為消瘦之善藥。兼補陰虛勞傷。精血衰少。及婦人帶下。理腰脚氣。不宜多食。久食令人陽痿不起。及脫人髮。一切海中苔菜皆然。不獨淡菜也。

海蠃胎名甲香 鹹平無毒。發明 海蠃肉甘寒。食之能止心痛。生螺汁洗眼止痛。經二三十年者。輒應。黃連末點。

之尤良。○屬性閑。能斂香氣。經月不散。獨燒則臭。與沉麝諸香。及諸花和蠟煎成者。曰甲煎。可作口脂。千金方用之。唐李義山詩。所謂沉香甲煎為庭燎者是也。其殼五色斑斕。為細最清。燒過點眼。能消宿翳。惜乎專目科者罕知。

蠃螺 甘寒無毒。發明 蠕蚌蛤蟹通體之類。皆外剛內柔。稟離火之象。雖居泥水而性寒。治火熱之毒。最捷。

用珍珠黃連。嵌入良久。取汁注目中。止熱壅目痛。生搗絞汁。和無灰酒飲。治黃禪小便不利。田中大螺去掩入冰片少許。埋土中一伏時。化水療痔瘡。又搗爛和麝香貼臍上。引濕熱下行。治噤口痢。土牆上爛殼燒灰敷痘瘡。及臙瘡濕毒。生田中者。得土氣多而形大。生水中者。得水氣多而形小。其治水腫黃禪。目赤腫痛痔瘡脫肛。消渴解酒之功。則一。產徽州溪澗中者。其肉青碧可愛。土人取肉焙乾。以充方物。但性冷利人過食。令人腹痛泄瀉。急磨木香酒解之。

寄居蟲 甘溫無毒。發明 藏器曰。寄居蟲在螺殼間。非螺也。候螺蛤開。即自出入螺蛤。故合已還殼中。海族多被其寄。南海一種似蜘蛛。入螺中負殼而行觸之。即縮入螺火炙乃出。婦人難產。以七枚搗酒服之。或臨產兩手各握一枚。與相思子無異。弘景云。食之益顏色。美心志。惜乎一時不易得也。

郎君子卽相思子 發明 相思子狀如螺中之子。大如小豆。藏篋笥積歲猶活。置醋中即盤旋不已。婦人難產。手把之便生屢驗。

禽部

鶴頂 辛溫大毒。發明 鶴食蛇虺而頂血大毒。力能殺人。人之欲求自盡者。服之卽斃。而嘉祐又以鶴血益氣力補虛乏。去風益肺。恐未必然。肫中砂石子磨水服。能解蠱毒。

鶴骨 甘寒小毒。發明 鶴骨治尸疰喉痺蛇虺傷。專用其毒。以攻伏匿之毒也。嘴及脚骨尤良。卵能預解痘毒。水煮一枚。與兒啖之。令不出痘。或出亦稀。與鶴卵同功。

鵝鴨鴟鴞 滅寒無毒。發明 鵝鴨好啖魚蛇及鳥雛。故治痞積有鵝鴨丸。用之為君。治食魚鼈成瘕者尤效。其骨酥炙。和南蓮砂吹喉治骨哽。忍之須臾。輕輕咯之。骨與痰涎俱出。

鵝鴨鴟鴞 滅溫滑無毒。發明 淘鵝油性走能引諸藥透入病所拔毒。故治聾風方中。取純白鵝通身之毛及嘴足之皮。與肫肝內皮同固心拔毒外出也。

鵝 白者甘平無毒。蒼者有毒。嫩者尤劣。發明 鵝氣味俱厚。發風發瘡。莫此為甚。別錄謂其性涼利五藏。是指蒼者而言。韓氏謂其躁風。是言白者之性耳。昔人治癲風方中。取純白鵝通身之毛及嘴足之皮。與肫肝內皮同固

濟。煅灰存性和風藥用之為風藥之嚮導也。然不可遺失一處。其處卽不能愈。又不可用雜色者。若有一處色蒼風愈之後。其處肌膚色黑。此與蛇發風毒。白花蛇善解風毒之義不殊。白鵝脂祛風潤燥。解譽石毒。血能涌吐。胃中瘀結。開血膈吐逆。食不得入。乘熱恣飲。卽能嘔出病根。以血引血。同氣相求之驗也。中射工毒者飲之。并塗其身。卽解以其能食此蟲也。尾腺內耳中治聾。及聰耳。取以達三焦之氣也。涎治誤吞稻芒。亦物性之相制耳。白鵝屎絞汁治小兒鵝口瘡。蒼鵝屎博蟲蛇咬毒。

雁 甘溫無毒。本經主風攀拘急偏枯。血氣不通利。發明 雁為信鳥。豈宜食之。故道家謂之天厭。性善通利血氣。風攀拘急偏枯。取肉炙熟帖之。昔黃帝製指南於鴈脰骨空中製鍼。取其能定南北也。但覓之不易。令人於鯉魚腦中製之。以其性專伏土。定而不移。可定水土之方向也。

鷺即家鷺 甘溫無毒。嫩者有毒。老者無毒。發明 鷺之逼火而生。唼水而長。未出卵時。先得火氣。故不憚冰雪。偏喜溼雨。而尾腺瀉濁最甚。故羣雌一被其氣。皆得生化之機。不待鷺尾之遍也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。男子陽氣不振者。食之最宜。患水腫人。用之最妥。嘴白毛者。治腸胃久虛。葛可久白鳳膏用之。取金水相生之義。綠頭老鴨。治陽水暴腫。外臺鴨頭丸用之。取通調水道之義。白鴨生血。能補血解毒。勞傷吐血。衝熱酒調服。屢効。中射工溪毒。及野葛砒霜毒。灌之卽解。悞吞金銀入腹。乘熱煩飲數升。其金卽下。諸鴨涎治穀麥芒入喉。及小兒痙風反張。滴之卽消。卵能閉氣。以混沌未分。塞人聰慧。諸病忌食。而滯下尤禁。白鴨通殺石藥毒。凡服藥過劑。昏迷眩暎者。取白鴨通一合。湯漬澄清服之。卽解。勿以其穢而棄諸。

鳬即野鶴 甘平無毒。發明 鳩逐羣飛。夏藏冬見。與鴻雁不異。其在九月以後。立春以前。味極甘美。病人食之全勝家鴨。以其肥而不脂。美而易化。故滯下泄瀉。喘欬上氣。虛勞失血。及產後病後。無不宜之。雖有安中利水之功。而方藥曾未之及。孟洗除十一種蟲等治未能深信。摘玄方解桃生蠱毒。取生鳩血熱飲探吐。於此可悟。生鵝血可吐胸腹諸蟲血積。總以血引血。同氣相應之力耳。

雞 甘平。小毒。諸雞有五色者。黑雞白首者。六指者。死足不伸者。並不可食。發明 雞屬巽而動風。外應乎木。內通乎肝。得陽氣之最早。故先寅而鳴。鳴必鼓翅。火動生風之象。風火易動而易散。人之陽事不力者。不宜食雞。是以

昔人有利婦人不利男子之說。而東南之人肝氣易動，動則生火，生火則病。邪得之為有助也。北方陽氣潛伏，最宜發越。病邪得之便能作汗。以其能助肝氣也。姑以物性之常變言之。諸雞中惟烏骨白絲毛者最良。巽象變坎，得水木之精氣。肝腎血分病宜之。烏骨雞丸治經癸胎產虛熱諸病。以其峻補肝血也。令人治賊風痛癆。專取五爪烏骨雄雞治病人痛處。任在鳴啄少頃其痛自止。雞之五爪者有毒。此專取其毒。以引其毒外泄也。丹雄雞治女人崩中漏下。赤白漏通神明殺惡毒辟不祥。中惡魔魅以血灌鼻卽愈。中風口眼喎斜乘熱塗患處卽止。雞冠血和酒釀調陵鯉甲末治痘瘡。肝熱毒盛而變青乾紫黑陷伏。黃雌雞治產後虛羸。煮汁煎藥最宜。黑雌雞治妊娠胎息不安。泰和老雞內托小兒痘瘡。近世治產後虛羸寒熱亦取用之。以其能助肝經生氣也。雄雞肝取不落水者研爛和蜂蠟酒釀頓熟。治小兒疳積壞眼。日服無間。醫盡為度。雞肫俗名雞內金。治食積腹滿反胃泄利及眼目障翳。雞卵治傷寒發狂。欬嗽失音。並生食之。以雞卵略敲損勿令清漏。浸尿中。冬三夏一日取煮食之。治哮喘風疾。雞子清治伏熱目赤喉痛。雞子黃治產後胞衣不下。並用生者。又以煮熟去白取黃。同亂髮香油熬化塗嬰孩胎毒熱瘡。抱出卵殼研細為末。去目中瘴醫燒灰蜜調塗嬰兒頭身諸瘡。卵殼中白皮同麻黃紫菀治久欬氣結。糰雞子乃不孚之卵。取以同大黃敷腫瘍。其痛立止。千金方也。雞矢白為散。無灰酒下一錢。治蠱脹腹滿。內經雞矢醴也。溏矢和石灰末塗疔腫半日許即能拔出。

雉即野雞 甘酸溫小毒。發明 俾雅云。蛇交雉則生蜃。蜃為雉入大水所化。推其變化之源。必由異氣所感。水經云。蛇雉遺卵於地而為蠍。其卵遇雷則入地。不遇雷則仍為雉。於此可悟其化蜃。總由靈蛇之性未泯。不得山靈之氣。遂其飛騰。則得滄溟之氣。恣其吞吐。是與虹蜺奚擇哉。別錄言其補中益氣力止泄痢除蟻瘧。此指尋常之雉而言。十金以之治蟻瘧。因其喜於食蟻。乃用以製之也。周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有毒不可常食。有病人尤非所宜。而春夏不可食者。以其食蟲蠍也。時珍曰。雉屬離火。雞屬巽木。故煮雞則冠變者雉則冠紅。火性暴烈。發痔發瘡。與家雞子同食。令人發症。週身疼痛。為患種種。恐得謂之無毒乎。

烏鵲 酸甘平無毒。種類有四。小而純黑者為烏。大嘴而腹下白者為鵲。並入藥用。其項白而大者為燕烏。嘴亦而小者為山烏。皆不入藥。發明 慈烏反哺性稟孝慈嘉祐。雖有補勞治瘦之功。骨蒸羸弱欬嗽之治。然血肉之中。

本草綱目 卷四
十二
豈無他味。而忍傷孝慈之物哉。○烏鵲嘴大。貪戾。傷生時珍。取治暗風癧疾。勞傷吐血。欬嗽殺蟲等病。專取搜逐風毒之用。與燕鳥之調補虛羸。各有仁慈剛暴之用。奚啻天淵。

鵲 巢重 甘寒無毒。發明 鵲性靈慧能知吉凶。觀其營巢門戶必背太歲而向太乙。非鵲鳩之可比。別錄用之。

為下石淋專藥。以其鳴必掉尾。取其週身利氣。惡向下通也。藏器有云。燒灰淋汁飲之。令人淋石自下。蘇頌言。婦人不可食。以其相視得通音感而孕也。其腦燒之入酒同飲。令人相思。蘇頌之說得非緣此。○鵲重巢。日華取多年者燒之。療顛狂鬼魅及蠱毒。仍呼崇物名號。亦數遭瘡。千金治婦人難產。取多年生育相安之義。

鵲鳩 甘溫小毒。發明 此物食烏頭半夏苗。好咬此者多發咽喉頭腦腫痛。甘草生薑並可解之。唐本言。鵲鳩治嶺南野葛菌子生金毒。及溫瘡久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生搗汁服最良。日華云。酒服主蠭氣欲死。孟詒云。能利五藏益心力。令人聰明。

鶉 甘平無毒。發明 鶉主腹大如鼓。解熱結。療小兒疳。按鶉乃蛙化氣性相同。蛙與蝦蟇皆解熱結。治疳利水消腫。則鶉之消鼓脹益亦同功。食後下如鵝脂數次即愈。

鵠 賦平無毒。發明 鵠之品類頗多。惟白者入藥。能解諸藥毒。久患虛羸者食之有益。調精益氣。治惡瘡疥癬。風瘡。白癩。風癧。癰瘍。風疽。熟酒服無不宜。之。鵠卵能補痘。其矢氣臭之能殺瘧蟲。虛勞家咸多畜之。

鶯 俗作鶯。即黃鸝。月令名倉庚。 甘溫無毒。發明 此鳥感春陽先鳴。故能補益陽氣。食之令人不妒。以陽和之氣能勝陰毒也。按陽變止妒。論云。梁武帝郊后性妒。或言倉庚為膳療治。遂令食之。如果減半。

雀卵 甘溫無毒。服水人忌食。發明 雀屬陽而性淫。故能強壯陽事。火衰陰痿精寒者最宜。陰虛火盛者禁用。雀卵治血枯。素問有四鳥。鯽骨一。蘋茹丸。用之最妙。如無雀卵。生雀肝代之。頭血主雀盲。腦用綿裏塞耳治聾。雄雀屎名白丁香。去目中翳膜及面上黑點。但取直者即雄。與假鼠糞無異。入藥有効。

伏翼 即蝙蝠屎。名夜明珠沙。 賦平無毒。伏翼煅灰用。夜明砂淘淨焙用。本經主目瞑瘡。痛用伏翼。近世目科惟用夜明珠。鮮有用皮膚洗。洗時痛。腹中血氣破寒熱。積聚除驚悸。發明 本經治目瞑瘡。痛用伏翼。近世目科惟用夜明珠。鮮有用。伏翼者。要皆取陰肝經血分藥也。其伏翼屎能破結血消積。故目晝盲障。瘡胞淋帶。瘰疬癰疽皆用之。然蝙蝠食之。

大能利人。稍虛者不可輕用。

五靈脂卽寒號蟲矣

苦酸寒小毒研細酒飛去砂石晒乾生用則破血炒用則和血

發明 鴟鴞候時鳥也晉

地有之春夏羽儀豐盛冬時裸形晝夜哀鳴故楊氏丹鉛錄謂之寒號蟲屎名五靈脂謂狀如凝脂而受五行之靈氣也其氣腥穢其味苦酸大傷胃氣綱目言其甘溫恐非正論雖有治目翳中脫疼痛之功惟藜藿庶可應用終非膏粱所宜同蒲黃名失笑散治一切心胸腹脇少腹諸痛及產後結血血崩目中生翳往來不定其性入肝散血最速但性極羶惡脾胃虛者不能勝其氣也

斑鳩 甘平無毒發明 斑鳩補腎故能明目治虛損益氣食之令人不噎目科斑鳩丸錦鳩丸用之取氣血為引導以助補腎明目之功也

伯勞 平有毒發明 方藥未有用者其毛治小兒繼病俗作魅病取毛帶之繼病者母有娠乳兒兒病如瘻痢他日相繼腹大或瘻或發他人有娠相近亦能相繼也北人未識此病

鸚鵡俗名八哥 甘平無毒發明 鵬鵡目和乳汁滴目令人目明能見霄外之物甚言明目之効耳肉治噎逆及五痔止血並炙熟食之

啄木鳥 甘酸平無毒形色與畫眉鳥相似但頭頂有紅毛一片嘴與爪皆堅銳如鐵故能啄木取蠹不可不辨

發明 啄木性專殺蠹故能治人藏府稍蠹之患時珍治勞瘵癰瘻皆取制蟲之義燒灰存性治痔漏蟲管納孔中不過二三次愈丹方治噎膈諸藥不效以之熬膏入麝香一錢匕晝夜六時噴之膈塞自開益噎膈多有因鬱積所致以其善開木鬱之邪也

鷗鷺卽水老鴉 酸鹹溫微毒或云鹹寒誤發明 鷗鷺性寒利水能治腹大如鼓體寒者以鷗鷺燒存性為末米飲服之其骨煅灰蜜調綿裹治魚骨哽與白鷺骨同功嘴骨尤効○鷗鷺屎多在石上色紫如花就石刮取名蜀水花能去面上黓黑屬慈減瘢痕及湯火瘡痕和猪脂敷疔瘡

鷹屎白 微寒無毒本經主傷撻滅瘢發明 虎嘯則風生於地鷹揚則風動於天具體雖殊機應則一鷹具雄健之翮不能長恃無虞至秋火伏金生令行改革勁翮漸脫弱翎未振卽有雄風未遂奮揚是以衆鳥侮之月令

所謂鷹乃祭鳥是也。古聖觸物致思，專取鷹之屎白，減傷撻痕。雖取穢惡，滌清實取其翮之善脫也。後人推而廣之，用以滌除目中宿翳。吹點藥中，咸取用之。其屎中化未盡之毛，謂之鷹條。入陰丹、陽丹，不特取其翮之善脫，以治難脫之病，并取其屎中未化之羽，以消目中未脫之翳。頽脫之妙用，崇古未宣，因顯示後起。母失本經，取用之義。

鷗 溫小毒。發明 鷗鷂鷗骨，皆能接骨。以鷂鳥之力在骨，故以骨治骨。從其類也。折傷斷骨，燒灰每服二錢酒下。在上食後，在下食前，骨即接如初。但在三日內者易治，三日外則難治。以氣血凝滯，不能合轍也。

鷗 鹹平小毒。發明 鷗頭治頭風目眩，顛倒癇疾，千金治頭風眩轉。面上游風有鷗頭酒。聖惠治旋風眩胃。有鷗頭丸，總取旋風健搏之力。

鷗 甘溫小毒。發明 鷗治風癎，噎食，取初生無毛者一對，黃泥固濟，煅存性為末。每服一匙，溫酒服之。頭主痘瘡，黑陷用臘月者燒灰，酒服之當起。

鷄鷂（俗呼鷂） 酸微鹹小毒。發明 鷄鷂不祥之物，古方罕用。近世治傳屍勞瘵，專取陰毒之味，以殺陰毒之蟲也。方用鷄鷂酒煮焙乾，同大蠶蠶七條，攤薄荷上蒸爛，和薯蕷一觔，搗焙細末為丸，空腹酒下三錢。功用與獺肝彷彿。方士用以昏夜露煮，以聚鬼魅，是以至陰之味誘至陰之物也。

鳩 大毒。發明 鳩產蠭毒瘴癰之鄉，鍾毒最烈，非宿積榔，不能自安。以其無枝，人莫能捕也。人欲求自盡者，以翅羽調酒服之，立斃。與鷂頂之毒無異。別錄云：鳩啄殺蝮蛇中人，刮末塗之即愈。如極惡之人，有以用之，未嘗不解危救急也。

獸部

猪 甘平無毒。同驢馬肉食之，令人霍亂。同羊肝食之，令人心悶。與生胡荽同食，傷人臍。發明 猪屬水，獸性廉善，溼飽食無所用力。周身脂膏不流，故人食之，助濕生痰，莫此為甚。而肥盛之人尤非所宜。一種蹄甲白者，有金水相生之象，稍異尋常。鹽漬風乾，製為南腿，有補養脾胃之能。病人食之，略無妨礙。良非鮮者之比。丹溪云：猪肉補陽，陰虛者切宜少食。益肉性入胃，便作濕熱生痰。痰生則氣不降，而諸證作矣。故痰嗽家最忌。然肺燥乾渴，及火嗽痰結者，食之痰即易出，其嗽便止。但不宜過鹹耳。當知助濕生痰，惟中間膘脂一層，專助脾濕。若皮則走肺，益氣精者。

補肝益血。但嫌難消化耳。其汗則全是膘脂鎔化食之滲入經絡。故東垣言之頗詳。千金治打傷青腫。炙精豬肉搗之。小兒火丹。生豬肉切片貼之。漆瘡作瘻。宜啖豬肉。并以豬脂塗之。男女陰蝕。肥猪肉煮汁洗之。不過三十觔瘥。山行石蛭著人足。則穿肌入肉。但以臘脂膏和鹽塗足腰趾。卽不著人也。急救方。治竹木刺入肉。以多年熏肉切片包裹。裏卽出。其腎性堅難化。且藏淫火。最不益人。而治腎虛腰痛。猪腎切開。入人參末一錢。濕紙裹煨。每日空心嚼一枚。或入青娥丸中煮食並効。其治水脹用豬脂丸。便血用藏連丸。皆用以為引藥入病處耳。心血治驚風癲癇。益以心歸心。以血導血之意。得冰片入心經也。卒中惡死。尾血灌之。取其動而不息之意。并縛豚枕之。卽活。蛇入人孔割母猪尾。血滴入卽出。用肝者。肝主藏血。血病用為嚮導。故脫肛肝虛雀目用之。服卽三焦能滌除腎藏邪毒垢膿。故同胡黃連等藥治微瘡最捷。用膽者。取其瀉肝膽之火。故仲景白通湯用為嚮導。益寒能勝。熱滑能潤燥。苦能入心也。傷寒熱邪。燥結有豬膽導法。又膽汁和香油等分。亦治微瘡結毒。清晨連服七日。大便下泄。邪毒最捷。未盡停七日更服。七日餘邪自盡。屢驗。屎脬。治產婦傷膀胱。急用上好人參一兩。入脬中煮食。日日服之。稍或遲延。氣血衰冷。不可療矣。齒治驚癇。乳能斷酒。千金方用之。其膚者。皮上白膏是也。取其鹹寒入腎。用以調陰散熱。故仲景治少陰病下利咽痛。胸滿心煩。有豬膚湯。子當用之。其効最捷。豚卵。治陰莖中疼。驚癇鬼氣蠱毒。除寒熱。貢豚五腫。邪氣攀縮。豬蹄煮湯去油煎。催乳藥。及醃洗潰瘍有効。蹄甲。本經治五痔。伏熱在腹中。腸癰內蝕。令目疾。外障亦用之。豬膽。治風眩腦鳴。凍瘡。瘻疽。塗紙上貼乾則易之。禮記云。食豚去腦。孫真人食忌云。豬膽損男子陽道。酒後尤不可食。延壽安。憎寒微熱。心中欲吐。吐時無物。用新豬尿二升半。內好酒一觔。攬令散。以生布綾取汁。更以綿濾頓服之。卽地鋪暖覆卧。面前著火。常令汗出。得汗待其自乾乃起。亦治風勞蠱毒。燒灰治痘瘡黑陷。無價散用之。又衝沸湯蒸麻疹。陷伏卽起。總取穢惡少辟不祥之氣。同氣相應之用耳。

狗。鹹酸溫無毒。熟病後忌食。妊婦食之。令子無聾。發明。狗屬土而有火。故夕人履其地。雖卧必省。天時亢熱。則卧陰地下。元虛人食之最宜。但食後必發口燥。惟啜米湯以解之。敗瘡稀水不斂。日噉狗肉最佳。痔漏人歲久不

愈。日食自瘥。凡食犬肉不消。心下堅。或腹脹口乾。大渴心急發熱。妄語如狂。或洞下泄。以杏仁一升。合皮熟研。沸湯二升。和取汁。分三服。利下肉片大驗。狗膽本經主明目。取其夜能見物也。陰莖治傷中陰痿不起。除女子帶下十二疾。狗頭骨煅末。止婦人崩中下痢。取其溫而能散也。狗屎中米名戎腹糧。又名白龍砂。主噎膈風病。及痘瘡倒黽用此催漿為最。取其性溫熱也。若乾紫黑焦為血熱毒盛。慎勿誤用。其血能破妖邪。以性屬陽陰邪不能勝之也。

羊甘溫有毒。羊類多種。惟白羯者良。胡羊毛捲。兆羊毛豐肉厚皮薄。並可為裘。牂羊墳首。燔羊色黃。形羸味薄。不堪供餌。凡煮羊忌用銅器。有宿熱者不可食。大病食之必發熱。瘧家及痼疾家食之必發。以其食百草之毒也。羊肉不可共生魚鱉食。能害人。白羊黑首。食其腦作腸癰。羊肝共生椒食之傷人五藏。羊蹄中有白珠者。名羊懸。食之令人癲。羊獨角及四角者。闕外有之。皆有毒不宜食。發明羊為肺家之獸。目無瞳子。周身之氣皆聚於肺。故其氣最腥膻。而性味甘溫。色白補肺。是以昔人有人參補氣。羊肉補形之說。金匱治產後腹中虛痛。及少腹寒疝。並用當歸生薑羊肉湯。專取羊肉之甘溫。煮湯去滓。以助當歸生薑辛散之力。虛滯得以開矣。羊腎治腎虛膀胱熱。胞痹小便淋瀝疼脹。千金腎瀝湯以之為主。羊石子卽羊之外腎。治腎虛精滑。本事金鎖丹用之。羊脬治下虛遺溺。溫水漂淨。入補骨脂焙乾為末。卧時溫酒服半兩。不過四五服。卽瘥。羊肝補肝。專主肝經受傷。目無精光之病。膽治青盲目暗。膽開竅於目。膽汁充則目明。膽汁減則目暗。古方碧雲膏。臘月取羯羊膽。以蜜盛滿。簷簷下。待霜出。取藏。點眼神效。羊乳潤而且補。反胃人宜時時食之。取開胃脫潤大腸之燥也。青羊者尤良。羊肺治嗽止渴。久嗽肺虛者宜之。羊肺主反胃止汗。治虛羸小便數。丰脂生主下痢脫肛。取潤以導之。補中寓濡也。熟主賊風癩痹。潤肌膚。入膏透經絡。風熱毒氣。婦人產後腹中絞痛。中最宜。羊脂潔除藏府垢膩。與豬脂同功。而入肺祛痰尤捷。羊骨稟西方堅勁之氣。最碗。得火煅以濟之。可以消銅鐵故悞吞銅鐵者用之。觀磨鏡者非此不明。其治賊風痹痛。同虎骨煅灰酒服。皆隨痛處取用。羊頭燒火敷小兒頰瘡。并療蠅蠅瘡。羊胎爻乾入藥。亦能補人。與鹿胎紫河車同入六味地黃丸中。名三胎丸。調補腎虛羸瘦。最為得力。羊血解石藥毒。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年一食。前功盡亡。凡服石藥。覺毒發。刺羊血熱飲一升。卽解服地黃。何首烏補藥者忌之。

羖羊角

皮音古
里也

鹹平無毒。

本經主青盲明日。止驚悸寒泄。久服安心血氣輕身殺蟲蟲。入山燒之辟惡虎狼。

本草綱目 卷之二十一

發明 殺羊與羚羊俱是野獸。殺則雄猛倍甚。角亦起稜。與羚羊不殊。但色黑如漆。故專伐腎邪辟不祥。與羚羊大都彷彿。互參本經。此言青盲明日。卽羚羊之專主明日也。此言止驚悸。卽羚之治魔寐也。此言止寒泄。卽羚羊之去惡血注下也。此言久服安心益氣輕身。卽羚羊之益氣起陰氣也。此言殺毒蟲辟惡鬼虎狼。卽羚羊之辟蠱毒吐血。又與羚羊主治不祥也。但此主寒泄。本乎腎虛不能攝津。彼主惡血注下。係乎肝傷不能統血。而別錄治蠱毒吐血。又與羚羊主治相合。究其大綱。此專補救瞳人。彼專消磨腎障。一皆證治之常。至於燒之辟惡鬼虎狼。如此奇突。迥出意外。非尋常之可擬也。

牛 甘溫無毒。同猪肉食之生寸白蟲。獨肝牛善噉蛇。食之傷人。春月自死牛肉。及生疔。牛肉食之令人瘧。急以生甘草煮汁解之。剝膾牛傷手足者。令人脹滿。急宜解之。遲則不救。發明 黃牛肉補氣。與黃耆同功。觀丹溪倒倉法論。而引伸觸類。則牛之補土。可心解矣。又以黃牛肉取四蹄各五片。熬膏去滓。收乾如鹿膠法。名霞天膏。主中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞。五藏六府留痰宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。及大病後極虛羸瘦。每斤入茯苓四兩煩熔。空腹酒服三四錢。肥盛多痰者。每斤入半夏鞠四兩。廣皮二兩。九服大效。牛本屬坤土。而膽主風木。故能鎮肝明日。臘月用釀南星末陰乾。歲久多裂。則苦潤不燥。治經絡風疾。及小兒驚癇。其功不減牛黃。牛骨髓。補中填骨髓。久服增年。能潤澤肌膚。黃牛腦和藥。治頭風腦漏。牛角腮。本經下閉血瘀。血疼痛。女人帶下血崩。燔之酒服。宗奭曰。燒灰主婦人血崩。大便下血。血痢。牛血性溫。能補脾胃諸虛。治便血血痢。一切病後羸瘦。咸宜食之。其膚乃肺系肉團。瓦上焙乾為末。酒服治喉痹氣癰。古方多用之。或以製藥益佳。取引入肺經。以通氣結耳。與猪羊醫療治不殊。牛齒燒灰治小兒癩。牛乳補虛羸止渴。噎膈反胃。大便燥者宜之。入生薑搗白。止小兒風熱吐乳。牛馬肉共生魚食之成鼈瘕。牛尿治水腫。但胃虛少食人勿用。牛屎燒灰。傅小兒痘瘡潰爛。產寶治子死腹中。以濕牛糞塗之。牛鬚草絞汁。治反胃噎膈。取其沾涎之多也。

馬 辛溫有毒。綱目作甘涼。非馬脚無夜眼。白馬黑頭。白馬青蹄者。皆不可食。按下肉食之殺人。肝亦不可食。以鞭驅之傷。皆聚於肝也。食馬肉中毒欲死。以香豉杏仁各二兩。蒸熟杵末服之。或者蘆根汁飲之。發明 按靈樞經云。卒口僻急者。目不合。熱則筋縱目不開。頰筋有寒則急。引頰移口。有熱則弛緩。緩不勝收。故僻治之以馬膏。膏其

急煩以白酒和桂塗其緩頰以秦鈎勾之即以生桑灰置之坎中高下以坐等以膏熨急煩且飲美酒。啜炙肉不飲酒者自強也。為之三拊而已。世多不知此方之妙。竊謂口煩渴辟乃風中血脉也。手足陽明之經絡於口會太陽之經絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而縱。故左中寒則逼熱於右。右中寒則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑痹。營衛凝滯。治法急者緩之。緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩以摩其薄。以通其血脉。用桂酒之辛熱急束以塗其緩。以收其縱。以和其營衛。以通其筋絡。桑能治風痹。通節竅也。病在上者酒以行之。甘以助之。故飲美酒。啜炙肉云耳。馬白睛治癩瘤時發千金方用之。馬心食之善忘。馬肺食之寒熱。姜陽馬鞍下肉食之傷人五藏。馬乳祛風止渴。白馬蹄本經主驚邪瘞癰。乳難辟鬼氣。鬼毒蟲症不祥。別錄止衄內崩齷齒。白馬者治婦人白崩。赤馬者治婦人赤崩。髻毛主小兒驚癇。女子崩中亦白隨其色用之燒灰止血。塗惡瘻尾主女人崩中小兒客忤。白馬陰瘻。本經主傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉肥健生子。野馬陰莖食之令人陰萎。野馬肉食之成馬癇。筋脈不能自收。馬弱微寒小毒。治癥瘕有驗。反胃有蟲積者亦能治之。潰瘍著肉腐爛徹骨。毒能傷人。馬矢煨風痹藥酒。取其透達直入病所也。馬通止血解毒。千金梅師治吐血衄血。肘後治卒中惡吐利不止。經驗治絞腸沙腹痛欲死。俱絞汁服之。又肘後治久痢赤白。聖惠治傷寒勞復。俱燒灰服之。千金治筋骨破傷。以熱馬屎敷之。又治破傷腫痛。以馬屎燒烟熏之。聖惠治疔腫傷風腫痛。以馬屎炒熟熨之。靈樞椒薑桂酒置馬矢溫中。助一切藥力也。令人以馬屎煨烟熏。蠶蠶复蟲無不斃者。食馬肉心煩者飲美酒則解。飲濁酒則劇。

驢——甘溫無毒。綱目作甘涼誤。發明驢肉食之動風。脂肥尤甚。日華子言治一切風。是指烏驢而言。烏驢皮治風補血。東魯阿井水煎膏用之。驢髻敷膏能長鬢髮與馬髻同功。驢莖強陰壯筋與白馬莖同功。驢乳療黃疸濕熱止渴。驢尿專於殺蟲利水止脹。其治噎膈或單服或入四物湯服之。効。驢屎炒熨風腫漏瘡。絞汁主心腹疼痛。治水腫服五合良。

駝峯——甘溫無毒。發明駝峯八珍之一味雖極美。但能動風。宿有風氣人勿食。駝脂摩風去頑皮死肌。取熱氣透肉也。

酪——甘平無毒。發明凡牛羊駝馬之乳並可作酪。南人惟知熱酒冲食。北人必以熬熟冲茶漿服。大能清胃不

助濕熱止煩解渴除心膈熱悶潤腸胃燥結摩腫生精血補虛損壯顏色載原禮云乳酪血液之屬血燥者宜食較之人乳尤勝以其無怒火淫毒也華元化云蛇蟠入耳以酪灌入卽出

酥醍醐

甘寒利下無毒酥酪不可與生魚膾同食令人腹內生蟲

發明 酥酪醍醐性皆滑潤故血熱枯燥之人

咸宜用之又傷熱失音用以通聲最妙凡炎一切氣血堅韌筋骨藥俱不可少但脾胃虛滑者禁用

阿膠

甘平微溫無毒辨真偽法以項有鬃文極圓整者為真折之沉亮不作屑不作皮是蛤粉炒成珠經月不軟

者為佳東阿產者雖假猶無妨害

其水膠入木炭質造有傷脾氣慎不可用本經主心腹內崩勞極洒酒如瘡狀

腰腹痛四肢酸疼

女子下血安胎久服輕身益氣發明 阿井本淄水之源色黑性輕故能益肺補腎兼用烏鵲

必陽谷山中驗其舌黑其皮表裏通黑者

用以熬膠則能補血止血本經治心腹內崩下血安胎為諸失血要藥勞

證效峻急

肺痿肺癆潤燥滋大腸治下痢便膿血所謂陰不足者補之以味也

黃明膠即廣

甘平無毒發明 明膠治吐血衄血下血血淋血痢妊娠胎動下血風濕走注疼痛打撲傷湯火

傷一切癰疽腫毒

治血止痛潤燥利大小腸皆取其有滋益之功無滑利之患

牛黃

苦平小毒試真假法揩摩舌甲其體輕氣香置舌上先苦後甘清涼透心者為真喝迫而得者名生神黃圓

滑外有血絲嫩黃層多者為上穀後取者其形雖圓下面必扁者次之在角中者名角黃心中剝得者名心黃膽中

得之名膽黃則又次之產西戎者為西黃產廣東者名廣黃本經主驚癇寒熱盛狂症除邪逐鬼發明牛

有黃是牛之病也因其病之在心及肝膽之間凝結成黃故還治心及肝膽之病本經治驚癇寒熱狂症邪鬼皆疾

熱所致其功長於清心化熱利痰涼驚安神辟惡故清心牛黃丸以之為君其風中心藏者亦必用之若中經中府

者誤用引邪深入如油入麪莫之能出宜詳審而用可也

狗寶

甘苦溫小毒狀如白石微帶青色擊碎其理如蠶白臘者真發明 狗寶專治噎膈反胃之病取苦能下

降溫能開結也予嘗推廣其用凡癰疽潰瘍不收癰狂冷瘻積結無不可用惟鬱結傷脾氣血枯槁者誤投則有負

薪救火之厄

獅油

辛溫有毒色微黑者真發明 獅為百獸之長性最難馴一吼則百獸辟易爾雅言其食虎豹熊太古言

本經卷四

獸部

其乳入牛羊馬乳中皆化成水。西域人捕得取其油入貢以供宮人。滌除衣垢之用又能去紙上墨跡。刮少許隔紙熨之卽脫。嘗試用垢雖去而衣易毀。紙易脆僅供一時之用。雖係方物方藥罕用。近世醫師以之治噎膈病。蓋噎膈皆營疾癥所致。用取滌垢之意試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性最猛烈力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢滌痕。但不能去墨跡耳。

虎骨 单微熱無毒。骨取黃潤者良。若帶青黑色乃藥箭射者有毒勿用。酥炙黃脆用之。發明 虎陰也。風陽也。虎金也。風木也。虎嘯風生木承金制。陽出陰藏之義。故骨能追風定痛。強筋壯骨。風病攀急。膏節風毒為之要藥。虎之一身。節節氣力皆出前足。故膝脰為勝。而前左脰尤良。以卧必用左脰為枕也。然按病之前後左右取用。其效尤捷。入陰陽二疊。虎睛定魄。千金治狂邪有虎睛湯丸。並酒浸炙乾用。一時不可得。以珍珠蝦末代之。總取定魄之用也。虎膽治反胃吐食。新瓦上煅存性入平胃散末和勻。空腹白湯服三錢效。虎頭骨治頭風藥中漫酒服作枕止癓。虎長牙辟邪殺蟲傳尸方用之。

象皮 鹹溫無毒。發明 象秉西方金氣。金令主藏。不宜擅鳴。鳴主金象大非所宜。其皮專於收斂。其肉壅腫。人以斧刀刺之。半日即合。故治金瘡不合者。用其皮煅存性敷之。若入長肉諸膏藥切片酥拌炙之。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨礪之末。生蜜調塗治諸鐵雜物入肉。舊折刮薄片屑。溫湯頻服。治竹木刺。及諸魚骨鰓。卽時吐出。不吐再服。以吐出為度。非刮下薄片不能應手也。

犀角 苦微鹹。大寒無毒。鎛成以熱手掌摸之。香者為真。臭者卽假。忌瀉鹽烏附。孕婦勿服。能消胎氣。發明 犀之精靈皆聚於角。足陽明胃為水穀之海。飲食藥物必先受之。故犀角能涼血散血及畜血驚狂。斑痘之證皆取以通利陽明。血結耳。別錄治傷寒溫疫。頭痛寒熱諸毒。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之棘。所以能解毒。凡蠱毒之人。遇有飲食。以犀筋攬之。有毒則生白沫。無毒則否。宗奭曰。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力盡在是也。其治吐血衄血。大小便血。犀角地黃湯為之專藥。若患久氣虛。又為切禁。以其能耗散血氣也。痘瘡之血熱毒盛者。尤為必需。然在六七日灌漿之時。又為切禁。以其能化膿為水也。而結痂後餘毒癰腫。則又不忌。惟氣虛毒盛之痘。切不可犯。其性大寒。無大熱邪者。慎不可用。凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈。又感山嵐瘴氣。射工溪毒。用生犀磨汁服之卽解。

熊脂肉

甘溫無毒

本經主風痹不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭癟白禿面上奸皰

發明

熊票雄毅

之性故其脂可開風痹不仁等疾可服可摩但不可作燈烟氣薰目使人不能遠視本經所主不出風痹筋急之用風為陽邪能為陽獸其性溫潤能通行經絡開通血氣也能筋亦能壯筋強力與虎骨之搜風壯骨無異熊肉振羸其氣有餘癆病人食之終身不愈

熊膽

苦寒無毒試法取少許研滴水中掛下如線直至水底不散者為真

發明

熊膽苦入心寒勝濕手少陰足厥陰藥也其性潔不染塵故能清心平肝為時氣熱盛變為黃疸之要藥又能殺蟲明日除醫瘴疳瘡蟲牙蛇痛

小兒驚癇瘧症以竹瀝化豆大許服之去心中涎痔瘡赤腫水化點之卽消凡實熱之證用之咸宜苟涉虛家便當

嚴禁

麋羊角

卽羚羊角

鹹寒無毒鎊碎胸前煨熱令脆研如粉不則粘人腸胃

本經主

明日益氣起陰去惡血注下辟鹽

毒惡鬼不祥

驚癇

發明

羚羊屬木入足厥陰伐肝最捷目暗障而羚羊角能平之痘瘡正面稠密不能起發

而羚羊能分之小兒驚癇婦人子癥

大人中風搐搦及筋寒厯節痛而羚羊角能舒之驚駭不寧狂越驚癇而羚羊

角能安之惡鬼不祥而羚羊角能辟之惡血注下

鹽毒痘瘡瘻瘍產後血氣而羚羊角能散之濕熱留滯陽氣

不振陰器衰痿而羚羊角能起之煩憊氣逆噎塞不通

鬱為寒熱而羚羊角能降之詳本經所主皆取散厥陰血結耳愚按諸角皆能入肝散血解毒而犀角為之首推以其專食百草之毒兼走陽明力能祛之外出也故痘瘡之血

熱毒盛者為之必需若痘瘡之毒并在氣分而正面稠密不能起發者又須羚羊角以分解其勢使惡血流於他處

此非犀角之所能也人但知羚羊角能消目翳定驚癇而散痘瘡惡血之功人所共昧殺羊角治青盲目暗與羚羊

角不殊而辟除邪魅靈毒亦相彷彿惜乎從未之聞惟消乳癬丹方用之白鶴羊角亦能消乳癬而方家每用琉璃

角燈磁片刮取薄屑置胸中候腕杵細酒服方寸匙屢效專取宿腐之味以消陳積之殆也其鹿角刮屑善消虛人

乳腫未潰卽消已潰卽斂

卽本經主漏下惡血之治龍角治神魂不寧功用與龍齒略同千金方中有齒角並用者

牛角肥專主閉血崩牛之一身惟此無用而本經特為採錄千金尤為崩漏要藥可見天地間無棄物也

山羊血

鹹溫無毒

苗人以桑竹通節削鋒利活刺心血收斂者良草取者不堪用

發明

山羊產滇蜀諸山中性善走逐好闖肉能療冷勞山

嵐瘡病婦人赤白帶下其心血綑目失載性溫味鹹為和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醉醒其骨自續每用不過分許不可多服雖不傷耗元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣但舉世用者絕罕間有收取而市者其價重等於牛黃且心血絕不易得滲血丹用之真虛勞失血之續命丹也

鹿耳 甘溫無毒形如茄子色如瑪瑙者良紫潤圓短者為上毛瘦枯鰥尖長生政者為下酥炙酒炙各隨本方但不可過佳有傷氣血之性炙後去頂骨用耳 本經主漏下惡血寒熱癆益氣強志生齒不老。發明 鹿是山獸屬陽性淫而遊山夏至得陰氣而解角從陽退之象麋是澤獸屬陰性淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象鹿耳功用專主傷中勞絕腰痛羸瘦取其補火助陽生精益髓強筋健骨固精攝便下元虛人頭旋眼黑皆宜用之本經治漏下惡血是陽虛不能統陰即寒熱驚癇皆肝腎精血不足所致也角乃督脈所發督為腎藏外垣外垣既固腎氣內充命門相火不致妄動氣血精津得以凝聚扶陽固陰非他草木可比八味丸中加鹿茸五味子名十補丸為峻補命門真元之專藥傳尸瘍瘻瘧中生蟲習習痒痛浙浙作聲者同生犀鼈甲入六味丸中其殺蟲之力與天靈蓋同功近世鹿茸與麋茸等卒能辨別大抵其質粗壯而腦骨堅厚其毛蒼蠶而雜白毛者為麋茸其形差瘦而腦骨差薄其毛荀澤而無白毛者為鹿茸鹿茸補督脈之真陽麋茸補督脈陰中之陽不可不辨。

鹿角膠 甘微鹹溫無毒河南者味甘溫為上泊上者味鹹辛為下又生取成對者力勝解下單角力薄凡角大而毛色淡白者卽為麋角能補陽中之陰熬膠法取角寸截用長流水浸三日刮淨入黃臘煮三日夜乾即添水二日夜足去角取汁重煎滴水不化膠成切片陰乾不可日晒晒則融化成水矣今市者多以黃明膠加楮實偽充不可不察取嫩角寸截置小罈中洒水相和益蓋泥封糠火煨三伏時搗細如霜名鹿角霜 本經主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣力婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年 發明 鹿角生用則散熱行血消腫辟邪熟膠則益陽補腎強精活血總不出通督脈補命門之用但膠力稍緩不能如茸之力峻耳互參二條經旨乃知茸有交通陽維之功膠有緣合衝任之用然非助桂以通其陽不能除寒熱驚癇非龜鹿二膠並用不能達任而治羸瘦腰痛非輔當歸地黃不能引入衝脈而治婦人血閉胎漏至若膠治傷中絕勞卽茸主漏下惡下也膠之補中益氣力卽茸之

益氣強志也。膠之輕身延年，卽耳之生齒不老也。歷攷別錄外臺千金等方，散血解毒居多。非如近世耑一溫補為務。殊失聖賢一脈相傳之義。○鹿角霜治火不生土，脾胃虛寒，食少便溏。胃反嘔逆之疾，取溫中而不粘滯也。古方多製應用。今人每以煎過膠者代充，其膠既去，服之何益。○生角、銹尖屑消乳癰腫毒。○煅灰行崩中積血。○鹿骨安胎下氣作酒主內虛，續絕傷，補骨除風。千金鹿骨丹用之。

鹿胎 甘溫無毒。其嘴尾蹄合與生鹿無異者為真。其色淡形瘦者為鹿胎。若色深形肥者為麋胎。慎勿誤用。能損真陽。又獐胎與鹿胎相類，但色皎白，且其下脣不若鹿之長於上脣也。其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也。入藥取真者，酥炙黃用。發明 鹿性補陽益精。男子真元不足者宜之。不特茸角莖胎入藥而全鹿丸合大劑參耆桂附大壯元陽。其胎純陽未散，宜為補養。天眞滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之。尤為得力。如平素虛寒，下元不足者，入六味丸中為溫補精血之要藥。而無桂附半熱傷陰之患。但慎勿誤用鹿胎，反傷天元陽氣也。

麋耳 甘溫無毒。修治與鹿茸同。發明 麋肉大寒。食之令人陽痿。而麋耳大益陽道。以其陽精都聚於角也。其角煎膠勝於鹿角。茸亦勝於鹿茸。然鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古微旨。治虛損有二至丸兩角並用。但其藥性過溫，偏於補陽，非陰虛者所宜。其麋膠主治與鹿膠無異。而兼補陰血之功，過於鹿膠。但驗其角大而毛者即是。惜乎本經但言麋脂療癰腫惡瘡死肌寒熱濕痹。四肢拘緩不收。風頭腫氣通腠理。從無及乎茸角之用。彭箋延齡方有麋角粉，千金變為麋角丸，以麋性喜菖蒲。故修煉服食方用之。金匱云：麋脂卽梅子。若妊娠食之，令子青盲。男子傷精皆性冷。傷厥陰肝經之驗也。

麋鹿肉 麋肉甘寒。鹿肉甘溫無毒。發明 凡獸之有角者皆能助肝腎督火。而麋鹿之角多岐，故力能拒虎。為角獸之冠，則鹿肉之補陽，麋肉之益陰，所不待言。鹿之一身所稟皆陽，最能益人。人以陽氣為主也。麋之一身所稟皆陰，惟角為陰中之陽。較之鹿角純陽無陰，倍勝。而週身血肉筋骨皆不足，取鹿肉之生者，主中風口僻不正，剗碎薄貼僻上，正急去之，不爾復牽向不僻處矣。○鹿血起陰器止腰痛，療折傷和酒服。治肺痿消中諸氣刺痛，飲之立愈。鹿筋大壯筋骨。食之令人不畏寒冷。但須辨骨細者為鹿粗者，即是麋筋。悞食多致陰瘻。○凡服丹石藥人勿食鹿肉。以其食百草之毒，善解諸藥之性也。

麝 甘寒無毒。發明 麝之性怯畏人。以其膽白易驚也。其肉雖肥但能悅澤人面。不能助人聰力。以其善躍而無久常之力也。麝能治人粗豪之氣。若人素常膽怯者為之切禁。其骨主虛羸泄精。麝稟偏陰而骨主精氣也。綱目言其甘溫。安有膽白易驚而性甘溫之理。

麝腦 辛溫無毒。不可犯大妊娠禁。用能力能墮胎。令人以荔枝核燒灰入燒酒拌和混充不可不察。本經辟惡氣殺鬼精物去三蟲鹽毒。溫瘡驚癇。發明 麝香辛溫芳烈為通關利竅之專藥。凡邪氣著人淹伏不起。則關竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨節俱開。從此而出。故本經有辟惡氣殺鬼精物去三蟲鹽毒諸治也。其主溫瘡驚癇者。借其氣以達病所也。嚴氏言。風病必先用麝香。丹溪謂風病必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅入筋能通筋竅之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣諸血諸病驚癇癩瘕諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不用為引導以開之通之。惟中風表證未除。而誤用之。引邪入犯。如油入麪。莫之能出。致成痼疾。為之切戒。而救苦丹治壅腫結塊方。用硫黃辰砂入麝烊化隔紙壓成薄片。以少許灸患處。無不立應。濟生方治食瓜菜成積作脹。及飲酒成消渴者。皆用之。蓋果得麝則壞酒得麝則敗。此得用麝之理也。

貓 甘酸溫無毒。發明 貓捕生鼠虎噉生人。大小雖異。稟性不殊。虎嘯風生而治風痹。腫痛。貓聲鼠竄而主鼠瘻。寒熱。故肘後方取貓肉作羹。消鼠瘻結核。已潰未潰皆愈。但助濕發毒。有濕毒人忌之。其頭骨及腦眼酥炙亦治癩癩。鼠瘻。其毛煅存性。傅療癩癩。潰爛。貓尿治蟬聾入耳。滴入卽出。以薑擦貓鼻或生葱刺鼻取之。屎治痘瘡倒陷。臘月取乾者燒存性。用之貓胞。治噎膈反胃。以純陽之性未散。故取以開陰邪之結也。方用一具。酥炙為末。入臍麝牛黃鬱金各少許。津唾乞服之。子嘗以格致之理論。物類貓之體陽而用陰。性稟陰賊機。竊地支。故其日夜視精明。而相感之應若此。而食江中鱠魚之骨。其胎必墮。按異物志云。鱠是鼈鳥所化。故腹內尚有鳥腎二枚。與雀入淮水為蛤無異。其肉中細骨如毛。粘腸不脫而致傷胎。物類感觸之應。則又如此。

狸 甘溫無毒。發明 狸之與貓同類異種。以性溫散。故其骨爻反。善開陰邪鬱結之氣。鼠瘻寒熱為之專藥。千金以內治遊風蘇頌作臍治鼠瘻。元化取頭骨千金用陰莖。炮取攻毒破結之義。時珍曰。狸骨貓骨性皆相近。可用

狼 肉鹹熱無毒。發明 狼脂摩風首推而本草不錄亦一久事。狼肉補五藏厚腸胃填骨髓有冷積人宜食。○狼性追風逆行故其矢燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也。

兔 辛平無毒妊娠忌食兔肉合乾薑食之成霍亂

○發明 兔無脾改善走二月建卯木位木克戊土故無脾其

肉性寒能治胃熱嘔逆腸紅下血其腦為髓之精性善滑胎故兔腦丸為催生首藥然須臘月取活兔用之始驗○免肝明日目屬肝稟氣獨勝且得至陰之精可救目暗之疾其屎謂明月沙又名望月沙治目中浮翳痘瘡患眼但

瞳人無損者用以煅灰存性日日服之其腎自退又方免屎一味為末生雞肝搗爛為丸空腹穀精湯服之醫厚加雞內金尤捷兼治勞瘵五疳痔瘻殺蟲解毒黃帝曰兔肉和獺肝食之成遁尸

狐陰莖

甘平有小毒

○發明

狐屬陰類故其莖主女子絕產陰中癢小兒陰癩卵腫以狐陰善縮入腹也

水獺肝

甘鹹平小毒

○發明

獺者水獸水性靈明故其性亦多智詭性專嗜魚魚之生氣都聚於肝是以獺肝

專主傳尸癆癧殺蟲之性與獺之捕魚不殊蘇頌曰諸畜之肝皆有定數惟獺一月一葉十二葉間有退葉斗柄建寅之月值其氣退之時反為諸魚所蝕月令所謂獺祭魚者也以其治療有驗故仲景治冷勞有獺肝丸崔氏治蠱症亦有獺肝丸孟诜云疰病一門患者以獺肝一具火炙水服方寸七日再服之葛洪言戶疰乃五疰之一病則使人寒熱沉沉默默不知病之所苦無處不惡積月累年淹滯至死後復傳他人乃至滅門覺有此候惟以獺肝一具陰乾為末水服方寸匕日三以瘥為度如無獺肝獺爪亦可應用小兒鬼疰及諸魚骨鯁皆燒灰酒服獺肝之用當不出乎此也

山獺莖

甘熱無毒

○發明

山獺稟南奧純陽之氣故其性最淫專主陽虛陰痿精寒山中有此凡牝獸皆避去

獺無偶則抱木而枯凡女春時入山獺聞婦人氣躍來抱合牢不可脫因扼殺而取之也

膾肺臍

一名海狗腎

鹹大熱無毒以漢椒樟腦同收則不壞

○發明

和劑局方治諸虛損有膾肺臍丸滋陰丸藥中

用之精不足者補之以味也令人多於房衍方中用之亦可同糯米法釀酒服但功專補陽陰虛切忌此物牝者最多而牡者絕少海州人博得牝者以家狗外腎用筋縫上熨貼如生成無二然牝戶與穀道連合為一雖用生筋縫熨其孔較牡者大而且長以此辨之最為有據

牡鼠 甘溫無毒。取膽法用活鼠繫定熱湯浸死破喉取膽。真紅色者是也。誤食鼠噉之餘令人發瘡瘍。以貪慾之火。纏積饑延也。發明 咳水位在於子。通氣於腎。其目夜明。其精在膽。故膽能治耳聾。目盲。睛能明。目骨能生齒。皆益腎之驗。肘後方治三十年老聾卒聾不過三度即愈。令人側卧。懸膽汁入耳。盡膽一枚。須臾汁從下耳出。初時益聾十日後乃瘥也。生鼠血蘸青鹽擦牙宣有効。初生小鼠香油浸腐化取塗火燙效。少水能制壯火也。若生毛則不能消融矣。牡鼠糞俗名兩頭尖。驗其直者方是牡鼠之矢。入足厥陰少陰。故煮服治傷寒勞復陰陽易腹痛研末服治乳癰燒灰存性。傅折傷疔腫所主皆厥陰血分之病。又犬咬先洗去牙垢惡血。用鼠糞炒研。黑糖調塗即愈。猾皮 苦平無毒。細剉炒黑或酥炙用。本經主五痔陰蝕。下血不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。發明 猥者胃之獸也。故肉治反胃。胃脘痛最捷。其皮除目中醫障。本經主五痔陰蝕。取其銳利破血也。酒煮治陰腫痛引腰背。取筋脈能收縱也。南方金蠶鹽用猾皮為末。酒服探吐之。猾腦猾肝治療癰痕漏。千金方用之。但不可食其骨。令人瘦劣。

人部

髮 若微溫無毒。揀去白者先用滾水洗淨入燶成罐。外用鹽泥固濟。燶候內外確通。紅冷定研末置地去火毒用。本經主五癰闊格不通利小便水道。療小兒驚大人瘧仍自還神化。發明 紋者血之餘。故能治血病。雖曰補真陰。療驚癇理欬嗽。固崩帶止血暈而實消瘀生新能去心竅惡血並煅過服。若煅之不透。反能動血。合雞子黃。香油煎之。消化為水。則治小兒胎驚及塗癩瘡有效。用入膏藥中。則長肉消瘀。本經治五癰闊格不通利小便水道。皆取其利竅散瘀之功。其療小兒驚大人瘧以能達肝心二經。開通瘀血之滯也。仍自還神化者。言服自己之髮。則勝用他人之髮也。但胃虛人勿用。以其能作嘔瀉也。亂髮功用與此不殊。而利下者尤勝。取長之速也。小兒胎髮煅灰大解胎毒。而補先天血氣。以純陽未離也。

頭垢 鹹苦溫小毒。發明 頭垢乃相火之餘氣結成。專開鬢結之氣。乳癰初起。煅灰酒服即消。以其善祛胃中積垢也。

人乳汁 甘鹹平無毒。發明 乳汁治目之功甚捷。目得血而能視。乳即血之源也。用以點眼。豈不相宜。老人服

食尤良。但脾虛易濁者勿食。日中曝乾入參苓丸服。尤為合宜。

爪甲 甘鹹小毒。發明 爪乃肝氣之餘。其性銳利。故能催生下胞。衣利小便。治尿血及陰陽易病。破傷風去目翳。刮末治鼻衄。噙之立止。又能治乳蛾。用爪指甲不拘多少。煅為末。蓬砂白礬各一錢。西牛黃一分。烏梅白梅肉各五枚。共搗如泥。含彈大丸。疾大湧出三四丸即愈。但其方酸收太速。不無萌發之患。莫若探吐頑痰。迅掃病根。為愈人牙 甘鹹熱有毒。發明 牙乃腎之標骨之餘。痘瘡倒黡。用人牙散。因痘瘡為風寒濕氣所觸。而變黑倒黡。用此煅灰。以酒麝達之。竄入腎經。發出毒氣。乃劫劑也。若伏熱在心。昏冒不省人事。及氣虛色白。瘡瘍不能作膿。熱瘡紫泡之證。正宜涼血解毒。苟誤用之。則鬱悶聲啞。反成不救。臨證審諸。

人中黃 甘鹹寒無毒。造法用大竹截段兩頭留節。削去外皮。傍鑽一孔。用甘草細末入滿於中。以蕉扇柄削圓塞孔。冬至浸大糞池內。立春後取出。懸風處晒乾。取用。又法如前製竹。不入甘草。但用蕉扇柄或杉木塞孔。浸糞池中。以取其汁。與金汁無異。僅供一時。取用不能久藏。糞清亦解瘟熱諸毒。又誤食毒菌楓樹上菌及過食銀杏。脹閉欲死者。悉能解之。并解砒石野葛野羊等毒。即家芋三年不收。花開如蓮者。亦能殺人。急取灌吐。方可得生。發明 人中黃取糞土之精。以解天行狂熱溫毒。發斑最捷。然汁則性速而能解毒。兼治河豚菌毒。一切惡瘡災病。用人中黃酒大黃末等分。無灰酒服。須臾濁利。毒即隨出。雖大渴不可飲水。飲水則毒邪不散。而難救也。急切不可得。以糞坑垢代之。

金汁 苦寒無毒。臘月取糞。置罐中埋土內。越三年。取出如水者是。發明 金汁得土氣最久。大解熱毒。故溫熱時行。昏熱勢劇者。用以灌之下咽。其勢立減。初生小兒。週時內毒邪不散。服一二合。勝化毒丹。胎毒盡解。無痘疹患者。此屢驗者。但胎氣虛寒。體瘦色白者。不可誤用。誤用反奪天真。多致夭枉。不可不慎。圈叟用以灌諸草木。卽花葉茂盛。且無過壅傷花之患。

乾糞灰 鹹平無毒。發明 人屎取乾者煅灰。治小兒痘瘡黑陷。解時行大熱狂走。蜜調塗疔腫。拔毒出根。總取溺。鹹寒無毒。童子者佳。不可見火。見火則腥臊難服。發明 人溺療寒熱頭疼。取其鹹寒降泄。也有客邪沖熱解毒之迅耳。

葱頭湯服之。汗出即止而童子小便性純。一切熱勞吐血。陰虛火動。骨蒸勞瘵。用以降火最速。產後血暈。溫飲一杯。壓下敗血惡血。卽蘇。蓋洩濁滋陰降火。消瘀血止吐衄諸血。每用益許。入薑汁一二匙。徐徐服之。久自有功效。須乘熱服之。以接生陽之氣。冷則生氣散矣。時珍云。童便入胃。隨脾氣上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。乃其舊路也。故能清肺導火下行。若多服久服。亦能損胃滑腸。故食少便溏者禁用。傷寒少陰證。下利不止。厥逆無脈。乾嘔欲飲水者。加人尿。猪膽汁。鹹苦寒物於白通湯薑附藥中。其氣相從。可無格拒之患。但胃虛欲作嘔者勿與。恐助嘔勢。反致不測也。

溺白瑩卽人舌諸瘡。用之有効。降火之驗也。但積垢之滓。僅堪滌熱。略無益陰之功耳。

秋石
藏溫無毒。陰煉淡秋石法。將大缸一隻。近底三寸許艾火燒三十餘炷。打成一孔。杉木塞之。秋月取童子溺入缸內。衝河水攬澄定。去木塞放去上水。每日增童便河水。如前攬之。只留缸底者。積至月餘。用絹篩。襯紙。瀝乾收之。○又陰收秋石法。將鉛錠大小數十枚。俱兩片合成。多鑽孔眼。入尿桶中浸。每日傾去宿尿。換溺浸之。經秋收取。置鉛罐藏之。此為最勝。○陽煉秋石。將草鞋數百隻。舊者尤佳。長流水漂晒七日。去黃色。浸尿桶中。日晒夜浸。一月許。曝乾。烈日中燒灰。須煪挑撥令燒盡。涼湯淋汁澄數日。鍋內燒乾。重加雨水者溶。篾撈紙數重。瀝淨再澄。半月餘。銀缶器內煮。乾色白如霜。鉛罐收之。○又陽煉法。以童子小便入鍋熬乾。其鍋先燒通紅。香油熬過洗淨。則不粘滯。傷鍋。初如油腳。入燶成罐。或小鐵盒中。燶通紅。用熱水熔化。置有嘴壺中。將草掩塞壺口。徐徐傾出。下以竹蓆。襯紙。瀝清。再以文火收乾。鉛罐收之。則不熔化。○又煉秋冰法。以秋石入秋露水煮化。入燶成罐內。新鐵蓋蓋定。鹽泥固。瀉昇打三炷。香取出再研。如前昇打。蓋內用水。徐徐塗之。水不可多。多則不結。又不可少。少則不昇。從辰至未。退火冷定。蓋上昇起者。為秋冰。乃秋石之精英。真虛羸之神丹也。○凡人力制造之藥。每多偽充。而秋石之真者。尤不易得。有以食鹽瀝水者。或者有以朴硝溶化製造者。有以礮硝烊化順成錠式者。其偽不一。苟非雇庸督製。總難輕用也。試真偽。入滾豆腐漿中。不結腐花者為真。若結者。卽鹽之偽充也。入口令人作渴。入滾豆腐漿中。起水紋而微苦者。卽玄明粉之偽充也。入腹令人作瀉。其傾成錠式。入熱水不易化者。卽礮硝之偽充也。下咽令人發熱。又以秋

石化水入青菜葉。有項色不癢者為真。又以少許入眼不澁痛者必真無疑。其淡秋石入滾水不化者。卽熟石膏末及滑石末混充也。發明 秋石以秋命名。專取秋氣下降之意。他時製者功力則殊。製法以童溺煅煉去其鹹寒。轉成溫補能滋陰降火而不傷胃。補益下元真火。散瘀血助陰精降邪火歸真陽止虛熱。收血骨蒸勞瘵之仙品也。火盛者宜生宜淡。陰虛者宜熟宜鹹。凡勞瘵陰火亢極而不受參耆補益者。立秋石丸三方。次第施之或服或噙。則喘欬氣息漸平。痰亦易出。嗽亦省力。以其性味鹹降而無上逆之患也。先用薤汁炒黑大黃淨末與秋石等分煮紅棗肉為丸空心服三錢清熱散血。次用貝母秋石末各等分生甘草末減半。仍用紅棗肉為丸服之以止嗽消痰。後用人參秋石等分炙甘草末減半亦棗肉丸以補氣安神。製劑之多少隨病熱元氣而施不可限以分兩。其陰燥淡者性最下澀。苟非陰分熱極難以輕投。陰虛多火小便頻數精氣不固者誤服令人小便不禁甚則令人夢泄。其鹹者可代鹽蘸物食之。喘欬煩渴不得寐者以半錢匙衝開水服之卽得安寐。覺時滿口生津亦不作渴。補陰之功可知。陰燥淡秋石治夏暑熱淋小便不通及濁淋沙石淋肉淋老人絕慾太旱小便淋澁澀痛一服卽效。

紅鉛 鹹大溫無毒。卽室女初通經水中之結塊如櫻桃者是也。發明 紅鉛流穢之餘其性大熱峻補命門淫火陳酒服一枚少頃蒙昧如醉若連服二枚則邪火內拒令人暴亡壯火食氣之驗也。

天靈蓋 鹹溫小毒。制法以香水滌淨。酥炙杵細入藥或煎酒或煅末隨證取用忌鐵器。發明 腦為髓海諸陽之會能辟一切陰邪不正之氣故曰天靈。凡人身中氣血安和諸邪不能侵犯。陰陽乖戾則屍疰之氣得以乘虛襲入是卽瘵蟲之根氣也。若其人平昔陽衰則蟲攻脊脣脊中淫淫作癢隱隱作痛轉側不能自安或時凜凜畏寒或時翕翕發熱手足四末常清脈來弦細乏力非天靈益散不能療之。若其人素稟陰虛則蟲蝕藏府胸中嘈雜如饑默默不知所苦無處不苦動則時欬時嘔靜則善寐忘忘面上忽時呴熱脈多弦勁搏指此屬類肝九證非天靈之所宣其天靈散方用炙淨三指大一片赤橘榔三枚白甘遂麝香真安息各三分阿魏二分辰砂一分搗羅為散桃枝煎湯五更調進一服約人行十里噴蟲不下再進一服天明進第三服取下蟲物急擒入油鑑熬之其蟲嘴黃亦者可卜病人血氣未艾治之可愈。青黑白者血氣已竭治之難已然亦得斷傳染之患。凡修合勿令病人知擇僻淨處忌雞犬婦人孝服者見蟲下後忌肥鮮及鹽半月白粥調養漸安。如病久不勝甘遂阿魏等攻逐只以天靈益香

水潔淨。仰置銀壺器內。盛以醇酒。隔水煮一官香。酒耗旋添候一炷香足。取酒服之。少頃頭旋顱脹。察蟲隨呴吐出。卽以燼大燎之。將養三日後。取前蓋膏。製服如前。蟲盡。卽以蓋膏。仍埋舊處。其虫淨細末。并治小兒痘瘡灰白。陷伏不長。煩躁不寧。酒服四五分。卽起。然皆不得已而用之。至於傳下部疮。入枯痔散。乃以人之至高之骨。置之汚下。不潔之處。雖極其神驗。殊非仁人君子之用心。舍此豈無他藥可治乎。

人胞即紫河車 甘鹹溫無毒。取厚小色鮮者。挑去血絡。漂淨血水。入板一握。沸湯泡去腥水。以蜂蜜和長流水於舊錫器內。隔水文火煮爛如糜。綿絞去滓。代蜜糊丸藥良。發明 紫河車稟受精血。結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。喘虛勞之疾。是補之以味也。自丹溪極言其功。而吳球創大造丸。雖世所推重。然方中生地黃柏。天冬夢冬。龜版。一派滋膩傷胃之品。雖有人參一味。反助羣陰之勢。服之每致傷中嘔泄。未見其可。惟永類鈎方。河車丸方。用人包一具。山藥二兩。人參一兩。茯苓五錢。酒糊為丸。近世改用鮮者。隔水煮。搗作丸。尤為得力。卽虛人服之。未嘗傷犯胃氣。

胞衣水 鹹潤微涼無毒。臘月取紫河車。置有益瓦罐內。深埋土中。臨用取出。不可留太久。卽乾矣。或與生甘草末同入罐中。埋於土中。三五年後掘出。卽為藥也。發明 胞衣之性本熱。而得土氣之化。善能攝火歸元。小兒丹毒。諸熱毒發。寒熱不歇。狂言妄語。頭上無髮。髮豎。虛浮等證。天行熱疾。咽痛。及虛勞咽痛。飲之立効。反胃久病。飲一錢。當有蟲出。

初生臍帶 發明 脍帶者人之命帶也。用以煅末。入硃砂少許。蜜水調服。以解本嬰之胎毒。與內傷之用骨火無異。

胎元 鹹大溫小毒。發明 胎元雖墮胎。胎息淫火未離。天真未剖。較河車之性倍甚。古方鮮用。惟金剛丸用之。雖以人補人。然獸相食。且人惡之。況人食人。能無憚怛之念乎。