

傷寒

杭州圖書館



傷寒部
身重
喘
遺尿
盜汗
筋惕肉瞤
藏結結胃痞氣同異
結胃

難轉側
戰慄振搖
驚悸
痞煩
小便難
瘧狀
鼻衄
短氣
寒身寒惡熱
合病併病汗不吐後等病
太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

瘧狀
頭汗
舌白胎
畜血
吐血
動氣

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

合病宜

汗

宜和

宜下

併病宜

汗

宜下

表裏

喘發熱

脈浮為

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊痠鼻

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

傷寒部

表

乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而冒滿者麻黃湯也治以麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯論見發熱陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯論見大便喘家有汗桂枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝去波芍藥各一兩 甘草多 厚朴各六錢

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚劈破同煎至八分溫服覆取微汗

喘潮熱腹滿大便秘脈沉為裏表不解乾嘔發熱喘者小青龍去麻黃加杏仁湯論見陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯見

裏

不大便秘云在裏而喘者腹滿在表而喘者腹不滿小便不利大便乍難乍易微熱喘冒不能臥者大承氣湯脈沉喘滿反發汗大便難者裏實論見

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩 杏仁五十箇 甘草二兩 石膏半斤

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘 汗後脈沉喘滿大便難語者裏實論見下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯 下後利不止脈促而喘汗者葛根黃芩連湯論見

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

下後而喘

汗後而喘

八覽厚朴是表三

二

加厚朴杏仁湯主之

註有武臣為寇執置舟中艤板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而膈不利一醫作傷食而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜藥熱汗出至晚身涼脈已和矣醫曰其平生不曾用仲景方不知其神捷如此

診

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脈弦者生澁者死論見循衣摸床濕家下後額汗微喘大小便利者死論見痛少陰病息高者死詳見厥利厥冷無脈灸之不還及微喘者死厥利直視譫語喘滿者死論見脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

入醫學綱目卷三

三

喘續法

陰症喘

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳助

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚眾當

飲水喘

以五苓散或陷胃丸主之方見渴及結胸

身重

身重面垢過寐

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白

虎湯主之

身重脈浮多眠

風溫為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見風溫宜

身重脈浮多眠

陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身

重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗証云此証宜和緩之

身重脈浮多眠

陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大

承氣湯論見不
大便

風濕脈浮身重汗出惡風者宜

防已黃芪湯

防已兩一

甘草兩半

白朮七錢半

黃芪去蘆一兩一錢

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盞半煎八分
溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐
被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥喘者加麻黃
半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三
分下有沉寒者加細辛三分

中暑身
重

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下

鍼宜瓜蒂散白虎湯論見中暑

身重無
汗

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大

青龍湯

八醫學綱目卷三

四

身重心
悸

下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見

身重陰
中拘攣

陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花

者燒棍湯論見陰

四肢重
為陰

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者真武湯論

身重

難轉側

熱濕風

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見下後

胷滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡礪湯

論見

風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮

虛而澁者桂枝附子湯論見

遺尿

腹滿諸
語者合

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論

病身

多眠見
汗者風
溫

風温病脈浮汗出者身重多眠若下之則小便不利直視

失溲 論見
風溫

診

遺發
汗

寸口脈微而澁微者衛氣不行澁者榮氣不達榮衛不能
相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言
衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者意而吞
醉中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷
太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便
不得反嘔而失溲者此為欲解也 論見
譫語 遺溲狂言目反
直視者此為腎絕 論見
大法

盜汗

盜汗脈
浮邪在
半表半
裏

三陽合病脈浮大見關上但欲眠睡目合則汗 陽明病
脈但浮者必盜汗出 論見胃實成無已云陽明病當作裏
實而脈浮者云必盜汗是猶有表邪

醫學綱目卷三

五

故 太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒

者表未解也 論見
結胃

傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使
然也何者若邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則
邪氣浸行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽
氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止
矣其證悉當和表而已

面赤

面赤脈
短氣
煩滿者
汗不微

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽
明續自微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下之下之
為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤色者陽氣怫鬱在
表當解之薰之若發汗不出不足言陽氣怫鬱不得越
當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之

身痒脈浮者

不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈澁故知也因發不透徹而面赤燥煩短氣者不足言陽氣拂鬱故更發汗則愈

只堪背張者

脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者痿遲為無陽不能作汗其身必痒也 太陽病如瘡狀若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之論見發熱

只堪背張者赤斑者陽毒

身熱足寒面赤卒口噤背反張者痙病陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉腫痛唾膿血者宜升麻鱉甲湯方論見

面赤下利脈微為陰

少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤色者通脈四逆湯加蔥白論見下利下利清穀脈沉遲面少赤手足微厥者必鬱胃汗出解論見下利

面赤也下

陽明病面合赤色者不可攻之論見便難

壞病

太陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

虛

山治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服

海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

輶產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若謂得下焦有陽則

上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多踈足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸

白芍藥各一兩 黑附子炮去皮

龍骨燒通赤

生薑二兩

牡蠣燒赤 桂枝七錢

右為龕末每服一兩羊肉四兩蔥白五寸去黃心同剉

爛以水五升一升今之熬至一半以來濾絞去渣分三

服服之

戰慄振搖

虛

成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

醫學綱目卷三十一

七

汗後振為虛

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者宜

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓兩二

桂枝一兩

白朮

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲蹠地者真武湯主之方見少陰

孫太乙宮道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰

掉欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作直武湯服之三服微汗自出遂解蓋直武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能

乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

清心竹葉湯未考

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病火熨其背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此為解也

論見譫語

未汗戰振為欲

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮

解

為在表故當汗出解也

論見大法

太陽病脈陰陽俱停等必戰慄汗出而解

論見發熱凡柴胡症下之若柴胡症不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解

論見往來其熱脈浮而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脈遲不能

作汗其身必痒也

論見面赤

平居忽戰慄者初中邪

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰而慄也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

注

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲墜地者及服大青龍湯後厥逆者俱宜真武湯

方見戰掉及發熱若動氣在左頭汗不止者活人用防風白朮牡蠣次服建中湯

論見重寒

汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩面色青黃者難治

若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿

論見痞

診

叉手冒心

虛發汗過多叉手自冒心心中悸欲得按者桂枝甘草湯論方

驚悸

虛少陽耳聾目赤胃滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚論見

苦口

下後驚

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者宜

柴胡加龍骨牡礪湯

半夏二合

大棗六枚

柴胡四兩

生薑

人參

龍骨

鉛丹

桂枝

茯苓各一兩半

大黃二兩半

牡礪一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

入醫學綱目卷三

九

火逆驚

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯主之論方

火迫劫汗出或熨而滅火邪者是也

桂枝蜀漆牡礪龍骨救逆湯

桂枝去皮三兩

甘草炙二兩

生薑切三兩

牡礪炒五兩

龍骨四兩

大棗十二枚

蜀漆洗去腥三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚獨時瘰癧論見 陽明病

脈浮緊口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠論見

驚悸續法

虛熱後

海茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸

吸短氣

茯神

麥門冬去心

熟地各一兩

牡丹皮

人參

黃芪各七錢

桂枝

甘草炙

牛膝

澤瀉各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑半兩

茵陳蒿半斤 茯苓二兩

芍藥

生地兩

麥門冬去心 山柰半兩

右咬咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬去心

赤茯苓去皮

知母焙

芎藭

甘草炙

酸棗仁微炒

陳皮去白炒

檳榔各一兩

入醫學綱目卷三十一

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服

宜溫溫

少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心

故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡

候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯溫之者

為心悸全無手經火今入足水也心悸在濕未去終至於

斃故不敢溫之溫之則壞矣

汗後心

汗後心下悸若頭眩身動振振欲僻地者直武湯也論

振振 若义手自冒心者後條桂枝甘草湯也若譫語胃不

和煩悸者活人用調胃承氣湯也論見 若臍下悸者後

條茯苓桂枝甘草大棗湯也 發汗過多其人义手自冒

心心中悸欲得按者宜桂枝甘草湯

桂枝四錢 甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去渣溫服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢 甘草炙二錢 桂枝四錢 大棗二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮

取一盞去渣溫服日三作甘爛水法取水斗許置大盆

中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心悸

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗

當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須臾實津

液自和便自汗出愈 少陽病耳聾胃滿不可吐下吐下

則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胃腸滿心下悸而小

便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯方論見往來寒熱

飲心悸

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏

氣虛心悸

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 傷寒脈結

代心動悸宜 炙甘草湯

甘草炙一兩 生薑三片 人參半兩 生地一兩

桂枝去皮 麥門冬去心各兩 麻仁一合

阿膠半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去渣

納阿膠溶盡溫服日三 霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

霍亂心悸厥逆心

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四逆

散加桂枝

醫學綱目卷三十一

十一

臟結與結胃痞氣大同小異

寸浮關沉不下利為結胃問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胃也何謂臟結答曰如結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者沉下利欲食如故為難治刺關元穴王朝奉云可臟結無陽症不往來寒熱其人反靜

舌上滑胎者不可攻也王朝奉云可刺關元穴服小柴胡湯病胃中素有痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於陽下之陰下之成痞氣病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞所以成結胃者以下之太早故也傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而

以他藥下之柴胡症仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

結胃

大結胃不痞而痛

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所有潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主之

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫

反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主

之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁煩曰脈浮大陷胃湯不可輕用

傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞅者大陷胃湯主之雲岐云三症脈皆皆月西潮熱

大陷胃湯

大黃一兩半去皮為末綿散者佳

芒硝八錢

甘遂一字赤連珠者

為細末

右水二盞煮大黃至八分去查下硝一沸下其遂末溫服得快利止後服

小結胃按之則痛

小結胃病正在心下按之則痛脈浮滑者宜

小陷胃湯

半夏湯洗

黃連兩

瓜蒌一枚用四分之一

右呖咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎取八分去查溫服未和再服微解下黃庭便安也

孫工部郎中鄭忠厚因患傷寒胃腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議畧不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有一二服藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色改白京城人稱服

醫學綱目卷三

三

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

欬實結胃潮熱水結留胃頭汗無大熱

但結胃無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

活人云水結留胃半夏加茯苓湯小柴胡去牡蠣湯亦主之

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃湯此三物白散亦可

寒實結胸無熱

桔梗三分

巴豆一分去皮尖熬黑研如脂

貝母三分

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥一兩

右熱實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

結胃項亦強如柔痙狀下之則和宜
不瘥用枳實理中丸應手而愈

大陷胃丸

大黃兩二

葶蘆

芒硝

杏仁

去皮炒各三分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大後用甘遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服

一宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽入

本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也大陷

胃治熱實大陷胃丸兼喘小陷胃治痞

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩冒者刺大椎肝膈若

汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯方論並見項強

若婦人經水來熱除諱語者刺期門論見諸語

熱入血室

診

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此

作協熱利也四日復下之五字衍文也

也論見大法太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利

不止水漿不下其人心煩 結胃症悉具煩躁者亦死

結胃續法

若誤下了初未成結胃者急頻與理中湯自然解了更

不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因

入消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃

中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之

蓋前來下之未是故也

服陷胃不效者以枳實理中治 西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近用大陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小結

氣毒相搏結於胃者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

枳實十六片

茯苓

人參

白朮

乾薑炮

甘草炮已上各二兩

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進

二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡蠣

二兩煨過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參

白朮

瓜蒌

牡蠣

甘草炙各二兩

乾薑炒白半兩

枳實炒二十箇黃芩去枯

右為細末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不效復與

之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

醫學綱目卷三十一

五

加瓜蒌根有汗加牡蠣

注水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱

者小半夏加茯苓湯小柴胡去吏加牡蠣主之

孫按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解眾醫以為

溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半

夏茯苓湯遂瘥眾問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水

結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身

汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒

表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯勸門

穿結散大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆另研少許

右再研過至細以乳汁為丸如黍米大每服二丸用薑

以半夏
茶冷水
結

氣塞不通
宜穿

血結胃
宜海蛤

湯下不時服
本婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤

滑石

甘草灸各一兩

芒硝兩半

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胃膈血散膈中血聚則小腸壅小腸壅膈中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑存之

針灸
治結胃灸法

巴豆十四箇 黃連七寸去皮用

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

入醫學綱目卷三

去

摘傷寒結胃

先使人心敞骨下正痛處左畔揉之以毫

針刺左畔支溝穴

正坐側臂取之次刺左間使名曰雙關刺次

左行間

臥取之針入六分此支溝行間穴下針至分數內然針令病人五吸次外然針三呼又次內然針五吸訖長呼一口氣出針即左畔一壁結胃立效右畔

依上刺之慢慢呼吸停針用針獲時而愈無有不效

雲傷寒結胃瘧氣

胸中結痞湧泉

太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白

太白 少衝 神門

胃中結痞少商

太淵 大敦 太衝并上下中腕瀉之

通玄結胃身黃 湧泉

摘血結胃面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍

期門

太陵

關元娠不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之

集傷寒胸膈痛

期門 太陵

忌
近世治結胃多用金針并用硫黃陽起石者若寒實結

曾或有瘥者若熱實結胸必死也

瘥

心下痞
滿閉脈
浮者大
黃瀉心
脈浮者
大黃黃
連瀉心
湯
心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之活人

大黃黃連瀉心湯

大黃

黃連各二兩

黃芩一兩

右咬咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去渣分溫再服

惡寒汗
出加附
子

心下痞而復惡寒汗出者宜附子瀉心湯

大黃

黃連

黃芩各一兩

附子一枚炮去皮臍

破別煮
取汁

右咬咀百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去渣納附子

大醫學綱目卷三

七

汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之膈滿微縮小柴胡加乾薑牡蠣湯主之

心下痞
硬閉脈
沉者半
夏瀉心

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸痞同異

半夏瀉心湯

半夏湯洗七次黃芩一兩

人參

甘草各一兩半

黃連半兩

大棗六枚

乾薑一兩

右咬咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣溫服半夏瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞嘔噦氣下利也

幅利下
後者加
甘草

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜

甘草瀉心湯

甘草 炙二兩 黃芩 兩半 乾薑 各一兩半 半夏 一兩

大棗 六兩 黃連 兩半 人參 兩

右呔咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服活人云伊尹湯液論甘草瀉心七味舊本無人參

痞硬未下

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而不利者大柴胡湯主之

痞硬表解身涼胸脇痛

心下痞硬嘔逆下利若表解身涼脇痛十棗湯主之方論並見

醫學綱目卷三十一

六

痞硬下利

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑 兩 黃芩 兩 甘草 炙 人參 各一兩半

乾薑 兩 半夏 一兩 黃連 兩 大棗 六兩

右呔咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服

太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者宜

下後表裏不解者桂參

桂枝人參湯

桂枝 另 甘草 炙 各一兩 白朮 三錢 人參 兩

乾薑 各一兩

右呔咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更煮取七分

去查溫服日再服夜一服

汗下解 傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噫氣不除者旋覆代
瘕硬者 赭石湯主之 活人云有旋覆代赭石湯証其人或欬逆氣
虛者先服四逆湯胃虛者先服理中丸次服

旋覆代赭石湯
石湯為良

旋覆花 兩 人參 半兩 生薑 一兩 代赭石 三錢

甘草 兩 半夏 湯泡 大棗 六箇

右噉咀每服五錢水一盞煎至八分去渣溫服 病解
後心下痞噎噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也
若下利者前條生薑瀉心湯也

痞硬氣
上冲咽

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛
氣上衝咽眩冒者成痿 方論並見
氣上冲心

脹瀉心
痞不解

本以下之故心下痞隨瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥
小便不利者五苓散主之

入醫學綱目卷三

元

心下支
結似痞

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝
湯也 方見發熱若心下痞而腹滿者即前條
先以桂枝湯解後用大黃黃連瀉心也

心下滿
似痞手
足冷

心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結下緊心煩飢不欲食
者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯 論見

大陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛
陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚臞
者難治今色微黃手足溫易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞
耳

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者
不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈甚汗少則便難若
脈遲尚未可攻 陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之 論見

實胃

痞續法

虛痞
活傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙綠桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼各二兩
祛炒去穢

右咬咀以水二盞煎至一盞去查分二服

煩

汗吐下後懊憹虛煩

發汗吐下後虛煩不得眠若刺者必反覆顛倒心中懊憹者梔子生薑豉湯主之 若少氣者梔子甘草豉湯主之 若嘔

不結胃心下懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之 陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

醫學綱目卷三十一

三

懷舌上白胎者宜梔子豉湯論見下利後煩按之心下濡者為虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子

四箇 香豉半兩

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去查溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得吐止服 梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

梔子

四兩

乾薑半兩

右二味以水一盞半煎取八分去查溫服得吐者止後

服

發汗吐下後心中懊懣而煩若無燥屎大便硬者此條梔子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

煩實而

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小

承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿

初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

陽明 胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也

熱 若不吐不下者調胃承氣也

許有人病傷寒八九日身熱無汗時譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中

無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予

診之曰此懊懣怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

入醫學綱目卷三十一

三

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中心懊

懣微煩胃中有燥屎者可攻又云小便利大便乍難乍

易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云

胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大

便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非

痛所以心中懊懣也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱

也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩

論見不得眠

胃滿而煩

胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯

兼下利咽痛者猪膚湯

柴胡桂枝薑湯

骨牡礪湯

發汗若下之而煩熱胃中空者梔子豉湯主之

胃中空而煩

心下滿而煩

心下鞕滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心湯 脇痛氣衝咽胃眩者成痿方論見痞 若滿痛下利不止

心煩腹滿臥起不安

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜

梔子厚朴湯

梔子去殼

厚朴薑製

枳實切一兩

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後服

腹滿而煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便澹胃痛欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見

吐後火後煩

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也脈之微數不可灸則煩逆論見

嘔時煩鬱鬱

嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

醫學綱目卷三

三

極吐下後胃滿便澹腹痛者調胃承氣湯也

脈浮數而煩

病欲解者必當先煩乃有汗而解論見 太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

主之

脈平後煩者損穀

病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小

煩者以胃虛不勝穀氣也論見吐利

先煩後悸為熱

心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯論見

先陰後煩為虛

若二三日心中悸而煩者宜小建中湯論見 心煩而渴

但欲寐而煩

少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆

湯論見
欲寐

下利厥逆而煩 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁

若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也 論見但欲寐

手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜

瓜蒂散吐之

診

若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也

方論並見下利 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也 論見下利

煩躁

煩躁有表証宜汗

煩躁有表証發熱惡寒體痛脈浮緊者大青龍湯也 方論見發熱條

若發汗不徹太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗

則愈 論見短氣

入醫學綱目卷三十一

三十一

煩躁無表証宜下宜溫

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞅至四五日

雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承

氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭

鞅後必澹未定成鞅攻之必澹須小便利屎定鞅乃可攻

之宜大承氣湯 王註云無太陽証為無表証也無柴胡症為無半表半裏証也 煩躁不

大便續臍痛發作有時者有燥屎也 下之後復發汗日

夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無

大熱者宜

乾薑附子湯

附子生用 乾薑兩一

右二味以水三升煮取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱

服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消醫

如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜扶苓四逆湯

扶苓一兩

人參六錢

附子一枚

生用去皮臍作八片只用二片

甘草二錢

乾薑各二錢

煩躁心下鞅

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查溫服

煩躁心下鞅若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承氣少少微和之也若已曾下心下鞅痛短氣躁煩者大陷

胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見結胃

火逆煩躁

火逆下之因燒鍼煩躁者宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝半兩甘草炙龍骨各一兩牡蠣熬

入醫方綱是卷三十一

五

桂枝去皮

甘草炙

牡蠣熬

龍骨各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名為

火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發

譫語十餘日振慄下利者欲解也論見譫語

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見吐利

若不煩而躁四逆脈不至死也論見厥不得臥者死也論見

利下

診

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而逆遲復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此為陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭臂
如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰
躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩
後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先煩
煩者皆不可治也 臟厥疏厥煩躁方論見厥 躁無暫定而
厥者為臟厥靜而復煩吐舌而厥者為蛇厥烏梅丸主之
方論 熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若
欲食者愈若厥而嘔胃脘煩滿者便血論見厥 少陰病但
欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見厥寐

煩躁續法

煩躁不
飲水為
陰盛陽
陽

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜
服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火醱散丹砂丸並主
之丹砂丸方
見活人書

八醫學綱目卷三

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子

一枚炮熟取出用冷灰搗
細研入真蠟茶二錢和勻

右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙

放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

煩躁清
為土熱
下寒

海已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰症服四逆輩胃中
發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不躁大

小便自利

肉桂

茯苓各五錢

良薑

烏頭炮各七錢

附子炮

乾薑炮

芍藥

茴香炒各一兩

右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七

十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

本破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏

方論見陰毒

頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

煩躁六
脈沉伏
為陰中
伏陽

力頭疼身温煩躁指末皆冷胷中滿惡心更兩醫矣皆不識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此証世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能導引真陽反生客熱用冷藥則所伏真火愈見消燦非其治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得汗而解矣予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定畧睡身已中汗自昏達旦方止身涼而病除矣

效

表不解而欲屬太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者宜

小青龍湯

麻黃

芍藥各三錢

五味子半

乾薑

醫心方卷三

三

甘草

細辛

桂枝去皮

半夏各三錢

右咬咀每服五錢水盞半煎八分去渣温服 若微利

者去麻黃加芫花如彈子大葵赤色 若渴者去半夏

加瓜蒌根三分 若噎者去麻黃加附子一錢五分炮

若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩 若喘

者去麻黃加杏仁三分去皮尖

欬而往來寒熱胷滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑蔥加

五味乾薑也 方論見桂來寒熱

欬而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥

者必頭痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛 論見胃實

欬而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四肢重痛

者用真武湯加五味子細辛乾薑也 若下利六七日變

欬嘔渴不得眠者猪苓湯也 若下利譫語小便難者破

往來寒熱而欬屬少陽

表解胃實而欬屬陽明

但欲寐而欬下利屬少陰

火氣劫也 若四逆者用四逆散加五味子乾薑也方論

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也 欬而失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷論見遺尿

欬續法

丹崇慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡 黃芩 白朮 陳皮

桔梗 木通各二錢 人參 麻黃各一錢半

甘草三錢 右分三貼水煎服

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參兩 五味子五錢 桑白皮兩 欬冬花

蛤蚧一對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

入醫學綱目卷三十一

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷 阿膠炒 五味子 麥門冬法

白朮各一兩 乾薑炮 桂枝各二錢 杏仁去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯澁邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗 桑白皮各一兩 甘草 貝母

訶黎勒各五錢

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

小便不利

小便不利表不解若乾嘔發熱而欬少腹滿者小青龍湯

內傷外感補劑散之

肺虛氣乏宜補

肺實氣泄宜散

解

去麻黃加茯苓也。方論見欬若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮。方論見項強

小便不利胃滿

小便不利胃脇滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩加茯苓汗下後者加柴胡桂薑。方論見往來寒熱若煩驚譫語

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也。論見不得臥

小便不利大便難

小便不利大便乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯。論見不得

小便不利而渴

小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯。方論見渴

小便不利頭汗

若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯。方論見發黃

小便不利胸脅疼

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也。方論見身痛

小便不利頭汗

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也。方論見往來寒熱

八醫學綱目卷三

三

若發黃者茵陳蒿湯也。小便不利身發黃。方論俱見發黃

小便不利身黃下後無治症勿

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈。活人云若大渴引飲入瀕列之

但欲寐者陰症

小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花湯。腹痛下利四肢重痛者用真武湯也。方論見下利若四

逆者用四逆散加茯苓。方論見但欲寐

診

陽明病小便不利濇然汗出者若欲食者愈不能食者欲作瘰癧瘰癧者寒氣積結也。

小便不利續法

陰症治

法

活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷

滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之。方論見陰痛返陰丹

針灸

集傷寒小便不通取陰谷。陰陵泉

傷寒後小便不利。見小便不通門

小便難

汗後小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯也方論若太陽症中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小便難也方論見

若少陰以火劫汗者則欬而下利謹語頭汗

論見

下後小便難

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身黃項強小便難也見胸若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊

下之者則腹滿小便難也論見

萎痺身黃小便難

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下後不食項強者忌柴胡論見

口厥鬱胃

少陰脈不至尸厥

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反

厥

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽汗下後鬱

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復

下之得裏和三字中間必有衍文脫簡得字當字若字之誤裏和當是裏未和蓋脫一未字也

下利清穀

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱胃汗出解

喘秘澀

小便不利大便乍難乍易喘冒不能臥者大承氣湯論見

乘寒澀

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也論見

眩胃

眩胃心下鞭若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

欲寐下利止而眩胃者死論見

尸厥鬱冒續法

蠱海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫重肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有火邪故令神昏宜梔子黃芩黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

入醫學綱目卷三

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者長之離也越經傳者又為腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也脈在丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

噫

濕痰

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心

湯也方論見痞

噫續法

水火相傳噫氣 雲傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經

至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜

如聖加枳實湯

甘草

桔梗各五錢

枳實炒三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後喘而噫傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各

分右剉細每服五錢水煎服

噫

汗下吐後噫

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復

飲水而噫

與之水以發其汗因得噫所以然者胃中寒冷故也

胃中虛冷不能食者飲水則噫與小承氣湯入腹中不轉

矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噫論見

入醫學綱目卷三十一

主

食者攻其熱必噫論見濕家頭汗出背強惡寒欲覆被

向火者下之早則噫論見

火劫汗

太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語

甚者至噫拾衣摸床小便利者可治論見

噫滿下利

傷寒噫而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

陽明胃實脈弱浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有

潮熱時時噫脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噫者不治論見

實胃

噫續法

寒熱異治

活噫胃寒所生橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退

陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦人

則屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹

湯方見雜病噫

橘皮乾薑湯

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草各三

人參二

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去渣溫服日三

羌活附子散

方見雜病

半夏生薑湯治噦欲死

半夏一兩

生薑二兩切

右水二盞煎至八分去渣溫服

胃氣失下

海傷寒欬逆脈散死

仲景之言不虛偽

大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內

便軟惟宜用瀉心

便硬尤

宜大承氣 二藥神工作者誰 東垣潔古為良劑

瀉欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘

者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

入醫學綱目卷三

三

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不

內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽

而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左

浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強

右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓

散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌攣語言不正而

反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈

浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦

然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽極復之表也

陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已

病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲

盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱他人

按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

身寒大渴不欲陰近本為

裏寒

用丁香乾薑之類熱藥溫胃其火自下

勻氣散

川烏頭

大者三箇炮裂去皮嘴

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭

乾薑

附子炮

肉桂

芍藥

半夏

炙甘草

吳茱萸

陳皮

大黃各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去查溫服

肉苳菴湯治傷寒汗後吃逆噦氣

肉苳菴

一箇

石蓮肉炒

茴香各一兩

人參

醫學綱目卷三

三三

丁香

各半兩

枇杷葉五片拭去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去查空心溫服分二服

表裏

良薑湯

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一兩

麻黃

半兩

杏仁二十箇

甘草兩

檳榔三箇別為末

右咬咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去查下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無休止宜服此方

無汗

無汗發
惡寒
厚厚屬
太陽

太陽發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也 若項背強者葛根湯也

方論見發

執 若小便少氣衝胃口禁者為剛症亦葛根湯也論見症
若目眴者必自愈論見

無汗不
大便屬
陽明

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者瘀熱宜茵陳利之也論見胃實

無汗身
痒為虛

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各半湯也方論見 若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無陽不能作汗也論見 若陽明胃實身如虫行者久虛也論見

胃實

無汗小
便不利
下澇

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或悞懷者宜茵陳湯方論見 若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者柴胡湯方論見 若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

下澇
發熱心

白朮也方論見 項強論見

醫學綱目卷三

五

禁忌

無汗禁忌若浮緊身痛者忌桂枝論見 脈浮發熱表不解者忌白虎論見 若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也論見

凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也論見

無汗續法

象

摘傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮

合谷五分候遍身汗出即 復溜瀉

雲又法 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經禁皆可刺

摘傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際散脈中二 經

渠分 內庭 應時 出汗

瘧狀

日二三 太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半湯

也方論見 服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前

法若形如瘧日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃三錢 大棗二

生薑五錢 杏仁去皮尖甘草半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

日晡發 病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

入醫學綱目卷三十一

三十一

使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之論見婦人傷寒

頭汗

小便不利頭汗利頭汗 頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也

方論見往 若發黃渴飲水漿者宜茵陳湯方論見發黃

陽明胃實頭汗其人若下血譁語者為熱入血室宜刺期

門論見 若下後手足溫不結胃心中懊懣飢不欲食者

宜梔子豉湯方論見煩 若被火額上汗出小便不利者必發

黃也方見

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大

便鞭者小柴胡湯論見厥仲來寒熱

若水結胃無大熱者大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常

度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲血陰虛則小便難陰

心下滿 頭汗

診

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至臑手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治 關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死 濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死 濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦留滿小便利舌上白胎也論見身痛

頭汗續法

診

孫凡水結胃脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂之重虛

成頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上凑則汗見於頭也

海頭汗出劑頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

入醫學綱目卷五

五

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯

論見胃實 若下後心中懊懣者梔子豉湯方論 若下後噦

診

而胃滿小便利者丹田有熱胸中有寒也論見牙寒

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出

舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者

此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治設使惡寒

者必欲嘔也腹內痛者必欲利也海藏云惡寒必欲嘔者小柴胡湯腹中痛者理

中臟結如結胃狀飲食如故時下利寸脈浮關脈小

細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其人反靜者不可攻也論見臟結

舌胎續法

舌白胎
邪淺黃
深者邪

成舌者心之官法應南方火本紅而淫傷寒三四日已後
舌上有膜白滑如胎甚者或燥澁黃黑是數者熱氣淺深
之故也邪氣在表者舌上卽無胎及邪氣傳裏津液結搏
則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏
或邪氣客於胃中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎
者以丹田有熱胃上有寒邪初傳入裏也陽明病膈下硬
滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表
半裏也太陽病若下之則胃中空虛氣動膈心中懊憹
舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胃中也若病在臟宜
若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熱猶帶表
寒故也

澁者白

及其邪傳爲熱則其舌上之胎不滑而澁也經曰傷寒七
八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

八醫學綱目卷五

三七

而煩欲飲水數升者白虎加入參湯主之是熱耗津液而
滑者已乾也

下黃者宜

若熱聚於胃則爲之舌黃是熱已深矣金匱要畧曰舌黃
未下者下之黃自去

黑者不

若舌上黑色者又爲熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者
死以心爲君主之官開竅於舌黑爲腎色見於心部心部

者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

雜方

垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中

有寒勿用之曾有微寒加辛熱之劑立效 舌燥澁如楊

梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搽之其刺立消神效

無薄苛蜜治舌上白胎乾澁語話不真先以生薑厚片蘸

蜜水揩洗有用薄苛自然汁與白蜜等分調勻傳之良

動氣

禁惡

動氣者為築築然動跳於腹者是也 動氣在右不可

發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水 活人云先服五苓散三服次服竹葉

湯 活人云先服防風白朮牡蠣 動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

活人云先服建中湯方見自汗 動氣在上不可發汗發汗

則氣上衝正在心端 活人云宜服李根湯方見氣上衝 動氣在下不可

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反

吐穀不能進 活人云先服大橘皮湯 動氣在右不可下

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也 動氣在左不

可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則

欲蹠 動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱

汗自泄欲得水自灌 動氣在下不可下下之則腹脹滿

卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

醫學綱目卷三

三

滯氣

傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵 兩

木香 不見

柴胡

黃芩 各半兩

右剉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼 麩炒五錢

赤茯苓

當歸

三稜 炮各兩

木香

訶黎勒 各五錢

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡

赤茯苓

大腹皮

人參 各五錢

木香

檳榔

大黃 各三錢

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓一兩 檳榔三錢 桂心 大腹皮

川茴香炒 良薑各五錢

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

表

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之活人云衄後脈浮者宜麻

黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯

疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之 不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

醫學綱目卷三

一六

便清而衄者桂枝湯也論見 太陽病脈浮緊發熱無汗

而衄者愈也論見

虛

太陽病以火劫發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰虛則小便難論見 少陰病但厥無汗而強發之必動其

血或從口鼻出或從目中出者難治論見 動氣發汗則

血而渴飲水就吐論見

驚

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲

漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊直視不能瞬不得眠衄忌發汗者為無脈若浮緊身疼發熱惡寒之症宜發之

鼻衄續法

脈浮者麻黃桂枝湯微者犀角黃芩

海仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黃湯主之仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能瞬不得眠又云亡血不可發其表汗出即寒慄而脈此二說皆為

脈微不可汗也若脈浮緊
及得緩者皆當發之是也

活傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯王之

犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐

血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥一兩 生地半兩 牡丹皮二錢 犀角二錢半

右咬咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

芫花湯治鼻衄不止用芫花尖一把以水三盞濃煎汁一

盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

赤治傷寒衄血滑石丸

滑石末以多少飯丸如桐子大每服十九微嚼破新

大醫學綱目卷三

早

水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆

可服湯暍叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不

以多少乃止宜服溫和藥以調其衝纔見鮮血急以此

藥治之

下血

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯

也方論見

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見

太陽病以火熏汗不得汗其人必躁而滑血論見 林家

不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少

厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

少腹結急下血

胃實譫語下血

汗下後下血

下血

診

胃腸煩滿者必便血也

唾血

咽痛吐血

咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鱗甲湯

方論見陽毒

下後屎逆吐血

若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯

方論見

灸後汗後吐血

脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血

吐膿血

畜血

大腸畜血

身黃如狂屎黑喜忘者為畜血 太陽病表証在而發熱

惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為

無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之

抵當湯

醫學綱目卷三

水蛭

十箇熬 蜜 十枚去 大黃 兩 桃仁 七枚去

右咬咀作一服水一盞煎七分去渣溫服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下

之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭

五枚 蜜 五枚去 桃仁 六枚

右為末煉蜜和作一九以水一盞煎至七分頓服碎時

當下血不下再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外

未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者宜攻之

桃仁承氣湯

王海藏方有薑七片桂確各三錢

桃仁

十二枚去皮尖

大黃

兩 甘草 灸

桂枝

芒硝 各半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣入硝化開食後服

陽明畜血

陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵

當湯論見胃實

海初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色久則漸變而為黑色即此意也當詳察之

訖血在上則喜忘在下則發狂

下後畜血

病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而使膿血也成當不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞭滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

八醫學綱目卷五

里

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去而浮仍在則禁血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱及渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

口燥數水不欲咽者瘀血在胸

病者胃滿痞痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來連腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不咽胸滿心下手不可近

者挑仁承氣湯主之

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衄血唾血畜血續法

血分上
中下三
部

海血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血爲上部血結胃中爲中部畜血下焦爲下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

上部血

汗多爲衄血脈浮灸之咽燥爲唾血當汗不汗熱入於裏者爲嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃足太陰所主脾所不裹越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胃中 頭痛身痛漱水不咽者衄無熱胃滿漱水不欲咽者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

入醫學綱目卷三

聖

下部血

桃仁承氣湯主之 其人發狂小腹滿硬小便自利大便反黑及畜血下焦 其人發狂小腹滿硬小便自利大便反黑及

血分輕
重異治

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃尿黑者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別桃仁大黃等分水蛭蚘虫多者作湯三之二者作丸九之名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化爲血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物爲效者表症仍在也

今云無表証者但說
得陽明畜血爲未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者輕也

生地黃丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼氣虛弱者宜此方主之

生地黃

自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃二兩

乾漆半兩炒烟盡

生藕

自然汁半升如無藕用刺薊汁一升半

藍葉一握切細乾者用末半升

蜚虫

二十箇去翅足楚內炒黃

水蛭

十箇炒

大黃一兩剉如豉大

桃仁

研碎

右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯九其熱甚輕如無地黃與藕汁升數添水同煎抵當丸恐用之太過不止損血故以此湯主之

醫學綱目卷五

器

吐血續法

表虛脈浮脈者麻黃去莖

垣治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居曠室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒雍遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃

一錢去外寒

桂枝

半錢補表虛

白芍藥

一錢實

甘草

炙一錢補脾

五味

五粒安肺氣

門冬

三分保肺氣

人參

三分益氣

氣不足而實其表

當歸

五分和血養血

右咬咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

入餘藥同煎至一盞去查熱服臨臥一服愈觀此一方足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也

熱毒入裏者低當挑仁

治傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃丸

短氣

短氣表症

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見體痛短氣腹滿脇痛其人若脈弦浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯

也論見胃實方見往來寒熱

短氣裏症

若表未解手足澀然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見潮熱若表解心下痞硬乾嘔短氣者宜十棗湯方論見上

短氣汗不徹

短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤者為併病更發汗則愈論見面赤

短氣心硬痛診

若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胃湯論見結胃跌陽脈微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也論見大法

心痛

下後心中結痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也梔子豉湯主之

脈弦脈及心痛

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯論見胃實方見往來

寒熱

心痛續法

針灸

摘傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣

海二穴 如小腹有氣衝者宜灸天樞氣衝三里三陰交如無此症只用前穴

除中

診傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中口雖欲言舌不能語 凡手足厥冷而利不賞食而食者恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論見

下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱者白頭翁湯
方論見下利
脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已

入醫心綱目卷三

吳

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱表弱誤下脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食脇痛身黃項強小便難復與柴胡湯必下重論見脇痛

診

身熱惡寒身寒惡熱

診治病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先以桂枝湯治寒次以小柴胡加桂以溫其表身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也活人云先與白虎湯加人參除熱次以桂枝麻黃各半湯以解其外

續增症

表射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

- 射干一兩
- 甘草
- 紫苑各一兩
- 橘皮
- 肉桂
- 半夏二兩
- 杏仁兩半去尖炒
- 生薑兩二

枳實多各 當歸 獨活 麻黃已上各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

續增斑

海陽症發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑

有傷寒發斑已上四斑活人

陽斑如

斑斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之胃背色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感

熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥王朝奉云赤斑

斑出十死一生皆用白虎人參湯何膠大青

溫毒斑

活溫毒發斑者初春病人肌肉發斑癩疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之

又有冬月溫煖人感乖戾之氣冬末卽病至春或被積寒

所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如

錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之

黑膏方療溫毒發斑

生地半斤 好豉一升

右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄

黃麝香如荳大為末同藥再煎服之其毒便從皮中出

者則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯療冬溫未卽病至春被積寒所折不得發至

夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癩疹如錦紋而咳心

悶但嘔吐有清汁宜服此湯卽止

葛根 橘皮 杏仁去皮 知母

黃芩 麻黃湯泡 甘草炙各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

發病時
氣斑無
時發

熱病發癩與時氣發癩並同夫病人或未發汗或已經發汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發癩瘡癬疹如錦紋俗名謂之麩瘡素問謂之疹大抵發癩不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癩爛也宜用玄參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯選用之

玄參

升麻

甘草各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不

除身上斑出

大青兩一

阿膠

甘草各二錢半

豆豉合

入醫學綱目卷三

吳

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

溶解

猪膽雞子湯治五六日斑出

猪膽三合

雞子一枚

苦酒三合

右三味合煎三沸強入盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒瘡
在面

陽毒升麻湯治斑出面方見

陽毒

海消毒飲子治癩

黍粘子六錢

荆芥

防風各二錢

甘草一錢

右咬咀水煎服

陰毒瘡
如蚊咬狀

陰症發癩出背又出手足亦稀少而微紅者若作熱症

投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胃中上獨熏肺

傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦紋也

宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯之

類其斑自退可謂治本而不治標也。海藏云陽明發斑亦毛之間者宜白虎 大建中湯。方見治惡寒門 陰毒升麻鷲甲

湯治陰癰。陰毒方見

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥

陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯

陽易若只與燒棍散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一

大服調燒棍散連進二服出大汗兩晝夜而愈。

丹發癰似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

欲眠目不閉聲啞為狐惑為羸

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默

欲眠目牽不得閉臥起不安重蝕於喉咽為惑蝕於陰肛

為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

醫學綱目卷三

則聲啞甘草瀉心湯主之。方見 蝕於下部則咽乾苦參

湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二

瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰

蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之。方未考究

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目

赤如鳩眼七八日目四眦一本皆黑若能食者膿已成也

赤荳當歸散主之。方見下血

狐惑續法

濕痰

一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月

後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽

覺中有汗腹鳴即目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑

汁飲之五六貼而愈

上唇有瘡無膿
下唇有瘡有膿

活狐惑傷寒與濕蘆皆虫証初得狀如傷寒或因傷寒變
成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三虫行作求食
蝕人五臟及下部為蠱虫病其候齒無色舌上盡白甚者
唇黑有瘡四肢沉重忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死
當教看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其
肛殺人甚急多因下痢而得治蘆桃仁湯黃連犀角湯雄
黃銳散主之

治蘆桃仁湯

生艾

桃仁去皮尖炒
双仁不用

槐花子碎各
二兩

大棗十五箇
去皮

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有蘆出下部者

黃連兩半

犀角兩

烏梅七箇

沒藥一分

入醫學綱目卷三

五

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部蠱瘡

雄黃

苦參

青箱子

黃連各二分

桃仁去皮尖
一分

右為散以生艾搗汁為丸如棗核大綿裹納下部匾竹
葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百服一宗悉致其病

百合病論曰百合病者謂無經絡百服一宗悉致病也人
常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行

診

或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便亦諸
藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人
脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸
漸然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈體症

或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨其症治之治人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不汗後變成奇疾也

百合病發汗後宜服

百合知母湯 知母三兩 切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水

二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞

去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇 滑石三兩 碎 代赭石如彈大一枚 綿裹

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出去水更以井水二

升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同煎取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合七枚 雞子黃一枚

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二

升煎取一盞去查納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黃湯

百合七箇 生地黃汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎

取一升去查納地黃汁煎取一升五分溫再服中病

勿更服大便當如漆黑
百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升

以水一斗漬之一宿洗身已食煮餅勿以鹽豉食之

百合病渴不瘥者宜

括萎牡礪散

括萎根

牡礪各等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病變發熱者一作發寒熱宜用

百合滑石散

百合兩

滑石三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利止服熱則除

宜

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆也

八醫學綱目卷三

五

杭州圖書館