T7982/4443(12)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 10 1952

ナ

卷之十八

瘛疭　腫瘍

癲疳　潰瘍

癰疽所兼諸症　久瘍

漏瘡

癰疽　腫瘍　潰瘍　瘡瘍

久漏瘡

虛實

腫瘍者癰疽未見膿而腫者也潰瘍者癰疽之膿已潰出者也丹溪云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主設欲行大黃者宜審其虛實之原瘍潰內外皆虛宜以補接爲主設欲行香散者宜防其虛虛之失由是言之則癰疽之腫時與潰時不同今分腫瘍潰瘍爲二門

腫瘍

癰疽方腫未見膿者也

瘡瘍者火之屬須分內外若其脉沉實當先疎其內以托裏表恐邪氣入內也有內外之絕其原也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚逾絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆于

哈佛大學哈佛燕京圖書館藏印

托裡疎通行榮衛三法

肉理乃生癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治
瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其中也內之外者其外之
內疎通治其內之外行榮衛者治其中也故先疎通
況實發熱煩躁外無瘀赤痛甚邪氣深于內也故先疎通
臟腑以祛其原外之內者其脉浮數腫在外形証外顯
熱邪氣極而內行故先托裏以防其干也內外之中者外
邪氣極而內行故先托裏以防其干也內外之中者外
無邪氣之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此
三法之後雖未痊必無變証亦可使邪氣峻減而易痊也
表証之發其受之有內外之別治之有寒温之異受之
有內外之別治之有寒温之異受之有內外之別治之有寒温之異受之
凡治法當托裏以温劑及用寒藥則是反毛始受之邪引
入臟腑受之內者法當疎利以寒劑反用温劑托裏則是
引賊入室矣
有臟腑之病上徹皮毛表裏通潰其爲一瘡助邪爲毒甚是
百倍輕則危殆重則死矣予聞諸古云瘡瘍之生也表裏
不同或攻或發少有差舛變証隨能殺人甚于傷寒也針
灸施治各隨其宜所用之藥又當明入五臟君臣是其法
也

脉沉实 痛深者 宜寒剂 閉而皮肉不變色根係深大病連在內臟腑秘滯當急疎通 內疎黃連湯治噁心煩發熱而煩脉沉而實腫硬木利之

黃連	芍藥	當歸	枳殼
木香	黃芩	梔子	薄荷
桔梗	甘草炙各一兩	連翹二兩	

右除枳殼木香爲末外並對每服一兩水一盞半煎一盞先吃一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利爲度如有熱証止服黃連湯大便秘滯加大黃如無熱証止用復煎散時時呷之如此內外皆通榮衛和調則經

絡自不過絕矣

脉浮数痛淺者宜温劑托裡

内托復前散治腫燃於外根盤不深形証在表其脉浮痛在皮内恐邪氣盛則必侵于内急須内托以救其裡

地骨皮　黄芪　防風各二兩　芍藥

黄芩　白朮　茯苓　人參

甘草　當歸　防已各一兩　桂五錢

右㕮咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓爲湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料

表裡已行而當歸黄芪湯治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

表裡雜方

當歸　黄芪

地骨皮　芍藥各半

右㕮咀水煎服如發熱加黄芩　如煩躁不能睡臥者加梔子　如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

海　奪命丹治惡瘡癰疽發背

大黄為末置砂器中以水撓過一遍飛過一兩

生姜兩一　没藥　乳香各一錢

右為粗末轉作丸子一錢用好酒一升木炭火熬一沸分二碗盛之夜露一宿早晨去滓空心服

治發背方蒼耳炒黄擦其刺再炒深黄不見風研細末每服五錢七好熱酒調食前臨卧服

一則用大黄牡砺一則用蒼耳知有内外之別也　前用奪丹二藥表裏不同何以然乃膏粱之變脉沉而滑

瘡以發表為先

地之濕氣感則害人皮肉筋脉脉浮而滑所以有泄之發之之異也

瘅瘡因積毒在臟腑非一朝夕發于外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐庶以經絡時令使毒氣外發此症仲景解表用麻黄桂枝之意施治之早可以内消此乃内托之本意也

通公家翟梗於庶醫上足太陽經生瘡堅硬腫痛大作左右尺脉俱緊按之無力

羌活　黄柏酒洗各二錢　防風　蒺藜　甘草炙　蒼术

連翹各一錢　肉桂七分　當歸一錢　黄芪一錢半

各五分

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去查熱服空心以夾被蓋覆其瘡使藥行罷去之一服愈

壬姑丈七十餘患項疽脉實而稍大此因憂悶而生太陽經治之

羌活　黄芪一錢　黄柏一錢半酒　黄芩酒炒　當歸稍七分

桔梗一錢　黄連酒炒　甘草生　人參　白水煎服

澤瀉五分　白水煎服

防風一錢　柴胡一錢　甘草五分

桔梗五分　甘草五分

連翹　防風　防己　甘草　當歸稍　人參

升麻半錢　羌活二錢　黄芩酒炒　桔梗　黄連酒炒

連翹　防風　防己　甘草　當歸稍　人參

升麻半分

尹老家素貧寒形志皆苦于手陽明經分出癰第四日忽腫幻有癮疹其臂外皆腫痛先腫在陽明左右寸皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自入風之變以脉斷之邪氣在表然其症大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裏俱和知邪止在經脉之中凝滯爲癰出身半已上風從生受之也故與卻寒邪和經脉中氣血使無凝滯也白芷升麻湯

白芷七分　升麻　桔梗各五分　甘草炙生　黃芩　升麻　葛根各一錢半　黃芪　連翹各二錢　中桂少許　紅花少許　酒黃芩　生地各一錢　歸稍

右水酒各一盞同煎至一盞臨卧熱服一服愈

此症雖曰經脉之中然得之自八風之變其藥制度皆發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

升麻　黃芪　連翹　葛根各一錢半　炒柱三分　歸身　甘草炙各一錢　黍粘子五分

右作一服水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

脉浮緊者宜緜汗之則瘥已

黃柏二錢

丁巳年委予從軍回住曹州有趙同知舅經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫腫上砭刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然予往診視其脉浮緊按之洪緩此寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒地凍則水氷人氣在中皮膚緻腠理

閉汗不出血氣強肉堅濡當是之時善行水者不能取四厥必待天温善穿地者不能鑿凍解而水可行地可穿人脉亦猶是也又曰冬月開藏水氷地折故用藥多而少針石也宜以苦温之劑温經散寒則已所謂寒淫於内治以甘熱治以苦温以苦發之以辛散之也宜以托裏温經湯麻黄苦温發之者也防風辛温散之者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以爲臣熱則腫蒼朮苦甘温躰輕浮力雄壯能泄皮膚腠間濕熱血流而不行者則痛以香白芷歸身辛温以破血散滯濕人參甘草甘温白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏也故以爲佐各剉如麻豆大同秤水煮餌之以薄衣覆其手以厚被覆其身且卧于暖處則經血温腠理開寒乃散陽氣伸大汗出腫減六七九再服去麻黄防風加連翹黍粘子痛

腫悉去經言汗出則瘡已信哉

托裏温經湯治寒邪客皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤脤痛不可忍惡寒發熱或相引肢躰疼痛

麻黄去根節 黄芪 當歸各二錢 防風去芦 葛根各三錢 升麻四錢 甘草炙 白芍藥各一錢半 人參 蒼朮各一錢

右剉如麻豆大每服秤一兩水二盞先煮麻黄令沸熟去沫再下餘藥同煎至一盞去渣大温服乾卧于暖處

蒲津王世祥年七十感寒濕地氣二月間得附骨癰于己以綿衣覆之得汗而散

左腿外側足少陽之分少侵足陽明分濶六七寸長一小尺堅硬漫痠不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛以藥下咽疼痛立止二日後柔軟而腫消矣

柴胡　黃芪　升麻七分　作一貼好酒一盞半煎至一盞大温空心食消盡服之
少時必早膳壓之使不令大熱上攻犯上中二焦也
貫徳戊子十歲四月天氣大熱于左是大腿近膝股肉足
厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽不辨腫色
漫腫皮澤木硬痛勢甚大其脉在三部細弦按之洪緩畧
有力
黃芪二錢　柴胡稍一錢　羌活五分　連翹二錢　肉桂各一錢
四桂三分　土瓜根三分　王地　當歸尾七錢半　黃柏酒洗二分
右作一服酒一盞水三盞煎至一盞空心執服一服未
内托柴衛湯治風濕熱鬱其手足少陽致血脉疑逆使
微黯色風本之性上衝顏必忿忿色其人多怒甚瘡之色亦
赫赤膚硬微帶黯色其瘡之形勢亦蒼然高起結硬而作
痛其脉洪緩而弦宜發其汗而通其榮衛則邪氣去矣
黃芪　桂枝各五錢　防風　羌活
黃芩　當歸各一錢半　連翹　柴胡各一錢
甘草炙　人參各一錢　蒼朮　紅花各三錢
右㕮咀只作一服水酒各一大盞同煎至一盞温服
右九方皆東垣及羅謙甫丹溪隨瘡所發分野制之
也其方皆以發表爲先不過一二服而愈如癰疽發在
太陽經分野必用防風羌活陽明經分野必用香白芷
升麻少陽經分野必用柴胡太陰經分野必用芍藥升

麻少陰經分野必用獨活厥陰經分野必用青皮柴胡
皆以佐佐之身半已下者必用酒水多熟煎之空心服
使藥下行身半已上者必用酒水少帶生煎之臨臥服
使藥上行脈細小無力必于本經藥中加辛熱劑脉洪
大有力必于本經藥中加苦寒劑隨症加減活潑潑地
其効如神真良醫也

消 縮毒金根散治但疼痛不急脹

乾葛 甘草 鬱金 川芎
瓜蒌根 白芷
右等分並生爲末每一錢温酒入蜜調下不拘時此藥
大散五臟積毒疑滯日三服

宜 羌活當歸湯治腦疽

黄芩 酒炒 黄連 酒炒 當歸身 酒浸 甘草 炙各一兩

羌活 黄柏 酒浸 連翹 各五 澤瀉
獨活 蒼本 各三 防風 梔子仁 各五
右㕮咀分作四服水一小椀先浸一時許入酒一匙煎
至八分去滓大温服食後臥後服
盡去滓清藥調下後臥
梹榔散用梹榔爲細末將羌活當歸湯調下
黄柏當歸湯治背疽

黄柏 炒 七錢 黄芩 炒 當歸身 炒 甘草 炙各一兩
黄連 炒 澤瀉 山梔
知母 地骨皮 各三錢 連翹 五分
防風 各五錢
右㕮咀分作四服每服水一小椀浸一時許入酒一匙
煎至八分去滓調下梹榔散大温服與前藥同

開 呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥

白朮　川芎　赤芍藥　連翹各一錢
陳皮　防風　黃芩二錢
甘草炙五分　木通一錢

右㕮咀以水煎服

丹 治好酒婦人用酒喂大黃取汗法見膏粱條一

精要十宣散　脉無力冬月亦宜温熱併表

人參　當歸　黃芪各二兩
川芎　防風　厚朴　桔梗
官桂　甘草　白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得于都下異人濟苦者不可計數陳無擇謂此藥在第四節服者非也早服中病者必消散

千金托裏散治發背疽疔瘡方見瘡

治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗

附子去皮臍炮當歸　麻黃　甘草
官桂　川芎　羌活　石葦
龍胆草

右九味等分爲末每服二錢水一大盞姜三片棗少許同煎

丹 一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚脈數而洪飡食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃芩生附子枯萎子甘草節差活青皮人參黃芪半夏生姜去貼而消此非內托之意歟

精 五香湯

木香　沉香　麝香　乳香

丁香　粉草　人參　黃芪
犀角

右每服四錢水二盞煎至一盞不拘時

五香連翹湯

乳香　甘草　木香　沉香各三分
丁香半兩　連翹　射干　升麻
黃芪　木通
獨活　烙三　麝香少許　桑寄生如無升麻皆可

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分溫服大便秘者加大黃

內托散一名護心散　一日至三日之內宜連進十數服

真茱萸粉一兩明乳香半兩慢火于銀石器中炒手捻攪使乾急傾出扇冷研極細

右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時細呷要藥常在胸膈間若動衝心有逼逆之証大宜服此如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

丹溪云內托散菓萸解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使此方專為服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理

雜方

仲　排膿湯方

甘草二兩　桔梗三兩　生姜一兩　大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

本　托裏排膿生犀散

皂角刺不拘多少炒黃去皮

右置罐中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出研為細末

每服一錢薄酒微温調下着月陳米飲下

保安湯治瘡托裏或已成者速潰

瓜蔞新者去皮火焙 側子炮通明者 金銀花 甘草 生姜各半兩

右爲細末用好無灰酒三升于銀石器内煎至一升分作三盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此

海小者輕劑内消

梔木飲子

乾梔木葉四兩半 乾荷葉中心蒂 乾蕺草根 甘草節 地榆各一兩

右細剉每服半兩水二碗煎一碗分作二服早晚各一服未成者自消已潰者自乾甘荷蒂去惡血當根下水煎毒利胸膈梔木不犯甘草剌能驅逐地榆主下焦血病輕

證候或可倚仗

猜車螯散

車螯 一兩煅通赤本草云車螯鮮酒毒 生甘草 輕粉五分

右一處爲細末每服四錢濃煎括蔞酒調下五更服轉下惡物爲度未知再用效在三香之上 又方車螯四個黄泥固濟煅赤出火毒 甘草一寸炙 蛤也一名蜃 燈心墊三十 瓜蔞一個去皮炒香

右爲粗末作一服酒二盞煎一盞去查入蜜一大匙和勻每用酒八分盞車螯末二錢服粉少許調勻空心温服取下惡物當症爲効

丹云車螯散一以輕粉心爲佐甘草睡消毒下積安詳穩重輕小症候可以倚仗

治背瘡荆芥穗木鱉子仁大黄蜈蚣甘草倂除荆芥穗爲

君外餘各等分酒水各一椀煎至七分空心向東飲即下積與粥便止若結成者用川練子七枚燒灰酒下次與十四枚又次與十一枚三貼後雖結亦小之陶氏

千 漏蘆湯治癰疽丹瘄惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆　連翹　黃芩　白斂　枳殼　升麻　粉草　麻黃　柴胡各一兩　大黃半兩

右除硝外每服二錢水一盞姜三片薄荷三葉同煎溫服取利為度

清 漏蘆湯

生黃芪　連翹　沉香　漏蘆各一兩　柴胡　粉草　大黃各二兩

右為細末每服二盞姜棗湯調下

內消升麻湯治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻　大黃各一兩　當歸　芍藥　黃芩各一兩半　甘草炙各一兩

右㕮咀水煎食前

清 內消丸治疳腫初生及瘡瘰結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉　皂角不蛀者水煮至爛各去皮酥炙各一兩　青皮　京三稜炮各一兩　蓬牛半斤取末　商陸炮

右為末入麝牛頭末同研丸如菉豆大每服三十丸煎青橘葉湯送下食後

孫真人單煮大黃湯

錦文大黃酒洗去皮

右一味剉如麻豆大水煮服

瘡神仙追毒丸能解一切毒如被狐狸毒鼠惡菌河純毒
疫死牛馬肉毒蛇犬惡虫所傷又治癰疽發背及療魚膾
瘡人多不識喚作癰疽致命殺人者及治諸風癰瘀赤腫
痛等

五倍子 楸破洗焙三兩　山茨菰 去皮淨焙一兩　麝香 二錢研入

千金子 即巴豆去油取霜一兩　山萸根一兩

紅芽大戟 去蘆洗焙乾一兩

雄黃各一兩　全蠍 炒

右除子金子麝香外七味爲細末却入研藥另勻用糯米飲爲丸分四十九丸服一丸生姜薄荷汁井花水研服昔有一女子乂年病瘵癖一丸服之一時吐下小虫千餘條半月即無事　丹溪云神仙追毒丸基五倍子消毒殺虫解風爲君山茨菰千金子大戟皆驅逐走泄之劑佐以麝香升散若用之固裹以發表實非所能灼見臟腑有精毒異虫深痼而躰不虛者亦足快意

古人兵刑義兵刑曰祥刑戒勿輕于用也

瘡高而薄岸其腫痛在外　帝曰癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留于經脉之中則熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷肌膚骨髓不爲焦枯五臟不爲傷故命曰癰

瘇平而大堅其痛微心　劉涓子云癰之痛只在皮膚之上又云癰發如火焚茅初如黍米大三兩日如掌面大五七日如椀面太即易治如腫冷發渴發過治之難愈

帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋骨良肉皆無餘故命曰疽

劉涓子云疽發或如小瘡觸則微心痛四邊微起如橘皮

孔色紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘急不止又云始發腫高五指忽乎陷者此內攻之候也精要云生瘡處不熱不痛低陷者此為內發難治必死

瘡者上之皮天以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此土、也癌瘡篇○精要云小按乃痛者病勢深此辨瘡瘡之法也

初潤一云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑猶傷寒毒氣猛烈而行經絡或淺或深無定五臟六腑癰疽陰症

治皆受五毒雜為調理唯宜急切于寒雜治於癰發諸不問虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱急脹滿或有痒疼別無惡候初用温藥平氣次用排膿發穴

治癰所謂平氣者乃犀角飲之類其方用犀角連翹漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所謂發穴者乃用針之類開皂角刺為君甘草川芎乳香為佐使亦托裏之

瘡可實內補虛

藥也然不若潔古東垣諸方發表托裏為穩當

瘡發諸處不拘大小精要謂廣一尺二寸日瘡者非惟起在背廣一尺二尺三尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶應四肢重疼前心亦痛餘處發猶可唯虛處及近筋骨處若膿毒未潰即傷爛筋骨肉損為瘡者屬五臟毒氣深沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須內實五臟外透皮膚令軟勻和即膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不此癰之毒氣浮淺也母作一類治之

凡一切瘡腫始覺患起高腫五七日忽平陷者此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補托臟腑令實最怕透膜膜穿十無一生矣留壅遏獨在經脉之中而專攻于外故初癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脉之中而專攻于外故初發時自表便發挽患處便如椎如盆高腫而痛甚者縱欲

下陷緣正氣內回不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不傷也疽之邪深其稽留壅遏內連五臟而不專攻于外故身躰或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如黑多死也治之之法癰之初發當以托為主表者散之裏者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必消膿已成者速潰也疽之初發當以涓子法為主補填臟腑令實勿令下陷之邪蔓延外以泥灸引邪透出使有穴歸着而不亂則可轉死回生變凶為吉今世外科不分癰疽一例宣熱拔毒外以五香新斗氣內以大黃竭其血終不能自悟其藥之非惜哉

補亟汤
治癰疽初起腫結未成可以消散毒飲子

黃芪二兩　甘草炙　天羅生　山藥炒
鬼腰帶炙半兩　生竹篙陰濕石岸絡石而生者好　絡
未者無用其藤柔細兩兼相　對影生主

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎一二沸去查溫服

精神効托裡散治癰疽發背腸癰嫩癰無名腫毒燉赤疼痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之

黃芪去芦　炙　甘草炙　各五錢　忍冬藤葉　各五兩　當歸一兩　入錢

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞病在上食後服在下食前服少頃再進留滓外傳

保諸瘡瘍痛色變黑紫者回毒金銀花湯

金銀花并梗二兩　黃芪四兩　甘草一兩

右用酒一升重湯煮三兩時去查溫服

本黃芪散

綿黃芪一兩　甘草半兩　皂角刺棟紅紫者炒黃一兩

右細末每服二大錢酒一盞乳香一塊煎至七分去查服

海 黃芪湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補也

黃芪四物湯

人參　黃芪　白朮　茯苓
芍藥　甘草　生姜　當歸
地黃　川芎　多加金銀花煎服

內固黃芪湯

純黃芪　人參各半

右細末入真生龍腦一錢研細生藕汁和丸如豎豆大每服三十九溫熱水下加至四十九日三服

五八孀年六十歲背上瘡脈洪大數午後惡寒發少

連翹　黃芪生三錢　人參二錢　陳皮
茯苓五分　砂仁三錢　甘草炙　白朮一錢

分十貼煎服

右方皆以黃芪為君甘草歸參為佐乃實內補虛之中兼托裏也

精 阿膠飲子

明阿膠炒如珠　粉草各一兩　橘紅半兩

石吹咀分作三服丹服以水一盞煎七分去查溫服

又方牛膠飲截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于內

牛膠通明者四兩　用酒一碗入膠內重湯煮溶透攪勻頓出更侵酒隨意飲能飲者以醉為度此法活人甚多腑活人不可勝數

又方黃蠟九服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟

白礬一兩　黃蠟半兩

右和丸如桐子大每服十丸漸加至五十丸溫酒送下如未破已消已破即合一日服百粒則有效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳治蛇咬溶化白礬乘熱滴傷處痛即止一方用明礬飛過研細以鷄子二個取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒放開服之膿未成者即消已成膿者從大小便出神效累驗其功大勝黃礬丸

國老膏治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其効不可具述

甘草大者二斤搥碎河水浸一宿採令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之（木香一方每甘草一斤分作三服溫酒調下今六一二匙恐力少也）

遠志酒治一切癰疽發於背膂毒惡候浸有死血陰毒在中則不痛傅之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傅之即不痛或溫熱在內熱逼入手不可近傅之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈

遠志不以多少洗去心　以滓傅于患處

為末酒一盞調末三錢澄清飲之忍冬酒初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫野老百發百中

忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和搥碎不犯鉄器　甘草一兩生剉

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一碗入好酒一大碗煎十數沸去查分為三服一日連夜進盡病勢

重一日夜可二劑忍冬藤補血如氣虛及寒多人不
用是故田夫野老百發百中也
阿膠飲牛膠飲黃蠟丸以牛皮屬金屬土補肺氣實大
腸壯胃止泄黃蠟丸以蠟味甘淡入大腸有補難化國老
甘以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有補性歸心歸血
用之頗切善用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛
亦奏捷功
右丹溪內補虛法皆以參朮歸芪又甚者獨參膏其
法並見後分經條及散見潰瘍門虛實寒熱條真轉死
回生之妙法也
雜病當分經絡論 六陰經六陽經分布周身有多氣少
血者有多血少氣者不可一槩論也若夫
要害處近虛處快溥處前指已曾論及惟分經之言未聞
也何則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其

禁忌

氣少血也其血本少肌肉難長瘡久未合必成危証又云
少陽經多氣少血與厥陰經同少陽有相火尤甚於厥陰
經者其有不思本經少血遽用驅毒利藥以伐其陰分之
血禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者予族叔父
平生多慮膚弱神勞年近五十忽有膊外側廉上生結核
身微寒熱而易怒食味頗厚脉之俱浮大弦數而重似濇
予曰此多慮而受傷血證在初秋勿輕視之宜急補以防
變証以人參一斤作膏下以竹瀝病者不費招一外科以
十宣五香散相間與服旬日後一日大風拔木病者發熱
神思不佳急召予視之核稍高大似有膿于中起一紅線
延過肩後斜走背脊過入右脇下不痛覺肩背重而急
迫食有嘔意服同前但弦多耳急作人參膏入苦朮生姜
汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮

甘草半夏生姜百餘貼而安此等若在春令雖神仙不治也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏駿補何由得免此正涓子所謂補腑腸腸皆由腸醫悞下之而死詳見後條 或曰太陰經非多血少氣者乎何醫瘡之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰醫君小腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻醫曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年已後不可生癰縱有痛腫參之脉証但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌可不慎歟

邪風水之令者多爲瘧

帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以甘勝治之愈也脈要精微論

血脈榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客之則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化爲熱熱勝則腐肉腐肉則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脉敗漏熏于五臟臟傷故死矣瘡瘍篇

生氣通天論云勞汗當風寒薄爲皷鬱乃壅又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大偻榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是亦寒邪從勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙又客之爲癰腫也觀此數論則知癰疽之發皆得之於寒邪所客也獨運氣瘡瘍一歲老幼相似之病間有熱者不可不知詳見運氣條

右經數節皆論癰疽乃因寒邪客之而發也治法則精要十宣散五香湯潔古蒼术復煎散等發表之劑是也

丱 朱郎年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一種毒此是冷折熱在肺經血分與此方

瓜蒌子 黃芩藥子 赤芍藥 當歸頭
條芩 青皮 皂角刺
甘草節 桂枝
右分四貼煎取一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前煎飲以忍冬藤查傅腫上

潰 安神散治諸色瘡腫調氣順榮衛

人參 茯苓 甘草炙 枳殼去瓤炒
附子泡去皮臍 白芍藥 山藥 陳皮
右等分爲末每服一錢水一盞生姜三片大棗一個煎至七分通口服

垣 膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從道于肉理乃生癰

膏粱內癰者名

腫榮氣者胃氣也飲食入于胃中先輸於脾而朝於肺脈朝百脈次及皮毛先行陽道下歸五藏六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走于空竅而先行陽道令及行陰道則濕氣大勝于令甘貴火乃大旺熱濕既盛必來赴腎若不慎房事拘其真水則水乏而濕熱之化上行其瘡必出背上及腦此爲大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出于他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病爲本非苦寒之劑爲主爲君不能除其苦楚疼痛也諸瘡癰有痛徃徃多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必無少減之理此其候也若使經

絡流通臟腑中去其壅滯必無痛矣痛則以苦寒之劑除之無不愈者瘡瘍食肉與自殺無異法當瀉氣而反補之故也

元好問飲酒太過脈候沉數九月間腦下項上出小瘡不痛不痒如白頭瘡凡四日後腦項麻木腫勢匆散熱毒燉發又二日痛大作夜不得寐醫處以五香連翹湯後再邀東垣診視云膏粱之變不當投五香連翹湯已無及矣且疽已八日當先以火攻之然後用藥以火艾炷如兩核許者攻之百壯始覺痛次為處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脉中得弦緊按之洪大而數又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異必先歲氣無伐天和以時令言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之酸以耎之然寒受邪而禁酸緣制黃連消毒飲治之

黃連五分　黃芩五分　黃柏五分酒洗　人參五分　獨活五分

知母四分寒引用通經為君　羌活一錢　連翹一錢此以大辛解本經之結為臣

防風五分　藁本五分　甘草炙五分　生地一錢酒洗　甘草炙五分此以甘温配諸苦寒者之一多則滋榮氣而補土

黃芪一錢　當歸身一錢酒洗　生地一錢酒洗此以甘温配諸苦寒者

陳皮五分下去白補胃氣　甘草梢五分生用瀉腎火之邪補下焦元氣　澤瀉七分淡滲導濕扶助私令　防已五分酒洗除膀胱

蘇木五分去惡　桔梗一錢使藥不上行　歸梢五分

所用之藥用酒洗併入酒煎者用酒執為因為使

右俱作一服水三盞煎至半乾去渣入酒少許再煎食後温服投劑之後大鼎日出乃寤瘡腫減七分精神旺

飲啖漸進灸瘡漸膿出而痊服藥後不得飲水必再作膿效遲初患三日者服之立效凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已東垣治疽陽藥七分陰藥三分名曰昇陽益胃散老人宜之亦名復煎散或加沒藥乳香各一錢

右東垣論膏粱肉食之變治宜苦寒不宜芳香者如雃裏條撮要內消升麻湯孫真人卑煮大黃湯皆為富貴食肉之輩設也

甘 嘗治一婦人年將七十形實性急而好酒腦生疽十五日脈弦緊急且濡予急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌炒人參入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已此亦內托之意也

辛 排膿散方

枳實 十六枚 芍藥六分 桔梗二分

右三味杵為散取鷄子黃一枚以藥散與鷄子黃相等採和煎如薄粥溫服一升即瘥

升 朱紹入宮右脚腫生附骨癰吃草藥酒多生隔瘀熱遂無方

人參 黃連 茯苓 桔梗 各等分

分二貼入竹瀝薑汁煎飲

保 諸瘡腫已破未破膿者當歸散主之

川芎 黃芩 黃連 各等分

右為粗末水煎一兩服如痛而大便秘加大黃三錢

消 凡癰疽外冷內疼者由陰氣外逼皮虛用熱物熨之大熱亦不覺者須用熱物前後熨令透隨手便用膠急潰膿

外冷內疼者宜熟藥數貼

毒藥使膿外出盡腫平即用生肉瘡瘡和正氣藥令進飲食不倦

治癰疽發背初腫時方

風化石灰二兩細辛一兩

右爲粗末用熱醋傳患處乾再傳三上其腫即消

四虎散治發背初生筋脉緊急不舒

附子生去皮一兩 天南星泡 半夏湯洗七次 狼毒各半兩

右四味爲末熱酒調成膏攤上腫處以熟絹靨定覺患處如火燒不妨

外熱內疫者宜涼藥敷貼

凡癰疽外熱內瘀者是有客邪內有積毒欲作膿透之候治背瘡初發時小後五七日赤腫高即毒藥令內毒散減疼免牽引乳香膏

乳香一兩 青連翹薄荷葉各一兩

右研勻厚摊患處以青絹盖之如乾以新汲水潤之常令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用氣毒攻結不可用

貼癰毒令內消金黃散

白芷 白芨 白蘞 白及 白歛

右等分爲細末用新汲水調傳

治陽症腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹一段刮去青兩頭留節開一小竅入草在內滿後却用油灰塞竅從冬至日放糞缸內待立春日先一日取起竪在有風無日陰處二十一日驗兩發好却破竹取草爲細末用水調傳

白蘞 白芨各二兩 南星 五倍子一兩炒 草烏 黃柏

右為末調如糊隨血圍匝如墻壁可移險處於不險處
如神

傳藥白飲　白芷　南星　白芨
貝母各等分

右為末水調傳外用圍藥束定內用傳藥提起劑之有
理

藥性論甘蔗根搗傳一切癰腫上乾即更傳無不瘥者
治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消
方搗汁根傳之數易乾

治諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若調點井
花水少許若不稠不須用水以紙攤如膏藥貼之立効
方用蜀葵
根去粗皮

又方　裹藥搗爛之立効腫乾為末水調傳亦

發背蝸牛百箇活者置淨瓶內新汲水一盞浸瓶中封閉
自晚至曉其水如泥取水將真蛤粉不拘多少調之刷瘡
上效

治背癰與癤久年㾦壁土黃栢等分細末生姜汁搜成
膏傳之夏以茅香湯下一二錢妙經驗

治癰疽止痛拔毒七寶散乾荷葉心當中如錢片不計
多少為粗末每用二貼水二盞熬令煎至一碗半放溫淋
洗乾以太白膏傳之

太白膏寒水石飛用臘月豬脂調成膏隨瘡大小用薄紙
攤貼之

飲瘡內消方黃明膠一兩水半升綿消了入黃丹一兩再
煮三五沸又放溫冷以鷄毛掃在瘡口上如未成即塗腫
處自消

右以蟾酥乳香各一錢同研勻細以兒乳汁和如泥入磁石盒妝之乾不効每用以唾調搽少許於腫處上以膏藥貼之毒氣自消雖然有瘡亦軽

濟 万應針頭丸治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

麝香二分　血竭三分如孀者用非真　軽粉三分
蟾酥三分酒化蜘蛛者用非真　乾腦一分
蟾酥試辣者研砂三分　蜈蚣一對全用

右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用針頭挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用帛花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈　如兩腋見無頭瘡即是暗疔即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥封蓋忌鷄鴈酒濕麪一切発熱之物

千和 一省椽背項常有痤癰愈而復生戴人曰太陽血有

外 凡癰不問已潰未潰者以膠一片水浸令軟隨腫大小貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

治 治發背秘法李北海云此方神受極奇秘以甘草三大兩生擣別篩末大麥麪九兩熬一盤中相和攪令勻取上好醋少許別檢入藥令勻百沸水煠和如餅劑方員大于瘡一分熱傳腫上以油紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便消

丹 隔皮取膿法治諸般腫毒

驢蹄細細一蕎麥麪一兩　白鹽半錢　草烏四錢去皮

右為末水調作餅子煖火炙黃出火毒研米醋調成膏用白帋攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

偏 治瘡瘍瘀腫木硬針頭散

餘也先令涌泄之次於委中排針出紫血病更不復作也

予男袞常喜熱灸烘灼其背及兩足又食自死肉久而兩足常生癰毒愈而復生者半年餘予以清涼飲子下之得紫黑血積於便中去者月餘其癰毒頓除是知積熱毒致癰腫者如此

李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常冷脈沉微細或自汗出急用姜附之藥甚者於臍下開孔着艾三五百壯待手足温泄瀉止飲食知味方可爲喜

精 憤鬱不遂志欲之人多犯此疾

無 癰疽瘡癤不問虛実寒熱皆由気鬱而成経云気宿于経絡與血俱濇而不行壅結爲癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也

遠志酒治七情内鬱成癰疽方見虛労条

精 獨勝散治癰疽皆緣血滯気凝而致者

香附子去毛令淨以生姜汁浸一宿焙乾研爲細

右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒気得之若有此疾必多怒但服香附進食寬気自有効

元 獨勝散治気鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施于体実気鬱之人予見吳兄厚味気鬱而形実性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰恃此以安然此等体実而又病実乃瘥千百而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子姜黄香附子甘草三味而以不老爲名且引錢氏先生與刘君爲証夫豈無其故哉蓋于行気中有補之之理耳天之所以爲天者健而有常也因其不息所以生生無窮正如芫荽子活血行気有補陰之

妙故名益母胎前産後所恃者氣血耳胎前無滯産後無虛以其行中有補也夏枯草治瘰癧亦然

補遺 謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結三証有異耳愚謂婦人海滿則行月閉一証固異然婦人性情執着比之男子十倍雖有虛証宜補亦當以執着爲慮向見樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沉毒年六十六七月間生背疽近正春醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散典酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬱酒肉之毒執着之滯時令之熱卒至于平陷淹延兩三月而不救

六脈不和則留爲癰全文見五臟○此則諸痛痒瘡瘍皆屬于心全文見診病瘡皆心火之用也或痒或痛如針刺者猶飛迸火星灼之然也熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲右心火実則爲熱瘡心火虛則爲寒瘡

脈 肺素有肝鬱脾胃移寒於肝癰腫少氣全文見診病肝藏血肝病則血從之而榮氣逆于肉理生癰腫是也 脾移寒于肝癰腫筋攣腎癰之脈也

末 治發背方草決明生用一升搗碎生甘草一兩亦碎水三升煮取一升温分二服大抵血滯則生瘡肝爲血之臟而決明和肝氣不損元氣也本草云決明除肝熱三陽爲病發寒熱下爲癰腫三陽小腸膀胱也下爲癰腫癰腫背膂脇爲病又腦疽背癰

運氣癰疽有四

一曰火熱耑心爲瘡經云少陽所至爲瘡瘍又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱發暑將起中外瘡瘍又云少陽所至爲瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰横流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃大温其病膚腠中

瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘡發于中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰之復病瘍珍瘡瘍癰疽痤痔又云火太過曰赫羲其病瘡瘍血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也

二曰寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫所勝血變于中發為癰瘍病本于心又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也

三曰燥邪傷肝為瘡瘍經云木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘍瘡痤癰病本于肝是也

四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天濕氣變物甚則身後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散於外是也

少陽攻裡之候

精要第一論曰凡有此病未要辨問是癰是疽是虛是實是冷是熱首先便服內托散五香連翹湯沉麝湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實多服為妙夫癰疽瘡癤臟腑陰陽有淺深虛實冷熱用藥有補瀉溫涼老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損奈何欲以不冷不熱四五方而通治之又多服為妙此不能無疑者也學者當審經絡察病機而處治豈可伏此為通治之法

東陽李兄年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過于色忽左腿外廉側上發一紅腫其大如栗一醫聞其大腑堅實與承氣湯二貼下之不効又一醫教與大黃硃

砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召予視之曰事去矣又一李兄四十餘面稍白神甚勞忽脇下生一紅腫如桃一人教用補劑服笑且排於是以流氣飲十宣散雜進之旬餘後召予視之予曰非惟不與補劑抑且多得解利氣血俱憊難矣已而果然

此二者皆由不預防本經少陽少血遽猛浪用大黃攻裏而死之者也

一男子年近六十形素肥初夏於左膊外廉側生一核方圓二寸餘不甚痛召予治診其脈息緩大而弱予曰此因憂悶而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又看作何應病家召他外科以十宣散五六貼而瘡甚予曰此太虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍以十宣散

又五六貼瘡平腦出清水而死此可為因虛而生癰之

之例　胡經歷女及笄性急而形實未許嫁厚味積毒已深髀骨中痛者年餘醫以氣藥雜治之愈而復發至秋冬令忽大痛發熱醫者方悟髀樞穴上生附骨疽在外廉側少陽之分其厚味性急自首至尾悉是五香湯十宣散服至瘡潰猶與五香湯者月餘忽一日惡寒發熱腸滿醫者不悟升散太多瘡口已絕孤陽狂越于上猶恨服五香飲欠多致腸閉有滯大服以進一夕喘汗而死

此二者由不預防本經少陽血少遽猛浪用十宣五香表散而死之者也可不戒哉

帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲膿小鍼能取之乎岐伯曰聖人不能使化者爲之邪不可留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳于中野者此非一日

之謀也能使其民令行禁止士卒無白刃之難者非一日之教也須臾之得也夫至使身被癰疽之病膿血之聚者不亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成也不從天下不從地出積微之所生也故聖人自治于未有形也愚者遭其已成也黃帝曰其已形不予遭膿已成不予見爲之奈何岐伯曰膿已成十死一生故聖人弗使已成而明爲良方者之竹帛使能者踵而傳之後世無有終時者爲其不予遭也黃帝曰其在前順爲爾奈何岐伯曰以小治小者功小以大治大者多害故其已成膿血者其惟砭石鈹鋒之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在前順爲爾（玉版篇○逆順法見潰湯瘍條）

治初生癰疽發背神效灸法累試有驗江陵府紫極觀道士得石碑載之凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛以其紙復其上立視候之其紙先乾處則是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者多至不痛時方住最要早覺早灸爲上（如有頭似麻萱大者不用灸法只消頭上灸之）若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾于餅上燒之（一二日十灸十七八日五六日三四活）

灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者灸至痛時住不痛者灸至痛而後及良肉所以痛而灸而痛者先及其未潰所以不痛也

癰疽者灸至不痛痛者灸至不痛大率以百壯爲準又云癰如諸盜入主人之家必開門逐之使出萬一門不開無從而出必傷主後已

灸而痛不痛者先及其潰所以不痛也

上瀕發背方序云元佑三年夏四月宮京師疽發於背

召國醫治之逾月勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加
瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂
膿盡潰肉理皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉
易時旋剪去黑爛月許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫
病疽者七人余獨生此雖司命自然固有料理不知其方
遂至不幸者以人意論之可爲慨然於是撰次前從所得
方模板以施庶幾古人濟衆之意此即當頭隔蒜灸法但不用蒜耳

精 史源毋氏肯構問徵痒視之有赤半寸許方有白粒如
粟黍乃急着艾炙其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛
視之有赤下流長二寸潤如韭葉舉家皆以前灸爲悔或
云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈奔閭之全六
劇時昏不知但小師輩言范八奉議守定灸八百餘壯方
甦約艾一篩爾亟歸白之見從始以艾作炷如銀杏大灸
其上十數殊不覺痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺
痛七壯後覺痒每一壯輒以艾作圓大灸其上漸加至鷄黃大
量收退痛者不憚遂以艾作圓大灸其上漸加至鷄黃大
約四十圓方覺痛視火焦處已十餘蓋灸之違而初發處
肉已壞壞肉成隔直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病
者六夜不寐至是食粥安寐至晚視之瘡如覆一甌突高
三四寸上有百數小竅色正黑突然高者毒氣出外而聚
也百數小竅者毒未聚而浮攻肌膚也色正黑者皮與高

通 地之濕氣自外而入氣疵瘍
先用温火復蓋不令凝滯灸瘥
立已若不如此血不凝滯而

瘡腕也嬰兒瘡亦爲

精 騎竹馬灸法先令病人以
條自臂腕中曲處橫紋男左女
盡處截斷爲則不量指甲却用竹
定令身正直前後用兩人扛起令脚不着地又令二人扶
定勿令傾仆却將前所量臂腕從至筴盡處爲則用墨點定此只是取
處直向上貼着背量至筴盡處爲一則就前所點處兩邊各量一則
中非灸穴也却用薄蔑作則子量病人中指節相去兩橫
約爲則男左女右截爲一則
盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯止不可多灸不問
癰疽生何處並用此法灸之無不愈者蓋此二穴心脉所
通處此癰疽皆心火留滯而生灸則心火流通即見安愈
可以起死救危有非常之効累試累驗

詳臂腕中曲處橫紋即曲澤穴間橫紋非掌後
紋也

丹 凡癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內熱若於生
發之際支節以後背注之于早可以移深爲淺改重爲
輕諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤爲切要此消患於未
形之策

保 凡瘡可灸而者須分經絡部位血分多少腧穴遠近若
從背而出者當從太陽五穴隨証選用或灸泄其邪
氣

凡太陽多血少氣

至陰 通谷 束骨 崑崙 委中
從髮而出者多從少陽五穴選用 少陽少血多氣
竅陰 俠溪 臨泣 陽輔 陽陵泉

從髭而出者多從陽明五穴選用　陽明多血少氣

厲兌　內庭　陷谷　衝陽　解溪

從腦而出初覺腦痛難忍欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣髓者舍也故脈浮者從太陽經依前選用脈長者從陽明經依前選用脈弦者從少陽經依前選用論曰諸經各有井榮輸經合井主心下滿及瘡色青榮主身熱及瘡色赤俞主躰重節痛及瘡色黃經主咳嗽寒熱及瘡色白合主氣逆而泄及瘡色黑各隨經病而見此証者或宜灸或宜針以泄邪氣經云邪氣內搐則痙熱宜砭射之也

右保命集分經灸刺乃大綱耳今更取靈樞經脈篇及銅人等書毫分縷析出各經分野在針門十二經條列為之圖目之曰經絡分野圖使人視之心目燎然自無

全牛矣夫癰疽初發必先當頭灸之以開其戶次看所發分野屬何經脈經脈既定却內用所屬經脈之藥引經以發其表外用所屬經脈之俞穴針灸以泄其邪內外交治邪無落也針灸癰疽者更於針灸門十二經脈分野圖求之

非秘結積熱者忌大黃

甲　癰疽瘍陰主之　頭項癰腫不能言天窓主之

乙　邪氣不傷於腸胃大便如常慎不可下切禁之

精要云大黃治癰疽之要藥以其宜熟拔毒又云瘡始作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前用大黃恐因病躰實而大腑秘結有積熱沉痼之積者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢乎若下利之後又與利藥忽非防微杜漸之意

瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實堅之証自當行仰景發表之法借五香湯爲例散之於外何必遽以峻下之藥以奪其裏自取其禍乎

精要云大凡癰疽不可令五香湯此又不能無言者也開卷便於第一論中詳言之吾衆知良甫之頑原可以驟散而大下者若果有堅秘病氣鬱塞若是之頑原亦當開陳時之先後証之高下庶乎後人不敢孟浪殺人也戊曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方已言之矣良甫祖述其說何吾子病之深也曰大黃除諸實熱而性峻急孫以盛行奇術於公卿間時在晚宋民不知兵戈游於富貴之家肉食之輩固皆捷効今良甫不分貧富苦樂務逸一槩用之寧無孟浪之患乎況有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪味而虛者施力動勞而虛者大

腫過飽而虛者皆因氣弱而濁甚血少而濁生疽固是難治之症若大腑秘而稍安穀食肯守戒律甘心淡味者猶爲可治但費補工夫耳治因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以爲有外感而行大黃些少寒熱不知其血氣不和也便以爲實而行表散如此害人甚速

垣　瘡湯及諸病內伏火熱禁不得攻裏爲陽氣俾鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脈風証只用發表風藥便可以通利大便若只乾燥秘澁尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也慎不可汗之則愈

排膿內補十宜散若用之于些少癰疽與冬月盡可助湯用之亦可轉重就輕移深爲淺

宣息施於夏月與潰湯

若潰瘍當夏月用之其秋杪之溫散佐以防風白芷善愈雖有參芪難爲倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉　又云內補十宜散瀉衛煖血藥太多止可用于輕小証候虛之甚者恐難倚伏

內托忌施於年老與体虛

精竭六內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝而發恐非必用之劑若夫年老者病深者証慾者躰重者聲音雖補將有不勝重任之患矣

脈厥冷熱

脈數厚不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

輕表散也

豬家雖不疼痛不可　汗汗之則痙

發汗爲大汗出非謂諸托裏之藥深

忌奪血

蜞針法謂開門放毒以爲要捷恐可施於輕小証候耳愚謂蜞之所吮止膚間惡血若積毒于臟腑者徒竭之於外而不及于裏恐未爲得徒見張兄之子甫二歲遍身赤瘡如霞片子向見其母久病疳謂毒熱在血所成者張曰誰不因母血所成何謂毒熱之血子曰其母雖疳食肉如平

時肉性熱與宿痰之熱相搏非毒歟張不之信自取五六
大甌吸其血瘡頓消乳食起居如舊予曰非其治也未可
以為善張怒越二三日大發熱而暴死非竭之於外血去
而氣不能獨存乎

治法

精要云口乾與口渴不同不宜用丹藥鎮墜用之其禍如
反掌用桑枝煎五味湯以救陰水甚妙方也而不言食味
起火怒氣生火房勞激火吾恐渴未易除也

灸法

精要謂頭上有發毒者不得灸恐因火氣拔起熱毒炎上
動病邪而添病患謂此言過矣火本以暢達拔引鬱毒此
從治之意也頭為諸陽所聚之處艾灶宜小壯灸宜少小
者如椒粒少者三五灶而已若盡滾如腹背上引痛灸至
不痛不痛灸至痛為例斯為誤矣

按東垣灸元好問腦疽以大艾灶如兩核許者至百壯
始覺痛而瘥由是推之則頭上發毒灸之痛者艾灶宜
小壯數宜少如不痛者艾灶大壯數多亦無妨也又引
陳日華之說謂於始發時用針灸十死八九此未之思
也切詳因灸而死者必其血虛孤陰將絕無以承當火
氣脈必浮數而大鼓與精神必短而昏豈可泛言始發
不可灸以誤人

瘡疽已覺微浸腫硬皮不變色脈沉不痛者當外灸之
引邪氣出若已止經曰陷者灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之如有膿水
者當急灸之是邪氣深陷者灸之如外微覺木硬而不痛
亦不可灸當刺之

按刺之膿出不腫痛者邪已去矣不宜灸若刺之膿出
而痛腫不止者亦當灸之無妨又毒雖淺却有
十數頭腫痛者亦灸之無妨

春夏宜急生肌　秋冬宜壯肌氣

洞 一有癰疽瘡癤須順時節春夏為正易為整理緣天氣温和肌肉緩慢而煖故易治其有內冷是患人氣虛所致但以温藥調順氣血外即用温煖潰膿膏藥貼之令穴候穴抽膿盡急用生肌長肉藥滿瘡口不宜緩慢恐至秋冬成洞瘡也或在秋冬發者乃春夏內先有發蒸熱毒遇一陰生後毋有伏毒至秋冬間又因食毒物酒麪房慾之事忽發初覺微小數日之間腫大疼不可忍初得大便五七日不通小便淋瀝者是其候也先調脾臟氣令實次服發穴排膿消毒去積之藥內托温平不得用太熱澁之藥線肿中臟要和煖如用熱藥恐氣澁而不流暢致榮衛不調也貼即用温涼藥不得用冷藥恐逼入毒氣須引膿外透方漸安矣

中 諸浮數脈應當發熱而反灑淅惡寒若有痛處當發其

滑 陰滯于陽則發癰陽滯于陰則發疽而此二毒發無定處當以脈別之浮洪滑數為陽微沉緩濇為陰陰則熱治陽則冷治

右陽脈當以癰法治之陰脈當以疽法治之不必拘於熱治冷治也

中 身重脈緩濕勝者除濕　身熱脈大心躁時腫乍來乍去者清熱　諸痛眩暈動搖脈弦者去風　氣澁氣滯乾燥亡津液脈澁者瀉氣補血　寒勝則脈浮食不入便溺多惡寒脈緊者宜瀉寒水　腎脈澁甚為大癰全文見虛実法

滑 夫人生最可憂者發背也其種有五

一曰陽毒因風熱而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有陽毒觸處留積起于背脊之間不問椎數但從兩夾春

起止腰上滿背熾熱如炊之狀赤紫或紅如焰膿毒難成成後不止止後痛不除驀忽數日之間復平如舊將謂腫消此是內攻肉陷不可療矣

二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快憎悟而痛直應前心心忪怔頭目昏重寒熱如瘧五七日後始發引攻腫開闊難收內積有膿深沉遲緩未透宜急以神氣湯藥內托外以拍膿藥貼之宜急見膿無膿即平愈

末期

三曰有人多服金石煉之藥毒惡流滯成發背者初起如丹疹之狀漸開如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多渴嗜冷其瘡難起起即驚人猶勝于陰陽二毒者緣此有解金石藥毒湯散治其內也賴有根底分明亦須急療方安

四曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮膩腻未下胸膈房室不禁忿意當風取快脾臟氣虛不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如小彈子後大如拳堅如石痛遍四肢加之拘急口苦舌乾腹急大小便澁十數日後頭面手足虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其症也喜方腫引急用妝腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水不可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因而感邪內敗者死矣

五曰人有胃山嵐瘴氣發背毒氣先在臟腑年月浸遠氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑痺痛深附筋骨徹髓按之如木石引手加深方覺似有痛處至五七日毒氣浮淺腫高色變膏白有如拳打之狀寒戰似瘧及有風候

頭動口偏手足厥逆眼黑睛小白多而慢此內有邪氣相搏急破出清血三五升方有黃膿白汁相和發泄其皮不寬不慢亦急脹痛亦不住直至色退熱疼方愈亦宜急急追趕膿與毒氣外出無害

早治愼重者生　初患腫三日內灸者生　八日內膿成針烙導引者生未瘥愼勞力者生　愼忌食者生　不諱發背者生　愼喜怒者生　懼腫猛療者生　急療者生　愼療縱待膿自出不導引者死　未內攻而針烙用藥導引者生內攻後導引針烙者死　腫煩熱痛方盛已前療者生如過此後已內攻者死　膿成後不出不導引但傳藥者死如赤白痢氣急者是已內攻醫療無益必死　癰不救十得五生疽不療十全死　輕腫怕痛者必死　不過良方者死　節候不依法者必死　愚執恣意用性逸情者

河洛誕　有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚孕易于敗壞初發即可如黍粒大三兩日漸赤引腫如手掌面大五七日如碗面大即易為攻煩熱赤引如火燒之狀浮面漸潰爛開內發腫如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退疼亦不止發渴發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開闊者尤宜發膿托毒湯藥用之必愈陽証實也

不治証　其間有只如豆面大者此非不大緣為毒氣深沉內虛毒氣近膜也此必內攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散入四肢其人聲嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不治陰証虛也

陰陽　癰其証屬陽勢雖急而易治若初發如粟粒甚則如荳許

膜肉俱平或作赤色時覺痒痛痒時慎勿抓破此乃五臟不調爲疽其証屬陰蓋毒氣內畜已深勢雖緩而難治始發一粒如麻莖大身躰便發熱生疽處腫大熱痛此爲發於外雖大如盆治之百可百活陽症貴也或身躰不熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日後漸大不腫不痛低陷而壞爛此爲發於內雖神仙無如之何陰症虛也

雜方

保木香散治小兒疽後生癰如神出小兒門

地骨皮一兩　木香半兩　麝香一字　川山甲炙黃二錢五分

右末米飲下二錢

瘡瘍

癰疽已潰膿出者也

仲諸癰瘡欲知有膿無膿以手捻腫上熱者爲有膿不熱者爲無膿

凡癰疽按之牢靭未有膿也按之半軟半靭已有膿也宜急破之軟未詳何切半軟謂半央膿熟處半靭謂四旁無膿腫肉也

凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實又而方消

夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟瘡膿成則宜針疽膿成則宜烙　切宜熟視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用梯針尖自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不用針刀也尸溪云精要論戒用針刀業外科者當奉爲服膺

皮厚腫堅者用梯針九

唇成宜急破之

居處

啓針丸治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香一字　硇砂一字　沒藥一字　乳香一字

石灰餅藥內種糯米十四粒其法用石灰五升爐灰三

升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三五升用
瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙
貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種在皮紙
面上一宿即是

右為細末糯米飯為如麥粒大每用一粒未破用津貼
瘡頭薄處即破膿滿不快則用一粒納瘡口內使膿不
滯好肉易生

無替針法　陳倉米　沒藥各一

雄雀糞半升　硇砂少

右研勻以米飯為如粟大每用一粒貼瘡口眼中即潰
膿出

梅　治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀糞奎
頭上乾即易之雀糞中堅者為雄

鈹針以取膿

又治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紙即膿出
已盡一個去皮膜不去心油鹽豉十四個口中含去皮令
軟同研爛真珀少許如難丸入少稀糊捏作餅子如鼠糞
大大小臨時看瘡口細之只以紙撚子送入藥須臾必痛
忍之良久膿遂出

出一切瘡口出蛾傅殼燒存性無灰酒調下每服一枚
服下一個時辰便有瘡口一個若服兩枚出瘡口兩枚

癰成不針其欲用馬銜鉄為之形如扁葉兩面皆利
可以橫直裂開五六分許取其毒血如膏病輕須先灸而
後裂

按癰如椒眼數十粒或如蜂窠遍布而膿出痛不除宜
用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼
之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各各

灸之亦作不必裂也

鈹針者末如劒鋒以取大膿全文見針灸門

素夫癰氣之息者宜以針開除去之病疑篇王註云息瘜也死肉也○今世用刀割去死肉者是也　治腐腫者刺腐上視癰小大深淺刺大者多血小者深之必端以針為故正長刺節論○大者多血小者深之八字衍文也大小深淺刺上字取癰之法盡於此矣

流成膿宜烙可用銀鎊大二分長六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿為効

凡癰覺在虛處及膿不出處皆是惡症如發高腫紫赤及滿光澤覺裏有膿毒者諸藥貼敷不破者宜用銚銅鍼於油火上燒透先用墨筆點定却當頭以針淺刺入隨針出膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紙紵入針孔引出膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一道也腫不退疼不除但膿出二道也膿疼不退患人不覺瘡輕三道也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害稍遲緩即恐傷筋骨肉疼凡近筋脈骨節處不得亂行針烙反致他病也　患疽初生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅當用熟鉄大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熟透以大頭處按定捕入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作紙子紵入直候次日取出其膿即隨紵下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得亂行針烙　凡患發昔覺似有膿成便用大熟鉄針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通

紅烙入可二寸許初入肉即須橫捕入不得正入恐烙透
膜也如已有破處皮爛潰熟史不得用針烙如是橫長赤
引開闊當須兩頭下火針令膿盡隨針引出肥人膿汁多
瘦入膿汁少如肥人却少瘦人知多多是肉敗壞成膿少
是肉不腐爛受氣實也尤宜詳審不可造次便行針烙亦
有患人氣脈勻和榮衛氣不節滯血脈不致凝澁即行針
烙無畏切須仔細患人氣虛脈氣大者亦不可亂行針烙
針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤
者即可用針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用
針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不可用針烙

丹 或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴
者既前無肉托之藥先致力于內後又不用烙以開竅脈
膿何由出　膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若又留肉腠

間則毒氣浸淫好肉亦化爲膿腐此所以烙法有功于潰
瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐誤而脇
取利也

黃帝曰有問身形應九野奈何岐伯曰請言身形之應九
野左足應立春其日戊寅巳丑　左脇應春分其日乙卯
左手應立夏其日戊辰巳巳　膺喉首頭應夏至其日
丙午　右手應立秋其日戊申己未　右脇應秋分其日
辛酉　右足應立冬其日戊戌己亥　腰尻下竅應冬至
其日壬子
六腑膈下五臟應中州其大禁太乙所在之日及諸戊己
凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身躰有瘡
腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

身形應九野圖

右應立秋戊申右應立冬戊戌
手巳未忌開膿脇足巳亥忌開膿
酉忌開膿足巳亥忌開膿

膺應夏至六腑應中州太腰應冬至
喉乙所在日尻
首丙午日及諸戊巳下壬子日
頭忌開膿五日忌開膿竅忌開膿

左應立夏戊辰左應春分乙左應立春戊寅
手巳巳忌開膿脇卯忌開膿足巳丑忌開膿

行年五十三歲七十三歲巳上四人百神在忌忌患瘡疽上部不可患癰疽發背見血者死子辰年血忌餘年不妨男女同

二十五歲三十一歲六十八歲七十四歲以上四人百神在額不可患瘡腫見血者死

十八歲二十四歲三十五歲四十五歲五十六歲六十七歲七十二歲八十九歲以上八人百神在兩肩臂不宜患癰疽瘡腫瘡腫見血者死

十二歲二十七歲三十六歲五十九歲六十六歲九十七歲以上六人百神在中部不可患癰疽發背見血者死巳酉丑年血忌餘年不妨男女同

三十二歲四十二歲五十五歲六十一歲以上四人百神在肩背不可患癰疽見血者死

十九歲二十六歲四十九歲五十六歲七十二歲八十歲九十一歲以上八人百神在肝肺俞不宜患癰腫見血者死

十一歲二十三歲五十八歲九十六歲以上五人百神在脇肋不可患癰疽見血者死

十四歲二十九歲四十六歲五十二歲六十歲三十九歲四十六歲五十二歲六十歲六十九歲七十六歲八十一歲八十八歲九十五歲以上十一人百神在下部不可患瘡漏疾見血者死下部亢忌勞瘵人不宜下部出膿難瘥

十一歲十五歲二十七歲六十三歲七十五歲以上五人百神在尻尾間不可患癰疽見血者死

十三歲二十八歲五十二歲七十二歲九十三歲以上五人百神在足下不可患癰疽見血者死

虛實寒熱冗忌

二十一歲三十八歲四十一歲五十歲以上四人百神在遍身不可患瘡腫見血者不治

凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫欲熱者即用紫急收赤腫藥圍定不令引開中心即用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裡內補雖破穴膿汁不多再須排膿托毒透後慎不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止矣內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬

丹精要云凡疽疾勿食羊鷄牛鵞魚麵煎煿炙炒法酒等

味犯之必發熱只有梔子黃芩湯用之取効夫梔芩苦參犀角輔佐人參固可解食毒之熱若寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變足生大疔此原癰疽之因也禁戒厚味蓋以厚味能引起宿火之熱此誠富貴豢養口腹者所宜謹守若素貧者大不然矣予治章兄背疽徑尺家貧待死而已視瘡穴黑深似有近內之意急作參芪歸朮膏飲三日略以艾苧湯洗氣息奄奄不可支持幸其身不發熱而可進飲食每日作餛飩大碗與之盡藥膏五斤餛飩多肉者三十碗瘡口漸合以其因肉與餛飩助氣之有益也

捨時從証　六脈沉數有力　爭呌冬宜下

建　凡治病必察其下予從軍戊午年冬于武城縣有賈倉使父年踰六旬冬至後數日疽發于背五七日腫勢約七寸許不任其痛瘍醫曰視之膿成可開矣公懼不從越三日醫曰不開恐變証生矣遂以燔針開之膿泄痛減以開運之故治二日變証果生覺重如負石熱如焚火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱故宜寒藥治之時月嚴凝復有月寒遠寒之或乃思內經曰有假者反之雖違其時以從其証可也與瘍醫議急作清涼飲子加黃連一兩五錢與之利下兩行痛減七分翌老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥膿之氣獨存憔悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議遂制五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡針出膿因怒笞侍妾瘡即內陷四一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脈極沉細而遲蓋緣衰

脈微泄瀉內陷者虛盛宜溫

日復用前藥其証悉除月餘平復　陳錄判毋年七十餘歲忽冬至後腦出疽形如瓠面大命瘍醫診視俟瘡熟以

瘡復大發隨証調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛痒瘡瘡皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣

至元壬午五月二十八日王伯祿年五十有七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈證俱寒予聖瘍醫孫彥和視之曰此附骨癰開發已遲以艾灸針啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和以丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利膿腹冷而腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處炙二七壯又處托裏溫中湯用乾姜附子木香沉香茴香各二兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言差活等分吹咀一二服心火又當盛暑之時乾姜附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不進此謂五虛況吃逆者胃中虛寒極也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此証內外相反須當捨時從証非大方辛熱之劑急治之則不能愈矣遂投之諸症悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正彥和又與五香散數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變因而取敗者亦多矣況醫乎哉守常知變豈可同日而語

托裡溫中湯治瘡瘍為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便溏食則嘔逆氣短促吃逆不絕不得安臥時發昏憒

差活　益智仁各一錢　乾姜炮各三錢　黑附子四錢炮去皮臍　沉香各一錢　木香一錢半　陳皮一錢　茴香　甘草炙　丁香

按經曰寒淫于內治以辛熱佐以苦溫附子乾姜大辛熱溫中外發陽氣自裡之表以為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁沉香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香茴香陳皮苦辛溫治瘡散滿為使也

石吹咀都作一服水三盞生姜五片煎至一盞去查溫服無時息一切冷物

一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自去吃內托散隔申不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮煮膏以牛膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥二斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自湧出而得睡又旬餘內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以溫胃行氣時七月大執脈洪數有力予因謂此脈症在潰瘍尤為忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡藥十五斤竹瀝百餘拏而安予曰此病幸安也不薄味必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脇旁生一軟塊如餅二年後軟塊為疽本人見膿血淋漓而脈洪數有力又嘔逆食不下食必遂自以人參膏入竹瀝飲之又百餘拏而安今八十歲強健如舊此病雖以老年血氣弱專服人參竹瀝而愈若與內托十宣散恐未能若是之安全也

潰後反痛宜補宜溫宜和解之

膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和解之亦有風寒逼者宜溫散之

補者歸芪之類和解者乳香芎藥之類温散者防風桂枝之類

攻下

瘡小娘瘡後右腿股生癰破後筋吊疼脈虛而濟詢之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

川芎 歸頭 條芩 生地
牛膝 黃柏 甘草炙 二分
槟榔 五分 通草 三分 桂皮 一
青皮炒 一

右煎食前熱飲之

潰後忌五香飯 若用于腫瘍猶可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用于潰瘍雖多有參芪甘草之緩補而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎

膿出忌追毒丸 精要云凡瘡則行聞臭則逆又言飲食調令香美益其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾土若香美者但能起火經以熱傷脾熱傷氣為戒今曰益脾養氣若施之于腫瘍者似有暢達之益潰瘍後用香美恐有發濕熱損真陰之患矣

精要云熱盛脈數與漏蘆湯煮大黃等湯不甚熱脈緩弱只投五香連翹湯矣熱盛脈數若腫瘍時臟府秘而躰實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者熱盛脈數去死為近其可下乎緩弱之脈古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

又不能無疑者也大追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

渴忌油毒丸

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膽湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則津液生氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示脈証何以知其當下後又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脈証恐是但有大渴必與峻下下後尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

潰後咽痛忌犀角衝心與琥珀犀角膏大青

瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不助病邪致虛以速其死也即後有犀角散以大黃佐黃芪用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有実熱夫瘡潰躰虛縱有舊熱將自漸因膿血而消何必以峻冷利動臟腑若在秋冬何異用刀劍即

潰後寒熱忌正氣

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔瘀然後寒熱寒熱解大汗出不可專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此証者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散瀉衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之瀉衛可乎若用于腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能無治乎又未知用于腫瘍即潰瘍耶

穴未合慎風濕

穴有孔慎風仍慎再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣

害人之命也

無瘡瘍未合風入爲破傷風濕入爲破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癱疽瘧癰潰後尤宜謹之

清後大補氣血 加味十全湯治癱疽愈後補氣血進飲食

黃芪蒸　當歸　川芎　地黃蒸　白朮　茯苓　芍藥炒　人參　甘草炙　肉桂　各一兩　陳皮　粉草炙　五味各五錢　烏藥七錢

右�once咀每服一兩用水一椀生姜五片棗二枚同煎分作二服留查晒乾爲末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之强弱証之緩急時之寒熱加減用之

平 加味十全湯治癱疽後補氣血進飲食實爲切要蓋膿血出多虛陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡

運氣

不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫痛寬遂以爲安漫不加省往往于結痂後兩三日或半年成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言閒不舒肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾于背膂腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予爲作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者太半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石三錢半以青州白丸作料煎飲子頓服之予諫止不聽因致不救書以爲警云

運氣癱自潰者惟土不及歲有之經曰土不及曰卑監卑

監之紀其動瘍涌分潰癰腫蓋土不及則肉腐爲癰腫故
木化啓折乘之而膿涌分潰其癰腫也
東垣癰疽用藥加減法　如發背疔腫膿潰前後虛而頭
痛者于托裏藥內加五味子　恍惚不寧加人參茯神
虛而發熱者加地黃瓜蒌根　潮熱者加柴胡地骨皮
渴不止者加知毋赤小荳　虛煩者加枸杞天門冬　自
利者加厚朴　膿多者加當歸川芎　痛甚者加芍藥乳
香　肌肉遲生者加白斂官桂　有風邪者加獨活防風
心驚悸者加丹砂　口目瞤動者加羌活細辛一嘔逆
者加丁香藿葉　痰多者加半夏陳皮
清麥飯石膏在膿潰後圍瘡口
麥飯石火煅醋炸十次研數日　鹿角煅炯　白斂
右用麥飯石末二兩白斂末二兩鹿角灰四兩要研極

細如不細反痛用好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却
入三味藥末用竹篦子不住手攪熬一二時稀稠得所
傾出候冷以紙蓋瘡用時先以猪蹄湯洗去膿血挹乾
以鵝翎拂藥塗四圍凡赤處盡塗之但留一小口如錢
大以出膿血凡用猛藥上久則藥乾勿令細急須常用
醋拂濕其藥初便一日洗換藥十日後兩日一換肉冷者不宜用惡疾
猪蹄湯治一切腫破消毒氣去惡肉凡瘡有口便用此湯
潤洗
白芷　生甘草　羌活　露蜂房
黃芩　赤芍藥　川芎等分
右爲粗末看瘡大小用藥如瘡大猪蹄兩隻只用白
水三升煮軟將汁分爲兩次澄去面上油併下面查却

將藥末按其中再煎十數沸去查以故帛蘸藥湯温洗薄揩惡血惡肉隨洗而下洗訖仍避風忌人口氣吹之又忌狐臭人月經人

去死肉癰疽有死肉不去者用白丁香霜梅深則紝之淺則乾摻於膏藥上甚妙

又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不惟惡瘡凡癰疽有惡肉者俱可去

又方雄黃散以雄黃一錢另研巴豆不去皮研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香 輕粉 粉霜 雄黃

麝香各一分 巴豆霜三個

右細末新飯和作錠子用之

丹治瘡疽攻腫息肉突出烏頭五枚苦酒三升漬三日洗之日夜三四次古今錄驗

諸癰疽有肉凸出數寸者更于凸出處門求之

清神異膏治諸般惡瘡癰發背癰疽其妙如神

露蜂房要用蜂巢多者為妙細剪碎一兩 全蛇蛻以鹽水洗淨焙乾半兩

玄參半兩去苦

黃丹五兩研細後入

杏仁去皮尖切小斤一兩

右件藥先將麻油入銀銚中同熬髮于風爐上慢慢文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好綿濾去查再將所熬油入銀銚內然後入黃蠟玄參二味慢火熬一二時取出銚子安一冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移銚于

絹黃蠟三分

真麻油一斤

男子亂髮洗淨焙乾如鷄子大

火上不住手攪慢慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用窠器內封收待用或恐偶然熬火大稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內窠器盛封蓋於瓶上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛窠器置淨水盆中出火毒一晝夜歇三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火發千萬謹戒膏藥效無出于此

熱瘡寒膏藥

當歸身 水洗焙乾一兩 杏仁 湯浸去皮 尖一百个

黃丹 研細六兩 肥嫩柳枝 三兩半切如寸許洗淨焙乾 麻油一斤

右件先熬麻油熟下肥柳枝熬令半焦以綿裹當歸杏仁同前至柳枝焦為度去藥在濾油澄淨抹去銚中渣滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成滴水中不散為度

寒瘡熱膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸梢桃柳枝分兩倒過便是

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用逼毒散方

黃蠟子 白蠟子 各一兩 赤小豆二兩 雄黃一錢

右為末水調傅治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用緊瘡口生肌膏散子

槿花葉臨時收陰乾爲末　青赤小荳
白芨各二兩

爲末臨時用槿花末三錢七白芨小荳末各一錢七相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼

【垣】歛瘡口方木香槟榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡上生肌歛肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏梁熱瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香　槟榔　黃連各等分

右爲極細末依前調用濕則乾貼

治寒瘡歛瘡口藥

當歸身一兩洗淨晒乾　青皮二分去白　木香一分

黃連五分

右四味爲極細末蠟油調塗取効其速

【保】瘡口大者乳香散

寒水石煅　滑石各一兩　乳香　沒藥各半兩

腦子少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

【撮】桃紅散歛瘡口定痛辟風邪

滑石四兩　乳香　輕粉各二錢　小荳粉一兩

寒水石三兩煅

右爲細末乾摻口上一方改小荳粉爲定粉

【精】有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅膈膜耳自謂必死用大鯽魚一枚去腸臟以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥爲細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有効須候膿少欲生肌肉時用之

【保】又方治瘡口久不收

小椒去目炒黑一錢　定粉　風化硝二錢　白礬二錢半　乳香　沒藥各一錢　右爲末摻之

清生肌散

寒水石 鍛　滑石　烏魚骨　龍骨各一兩　定粉　密陀僧　白礬灰　乾胭脂各半兩　右爲細末乾摻用之

平肌散治諸瘡久不斂

蜜陀僧 煅　花蓋石 煅　白龍骨各一兩　乳香另研　輕粉各一錢　右爲細末和勻乾摻

丹 精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此爲瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮于瘡遂致如此用北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯洗洗瘡口四圍爭肉以絹帛塊艾葉乘熱洗沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之不可與厥穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無效夫以血氣枯燥不知補接於內惟務執洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪于冷滯大抵潰宜洗若非行陳接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病躰自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先補接乎（神接即參芪歸朮之類是也）

蘇 亂髮蜂房蛇蛻皮各燒存性每味取一錢七酒調服治瘡久不合神驗（丹溪云髮灰陰之功甚捷）

丹 收斂瘡口止有柳皮白欲煎湯飲之

靈 眼白青黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是三逆也有頂中不便是四逆也聲嘶色脫是五逆也（玉版篇）

瘡瘍 癰疽破潰之後其形候有逆有順眼白青黑而眶小一惡也不能下食納藥而嘔食不知味二惡也腹痛渴甚三惡也肩背不便四肢沉重四惡也聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫五惡也煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋六惡也膿血大泄燃痛尤甚膿色敗臭氣不可近七惡也喘粗短氣恍惚嗜臥八惡也未潰先黑又陷面青唇黯便污者九惡也更有氣噫痞塞咳嗽身冷自汗無時瞪目耳聾恍惚驚悸語言顛錯皆是惡証動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也神彩精明語聲清朗三善也膿清腫消色鮮不臭四善也躰氣和平五善也五善見三則吉諸惡見四必危

癰疽所忌諸證

瘡熱毒方盛或發大渴此是毒攻心臟令舌乾煩渴也但以補心氣藥內補即止

癰竹葉黃芪湯治發背發渴通治諸瘡大渴

淡竹葉二兩　生地八兩　黃芪　麥門冬去心　當歸　川芎　人參　甘草　黃芩

右為粗末每服五錢水一盞半竹葉五七片同煎至一盞去查熱溫服無時虛渴者忌用石膏虛渴者忌用半夏黃芩

金銀花散

金銀花四兩去土　甘草一兩炒

右為細末每服四錢水酒各一盞同煎至一盞去查熱服

外科精要云疽向安後發渴與加減八味丸去當此時血氣兩虛當用參芪補氣當歸地黃養血渴當自止何必

澤瀉茯苓導水佐以肉桂若忍冬丸黃芪六一湯等方切
宜忍冬養血黃芪補氣湯何由作
忍冬丸大能止渴及療渴疾既愈之後須預防外癰疽
六宜服此
忍冬草不以多少根莖
花葉皆可用
右入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入
甘草少許研爲細末以所浸酒打麪糊丸如桐子大每
服五十丸至百丸無時酒飲任下
黃芪六一湯大治渴疾補虛乏常服此藥終身可免癰疽
之疾
綿黃芪去芦六兩一半生用
半鹽水潤蒸三次焙乾粉草一兩一半炙黃用
右爲細末每服二錢早晨日午以白湯點服若飲初盃
用酒調尤妙

桑枝湯大治口乾取桑枝一小升細切炒香以水三大升
煎取二升一日服盡
五味子湯大治口燥舌乾此是腎水竭也
五味子去芦生用 人參去芦 麥門冬去心
粉草炙半兩
黃芪去芦生用
右㕮咀每服半兩水一盞半煎至八分去查溫服無時
候一日二夜五七服妙

外科精要云嘔逆有二証一証謂初發時不曾服內托散伏熱在心一証謂氣虛脾氣不正而嘔伏熱在心與內托散三兩貼氣虛而嘔宜嘉禾散有寒熱宜家傳正氣散兼與山藥丸以補腎謹按病機諸逆衝上嘔越皆屬於火其內托散性涼固有降火之理若嘉禾散羣隊以爲補虛之劑補力已少徒有溫煖助火耳山藥丸補腎以壯下焦

之陰粗為近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛補之若年老因疽潰發嘔不食者宜用參芪白朮膏峻補取効佐藥隨時隨証加減恐用山藥丸緩急未易得力河間謂諸病瘡瘍如嘔者濕氣侵于胃也藥中宜倍加白朮

丹溪治一老人背疽嘔逆用補藥効方見潰瘍門予治一男子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服嘔即愈

咽喉口舌瘡

犀角膏治咽喉口舌生瘡盲有一貴人因疽而生此証醫者以為心臟絕盡皆辭退愚進此藥一日而安

真琥珀研　生犀角各一錢研　辰砂砂　茯神去木各二錢

真腦子研一字　人參去芦　酸棗仁去皮研各二錢

右人參茯神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻用煉蜜搜為膏子以蘆擁收貯俟其疾作每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化服一日連服五服取効

不自用

瘡泄瀉逆冷

涓治發背癰疽膿潰後氣虛脾臟滑泄并四肢逆冷宜服

和氣散

蒼朮四兩米泔浸三日洗淨晒乾用以米醋炒令香黃色

青皮去穰各一兩　良薑炒

陳粟米半升

右七味為末每服二錢用炒苗香末半錢相和温酒調下不拘時

瘡血不止

垣聖愈湯治諸惡瘡血出不止以寒水石細末摻之立止或瘡時間作黑色不可潰也藥力未盡却紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也此湯主之

熟地　牛地各三錢　歸身一錢半　川芎二錢

甘草炙　乾姜炮各半兩

瘡膿肉

梅治指瘡肉長疾皮不合裹見風即成膿以寒水石燒研爲細末傅瘡上再用銅綠細末上之肉即不作膿矣

瘡事急當陰入小腹

圖經古方療惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗藥搗取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神効

久漏瘡

虛寒

用涌瘡　須先服補藥以生氣血即參芪朮歸等爲主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷隨瘡之大小便灸令微熱不可令痛乾則易之乾者再研爲末再和再灸如此則止來日再灸至肉平爲効亦有用附片灸仍用前血氣藥作膏藥貼之

經云肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大胭留于節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不養肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也

梅師云腎移寒于脾發爲癰疽少氣脾移寒于肝發爲癰腫拘攣又云諸癰腫此皆安生岐伯曰生于八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服之表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸耎而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口不合變易爲痺潰敗壞肌肉銷損骨髓以致

痿跛宜以此骨碎補丸主之

骨碎補　補骨脂　熟地　當歸
續斷　石楠　石斛　牛膝
杜仲　巴戟　附子　芎藥
川芎　兎絲子　沙參　羌活
防風　獨活　天麻　黃芪

此方與大僂方相表裏各等分爲末煉蜜丸空心鹽湯服

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂宜用

羌活　防風　細辛　附子
甘草　川芎　續斷　白芍
白朮　當歸　桂心　麻黃

此方與前骨碎補丸相表裏

營氣不從逆十肉墮乃生癰腫　陷脈爲痿留連肉腠喻氣化薄傳爲善畏及爲驚駭（左傳文見陽門）

精 桂附丸治氣漏諸瘡

桂心　附子炮裂米醋中浸再泡三五次去皮臍　厚朴姜製
粉草炙　白朮各一兩　木香一分　乳香研二錢

合爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十丸丹溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖温其瀉衝尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之爲當又虛甚者宜參芪歸朮膏

隔脈散治漏瘡及二三十年癭瘤或大如盃盂久久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕卧寐不安躰中掣痛愈而復作

乾姜炮　琥珀研　大黄　附子炮去皮各一兩　丹參三分　烏賊骨研半兩　石硫黄研　白石英研　鍾乳粉研

右爲末貯以甕合口囊勿令泄氣若瘡濕即傳無汁即煎猪脂和傳之以乾爲度或死肌不消加苦硝二兩益佳一法胡燕巢一枚

小渠衣三因强寇入家傷其兩脛外廉作瘡數年不已膿汁常消消然但飲冷則瘡閒冷水浸淫而出延年濕瘡求治戴人曰爾中焦當有緑水二三升涎數掬袁曰也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也兼兩外廉皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有緑水少陽在中焦如瀆既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經兩旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上湧寒痰汗如流水次下緑水果二三升一夕而痂乾真可惟也

管治足膝下至踝浸淫瘡通足腫大於好足二倍行歩不全用五龍左大下之者六番每番皆五七行下後用黄柏蒼朮蕘芍地草升葛星半牛膝活石桂調之近三四個月而安

丹治漏瘡

川芎半兩　細辛二錢半　白芷稍二錢半　甘草細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小用陳年黄麻根刮去粗皮槌軟撚成繩子撚入孔中至不可

入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

一錢七立瘥

靈 治瘍有頭出膿水不止以啄木鳥一隻燒灰酒調服

神 應膏治久漏瘡此宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此膏愈之如腸毒胃毒為丸服之神効

當歸一兩一錢　赤芍藥　大黃各一兩五錢　香白芷
官桂各一兩　玄參一兩三錢　川續斷一兩二錢　莪朮一兩
生地二兩一錢

右九味細剉用真香油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色慮去查如熟天用黃丹卅兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉為度不可令婦人鷄犬見如漏有孔者以膏送入孔內外仍以膏攤貼之

海 槟榔散治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫脹膿硬應水清稀出而不絕肉腐不生及療疳瘍惡瘡浸淫肉腐空虛惡汁臭敗瘡邊干及好肌不槟榔黃連等分為末敷貼也

外 治漏外寒藥

蘆甘石童便煅牡蠣粉　右為極細末傅之

濟 烏金散貼惡瘡疳瘍瘻

橡斗子二個內一個實黃丹一個實白礬末相合定用黑俏麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

通 截疳散治年深疳瘻瘡

黃連半兩　白斂　黃丹各一兩　輕粉一錢　龍腦　麝香另研各半兩　蜜陀僧一兩

右爲細末和勻乾摻在紙上以膏貼之

取朽骨火疽及痔漏中有者

取黑骨鷄脛骨上等研細霜實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入孔竅內更用膏藥貼之

雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成註云今醫方有五毒之藥作之用黃蜜置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三日三夜其烟上着以鷄羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒軸車外腫若覆碗肉潰出膿血不輒止之痛楚難忍療之百方彌久不瘥人語鄭法依法製藥咸注之瘡中少頃取朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃蜜即瓦盒也

灸漏瘡

診　足內踝上一寸灸三壯　如在上者肩井　鳩尾

脈　脈微緩爲瘡瘻緩者多熱○全文見治虛實法

雜方　一瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記痔瘻惡瘡諸藥不效者取蟾蜍剪去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過七枚無不效者又法用乞火婆虫兒灸之同前法累驗神効人忻秘之往往父子不傳