

新刻圖註傷寒活人指掌卷之三

傷寒表裏証二十論

表裏証 發熱 有水 惡寒 身軀痛

身熱不渴為表有熱小柴胡加桂五十一厥而脉滑為裏有熱白參

黃帝所謂發表不遠熱攻裏不遠寒也又一云身熱口火

為裏有熱白虎加人參湯七乾嘔微利發熱而欬為表有水小青龍加

八身體涼表証罷欬而脇下痛為裏有水十棗湯百發熱而惡

寒者發於陽也表惡寒麻黃湯三十一無熱而惡寒者

發於陰也裏惡寒附子湯百八○自有惡寒條身軀痛發熱頭疼而

脉浮者表未解也麻黃湯三十一身軀痛自利而脉沉者裏不和四逆

○表裏歌 長短句



發熱惡寒發於陽柴胡桂麻黃無熱惡寒陰上起四逆理中

治下利清穀身軀疼救裏急經營真武湯百三九身痛清便

自調者救表母緩也桂枝湯三身熱不渴熱在表加桂柴胡小

厥而脉滑渴躁煩白虎人參安毛乾嘔微利欬發熱表水君

須別小青龍加羌身涼表罷欬協痛裏有水氣重十棗湯表

中風寒裏不消沉細數須調此為裏脉表却熱辛藥微汗洩

麻黃附子甘陰病發汗須動經也須細調停少陰發熱脉沉

者麻辛附子也麻黃細辛附子湯三十六太陰脉浮可汗之仍須用桂枝

毛此為陰証發表藥對証保安樂

表証 論浮脉

發熱惡寒身軀痛而脉浮者是也浮屬陽也素問云寸口脉浮

而盛曰病在外外者表也寸口脉沉而緊曰病在中中者裏也

仲景云脉浮者病在表可發汗又曰表有病者脉當浮又曰結

胸証脉浮者不可下則知脉浮屬陽證無疑矣惡寒者表之虛

屬太陽宜汗也

○表証歌

發熱惡寒為表證脉浮身痛太陽定惡寒乃是表之虛發表

重輕宜審訂春月陽微其氣弱汗之太過則陰勝冬月潛伏

汗非宜輕藥解之可安靜

春初冬月若病輕不問風寒有汗柴胡桂枝湯五十三無汗麻黃葛

類三若病重不拘此

裏證 論手足心汗

不惡寒反惡熱手掌心并腋下澀澀出汗胃中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞭小便如常腹滿而喘或譫語脉滑而沉者裏証也仲景云手足澀然汗出者大便已鞭也傷寒欲下而小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻也裏証者內熱是也內熱者裏之弱屬陽明宜下之

○裏証詞

裏証之脉沉而滑不惡寒今反惡熱掌心腋下汗潤滋咽燥胃乾仍糞結腹滿而喘或譫語大便不調兼潮熱內熱乃是裏之弱此屬陽明宜下泄

表裏俱見證

傷寒脉浮是表証當汗其人發汗煩渴小便赤却當下此是

表裏俱見五苓散百七十九仲景云中風發熱六七日不解而煩有表

裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散百七十九六七日不大便

頭痛有熱者是裏証當下其人小便清者知不在裏仍在表却

當汗此兩証俱見桂枝湯三病人心中下滿不欲食大便鞭脉沉細是

裏証當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩証俱見柴

胡湯四十三太陽病表証未除而醫數下之遂協熱而利利不止

心下痞鞭謂之表裏不解桂枝湯八太陽病醫反下之因爾腹

痛是有表復有裏桂枝湯十痛甚者桂枝加黃芩太陽病桂枝

証誤為醫下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根

黃連湯三十四此皆仲景治傷寒有表則有裏學者當以意推之

○表裏俱見詞

脉浮而大表之形渴煩小赤熱五苓不大六日頭疼熱小便
 却清桂枝說心滿不食沉細鞭微寒頭汗小柴先太陽誤下
 協熱利心痞桂枝參便止因爾腹痛有何方桂枝加芍甚加
 黃桂証下之利不止脉如促者表未已喘而汗者當何如葛
 根苓連方可理

脉浮大

脉浮緊

脉遲弦細

誤下

脉浮而大是表其人心
 下痞悶却當下若煩渴
 燥熱小便赤澁宜用大
 柴胡湯和其胃氣四二
 若肢節痛不煩渴雖痞
 宜汗之桂枝湯一

咽燥口苦腹
 滿而喘發熱
 出不不惡寒
 反惡熱此陽
 明証也脉疼

有表証而脉
 遲者不可汗
 亦不可下宜
 小建中湯五
 八脉弦細不
 欲食則當下

太陽表未解
 而數下之遂
 協熱利不止
 心下痞硬桂
 枝人參湯八
 太陽醫下之

表裏俱見

脉浮而大是表其人發
 渴小便赤却當下五苓
 散百七九
 六七日不大便頭痛有
 熱小便清者知不在裏
 尚在表也桂枝湯一

浮而緊是有
 表裏俱見不
 可汗下宜枝
 子豉湯吐之
 八十八

其人頭汗出
 身熱微惡寒
 手足冷此兩
 証俱見宜小
 柴胡湯四三

因尔腹痛桂
 枝加芍藥湯
 十五利不止
 喘而渴葛根
 黃連黃芩湯
 三十四

無表裏証

傷寒四五日後以至過經十三日謂之過經無表証又於裏証

未可下者但非汗証亦非下証者皆用証小柴胡湯隨仲景云六

七日目中不了了睛不和無表裏証發熱大便難七八日脉雖

浮數可大柴胡湯下假令已下而脉數不解消穀善飢至六七

日不大便者有瘀血也抵當湯百四自有血証條少陰病始得之反發熱
脉雖沉以麻黃細辛附子若二三日常見少陰無表証者麻黃
附子湯微發汗之二十六此二証又非表裏之所能拘不可不慎也
汗二十六

○表裏俱無謂

四五日後至過經非汗非下小柴行十餘日外用不愈隨証
可下大柴輕下後脉數不解時六七日間不大遺瘀血結凝
當辨別抵當湯中可治之

過經

瘀血

無表

傷寒四五日至十三日過經
無表証與裏証又未可下小
柴胡湯不愈大便硬者大柴
胡湯六七日目中不了了清

下後脉數不止至
六七日不大便有
瘀血也抵當湯

無表裏証又非
汗証亦非下証
俱可用小柴胡
湯服後俟其除
脉更以小柴胡

裏

不和無表裏証發熱大便
難脉雖浮數大柴湯甚者
大承氣湯

脉故善飲消穀六
七日不大便亦瘀
血證也

加減法治之亦
良

表熱裏寒表寒裏熱

病人身大熱反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無治法宜
與陰旦湯寒已次以小柴胡湯加桂以身大寒反不欲衣寒在

皮膚熱在骨髓也仲景亦無治法先與白虎加人熱除次以桂
麻黃各半湯以表熱裏寒者脉須沉而遲手足微厥下利清穀
解其外十三此裏寒也所以陰証亦有發熱者此表解也四通湯百八又通

表寒裏熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而倦此表寒
也時自煩不欲厚衣此裏熱也大柴胡湯下此仲景之餘議
也少陰惡寒而蹇或有從足傍者蹇音拳言手足拳縮也此

理亦通故兩存之煩躁條通

○表熱裏寒歌

病身大熱反欲衣寒在骨間熱在皮陰旦湯先寒既退小柴加桂次溫之裏寒表熱脉沉遲手足微厥利下時所以陰証發熱者四逆湯中實主持

○表寒裏熱詞

身寒及不欲衣者寒在皮膚熱在骨髓也白虎加參先除熱桂麻各半湯宜下表寒裏熱脉滑厥口燥舌乾勿須訝所以少陰惡寒時自煩不欲衣宜瀉

陰盛陽虛陽盛陰

陰盛陽虛汗之則愈下之則死陽盛陰虛下之則愈汗之則死

陰盛則外寒陽虛則外寒屬表故表証條云外寒者表之虛汗之則愈也陽盛則內熱陰虛則內熱內熱屬裏故裏証條云

內熱者裏之弱下之則愈也外臺云表病裏和汗之則愈裏和裏病下之則愈蓋謂此也古人云病有根本治有先後也

●陰証似陽歌

陰証似陽當辨別躁煩陰盛故也面赤下虛故也身微熱裏寒故也盛陰發躁藥宜溫尺寸微沉為君說

此証大率以脉為主諸數為熱諸遲為寒若以虛陽上膈發煩燥誤以為熱醫反與涼劑則氣消成大病矣四逆湯加蔥白散主之百八

外臺秘要云陰盛發躁名陰躁歌方井中方可宜以熱藥治之不可妄投涼劑

●陰盛隔陽歌

陰盛隔陽其身冷躁煩不欲疾細沉霹靂散除其躁止得眠汗出即安平

宜以霹靂散通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈百三十四

●陽證似陰詩

陽證似陰何以測四肢逆冷小便赤大便或秘或黑時此脉沉滑君須識傷寒失下血氣空伏熱之深故厥逆指甲時溫可驗之此證下之宜端的

用大承氣湯加膩粉六十六下之汗出立差輕者白虎湯七十一熱厥與冷厥不同

熱厥微厥即發熱陰厥却不發熱四肢逆冷脉沉細大小便滑泄矣

陰陽毒

陰毒盛而陽暴絕則為陰毒若陽毒盛而陰暴絕則為陽毒大凡陰陽離絕非大汗不能復其正氣也六脉俱洪大矣或沉取之大而不甚疾者非陰証也陽毒其脉當弦而洪數陰毒其脉沉細而疾陽病則身熱而無汗陰病則身冷而有汗岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘麤為之俛仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出數慄而寒寒則厥此証不可以常法治之金匱論陽毒之為病面赤斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治陰毒之為病面目青身疼狀如被打喉咽痛死生與陽毒同

陽毒

陽毒已深脉洪大內外結執舌卷焦黑鼻中如烟煤宜用傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒身重腰背痛

煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下利赤黃其脉浮大而數
面赤斑如錦文咽候痛唾膿血五日可治至六七日不可治
陽毒升麻湯咽痛玄參升麻湯甚者或有踰垣上屋
主之六十四

●陽毒誦

脉多弦而洪數身熱無汗煩燥

妄言狂走為陽毒面赤咽疼身錦斑下利赤黃仍或有脉當
滑促實洪者

陽毒

陽毒之証初受病時所感邪毒深重加以當汗失汗當下失
下或吐下後邪熱乘虛而入或誤服熱藥使毒熱散蔓如抱
薪積火無不延燎至于六脉洪大舌卷焦黑鼻中如烟煤身
面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌奔衣而走皆其証也
五日可治六七日不可治可用陽毒升麻湯斑盛者青黛一
物咽痛玄參升麻湯若熱甚者時狂時昏口禁咬牙藥不可
下者用水責去候牙寬王乳稍定後藥亦良如黑丸不可經用

陰毒

陰毒已深疾勢困重六脉附骨取之方有按之即無一自八至
已上或不可數宜用葱熨法二百三十一傷寒一二日便結成

陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞
痛咽候不利毒氣入心心下堅強短氣不得息躁汗虛汗或時
鄭聲嘔逆下利身如被杖唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊數
仲景云此陰毒之候五日可治至六七日不可治也陰毒甘草湯主之百

●陰毒誦

陰毒四肢逆脉沉細而疾心腹痛渴煩吐利冷汗出一身如
被杖恍惚如有失尺小寸或大沉取看消息沉取而大不甚疾者非陰也

俱法則非陰甚者一息七

陰毒

陰毒之証初受病時所感寒和深重致陰氣獨盛或汗吐下後變成陰毒六脉微沉腹中絞痛或自下利四肢沉重咽喉不利虛汗嘔逆唇青面黑手足厥冷身如被杖短氣不待息此陰毒之候三日可治四五日不可治先服陰毒百廿草湯百三真武湯百三附子湯次灸百三氣海關元三二百壯或葱熨臍二十再以手足温和脉息漸應為効如厥冷寒極囊縮者可用薰法二九嘗有回生之驗

厥証

陽厥當溫
陰厥當溫

厥有二証有陽厥有陰厥仲景所謂執熱深則厥深也蓋陽極則發厥也不可一例作陰証治之初得病而身熱至三四日後

熱氣方深大更叔小更赤或厥語煩躁昏貴及別有熱証而反發厥者陽厥也急用大承氣湯六十六六十七隨輕重用之

若大段輕者白虎湯初得病身不寒熱大便不秘引衣自蓋

或下利或小便數無熱証而厥逆者陰厥也四逆湯百八理

脉四逆湯二百二十四當歸四逆加茱萸生薑湯百十二陰陽二厥脉皆沉所以使人

疑也陰厥脉沉遲而弱陽厥脉沉而滑或云緊又陽厥指爪時

一溫陰厥常冷也証治論云若兩脉不見者只以外証論冷熱也若未辨陰陽者且

與四順丸試之若是陽厥便當見熱証若是陰厥則不發熱矣

方見明手足指頭微寒者謂之情清此疾為輕只可服理中之

類已成厥者則用四逆也脉不至者通脉四逆等湯厥而

脉乍結者邪氣結在胸中也亦令人厥瓜蒂散吐法厥而怔

忪者有水也宜先治水屬厥陰悸條藏厥証條下

厥歌

陰厥脉沉無細弱足多拳卧惡寒過陽厥脉沉煩實滑頭疼惡熱爪温和

陽厥

陰厥

厥證

初得病身熱頭痛已後大便
秋小便赤或畏熱或飲水或揚
手腳足煩燥不得眠識語昏惰而
厥陽厥也 大柴胡湯大小承氣湯
渴者白虎湯手足厥冷脉或結或
氣結在胸心下滿煩亂不能爪帶
法吐之三百五寒執帶厥而面色不
澤習昧兩手忽無脉或一手無
脉必是有正汗也多用綿衣包
手足急服五味子湯或魚翅桂
枝麻苗各半湯百八十三傷寒厥
逆心下怔忡者宜先治水次用
大承氣湯

得病後四肢逆冷脉
沉而細足拳卧而惡
寒引衣蓋覆不飲水
或下利清穀而厥逆
者陰厥也 四逆湯白
虎湯厥逆脉不至者
通脉四逆湯三百二十一
手足指頭微寒謂之
清理中湯百四十五
無熱語而厥當歸四
逆加茱萸生薑湯
喘促脉伏而厥五味子
湯百一十一

厥者至也手足至冷甚
於四逆也此陰陽隔絕
致陽氣伏逆陰氣隔騰
是故厥有二種但以未
厥前大便秘小便赤識
語煩渴及別有熱証而
後厥者此陽氣伏逆名
陽厥也急用大柴胡湯
及大承氣湯小承氣湯
下之若未厥前日利不
渴無執証而厥者此陰
氣獨勝名陰厥也急用
四逆湯真武湯溫之桂
湯者宜早治之

腹痛四証

實 陽太陰亦有腹痛載三陰三陽詞中

仲景云尺脉弦而腸鳴泄利腹中急痛者虛痛也先與小建中湯五六

不差者小柴胡湯四十三或湯或湯關脉實腹滿大便秘按之而

痛者實痛也桂枝加大黃湯七黃連湯黃連湯太陽病醫反下之

因爾腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯十一即是小建中湯也

痛甚者加大黃方載三陰三陽及表裏俱少陰腹痛或泄利

下重四逆散百十二通脉通脉腹痛小便不利真武湯百若六七

日腹脹不大便急下之小承氣湯或用大承氣湯六十六七

腹痛歌

傷寒腹痛要消詳有虛有實有陰陽太陽下之因腹痛桂枝加芍甚加黃少陰腹痛洩利重四逆頻加芍藥湯虛痛建中

論老少實宜承氣用斟量

腹痛

寒

寒熱

實

少陰腹痛手足厥逆
 脉微欲絕不惡寒面
 色赤裏寒外熱通脉
 四逆湯加芍藥二三百
 或泄利下重四逆散
 腹中痛者加附子百
 利而救逆加五味
 子乾姜百九少陰病
 二三日至四五日腹
 痛小便不利四五日
 重疼痛自下利者此
 水氣或欬或嘔或大便
 利本太陽病醫反下之
 因下腹滿時痛小建中湯

傷寒胸中有
 熱胃中有邪
 氣腹中痛欬
 嘔吐者此上
 熱下寒也黃
 連湯七十六
 陽脉瀋陰脉
 弦法當腹中
 急痛先服小
 建中湯不差
 者與小柴去
 黃芩加芍藥芍藥湯

六七日不
 大便腹脹
 滿而痛急
 下之大小
 承氣湯十
 六
 若時痛時止乃病
 發於陰下之早因
 而腹痛亦未可遽
 下且與小建中湯
 溫之

坤為腹純乎陰也
 故太陰病則為腹
 痛自利脉弦微手
 足温而不渴此內
 寒也故可温之少
 陰泄利厥逆脉微
 不渴亦內寒明矣
 若閔脉沉實大便
 硬臍腹痞悶喘滿
 疼痛者則當下之

動悸

水氣承心振寒而悸

茯苓甘草湯

傷寒二三日心中悸而煩

中湯發汗

下悸欲作奔逐

白有發汗過多心中悸欲得按

者桂枝甘草

發汗出仍發熱心中悸身憊動振欲擗地

湯百三

脉結代心動悸

少陽不可發汗汗則譫

語此屬胃不和故悸

小柴胡湯

中風徃來寒熱或心中悸

小柴胡湯

厥而心下悸者怔忡也宜先治水

茯苓甘草湯次

治其厥本自條

●動悸歌

動悸元來有九證
 臍下奔逐桂枝湯
 汗後發熱身憊動
 真武湯功可佳憑煩
 悸小柴和胃府水
 乘心悸茯苓行

汗後

水氣

脉代

動悸

發少陽汗則識語動悸小柴胡湯四十三汗後悸欬作奔豚茯苓桂枝甘草湯百十一汗過多心下悸欬得按桂枝甘草湯三汗出仍發熱心下悸身憊動欲擗地直武湯百九

水氣承心振寒而悸茯苓甘草湯百十九厥而心下動悸者怔忡也先治水茯苓甘草湯

脉結代心動悸炙甘草湯百十

動悸即怔忡動惕不安也其由有三一為氣虛二為停水三為汗多氣虛神弱心不自持一也水氣承心心火思水二也汗為心液去心空如魚無水三也各隨証以療之

奔豚

所以多用桂枝者以桂能止奔豚故也

從小腹上衝心者

桂枝加桂

太陽病下之後氣上衝者

桂枝湯

不可與也發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓甘草湯百二十一

心下逆滿氣上衝胸起即頭眩其脉沉緊發汗則動經身振

悸者茯苓桂枝白朮湯百二十一

奔豚詞

奔豚小腹上衝心桂枝加桂却為靈汗吐下後心逆滿氣上衝胸轉不經頭眩六脉蕪沉緊更加發汗動經深身若振動悸者茯苓桂枝木可宜行

奔豚

衝心

汗吐下後

傷寒或因燒針腎氣逆上發為奔豚欬衝心者桂枝加桂湯十四太陽病下之後氣上衝者桂枝湯若不上衝不可與也

發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓甘草湯百二十一吐下後心下氣逆滿氣上衝胸起即頭眩其脉沉緊發汗則動經身振悸者茯苓桂枝白朮湯百二十二

奔豚者腎之積也其人素有腎積因傷寒之和攻衝下焦致其發動所以如江豚之奔衝或因汗吐之後心氣虛而攻動腎積也多用桂者以其桂能泄奔豚茯苓能伐腎和也臍下有動氣亦曰奔豚

脇痛

傷寒表裏有水或熱邪偏注多令脇痛乾嘔微利發熱而咳脇

痛表有水也小青龍加羌活三十八表証罷身涼乾嘔脇痛裏有水十寒

(八)不可妄投量其虛實 往來寒熱小柴胡湯加茯苓或身涼

兩脇刺痛此熱攻注於脇也局方或結而成塊或走入脾間

作痛五磨飲子局方

●脇痛歌

乾嘔微利欬發熱表水青龍加有訣身涼表罷咳脇疼裏水

十棗功尤竭往來寒熱脇疼時小柴亦有加減法身涼脇痛

熱攻注五磨曠氣尤為切

氣痛 即動氣

傷寒氣痛有四證具不可干所謂左右上下藥觸動氣是也

左汗之則頭眩汗不止勝惕肉瞤此為逆也難治法以木利

湯百七次以建中湯在右汗之則衄而竭也煩飲水則吐先以

五苓散次以竹葉湯在上汗之則氣上衝心端李根湯在下汗

之則無汗心中大煩骨節痛目運惡寒食即反吐穀不得入先

以大橘皮湯吐止次小建中湯

●動氣歌

上下左右動氣者不可汗而不可下汗後筋惕肉瞤時下病

決然九死也

舌上白胎此册田 ○藏結舌上胎

胎陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥足冷鼻中涕出舌上胎滑者

勿妄治也到七八日以來微熱手足溫為欲愈或八日已上反

大熱者為難治之惡寒者必欲嘔也小柴胡去半夏加人參腹中痛者必欲利也理中丸陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下則胃中虛客熱熏隔心中懊懷舌上白胎者亦屬陽明小柴胡湯胃氣和汗出而解

●胎滑詞

舌上胎滑丹田熱陰陽俱緊口氣出八日已來微熱安大發熱時無治決

惡寒嘔

喘滿

胎

胎陰陽俱緊舌上胎滑惡寒者小柴胡去半夏加人參括萎湯四九腹痛者理中湯八胎脇下硬不大便而嘔舌上胎小柴胡湯

陽明脉浮緊咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱心中懊懷舌上白胎枝子鼓湯吐之

舌為心之本津液之潤澤丹田和熱攻其心液故舌上乾枯而生白胎若邪在表則無胎邪傳裏則生胎若舌上黃來下者下之舌生黑為熱劇至七八日已上反大熱者為難治

●傷寒遺事

○戰汗四證

厥陰逆至第六七日脉得微緩微浮為有脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

黑奴圓證服藥一九但與冷水盡足飲之須臾當寒竟汗出而解矣

小柴胡證具而以他藥下之柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆得湯必蒸而振發熱出而解調胃承氣湯證云太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解

○戰汗歌

戰汗雖分四證諸泰來否去事還殊柴胡證具何為逆不戰
須知體不虛

戰而汗出

病有戰而汗出因得解者此脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰脉浮故當汗出而解也

戰者陰陽相爭邪氣將出和與正爭其人本虛是以發戰正氣勝則戰已復熱而

振而汗出

太陽未解脉陰陽俱停謂無偏勝也以其寸口關上尺中大小浮沉遲數同等雖劇當愈必先振慄汗出而解陽脉微者先汗出而解矣

不再受邪猶天下陰霾不已陽光將復雷

蒸而汗出

凡柴胡湯證下之柴胡證不四復與柴胡此不為逆也又蒸而振却發熱汗出而解矣

慄而汗者陰陽所爭頗淺不為大戰也不

不戰而汗出

脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出矣不發戰也又曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也

戰汗出其人不虛以正勝邪作戰不成但汗出而解矣

○急下兩證急温兩證

少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下之非若陽明證宜下而可緩也雖然陽明宜緩而有一證發熱汗出多者亦急下之蓋陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下之少陰証口燥咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明証發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之少陰脉沉或隔上寒飲乾嘔者急温之

○急下急温哥

少陰病證兩三日口燥咽乾速下之陽明汗多頻發熱急投

承氣不瀆疑惟有少陰內寒者乾嘔沉脈急溫宜

少陰急下 陽明急下 少陰急溫

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之大承氣湯六十六

少陰病自利純青水心下必痛口燥咽乾者急下之大承氣湯

下之大承氣湯少陰病六七日腹脹不大便急下之大承氣湯

傷寒傷風誤下成痞

傷寒傷風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾咽心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也

誤下成痞詞

感冒風寒誤下之因令痞氣結心岐長沙妙法分明載甘草瀉心湯主治

三陰可汗

陰病不當發汗發汗即動經然太陰脈浮少陰發熱亦瀆微汗但不可正汗耳太陰脈浮者宜桂枝湯少陰發熱脈沉宜麻黃細辛湯少陰二三日常見少陰證無陽證者宜麻黃細辛湯

急下以存津液腹滿痛為上實急當下之熱病日不明熱不已者死今日睛不和証亦危矣瀆急下之少陰急溫二証內寒已甚急溫無疑也

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

急下之四逆湯

證表藥也 (三十八)

●三陰可汗詞

三陰本不宜行汗少陰發熱畧微良太陰脉浮雖用桂不遇良醫反見殃

●差後昏沉

傷寒差後十數日或半月二十日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼崇或作風疾多般治之不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧皆緣發汗不盡餘毒在心胞絡間所致也知母麻黃湯主之 (五十九)

●昏沉詞

傷寒差後已經旬錯語紛紛但欲眠寒熱却無如有崇或如瘧病熱寒蒸者緣餘毒留心絡知母麻黃真似神

差後昏沉

汗不流

水氣

餘

差後昏沉又無汗不流是汗寒熱終不惺：出蓋覆不周或潮熱頰赤緣汗出不勻致發汗不盡餘毒腰背手足搐在包絡所致

知母麻黃湯

旁根散 (百八十)

散 (二百四)

不救

●飲酒復劇

傷寒時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得食 (黃連解毒湯)

●復劇歌

汗後平和身體涼却因放恣飲黃漿病逢狂藥依前作急用
黃連鮮毒湯

●循衣摸床

傷寒若吐若下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡即發
潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而
不安微喘直視若微者但發熱譫語大承氣湯主之若一服利則止後服
脉弦者生脉濇者死六十六

●循衣摸床歌

鄭聲直視或喘利見鬼尋衣驚惕然潮熱摸床人不識滑生
澁死脉當言

●傷寒禁忌

服藥中病即已不必盡劑謂服藥中病即停後服也。千金云傷
寒新差後食猪肉羊血肥魚油膩等必大下利若食餅餌鱠炙果
實脯脩難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱皆難救也
又云新病差後但得少食糜粥常令稍飢不可過飽不得他有所
食雖思之勿與也。又忌狗肉及諸般骨汁。又本草注云羊肉
熱病差後食之發熱殺人。又新病差後當靜卧切勿早起梳頭
洗面非但躰勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此皆令人勞復
若新差後未滿百日氣力未平復而犯房室者皆死此差後大忌
也

●禁忌詞

新差雖當自保持勿將酒肉口中肥清宵靜睡毋思想用意

勞煩最忌之節食寡言須晏起寒暄冷煖減添衣切戒房室
陰陽易悔悞難追已噬臍悔也

●傷寒別名 陰陽易病附

語無倫者曰讖語實則讖語也外証大便秘小便赤 聲重曰鄭
聲虛則鄭聲大小便利而手足冷也 下洩曰轉失氣 大便堅

小便利曰脾約 得大便曰更衣 大便如常曰清便自調或云

○水穀不化曰下利清穀 下利曰殄洩 痔曰腸癰腸癰謂痔

也素問云飲食自倍腸胃乃傷活人書云此太陰受病下為殄洩

久為腸癰見藏府受病條 傷寒病十三日曰過經 長虫曰虵虵即蛔

虫也陰病發躁曰陰躁屬少陰 手足逆冷曰厥 有陰厥陽厥二

證 手足背頭散令曰青屬三 肌膚冷或下利而發躁無時暫

安曰藏厥不治 兩手無脉曰雙伏 一手無脉曰單伏 男子

病新差而婦人與之交曰陽易婦人病新差而男子與之交曰陰

易漢說散三百二十二彼鼠糞湯 男子則陰腫小腹絞痛婦人則

裏急腰膝連腹內痛其人身躄重熱上衝胃頭重不能舉眼中生

花或云生眵四肢拘急小腹絞痛手足攣百節解離經脉 見者

皆主死一呼一至曰損脉離經太過曰至不及曰損一呼三至曰

至難經 二脉唯陰陽病有之 發汗吐下溫針后病不解此為

壞病又曰何逆何逆有四種或變為溫瘧或變為風溫或為溫毒

或為溫疫也 發汗後汗不止曰漏風漏風亦亡陽別名也 大

下之后損陰傷血亦謂之亡陽見下后 太陽病桂枝證而投麻

黃汗出多遂漏不止曰亡陽 發狂條有因火劫驚狂謂之火邪

其人亡陽 尺寸脉緊主無汗今反有汗者亦亡陽大抵陰病主無汗今有汗者亦亡陽也 三月至夏方發曰晚發見熱病條 冬應

寒而反大溫人暴感之而病曰冬溫見疫病條 非時暴寒伏於少陰

之經咽痛下利曰腎傷寒 發汗後仍灼熱自汗曰風溫係何逆

之數也 中暑曰中暍 感不時之氣而病老幼皆相似也俗謂

之天行即疫病也 發溫溫汗汗者曰重暍重暍者死 溫病汗出徹

後發熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食曰陰陽交交者死也評

熱論云發熱脉躁狂言不能食謂之三死 熱疾脉躁盛不得汗

者死曰陽極 已得汗而脉躁盛者死大都汗後脉躁盛者皆主

死也 病差後更發熱曰遺熱 病差後勞動再病曰勞復 病

差後食肉再病曰食復 熱病已愈多食而有所遺曰遺岐伯曰

食肉則復多食則遺活人書謂遺熱素問熱論注曰如遺之在人

也愚恐謂遺者大小便不禁也亦嘗見病差後善飲食而大小便

不禁者故有是說 脉浮遲或汗不能作汗其身者曰無陽 自

亂無神氣曰無精 吐利並作曰霍亂 鼻出血曰衄 陽病下

之早即為結胸蓋當汗而誤一下者為痞為結胸為懊懣 陰病

下之早即為痞按之不痛胸中氣結 不按自痛連臍腹堅硬曰大結胸

按之即心下痛為小結胸 有水停結在胸脇間無大熱而頭微

汗出曰水結胸 煩躁多而有結胸證曰熱實結胸 無熱而有

結胸證曰寒實結胸 證似結胸飲食如故時時下利陽脉浮關

脉小細沉緊舌上白胎滑者曰藏結死不治 上唇有瘡虫食其

喉或食其藏曰惑 下唇有瘡虫食其肛或食其陰曰狐 咳逆

曰噦 乾嘔曰哕 脉相尅賊曰負二者死謂陽明與少陽合病

其脉但長大者為有胃脉為順若脉中有弦即是有木脉也土被

木賊故曰負所以死也 傷寒有所不利者行之取其滲洩也利

小便曰滲洩大抵洩數則大便難小便曰洩 民病驚澹大便寒

而鴨澹水穀不別也 大便堅硬曰鞭此有熱而鞭也故曰寒則

澹熱則垢也 協熱而利謂之腸垢 渴欲飲水水入即吐名曰

水逆 黃病曰疸內經瘧論中謂疸為熱活人書以黃為疸南方

暑濕近夏痺熱故病黃也疸與痺同因熱而病黃疸也 心振寒

而動曰悸即怔忡之別名 厥陰證云厥逆怔忡此有水也宜先

治水 脚氣有小腹不仁怔忡者 少陽嘔而發熱胃脇滿小便

不利怔忡者 心中若有所失曰懊懣當汗而誤下者為痞為結

胸為懊懣 應下而汗者為亡陽為譫語為下厥上竭強發少陰

汗則動血或出口鼻或出耳目謂之下厥上竭也 目中不了了

了了謂不明了也或謂之病差安常云楚人有此語 睛不和胃不和者言

不和平如尋常也 口中不仁小腹不仁者如所謂皮膚不仁之

義不仁者皮膚也而不知有無也 身振搖而動曰肉瞤 臍下

有動氣曰奔豚 在上者湧之吐曰湧 在下者洩之利曰洩

左關曰人迎屬少陰 右關曰氣口屬陽明 足趺上動脉曰衝

陽第一名跌陽指迷方 內踝危突骨上陷中動脉曰太谿婦人

乳直下筋骨間近腹處曰期門 臍下一寸曰氣海千金方指迷

五分此謂從臍心 二寸曰丹田 三寸曰關元 血曰榮 氣

曰衛 玄府汗空素間生氣通天論勞汗當風注云玄府即汗空

也 腠理司開闔見中 手足搖擗曰瘳 二陽俱病曰合病

先二陽俱病而後一陽自病曰併病 陰陽俱病曰兩感 又曰

陰陽雙傳 四肢病曰未疾大抵有風則四肢不收左傳曰風淫

木疾者是也 厥而下利當不能食反能食者曰除中不治

●陰陽易歌

傷寒新差因房室易病雖分陰與陽小腹絞疼攣手足離經
脈見定知亡

易病

男子病新差婦人與之交曰陽易婦人病新差男子與之交
曰陰易如交易之易互為病也男子則陰腫小腹絞痛婦人
則裏急腰膝連腹內痛男女或熱上衝胃頭重不舉眼中生
花然又百節解散燒裊散百七九其不易目病者名女勞復以其內損真
氣外動邪熱痛引入腹陽脈和盛多不可治矣

●壞病歌

病轉少陽無表裏妄汗下吐及溫針損耗津液胃中燥木邪
干土病邪深必發汗言寒熱併柴胡証罷為壞病詳其病証
犯何逆以法治之活危証

壞

証

傷寒病中又感寒暑燥溫風熱異氣而成壞証或經發汗
吐下溫針乃不解小柴胡湯証罷亦成壞証况病已過經熱
蓄藏府疾候多變久而不瘥陰陽舛亂無復紀綱大率以表
証多者知母麻黃湯九若諸藥未差者鱉甲散証犯何逆
以法治之柴胡証在則不為逆

●下利膿血歌

下利膿血兩般因協寒腹痛少陰連腸垢協熱屬陽定犀角

便膿血

協熱

協寒

下後脉數不解下利不止必協熱
而便膿血犀角地黃湯百五十八
傷寒先熱後寒後發傳陽至言傳經
盡當愈至七日熱不退者其後必膿血
先厥而利寒極變熱利當日止而咽痛
為噤痺熱上行也利不止必其不痺也

少陰下利便膿血
桃花湯百至三少陰
二三日至四五日腹
痛嘔不利下利不吐
便膿血桃花湯

陽病下利便膿血協
熱也少陰下利便膿
血協寒也膿為積積
血為新積協熱者謂
之腸垢協寒者謂之
下焦不納熱則當清
其腸寒則當溫其
下也

●雜證所屬

頭項強痛 太陽

頭搖 裏痛

獨頭面搖 瘧病

頭汗 瘀血在裏

額汗 風溫

面戴陽 面赤色下虛也

面拂鬱 表未解

面慘不光 傷寒

面光不慘 中風

面下黑下白下赤 惑

面斑如錦紋 陽毒

面垢中濕 又汗病

目痛 陽明

目睛黃 小腸熱

目中生花 陰易

目中不了了 謂不明

睛不和 未解和中而

目不慧 不流利也上實下

目直視不能眴發衄象汗目脉赤 瘧病

目瞑 必衄

耳聾 少陽

鼻乾 陽明

鼻中燥 必衄

身如烟煤 陽毒熱極

鼻衄 風溫

口噤 瘧病

口苦 少陽

口燥 少陰

口難言 榮不足

口傷爛赤 應下而汗熱上行也

唇瘡 狐惑

舌黑 熱劇

懊懷 胃虛

聞食臭 胃虛

叉手冒心 汗多虛也耳又

喜忘如狂 畜血

漱水不欲嚥 必衄

筋惕肉瞤 汗下虛也

洒然毛聳惡寒 中暑

身痛如被杖 陰毒

一身盡痛 風溫

身微腫風温

身重多睡風温

身黃小便不利

身如虫行表虛

身痒陽虛汗未盡

背惡寒陰勝陽

腹脹氣偏不和

飢不能食病在胃

多眠神倦風温

不眠神虛

蹇卧手足温可治

手足瘈瘲搖擗也瘕病又

坐而下脚腰痛也

坐而伏短氣也

下利清穀內寒

腸垢熱也

鴨溏寒也

咽中瘡上實下虛

怔忡即心下悸汗多

咽痛少陰

譫語邪氣盛而神氣昏

舌生芒刺熱結甚也

聲啞孤感

鄭聲精氣奪而不全

咽乾腎虛燥不可汗

咳逆水寒相搏

●死証

赤斑出五死一生

黑斑出十死一生

陽證見陰脉者死陰

陽毒過六七日者不治

大發温家汗則成瘕

又曰熱而瘕者

死發少陽汗則譫語

發少陰汗則動血動血者死謂之下厥

上竭發動氣汗者死

發風温汗者死亦主

發濕温汗者死

曰重暍兩感傷寒者死

汗後不為汗衰謂之陰陽交交者死

不得汗者死發熱脉躁疾狂言不能食謂之三死

咳逆不止者死

藏結者死結胃証而舌上白胎者是也

厥陰舌卷囊縮者死

脉代者死

少陰吐利煩躁四逆者死

結胃証悉具煩躁者

發厥至七八

日膚冷而躁無時暫安曰藏厥不治

少陽與陽明合汗不和脉

長大而弦曰負者死

陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞

痛手足攣者死別名中詳

厥而下利當不能食反能食者除中不治

少陰病厥逆無脉與白通猪膽湯脉暴出者死微續者生方載

少陰病厥逆無脉與白通猪膽湯脉暴出者死微續者生方載

條 仲景云脉陰陽俱虛熱不止者死 傷寒七八日已上大發

熱者難治 若病人寒熱而厥面色不澤胃味兩手忽無脉或一

手無脉必是有正汗也多用綿衣包手足冷温暖急投五味子湯

或兼與麻黃細辛附子湯 服之晡時必大汗而解矣投藥無汗

或脉不至者不治 洩便遺失絕腎 汗出不止謂如貫珠 爪甲青

陽衰 藏結詳見本條 循衣摸床和熱內結 喘而不休衛

氣敗也柔汗發黃脾絕柔汗 唇吻反青肝絕 環口蠶黑脾絕直

視搖頭絕心 面黑陰毒腎色

●死證歌 三十一證 陰陽毒過七朝期 黑斑下厥與上竭

兩感傷寒不須治 陰陽毒過七朝期 陰陽交及摸床衣

易病見陰脉者死 舌卷耳聾囊更縮 效逆不已并藏結

重睛除中皆不治 唇吻青兮面黑蠶 口張目陷更何為

洩便遺屎便難醫 汗出雖多不至足 結胸証具煩燥甚

喘不休與陰陽易 離經脉見死當知 脉弦長大弦時遲

直視搖頭是死時 少陽証與陽明合 蝦遊屋漏并雀啄

汗後反加脉躁疾 更知藏厥命難追 已上諸証死無疑

魚翔彈石解繩推 更有代脉皆不救

○釋音 疝音備 疝音扛 虬音回 脊強下去声 咳若代切 噦於月切

七必以切 衄尼六切 噫亡界切 赭音者 萎蕤上於危切

潤如倫切 羸音雷 讖職廉切 疲癢上音皮 澱咀立切 齋音色

折音昔 翕音吸 蹇音拳 漬音字 暘音謁 瘞巨井切

眇

音髡

瞑

音冥

𦉳

下官切

噤

音禁

瘕

上胡升切

怔忡

上音征下音冲

澹

音唐

𠵽

所誦切

瘕

克至切

攣

力全切

熇

許告切

懊懷

上於刀切下

諱

朱倫切

拂

音佛

