

重刊巢氏諸病源候總論卷之四

小兒雜病諸候 凡三十四論

時氣病候

時氣病者是四時之間忽有非節之氣如春時應暖而寒夏時應熱而冷秋時應涼而熱冬時應寒而溫其氣傷人爲病亦頭痛壯熱大體與傷寒相似無問長幼其病形證畧同言此時通行此氣故名時氣世亦呼爲天行

天行病發黃候

四時之間忽有非節之氣傷人謂之天行大體似

傷寒亦頭痛壯熱其熱入於脾胃停滯則發黃也  
脾與胃合俱象土其色黃而候於肌肉熱氣蘊積  
其色蒸發於外故發黃也

時氣腹滿候

時氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人其病  
狀似傷寒亦頭痛壯熱也而腹滿者是熱入腹與  
臟氣相搏氣否澁在內故令腹滿若毒而滿者毒  
氣乘心煩懊者死

時氣結熱候

時氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人其病

傷寒亦頭痛壯熱熱入腹內與腑臟之氣相  
之結熱熱則大小腸否澁大小便難而苦煩  
入也

敗時氣病候

氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人其病  
似傷寒亦頭痛壯熱若施治早晚失時投藥不  
與病相會致令病連滯不已乍瘥乍劇或寒或熱  
敗壞之證無常是也

時氣病兼瘥候

時氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人其病

狀似傷寒亦頭痛壯熱而又兼瘧者是日數未滿本常壯熱而邪不退或乘於陰或乘於陽其乘於陽陽爭則熱其乘於陰陰爭則寒陰陽之氣為邪所并互相乘加故發寒熱成瘧也

時氣病得吐下後猶熱候

時氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人其病似傷寒亦頭痛壯熱而得吐下之後壯熱猶不歇者是腸胃宿虛而又吐利則為重虛其熱乘虛而入裏則表裏俱熱停滯不歇故雖吐下而猶熱也  
時氣病後不嗜食面青候

時氣之病是四時之間忽有非節之氣傷人客於肌膚與血氣相搏故頭痛壯熱熱歇之後不嗜食而面青者是胃內餘熱未盡氣滿故不嗜食也諸陽之氣俱上榮於面陽虛未復本帶風邪風邪挾冷冷搏於血氣故令面青也

時氣病發復候

時氣之病發復者是四時之間忽有非節之氣傷人客於肌膚搏於血氣蘊積則變壯熱頭痛熱退之後氣血未和腑臟熱勢未盡或起早勞動或飲食不節故其病重發謂之復也然發復多重於初

病者血氣已虛重傷故也

溫病候

溫病者是冬時嚴寒人有觸冒之寒氣入肌肉當時不即發至春得暖氣而發則頭痛壯熱謂之溫病又冬時應寒而反暖其氣傷人即發亦使人頭痛壯熱謂之冬溫病凡邪之傷人皆由觸冒所以感之小兒雖不能觸冒其乳母抱持解脫不避風邪冷熱之氣所以感病也

溫病下利候

溫病是冬時嚴寒人有觸冒之寒氣入肌肉當時

不即發至春成病得暖氣而發則頭痛壯熱謂之溫病又冬時應寒而反溫其氣傷人即發成病使人頭痛壯熱謂之冬溫病也其下利者是腸胃宿虛而感於溫熱之病熱氣入於腸胃與水穀相搏腸虛則泄故下利也

溫病鼻衄候

溫病者是冬時嚴寒人有觸冒之寒氣入肌肉當時不即發至春得暖氣而發則頭痛壯熱謂之溫病又冬時應寒而反溫其氣傷人即發成病謂之冬溫病並皆頭痛壯熱其鼻衄者熱乘於氣而入

血也肺候身之皮毛主於氣開竅於鼻溫病則邪先客皮膚而搏於氣結聚成熱熱乘於血血得熱則流散發從鼻出者爲衄也凡候熱病鼻欲衄其數發汗汗不出或初染病已來都不汗而鼻燥喘息鼻氣有聲如此者必衄也小兒衄止至一升數合熱因得歇若至一斗數升則死矣

### 溫病胃結候

溫病是冬時嚴寒人有觸冒之寒氣入肌肉當時不即發至春得暖氣而發則頭痛壯熱謂之溫病又冬時應寒而反溫其氣傷人即發成病謂之冬溫病並皆頭痛壯熱凡溫熱之病四五月之後熱入裏內熱腹滿者宜下之若熱未入裏而下之早者裏虛氣逆熱結胃上則胃否滿短氣謂之結胃也

### 患斑毒病候

斑毒之病是熱氣入胃而胃主肌肉其熱挾毒蘊積於胃毒氣熏發於肌肉狀如蚊蚤所嚙赤斑起周匝徧體此病或是傷寒或時氣或溫病皆由熱不時歇故熱入胃變成毒乃發斑也凡發赤斑者十生一死黑者十死一生

黃病候

黃病者是熱入脾胃熱氣蘊積與穀氣相搏蒸發於外故皮膚悉黃眼亦黃脾與胃合俱象土候肌肉其色黃故脾胃內熱積蒸發令肌膚黃此或是傷寒或時行或溫病皆由熱不時解所以入胃也凡發黃而下利心腹滿者死診其脈沈細者死又有百日半歲小兒非關傷寒溫病而身微黃者亦是胃熱慎不可灸也灸之則熱甚此是將息過度所為微薄其衣數與除熱粉散粉之自欲不得妄與湯藥及灸也

黃疸病候

黃疸之病由脾胃氣實而外有溫氣乘之變生熱脾與胃合候肌肉俱象土其色黃胃為水穀之海熱搏水穀氣蘊積成黃蒸發於外身疼膊背強大小便澁皮膚面目齒爪皆黃小便如屋塵色著物皆黃是也小便宣利者易治若心腹滿小便澁者多難治也不渴者易治渴者難治脈沈細而腹滿者死也

胎疸候

小兒在胎其母臟氣有熱熏蒸於胎至生下小兒

體皆黃謂之胎疸也

瘧病候

瘧病者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣  
腠理虛而邪乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭  
陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰  
陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘧  
休作有時其發時節漸晏者此由邪客於風府邪  
循脊而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日  
日下一節故其作日晏其發早者衛氣之行風府  
日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內

上注於伏衝之脉其行九日出於缺盆之內其氣  
之上故其病發更早其間日發者由邪氣內薄五  
臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故  
間日蓄積乃發也小兒未能觸冒於暑而亦病瘧  
者是乳母抱持解脫不避風者也

瘧後餘熱候

夫風邪所傷是客於皮膚而痰飲漬於臟腑致令  
血氣不和陰陽交爭若真氣勝則邪氣退邪氣未  
盡故發瘧也邪氣雖退氣血尚虛邪氣干於真氣  
臟腑壅否熱氣未散故餘熱往來也

患瘧後脅內結硬候

瘧是夏傷於暑熱客於皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒熱其病正發寒熱交爭之時熱氣乘藏藏則燥而渴渴而引飲飲停成癖結於脅下故瘧後脅內結硬也

瘧後內熱渴引飲候

瘧病者是夏傷於暑熱客於皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒熱成瘧凡瘧發欲解則汗汗則津液減耗又熱乘於臟藏虛燥其瘧瘥之後腑臟未和津液未復故內猶熱渴而引飲也若引

飲不止小便澀者則變成癖也

寒熱往來候

風邪外客於皮膚內而痰飲漬於腑臟致令血氣不和陰陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所乘邪與正相干陰陽交爭時發時止則寒熱往來也

寒熱往來五臟煩滿候

風邪外客於皮膚內而痰飲漬於腑臟致令血氣不和陰陽交爭故寒熱往來而熱乘五臟氣積不泄故寒熱往來而五臟煩滿

寒熱往來腹痛候

風邪外客於皮膚內而痰飲漬於腑臟血氣不和則陰陽交爭故寒熱往來而臟虛本挾宿寒邪入於臟與寒相搏而擊於臟氣故寒熱往來而腹痛也

寒熱結實候

外為風邪客於皮膚內而痰飲漬於腑臟使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而臟氣本實復為寒熱所乘則積氣在內使人胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便亦澁是為寒熱結實

寒熱往來食不消候

風邪外客於皮膚內有痰飲漬於腑臟使血氣不和陰陽交爭則寒熱往來其脾胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱而內冷發動故食不消也

寒熱往來能食不生飢肉候

風邪外客於皮膚內而痰飲漬於腑臟使血氣不和陰陽交爭故發寒熱往來胃氣挾熱則消穀穀消則引食陰陽交爭為血氣不和血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而不生肌肉也

胃中有熱候

小兒血氣俱盛者則腑臟皆實故胃中生熱其狀大便則黃四肢溫壯翕然體熱

熱煩候

小兒臟腑實血氣盛者表裏俱熱則苦煩燥不安皮膚壯熱也

熱渴候

小兒血氣盛者則腑臟生熱熱則臟燥故令渴

中客忤候

小兒中客忤者是小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之與鬼神氣相忤而發病謂

之客忤也亦名中客又名中人其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛反倒夭矯面變易五色其狀似癩但眼不上搖耳其脉弦急數者是也若失時不治久則難治若乳母飲酒過度醉及房勞喘後乳者最劇能殺兒也

爲鬼所持候

小兒神氣軟弱精爽微羸而神寃被鬼所持錄其狀不覺有餘疾直爾萎黃多大啼喚口氣常臭是也

卒死候

小兒卒死者是三虛而遇賊風故無病倉卒而死也三虛者乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也有人因此三虛復爲賊風所傷使陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死也若腑臟未竭良久乃蘇亦有兼挾鬼神氣者皆有頃邪退乃生也凡中客忤及中惡卒死而邪氣不盡停滯心腹久乃發動多變成注也

中惡候

小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順理榮衛平和神守則強邪不干正若精

氣衰弱則鬼毒惡氣中之其狀先無他病卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而蒲脉緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯臟腑之間更發後變爲注也

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十七

小兒雜病諸候三 凡四十五論

注候

注之言住也謂其風邪氣留人身內也人無問大小若血氣虛衰則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留在肌肉之間連滯腑臟之內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮腫沈滯至死死又注易傍人故爲注也小兒不能觸冒風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神寬軟弱而爲鬼氣所傷故病也

尸注候

尸注者是五尸之中一尸注也人無問小大腹內皆有尸蠱尸蠱爲注忌惡多接引外邪共爲患害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸注因而爲病其狀沈默不的知病處或寒熱淋瀝洩引歲月遂至於死死又注易傍人故名之爲尸注也

蠱注候

人聚蟲蛇雜類以器皿盛之令相噉食餘一存者即名爲蠱能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶

急者即死緩者涉歷歲月漸深羸困食心裁盡利血心藏爛乃至死死又注易傍人故爲蠱注也

陰腫候

足少陰爲腎之經其氣下通於陰小兒有少陰之經虛而受風邪者邪氣衝於陰與血氣相搏結則陰腫也

腹脹候

腹脹是冷氣客於臧故也小兒腑臟嫩弱有風冷邪氣客之搏於臧氣則令腹脹若脾虛冷移入於胃食則不消若腸虛冷氣乘之則變下利

霍亂候

霍亂者陰陽清濁二氣相干謂之氣亂氣亂於腸胃之間爲霍亂也小兒腸胃嫩弱因解脫逢風冷乳哺不消而變吐利也或乳母觸冒風冷食飲生冷物皆令氣流入乳令乳變敗兒若飲之亦成霍亂吐利皆是觸犯腑臟使清濁之氣相干故霍亂也挾風而絡實者則身發熱頭痛脇疼而復吐利凡小兒霍亂皆須暫斷乳亦以藥與乳母服令血氣調適乳汁溫和故也小兒吐利不止血氣變亂即發驚癇也

吐利候

吐利者由腸虛而胃氣逆故也小兒有解脫而風冷入腸胃腸胃虛則泄利胃氣逆則嘔吐此大體與霍亂相似而小兒不劇悶頓故直云吐利亦不呼爲霍亂也

服湯中毒毒氣吐下候

春夏以湯下小兒其腸胃脆嫩不勝藥勢遂吐下不止藥氣熏臟腑乃煩懊頓乏者謂此爲中毒毒氣吐下也

嘔吐逆候

兒啼未定氣息未調乳母忽遽以乳飲之其氣尚逆乳不得下停滯胃膈則胃滿氣急令兒嘔逆癩吐又乳母將息取冷冷氣入乳乳凝壞不捨除之仍以飲兒冷乳入腹與胃氣相逆則腹脹滿氣息喘急亦令嘔吐又解脫換易衣裳及洗浴露兒身體不避風冷風冷因客膚腠搏血氣則熱入於胃則腹脹痛而嘔吐也凡如此風冷變壞之乳非直令嘔吐腸虛入於胃大腸則爲利也

噓候

小兒噓由哺乳冷冷氣入胃與胃氣相逆冷折胃

氣不通則令噓也

吐血候

小兒吐血者是有熱氣盛而血虛熱乘於血血性得熱則流散妄行氣逆即血隨氣上故令吐血也

難乳候

凡小兒初生看產人見兒出急以手料拭兒口無令惡血得入兒口則兒腹內調和無有疾病若料拭不及時則惡血穢露兒咽入腹令心腹否滿短氣兒不能飲乳謂之難乳

又云兒在胎之時母取冷過度冷氣入胞令兒著

冷至兒生出則喜腹痛不肯飲乳此則胎寒亦名難乳也

吐呢候

小兒吐呢者由乳哺冷熱不調故也兒乳哺不調則停積胃膈因更飲乳哺前後相觸氣不得宣流故吐呢出診其脉浮者無苦也

百病候

小兒百病者由將養乖節或犯寒溫乳哺失時乍傷飢飽致令血氣不理腸胃不調或欲發驚瀆或欲成伏熱小兒氣血脆弱病易動變證候百端若

見其微證即便治之使不成衆病故謂之百病治之若晚其病則成凡諸病至於困者汗出如珠著身不流者死也病如胃膈者其口唇乾貝髮張口中氣出冷足與頭相柱卧不舉手足四肢垂其卧正直如縛得其掌中冷至十日必死不可治也

頭身喜汗出候

小兒有血氣未實者膚腠則疎若厚衣溫卧腑臟生熱蒸發腠理津液泄越故令頭身喜汗也

盜汗候

盜汗者眠睡而汗自出也小兒陰陽之氣嫩弱腠

理易開若將養過溫因睡卧陰陽氣交津液發泄而汗自出也

### 痰候

痰者水飲停積胃膈之間結聚痰也小兒飲乳因冷熱不調停積胃膈之間結聚成痰痰多則令兒飲乳不下吐涎沫變結而微壯熱也痰實壯熱不止則發驚癇

### 胃膈有寒候

三焦不調則寒氣獨留膈上不通則令兒乳哺不得消下噫氣酸臭胃膈不滿甚則氣息喘急

### 癥瘕癖結候

五臟不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺不消化結聚成癥瘕也其狀按之不動有形段者瘕也推之浮移者瘕也其弦急牢強或在左或在右癖也皆由冷氣痰水食飲結聚所成故云癥瘕癖結也

### 否結候

否者塞也小兒胃膈熱實腹內有留飲致令榮衛否塞腑臟之氣不宜通其痛腹內氣結脹滿或時壯熱是也

宿食不消候

小兒宿食不消者脾胃冷故也小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾胃脾胃則冷胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣和調則乳哺消化若傷於冷則宿食不消診其三部脉沈者乳不消也

傷飽候

小兒食不可過飽飽則傷脾脾傷不能磨消於食令小兒四肢沈重身體苦熱面黃腹大是也

食不知飽候

小兒有嗜食食已仍不知飽足又不生肌肉其亦

腹大其大便數而多泄亦呼為豁治此腸胃不守故也

哺露候

小兒乳哺不調傷於脾胃脾胃衰弱不能飲食血氣減損不榮肌肉而柴辟羸露其臟腑之不宣則吸吸苦熱謂之哺露也

大腹丁奚候

小兒丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精減損無以榮其氣血致肌肉消瘠其病腹大頸小黃瘦是也若久不

瘥則變成穀瘵傷飽一名哺露一名下奚三種大體相似輕重立名也

### 洞泄下利候

春傷於風夏爲洞泄小兒有春時解脫衣服爲風冷所傷臟在肌肉至夏因飲食居處不調又被風冷入於腸胃先後重脊爲風邪所乘則下利也其冷氣盛利甚爲洞泄洞泄不止爲注下也凡注下不止者多變驚癇所以然者本挾風邪因利臟虛風邪乘之故也亦變眼痛生障下焦偏冷熱結上焦熏於肝故也

### 利後虛羸候

腸胃虛弱受風冷則下利利斷之後脾胃尚虛谷氣猶少不能榮血氣故虛羸也

### 赤白滯下候

小兒體本挾熱忽爲寒所折氣血不調大腸虛弱者則冷熱俱乘之熱搏血滲腸間其利則赤冷搏腸津液凝其利則白冷熱相交血滯相雜腸虛者泄故爲赤白滯下也

### 赤利候

小兒有挾客熱客熱入於經絡而血得熱則流散

滲入大腸腸虛則泄故爲赤利也

熱利候

小兒本挾虛熱而爲風所乘風熱俱入於腸而利爲熱是水穀利而色黃者爲熱利也

冷利候

小兒腸胃虛或解脫遇冷或飲食傷冷冷氣入於腸胃而利其色白是爲冷利也冷甚則利青也

冷熱利候

小兒先因飲食有冷氣在腸胃之間而復爲熱氣所傷而腸胃宿虛故受於熱冷熱相交而變下利

黃白或水或谷是爲冷熱利也

卒利候

小兒卒利者由腸胃虛暴爲冷熱之氣所傷而爲卒利熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則變爲赤白帶利也

久利候

春傷於風至夏爲洞泄小兒春時解脫爲風所傷藏於肌肉至夏因爲水穀利經久連帶不瘥也凡水穀利久腸胃虛易爲冷熱得冷則變白膿得熱則變赤血若冷熱相加則赤白相雜利久則變腫

蒲亦變病蠱亦令嘔噦皆出利久脾胃虛所爲也

重下利候

重下利者此是赤白滯下利而挾熱多者熱結肛門利不時下而久噤氣謂之重下利也

利如膏血候

此是赤利腸虛極腸間脂與血俱下故謂利如膏血也

蠱毒利候

歲時寒暑不調而有毒厲之氣小兒解脫爲其所傷邪與血氣相搏入於腸胃毒氣蘊積值大腸虛

者則變利血其利狀血色蘊瘀如鷄鴨肝片隨利下此是毒氣盛熱食於人臟狀如中蠱故謂之蠱毒利也

利兼渴候

此是水穀利津液枯竭腑臟虛燥則引飲若小便快者利斷渴則止若小便澁水不行於小腸滲入腸胃渴亦不止利亦不斷凡如此者皆身體浮腫脾氣弱不能剋水故也亦必眼痛生障小兒上焦本熱今又利下焦虛上焦熱氣轉盛熱氣熏肝故也

被魃候

小兒所以有魃病者婦人懷娠有惡神導其腹中胎妬嫉而制伏他小兒令病也任娠婦人不必悉能制魃人時有此耳魃之爲疾喜微微下寒熱有去來毫毛髮學鬢不悅是其證也

驚啼候

小兒驚啼者是於眠睡裏忽然啼而驚覺也由風熱邪氣乘於心則心臟生熱精神不定故卧不安則驚而啼也

夜啼候

小兒夜啼者藏冷故也夜陰氣盛與冷相搏則冷動冷動與藏氣相并或煩或痛故令小兒夜啼也然亦有犯觸禁忌亦令兒夜啼則可法術斷之

軀啼候

小兒在胎則其母將養傷於風冷邪氣入胞傷兒臟腑故兒生之後邪猶在兒腹內邪動與正氣相搏則腹痛故兒軀張蹙氣而啼

胎寒候

小兒在胎時其母將養取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃故兒生之後冷氣猶在腸胃之間其狀兒腸

胃冷不能消乳哺或腹脹或時谷利令兒顏色素  
肥時啼者是胎寒故也

腹痛候

小兒腹痛多由冷熱不調冷熱之氣與臟腑相擊  
故痛也其熱而痛者則面赤或壯熱四肢煩手足  
心熱是也冷而痛者面色或青或白甚者乃至面  
黑唇口爪皆青是也

心腹痛候

小兒心腹痛者腸胃宿挾冷又暴為寒氣所加前  
後冷氣重脊動與脈氣相搏隨氣上下衝擊心腹

之間故令心腹痛也

重刊巢氏諸病候總論卷之四十七

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十八

小兒雜病諸候四 凡四十六論

解顛候

解顛者其狀小兒年大顛應合而不合頭縫闕解是也由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成則髓腦不足不能結成故頭顛開解也

凶填候

小兒凶填由乳哺不時飢飽不節或熱或寒乘於脾胃致腑臟不調其氣上衝所爲也其狀凶張如物填其上汗出毛髮黃而短者是也若寒氣上衝

即牢鞣熱氣上衝即柔軟又小兒脊下有積又氣  
滿而體熱熱氣乘於藏藏氣上衝於腦凶亦致凶  
填又欬且啼而氣乘藏上衝亦病之啼甚久其氣  
未定因而乳之亦令凶填所以然者方啼之時陰  
陽氣逆上衝故也

凶陷候

此謂凶陷下不平也由腸內有熱熱氣熏臟臟熱  
即渴引飲而小便洩利者即腑臟血氣虛弱不能  
上充髓腦故凶陷也

重舌候

小兒重舌者心脾熱故也心候於舌而主於血脾  
之絡脉又出舌下心火脾土二臟母子也有熱即  
血氣俱盛其狀附舌下近舌根生形如舌而短故  
謂之重舌

滯頤候

滯頤之病是小兒多涎唾流出漬於頤下此出脾  
液多故也脾之液為涎脾氣冷不能收制其津  
液故令涎流出滯漬於頤也

中風候

小兒血氣未定肌膚脆弱若將養乖宜寒溫失度

腰理虛開即為風所中也凡中風皆從胃諸臟俞入若心中風但得偃卧不得傾側汗出唇赤若汗流者可治急灸心俞若唇或青或白或黃或黑此是心壞為水面目亭亭特悚動皆不復可治五六日而死若肝中風踞坐不得低頭若繞兩目連額上色微有青唇色青而面黃可治急灸肝俞若大青黑面一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死若脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹汁出者可治急灸脾俞若手足青者不可復治也若腎中風踞而腰痛視脇左右未有黃色如餅糶大者可治

急灸腎俞若齒黃赤鬢髮直面土色不可治也肺中風偃卧而胃滿短氣冒汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞若黃為肺已傷化為血不可復治也其人當要掇空或自拈衣如此數日而死此五臟之中風也其年長成童者灸皆百壯若五六歲已下至於嬰兒灸者以意消息之凡嬰兒若中於風則的成癩癩也

中風四肢拘攣候

小兒肌肉脆弱易傷於風風冷中於膚腠入於經絡風冷搏於筋脉筋脉得冷即急故使四肢拘攣

也

中風不隨候

夫風邪中於肢節經於筋脉若風挾寒氣者即拘急攣痛若挾於熱即緩縱不隨

白虎候

按堪輿歷遊年圖有白虎神云太歲在卯即白虎在寅準此推之知其神所在小兒有居處觸犯此神者便能為病其狀身微熱有時啼喚有時身小冷屈指如數似風癩但手足不瘳癢耳

卒失音不能語候

喉隴者氣之道路喉厭者音聲之門戶有暴寒氣客於喉厭喉厭得寒即不能發聲故卒然失音也不能語者語聲不出非牙關噤也

中風口噤候

小兒中風口噤者是風入頷頰之筋故也手三陽之筋入結頷頰足陽明之筋上夾於口脣脣虛受風冷客於諸陽之筋筋得寒冷則攣急故機關不利而口噤也

中風口喎邪僻候

小兒中風口喎邪僻是風入於頷頰之筋故也足

陽明之筋上夾於口手三陽之脈偏急而口喎邪  
僻也

中風瘓候

小兒風瘓之病狀如癩而背脊項頸強直是風傷  
太陽之經小兒解脫之臍瘡未合為風所傷皆令  
發瘓

羸瘦候

夫羸瘦不生肌膚皆為脾胃不和不能飲食故血  
氣衰弱不能榮於肌膚凡小兒在胎而遇寒冷或  
生而挾伏熱皆令兒不能飲食故羸瘦也挾熱者

即溫壯身熱肌肉微黃其挾冷者即時時下利唇  
口青皸

虛羸候

此謂小兒經諸大病或驚癇或傷寒或溫壯而服  
藥或吐利發汗病瘥之後血氣尚虛脾胃猶弱不  
能傳化穀氣以榮身體故氣力虛而羸也

嗽候

嗽者由風寒傷於肺也肺主氣候皮毛而俞在於  
背小兒解脫風寒傷皮毛故因從肺俞入傷肺肺  
感微寒即嗽也故小兒生須常暖背夏月亦須單

背襠若背冷得嗽月內不可治百日內嗽者十中  
一兩瘥耳

欬逆候

欬逆由乳哺無度因挾風冷傷於肺故也肺主氣  
為五臟上蓋在胃間小兒啼氣未定因而飲乳乳  
與氣相逆氣相引乳射於肺故欬而氣逆謂之欬  
逆也冷乳冷哺傷於肺搏於肺氣亦冷欬逆也

病氣候

肺主氣肺氣有餘即喘欬上氣若又為風冷所加  
即氣聚於肺令肺脹即胃滿氣急也

腫滿候

小兒腫滿由將養不調腎脾二臟俱虛也腎主水  
其氣下通於陰脾主土候肌肉而剋水腎虛不能  
傳其水液脾虛不能剋制於水故水氣流溢於皮  
膚故令腫滿其挾水腫者即皮薄如熟李之狀也  
若皮膚受風風搏而氣致腫者但虛腫如吹此風  
氣腫也

毒腫候

毒腫是風熱濕氣搏於皮膚使血氣澀不行蘊積  
成毒其腫赤而熱是也

耳聾候

小兒患耳聾是風入頭腦所為也手太陽之經入於耳內頭腦有風風邪隨氣入乘其脉與氣相搏風邪停積即令耳聾

耳鳴候

手太陽之經脉入於耳內小兒頭腦有風者風入乘其脉與氣相擊故令耳鳴則邪氣與正氣相擊久即邪氣停滯皆成聾也

中風掣痛候

小兒耳鳴及風掣痛其風染而皆起於頭腦有風

其風入經脉與氣相動而作故令掣痛其風染而漸至與正氣相擊輕者動作幾微故但鳴也其風暴至正氣又盛相擊則其動作疾急故掣痛也若不止則風不散津液壅聚熱氣加之則生黃汁甚者亦有薄膿也

聾耳候

耳宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎臟盛而有熱者熱氣上衝於耳津液壅結即生膿汁亦有因沐浴水入耳內而不傾瀝令盡水濕停積搏於血氣蘊結成熟亦令膿汁出皆為之聾耳久不瘥即變

成瞽也

目赤痛候

肝氣通於目臟內客熱與胃膈痰飲相搏熏漬於肝肝熱氣衝發於目故令目赤痛也甚則生翳

眼障翳候

眼是腑臟之精華肝之外候而肝氣通於眼也小兒腑臟痰熱熏漬於肝衝發於眼初只熱痛熱氣蘊積變生障翳熱氣輕者止生白翳結聚小者如黍粟大者如麻豆隨其輕重輕者止生一翳重者乃至兩三翳也若不生翳而生白障者是疾重極

徧覆黑睛滿眼悉白則失明也其障亦有輕重輕者黑睛邊微有白膜來侵黑睛漸染散漫若不急治熱勢即重滿目併生白障也

目盲候

眼無障翳而不見物謂之盲此由小兒臟內有停飲而無熱但有飲水積漬於肝也目是五臟之精華肝之外候也肝氣通於目為停飲水漬臟氣不宣和精華不明審故不赤痛亦無障翳而不見物故名青盲也

雀目候

人有晝而睛明至瞑便不見物謂之雀目言如鳥雀瞑便無所見也

綠目生瘡候

風邪客於臉皆之間與血氣相搏挾熱即生瘡浸漬綠目赤而有汁時瘡時發世云小兒初生之時洗浴兒不淨使穢露津液浸漬眼臉睫皆後遇風邪發即目赤爛生瘡喜難瘡瘡後還發成疹世人謂之胎赤

鼻衄候

小兒經脈血氣有熱喜令鼻衄夫血之隨氣循行

經脈通遊腑臟若冷熱調和行依其常度無有壅滯亦不流溢也血性得寒即凝澀結聚得熱即流散妄行小兒熱盛者熱乘於血血隨氣發溢於鼻者謂之鼻衄凡人血虛受熱即血失其常度發溢妄行乃至發於七竅謂之大衄也

醫鼻候

醫鼻之狀鼻下兩邊赤發時微有瘡而痒是也亦名赤鼻亦名奔鼻然鼻是肺氣所通肺候皮毛其氣不和風邪客於皮毛次於血氣夫邪在血氣隨虛處而入停之其停於鼻兩邊與血氣相搏成瘡

者謂之鑿鼻也

斃鼻候

肺主氣而通於鼻而氣爲陽諸陽之氣上榮頭面若氣虛受風冷風冷客於頭腦即其氣不和令氣停滯搏於津液膿涕結聚即鼻不聞香臭謂之斃

鼻塞候

肺氣通於鼻而氣爲陽諸陽之氣上榮頭面其氣不和受風冷風冷邪氣入於腦停滯鼻間即氣不宣和結聚不通故鼻塞也

喉痺候

喉痺是風毒之氣客於咽喉之間與血氣相搏而結腫塞飲啣不下乃成膿血若毒入心心即煩悶懊懣不可堪忍如此者死

馬痺候

馬痺與喉痺相似亦是風熱毒氣客於咽喉頰頰之間與血氣相搏結聚腫痛其狀從頰下腫連頰下應喉內腫痛塞水漿不下甚者膿潰毒若攻心則心煩悶致死

齒不生候

齒是骨之所終而爲髓之所養也小兒有稟氣不

足者髓即不能充於齒骨故齒久不生

齒痛風齩候

手陽明足太陽之脉並入於齒風氣入其經脉與血氣相搏齒即腫痛膿汁出謂之風齩

齒根血出候

手陽明足太陽之脉並入於齒小兒風氣入其經脉與血相搏血氣虛熱即齒根血出也

數歲不能行候

小兒生自變蒸至於能語隨日數血脉骨節備成其髓骨成即能行骨是髓之所養若稟生血氣不

足者即髓不充強故其骨不即成而數歲不能行也

鶴節候

小兒稟生血氣不足即肌肉不充肢體柴瘦骨節皆露如鶴之脚節也

頭髮黃候

足少陰爲腎之經其血氣華於髮若血氣不足則不能潤悅於髮故髮黃也

頭髮不生候

足少陰爲腎之經其華在髮小兒有稟性少陰之

血氣不足即髮踈薄不生亦有因頭瘡而禿落不生者皆由傷損其血血氣損少不能榮於髮也

昏塞候

人有稟性陰陽不和而心神昏塞者亦有因病而精采闇鈍皆由陰陽之氣不足致神識不分明

落床損瘀候

血之在身隨氣而行常無停積若因墮落損傷即血行失度隨傷損之處即停積若流入腹內亦積聚不散皆成瘀血凡瘀血在內顏色萎黃氣息微喘瀡瀡小寒噲噲微熱或時損痛也

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十九

小兒雜病諸候五

凡五十論

丹候

風熱毒氣客於腠理熱毒搏於血氣蒸發於外其皮上熱而赤如丹之塗故謂之丹也若久不瘥即肌肉爛傷

五色丹候

五色丹發而改變無常或青黃白黑赤此由風毒之熱有盛有衰或冷或熱故發為五色丹也

赤黑丹候

丹病本是毒熱折於血氣蘊蒸色赤而復有冷氣  
乘之冷熱互交更相積凝冷色赤黑

白丹候

丹初是熱毒挾風熱搏於血積蒸發赤也熱輕而  
挾風多者則其色微白也

丹火候

丹火之狀發赤如火之燒湏臾燦漿起是也

天火丹候

丹發竟身體斑赤如火之燒故謂之天火丹也

伊火丹候

丹初發肉黑忽腫起謂之風火丹也

暴火丹候

暴火丹之狀帶黑皴色謂之暴火丹也

留火丹候

留火丹之狀發一日一夜便成瘡如棗大正赤色  
謂之留火丹也

朱田火丹候

丹先發背起徧身一日一夜而成瘡謂之朱田火  
丹也

鬱火丹候

丹發從背起謂之鬱火丹也

神火丹候

丹發兩髀不過一日便赤黑謂之神火丹也

天竈火丹候

丹發兩髀裏尻間正赤流陰頭赤腫血出謂之天竈火丹也

鬼火丹候

丹發兩臂赤起如李子謂之鬼火丹也

石火丹候

丹發通身自突起如細粟大色青黑謂之石火丹也

野火丹候

丹發赤斑斑如梅子竟背腹謂之野火丹也

茱萸火丹候

丹發初從背起編身如細纈謂之茱萸火丹也

家火丹候

丹初發著兩腋下兩髀上名之曰家火丹也

廢竈火丹候

丹發從足跌起正赤者謂之廢竈火丹也

螢火丹候

丹發如灼在脅下正赤初從骼起而長上痛是螢

火冊也

赤冊候

此謂冊之純赤色者則是熱毒搏血氣所爲也

風痿隱胗候

小兒因汗解脫衣裳風入腠理與血氣相搏結聚起相連成隱胗風氣止在腠理浮淺其勢微故不腫不痛但成隱胗癢痒耳

卒腹皮青黑候

小兒因汗腠理則開而爲風冷所乘冷搏於血隨肌肉虛處停之則血氣沈澀不能榮其皮膚而風

冷客於腹皮故青黑

藍注候

小兒爲風冷乘其血脉血得冷則結聚成核其皮肉色如藍乃經久不歇世謂之藍注

身有赤處候

小兒因汗爲風邪毒氣所傷與血氣相搏熱氣蒸發於外其肉色赤而壯熱是也

赤遊腫候

小兒有肌肉虛者爲風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣則皮膚赤而腫起其風隨氣行遊不定故名赤

遊腫也

大便不通候

小兒大便不通者腑臟有熱乘於大腸故也脾胃爲水穀之海水穀之精華化爲血氣其糟粕行於大腸若三焦五臟不調和熱氣歸於大腸熱實故大便燥澀不通也

大小便不利候

小兒大小便不利者腑臟冷熱不調大小腸有遊氣氣壅在大小腸不得宣散故大小便澀不流利也

大小便血候

心主血脉心臟有熱熱乘於血血性得熱流散妄行不依常度其流滲於大小腸者故大小便血也

尿血候

血性得寒則凝澀得熱則流散而心主於血小兒心臟有熱乘於血血滲於小腸故尿血也

痔候

痔有牡痔牝痔脉痔腸痔血痔酒痔皆因勞傷過度損動血氣所生小兒未有虛損而患痔止是大便有血出腸內有結熱故也

小便不利候

小便不利者腎與膀胱熱故也此二經為表裏俱主水水行於小腸入胞為小便熱氣在其臟腑水氣則澀故小便不利也

### 大小便數候

脾與胃合胃為水穀之海水穀之精化為血氣以行經脈其糟粕水液行之於大小腸若三焦平和則五臟調適虛實冷熱不偏其脾胃氣弱大小腸偏虛下焦偏冷不能制於水穀者故令大小便數也

### 諸淋候

小兒諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎為表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰為小便也腎氣下通於陰陰水液之道路膀胱津液之府膀胱熱津液內溢而流於澤水道不通水不上不下停積於胞腎氣不通於陰腎熱其氣則澀故令水道不利小便淋瀝故謂為淋其狀小便出少起數小腹急痛引臍是也又有石淋氣淋熱淋血淋寒淋諸淋形證隨名具說於後章而以一方治之者故謂諸淋也

### 石淋候

石淋者淋而出石也腎主水水結則化爲石故腎容砂石腎爲熱所乘熱則成淋其狀小便莖中痛尿不能卒出時自痛引小腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者水道塞痛令悶絕

### 氣淋候

氣淋者腎虛膀胱受肺之熱氣氣在膀胱膀胱則脹肺主氣氣爲熱所乘故流入膀胱膀胱與腎爲表裏膀胱熱則氣壅不散小腹氣滿水不宣利故小便澀成淋也其狀膀胱小腹滿尿澀常有餘瀝是也亦曰氣癃診其少陰脉數者男子則氣淋也

### 熱淋候

熱淋者三焦有熱氣傳於腎與膀胱而熱氣流入於胞而成淋也

### 血淋候

血淋者是熱之甚盛者則尿血謂之血淋心主血血之行身通徧經絡循環腑臟其熱甚者血即散失其常經溢滲入胞而成血淋矣

### 寒淋候

寒淋者其病狀先寒戰然後尿是也小兒取冷過度下焦受之冷氣入胞與正氣交爭寒氣勝則戰

寒正氣勝則戰寒解故得小便也

### 小便數候

小便數者膀胱與腎俱有客熱乘之故也腎與膀胱爲表裏俱主水腎氣下通於陰此二經既受客熱則水行澀故小便不快而起數也

### 遺尿候

遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故也足太陽爲膀胱之經足少陰爲腎之經此二經爲表裏腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也膀胱爲津液之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿也終

## 重刊巢氏諸病源候總論卷之五十

### 小兒雜病諸候

凡五十一論

### 三蟲候

三蟲者長蟲赤蟲蛭蟲爲三蟲也猶是九蟲之數也長蟲蛭蟲也長一尺動則吐清水而心痛貫心卽死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蛭蟲至細微形如菜蟲也居胴腸間多則爲痔劇則爲癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘦癩疥齩蟲無所不爲此既九蟲之內三者而今則別立名當以其三種偏發動成病故謂之三蟲也

蚘蟲候

蚘蟲者九蟲內之一蟲也長一尺亦有長五六寸者或因腑臟虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中痛發作腫聚行來上下痛有休止亦攻心痛口喜吐涎及清水貫傷心者則死診其脉腹中痛其脉法當沈澀弦今反脉洪而大則是蚘蟲也

蛟蟲候

蛟蟲者九蟲內之一蟲也形甚細小如今之螞蟥狀亦因腑臟虛弱而致發甚者則成痔瘻癢疥也

寸白蟲候

寸白者九蟲內之一蟲也長一寸而色白形小扁因腑臟虛弱而能發動或云飲白酒一云以桑樹枝貫串牛肉炙并食生栗所作或云食生魚後即食乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疼痛又云此蟲生長一尺則令人死也

脫肛候

脫肛者肛門脫出也肛門大腸之候小兒患肛門脫出多因利方腸虛冷兼用輿氣故肛門脫出謂之脫肛也

病瘡候

瘡者陰核氣結腫大也小兒患此者多因啼哭氣不止動於陰氣陰氣而擊結聚不散所成也

差賸候

差賸者陰核偏腫大亦由啼哭軀氣擊於下所致其偏腫者氣偏乘虛而行故偏結腫也

狐臭候

人有血氣不和腋下有如野狐之氣謂之狐臭而此氣能染易著於人小兒多是乳養之人先有此病染著小兒

四五歲不能語候

人之五臟有五聲心之聲爲言小兒四五歲不能言者由在胎之時其母卒有驚悸內動於兒臟邪氣乘其心令心氣不和至四五歲不能言語也

氣癭候

氣癭之狀頸下皮寬內結突起腿腿然亦漸長大氣結所成也小兒啼未止因以乳飲之令氣息喘逆不得消散故結聚成癭也

胃脅滿痛候

看養小兒有失節度而爲寒冷所傷寒氣入腹內乘虛停積後因乳哺冷熱不調觸胃宿寒與氣相

擊不散在於胃脅之間故令滿痛也

服湯藥中毒候

小兒有疥患服湯藥其腸胃脆嫩不勝藥氣便致煩毒也故謂之中毒

蠅蝮毒繞腰痛候

蠅蝮蟲長一寸許身有毛如毫毛長五六分脚多而甚細足處至壁之間云其行走遇人則尿人影隨所尿著影處人身即應之生瘡世病之者多著腰痛初生之狀匝起初結痞癩小者如黍粟大者如麻豆染漸生長闊大繞腰生膿汁成瘡也

頭面身體諸瘡候

腑臟熱甚熱氣衝發皮膚而外有風濕折之與血氣相搏則生瘡甚壯初赤起瘡癩後乃生膿汁隨瘡隨發或生身體或出頭面或身體頭面皆有也

惡瘡候

夫人身體生瘡皆是臟熱衝外外有風濕相搏所生而風濕之氣有挾熱毒者其瘡則痛痒腫嫩久不瘡故名惡瘡也

標瘡候

小兒爲風熱毒氣所傷客於皮膚生標瘡而潰成

瘡名爲慄瘡也

瘰癧候

小兒身生熱瘡必生瘰癧其狀作結核在皮肉間  
三兩箇相連累也是風邪搏於血氣燉結所生也  
惡核候  
惡核者是風熱毒氣與血氣相搏結成核生頸邊  
又遇風寒所折遂不消不潰名爲惡核也

捺瘡候

人無問男女大小有稟性不耐捺者見捺及新捺  
器便着捺毒令頭面身體腫起隱胗色赤生瘡痒

痛是也

癰瘡候

六腑不和寒氣客於皮膚寒搏於血則壅遏不通  
稽留於經絡之間結腫頭成癰其狀腫上皮薄而  
澤是也熱氣乘之執勝於寒則肉血腐敗化爲膿  
膿潰之後其瘡不瘥故曰癰瘡

腸癰候

腸癰之狀小腸微強而痛是也由寒熱氣搏於腸  
間血氣否結所生也

齇候

腫結長一寸至二寸名之爲癰亦如癰熱痛久則膿潰捻膿血盡便瘡亦是風寒之氣客於皮膚血氣壅結所成凡癰竊捻膿血不盡而瘡口便合其惡汁在裏雖瘡終能更發變成漏也

疽候

五臟不調則生疽亦是寒氣滲皮膚折於血氣血氣不調不通結聚所成大體與癰相似所可爲異其上如牛領之皮而硬是也癰則浮淺疽則深也至於變敗膿潰重於癰也傷骨爛筋遂至於死

疽瘡候

此疽瘡者非癰疽也是癰之類世謂之癰疽多發於指節脚脛間相對生作細瘡瀉子而小而細孔瘡裏有蟲痒痛搔之有黃汁出隨瘡隨發也

瘦候

寒熱邪氣客於經絡使血氣不潤初生作細癩癧或如梅李核大或如箭乾或圓或長者至五六分不過一寸或一或兩三相連時發寒熱仍膿血不止謂之漏也是皆五臟六腑之氣不和致血氣不足不受寒熱邪氣然瘦者有鼠瘦蟻蝨瘦蚯蚓瘦蟻蝨等瘦以其於當病名處說之也

癩候

癩者風濕搏於血氣所成多著手足節腕間而然搔之痒痛浸淫生長呼謂之癩以其瘡有細蟲如癩蟲故也

疥候

疥瘡多生手足指間染漸生至於身體痒有膿汁按九蟲論云蟻蟲多所變化亦變作疥其瘡裏有細蟲甚難見小兒多因乳養之人病疥而染着小兒也

癬候

癬病由風邪與血氣相搏於皮膚之間不散變生隱軫軫上如粟粒大作匡郭或邪或圓浸淫長大痒痛搔之有汁名之爲癬小兒面上癬皮如甲錯起乾燥謂之乳癬善兒飲乳乳汁漬汚兒面變生此仍以乳汁洗之便瘥

赤疵候

小兒有血氣不和肌肉變生赤色染漸長大無定或如錢大或闊三數寸是也

臍瘡候

臍瘡由初生斷臍洗浴不即拭燥濕氣在臍中因

解脫遇風風濕相搏故臍瘡久不瘥也臍瘡不瘥風氣入傷經脉則變爲癩也

蟲胞候

小兒初生頭即患瘡乃至徧身其瘡有蟲故因名蟲胞也

口瘡候

小兒口瘡由血氣盛薰將養過温心有客熱熏上佳冷口生瘡也

鵝口候

小兒初生口裏白屑起乃至舌上生瘡如鵝口裏

世謂之鵝口此由在胎時受穀氣盛心脾熱氣熏發於口故也

鷺口生瘡候

此由脾胃有客熱熱氣熏發於口兩吻生瘡其瘡白色如燕子之吻故名爲鷺口瘡也

口下黃肥瘡候

小兒有涎唾多者其汁流溢浸漬於頤生瘡黃汁出浸淫肥爛挾熱者瘡汁則多也

舌上瘡候

心候於舌若心臟有熱則舌上生瘡也

舌腫候

心候舌脾之絡脉出舌下心脾俱熱氣發於口故舌腫也

噤候

小兒初生口裏忽結聚生於舌上如黍粟大令兒不能取乳名之曰噤此由在胎時熱入兒臟心氣偏受熱故也

東爛瘡候

小兒冬月爲寒氣傷於肌膚搏於血氣血氣壅滯因即生瘡其瘡亦焮腫而難瘡乃至皮肉爛謂之

爲凍爛瘡也

金瘡候

小兒爲金刃所傷謂之金瘡若傷於經脉則血出不止乃至悶頓若傷於諸臟俞募亦不可治自餘腹破腸出頭碎腦露並亦難治其傷於肌肉淺則成瘡終不慮死而金瘡得風則變瘡

卒驚瘡候

此由金瘡未瘡忽爲外物所觸及大啼呼謂爲驚瘡也凡瘡驚則更血出也

月食瘡候

小兒耳鼻口間生瘡世謂之月食瘡隨月生死因以爲名也世云小兒見月初生以手指指之則令耳下生瘡故呼爲月食瘡也

耳瘡候

瘡生於小兒兩耳時瘡時發亦有膿汁此是風濕搏於血氣所生世亦呼之爲月食瘡也

浸淫瘡候

小兒五臟有熱熏發皮膚外爲風濕所折濕熱相搏身體其瘡初出甚小後有膿汁浸淫漸大故謂之浸淫瘡也