



08757

序林並致書二冊未之見也

國朝
大清
高宗
乾隆
二十
年
庚
子
秋
八
月
廿
九
日
奉
旨
鑒
定
欽
此

青玉先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯冤事

尋得白當時義聲動天下馬交甬義士傅比之裴瑜魏

劭國變後隱居崛岫山中四方仰望聿采已未鴻詞之

薦先生堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傅山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣

中書聽其回籍蓋其高尚之志已久爲矣且夫醫亦回

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已

序

一
海山仙館叢書

細哉字爲六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以

晦迹而逃名者也而名即隨之抑可奇矣且夫醫亦何

可易言自後漢張仲景創立方書以來幾二千年專門

名家罕有窮其奧者先生以餘事及之遽通乎神余讀

兼濟堂文集並觚臙諸書記先生軼事其診疾也微而

臧其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔

人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生既擅

高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著

女科並產後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙

西適世兄王奎章來省試具道李子緝中賢至丙戌冬
果寄貲命付劄劄甚盛德事也故樂爲序而行之並述
先生生平大節及

聖朝廣大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月
丹崖張鳳翔題

序

海山仙館叢書



聖朝

廣大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月

丹崖張鳳翔題

先生生平大節及

果寄貲命付劄劄甚盛德事也故樂爲序而行之並述

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如拆舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何爲而刻乎此書爲傅青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰

序

一
海山仙館叢書

極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手卽愈此書則不然其方專爲女科而設其症則爲婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫徹靈素能收十全之效者不數數覩讀徵君此書談症不落古人

女科上卷目錄 共三十八條三十
九症四十一方

帶下 完帶湯

白帶 完帶湯

青帶 加減逍遙散

黃帶 易黃湯

黑帶 利火湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

女科上 目錄

年老血崩 加減當歸補血湯

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海太熱血崩 清海丸

鬼胎

婦人鬼胎 蕩鬼湯 紅花霹靂散

室女鬼胎 蕩邪散 調正湯

調經

經水先期

水火太旺清經散

火旺水虧兩地湯

經水後期

溫經攝血湯

經水前後無定期

定經湯

經水數月一行

助仙丹

年老經水復行

安老湯

經水忽來忽斷時疼時止

加味四物湯

經水未來腹先疼

宣鬱通經湯

行經後小腹疼痛

調肝湯

女科上

目錄

經前腹疼吐血

順經湯

經水將來臍下先疼痛

溫臍化濕湯

經水過多

加減四物湯

經前先洩水

健固湯

經前大便血

順經兩安湯

年未老經水斷

益經湯

種子

身瘦不孕

養精種玉湯

胸滿不思食不孕

并提湯

下部冰冷不受孕 溫胞飲

胸滿少食不受孕 溫土毓麟湯

少腹急迫不受孕 寬帶湯

嫉妬不孕 開鬱種玉湯

肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕 升帶湯

便澀腹脹足浮腫不受孕 化水種子湯

女科上

目錄

三

海山仙館叢書

黃連解毒湯不受孕 清熱解毒

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰膝不受孕 加味補中益氣湯

少腹急迫不受孕 寬帶湯

胸滿少食不受孕 溫土毓麟湯

下部冰冷不受孕 溫胞飲

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

女科上卷 欽定中興藥錄 自長觀錄 天土觀藥 而濕

河醫出 欽定中興藥錄 陽曲傅 山青主 手著 婦

白帶下 一 婦 白帶 之 由 創 門 直 下 於 日 禁 而 不

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脉不能約束而有

此病故以名之蓋帶脉通於任督任督病而帶脉始病

帶脉者所以約束胞胎之系也帶脉無力則難以提繫

必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然

而帶脉之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲

酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化

女科上 帶下

海山仙館叢書

宜藥參方見
必經水過期
少腹急迫宜
取宜帶湯餘
宜類參方見
婦科一門最
屬難治不難
於用方難於
辨症也五帶

症辨之極明
立方極善倘
用之不效者
必其人經水
不調須於調
經種子二門
參酌治之無
不見效即如
白帶症倘服
藥不效其人
必經水過期
少腹急迫宜
取宜帶湯餘
宜類參方見
三十三

經水而反變為帶病矣故病帶者惟尼僧寡婦出嫁之
女多有之而在室女則少也况加以脾氣之虛肝氣之
鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人
有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢
者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則
脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血
以為經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不
可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風
木不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕

氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白木一兩 土炒 山藥一兩 炒 人參二錢 白芍五錢 酒炒

車前子三錢 酒炒 蒼朮三錢 製 甘草一錢 陳皮五分

黑芥穗五分 柴胡六分

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

女科上 帶下

二 海山仙館叢書

此方本之... 補脾... 胃... 氣... 消... 自... 無... 白... 帶... 之... 患... 矣... 方... 用... 完... 帶... 湯...
白木土炒 山藥炒 人參 白芍酒炒
車前子酒炒 蒼朮製 甘草 陳皮
黑芥穗 柴胡
水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

青帶下二

婦人有帶下而色青者甚則綠如菘豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木木色屬青帶下流如菘豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成青帶之症不知水為肝木之所喜而濕實肝木之所惡以濕為土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脉遂從陰器而

女科上

帶下

三

海山仙館帶書

脾土喜燥而惡濕土病濕則木必乘之木又為濕土之氣所侮故肝亦病道遙散減去當歸妙極

出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓五錢 白芍酒炒五錢 甘草生用五錢 柴胡一錢 陳皮一錢 茵陳三錢

梔子三錢 炒

水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱也鬱

則必逆道遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解
則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱
肝氣得清而青絲之帶又何自來此方之所以奇而
效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問
安有止帶之日哉

女科上

帶下

四

海山仙館叢書

安赤丸帶之日哉

效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問

安赤丸帶之日哉

效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問

安赤丸帶之日哉

黃帶下

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汁其氣腥穢所謂

黃帶是也夫黃帶乃任脉之濕熱也任脉本不能容水

濕氣安得而入而化為黃帶乎不知帶脉橫生通於任

脉任脉直上走於唇齒唇齒之間原有不斷之泉下貫

於任脉以化精使任脉無熱氣之繞則口中之津液盡

化為精以入於腎矣惟有熱邪存於下焦之間則津液

不能化精而反化濕也夫濕者土之氣實水之侵熱者

火之氣實木之生水色本黑火色本紅今濕與熱合欲

化紅而不能欲返黑而不得煎熬成汁因變為黃色矣

此乃不從水火之化而從濕化也所以世之人有以黃

帶為脾之濕熱單去治脾而不得痊者是不知真水真

火合成丹邪元邪繞於任脉胞胎之間而化此黔色也

單治脾何能痊乎法宜補任脉之虛而清腎火之炎則

庶幾矣方用易黃湯

山藥一兩 芡實一兩 黃栢二錢 鹽 車前子一錢

白果十枚 炒 水炒 酒炒

水煎連服四劑無不全愈此不特治黃帶方也凡有

丹邪元邪四字未晰擬易以真水真火為濕熱之氣所侵繞於任脉云云較無語病然原書究不可輕改姑仍之

凡帶症多係濕初病無

女科上

帶下

五海山仙館叢書

熟復補脾土
 兼理衝任之
 氣其病自愈
 若濕久生熱
 必得清腎火
 而濕始有去
 路方用黃柏
 庫前子妙

帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋山藥
 芡實專補任脉之虛又能利水加白果引入任脉之
 中更爲便捷所以奏功之速也至於用黃柏清腎中
 之火也腎與任脉相通以相濟解腎中之火即解任
 脉之熱矣

女科上

帶下

六

海山仙館叢書



祖傳熱症

兼補脾土
 兼理衝任
 兼清腎火
 兼利白果
 兼入任脉
 兼清濕熱
 兼解熱毒
 兼化腐生肌
 兼止痛消腫
 兼祛風除濕
 兼活血通絡
 兼化痰止咳
 兼消食化積
 兼開胃健脾
 兼養血安神
 兼潤肺止咳
 兼清心火
 兼通大便
 兼利小便
 兼止渴
 兼生津
 兼止汗
 兼止瀉
 兼止嘔
 兼止吐
 兼止喘
 兼止咳
 兼止驚
 兼止癇
 兼止疳
 兼止痢
 兼止泄
 兼止痢
 兼止泄
 兼止痢
 兼止泄

此方專治帶下之症，無論赤白，服之立見奇效。其藥性平和，不寒不燥，誠為女科之聖藥也。凡患此症者，宜早服之，以免病入膏肓，後悔莫及。此方之妙，在於能補虛、清熱、利濕、化腐，兼而有之，誠為濟世之良方也。

黑帶下 四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅何以成黑謂為下寒之極或有之殊不知火極似水乃假象也其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺寬快此胃火太旺與命門膀胱三焦之火合而熬煎所以熬乾而變為炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之症不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成黑帶之症是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火為主火熱退而濕自除矣方用利火湯

大黃 三錢

白朮 五錢

茯苓 三錢

車前子 三錢

王不留行 三錢

黃連 三錢

梔子 三錢

知母 二錢

石膏 五錢

劉寄奴 三錢

水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑帶變為白三劑白亦少減再三劑全愈矣或謂此方過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法譬如救火之焚而

女科上

帶下

七

海山仙館叢書

病後當節

飲食戒辛熱

之物調養脾
土若恃有此
方病發即服
必傷元氣矣
極之

少為遷緩則火勢延燃不盡不止今用黃連石膏梔
子知母一派寒涼之品入於大黃之中則迅速掃除
而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急則濕與熱
俱無停住之機佐白朮以輔土茯苓以滲濕車前以
利水則火退水進便成既濟之卦矣

女科上

帶下

八

海山仙館叢書

肝水腫大腹水腫通氣滯之使矣

大腹水腫之類也

肝水腫大腹水腫通氣滯之使矣

肝水腫大腹水腫通氣滯之使矣

肝水腫大腹水腫通氣滯之使矣

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者似血非血淋瀝不斷所謂赤帶也夫赤帶亦濕病濕是土之氣宜見黃白之色今不見黃白而見赤者火熱故也火色赤故帶下亦赤耳惟是帶脉繫於腰臍之間近乎至陰之地不宜有火而今見火症豈其路通於命門而命門之火出而燒之耶不知帶脉通於腎而腎氣通於肝婦人憂思傷脾又加鬱怒傷肝於是肝經之鬱火內熾下尅脾土脾土不能運化致濕熱之氣蘊於帶脉之間而肝不藏血亦滲於帶脉

女科上

帶下

九海山仙館叢書

之內皆由脾氣受傷運化無力濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以似血非血之形象現於其色也其實血與濕不能兩分世人以赤帶屬之心火誤矣治法須清肝火而扶脾氣則庶幾可愈方用清肝止淋湯

白芍一兩 當歸一兩 生地五錢 阿膠三錢 白醋炒 酒洗 酒炒 麵炒

粉丹皮三錢 黃柏二錢 牛膝二錢 香附一錢 酒炒

紅棗十個 小黑豆一兩

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑不再

發此方但主補肝之血全不利脾之濕者以赤帶之

不用麥米苓
極妙此症若
誤認爲血漏
恐其久則成
崩用麥米苓
等藥治之多
不見效赤帶
反甚若年逾
四九癸水將
止或頻頻見

血崩昏暗

六

婦人有一時血崩兩目黑暗昏暈在地不省人事者人莫不謂火盛動血也然此火非實火乃虛火耳世人一見血崩往往用止澁之品雖亦能取效於一時但不用補陰之藥則虛火易於沖擊恐隨止隨發以致經年累月不能全愈者有之是止崩之藥不可獨用必須於補

陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

大熟地

一兩

白朮

一兩

黃芪

三錢

當歸

黑姜

二錢

人參

三錢

九蒸

土炒

焦

生用

酒洗

煎

女科上

血崩

上

海山仙館叢書

著血崩數日

血下數斗六

脈俱無鼻中

微微有息不

可遽服此方

恐氣將脫不

能受峻補也

有力者用遼

人參三五錢煎

成沖買炭

未一錢服之

待氣息微旺

然後服此方

仍加買炭

未一錢無不

見效無力者

水煎服一劑崩止十劑不再發倘畏藥味之重而減半則力薄而不能止方妙在全不去止血而惟補血又不止補血而更補氣非惟補氣而更補火蓋血崩而至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣以為護持若不急補其氣以生血而先補其血而遺氣則有形之血恐不能遽生而無形之氣必且至盡散此所以不先補血而先補氣也然單補氣則血又不易生單補血而不補火則血又必凝滯而不能隨氣而速生況黑薑引血歸經是補中又有收斂之妙所以

用無灰黃酒
 沖服眾炭末
 三錢服之待
 其氣接神清
 始可服此方
 人參以黨參
 代之臨服亦
 加貫眾炭末
 錢沖入

同補氣補血之藥並用之耳

女科上

血崩

三

海山仙館叢書



一錢沖入
 用無灰黃酒
 沖服眾炭末
 三錢服之待
 其氣接神清
 始可服此方
 人參以黨參
 代之臨服亦
 加貫眾炭末
 錢沖入

同補氣補血之藥並用之耳

年老血崩 七

亦有嬌婦年
老血崩者必
係氣冲血室
原方加杭芍
炭三錢貫衆
炭三錢極效

婦人有年老血崩者其症亦與前血崩昏暗者同人以
為老婦之虛耳誰知是不慎房幃之故乎夫婦人至五
十歲之外天癸匱乏原宜閉關守寨不宜出陣戰爭苟
或適興不過草草了事尙不至腎火大動倘興酣浪戰
亦如少年之好合鮮不血室大開崩決而墜矣方用加

減當歸補血湯

當歸一兩黃芪一兩三七根末三錢桑葉十四片

水煎服二劑而血少止四劑不再發然必須斷慾始

女科上 血崩 三 海山仙館叢書

除根若再犯色慾未有不重病者也夫補血湯乃氣
血兩補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉者
所以滋腎之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精既虧
用此方以止其暫時之漏實有奇功而不可責其永
遠之績者以補精之味尙少也服此四劑後再增入
白朮五錢熟地一兩山藥四錢麥冬三錢北五味一錢
服百劑則崩漏之根可盡除矣

真三錢
加三錢
加八錢
加八錢
加八錢
加八錢
加八錢
加八錢
加八錢
加八錢

平水血崩

婦人百平水血崩者其症水地血崩者皆同人以

妊娠宜避房事不避者縱幸不至崩往隨胎即不難養慎之戒

少婦血崩八

有少婦甫娠三月卽便血崩而胎亦隨隋人以爲挫閃受傷而致誰知是行房不慎之過哉夫少婦行房亦事之常耳何便血崩蓋因元氣衰弱事難兩顧一經行房洩精則妊娠無所依養遂致崩而且隋凡婦人之氣衰卽不耐久戰若貪歡久戰則必洩精太甚氣每不能攝夫血矣況氣弱而又娠再加以久戰內外之氣皆動而血又何能固哉其崩而隋也亦無怪其然也治法自當以補氣爲主而少佐以補血之品斯爲得之方用固氣

湯

女科上

血崩

古

海山仙館叢書

人參 一兩

白朮 五錢

土炒

大熟地 五錢

九蒸

當歸 三錢

酒洗

白茯苓 二錢

甘草 一錢

杜仲 三錢

炒黑

山萸肉 二錢

蒸

遠志 一錢

去心

五味子 十粒

炒

水煎服一劑而血止連服十劑全愈此方固氣而兼補血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡氣虛而崩漏者此方最可通治非僅治小產之崩其最妙者不去止血而止血之味含於補氣之中也

交感血出 九

欲種子者必待落紅後卽三十時辰兩日半也經來之時數足三十時辰便可入房一日男二日女三日男四日女五日男六日女七日男過七日卽不能受孕矣

婦人有一交合則流血不止者雖不至於血崩之甚而

終年累月不得愈未免血氣兩傷久則恐有血枯經閉

之憂此等之病成於經水正來之時貪歡交合精冲血

管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈何以久而

流紅不知血管最嬌嫩斷不可以精傷凡婦人受孕必

於血管已淨之時方保無虞倘經水正旺彼欲湧出而

精射之則欲出之血反退而縮入既不能受精而成胎

勢必至集精而化血交感之際淫氣觸動其舊日之精

女科上 血崩

五 海山仙館叢書

則兩相感召舊精欲出而血亦隨之而出治法須通其

胞胎之氣引舊日之集精外出而益之以補氣補精之

藥則血管之傷可以補完矣方用引精止血湯

人參 五錢

白木 一兩

茯苓 三錢

熟地 一兩

九蒸

山黃肉 五錢

黑薑 一錢

黃栢 五分

芥穗 三錢

車前子 三錢

酒炒

水煎連服四劑愈十劑不再發此方用參朮以補氣

用地黃以補精精氣既旺則血管流通加入茯苓車

前以利水與竅水利則血管亦利又加黃栢爲引直

入血管之中而引夙精出於血管之外芥穗引敗血
出於血管之內黑薑以止血管之口一方之中實有
調停曲折之妙故能祛舊病而除陳痼然必須慎房
幃三月破者始不至重傷而補者始不至重損否則
不過取目前之效耳其慎之哉宜寡慾

外科上

血崩

六

海山仙館叢書

不嚴規目而之效耳其

轉三日變音故不至重傷而補者始不至重損否則

隨會曲折之妙故能祛舊病而除陳痼然必須慎房

幃三月破者始不至重傷而補者始不至重損否則

入血管之中而引夙精出於血管之外芥穗引敗血

鬱結血崩十

婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐吞酸而血下崩者人皆以火治之時而效時而不效其故何也是不識為肝氣之鬱結也夫肝主藏血氣結而血亦結何以反至崩漏蓋肝之性急氣結則其急更甚更急則血不能藏故崩不免也治法宜以開鬱為主若徒開其鬱而不知平肝則肝氣大開肝火更熾而血亦不能止矣方用平肝開鬱止血湯

白芍

一兩醋炒

白朮

一兩土炒

當歸

一兩酒洗

丹皮

三錢

女科上

血崩

七

海山仙館叢書

此方入貫仲
炭三錢更妙

柴胡

一錢

三七根

三錢研末

生地

三錢酒炒

甘草

二錢

黑芥穗

二錢

水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除四劑血崩愈方中妙在白芍之平肝柴胡之開鬱白朮利腰臍則血無積住之虞荆芥通經絡則血有歸還之樂丹皮又清榮骨髓之熱生地復清臟腑之炎當歸三七於補血之中以行止血之法自然鬱結散而血崩止矣

欲人肯對其難口薄舌澀則血不流而血下崩者人

閃跌血崩 十一

婦人有升高墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者若以崩治非徒無益而又害之也蓋此症之狀必手按之而疼痛久之則面色萎黃形容枯槁乃是疼血作祟並非血崩可比倘不知解瘀而用補澁則瘀血內攻疼無止時反致新血不得生舊血無由化死不能悟豈不可傷哉治法須行血以去瘀活血以止痛則血自止而愈矣方用逐瘀止血湯

生地一兩 酒炒 大黃三錢 赤芍三錢 丹皮一錢

女科上 血崩

六 海山仙館叢書

凡跌打損傷致唾血嘔血皆宜如此治法若血聚胃中宜加川厚朴一錢半姜升炒

當歸尾五錢 枳壳五錢 龜版三錢 桃仁十粒 炒 炮炒研

水煎服一劑疼輕二劑疼止三劑血亦全止不必再服矣此方之妙妙於活血之中佐以下滯之品故逐瘀如掃而止血如神或疑跌閃升墜是由外而傷內雖不比內傷之重而既已血崩則內之所傷亦不為輕何以只治其瘀而不顧氣也殊不知跌閃升墜非由內傷以及外傷者可比蓋本實不撥去其標病可耳故曰急則治其標

血海太熱血崩 十二

凡血崩症最
宜絕慾避房
無奈少年人
彼此貪歡故
服藥往往不
效若三月後
崩止病愈而
房事仍無節
制病必復作
久則成勞極
受

婦人有每行人道經水即來一如血崩人以為胞胎有
傷觸之以動其血也誰知是子宮血海因太熱而不固
乎夫子宮即在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海
者衝脉也衝脉太寒而血即虧衝脉太熱而血即沸血
崩之為病正衝脉之太熱也然既由衝脉之熱則應常
崩而無有止時何以行人道而始來果與肝木無恙耶
夫脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房之時君相
二火寂然不動雖衝脉獨熱而血亦不至外馳及有人
道之感則子宮大開君相火動以熱招熱同氣相求翕
然齊動以鼓其精房血海泛濫有不能止遏之勢肝欲
藏之而不能脾欲攝之而不得故經水隨交感而至若
有聲應之捷是惟火之為病也治法必須滋陰降火以
清血海而和子宮則終身之病可半載而除矣然必絕
慾三月而後可方用清海丸

大熟地一斤 山萸十兩 山藥十兩 丹皮十兩

北五味二兩 麥冬肉十兩 白朮一斤 白芍一斤

龍骨二兩 地骨皮十兩 乾桑葉一斤 元參一斤

女科上

血崩

丸

海山仙館叢書

沙參 十兩 石斛 十兩

右十四味各爲細末合一處煉蜜丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方補陰而無浮動之慮縮血而無寒涼之苦日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼而血海自固倘不揣其本而齊其末徒以髮灰白礬黃連炭五焙子等藥末以治其幽隱之處山恐愈澁而愈流終必至於敗也可不慎與

女科上

血崩

三

海山仙館叢書

鬼胎

鬼祟之事
者弗道然城

市鄉曲往往
有是症不可
不察甚勿以
此言為荒唐
也

婦人有腹似懷妊終年不產甚至二三年不生者此鬼胎也其人必面色黃瘦肌膚消削腹大如斗厥所由來必素與鬼交或入神廟而興雲雨之思或遊山林而起交感之念皆能召祟成胎幸其人不淫蕩見祟而有驚惶遇合而生愧惡則鬼祟不能久戀一交媾即遠去然淫妖之氣已結於腹遂成鬼胎其先尚未覺迨後漸漸腹大經水不行內外相包一如懷胎之狀有似血臙之形其實是鬼胎而非臙也治法必須以逐穢為主然

女科上

鬼胎

三

海山仙館叢書

人至懷胎數年不產即非鬼胎亦必氣血衰微況此非真妊則邪氣必旺正不敵邪其虛弱之狀必有可掬焉可純用迅利之藥以祛蕩乎必於補中逐之為的也方用蕩鬼湯

人參 一兩 當歸 一兩 大黃 一兩 雷丸 三錢

川牛膝 三錢 紅花 三錢 丹皮 三錢 枳壳 一錢

厚朴 一錢 小桃仁 三十粒

水煎服一劑腹必大鳴可瀉惡物半桶再服一劑又瀉惡物而愈矣斷不可復用三劑也蓋雖補中用逐

未免迅利多用恐傷損元氣此方用雷丸以祛穢又
得大黃之掃除且佐以厚朴紅花桃仁等味皆善行
善攻之品何邪之尙能留腹中而不盡逐下也哉尤
妙在用參歸以補氣血則邪去而正不傷若單用雷
丸大黃以迅下之必有氣脫血崩之患矣倘或知是
鬼胎如室女寡婦輩邪氣雖盛而真氣未漓可用岐
天師新傳紅花霹靂散紅花半斤大黃五兩雷丸三兩水
煎服亦能下胎然未免太於迅利過傷氣血不若蕩
鬼湯之有益無損爲愈也在人臨症時斟酌而善用

之耳

女科上 鬼胎

三 海山仙館叢書

室女鬼胎 十四

女子有在家未嫁月經忽斷腹大如妊面色乍赤乍白六脉乍大乍小人以爲血結經閉也誰知是靈鬼憑身乎夫人之身正則諸邪不敢侵其身不正則諸邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而對面相狎或假托親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其始則驚詫爲奇遇而不肯告人其後則羞赧爲淫褻而不敢告人日久年深腹大如斗有如懷妊之狀一身之精血僅足以供腹中之邪則邪日旺而正日衰勢必至

女科上

鬼胎

海山仙館叢書

經閉而血枯後雖欲導其經而邪據其腹則經亦難通欲生其血而邪食其精則血實難長譬以爲胎而實非真胎又以爲瘕而非瘕病往往因循等待非因羞憤而亾其生卽成勞瘵而終不起至死不悟不重可悲哉治法似宜補正以祛邪然邪不先去補正亦無益也必須先祛邪而後補正斯爲得之方用蕩邪散

雷丸 六錢

桃仁 六十粒

當歸 一兩

丹皮 一兩

甘草 四錢

此方陰臨大

矣見有因此

病羞憤而蹈

於非命勞瘵

而喪於妙年

深爲可憫若

服此方不應

水煎服一劑必下惡物半桶再服調正湯治之

胃服桂香不
效會後宜調
養氣血節飲

食
肉桂去粗皮

一錢

麝香一錢

以上二味共

研細末開水

為九如桐子

大空心開水

下服後半日

時煎平胃散

一劑服之

蒼木三錢炒

厚朴二錢姜

廣皮一錢

枳實二錢

全當歸三錢

川芎酒洗

服後必下惡
物若不見下
惡物次日再
服平胃散不
用桂香

白朮 五錢 蒼朮 五錢 茯苓 三錢 陳皮 一錢

貝母 一錢 薏米 五錢

水煎連服四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣前方
蕩邪後方補正實有次第或疑身懷鬼胎必大傷其
血所以經閉今既墜其鬼胎矣自當大補其血乃不
補血而反補胃氣何故蓋鬼胎中人其正氣大虛可
知氣虛則血必不能驟生欲補血必先補氣是補氣
而血自然生也用二朮以補胃陽陽氣旺則陰氣難
犯尤善後之妙法也倘重用補陰之品則以陰招陰
吾恐鬼胎雖下而鬼氣未必不再侵故必以補陽為
上策而血自隨氣而生也

女科上 鬼胎

海山仙館叢書

血氣以滋閉令期至其異故云白當大補其血以
蕪派對式命五度傳太流如狼其難與補心大對其
木煎或煎四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣而式
貝母 一錢 薏米 五錢
白朮 五錢 蒼朮 五錢 茯苓 三錢 陳皮 一錢

調經經水先期 十五

婦科調經尤難蓋經調則無病不調則百病叢生治法宜詳察其病原細審其所以不調之故然後用藥始能見效此書雖有先期後期先後無定期之分然須與種子帶下門參看臨症時自有進

見

婦人有先期經來者其經甚多人以為血熱之極也誰

知是腎中水火太旺乎夫火太旺則血熱水太旺則血

多此有餘之病非不足之症也似宜不藥有喜但過於

有餘則子宮太熱亦難受孕更恐有燥乾男精之慮過

者損之謂非既濟之道乎然而火不可任其有餘而水

斷不可使之不足治之法但少清其熱不必洩其水也

方用清經散

丹皮 三錢

地骨皮 五錢

白芍 三錢

酒炒 大熟地 三錢

九蒸

女科上

調經

三

海山仙館叢書

青蒿 二錢

白茯苓 一錢

黃柏 五分

鹽水浸炒

水煎服二劑而火自平此方雖是清火之品然仍是

滋水之味火洩而水不與俱洩損而益也

又有先期經來只一二點者人以為血熱之極也誰知

腎中火旺而陰水虧乎夫同是先期之來何以分虛實

之異蓋婦人之經最難調苟不分別細微用藥鮮克有

效先期者火氣之冲多寡者水氣之驗故先期而來多

者火熱而水有餘也先期而來少者火熱而水不足也

倘一見先期之來俱以為有餘之熱但洩火而不補水

或水火兩洩之有不更增其病者乎治之法不必洩火
只專補水水既足而火自消矣亦既濟之道也方用兩
地湯

大生地 一兩 酒炒 元參 一兩 白芍藥 五錢 酒炒 麥冬肉 五錢

地骨皮 三錢 阿膠 三錢

水煎服四劑而經調矣此方之用地骨生地能清骨
中之熱骨中之熱由於腎經之熱清其骨髓則腎氣
自清而又不損傷胃氣此治之巧也况所用諸藥又
純是補水之味水盛而火自平理也此條與上條參

女科上 調經

美 海山仙館叢書

觀斷無誤治先期之病矣

自前而入不致輸胃氣也... 中六... 水... 壯... 大... 只... 亦...

經水後期 十六

婦人有經水後期而來多者人以為血虛之病也誰知非血虛乎蓋後期之多少實有不同不可執一而論蓋後期而來少血寒而不足後期而來多血寒而有餘夫經本於腎而其流五臟六腑之血皆歸之故經來而諸經之血盡來附益以經水行而門啟不違迅闔諸經之血乘其隙而皆出也但血既出矣則成不足治法宜於補中溫散之不得曰後期者俱不足也方用溫經攝血湯

女科上 調經

三毛 海山仙館叢書

大熟地

一兩九蒸

白芍

一兩酒炒

川芎

五錢酒洗

白朮

五錢土炒

柴胡

五分

五味子

三分

肉桂

五分去粗研

續斷

一錢

水煎服三劑而經調矣此方大補肝腎脾之精與血加肉桂以祛其寒柴胡以解其鬱是補中有散而散不耗氣補中有洩而洩不損陰所以補之有益而溫之收功此調經之妙藥也而攝血之仙丹也凡經來後期者俱可用倘元氣不足加人參一二錢亦可

以上調經三
條辨論明晰

立方微妙但
恐臨時或有
外感內傷不
能見效有外
感者宜加蘇
葉一錢有內
傷者宜加神
曲二錢炒有
因肉食積滯
者再加東山
查肉二錢臨
症須酌用之
若肝氣鬱抑
又當以逍遙
散為主有熱
加梔炭丹皮
即加味逍遙
散

婦人有經來斷續或前或後無定期人以為氣血之虛也誰知是肝氣之鬱結乎夫經水出諸腎而肝為腎之子肝鬱則腎亦鬱矣腎鬱而氣必不宜前後之或斷或續正腎之或通或閉耳或曰肝氣鬱而腎氣不應未必至於如此殊不知子母關切子病而母必有顧復之情肝鬱而腎不無繾綣之誼肝氣之或開或閉即腎氣之或去或留相因而致又何疑焉治法宜舒肝之鬱即開腎之鬱也肝腎之鬱既開而經水自有一定之期矣方

用定經湯

女科上 調經

天 海山仙館叢書

兔絲子一兩 酒炒 白芍一兩 酒炒 當歸一兩 酒洗 大熟地五錢 九蒸
山藥五錢 炒 白茯苓三錢 芥穗二錢 炒黑 柴胡五分
水煎服二劑而經水淨四劑而經期定矣此方舒肝腎之氣非通經之藥也補肝腎之精非利水之品也肝腎之氣舒而精通肝腎之精旺而水利不治之治正妙於治也

婦人有數月一行經者每以為常亦無或先或後之異

亦無或多或少之殊人莫不以為異而不知非異也蓋

無病之人氣血兩不虧損耳夫氣血既不虧損何以數

月而一行經也婦人之中亦有天生仙骨者經水必一

季一行蓋以季為數而不以月為盈虛也真氣內藏則

坎中之真陽不損倘加以煉形之法一年之內便易飛

騰無如世人不知見經水不應月來誤認為病妄用藥

餌本無病而治之成病是治反不知其不治也山聞異

善見婦人一年一行經身健無恙姪後反月月俱

女科上 調經

元 海山仙館叢書

行經或至五月至七月經

止不等有男皆成人咸以

為異或亦仙骨之所致乎

斯造化令人不測耶

人之教特為闡揚使世人見此等行經不必妄行治療萬勿疑為氣血之不足而輕一試也雖然天生仙骨之婦人世固不少而嗜慾損天之人亦復甚多又不可不立一療救之方以輔之方名助仙丹

白茯苓 五錢 陳皮 五錢 白朮 三錢 白芍 三錢

山藥 三錢 兔絲子 二錢 杜仲 一錢 甘草 一錢

河水煎服四劑而仍如其舊不可再服也此方平補

之中實有妙理健脾益腎而不滯解鬱滯痰而不洩

不損天然之氣血便是調經之大法何得用他藥以

冀迪經哉

女科上

調經

三

海山仙館叢書



冀迪經哉

年老經水復行 十九

婦人有年五十外或六七十歲忽然行經者或下紫血塊或如紅血淋人或謂老婦行經是還少之象誰知是血崩之漸乎夫婦人至七七之外天癸已竭又不服濟陰補陽之藥如何能精滿化經一如少婦然經不宜行而行者乃肝不藏脾不統之故也非精過洩而動命門之火即氣鬱甚而發龍雷之炎二火交發而血乃奔矣有似行經而實非經也此等之症非大補肝脾之氣與血而血安能驟止方用安老湯

女科上 調經

海山仙館叢書

加貫仲炭一錢
研細末以藥沖服并妙

人參 一兩 黃芪 一兩 大熟地 一兩 白朮 五錢
生用 九蒸 土炒

當歸 五錢 山萸 五錢 阿膠 一錢 黑芥穗 一錢
酒洗 蒸 蛤粉炒

甘草 一錢 香附 五分 木耳炭 一錢
酒炒

水煎服一劑減二劑尤減四劑全減十劑愈此方補益肝脾之氣氣足自能生血而攝血尤妙大補腎水水足而肝氣自舒肝舒而脾自得養肝藏之而脾統之又安有洩漏者又何慮其血崩哉

經水忽來忽斷時疼時止 二十

婦人有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者人以為血之凝也誰知是肝氣不舒乎夫肝屬木而藏血最惡風寒婦人當行經之際腠理大開適逢風之吹寒之襲則肝氣為之閉塞而經水之道路亦隨之而俱閉由是腠理經絡各皆不宣而寒熱之作由是而起其氣行於陽分則生熱其氣行於陰分則生寒然此猶感之輕者也倘外感之風寒更甚則內應之熱氣益深往往有熱入血室而變為如狂之症一似遇鬼之狀者若但往來寒熱是風寒未甚而熱未深耳治法宜補肝中之血通其鬱而散其風則病隨手而效所謂治風先治血血和風自滅此其一也方用加味四物湯

女科上 調經

三 海山仙館叢書

加荆芥穗炒
黑一錢尤妙

大熟地 一兩 五錢
白芍 五錢 三錢
當歸 五錢 三錢
川芎 三錢 一錢

白朮 五錢 一錢
元胡 一錢 一錢
甘草 一錢

柴胡 一錢

水煎服此方用四物以滋脾胃之陰血用柴胡白芍丹皮以宣肝經之風鬱用甘草白朮元胡以利腰膈而和腹疼入於表裏之間通乎經絡之內用之得宜

自奏功如響也

女科上

調經

三

海山仙館叢書



上海圖書館藏

經水未來腹先疼 二十一

婦人有經前腹痛數日而後經水行者其經來多是紫黑塊人以爲寒極而然也誰知是熱極而火不化乎夫肝屬木其中有火舒則通暢鬱則不揚經欲行而肝不應則抑拂其氣而疼生然經滿則不能內藏而肝中之鬱火焚燒內逼經出則其火亦因之而怒洩其紫黑者水火兩戰之象也其成塊者火煎成形之狀也經失其爲經者正鬱火內奪其權耳治法似宜大洩肝中之火然洩肝之火而不解肝之鬱則熱之標可去而熱之本未除也其何能益方用宣鬱通經湯

女科上 調經

上海山仙館叢書

白芍 五錢 當歸 五錢 丹皮 五錢 山梔子 三錢
酒炒 酒洗 炒

白芥子 二錢 柴胡 一錢 香附 一錢 川鬱金 一錢
炒 研 酒炒 醋炒

黃芩 一錢 生甘草 一錢

水煎連服四劑下月斷不先腹疼而後行經矣此方補肝之血而解肝之鬱利肝之氣而降肝之火所以奏功之速

經水未來腹先疼

行經後少腹疼痛 二十二

婦人有少腹疼於行經之後者人以爲氣血之虛也誰知是腎氣之涸乎夫經水者乃天一之真水也滿則溢而虛則閉亦其常耳何以虛能作疼哉蓋腎水一虛則水不能生木而肝木必尅脾土木土相爭則氣必逆故兩作疼治法必須以舒肝氣爲主而益之以補腎之味則水足而肝氣益安肝氣安而逆氣自順又何疼痛之有哉方用調肝湯

經前經後腹痛二方極妙

山藥五錢炒

阿膠三錢白麪炒

當歸三錢酒洗

白芍三錢酒炒

女科上

調經

三五

海山仙館叢書

不可加減若有別症亦宜此方爲主另加藥味治之原方不可減去一味

山黃肉三錢

蒸熟

巴戟一錢

鹽水浸

甘草一錢

水煎服此方平調肝氣既能轉逆氣又善止鬱疼經後之症以此方調理最佳不特治經後腹痛之症也

婦人有經未行之前一二日忽然腹疼而吐血人以爲火熱之極也誰知是肝氣之逆乎夫肝之性最急宜順而不宜逆順則氣安逆則氣動血隨氣爲行止氣安則血安氣動則血動亦勿怪其然也或謂經逆在腎不在肝何以隨血妄行竟至從口上出也是肝不藏血之故乎抑腎不納氣而然乎殊不知少陰之火急如奔馬得肝火直冲而上其勢最捷反經而爲血亦至便也正不必肝不藏血始成吐血之症但此等吐血與各經之吐血有不同者蓋各經之吐血由內傷而成經逆而吐血乃內溢而激之使然也其症有絕異而其氣逆則一也治法似宜平肝以順氣而不必益精以補腎矣雖然經逆而吐血雖不大損夫血而反覆顛倒未免太傷腎氣必須於補腎之中用順氣之法始爲得當方用順經湯

女科上 調經

海山仙館叢書

婦人年壯吐

血往往有之

不可作勞症

治者認爲勞

症必至肝氣

愈逆非勞反

成勞矣方加

當歸 五錢

酒洗

大熟地 五錢

九蒸

白芍 二錢

酒炒

丹皮 五錢

白茯苓 三錢

沙參 三錢

黑芥穗 三錢

水煎服一劑而吐血止二劑而經順十劑不再發此方於補腎調經之中而用引血歸經之品是和血之

茜草一錢懷
牛膝八分尤
妙

法實寓順氣之法也肝不逆而腎氣自順腎氣既順
又何經逆之有哉

女科上

調經

三

海山仙館叢書



此書之內容
或可資參考
或可資參考
或可資參考

婦人有經水將來三五日前而臍下作疼狀如刀刺者或寒熱交作所下如黑豆汁人莫不以為血熱之極誰知是下焦寒濕相爭之故乎夫寒濕乃邪氣也婦人有衝任之脉居於下焦衝為血海任主胞胎為血室均喜正氣相通最惡邪氣相犯經水由二經而外出而寒濕滿二經而內亂兩相爭而作疼痛邪愈盛而正氣日衰寒氣生濁而下如豆汁之黑者見北方寒水之象也治法利其濕而溫其寒使衝任無邪氣之亂臍下自無疼痛之疾矣方用溫臍化濕湯

女科上 調經 吳 海山仙館叢書

衝任之氣宜通不宜降故化濕不用蒼朮薏仁餘宜類參

白朮一兩 土炒 白茯苓三錢 炒 山藥五錢 炒 巴戟肉五錢 鹽水浸

扁豆炒搗 三錢 白菓十枚 搗碎 建蓮子三十枚 不去心

水煎服然必須經未來前十日服之四劑而邪氣去經水調兼可種子此方君白朮以利腰臍之氣用巴戟白果以通任脉扁豆山藥蓮子以衛衝脉所以寒濕掃除而經水自調可受妊矣倘疑腹疼為熱疾妄用寒涼則衝任虛冷血海變為冰海血室反成冰室無論難於生育而疼痛之止又安有日哉

婦人有經水過多行後復行面色痿黃身體倦怠而困
乏愈甚者人以爲血熱有餘之故誰知是血虛而不歸
經乎夫血旺始經多血虛當經縮今日血虛而反經多
是何言與殊不知血歸於經雖旺而經亦不多血不歸
經雖衰而經亦不少世之人見經水過多謂是血之旺
也此治之所以多錯耳倘經多果是血旺自是健壯之
體須當一行卽止精力如常何至一行後而再行而困
乏無力耶惟經多是血之虛故再行而不勝其困乏血

女科上 調經

海山仙館叢書

損精散骨中髓空所以不能色華於面也治法宜大補
血而引之歸經又安有行後復行之病哉方用加減四
物湯

大熟地一兩 白芍三錢 當歸五錢 川芎二錢

白朮五錢 黑芥穗三錢 山萸三錢 續斷一錢

甘草一錢

荆芥穗炭能
引血歸經方
妙極不可輕
易加減

水煎服四劑而血歸經矣十劑之後加人參三錢再
服十劑下月行經適可而止矣夫四物湯乃補血之
神品加白朮荆芥補中有利加山萸續斷止中有行

加甘草以調和諸品使之各得其宜所以血足而歸
經歸經而血自靜矣

女科上

調經

海山仙館叢書



辨燥熱而血自靜矣

此甘... 各得... 血足而...

經前洩水 二十六

婦人有經未來之前洩水三日而後行經者人以爲血旺之故誰知是脾氣之虛乎夫脾統血脾虛則不能攝血矣且脾屬濕土脾虛則土不實土不實而濕更甚所以經水將動而脾先不固脾經所統之血欲流注於血海而濕氣乘之所以先洩水而後行經也調經之法不在先治其水而在先治其血抑不在先治其血而在先補其氣蓋氣旺而血自能生抑氣旺而濕自能除且氣旺而經自能調矣方用健固湯

女科上 調經

望 海山仙館叢書

人參 五錢 白茯苓 三錢 白朮 一兩 巴戟 五錢
土炒 鹽水浸

薏苡仁 三錢
炒

水煎連服十劑經前不洩水矣此方補脾氣以固脾血則血攝於氣之中脾氣日盛自能運化其濕濕既化爲烏有自然經水調和又何至經前洩水哉

與胖人不穿
參看自得立
方之妙

婦人有行經之前十日大便先出血者入以為血崩之症誰知是經流於大腸乎夫大腸與行經之路各有分別何以能入乎其中不知胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無所歸而心腎二經之氣不來照攝聽其自便所以血不走小腸而走大腸也治法若單止大腸之血則愈止而愈多若擊動三焦之氣則更拂亂而不可止蓋經水之妄行原因心腎之不交今不使水火之既濟而徒治其胞胎則胞胎之氣無所歸

舒久憂傷脾腫傷不能統血又當分別治之方用補血湯

嫩黃芪二兩 歸身四錢 杭芍炭三錢 焦白朮五錢 杜仲炒二錢 荆芥炭二錢 姜炭二錢 引用貫仲炭 一錢沖入服 之四劑必獲 愈愈後減半 再服二劑

再服二劑

而血安有歸經之日故必大補其心與腎使心腎之氣交而胞胎之氣自不散則大腸之血自不妄行而經自順矣方用順經兩安湯

女科上 調經

聖 海山仙館叢書

當歸五錢 白芍五錢 大熟地五錢 山萸肉二錢 酒洗 酒炒 九蒸 蒸 人參三錢 白朮五錢 麥冬五錢 黑芥穗二錢 土炒 去心 巴戟肉一錢 鹽水浸 升麻四分 水煎服二劑大腸血止而經從前陰出矣三劑經止而兼可受妊矣此方乃大補心肝腎三經之藥全不去顧胞胎而胞胎有所歸者以心腎之氣交也蓋心

經入大腸必
當行經之際
而大便下血
也初病血雖
錯行精神必
照常者脾不
統血精神即
不能照常矣
用者辨之

腎虛則其氣兩分心腎足則其氣兩合心與腎不離
而胞胎之氣聽命於二經之攝又安有妄動之形哉
然則心腎不交補心腎可也又何兼補夫肝木耶不
知肝乃腎之子心之母也補肝則肝氣往來於心腎
之間自然上引心而下入於腎下引腎而上入於心
不啻介紹之助也此使心腎相交之一大法門不特
調經而然也學者其深思諸

女科上

調經

星

海山仙館叢書

經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調
經水不調

夫調經之法
必先求其
病之所在
而後治之
不可不察
也
夫調經之法
必先求其
病之所在
而後治之
不可不察
也
夫調經之法
必先求其
病之所在
而後治之
不可不察
也

經云女子七七而天癸絕有年未至七七而經水先斷者人以爲血枯經閉也誰知是心肝脾之氣鬱乎使其血枯安能久延於人世醫見其經水不行妄謂之血枯耳其實非血之枯乃經之閉也且經原非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸世人以經爲血此千古之誤牢不可破倘果是血何不名之曰血水而曰經水乎古昔聖賢創呼經水之名者原以水出於腎乃癸

女科上

調經

渴

海山仙館叢書

干之化故以名之無如世人沿襲而不深思其旨皆以血視之然則經水早斷似乎腎水衰涸吾以爲心肝脾氣之鬱者蓋以腎水之生原不由於心肝脾而腎水之化實有關於心肝脾使水位之下無土氣以承之則水濫滅火腎氣不能化火位之下無水氣以承之則火炎鑠金腎氣無所生木位之下無金氣以承之則木妄破土腎氣無以成倘心肝脾有一經之鬱則其氣不能入於腎中腎之氣即鬱而不宣矣況心肝脾俱鬱即腎氣真足而無虧尙有茹而難吐之勢矧腎氣本虛又何能

盈滿而化經水外洩即經曰亢則害此之謂也此經之所以閉塞有似乎血枯而實非血枯耳治法必須散心肝脾之鬱而大補其腎水仍大補其心肝脾之氣則精溢而經水自通矣方用益經湯

善醫者祇用

大熟地

一兩

白朮

一兩

山藥

五錢

當歸

五錢

酒洗

品而大病盡

白芍

三錢

生棗仁

三錢

丹皮

二錢

沙參

三錢

酒洗

除不善醫者

柴胡

一錢

杜仲

一錢

人參

二錢

炒黑

惟無效及致

水煎連服八劑而經通矣服三十劑而經不再閉兼

用藥雜亂假

可受孕此方心肝脾腎四經同治藥也妙在補以通

文科上

調經

聖

海山仙館叢書

之散以開之倘徒補則鬱不開而生火徒散則氣益衰而耗精設或用攻堅之劑辛熱之品則非徒無益而又害之矣

此方之妙在於心肝脾腎四經同治，藥性平和，不寒不燥，誠為調經之聖藥也。凡患經閉者，服此方後，經水自通，且能受孕，其效如神。此方之妙，在於補以通，通以補，二者相輔相成，不可偏廢。若徒用攻堅之劑，則傷氣損精，反致經閉加重。若徒用辛熱之品，則生火動血，亦非所宜。此方之妙，在於藥性平和，不寒不燥，誠為調經之聖藥也。

婦人有瘦怯身軀久不孕育一交男子即臥病終朝人以為氣虛之故誰知是血虛之故乎或謂血藏於肝精涵於腎交感乃洩腎之精與血虛何與殊不知肝氣不開則精不能洩腎精既洩則肝氣亦不能舒以腎為肝之母母既洩精不能分潤以養其子則木燥乏水而火且暗動以鑠精則腎愈虛矣况瘦人多火而又洩其精則水益少而火益熾水雖制火而腎精空乏無力以濟成火在水上之卦所以倦怠而臥也此等之婦偏易動

女科上 種子

吳海山館叢書

火然此火因貪慾而出於肝木之中又是虛燥之火絕非真火也且不交合則已交合又偏易走洩此陰虛火旺不能受孕即偶爾受孕必致逼乾男子之精隨種而隨消者有之治法必須大補腎水而平肝木水旺則血旺血旺則火消便成水在火上之卦方用養精種玉湯

大熟地

一兩

當歸

五錢

白芍

五錢

山萸肉

五錢

蒸熟

水煎服三月便可身健受孕斷可種子此方之用不

特補血而純於填精精滿則子宮易於攝精血足則

子宮易於容物皆有子之道也惟是貪慾者多節慾

服藥三月後

不受孕仍照

原方加杜仲

二錢續斷

二錢白朮

二錢重者三錢

服數劑後必
受孕

者少往往不驗服此者果能節慾三月心靜神清自
無不孕之理否則不過身體壯健而已勿咎方之不
靈也

女科上 種子

望
海山仙館叢書



靈也

無不孕之理否則不過身體壯健而已勿咎方之不
靈也

胸滿不思食不孕 三十

婦人有飲食少思胸膈滿悶終日倦怠思睡一經房事
呻吟不已人以爲脾胃之氣虛也誰知是腎氣不足乎
夫氣宜升騰不宜消降升騰於上焦則脾胃易於分運
降陷於下焦則脾胃難於運化人乏水穀之養則精神
自爾倦怠脾胃之氣可升而不可降也明甚然則脾胃
之氣雖充於脾胃之中實生於兩腎之內無腎中之水
氣則胃之氣不能騰無腎中之火氣則脾之氣不能化
惟有腎之水火二氣而脾胃之氣始能升騰而不降也

女科上 種子

嬰 海山仙館叢書

胸滿不孕人
每誤爲脾胃
虛寒不能尅
食用扶脾消
導之藥腎氣
愈虛何能受

孕妙在立方
不峻補腎火
所以不用桂
附等藥但專
補腎氣使脾
胃之氣不復
下陷則帶脉
氣充胞胎氣
暖自然受孕
無難矣

然則補脾胃之氣可不急補腎中水火之氣乎治法必
以補腎氣爲主但補腎而不兼補脾胃之品則腎之水
火二氣不能提於至陽之上也方用并提湯

大熟地一兩 巴戟一兩 白朮一兩 人參五錢

黃芪五錢 山萸肉三錢 枸杞二錢 柴胡五分

水煎服三月而腎氣大旺再服一月未有不能受孕
者此方補氣之藥多於補精似乎以補脾胃爲主矣
孰知脾胃健而生精自易是補脾胃之氣與血正所
以補腎之精與水也又益以補精之味則陰氣自足

陽氣易升自爾騰越於上焦矣陽氣不下陷則無非
大地陽春隨遇皆是化生之機安有不受孕之理與

女科上

種子

男

海山仙館叢書



大抵調春調攝皆長外主之機法亦不愛孕之理與
調氣法亦自爾騰越於上焦矣調於下則無非

下部冰冷不受孕

三十一

婦人有下身冰冷非火不煖交感之際陰中絕無溫熱之氣人以爲天分之薄也誰知是胞胎寒之極乎夫寒冰之地不生草木重陰之淵不長魚龍今胞胎既寒何能受孕雖男子鼓勇力戰其精甚執直射於子宮之內而寒冰之氣相逼亦不過茹之於暫而不能不吐之於久也夫猶是人也此婦之胞胎何以寒涼至此豈非天分之薄乎非也蓋胞胎居於心腎之間上繫於心而下繫於腎胞胎之寒涼乃心腎二火之衰微也故治胞胎

女科上

種子

五

海山仙館叢書

今之種子者多喜服熱藥

不知此方特

爲胞胎寒者

設若胞胎有

熱則不宜服

審之

者必須補心腎二火而後可方用溫胞飲

白米

一兩 土炒

巴戟

一兩 鹽水浸

人參

三錢

杜仲

三錢 炒黑

兔絲子

三錢 酒浸炒

山藥

三錢 炒

芡實

三錢 炒

肉桂

二錢 去粗研

附子

三分 鹽水炒

補骨脂

二錢 鹽水炒

水煎服一月而胞胎熱此方之妙補心而即補腎溫

腎而即溫心心腎之氣旺則心腎之火自生心腎之

火生則胞胎之寒自散原因胞胎之寒以至茹而即

吐而今胞胎既熱矣尙有施而不受者乎若改湯爲

丸朝夕吞服尤能攝精斷不至有伯道無兒之歎也

胸滿少食不孕 二十二

婦人有素性恬淡飲食少則平和多則難受或作嘔洩胸膈脹滿久不受孕人以爲賦稟之薄也誰知是脾胃虛寒乎夫脾胃之虛寒原因心腎之虛寒耳蓋胃土非心火不能生脾土非腎火不能化心腎之火衰則脾胃失生化之權卽不能消水穀以化精微矣旣不能化水穀之精微自無津液以灌溉於胞胎之中欲胞胎有溫暖之氣以養胚胎必不可得總然受胎而帶脉無力亦必墮落此脾胃虛寒之咎故無玉麟之毓也治法可不

文科上 種子

至 海山仙館叢書

少食不孕與胸滿不思飲食有問一補腎中之氣一補命門與心包絡之火藥味不多其君臣佐使之妙宜細參之

急温補其脾胃乎然脾之母原在腎之命門胃之母原在心之包絡欲温補脾胃必須補二經之火蓋母旺子必不弱母熱子必不寒此子病治母之義也方用温土毓麟湯

巴戟 一兩 去心酒浸 覆盆子 一兩 酒浸蒸 白朮 五錢 土炒

人參 三錢 懷山藥 五錢 神麴 一錢 炒

水煎服一月可以種子矣此方之妙温補脾胃而又兼補命門與心包絡之火藥味不多而四經並治命門心包之火旺則脾與胃無寒冷之虞子母相顧一

家和合自然飲食多而善化氣血旺而能任帶脉有
力不虞落胎安有不玉麟之育哉

女科上

種子

五

海山仙館叢書



八下風濕氣交作不正氣之可也

此書乃... 海山仙館叢書

婦人有少腹之間自覺有緊迫之狀急而不舒不能生育此人人之所不識也誰知是帶脉之拘急乎夫帶脉繫於腰臍之間宜弛而不宜急今帶脉之急者由於腰臍之氣不利也而腰臍之氣不利者由於脾胃之氣不足也脾胃氣虛則腰臍之氣閉腰臍之氣閉則帶脉拘急遂致牽動胞胎精即直射於胞胎胞胎亦暫能茹納而力難負載必不能免小產之虞況人多不能節慾安得保其不墜乎此帶脉之急所以不能生子也治法宜

女科上 種子

聖 海山仙館叢書

凡種子治法
不出帶脉胞
胎二經數言
已洩造化之
秘矣

寬其帶脉之急而帶脉之急不能遽寬也宜利其腰臍之氣而腰臍之氣不能遽利也必須大補其脾胃之氣與血而腰臍可利帶脉可寬自不難於孕育矣方用寬帶湯

白朮 一兩 土炒 巴戟肉 五錢 酒浸 補骨脂 一錢 鹽水炒 人參 三錢

麥冬 三錢 去心 杜仲 三錢 炒黑 大熟地 五錢 九蒸 肉蓯蓉 三錢 洗淨

白芍 三錢 酒炒 當歸 二錢 酒洗 五味 三分 建蓮子 二十粒 不去心

水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月即受胎此方之妙脾胃兩補而又利其腰臍之氣自然帶脉寬舒

可以載物而勝任矣或疑方中用五味芍之酸收
不增帶脉之急而反得帶脉之寬殊不可解豈知帶
脉之急由於氣血之虛蓋血虛則縮而不伸氣虛則
攣而不達用芍藥之酸以平肝木則肝不尅脾用五
味之酸以生腎水則腎能益帶似相碍而實相濟也
何疑之有

女科上 種子

五 海山仙館叢書



此藥之性
和氣清心主胃水
準而本蓋用芍藥之酸以平肝木以平不地
藥之性由外透血之虛蓋血虛則縮而不伸氣虛則
不飲帶脉之急而反得帶脉之寬殊不可解豈知帶
何疑之有

婦人有懷抱素惡不能生子者人以爲天心厭之也誰

知是肝氣鬱結乎夫婦人之有子也必然心脉流利而

滑脾脉舒徐而和腎脉旺大而鼓指始稱喜脉未有三

部脉鬱而能生子者也若三部脉鬱肝氣必因之而更

鬱肝氣鬱則心腎之脉必致鬱之極而莫解蓋子母相

依鬱必不喜喜必不鬱也其鬱而不能成胎者以肝木

不舒必下尅脾土而致塞脾土之氣塞則腰膈之氣必

不利腰膈之氣不利必不能通任脉而達帶脉則帶脉

之氣亦塞矣帶脉之氣既塞則胞胎之門必閉精卽到

門亦不得其門而入矣其奈之何哉治法必解四經之

鬱以開胞胎之門則幾矣方用開鬱種玉湯

白芍 一兩 香附 三錢 當歸 五錢 白朮 五錢

丹皮 三錢 茯苓 三錢 花粉 二錢 蓋子母

水煎服一月則鬱結之氣開鬱開則無非喜氣之盈

腹而嫉妬之心亦可以一易自然兩相合好結胎於

頃刻之間矣此方之妙解肝氣之鬱宣脾氣之困而

心腎之氣亦因之俱舒所以腰膈利而任帶通達不

肝氣鬱結 心腎之脉 必致鬱之極 而莫解 蓋子母相 依鬱必不喜 喜必不鬱 也其鬱而 不能成胎 者以肝木 不舒必下 尅脾土而 致塞脾土 之氣塞則 腰膈之氣 必不利 腰膈之氣 不利必不 能通任脉 而達帶脉 則帶脉之 氣亦塞矣 帶脉之氣 既塞則胎 胞之門必 閉精卽到 門亦不得 其門而入 矣其奈之 何哉治法 必解四經 之鬱以開 胞胎之門 則幾矣方 用開鬱種 玉湯

方似平平無

奇然却解

妬種子不

可忽視若

而仍然嫉

胎即幸不

能成方加

如飲合庶

可保無虞

須變其性

始效

女科上

種子

海山仙館叢書

解妬飲

黍穀丸

樹麥明小

黑豆各四

十九粒豆

炒熟高糧

五十五粒

必啟胞胎之門而胞胎自啟不特治嫉妬者也

女科上

種子

要

海山仙館叢書



必啟胞胎之門而胞胎自啟不特治嫉妬者也

肥胖不孕

三十五

兩枚麻四枚刺史

婦人有身體肥胖痰涎甚多不能受孕者人以爲氣虛之故誰知是濕盛之故乎夫濕從下受乃言外邪之濕也而肥胖之濕實非外邪乃脾土之內病也然脾土既病不能分化水穀以養四肢宜其身驅瘦弱何以能肥胖乎不知濕盛者多肥胖肥胖者多氣虛氣虛者多痰涎外似健壯而內實虛損也內虛則氣必衰氣衰則不能行水而濕停於腸胃之間不能化精而化涎矣夫脾本濕土又因痰多愈加其濕脾不能受熱必津潤於胞

女科上 種子

海山仙館叢書

胎日積月累則胞胎竟變爲汪洋之水窟矣且肥胖之婦內肉必滿遮隔子宮不能受精此必然之勢也况又加以水濕之盛即男子甚健陽精直達子宮而其水勢滔滔泛濫可畏亦遂化精成水矣又何能成妊哉治法必須以洩水化痰爲主然徒洩水化痰而不急補脾胃之氣則陽氣不旺濕痰不去人先病矣烏望其茹而不吐乎方用加味補中益氣湯

人參 三錢 黃芪 三錢 柴胡 一錢 甘草 一錢
生用 土炒 升麻 四分 陳皮 五分
當歸 三錢 白朮 一兩

再十劑後方
加杜仲一錢
半炒斷絲續
斷錢半炒必
受孕矣

茯苓 五錢 半夏 三錢 製

水煎服八劑痰涎盡消再十劑水濕利子宮涸出易於受精而成孕矣其在於昔則如望洋觀海而至於今則是馬到成功也快哉此方之妙妙在提脾氣而升於上作雲作雨則水濕反利於下行助胃氣而消於下為津為液則痰涎轉易於上化不必用消化之品以損其肥而肥自無碍不必用濬決之味以開其竅而竅自能通陽氣充足自能攝精濕邪散除自可受種何肥胖不孕之足慮乎

女科上 種子

海山仙館叢書

此方之妙妙在提脾氣而升於上作雲作雨則水濕反利於下行助胃氣而消於下為津為液則痰涎轉易於上化不必用消化之品以損其肥而肥自無碍不必用濬決之味以開其竅而竅自能通陽氣充足自能攝精濕邪散除自可受種何肥胖不孕之足慮乎

受孕矣
斷錢半炒必
半炒斷絲續
加杜仲一錢
再十劑後方

婦人有骨蒸夜熱遍體火焦口乾舌燥咳嗽吐沫難於生子者人以爲陰虛火動也誰知是骨髓內熱乎夫寒陰之地固不生物而乾旱之田豈能長養然而骨髓與胞胎何相關切而骨髓之熱卽能使人不嗣此前賢所未言者也山一但創言之不幾爲世俗所駭乎而要知不必駭也此中實有其理焉蓋胞胎爲五臟外之一臟耳以其不陰不陽所以不列於五臟之中所謂不陰不陽者以胞胎上繫於心包下繫於命門繫心包者通於

女科上 種子

无 海山仙館叢書

心心者陽也繫命門者通於腎腎者陰也是陰之中有陽陽之中有陰所以通於變化或生男或生女俱從此出然必陰陽協和不偏不枯始能變化生人否則否矣况胞胎旣通於腎而骨髓亦腎之所化也骨髓熱由於腎之熱腎熱而胞胎亦不能不熱且胞胎非骨髓之養則嬰兒無以生骨髓過熱則骨中空虛惟存火烈之氣又何能成胎治法必須清骨中之熱然骨熱由於水虧必補腎之陰則骨熱除珠露有滴濡之喜矣壯水之主以制陽光此之謂也方用清骨滋腎湯

治骨體熱所以不用熟地
方極善用者萬勿加減
凡峻藥病去七分即止不
必拘泥三十劑六十劑之
數三元生人不一餘類推

地骨皮 一兩 丹皮 五錢 沙參 五錢 麥冬 五錢
酒洗 去心

元參 五錢 五味子 五分 白朮 三錢 石斛 二錢
酒洗 炒研 土炒

水煎連服三十劑而骨熱解再服六十劑自受孕此
方之妙補腎中之精涼骨中之熱不清胞胎而胞胎
自無太熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨
髓過熱所以受精而變燥以致難於育子本非胞胎
之不能受精所以稍補其腎以殺其火之有餘而益
其水之不足便易種子耳

女科上 種子 左 海山仙館叢書

其水之不足動風麻痺

之不弱受精神以助其清以殺其火之有餘而益

自無大熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨

髓過熱所以受精而變燥以致難於育子本非胞胎

之不能受精所以稍補其腎以殺其火之有餘而益

其水之不足動風麻痺

之不弱受精神以助其清以殺其火之有餘而益

自無大熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨

婦人有腰酸背楚胸滿腹脹倦怠欲臥百計求嗣不能如願人以爲腰腎之虛也誰知是任督之困乎夫任脉行於前督脉行於後然皆從帶脉之上下而行也故任脉虛則帶脉墜於前督脉虛則帶脉墜於後雖胞胎受精亦必小產况任督之脉既虛而疝瘕之症必起疝瘕碍胞胎而外障則胞胎縮於疝瘕之內往往精施而不能受雖餌以玉燕亦何益哉治法必須先去其疝瘕之病而補其任督之脉則提挈天地把握陰陽呼吸精氣

女科上 種子

空 海山仙館叢書

包裹成形力足以勝任而無虞矣外無所障內有所容安有不能生育之理方用升帶湯

白木一兩 人參三錢 沙參五錢 肉桂一錢
土炒 去粗研

葶藶粉三錢 鱉甲三錢 茯苓三錢 半夏一錢
炒 製

神麩一錢
炒

水煎連服三十劑而任督之氣旺再服三十劑而疝瘕之症除此方利腰臍之氣正升補任督之氣也任

督之氣升而疝瘕自有難容之勢况方中有肉桂以

散寒葶藶以祛積鱉甲之攻堅茯苓之利濕有形自

此方爲有疝瘕而設故用

沙參葶藶粉

鱉甲以破堅

理氣若無疝瘕去上三味

加杜仲半錢

澤瀉一錢 半

甘枸杞二錢

三味服之腰膝腹脹自除矣鱉甲破氣不可誤服惟

有疝瘕與引

者宜之

化於無形滿腹皆升騰之氣矣何至受精而再墜乎
哉

女科上 種子

室
海山仙館叢書



金瓶梅詞話卷之...

便澁腹脹足浮腫不孕

婦人有小水艱澁腹脹脚腫不能受孕者人以爲小腸之熱也誰知是膀胱之氣不化乎夫膀胱原與胞胎相近膀胱病而胞胎亦病矣蓋水濕之氣必走膀胱而膀胱不能自化必得腎氣相通始能化水以出陰器倘膀胱無腎氣之通則膀胱之氣化不行水濕之氣必且滲入胞胎之中而成汪洋之勢汪洋之田又何能生物也哉治法必須壯腎氣以分消胞胎之濕益腎火以達化膀胱之水使先天之本壯則膀胱之氣化胞胎之濕除

便澁腹脹足浮腫此症極多不惟不能受孕抑且漸不愈甚有成勞瘵不治者此方補水而不助濕補火而使歸原善極不可加減一味若無好肉桂以破故紙炒錢代之用核桃仁二

女科上

種子

壹 海山山館叢書

而汪洋之田化成雨露之壤矣水化則膀胱利火旺則胞胎煖安有布種而不發生者哉方用化水種子湯

巴戟一兩 白朮一兩 茯苓五錢 人參三錢
鹽水浸 土炒

兔絲子五錢 芡實五錢 車前二錢 肉桂一錢
酒炒 炒 酒炒 去粗研

水煎服二劑膀胱之氣化四劑艱澁之症除又十劑虛脹脚腫之病形消再服六十劑腎氣大旺胞胎溫煖易於受胎而生育矣此方利膀胱之水全在補腎中之氣煖胞胎之氣全在壯腎中之火至於補腎之藥多是濡潤之品不以濕而益助其濕乎然方中之

筒連皮燒黑
去皮用仁作
引若用好肉
桂即可不用
核桃引

藥妙於補腎之火而非補腎之水尤妙於補火而無燥烈之虞利水而非蕩滌之猛所以膀胱氣化胞胎不濕而發榮長養無窮與

女科上

種子

奇

海山仙館叢書

女科上卷終

嘉應李性校

女科下卷目錄 共三十九條 四十一
症四十二方二法

妊娠

惡阻 順肝益氣湯

浮腫 加減補中益氣湯

少腹疼 安奠二天湯

口乾咽疼 潤燥安胎湯

吐瀉腹疼 援土固胎湯

子懸脇疼 解鬱湯

跌損 救損安胎湯

女科下 目錄

胎漏 助氣補漏湯

子鳴 扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂 息焚安胎湯

中惡 消惡安胎湯

多怒墮胎 利氣洩火湯

小產

行房不慎 固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹疼 黃芪補氣湯

大怒 引氣歸血湯

難產

血虛 送子丹

交骨不開 降子湯

腳手先下 轉天湯

氣逆 舒氣湯

子死產門 救母湯

子死腹中 療兒散

女科下 目錄

正產

胞衣不下 送胞湯 補中益氣湯

氣虛血暈 補氣解暈湯

血暈不語 刺眉心穴法 獨參湯

敗血攻心暈 當歸補血湯 安心湯

腸下 補氣升腸湯 草麻仁提法

產後

少腹疼 血瘀散 維定瘀湯 血虛腸寧湯

氣喘 救脫活母湯

惡寒身顫

十全大補湯

惡心嘔吐

溫腎止嘔湯

血崩

救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止

完胞湯

四肢浮腫

轉氣湯

肉線出

兩收湯

肝疾

收膜湯

氣血兩虛乳汁不下

通乳丹

鬱結乳汁不通

通肝生乳湯

女科下

目錄

三

海山仙館叢書

女科下卷

陽曲傅 山青主手著

妊娠惡阻 三十九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲
臥人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊
本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠
則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝為腎之子曰食母
氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而腎水不能應
則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡

女科下

妊娠

壽山仙館叢書

亦有肝鬱氣
滯胸膈膨悶
見食不馨不
能多食雖係
妊娠而非惡
阻宜分別治
之後另有方

心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既
受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以
其能生肝之血也然補肝以生血未為不佳但生血而
不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔山恐氣虛則血不易
生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽
氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥
不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛
而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛
而逆者補其氣則逆轉况補氣於補血之中則陰足以

制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣湯

方經效但蘇子一兩疑是一錢之誤然

國初上元生人稟賦最壯

或非用一兩不效今當下

元用一錢可也萬不可用

一兩

疏肝化滯湯

全當歸酒洗

六錢杭芎酒

炒三錢黨參

去蘆三錢白扁豆去皮四

錢雲苓二錢

香附炒焦二錢

錢砂仁炒研

錢半條芩炒

焦八分神麩

炒焦錢半廣

皮八分薄荷

六分甘草五

分水煎服

人參 一兩 當歸 一兩 蘇子 一兩 白朮 三錢

茯苓 二錢 熟地 五錢 白芍 三錢 麥冬 三錢

陳皮 三分 砂仁 一粒 神麩 一錢

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆

除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡

阻者俱以此方投之無不安最有利益於胎婦其功更

勝於四物焉

女科下

妊娠

二 海山仙館叢書

海山仙館叢書

血虛血弱血枯血燥血暈血崩血塊血瘕血疝血疝

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆

刺史三錢 神麩 一錢 神麩 一錢

白朮一兩
多以蒼朮充
之於白朮偽
者更多白朮
補胎蒼朮打
胎用者宜審

血 妊娠浮腫 四子

妊娠有五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至
遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛
乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總
以健脾補肺爲大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不蔭非
氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺
衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血
少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所
以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而

女科下

妊娠

三

海山仙館叢書

濕邪卽乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣
血虛而然耶治法當補其脾之血與肺之氣不必祛濕
而濕自無不去之理方用加減補中益氣湯

人參 五錢

黃芪 三錢
生用

柴胡 一錢

甘草 一分

炙

當歸 三錢

白朮 五錢
酒洗

茯苓 一兩

升麻 三分

酒洗

陳皮 三分

水煎服四劑卽愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立

法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而

血非氣不生是補氣卽所以生血觀當歸補血湯用

若恐其僞以
白扁豆山藥
代之較妥

黃芪為君則較著彰明矣況濕氣乘脾肺之虛而相
犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也只補氣而助
以利濕之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣
然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利濕為君乎
嗟嗟濕症而不以此藥為君將以何者為君乎況重
用茯苓於補氣之中雖曰滲濕而仍是建脾清肺之
意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參朮合
實補多於利所以重用之以分濕邪即以補氣血耳

女科下

妊娠

四

海山仙館叢書

黃芪為君則較著彰明矣況濕氣乘脾肺之虛而相
犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也只補氣而助
以利濕之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣
然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利濕為君乎
嗟嗟濕症而不以此藥為君將以何者為君乎況重
用茯苓於補氣之中雖曰滲濕而仍是建脾清肺之
意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參朮合
實補多於利所以重用之以分濕邪即以補氣血耳

妊娠少腹疼 四十一

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墮之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脉而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脉無力胞胎即無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷即色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾為後天腎為先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

女科下 妊娠

五 海山仙館叢書

人參一兩無
力者以黨參
代之無上黨
參者以嫩黃
芪代之

是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

人參一兩 熟地一兩 白朮一兩

山藥五錢 山萸五錢 炙草一錢

杜仲三錢 枸杞二錢 扁豆五錢

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功

所以寡效此方正妙在多用也

女科下

妊娠

六

海山仙館叢書



人參 白朮 山藥 茯苓 補骨脂 鹿茸 杜仲 熟地 黃芪 歸身 芍藥 川芎 羌活 獨活 威靈 白芷 藁本 蘇合 安息 乳香 沒藥 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 熊膽 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍 麝香 蘇合 安息 乳香 沒藥 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 熊膽 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍 麝香

妊娠日乾咽痛 四十二

妊婦至三四個月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤

以至胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也

誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成

逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎

水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水又何能動胎必

腎經之火動而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之

不足所以火炎而胎必動補水則胎自安亦既濟之義

也惟是腎水不能遽生必須滋補肺金金潤則能生水

女科下 妊娠

七 海山仙館叢書

而水有逢源之樂矣水既有本則源泉混混矣而火又

何難制乎再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用

潤燥安胎湯

水熟地一兩 生地三錢 山萸肉五錢 麥冬五錢 連翹五錢

五味二錢 阿膠二錢 蛤粉炒 黃芩一錢 益母二錢 養姑一錢

水煎服二劑而燥息再三劑而胎安連服十劑而胎

不再動矣此方專填腎中之精而兼補肺然補肺仍

是補腎之意故腎經不乾燥則火不能灼胎焉有不

安之理乎

茶

散開而吹雲

藥決不日因

豆絲根干於

因因藥而吹

立製而不可

太熱而用之

方極妙用之

立應萬不可

因咽痛而加

豆根射干等

藥亦不可因

過潤而加雲

苓

妊婦上吐下瀉胎動欲墮腹疼難忍急不可緩此脾胃虛極而然也夫脾胃之氣虛則胞胎無力必有崩墜之虞況又上吐下瀉則脾與胃之氣因吐瀉而愈虛欲胞胎之無恙也得乎然胞胎繫於腎而連於心腎氣固則交全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則交於心其氣通於胞胎此胞胎之所以欲墜而不得也且腎氣能固則陰火必來生脾心氣能通則心火必來援胃脾胃雖虛而未絕則胞胎雖動而不墮可不急救其脾胃乎然脾胃當將絕而未絕之時只救脾胃而難遽生更宜補其心腎之火使之生土則兩相接續胎自固而安矣方用援土固胎湯

女科下 妊娠

海山仙館叢書

人參 一兩
白朮 二兩
山藥 一兩
肉桂 二錢
杜仲 三錢
山萸 一兩
炙草 一錢

製附子 五分
續斷 三錢
杜仲 三錢
山萸 一兩
酒炒砂仁 三粒
炒研

枸杞 三錢
兔絲子 三錢
酒炒砂仁 三粒
炒研
炙草 一錢

水煎服一劑而洩止二劑而諸病盡愈矣此方救脾胃之士十之八救心腎之火十之二也救火輕於救

土者豈以土欲絕而火未甚衰乎非也蓋土崩非重

白朮多偽附
桂更無佳者
用者若有真
藥固妙如無
真藥白朮以
白扁豆代之
肉桂以破故
紙代之

劑不能援火衰雖小劑而可助熱藥多用必有太燥之虞不比溫甘之品也況胎動係土衰而非火弱何用太熱妊娠忌桂附是恐傷胎豈可多用小熱之品計之以錢大熱之品計之以分者不過用以引火而非用以壯火也其深思哉

女科下

妊娠

九

海山仙館叢書



非用引火也其經思甚
痛多引錢大熱之品指之及今皆不嚴用引火而
取太燥取款品林園景照書讀疑可遂用引火之品
之與不其溫甘之品也或謂燥證生衰而非火燥而
燥不指勞火衰雖小劑而可助熱藥多用必有太燥

胎前子懸腸疼

四十四

婦有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛如弓

上弦人止知是子懸之病也誰知是肝氣不通乎夫養胎半係於腎水然非肝血相助則腎水實有獨功難支之勢故保胎必滋腎水而肝血斷不可不顧使肝氣不鬱則肝之氣不閉而肝之血必旺自然灌溉胞胎合腎水而並協養胎之力今肝氣因憂鬱而閉塞則胎無血陰腎難獨任而胎安得不上升以覓食此乃鬱氣使然也莫認爲子之欲自懸而妄用泄子之品則得矣治法宜開肝氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定矣方用

解鬱湯

方加薏仁米三四錢尤妙

人參 一錢

白朮 五錢

白茯苓 三錢

當歸 一兩

酒洗

白芍 一兩

枳殼 五分

砂仁 三粒

山梔子 三錢

炒

薄荷 二錢

水煎服一劑而悶痛除二劑而子懸定至三劑而全

安去梔子再多服數劑不復發此乃平肝解鬱之聖

藥鬱開則木不尅土肝平則火不妄動方中又有健

脾開胃之品自然水精四布而肝與腎有潤澤之機

文科下

妊娠

十海山仙館叢書

則胞胎自無乾燥之患又何慮上懸之不愈哉

女科下

妊娠

十一

海山仙館叢書



根源強自無流弊之患又何慮上懸之不愈哉

妊婦有失足跌損致傷胎元腹中疼痛勢如將墮者人
只知是外傷之為病也誰知有內傷之故乎凡人內無
他症胎元堅固卽或跌撲閃挫依然無恙惟內之氣血
素虧故畧有閃挫胎便不安若止作閃挫外傷治斷難
奏功且恐有因治而反隔者可不慎與必須大補氣血
而少加以行瘀之品則瘀散胎安矣但大補氣血之中
又宜補血之品多於補氣之藥則無不得之方用救損
安胎湯

女科下 妊娠

上海山仙館叢書

卽用尋常白
米土炒焦最
妙以其能理
氣行血也於
白木味過甘
不能理氣行
血用者知之

當歸 一兩 白芍 三錢 生地 一兩 白木 五錢
酒洗 酒炒 酒炒 土炒

炙草 一錢 人參 一錢 蘇木 三錢 乳香 一錢
搗碎 去油

沒藥 一錢
去油

水煎服一劑而疼痛止二劑而勢不下墜矣不必三
劑也此方之妙妙在既能去瘀而不傷胎又能補氣
補血而不凝滯固無通利之害亦痊跌閃之傷有益
無損大建奇功卽此方與然不特治懷孕之閃挫也
卽無娠閃挫亦可用之

妊娠小便下血病名胎漏 四十六

妊婦有胎不動腹不疼而小便中時常有血流出者人以為血虛胎漏也誰知氣虛不能攝血乎夫血只能蔭胎而胎中之蔭血必賴氣以衛之氣虛下陷則蔭胎之血亦隨氣而陷矣然則氣虛下陷而血未嘗虛似不應與氣同陷也不知氣乃血之衛血賴氣以固氣虛則血無憑依無憑依必燥急燥急必生邪熱血寒則靜血熱則動動則外出而莫能遏又安得不下流乎倘氣不虛而血熱則必大崩而不止些微之漏矣治法宜補其氣之不足而洩其火之有餘則血不必止而自無不止矣

方用助氣補漏湯

補血不用當歸抄

人參 一兩

白芍 五錢

黃芩 三錢

生地 三錢

益母草 一錢

續斷 二錢

甘草 一錢

水煎服一劑而血止二劑再不漏矣此方用人參以補陽氣用黃芩以洩陰火火洩則血不熱而無欲動之機氣旺則血有依而無可漏之竅氣血俱旺而利協自然歸經而各安其所矣又安有漏洩之患哉

女科下

妊娠

三

海山仙館叢書

妊娠子鳴 四十七

妊婦懷胎至七八個月忽然兒啼腹中腰間隱隱作痛人以為胎熱之過也誰知是氣虛之故乎夫兒之在胞胎也全憑母氣以化成母呼兒亦呼母吸兒亦吸未嘗有一刻之間斷至七八個月則母氣必虛矣兒不能隨母之氣以為呼吸必有迫不及待之勢母子原相依為命子失母之氣則拂子之意而啼於腹中似可異而究不必異病名子鳴氣虛甚也治宜大補其氣使母之氣與子氣和合則子之意安而啼亦息矣方用扶氣止啼

文科下

妊娠

內

海山仙館叢書

湯

黃芪用嫩黃
芪不可用箭
芪箭芪係北
口外苜蓿根

人參 一兩

黃芪 一兩

生用

麥冬 一兩

去心

當歸 五錢

酒洗

橘紅 五分

甘草 一錢

花粉 一錢

水煎服一劑而啼即止二劑不再啼此方用人參黃

芪麥冬以補肺氣使肺氣旺則胞胎之氣亦旺胞胎

節之氣旺則胞中之子氣有不隨母之氣以為呼吸者

未之有也

扶氣止啼湯
人參 一兩
黃芪 一兩
麥冬 一兩
當歸 五錢
橘紅 五分
甘草 一錢
花粉 一錢

妊娠燥狂每
 誤有別症不
 曰痰甚即云
 時疾傳經而
 置妊娠於不
 問誤服多藥
 數月不愈甚
 有打去胎而
 以顧大人性
 命為名者更
 屬糊塗之極

水煎服一劑而狂少平二劑而狂大定三劑而火盡
 解胎亦安矣此方藥料頗重恐人慮不勝而不敢全
 用又不得不再為囑之懷胎而火勝若此非大劑何
 以能蠲火不息則狂不止而胎能安耶況藥料雖多
 均是滋水之味益而無損勿過慮也

女科下

妊娠

去

海山仙館叢書



命源存濟更
 凡婦大人性
 命為名者更
 屬糊塗之極

以量滋水之起益而無礙於胎
 以指隘水不息則狂不止而胎能安
 用又不得不再為囑之懷胎而火勝若此非大劑何
 以能蠲火不息則狂不止而胎能安耶況藥料雖多
 均是滋水之味益而無損勿過慮也

妊娠中惡 四十九

婦人懷子在身痰多吐涎偶遇鬼神崇惡忽然腹中疼痛胎向上頂人疑為子懸之病也誰知是中惡而胎不安乎大凡不正之氣最易傷胎故有孕之婦斷不宜入廟燒香與遊靜陰寒之地如古洞幽岩皆不可登蓋邪祟多在神守潛踪幽陰岩洞亦其往來遊戲之所觸之最易相犯不可不深戒也況孕婦又多痰涎眼目易眩目一眩如有妄見此招崇之因痰而起也人云怪病每起於痰其信然與治法似宜以治痰為主然治痰必至耗氣氣虛而痰難消化胎必動搖必須補氣以生血補血以活痰再加以清痰之品則氣血不虧痰亦易化矣方用消惡安胎湯

女科下

妊娠

七

海山仙館叢書

輔正逐邪方
極平正如此
可知用金石
之藥以化痰
者皆矜奇立
異欲速取效
不知暗耗人
之真氣戒之

當歸一兩 白芍一兩 白朮五錢 茯苓五錢
酒洗 酒炒 土炒
人參三錢 甘草一錢 陳皮五分 花粉三錢
蘇葉一錢 沉香一錢
研末

此方大補氣血輔正邪自除之義也

婦人有懷妊之後未至成形或已成形其胎必墮入皆曰氣血衰微不能固胎也誰知是性急怒多肝火大動而不靜乎夫肝本藏血肝怒則不藏不藏則血難固蓋肝雖屬木而本中實寄龍雷之火所謂相火是也相火宜靜而不宜動靜則安動則熾况木中之火又易動而難靜者也人生在世無日非動靜之時即無日非動火之時尤加大怒則火益動矣火動而不可止遏則火勢飛揚不能生氣化胎而反食氣傷精矣精傷則胎無所養勢必不墜而不已經所謂少火生氣壯火食氣正此義也治法宜平其肝中之火利其腰臍之氣使氣生夫血而血清其火則庶幾矣方用利氣洩火湯

文科下

如娠

大

海山仙館叢書

性急怒多而不用舒肝藥

者以其有胎

娠故也經云

胎病則母病

胎安則母病

自愈所以妊

娠一門總以

補氣養血安

胎為主則舊

病自除矣

人參

三錢

白朮

一兩

甘草

一錢

熟地

五錢

艾炷

而

當歸

三錢

白芍

五錢

芫實

三錢

黃芩

二錢

酒炒

黃芩

水煎服六十劑而胎不墜矣此方名雖利氣而實補

氣也然補氣而不加以洩火之品則氣旺而火不能

平必反害其氣也故加黃芩於補氣之中以洩火又

有熟地歸芍以滋肝而壯水之主則血不燥而氣得

和怒氣息而火自平不必利氣而氣無不利即無往
而不利矣

女科下

妊娠

九

海山仙館叢書



道不味矣

時發時息而火自平不必利氣而氣無不利即無往

行房小產

五十一

妊婦因行房顛狂遂致小產血崩不止人以爲火動之
 極也誰知是氣脫之故乎大凡婦人之懷妊也賴腎水
 以蔭胎水源不足則火易沸騰加以久戰不已則火必
 大動再至興酣顛狂精必大洩精大洩則腎水益涸而
 龍雷相火益熾水火兩病胎不能固而墮矣胎墮而火
 猶未息故血隨火而崩下有不可止遏之勢人謂火動
 之極亦未爲大誤也但血崩本於氣虛火盛本於水虧
 腎水既虧則氣之生源涸矣氣源既涸而氣有不脫者
 乎此火動是標而氣脫是本也經云治病必求其本本
 固而標自立矣若只以止血爲主而不急固其氣則氣
 散不能速回而血何由止不大補其精則水涸不能遽
 長而火且益熾不揣其本而齊其末山未見有能濟者
 也方用固氣填精湯

女科下

小產

三

海山仙館叢書

人參 一兩

黃芪 一兩

白朮 五錢

大熟地 一兩

當歸 五錢

酒洗 三七 三錢

芥穗 二錢

炒黑

水煎服一劑而血止二劑而身安四劑則全愈此方

之妙妙在不去清火而惟去補氣補精其奏功獨神

小產血崩多
 出行房而致
 若年逾四十
 參芪宜倍用
 熟地宜減半
 用以其氣虛

火衰也否則
每令氣脫不
救凡有妊娠
者須恐恐謹
避房事萬勿
自蹈危途慎
之

者以諸藥溫潤能除大熱也蓋熱是虛故補氣自能
攝血補精自能止血意在本也

文科下

小產

三

海山仙館叢書



攝血補精自能止血意在本也
昔以諸藥溫潤能除大熱也蓋熱是虛故補氣自能

妊婦有跌扑閃挫遂致小產血流紫塊昏暈欲絕者人皆曰瘀血作祟也誰知是血室損傷乎夫血室與胞胎相連如唇齒之相依胞胎有傷則血室亦損唇亡齒寒理有必然也然胞胎傷損而流血者其傷淺血室傷損而流血者其傷深傷之淺者疼在腹傷之深者暈在心同一跌扑損傷而未小產與已小產治各不同未小產而胎不安者宜顧其胎而不可輕去其血已小產而血大崩宜散其瘀而不可重傷其氣蓋胎已隨血既脫而血室空虛惟氣存耳倘或再傷其氣安保無氣脫之憂乎經云血為營氣為衛使衛有不固則營無依而安矣故必補氣以生血新生血而瘀血自散矣方用理氣散瘀湯

文科下

小產

三

海山仙館叢書

人參

一兩

黃芪

一兩

當歸

五錢

茯苓

二錢

紅花

一錢

丹皮

三錢

薑炭

五錢

水煎服一劑而流血止二劑而昏暈除三劑而全安

矣此方用人參黃芪以補氣氣旺則血可攝也用當

歸丹皮以生血血生則瘀難留也用紅花黑薑以活

胎未墮宜加

杜仲炒炭一

錢續斷炒黑

一錢若胎已

墮服原方血

期不止加貫

衆炭三錢若
血閉心暈加
玩物炭一錢

血活則暈可除也用茯苓以利水水利則血易歸
經也

女科下

小產

三

海山仙館叢書



血血甜頭覺有刺也用荻苓以凉水水煎服之

妊婦有口渴煩燥舌上生瘡兩唇腫裂大便乾結數日不得通以致腹疼小產者人皆曰大腸之火熱也誰知是血熱爍胎乎夫血所以養胎也溫和則胎受其益太熱則胎受其損如其熱以爍之則兒在胞胎之中若有探湯之苦難以存活則必外越下奔以避炎氣之逼迫欲其胎之不墜也得乎然則血蔭乎胎則血必虛耗血者陰也虛則陽亢則害矣且血乃陰水所化血日蔭胎取給刻不容緩而火熾陰水不能速生以化血所以

女科下 小產

海山仙館叢書

陰虛火動陰中無非火氣血中亦無非火氣矣兩火相合焚逼兒胎此胎之所以下墜也治法宜清胞中之火補腎中之精則可已矣或疑兒已下墜何故再顧其胞血不蔭胎何必大補其水殊不知火動之極以致胎墜則胞中純是一團火氣此火乃虛火也實火可洩而虛火宜於補中清之則虛火易散而真火可生倘一味清涼以降火全不顧胞胎之虛實勢必至寒氣逼人胃中生氣蕭索矣胃乃二陽資養五臟者也胃陽不生何以化精微以生陰水乎有不變為勞瘵者幾希矣方用加

減四物湯

此方加條茶
錢尤妙

熟地五錢 白芍三錢 當歸一兩 川芎一錢

山梔子一錢 山黃二錢 山藥三錢 丹皮三錢

水煎服四五劑而全愈矣

女科下

小產

壹

海山仙館叢書



水煎服四五劑而全愈矣

山梔子一錢 山黃二錢 山藥三錢 丹皮三錢

水煎服四五劑而全愈矣

水煎服四五劑而全愈矣

錢尤妙

畏寒腹疼小產 五十四

妊婦有畏寒腹疼因而墮胎者人只知下部太寒也誰知是氣虛不能攝胎乎夫人生於火亦養於火非氣不充氣旺則火旺氣衰則火衰人之所以坐胎者受父母先天之真火也先天之真火即先天之真氣以成之故胎成於氣亦攝於氣氣旺則胎牢氣衰則胎墮胎日加長而氣日加衰安得不墮哉況又遇寒氣外侵則內之火氣更微火氣微則長養無資此胎之不能不墮也使當其腹疼之時服用人參乾薑之類補氣祛寒則可以疼止而胎安無如人拘於妊娠之藥禁而不敢用因致墮胎而僅存幾微之氣不急救氣尙有何法方用黃芪

補氣湯

黃芪

二兩當歸一兩

肉桂五分

去粗皮研

水煎服五劑愈矣倘認定是寒大用辛熱全不補氣

與血恐過於燥熱反致亡陽而變危矣

兩桂須用好的如無佳者用炮姜代之或一錢二錢皆可不可祇用五分

女科下

小產

海山仙館叢書

大怒小產

五十五

中血亦歸氣祖之所養血兩

妊婦有大怒之後忽然腹疼吐血因而墮胎及墮胎之後腹疼仍未止者人以為肝之怒火未退也誰知是血不歸經而然乎夫肝所以藏血者也大怒則血不能藏宜失血而不當墮胎何為失血而胎亦隨墮乎不知肝性最急血門不閉其血直搗於胞胎胞胎之系通於心腎之間肝血來冲必斷絕心腎之路胎因心腎之路斷胞胎失水火之養所以墮也胎既墮矣而腹疼如故者蓋因心腎未援欲續無計彼此痛傷肝氣欲歸於心而

女科下 小產

三 海山仙館叢書

心不受欲歸於腎而腎不納故血猶未靜而疼無已也治法宜引肝之血仍入於肝而腹疼自已矣然徒引肝之血而不平肝之氣則氣逆而不易轉即血逆而不易歸也方用引氣歸血湯

白芍 五錢 當歸 五錢 白朮 三錢 甘草 一錢

黑芥穗 三錢 丹皮 三錢 薑炭 五分 香附 五分

麥冬 三錢 鬱金 一錢

水煎服此方名為引氣其實仍是引血也引血亦所

以引氣氣歸於肝之中血亦歸於肝之內氣血兩歸

黃氏三
白芍五錢
當歸五錢
白朮三錢
甘草一錢
黑芥穗三錢
丹皮三錢
薑炭五分
香附五分

遷後忌用白芍因其酸寒也胎墮後用上元生人可若下元生人萬不可用必不得已而用之將白芍炒炭用三錢可

也餘藥如法
製

而腹疼自止矣

女科下

小產

天

海山仙館叢書



山陰
山陰縣志

而腹疼自止矣

血虛難產 五十六

妊娠有腹疼數日不能生產人皆曰氣虛力弱不能送子出產門誰知是血虛膠滯胞中無血兒難轉身乎夫胎之成成於腎臟之精而胎之養養於五臟六腑之血故血旺則子易生血衰則子難產所以臨產之前宜用補血之藥補血而血不能遽生必更兼補氣以生之然不可純補其氣也恐陽過於旺則血仍不足偏勝之害必有升而無降亦難產之漸也防微杜漸其惟氣血兼補乎使氣血並旺則氣能推送而血足以濟之是汪洋

女科下

難產

三

海山仙館叢書

之中自不難轉身也又何有膠滯之患乎方用送子丹

生黃芪一兩 當歸一兩 麥冬一兩 熟地五錢

川芎三錢

水煎服二劑而生矣且無橫生倒產之患此補血補

氣之藥也二者相較補血之味多於補氣之品蓋補

氣止用黃芪一味其餘無非補血之品血旺氣得所

養氣生血得所依胞胎潤澤自然易產譬如舟遇水

淺之處雖大用人力終難推行忽逢春水泛濫舟自

躍躍欲行再得順風以送之有不揚帆而迅行者乎

方妙若頭產
交骨不開加
多龜板尾三
錢生過子婦
人頂心髮三
錢洗淨用新
瓦一個置火
上焙髮成灰
入藥同煎服
下即效

交骨不開難產

五十七

妊婦有兒到產門竟不能下此危急存亡之時也人以爲胞胎先破水乾不能滑利也誰知是交骨不開之故乎蓋產門之上原有骨二塊兩相鬪合名曰交骨未產之前其骨自合若天衣之無縫臨產之際其骨自開如開門之見山婦人兒門之肉原自斜生皮亦橫長實可寬可窄可大可小者也苟非交骨連絡則兒門必然大開可以手入採取胞胎矣此交骨爲兒門之下鬪實婦人鎖鑰之鍵此骨不閉則腸可直下此骨不開則兒難

女科下

難產

三

海山仙館叢書

降生然而交骨之能開能合者氣血主之也血旺而氣衰則兒雖向下而兒門不開氣旺而血衰則兒門可開而兒難向下是氣所以開交骨血所以轉兒身也欲生產之順利非大補氣血不可然交骨之閉甚易而交骨之開甚難臨產交骨不開者多由於產前貪慾洩精大甚精洩則氣血失生化之本而大虧矣氣血虧則無以運潤於兒門而交骨粘滯不開矣故欲交骨之開必須於補氣補血之中而加開骨之品兩相合治自無不開之患不必催生而兒自迅下母子俱無恙矣方用降子

湯

方為子已臨門救急而設若子未臨門血虛難產宜服前送子丹不可透服此

當歸 一兩 人參 五錢 川芎 五錢 紅花 一錢

川牛膝 三錢 柞木枝 一兩

水煎服一劑兒門必响亮一聲交骨開解而兒乃降生矣此方用人參以補氣芎歸以補血紅花以活血牛膝以降下柞木枝以開關節骨君臣佐使同心協力所以取效如神在用開於補之中也然單用柞木枝亦能開骨但不補氣與血恐開而難合未免有下部中風之患不若此方之能開能合之為神妙也至

女科下

難產

三 海山仙館叢書

於兒未臨門之時萬不可先用柞木以開其門然用降子湯亦正無妨以其能補氣血耳若欲單用柞木必須候到門而後可

此方以開關節骨君臣佐使同心協力以補氣血耳若欲單用柞木必須候到門而後可

妊婦生產之際有脚先下而兒不得下者有手先下而兒不得下者人以爲橫生倒產至危之症也誰知是氣血兩虛之故乎夫兒在胞胎之中兒身正坐男面向後女面向前及至生時頭必旋轉而向下生此天地造化之奇非人力所能勉強者雖然先天與後天原並行而不悖天機之動必得人力以濟之所謂人力者非產母用力之謂也謂產母之氣與血耳產母之氣血足則胎必順產母之氣血虧則胎必逆順則易生逆則難產氣血既虧母身必弱子在胞中亦必弱胎弱無力欲轉頭向下而不能此胎之所以有脚手先下者也當是之時急用針刺兒之手足則兒必痛而縮入急用轉天湯以救順之

女科下 難產

三 海山仙館叢書

人參 二兩 當歸 二兩 川芎 一兩 川牛膝 三錢

升麻 四分 附子 一分 酒洗 製

水煎服一劑而兒轉身矣再二劑自然順生此方之妙用人參以補氣之虧用芎歸以補血之虧人人皆知其義若用升麻又用牛膝附子恐人未識其妙也

若服三劑後以針刺兒手足仍不轉身以針刺產婦合骨穴兒即下萬不可使

穩婆用手探
取以致子母
俱免戒之

蓋兒已身斜非用提掣則頭不易轉然轉其身非用
下行則身不易降升麻牛膝並用而又用附子者欲
其無經不達使氣血迅遠以催生也

女科下

難產

三

海山仙館叢書



其無經不達氣血迅遠以催生也
下行則身不易降升麻牛膝並用而又用附子者欲
其無經不達使氣血迅遠以催生也

氣逆難產 五十九

婦人有生產數日而胎不下者服催生之藥皆不見效
人以爲交骨之難開也誰知是氣逆不行而然乎夫交
骨不開固是難產然兒頭到產門而不能下者方是交
骨不開之故自當用開骨之劑若兒頭尙未到產門乃
氣逆不行兒身難轉耳非交骨不開之故也若開其交
骨則兒門大開兒頭未轉而向下必致變症非常是兒
門萬萬不可輕開也大凡生產之時切忌坐草太早若
兒未轉頭原難驟生乃早於坐草產婦見兒許久不下
未免心懷恐懼恐則神怯怯則氣下而不能升氣既不
升則上焦閉塞而氣乃逆矣上氣既逆而上焦必脹滿
而氣益難行氣沮滯於上下之間不利氣而徒催生則
氣愈逆而胎愈閉矣治法但利其氣兒自轉身而下矣

方用舒氣散

人參

一兩

當歸 一兩

酒洗

川芎

五錢

白芍

五錢

紫蘇梗

三錢

牛膝

三錢

陳皮

一錢

柴胡

八分

葱白七寸水煎服一劑而逆氣轉兒卽下矣此方利

氣而實補氣蓋氣逆由於氣虛氣虛易於恐懼補其

凡臨產三日
前必先腹痛
一小次名曰
試痛此時萬

女科下

難產

三

海山仙館叢書

勿坐草臨盆
但將包兒諸
物預備現成
不可早叫穩
婆來過三日
後腹若大痛
方叫穩婆來
不可令產婦
見面暫讓別
室靜待不可
高言蓋穩婆
名曰收生使
其兩手接收
不欲兒墮地
受傷非穩婆
別有妙法也
若穩婆來之
卽令產婦見

面彼必胡言
亂語用方太
早必致難產
百變叢生戒
之慎之

氣而恐懼自定恐懼定而氣逆者將莫知其何以定
也何必開交骨之多事乎哉

女科下

難產

壹

湖山仙館叢書



此命必開交骨之難產
胎前產後諸症
胎前產後諸症
胎前產後諸症

子死產門難產 六十

婦人有生產三四日兒已到產門交骨不開兒不得下
子死而母未亡者服開骨之藥不驗當有死亡之危今
幸而不死者正因其子死而胞胎下墜子母離開母氣
已收未至同子氣俱絕也治但救其母而不必顧其子
矣然死子在產門塞其下口亦有致母死亡之道宜用
推送之法補血以生水補氣以生血使氣血兩旺死子
可出而存母命也倘徒用降子之劑以墜之則死子未
必下而母氣先脫矣非救援之善者也山親見此等之
症常用救母丹活人頗多故誌之

女科下 難產

三 海山仙館叢書

方妙不可加
藏

人參 一兩 當歸 二兩 川芎 一兩 益母草 一兩

赤石脂 一錢 芥穗 三錢 炒黑

水煎服一劑而死子下矣此方用芎歸以補血人參
以補氣氣旺血旺則上能升而下能降氣能推而血
能送況益母又善下死胎石脂能下瘀血自然一湧
而出無少阻滯矣

西子母於胎
血崩血本藥

胎前胎後
胎前胎後
胎前胎後
胎前胎後

女子死腹中難產六十一

婦人有生產六七日胞衣已破而子不見下人以爲難
產之故也誰知是子已死於腹中乎夫兒死於兒門之
邊易辨而死於腹中難識蓋兒已到產門之邊未死者
頭必能伸能縮已死者必然不動卽以手推之亦必不
動如故若孫未死用手少拔其兒之髮兒必退人故曰
易辨若兒死在腹中何從而知之然實有可辨而知之
者凡子死腹中而母可救者產母之面必無煤黑之氣
是子死而母無死氣也子死腹中而母難救產母之面
必有烟燻之氣是子死而母亦無生機也以此辨死生
斷斷不爽也既知兒死腹中不能用藥以降之危道也
若用霸道以洩之亦危道也蓋生產至六七日其母之
氣必甚困乏烏能勝霸道之治如用霸道以強逐其死
子恐死子下而母亦立亡矣必須仍補其母使母之氣
血旺而死子自下也方用療兒散

女科下 難產

三 海山尚館叢書

人參一兩 當歸三兩 川牛膝五錢 鬼臼三錢
酒洗 研水飛

乳香二錢 去油

水煎服一劑死子下而母生矣凡兒之降生必先轉

下死胎不用
厚朴妙曾有
產婦面黑舌
青用補氣養
血活血之藥
而子母復得

產婦有兒已下地而胞衣留滯於腹中二三日不下心煩意燥時欲昏暈人以爲胞衣之蒂未斷也誰知是血少乾枯粘連於腹中乎世人見胞衣不下未免心懷疑懼恐其冲之於心而有死亡之兆然而胞衣究何能上冲於心也但胞衣不下瘀血未免難行恐有血暈之虞耳治法仍宜大補其氣血使生血以送胞衣則胎衣自然潤滑潤滑則易下生氣以助生血則血生自然迅速尤易催墮也方用送胞湯

女科下 正產

三 海山仙館叢書

大當歸

二兩酒洗

川芎

五錢

益母草

一兩

乳香

一兩 不去油

熟沒藥

一兩 不去油

芥穗

三錢 炒黑

麝香

五釐 研另冲

血

半自

水煎服立下此方以芎歸補其氣血以荆芥引血歸經用益母乳香等藥逐瘀而下胞衣新血既生則舊血難存氣旺上升而瘀濁自降倘有留滯之苦哉夫小胞衣是包兒之一物非依於子即依於母子生而不隨子俱下以子之不可依也故留滯於腹若有回順其母之心母胞雖已生子而其蒂間之氣原未遽絕所以留連欲脫而未脫往往有存腹六七日不下而

竟不腐爛者正以其尚有生氣也可見胞衣留腹不能殺人補之而自降耳或謂胞衣既有生氣補氣補血則胞衣亦宜堅牢何以補之而反降也不知子未下補則益於子子已下補則益於母益子而胞衣之氣連益母而胞衣之氣脫此胞胎之氣關通則兩合閉則兩開矣故大補氣血而胞衣反降也

有婦人子下地五六日而胞衣留於腹中百計治之竟不能下而又絕無昏暈煩燥之狀人以爲瘀血之粘連也誰知是氣虛不能推送乎夫瘀血在腹斷無不作崇

女科下

正產

早

海山仙館叢書

之理有則必然發暈今安然無恙是血已淨矣血淨宜清氣升而濁氣降今胞衣不下是清氣下降而難升遂至濁氣上浮而難降然濁氣上升又必有煩燥之病今亦安然是清濁之氣兩不能升也然則補其氣不無濁氣之上升乎不知清升而濁降者一定之理未有清升而濁亦升者也苟能於補氣之中仍分其清濁之氣則升清正所以降濁也方用補中益氣湯

人參 三錢
生黃芪 一兩
柴胡 三分
炙草 一分

當歸 五錢
白朮 五分
升麻 三分
陳皮 二分

萊菔子

五分
炒研

水煎服一劑而胞衣自下矣夫補中益氣湯乃提氣之藥也並非推送之劑何以能降胞衣如此之速也然而濁氣之不降者由於清氣之不升也提其氣則清升而濁降濁氣降則腹中所存之物即無不隨濁氣而盡降正不必再用推送之法也況又加萊菔子數分能理濁氣不至兩相扞格所以奏功之奇也

女科下

正產

卷

海山仙館叢書

婦人甫產兒後忽然眼目昏花嘔惡欲吐中心無主或神魂外越恍若天上行雲人以爲惡血冲心之患也誰知是氣虛欲脫而然乎蓋新產之婦血必盡傾血室空虚止存幾微之氣倘其人陽氣素虛不能生血心中之血前已蔭胎胎墮而心中之血亦隨胎而俱墮心無血養所賴者幾微之氣以固之耳今氣又虛而欲脫而君心無護所剩殘血欲奔回救主而血非正血不能歸經內庭變亂而成血暈之症矣治法必須大補氣血斷不可單治血暈也或疑血暈是熱血上冲而更補其血不愈助其上冲之勢乎不知新血不生舊血不散補血以生新血正活血以逐舊血也然血有形之物難以速生氣乃無形之物易於迅發補氣以生血尤易於補血以生血耳方用補氣解暈湯

人參 一兩 生黃芪 二兩 當歸 一兩 三錢

薑炭 一錢

水煎服一劑而暈止二劑而心定三劑而血生四劑而血旺再不暈矣此乃解暈之聖藥用參芪以補氣

原方極效不可加減

女科下

正產

聖

海山仙館叢書

使氣壯而生血也用當歸以補血使血旺而養氣也
氣血兩旺而心自定矣用荆芥炭引血歸經用薑炭
以行瘀引陽瘀血去而正血歸不必解暈而暈自解
矣一方之中藥止五味而其奏功之奇而大如此其
神矣乎

女科下

正產

聖

海山仙館叢書

輸矣乎

夫一丈之中藥正起而其奏也玄奇而大哉此其

良藥也

康血兩旺而心自定矣用荆芥炭引血歸經用薑炭

以行瘀引陽瘀血去而正血歸不必解暈而暈自解

產婦有子方下地卽昏暈不語此氣血兩脫也本在不
救然救之得法亦有能生者山得岐天師秘訣何敢隱
而不宣乎當斯之時急用銀針刺其眉心得血出則語
矣然後以人參一兩煎湯灌之無不生者卽用黃芪二
兩當歸二兩名當歸補血湯煎湯一碗灌之亦得生萬
不可於二方之中輕加附子蓋附子無經不達反引氣
血之藥走而不守不能專注於胞胎不若人參歸芪直
救其氣血之絕聚而不散也蓋產婦昏暈全是血室空

文科下

正產

望

海山仙館叢書

虛無以致昏暈舌爲心之苗心旣無主而舌又
安能出聲耶夫眉心之穴上通於腦下通於舌而其系
則連於心刺其眉心則腦與舌俱通而心之清氣上升
則瘀血自然下降矣然後以參芪當歸之能補氣生血
者煎湯灌之則氣與血接續又何至於死亡乎雖單用
參芪當歸亦有能生者然終不若先刺眉心之爲更妙
世人但知灸眉心之法不知刺更勝於灸蓋灸法緩而
刺法急緩則難於救絕急則易於回生所謂急則治其
標緩則治其本者此也

婦人有產後三五日發熱惡露不行敗血攻心狂言呼

叫甚欲奔走拏提不定人以爲邪熱在胃之過誰知是

血虛心不得養而然乎夫產後之血盡隨胞胎而外越

則血室空虛臟腑皆無血養只有心中之血尙存幾微

以護心君而臟腑失其所養皆欲取給於心心包爲心

君之宰相攔絕各臟腑之氣不許入心始得心神安靜

是護心者全藉心包之力也使心包亦虛不能障心而

各臟腑之氣遂直入於心以分取乎心血心包情急既

不能內顧其君又不能外禦乎衆於是大聲疾呼號鳴

勤王而其迹象反近於狂悖有無可如何之勢故病狀

似熱而實非熱也治法須大補心中之血使各臟腑分

取以自養不得再擾乎心君則心君泰然而心包亦安

矣方用安心湯

當歸二兩 川芎一兩 生地五錢 丹皮五錢

生蒲黃二錢

乾荷葉一片引水煎服一劑而狂定惡露亦下矣此

方用芎歸以養血何以又用生地丹皮之涼血似非

女科下

正產

湯

海山仙館叢書

服藥後狂定

宜服加味生

化湯當歸酒

洗一兩一錢

五苓三錢杵
 仁錢半研粉
 芥穗炒炭一
 錢丹皮錢半
 服四劑妙

產後所宜不知惡露所以奔心原因虛熱相犯於補
 中涼之而涼不為害況益之以荷葉七竅相通引邪
 外出不惟內不害心且佐蒲黃以分解乎惡露也但
 只可暫用以定狂不可多用以取咎也謹之慎之

女科下

正產

聖

海山仙館叢書



只可暫用以定狂不可多用以取咎也謹之慎之
 產後所宜不知惡露所以奔心原因虛熱相犯於補
 中涼之而涼不為害況益之以荷葉七竅相通引邪
 外出不惟內不害心且佐蒲黃以分解乎惡露也但
 只可暫用以定狂不可多用以取咎也謹之慎之

正產腸下 六十六

產婦腸下亦危症也人以爲兒門不關之故誰知是氣虛下陷而不能收乎夫氣虛下陷自宜用升提之藥以提其氣然新產之婦恐有瘀血在腹一旦提氣並瘀血升騰於上則冲心之患又恐變出非常是氣又不可竟提也氣既不可竟提而氣又下陷將用何法以治之哉蓋氣之下陷者因氣之虛也但補其氣則氣旺而腸自升舉矣惟是補氣之藥少則氣力薄而難以上升必須以多爲貴則陽旺力強斷不能降而不升矣方用補氣

女科下

正產

吳海山仙館叢書

升腸飲

人參一兩

生黃芪一兩

當歸一兩

白朮五錢

去蘆

川芎三錢

升麻一分

水煎服一劑而腸升矣此方純於補氣全不去升腸

卽如用升麻一分亦不過引氣而升耳蓋升麻之爲

用少則氣升多則血升也不可不知又方用蘆麻仁

四十九粒搗塗頂心以提之腸升卽刻洗去時久則

恐吐血此亦升腸之一法也

取一淨盆用開水洗熱將

腸置於盆內靜待勿懼子

下後腸卽徐徐收回若時

久盆與腸俱冷不能速收

急用開水一盆待溫以入

得于爲度將溫水傾於置

腸盆內腸熱氣充卽可收

起矣若子先下急服此方

少遲恐氣脫不救

產後少腹疼 六十六

婦人產後少腹疼痛甚則結成一塊按之愈疼人以爲
兒枕之疼也誰知是瘀血作祟乎夫兒枕者前人謂兒
頭枕之物也兒枕之不疼豈兒生不枕而反疼是非兒
枕可知矣既非兒枕何故作疼乃是瘀血未散結作成
團而作疼耳凡此等症多是壯健之婦血有餘而非血
不足也似乎可用破血之藥然血活則瘀自除血結則
瘀作崇若不補血而反敗血雖瘀血可消畢竟耗損難
免不若於補血之中以行逐瘀之法則氣血不耗而瘀
亦盡消矣方用散結定疼湯

女科下 產後

望 海山仙館叢書

前後二方極
澁不必加減

當歸 一兩 川芎 五錢 丹皮 二錢 益母草 三錢

酒洗

酒洗

黑芥穗 二錢

乳香 一錢

去油

山查 十粒

炒黑桃仁 七粒

泡去皮尖炒研

水煎服一劑而疼止而愈不必再劑也此方逐疼於
補血之中消塊於生血之內妙在不專攻疼病而疼
病止彼世人一見兒枕之疼動用元胡蘇木蒲黃靈
脂之類以化塊又何足論哉

婦人產後少腹疼痛按之即止人亦以爲兒枕之疼也
誰知是血虛而然乎夫產後亡血過多血室空虛原能

婦人產後氣喘最是大危之症苟不急治立刻死亡人
只知是氣血之虛也誰知是氣血兩脫乎夫既氣血兩
脫人將立死何又能作喘然此血將脫而氣猶未脫也
血脫欲留而氣不能留挽乎血之脫而氣反上喘如人
與賊鬪而力不勝賊之強又不肯自安於不鬪乃召號
同志以求鄰人之助故呼聲而喘作其症雖危而可救
處正在能作喘也蓋肺主氣喘則肺氣似盛而不知實
肺氣之衰也當是之時血將脫而萬難驟生望肺氣之

女科下 產後 吳海山仙館叢書

相救甚急若赤子之望慈母然而肺因血失止存幾微
之氣自顧尚且不暇又何能提挈乎血氣不與血俱脫
者幾希矣是救血必須補氣也方用救脫活母湯

方妙不可加

人參 二兩 當歸 一兩 酒洗 熟地 一兩 枸杞子 五錢

山萸 五錢 麥冬 一兩 阿膠 二錢 肉桂 一錢

黑芥穗 二錢 燕去核 去心 蛤粉炒 去粗研

水煎服一劑而喘輕二劑而喘減三劑而喘定四劑
而全愈矣此方用人參以接續元陽然徒補其氣而
不補其血則陽燥而狂雖同生於一時亦旋得旋失

產後惡寒身顫 六十九

婦人產後惡寒惡心身體顫發熱作渴人以爲產後傷寒也誰知是氣血兩虛正不敵邪而然乎大凡人之氣不虛則邪斷難入產婦失血既多則氣必大虛氣虛則皮毛無衛邪原易入正不必戶外之風來襲體也即一舉一動風即可乘虛而入之然產後之婦風易入而亦易出凡有外邪之感俱不必祛風況產婦之惡寒者寒由内生也發熱者熱由內弱也身顫者顫由氣虛也治其內寒而外寒自散治其內弱而外熱自解壯其元陽

女科下 產後

至 海內仙館叢書

而身顫自除方用于全大補湯

由人參三錢白朮三錢茯苓三錢甘草一錢

川芎一錢當歸三錢熟地五錢白芍二錢

黃芪一兩肉桂一錢

水煎服一劑而諸病悉愈此方但補氣與血之虛而

不去散風與邪之實正以正足而邪自除也況原無

邪氣乎所以奏功之捷也

誠入致致惡寒惡心身顫發熱作渴人以爲產後傷

宜連服數劑不可只服一劑

不可只服一劑

婦人產後惡心欲嘔時而作吐人皆曰胃氣之寒也誰知是腎氣之寒乎夫胃為腎之關胃之氣寒則胃氣不能行於腎之中腎之氣寒則腎氣亦不能行於胃之內是腎與胃不可分而兩之也惟是產後失血過多必致腎水乾涸腎水涸應腎火上炎當不至胃有寒冷之虞何故腎寒而胃亦寒乎蓋新產之餘水乃遽然涸去虛火尙不能生火既不生而寒之象自現治法宜補其腎中之火然火無水濟則火在水上未必不成火動陰虛之症必須於水中補火腎中溫胃而後腎無太熱之患胃有既濟之歡也方用溫腎止嘔湯

文科下 產後

至 海山仙館叢書

服此方必待

惡露盡後若

初產一二日

之內惡心欲

嘔乃惡露上

衝宜服加味

生化湯全當

歸一兩酒洗

川芎二錢炮

姜一錢東查

炭二錢桃仁

一錢研用無
灰黃酒一鍾
水三鍾同煎

熟地五錢 巴戟一兩 人參三錢 白朮一兩

山萸五錢 炮薑一錢 茯苓二錢 白寇一粒

橘紅五分 薑汁洗

水煎服一劑而嘔吐止二劑而不再發四劑而全愈

矣此方補腎之藥多於治胃之品然而治腎仍是治

胃也所以腎氣升騰而胃寒自解不必用大熱之劑

溫胃而祛寒也

產後血崩 七十一

少婦產後半月血崩昏暈目見鬼神人皆曰惡血冲心也誰知是不慎房幃之過乎夫產後業踰半月氣血雖不比其初產之二三日而新氣血初生尙未全復即血路已淨而胞胎之損傷未痊斷不可輕於一試以重傷其門戶無奈少嬌之婦氣血初復不知慎養慾心大動貪合圖歡以致血崩昏暈目見鬼神是心腎兩傷不特胞胎門戶已也明明是既犯色戒又加酣戰以致大洩其精精洩而神亦隨之而欲脫此等之症乃自作之孽十常不救者

亦有中氣素虛產後傾刻血崩不止氣亦隨之而脫此至危之證十常不救者
八九惟用獨參湯尙可救活一二遠人活去蘆五錢打碎急煎遲則氣脫不及待矣煎成徐徐灌之待氣回再煎一服灌之其餘治法參看血崩門但產後不可用抗芍炭以及諸涼藥然此證當條臨產一二日前入房久戰所致戒之

女科下 產後

至 海山仙館叢書

多不可活然於不可活之中而思一急救活之法舍大補其氣與血別無良法也方用救敗求生湯

人參 二兩 當歸 二兩 白木 二兩 九蒸熟地 一兩
酒洗 土炒

山萸 五錢 山藥 五錢 棗仁 五錢 附子 一分或一錢
蒸 炒 生用 自製

水煎服一劑而神定二劑而暈止三劑而血亦止矣倘一服見效連服三四劑減去一半再服十劑可慶

更生此方補氣以回元陽於無何有之鄉陽回而氣回自可攝血以歸神生精而續命矣

產後手傷胞胎淋漓不止 七十二

婦人有生產之時被穩婆手入產門損傷胞胎因而淋漓不止欲少忍須臾而不能人謂胞破不能再補也孰知不然夫破傷皮膚尚可完補豈破在腹內者獨不可治療或謂破在外可用藥外治以生皮膚破在內雖有靈膏無可救補耳然破之在內者外治雖無可施力安必內治不可奏功乎試思瘡傷之毒大有缺陷尚可服藥以生肌肉此不過收生不謹小有所損並無惡毒何難補其缺陷也方用完胞飲

女科下

產後

吾

海山仙館叢書

脫破諸書單
方多然不如
此之妙

人參

一兩

白米

十兩

茯苓

三錢

生黃芪

五錢

當歸

一兩

川芎

五錢

桃仁

十粒

紅花

一錢

益母草

三錢

白芨末

一錢

用猪羊胞一個先煎湯後煎藥飢服汁劑全愈夫胞損宜用補胞之藥何以反用補氣血之藥也蓋生產本不可手探試而穩婆竟以手探胞胎以致傷損則難產必矣難產者因氣血之虛也產後大傷氣血是虛而又虛矣因虛而損復因損而更虛若不補其氣與血而胞胎之破何以奏功乎今之大補其氣血者

不啻飢而與之食渴而與之飲也則精神大長氣血再造而胞胎何難補完乎所以旬日之內便成功也

女科下

產後

五

海山仙館叢書



再將羊胞一劑七煎湯後煎藥服十劑全愈夫胞
直用補胞之藥何以反用補氣血之藥也蓋羊胞
亦不可不探取而程嬰竟以手探胞胎以致傷損則
難產必矣難產者因氣血之虛也產後夫傷氣血得
再發而強能回蘇蘇矣乎適以命且之內即效也此
不啻胎前與之食飲而與之飲也慎此慎此大疑血

方妙不可加
減白芍宜炒
炭用

白產後四肢浮腫 七十三 山藥

產後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛人皆曰敗血流於經絡滲於四肢以致氣逆也誰知是肝腎兩虛陰不得出之陽乎夫產後之婦氣血大虧自然腎水不足腎火沸騰然水不足則不能養肝而肝木太燥木中乏津木燥火發腎火有黨子母兩焚火焰直冲而上尅肺金金受火刑力難制肝而咳嗽喘滿之病生焉肝火既旺而下尅脾土土受木刑力難制水而四肢浮腫之病出焉然而肝木之火旺乃假象而非真旺也假旺之氣若盛而實不足故時而熱時而寒往來無定乃隨氣之盛衰以為寒熱而寒非真寒熱亦非真熱是以氣逆於胸膈之間而不舒耳兩脇者肝之部位也酸者肝之氣味也吐酸脇疼痛皆肝虛而腎不能榮之象也治法宜補血以養肝補精以生血精血足而氣自順而寒熱咳嗽浮腫之病悉退矣方用轉

文科下 產後 美 海山仙館叢書

氣湯

- 人參 三錢
- 茯苓 三錢
- 白木 三錢
- 當歸 五錢
- 白芍 五錢
- 熟地 一兩
- 山萸 三錢
- 山藥 五錢

方妙不可加
減白芍宜炒
炭用

芡實

三錢 炒

故紙

一錢 鹽水炒

柴胡

五分

水煎服三劑效十劑痊此方皆是補血補精之品何以名爲轉氣耶不知氣逆由於氣虛乃是肝腎之氣虛也補肝腎之精血卽所以補肝腎之氣也蓋虛則逆旺則順是補卽轉也氣轉而各症盡愈陰出之陽則陰陽無扞格之虞矣

女科下

產後

至

海山仙館叢書



便到... 血... 氣... 虛... 補... 轉... 肝... 腎... 精... 血... 補... 精... 之... 品... 何... 以... 名... 爲... 轉... 氣... 耶... 不... 知... 氣... 逆... 由... 於... 氣... 虛... 乃... 是... 肝... 腎... 之... 氣... 虛... 也... 補... 肝... 腎... 之... 精... 血... 卽... 所... 以... 補... 肝... 腎... 之... 氣... 也... 蓋... 虛... 則... 逆... 旺... 則... 順... 是... 補... 卽... 轉... 也... 氣... 轉... 而... 各... 症... 盡... 愈... 陰... 出... 之... 陽... 則... 陰... 陽... 無... 扞... 格... 之... 虞... 矣...
水煎服三劑效十劑痊此方皆是補血補精之品何以名爲轉氣耶不知氣逆由於氣虛乃是肝腎之氣虛也補肝腎之精血卽所以補肝腎之氣也蓋虛則逆旺則順是補卽轉也氣轉而各症盡愈陰出之陽則陰陽無扞格之虞矣

產後肉線出 七十四

婦人有產後水道中出肉線一條長二三尺動之則疼痛欲絕人以爲胞胎之下墜也誰知是帶脉之虛脫乎夫帶脉束於任督之間任脉前而督脉後二脉有力則帶脉堅牢二脉無力則帶脉崩墜產後亡血過多無血以養任督而帶脉崩墜力難升舉故隨溺而隨下也帶脉下垂每每作痛於腰臍之間況下墜者而出於產門之外其失於關鍵也更甚安得不疼痛欲絕乎方用兩收湯

女科下 產後 海山仙館叢書

此方凡腎虛腰痛遺尿皆可治甚勿輕

人參 一兩 白朮 二兩 川芎 三錢 九蒸熟地 二兩

山藥 一兩 山萸 四錢 芡實 五錢 扁豆 五錢

巴戟 三錢 杜仲 五錢 白朮 十枚 炒香而出

水煎服一劑而收半二劑而全收矣此方補任督而仍補腰臍者蓋以任督連於腰臍也補任督而不補腰臍則任督無助而帶脉何以升舉惟兩補之則任督得腰臍之助帶脉亦得任督之力而收矣

此方凡腎虛腰痛遺尿皆可治甚勿輕

產後肝痿 七十五

婦人產後陰戶中垂下一物其形如柿或有角或二岐人以爲產類也誰知是肝痿之故乎夫產後何以成肝痿也蓋因產前勞役過傷又觸動怪怒以致肝不藏血血亡過多故肝之脂膜隨血崩墜其形似子宮而實非子宮也若是子宮之下墜狀如茄子只到產門而不能越出於產門之外惟肝之脂膜往往出產門外者至六七寸許且有粘席乾落一片如手掌大者如是子宮墜落人立死矣又安得而復生乎治法宜大補其氣與

女科下 產後 聖海山仙館叢書

血而少加升提之品則肝氣旺而易生肝血旺而易養肝得生養之力而脂膜自收方用收膜湯

生黃芪 一兩 人參 五錢 白朮 五錢 白芍 五錢
土炒 酒炒 焦

當歸 三錢 升麻 一錢
酒洗

水煎服一劑即收矣或疑產後禁用白芍恐伐生氣

之原何以頻用之而奏功也是未讀仲景之書者嗟

乎白芍之在產後不可頻用者恐其收斂乎瘀也而

謂伐生氣之源則誤矣況病之在肝者尤不可以不

用且用之於大補氣血之中在芍藥亦忘其爲酸收

破肝膜全賴
白芍之功不
可用炭

矣又何能少有作崇者乎矧脂膜下墜正藉酸收之
力助升麻以提升氣血所以奏功之捷也

女科下

產後

本

海山仙館叢書



其能扶氣以養其虛血以養其氣也

矣又升麻之可治崇者乎厥功之捷也

產後氣血兩虛乳汁不下 七十六

婦人產後絕無點滴之乳人以爲乳管之閉也誰知是氣與血之兩涸乎夫乳乃氣血之所化而成也無血固不能生乳汁無氣亦不能生乳汁然二者之中血之化乳又不若氣之所化爲尤速新產之婦血已大虧血本自顧不暇又何能以化乳乳全賴氣之力以行血而化之也今產後數日而乳不下點滴之汁其血少氣衰可知氣旺則乳汁旺氣衰則乳汁衰氣涸則乳汁亦涸必然之勢也世人不知大補氣血之妙而一味通乳豈知

女科下 產後 聖海山仙館叢書

無氣則乳無以化無血則乳無以生不幾向飢人而乞食貧人而索金乎治法宜補氣以生血而乳汁自下不必利竅以通乳也方名通乳丹

人參 一兩 生黃芪 一兩 當歸 二兩 麥冬 五錢
酒洗 去心

木通 三分 桔梗 三分 七孔猪蹄 二個
去爪壳

水煎服二劑而乳如泉湧矣此方專補氣血以生乳汁正以乳生於氣血也產後氣血涸而無乳非乳管之閉而無乳者可比不去通乳而名通乳丹亦因服之乳通而名之今不通乳而乳生即名生乳丹亦可

產後鬱結乳汁不通 七十七

少壯之婦於生產之後或聞丈夫之嫌或聽翁姑之誚遂致兩乳脹滿疼痛乳汁不通人以爲陽明之火熱也誰知是肝氣之鬱結乎夫陽明屬胃乃多氣多血之府也乳汁之化原屬陽明然陽明屬土壯婦產後雖云亡血而陽明之氣實未盡衰必得肝木之氣以相通始能化成乳汁未可全責之陽明也蓋乳汁之化全在氣而不在血今產後數日宜其有乳而兩乳脹滿作痛是欲化乳而不可得非氣鬱而何明明是羞憤成鬱土木相

女科下 產後

海山仙館叢書

結又安能化乳而成汁也治法宜大舒其肝木之氣而陽明之氣血自通而乳亦通矣不必專去通乳也方名通肝生乳湯

白芍 五錢 醋炒 當歸 五錢 酒洗 白朮 五錢 土炒 熟地 三分

甘草 三分 麥冬 五錢 去心 通草 一錢 柴胡 一錢

遠志 一錢

水煎服一劑即通不必再服也

麥冬用小木炒不惟不寒胃且得米味一直接入胃中而化乳愈速

女科下卷 終

嘉應李 性校

08757

