

二件牘

六禮
宿匪書
志傳心錄

痘疹傳心錄卷之十八

附慈幼心傳

瘦樵程永培校

脾胃

夫人以脾胃爲主胃屬陽主氣脾屬陰主血納脾司運化胃爲水穀之源飲食入胃脾乃化生精氣津液上升糟粕下降斯無悞矣至於小兒尤賴胃氣而生若乳食失節則脾胃受傷胃傷則不能納脾傷則不能化脾胃俱傷納化皆難而臟腑俱失所養則病生矣故諸病先觀胃氣人身氣血臟腑百骸皆由胃氣而生也又云有胃氣則生無胃氣則死故東

原书缺页

原书缺页

胡甘寒之藥而瀉止但口渴面白色青自此脾胃不足用小異攻散加升麻柴胡而愈

不寐多困

小兒不寐皆由胃氣不和血氣不從故不寐之症生矣治用六君子加遠志酸棗仁又歸脾湯肝腎虛熱者用六味丸心血不足振悸不得眠者真珠母丸精神短乏者人參安神丸膽虛者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯病後餘熱者當辨虛實治之有因他症不寐各當詳之又多睡者皆由脾氣虛弱健運之令不行而嗜卧也治當溫補其脾脾氣旺則

臟腑清陽之氣升舉易於運行何困倦之有治用四君子加木香半夏白朮倍之若脾倦多驚者乃心血虛而火動也治宜安神養血爲主若心脾氣虛有痰者用人參麥冬五味茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若肺氣虛有痰者用補中益氣湯又膽星天竺丸若飲食停滯而然者四君子湯加山楂麥芽神曲若脾虛好睡用歸芍六君子湯若乳母飲酒致兒昏睡者用乾葛陳皮解之不應用四君子加葛根子母並服

人參竹葉湯

人參

竹葉

甘草

半夏

小麥

麥冬

粳米

生薑

水煎服

加味小柴胡湯

卽小柴胡湯加山梔子皮

膽星天竺丸

膽星一兩

半夏

白附

各五錢

天竺黃

三錢

天麻

防風

各二錢

辰砂

一錢

右爲末甘草膏九芡實大茴一九薄荷湯化下

人參安神丸

人參一錢當歸三錢麥冬三錢黃連二錢

生地

三錢

硃砂

二錢

茯神

二錢

棗仁

二錢

右爲末猪心血丸如芡實大硃砂爲衣燈心湯化

腫脹

小兒腫脹未有不由飲食內傷脾胃虧損而致者其症有二曰氣腫曰水腫氣腫者由脾胃虛弱脾主肌肉肺主皮膚土弱不能生金致虛氣上攻於肺行於面目遍身浮腫也治法調脾行氣爲主五子五皮飲水腫者因土焦煩渴引飲而脾虛不能約制其水水

反侮土土隨水行上衝於肺流走於脾膚而光腫也治法實脾利水爲主胃苓湯至於喘脹兩條須分先後節齋曰先喘而後脹主於肺先脹而後喘主於脾蓋小使之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪而喘則失降下之令故小便短澀以致水溢皮膚而腫滿矣此喘爲本而脹爲標也治宜清金降氣而行水兼之脾土惡濕土能剋水若脾土受傷不能制水水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此脹爲本而喘爲標也治宜實脾行水而清金兼之苟肺病而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加肺病而用清金之藥

則脾得寒而脹益甚近世治喘脹但知實脾行水而不知分別肺脾二經悞矣又有脾胃虛弱濕熱積而爲脹者用瀉黃散胃苓湯又有瀉後痢後瘧後痘後諸病後脾虛發脹者宜調補脾胃爲主六君子湯補中益氣湯又有脾腎虛寒不能司攝而水泛行如蠱脹者用加減腎氣丸補命門火以生脾土間服六君子湯又有遍身膿瘍發脹治宜先去濕熱次用敗毒散以解表邪○或問曰小兒水腫俗云河簰用草藥煎洗又用雞子清口含吸臍并手足指頭前後心而愈者何也曰此內症已平但表受水溢浴洗則肌暢

卷之二
肌暢則微汗邪可散而愈也若內症不平浴洗雖愈未幾必復腫矣

一兒遍身光腫余審其能食便調身熱脉浮謂曰內症平和此水氣在表宜解散之用敗毒散去人參加紫蘇陳皮令汗出自漸消而愈總之斯症當辨經絡虛實標本先後而治不可拘泥

一兒瘡後遍身浮腫咸謂脾虛用六君子湯加芍連芍藥木通腹皮鱗甲澤瀉木香煨薑不効發熱煩渴或謂土燥而又進以燥劑面目浮腫愈甚宜苦寒之劑潤之用芍藥花粉知母黃連柴胡生地菝葜

芩木通漸愈

草藥方 沐洗水腫

河簾草

車前子

野紅花根

芭蕉葉

枇杷葉

枸橘葉

各一

把煎湯浴洗

稠柳餅

治水腫

稠柳子

梗葉似柳七八月採子晒乾

右爲末每用一兩大米粉和作餅蒸熟食之利
腹消愈

腹痛

小兒腹痛有飲食停滯而脹痛有積滯作痛有蟲痛

有火痛有寒痛有虛痛有腸胃中生瘡毒而痛有盤
腸內弔痛不可不辨○飲食停滯而痛者皆由飲食
不節或過餐堅硬之物脾弱不易尅化而腹脹痛也
其候按之堅痛身熱惡食治宜消化之劑香砂丸消
導二陳湯甚則以遇仙丹烏犀丸下之○積痛者皆
由飲食自倍脾虛不運停滯中脘久而成積腹痛欲
便便下釀臭便後痛減或閉滯其症面色蒼黃身熱
不思乳食足冷嗜卧治宜遇仙丹下之下後以小異
攻散和之若成癰痞治見癰條○蟲痛者有蛻垂長
尺許或五六寸居胃脘之間動則吐清涎撲身啼哭

面黃唇白時痛時止治宜安五飲烏梅丸又寸白虫
居腸胃之間動則傷人精氣又有一虫形若絢絲或
飲食中誤吞油髮所變亦居腸中動則腹中刺痛不
可忍皆由恣食肥甘煎燉濕熱鬱遏所致並用史君
子丸又有血鱉動則刺心而痛面黃肌瘦能食皆由
過食堅硬之物不化爲血聚成形漸大而活久則殺
人治宜追亟取積散下之。火痛者口中氣溫面赤
壯熱飲冷治用瀉黃散利之。寒痛者口氣冷不思
飲食嘔逆泄瀉此寒水侮土也治用六君子加炮薑
肉桂甚則加附子。虛痛者消導後其腹尙痛按之

不痛是也。治用小異。攻散補之。若痛連兩脇。乃肝木乘脾也。用四君子加柴胡芍藥主之。腸胃中生癰毒而痛者。皆由脾虛積熱。氣血凝滯所致。方論見外科條。盤腸內弔痛論見前本條。

一女子十五歲。胃脘痛甚。則號哭嘔吐清涎。或半月或月餘而發。患此數年。醫藥不効。余用張義古文錢300三分同好核桃肉半個。油核桃肉半個。同研爛。好酒調下。其痛反甚。痛漸下行。至小腹便行。二次卽愈。此芝田先生傳也。若氣鬱食滯而發者。用傅心錄內治心氣痛藥一服。利下卽愈。此僧徹

空傳也

一兒歲餘號哭不已醫藥不効余謂色脈俱好審其
仰身則哭甚合身稍止活幼曰若嬰兒色脈俱好
而病者必有他故細揣背上微紅腫以手按之大
哭用針撥開摘出乃竹刺也痛定卽安

追蟲取積散 治虫積

牽牛

二兩五錢

雷丸

一兩五錢

木香

五錢

蕪荑

五錢

蓬术

五錢

錫灰

五錢

大黃

一兩二錢

史君子

五錢

樟榔

一兩

乾漆

五錢

右爲末每用一錢好酒調下或麪糊丸麻子大天

明豬肉湯送下大小加減

烏梅丸 治蛻虫動痛

烏梅

三十
箇

細辛

桂枝

黃柏

乾薑

黃連

各一錢

當歸

蜀椒

右爲末酒浸烏梅一宿去核蒸之用米飯搗和光
桐子大每用二十九空心白滾湯送下

諸熱

經曰陽勝則外熱陽虛則外寒陰勝則內寒陰虛則
內熱陰陽相勝則寒熱往來又曰陽不足則先寒後
熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭

也發熱治法宜辨所因有因外感風寒而熱者有感
疫毒之氣而熱者有中暑而熱者有注夏而熱者有
感濕而熱者有驚風而熱者有飲食停滯不化而熱
者有疳積而熱者有五臟之熱有氣虛發熱有血虛
發熱有潮熱有骨蒸熱有表熱有裏熱有癧疹發熱
有諸病後發熱有瘡癆發熱有變蒸發熱○傷風而
熱者頭疼鼻塞聲重喘嗽痰涎惡風手背熱治宜芎
蘇散表散之○傷寒而熱者初發頭疼目痛身體拘
急耳聾脇痛惡寒發熱治宜麻黃桂枝湯表之○瘦
厲而熱者皆由元氣不足感邪疹之氣治宜正氣散

敗毒散十神湯五瘟丹截瘧丹方見十五卷。中暑而熱者長夏濕熱之令人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促乳食不思身熱頭疼自汗煩渴經曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者用清暑益氣湯中熱者黃連香薷飲十味香薷飲夾食者本方加消導藥暑瀉六和湯益元散。注夏而熱者皆由脾胃不足遇長夏潤溽之令則不能升舉清陽健運中氣又少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰四肢痿弱嗜卧發熱精神疲倦飲食少思口中無味小便赤澀大便不調名曰注夏皆由稟元氣不足而然也。

治宜補中益氣湯去升麻加炒黑黃柏麥冬又生脈散主之。感濕而熱者經曰諸濕腫滿皆屬脾土夫濕之爲病有從外感而得者或處卑濕之地而得者或途遇風雨而得者或汗濕沾衣而得者或恣飲酒漿醴酪而得者或多食柑橘瓜菓之類而得者治宜滲濕湯茵陳五苓散差活勝濕湯又曰濕在上宜微汗之在下宜利小便使上下分消其濕自除也故曰治濕不利小便非其治也。驚風而熱者論見驚風條。飲食停滯而熱者論見傷食條。疳積而熱者論見疳症條。五臟之熱者心肝脾肺腎也心熱者

額赤心煩手心熱或壯熱飲水噦惡已午時益甚導赤散肝熱者左頰赤便難轉筋尋衣捻物多怒多驚寅卯時益甚瀉肝散脾熱者鼻赤倦怠嗜卧身熱飲水過夜益甚瀉黃散肺熱者右頰赤手指眉目喘咳日西熱甚瀉白散腎熱者頰赤足熱甚骨蒸如蟲蝕夜間益甚六味地黃丸。氣虛發熱者氣短不續面色青白自汗乳食少思手足指冷午前熱甚治宜小異攻散補中益氣湯。血虛發熱者發熱惡寒兩頰赤色唇口鮮紅四肢無力午後熱甚治宜四物湯又地黃丸滋肝腎。骨蒸熱者身體虛羸遇晚發熱微

汗方止用補中益氣湯加地骨皮青蒿鱉甲又六味
地黃丸主之。潮熱者如潮水之應期而至也有風
寒痘積食痞之分陰陽虛實五臟之異各當詳辨。
表熱者陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱
此皮膚血脉之熱熱在表也壯熱惡風寒爲元氣不
足表虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪客表表之實熱
也。裏熱者以手按之筋骨分則熱輕手則不熱此
筋骨之熱熱在裏也壯熱煩渴飲水溺赤便結裏實
熱也壯熱飲水溺數裏虛寒也。痘疹發熱者呵欠
悶瞀時發驚悸乍涼乍熱兩腮頰赤目淚汪汪噴嚏

昏睡嘔噦搘擗耳聾俱冷也。諸病後發熱者當辨虛實經絡而治之。瘡瘍發熱者論見本條。又有乳母七情厚味飲食停滯遺熱於兒而發熱者或小兒恣食肥甘或衣衾過暖或頻浴熱湯積熱於內而發熱者各當詳之乳下嬰兒當兼治其母又小兒未斷乳母復有孕兒飲其乳肌肉羸瘦髮黃壯熱大便不調名曰駁病又曰繼病令兒斷乳用消乳丸導之小異攻散補之又有變蒸之熱輕則發熱微汗其狀如驚重則壯熱吐瀉煩渴啼哭此變蒸也不須用藥。○凡治諸熱宜用溫平之藥和其裏則體熱自除但

不可用大寒之劑攻之熱退則寒起變爲他症慎之一兒感時氣身熱用發散之劑而熱不退余用甘草芍藥黃芩黃連防風知母花粉元參而愈

滌濕湯

黃芩

黃連

山梔

防已

白朮

蒼朮

青皮

陳皮

赤茯苓

澤瀉

茵陳

猪苓

水煎服

羌活勝濕湯

羌活

獨活

防風

川芎

痘疹專心錄

卷十八

諸熱

七

奇文選

藁本

甘草

黃柏

蘆荊子

痘病

水煎服

諸症項強皆屬於濕諸暴強直皆屬於風症之爲病
濕爲本風爲標然小兒痘病多因驚駭停食或乳母
六淫七情飲食失宜所致更當審之兼治其母若面
目赤色無汗惡寒牙關緊急肢體反張一身強硬痰
涎壅甚小便赤澀終日不甦先譖詬而發者名剛症
風性剛急故也若大便滑泄不語不渴有汗不惡寒
先四肢厥冷而發者名柔症濕性柔和故也並以小

續命湯剛痓去附子柔痓去麻黃若壯熱譫語口渴手足微冷大便溏泄此兼剛柔如無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯若痰壅氣盛用南星半夏茯苓以清痰枳實陳皮紫蘇以順氣熱輕者用敗毒散熱盛者用小柴胡湯剛痓內熱便秘用大承氣湯下之大柴胡湯解之柔痓用附子理中湯溫之六君子湯補中益氣湯補之若延綿則難治也又有大病後筋脈攀急而爲角弓反張此血脫無以養筋不可作風治宜用黃蓍當歸煎亦用四物湯加附子防風羌活

小續命湯

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草

杏仁

防已

官桂

防風

附子

水煎服

敗毒散

柴胡

前胡

川芎

枳殼

羌活

獨活

茯苓

桔梗

人參

甘草

生薑

水煎服

葛根湯

治剛柔症無汗惡寒

葛根

麻黃

赤芍

豆豉

葱白

水煎服或加羌活防風

桂枝加葛根湯

剛柔有汗

葛根

赤芍

甘草

桂枝

水煎服或加羌活防風

諸血

經曰肺朝百脈之氣肝通諸經之血又曰氣主煦之
血主濡之蓋榮血者水穀之精氣也灌漑臟腑調和
百脉若脾胃有傷榮衛虛弱行失常道故血妄行從
胃上溢爲吐血從肺上溢爲衄血又吐咯血者出於
腎也咳嗽血者出於肺也降下則便血溺血未有不

因熱而得也然小兒或稟賦積熱或乳母六淫七情
厚味積熱傳兒或兒恣食肥甘煎燙積熱而致或感
殊厲之氣而血滲溢所致或若重闌暖閣火氣薰逼
不令常見風日積溫成熱所政治法若氣虛者用四
君子補之氣血兩虛者用四物加參术腎虛者六味
地黃丸肺胃熱者犀角地黃丸黃連解毒湯衄血者
此脾胃傳熱於肺而不能統也宜用六君子加甘桔
當歸山梔黃芩吐血者胃中積熱也麥門冬飲清胃
湯犀角地黃丸若血去多煩躁脈洪大按之如絲尋
衣撮空無氣以動乃血脫也經云血脫益氣宜用加

減八味丸又獨參湯加附子便血者糞前見血爲近
血乃大腸積熱也用黃連解毒湯加炒槐花糞後見
血者爲遠血乃胃中積熱用清胃湯久不止者用補
中益氣湯加黃連瀉血者如實熱用清心蓮子飲虛
熱用六味地黃丸若稟父腎燥者用六味地黃丸乳
母積熱者用加味清胃散鬱怒者加味小柴胡湯裏
思者加味歸脾湯俱加漏蘆子母飴服。凡治失血
當審氣血虛實病因隨經施治不可見其血盛以爲
熱劇過投涼藥使血受寒不能歸源而妄流其色紫
黯而凝滯也

一兒痢後脾虛糞後有血久不愈用小異攻散加柴
胡升麻黃連愈

一兒十五歲便血身熱謂腸風下血用生地芍藥丹
皮荆芥苦參黃連條芩十劑愈

麥門冬飲 治吐血久不愈

五味 麥冬 黃耆

人參 生地

當歸 水煎服

清心蓮子飲

黃芩 麥冬 骨皮

甘草 茯苓 黃耆

車前子 石蓮肉

人參 柴胡 水煎服

歸脾湯 治脾虛健忘驚悸憂思

人參 茯神 龍眼肉 黃蓍

棗仁 白术 當歸 遠志

木香 甘草 生薑 紅棗

水煎服

汗

夫汗者心之液內經主於心東垣主於胃蓋心爲君火主熱胃爲中土主濕濕熱相搏爲汗明矣其自汗者無時而出動則爲息屬陽虛胃氣之所司也盜汗

者寢中通身如浴覺而方知屬陰虛榮血之所主也
自汗宜補陽調衛補中益氣湯加麻黃根浮小麥門
冬盜汗宜補陰降火四物湯加黃蓍小麥黃連蓋小
兒氣血未充膚腠未密若厚衣溫暖薰蒸臟腑而生
熱熱搏於心爲邪所勝故液不能內藏薰出肌膚則
爲盜汗也又有傷於冷熱冷熱交爭陰陽不順亦令
睡中汗出其間有虛有實不可不辨。又有脾虛泄
瀉自汗身冷而出有時遇瀉則無瀉過則汗此症大
虛治宜六君子湯附子理中湯主之。有肺虛自汗
因久嗽肺氣虛上壅而汗出治宜補肺調脾爲主。

有慢驚自汗其冷如冰最爲惡候治同慢驚。有客
冒風寒發熱汗出治見傷風條。有因傷風醫過表
散致表虛自汗者宜保元湯主之。

黃疸

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰黃色屬脾蓋小兒
黃疸皆由飲食所傷又濕熱之氣蘊積於脾胃蒸發
而成也其候而目指爪小便偏身着物皆黃是也治
宜去脾家濕熱積滯並補散遇仙丹之類濕甚者茵
陳湯利之又有爪目不黃而偏身皆黃溺赤者乃脾
濕勝而爲之黃病治宜瀉黃散等主之。有病後脾

虛發黃肢體浮腫者宜六君子湯加茵陳主之
茯苓滲濕湯 治小兒食疸

四苓散合平胃散加黃連山梔仁茵陳山楂麥芽枳殼

茵陳湯 治黃疸

茵陳、山梔 大黃

水煎服

瀉黃散 治脾經濕熱

黃連 茵陳 黃柏

黃芩

赤芩 山梔 澤瀉

水煎服

朴硝膏 治小兒大人黃疸

用朴硝四茶匙以雞子一箇攪勻用井水和勻
一碗每日空心服用七服爲率弱者間一日服

草藥方

治大人小兒黃疸

地蜈蚣草

四兩連根

掛山龍草

四兩連根

右剉用白酒連瓶煮熟空心服

小棗丸

治大人小兒黃疸

厚朴

四兩

蒼术

八兩

陳皮

四兩

甘草

二兩

綠礬

四兩透明者以米粉同炒乾

右爲末

棗肉丸如桐子大

每用五十丸

空心清米

湯送下

惡核瘰癧

皆由風熱毒氣所干與氣血相搏鬱結成核如貫珠於耳項之間不消不潰若復客風熱搏於津液則潰化濃血此屬肝膽二經部分治宜滋腎水清肝火皂角子丸柴胡清肝散若因疳積所致用疳積散六味肥兒丸若脾虛而肝木乘之面色青白用小異攻散加蕪荑柴胡川芎白芍若潰而不斂乃氣血虛也用益氣養榮湯外用松香海螵蛸爲末香油調搽

皂角子丸

治肝膽風熱瘰癧

皂角仁

二兩

連翹

八錢

當歸

柴胡

白芍藥

山梔

川芎

膽星

紫背天葵

各一兩

龍膽草

甘草

桔梗

各四錢

皂角膏

貼惡核

大兒莢

去子燒存性八錢

糯米

一合炒褐色

草烏

乾薑

赤芍

各一兩

南星

二兩

右爲末葱酒調塗日易二次

益氣養榮湯 治潰而不斂

參术四物湯加柴胡貝母黃蓍銀花桔梗皂角

刺夏枯草水煎服

時毒

小兒時毒因感四時不正之氣致頭面耳項赤腫寒
熱頭疼狀如傷寒若邪在表用葛根甘草赤芍升麻
牛蒡羌活柴胡防風荆芥薄荷邪在裏用大黃山梔
牛蒡枳殼鬱金升麻或用防風通聖散

耳聾

腎通竅於耳由風邪乘於手太陽邪隨其經入於耳
內邪正相搏氣停聚滯不能聽於聰者也用通鳴散
菖蒲丸又有稟腎氣不足或大病後而耳聾者用六

味地黃丸加黃柏知母枸杞

通鳴散

菖蒲

遠志

柴胡

麥冬

防風

各五錢

細辛

葶苈

各二錢

杏仁

十四粒

磁石

一分

右爲末每用五分食後葱白湯調下

菖蒲九

菖蒲

二錢

巴豆

右研爲劑分作七丸每用一丸用綿裹塞耳內一

日一易

耳內出膿

卷十六

枯礬

海螵蛸

各一錢

麝香

少許

共爲末先以綿撲條子振耳中膿盡摻藥入耳內

齒病

小兒齒病者由風熱邪毒干於手足陽明二經隨經入於齒齦則宣爛臭氣有血或恣食肥甘辛熱而致用清胃湯加石膏又甘露飲又用大皂角一條羊脰骨一具龜以火煅烟盡以盆覆之候冷爲末如常揩牙又方用肥皂一箇去子滿填塗在內炭火燒烟盡放冷爲末揩患處有涎吐出

甘露飲

生地

天冬

麥冬

枇杷葉

枳殼

黃芩

石斛

茵陳草

水煎服

固齒方

七月取旱蓮草連根一觔用無灰酒洗淨用青
鹽四兩食鹽一兩醃三宿晒乾將無油鍋內
炒存性把厚汁漸傾入炒乾爲末擦牙嚥下
亦妙

口疳瘡

皆由胎中受熱或恣食肥甘炙燙積溫成熱熱客心脾薰逼上焦而成口瘡或瘡生走馬甚致齒齦黑爛腮頰穿破治法先去積熱用導赤散合清胃散消毒飲牛黃散中白散若乳母味厚七情致兒爲患者用加味清胃散加味逍遙散俱加漏蘆母子俱服又瘡生於口兩角開口則裂痛此脾家積熱也用當歸散又因滯頤涎從口出浸漬頤口角生瘡用桑根皮汁塗之又殺羊角燒灰臘豬油調塗又因膀胱移熱于小腸膈腸不便上爲口糜消爛用涼膈散牛黃散四順清涼飲

消毒飲

當歸

川芎

生地

赤芍

連翹

山梔

黃連

甘草

水煎服

涼膈散

大黃

朴硝

甘草

山梔

連翹

黃芩

薄荷

竹葉

水煎服

牛黃散

兼治痘疹後口瘡

黃牛糞後尖晒乾地上堆定作屋狀以燈點著

燒至欲過存性益子合定令作黑灰勿令白研爲末二錢牛黃分黃柏末二錢共和勻爲末敷之

解顱

解顱者兒生下頸大頭縫不合如開解腎主骨而腦爲髓海腎氣有虧則腦水不足故不合也故曰人乏腦髓如木無根不違千日終爲廢人此乃無辜之疾治之何益錢氏用六味地黃丸調元散仍用南星末調傅以紺帛焙熟貼之

調元散

人參

茯苓

山藥

白朮

白芍

地黃

當歸

川芎

甘草

水煎服

顙填

顙填者顙門腫起也由乳哺不節飢飽失時或寒熱乘於脾胃致臟腑不調其積熱氣上冲于腦故填脹顙突而高如物填其上也治宜大連翹飲又封顙散掩之

顙陷

顙陷如坑者由病久氣血虛弱不能上充於腦髓也治宜固真湯又狗骨炙爲末雞子清調敷之

天柱骨倒

天柱骨倒乃項軟也由真氣虛弱客邪侵襲風府傳於筋骨則項軟垂下而無力也治宜祛風散調元散又地黃丸加鹿茸牛膝又附子南星等分爲末薑汁調貼患處

祛風散

防風

川芎

白芷

黃芩

細辛

甘草

羌活

薄荷

當歸

水煎服

五軟

五軟者頭軟手軟肌肉軟脚軟口軟是也皆由胎氣
不固生下精髓不充又爲六淫所襲而爲之也。頭
項軟者腎主骨腎虛所致也或因吐瀉久脾弱而得
者補脾胃爲主大君子湯加肉桂炮薑風邪侵襲者
祛風爲主。手軟者兩手筋縮不能舒伸無力以動
也宜薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活荆芥等分
爲末蜜丸芡實大白湯化下。腳軟者骨髓不滿氣
血不充筋弱不能束骨而行遲也宜地黃丸加牛膝
五加皮鹿茸虎胫骨爲主。身軟者肉少皮寬飲食
不爲肌膚也宜補脾胃爲主。口軟者心神不足則

舌本不通而不能言語也宜人參石菖蒲麥冬遠志川芎當歸各二錢乳香硃砂各一錢爲末蜜丸米湯化下又有稟氣不足則髓不能充骨而齒不生者宜補腎丸又十全大補湯加知母黃柏主之

五硬

仰頭取氣動搖難氣壅疼連胸膈間脚手心如冰冷硬斯爲風客命懶還又曰肚大青筋急不寬積氣消除便卽安只恐面青心腹硬縱投羌活散難痊

龜胸

此症皆由客感風熱凝泣爲痰停滯心胸咳嗽喘促

肺氣脹滿攻於胸膈而漸成龜胸治宜寬氣化痰爲主或乳母過食辛辣或夏哺熱乳亦成斯症

龜背

此症皆由小兒失於護背客風吹背傳入於髓故背突如龜殼之狀或強令坐早或咳嗽久肺虛腎無生氣腎主骨風寒乘虛而入於筋骨其邪凝滯精血不能流通故背骨凸出而跔治法先驅風健脾兼滋陰壯水爲主得肺氣足而生水精髓固而流通則愈終不能脫然如故

重舌木舌

重舌者近舌根生形如舌而小也木舌者其舌腫硬漸漸粗大塞滿於口皆心脾極熱而然也用朴硝紫雪白蔻全研每半錢竹瀝井水調敷

重脣重齦

重脣者口中上脣薄皮腫起如囊盛水。重齦者牙床腫起如核是也以針刺破去血用蒲黃敷之

滯頤

滯頤者涎流出而瀆於頤間也脾之液爲涎脾胃虛冷不能收制其津液故流出於頤也溫脾丹主之

溫脾丹

半夏

丁香

木香

各五錢

乾薑

白术

陳皮

各二分

錢

右爲末糊丸黍米大一歲兒十九米湯送下

鶴膝

此候稟受腎氣不足血氣不充故肌肉瘦瘠兩腿細小其膝腫大伸屈艱難如鶴之狀故曰腎虛則精髓內耗膚革不榮易爲邪氣所襲治宜驅風散又地黃丸加牛膝鹿茸主之又有瀉痢久而爲是症焮腫紅赤作痛成膿以補中益氣湯固脾土爲主愈又有腫硬不痛色白者不治也

便濁

白濁者尿白如米泔狀也因乳輔不節致傷脾胃故清白不分而溺白也久則成疳治宜人參甘草當歸木通豬苓赤芍赤茯苓青皮川草薢主之如赤濁者心熱下流滲入於泡治用生地黃小薊木通山梔赤芍滑石甘草黃柏淡竹葉赤茯苓車前草葉水煎服○有脾虛食積濕熱下注而小便如泔者醒脾丸主之又四味肥兒丸

遺尿

腎主水與膀胱爲表裏經曰膀胱者州都之官津液

藏焉腎與膀胱之氣虛寒不能約制津液故瞞中遺出或常常遺出不覺內經謂膀胱不約爲遺溺用破故子散雞腸散若脾肺氣虛者用補中益氣湯加破故子山茱萸若稟父腎與膀胱虛者用六味地黃丸破故子散

破故子爲末每用一錢白湯調下

雞腸散

雞腸草

一兩

牡蠣

三錢

龍骨

肉桂

桑螵蛸

各五錢

水煎服

諸淋

淋者腎與膀胱熱也二經相爲表裏俱主水道水入小腸下行於胞則爲溺若膀胱熱則津液內涸水道不通則小便淋漓小腹引臍連莖中痛也夫淋有五沙淋者腎主水水爲熱結化爲砂石內塞水道痛引膀胱沙出痛止用五淋散氣淋者肺氣壅熱小腹脹滿小便澁滯而痛宜清肺爲主血淋者心熱血散失其常道滲溢入胞五淋散加小薊滑石車前子寒淋者膀胱氣冷與正氣交爭寒氣勝發寒戰而後溺八味丸正勝則寒戰解而溺而出少澁小腹連莖中痛甚者溺白如膏一名膏淋六味肥兒丸若因乳母情

慾厚味積熱傳兒爲患者用柴胡梔子散柴胡清肝
散加味清胃散若稟腎熱爲患者先用五淋散又滋
腎丸地黃丸又心熱者用清心蓮子飲腎熱者六味
地黃丸肝熱者柴胡梔子散脾熱者瀉黃散脾虛者
小異攻散脾氣下陷補中益氣湯肺實熱者瀉白散
肺虛熱者小異攻散加炒黑山梔此五臟蓄熱所致
而治也甚不可輕用寒涼之藥以損胃氣

柴胡梔子散

柴胡

山梔

丹皮

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡

甘草 水煎子母金服

柴胡清肝散

水煎子母金服

柴胡

黃芩

膽草

川芎

芍藥

山梔

連翹

甘草

漏蘆

水煎服

加味逍遙散

當歸

甘草

芍藥

茯苓

白朮

柴胡

丹皮

梔子

漏蘆

水煎服

加味清胃散

升麻

生地

丹皮

黃連

當歸

柴胡

山梔

水煎服

五淋散

赤茯苓

赤芍

當歸

甘草

山梔子

燈心

水煎服

瀉黃散

藿香

甘草

山梔

石膏

防風

水煎服

茯苓散

治小兒白濁

三稜

蓬术

砂仁

赤苓

各五錢

青皮

陳皮

滑石

甘草

各一錢
五分

右爲末每用一錢燈心湯調下

君朴散 治白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子

厚朴

黃連

各一兩

木香

三錢

右爲末每用一錢米湯下

大便不通

小兒大便不通乃肺與大腸有熱熱則津液少而便秘用四順清涼飲又潤燥丸潤字丸若積滯不通者遇仙丹血虛燥熱不通者柏子仁膏若乳母情慾鬱火或厚味積熱傳兒爲患者用加味清胃湯加味逍

遙散子母並服若稟賦怯弱而便難者用六味地黃丸

柏子仁膏 治大便不通

柏子仁

松子仁

胡桃仁

各等分

右研膏如彈子太白湯化下

通聖餅 治大便小便不通

黃連末

一錢

巴豆

五粒

獨郎蒜

一顆

鹽

五分

皂角末

一錢

右研爛捻餅子寸半闊貼臍上立通

又方

用桐油子大便不通酒磨大頭小便不通酒磨

小頭酒化下卽通

小便不通

小便不通由肺燥熱不能生水治當清肺中之熱而滋水之化源用黃芩黃連天花粉知母麥冬茯苓木通甘草若脾濕氣不升治當健脾土而生肺金治先瀉黃散又六君子湯若膀胱有濕澀其流用金沙散木通散五苓散加木通車前子若脾胃氣虛不能通調水道者補中益氣湯加內桂若稟腎虛陰燥者六味地黃丸若乳母厚味積熱者加味清胃湯子母並

服一兒脾虛痞滿小便不通用白术澤瀉人參茯苓
滑石愈

一兒小便赤澁煩躁睡臥不寧謂心經壅熱用導赤
散加黃芩麥冬赤茯苓竹葉煎服愈

一兒十五歲怔忡夢泄面白肌瘦用補中益氣湯加
麥冬遠志黃柏又六味地黃丸料加黃柏牡蠣間
又服佛座鬚丸漸愈

郁李仁膏

郁李仁

研

兩

滑石

研

兩

大黃

炒爲末

一兩酒

右和研丸黍米大每用二十丸薄荷湯下

痘瘻傳心錄 卷十八
木通散 治小便不通

木通 滑石 牽牛 燈心

葱白 水煎服

金沙散 治小便淋瀝不通

鬱金 海金沙 滑石 甘草

燈心 地膚子 木通 水煎服

又方 治小便不通

麝香一分葱白頭 馬蘭頭 食蓋

右藥用田螺肉同搗爛作餅貼臍中卽通

治小兒小便脹

用蚯蚓糞爲末煎甘草汁調塗上

又方

用人屎或狗屎燒灰存性爲末香油調塗
佛座鬚丸 專治夢遺

茯苓

一兩

黃柏

四兩

砂仁

遠志

猪苓

八錢

茱萸肉

蓮鬚

菟絲子

各七錢

甘草

八錢

右爲末山藥糊丸梧子大每用三錢空心白湯下

諸瘡

小兒瘡疥由乳食失節或早嗜肥甘煎燙或外感六

淫臟腑積熱或乳母厚味辛辣七情內火所致當分
表裏虛實標本調其氣血平其所勝切不可用寒涼
化毒之劑有傷真氣嬰兒當兼治乳母爲上若偏身
肥瘡脹痛膿水淋漓肢體虛浮此肺脾濕熱也用瀉
黃散四順清涼飲水銀膏若瘡癩乾癧爬搔不寧此
風熱與血熱相搏用柴胡清肝飲當歸和血飲大風
子膏又頭瘡常有膿血濕汁經歲不愈用松香苦參
黃連各五錢大黃胡粉水銀枯礬蛇床子各三錢爲
末臘猪油調搽

附胎毒瘡

胎毒之由皆娠母情慾

七清六慾

妄動辛酸煎燉多嘗蓄

毒傳於胎中嬰兒其毒未有中而不發雖至貴至賤
莫不皆然若其發也或爲胎剝或爲疥癬或徧身膿
瘍糜潰成片或胎毒流注或丹腫遊風或徧體紫黑
等症名各不一。稟元氣足者雖毒熾能易化解稟
元氣弱者毒雖輕而難治也大法當察其稟之厚薄
毒之淺深解利爲主犀角解毒湯合導赤散蓋解利
之藥性清涼而滑潤亦有宜過投何也曰乳兒未受
穀氣如萌芽嫩脆稍有不謹遂成泄瀉難以救治故
首尾用藥宜固正氣爲主兼利水益脾隨症活潑斯

爲王道。亦有乳母素有鬱熱或亦恣食辛辣煎炒生冷雞魚等發物流入乳中令兒哺之血熱相搏發爲瘡腫等症治宜散解乳母之蘊熱兒亦服之可也故經曰母安則子安母病則子病

一兒生下赤溜余用乾荷葉爲末乾摻之如乾用香油調搽

一兒患赤遊丹腫余以磁針砭出惡血以前方治之愈不則延入腹者不治

一兒患胎毒流注余先以發解之劑起者以鐵箍散圍之將起者玉露膏散之又以參耆托裏散成膿

痘化愈

一兒患痘如前只以涼藥塗之腫雖退毒倒陷嘴脹
搐搦而斃。啟雲先生謂胎毒瘡不宜服藥乳母
調適得宜乃不藥之藥也余嘗徧告於人不與藥
用余之言無不皆愈儒門事親曰噫班固真良史
嘗云有病不治得中醫若病久漸至衰羸當合宜
而治不可拘泥。

一兒患胎毒瘡發解太過有傷胃氣或以湯藥敷洗
瘡雖愈毒反內攻喘脹而卒。有胎毒瘡久而收
於滿頭連額有痂或成黃膿何也蓋頭者諸陽所

會之處洪範五行火曰炎上熱毒上攻兩陽相灼而然也法當解陳莝之積熱道心經之煩燎斯可矣百解散合五和湯及四黃散敷之愈

一兒患胎毒瘡徧體潰爛余以甘草苦參防風煎湯浸青布衣二領晒乾令兒換著身上內服清解之劑愈

一兒患胎毒瘡久稍愈面色枯白瘡痕少神余謂毒盡外出宜補益之否則元氣脫絕慢脾不治以保元湯加當歸芍藥金銀花治之而愈

一兒患胎毒瘡頓然而愈驚搐喘脹咸謂夾食驚風

用涼驚消食藥治之愈甚余謂瘡毒倒陷以和解湯治之其瘡復發諸症悉平但面白少神肌肉羸瘦乳食不化謂中氣不足以保元湯合四君子湯加防風金銀花固中氣爲主其瘡收至頭上又犀角解毒丸漸解而愈一有不從前治喘脹而卒一有瘡雖發外不以調補漸爲疳症不治

胎毒發丹

皆由胎毒內伏或頻浴熱湯或久卧火坑或乳母過食煎燂辛辣或七情內鬱助邪爲患或發於頭面或發於四肢胸背色赤遊走不定治以砭出先宜發解

必犀角消毒丸大連翹飲中病即止

一見患此乳食如常二便清調余謂毒盡出於肌表宜砭出毒血自愈不從外敷內服皆寒涼藥反毒內攻喘脹而死

一見患此外勢雖輕二便秘結乳食減少余謂毒在臟以百解散發出其勢雖重而內症悉平以大連翹飲及砭法愈

砭法 令口吮毒血各聚一處用磁鋒以筋頭劈開夾之用線縛定令磁芒對聚血處再用筋頻擊刺出毒血爲妙如患在頭者用針挑患處出血爲妙

遲則入腹入腎難治矣

大凡胎毒瘡腫等症當分陰陽虛實而用內治之法不可槩以寒涼敷塗之藥蓋曰血氣得寒則不能運行毒凝滯而不化也

一兒胎毒發赤遊丹腫先百解散發之頭目皆腫又犀角荆芥防風甘草牛蒡子赤芍愈

一兒百日內胎毒發丹腫傳過咽項耳後項上出膿用犀角消毒飲愈

一兒患胎毒偏延頭面赤腫用敷藥塗之火毒入目其目珠突出而瞎

一兒患此以敷藥塗之腹脹喘搐而死

一兒患症似前用百解散而復赤腫用犀角解毒丸加人參愈

一兒傷食發丹大便秘結用保和丸四順清涼飲通之愈

一兒因乳母食炙燂辛熱致兒爲患者用加味逍遙散加味清胃湯母子並服愈

柴胡清肝飲 治肝經風熱瘡毒

柴胡 丹皮 茯苓 山梔子

川芎 白芍 當歸 半夢子

甘草

連翹

水煎服

當歸和血飲

治瘡疥

四物湯加連翹牡丹皮荆芥防風

加味清胃湯

升麻

丹皮

生地

黃蓮

當歸

柴胡

山梔

水煎服

犀角消毒飲

犀角

生地

當歸

赤芍

荆芥

防風

連翹

牛蒡

丹皮

黃芩

甘草

薄荷

水煎服

赤遊火丹

此候皆由內有積熱薰發於外被風熱毒之氣所干
搏於血氣則皮膚赤腫行走不定若重者隨血氣虛
處則流注焮腫赤色如火灼或成膿或疽毋愛食煎
燄辛熟致見患此若遊走入腹入腎亦能殺人宜速
治之用升麻黃芩連翹大黃朴硝水煎服又方用鬱
金桔梗花粉甘草葛根薄荷煎服或用犀角消毒飲
又方用生地赤芍當歸川芎荆芥防風黃芩煎服又
方用慎火草杵爛敷之又方用馬齒莧杵爛敷之又

方螺螄肉搗爛絞汁塗上或冰片苔敷上又藍葉杵爛敷上○又有風塊遊走徧體或赤或白或痛或痒由風熱毒於氣血相搏而生也用升麻葛根湯加荆芥薄荷

癰瘡

癰瘡俗名痞子其狀如粟粒芥子色赤而痒搔之亦能成瘡夏月多生頭面或徧體皆由盛熱汗出而腠理開被風熱毒氣干於氣血而生也用冰片一分黃柏五錢白麪二兩臘茶一兩俱爲末以新綿搘藥撲破者敷之

黃水瘡卽浸淫瘡

皆由濕熱與氣血相搏而其瘡初生碎小後有膿汁
浸淫漸大膿汁著處便濕爛成瘡用二黃膏松香散
敷之

二黃膏

雄黃

雌黃

川烏

松香

三錢俱爲末

亂髮

一團燒灰存性

布以猪油六兩熬次入下三味煎至髮消盡以綿
濾去滓入二黃攬匀磁器盛之塗瘡上

又方

松香五棓黃連海鰓鮑黃丹輕粉雄黃等分爲
末摻之如乾臘豬油調塗

天泡瘡

由風熱毒氣客於皮膚搏於氣血而生始生如湯盪
作泡皮破漿出成瘡用地黃膏塗之

地黃膏

生地

升麻

藍葉

山梔

大黃

各一兩

右剉用豬油八兩文武火煎色變濾去渣磁器盛
之塗患處

卷十一
又方

柏葉搗汁半盞水解服之

又方

用滑石青黛黃柏甘草各爲末敷之乾則以柏葉汁調塗

湯瀉火燒成瘡

切不可用冷物泥塗之恐令熱氣不出伏濬潰爛深傷筋脈用小粉炒黑爲末麻油調塗又用風化石灰炒黃色地上出火毒麻油調塗 又方先以好酒冷洗用雞子十個煮熟去白以黃炒焦黑瓦油一盞用

生大黃末二兩調勻塗上 又柏子房爲末麻油

調塗

撲障損傷

人之氣血循身周流而無停止小兒有因墮床或高處墜下或打撲損傷致血氣失度隨損處瘀凝不散致寒熱疼痙舉動不能用活血散復元散如折傷用乳香沒藥紫木香臘糟雄雞熟血調攏紙上貼患處以布包外又以杉木薄板夾定又用布緊縛之骨折如舊

活血散

當歸

紅花

桃仁

甘草

柴胡

大黃

生地

蒲黃

水煎服

復元散

土鼈蟲

不拘多少用
茅麻線縛定
將黃泥包

在內以
火煅

紅花

爲末五分
大仙人柴

火煅醋淬爲
末五分古文錢火
煅爲末一錢

自然銅

火煅三次爲
末五分

乳香

沒藥各五分
爲末

右和勻每用二分空心好酒調下小兒一分

又方

半兩錢

不拘多少火煅
醋淬研細

麝香

少許

右共爲末每用一分好酒調下

治跌傷 用五爪龍草葉搗爛酒漿和貼

附驗方

巨勝子丸 補養氣血添精固髓久服種子

胡麻

揀淨不見水酒淘淨
黑豆上蒸九蒸九晒

生地

酒拌九蒸九晒

菟絲子

去沙酒洗淨童便浸二日搗爲餅晒乾

肉蓯蓉

去中心膜焙乾

枸杞子

人乳浸蒸焙乾各十兩

破故子

水拌炒五兩

杜仲

五兩去皮蜜酒炒去絲童便浸鹽酒炒去絲

茯苓

二兩五錢人乳拌蒸

當歸

二兩五錢酒洗焙乾

牛膝

五兩酒洗焙乾

麥冬

一兩五錢去心焙乾

五味子

一兩五錢敲碎蜜拌蒸焙乾

人參

中年四兩少年二兩童便浸焙乾

附子

防風煮透用濕紙裹慢火煨之

何首烏

上蒸豆熟爲度去豆晒乾如此九次晒

乾爲末少年不用

右爲末蜜丸如梧子大

每用三錢空心白湯下

治腎虛腰痛

杜仲四兩

鹽水炒斷絲

破故子三兩

鹽水炒焙乾

川草薢四兩

製米泔酒薑汁各浸一宿

胡桃肉八兩

湯泡去皮再研

右爲末粘米糊爲丸如梧子大每用三錢空心鹽湯送下以食壓之

萬應奪命散

治瘡疽發背疔瘡無名腫毒喉閉

乳香

置竹筒內煮
自然去油

沒藥

製全上

丁香

木香

苦丁香

麝香

各一錢

牛黃

蟾蜍

各五分

血竭

二錢

巴霜

五錢

右爲末酒漿糊丸如黍大壯實人每用九厘瘦人七厘小兒三厘臨卧用溫酒送下便利三四次愈

八味蠟礬丸

治瘡疽發背疔瘡無名腫毒喉閉

明礬

一兩

蜜蠟

一兩

牛黃

各一分

乳香

沒藥

硃砂

各五分

真珠

先將蠟溶化離火下衆藥和勻衆手急爲丸梧子大每用十九丸加至二十九溫酒送下日進三服治驚風痰涎壅盛兼治瘧痢

麝香

三分

牛黃

巴霜

砂仁

真珠

各五分

辰砂

三錢留一半爲衣

滑石

三錢水飛

右爲末飯丸如麻子大辰砂爲衣每歲二三丸薄

荷湯

下

截瘧方

大南星二個根上各挖開一孔用白砒末四錢置孔內兩星孔口對合以線扎定泥封固炭火

煅存性去泥爲末用細茶白扁豆蔻豆粉各一
兩飛羅麪和爲丸黍大碌砂雄黃爲衣每用二
分臨發日五更送下

治痢疾 初起服之積盡卽愈

雁蕩僧傳

大黃

肥皂肉

各一觔用好酒五觔
煮乾再焙乾爲度

右爲末黃米糊丸如小豆大每用四錢空心生薑
湯送下好酒亦可大小虛實加減

治疝氣偏墜小腸氣

薔薇子

黑丑

疏黃炒

荔枝肉

大橘核

川練子

各一兩

吳茱萸

大茴香

檳榔

枳殼各五錢

木香三錢

右藥共爲末神麴糊丸如梧子大每用二錢空心
薑湯送下

真珠丸 治遺精白濁

真珠

一錢

玉蛤蜊殼

四兩

黃柏末

四兩

知母

四兩

水炒

鹽

右爲末蜜丸梧子大青黛爲衣每用二錢空心鹽
湯送下

治善貢頭

一名軟瘡

菜油

一兩

黃蠅

五錢

瀝青

一錢

黃丹

五分

羊骨髓一具

右藥同沙鍋內熬成膏紙上攤貼

又方

用鱉甲殼爲末飛麵和勻醋調塗上或用千搘膏貼之

治凍瘡 多生兩耳手足

黃柏

白芨

白斂等分

右爲末先以童便洗淨以麻油調塗

治陰囊生瘡痒搔黃水出

礬

燒枯

五棓

細茶各等分

膩粉少許

右爲末先以醬水葱白川椒煎湯洗之用藥敷上
又方

黃連

胡粉各一兩

枯礬

右爲末敷之

治面上生瘡如火燒兼治火丹

冰片三分黃柏末七錢

輕粉三錢

右爲末淨猪膽調塗濕則乾摻

又方

用鯽魚頭燒灰研末醬油調塗如出黃水乾膠

上一日一易

治小兒口傍生瘡

枯礬

蛇床子

髮灰

黃連

故絮灰等分

右爲末敷上

治咽喉一切諸病

五月五日午時取蝸牛十四條同陳白梅肉一
兩研爛入大黃末礬燒火馬勃末各一錢研爲
丸如圓眼大每用一丸綿裹含化下或以淨水
磨化灌之

治蛇咬

以人屎厚敷之用綿裹卽消

治蜈蚣咬

以醋磨生鉢汁塗之

治天蛇頭

蜈蚣 全蝎 雄黃等分

右爲末 油調敷

治汗斑

礬 磷 貝母 硫黃

右等分爲末薑片蘸藥擦

又方

密陀僧海螵蛸硫黃等分爲末薑片蘸擦

犬咬

先以小便洗用瓦上青苔屑按患處或牛糞塗之

杖瘡

大黃末水楊根蚯蚓如無用田螺肉同搗爛用白蘿蔔汁調以鴛羽擔上不可用熱湯浴又不可用冷藥

治刀斧傷

五月五日午時採芝蕨葉連根葱薑鹽醬石灰

花椒一同搗爛如泥作餅貼壁上候乾爲末聽用

治赤鼻

枇杷葉 白蘋肉 芽茶

芭蕉葉各四兩

右爲末密丸如黍大每用二錢白湯送下

又方

用明礬如米大每用八分空心白湯送下

治詐腮 即腮腫

用薑汁猪膽好醋濃磨京墨頰塗患處使半一

日不乾立退

加味逍遙散

當歸

甘草

白芍

白术

茯苓

柴胡

丹皮

山梔

生薑三片水煎服

痘瘡傳心錄卷之十八終

痘疹傳心錄卷之十九

附種痘

朱純嘏輯

瘦樵程永培校

痘疹原於胎毒

易曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生夫乾爲父資始者氣之始也坤爲母資生者形之始也人之受氣于父成形于母是父精母血之毒已凝結于陽施陰受之時故曰胎毒不論富貴貧賤毒皆有之及兩間之雜氣交攻于五臟夫然後命門之胎毒外透矣始焉一點紅者血之色也血本水也天一生水地六成之水屬北方之坎在人身卽腎也腎水充足

而更得水火土金之氣相長相養而成氣與血焉是血之源子腎也明矣雖分屬于心生血肝藏血脾統血籍令腎中水枯則心何自而生肝何得而藏脾何從而統哉合之五臟同一氣血也故痘出齊之後次第起發其漿漸充漿者毒之所化也迨膿成則毒解矣漿轉褐色回水結痂之候痂結蒼蠟色此一十二日之成功也俗不論陰陽五行之正理且曰惟腎無候又曰痘之變黑始歸腎也此皆不經之談予不得已故著說以辯之

種痘採痧法

凡採痂須擇極順之症其險症逆症之痂斷皆不可用若春秋二季一月之痂可種若夏五六月半月之痂可種冬月嚴寒四五十日之痂亦可種蓋以寒則氣聚熱則氣散故有不同耳

凡一歲之兒女可用痂三十粒於淨磁鍾內以柳木作杵研此痂爲細末用潔淨棉花些須又用潔淨之水春秋溫用夏則涼用冬則略帶熱用滴三五點於鍾內乾則又加幾點總以研勻不乾捏成棗核樣以紅絲線拴定約留寸許長餘則剪去納於男左女右之鼻孔內線露在外以防吸上未滿一歲者種六箇

時辰取出若二三歲者十箇時辰取出卽十二箇時辰亦可

種苗取出後約計五日而五臟傳遍至七日身必發熱發熱三日苗必現焉見苗三日而出齊出齊之後痘必次第長漿漿長三日而膿漿充足旣曰足漿則回水結痂之候也以發熱三日應天時正二三月春令發生之時見苗出齊應四五六月夏令長養之時長漿足漿應七八九月秋令成熟之時回水結痂應十月十一月十二月冬令收藏之時也若未出齊以及灌漿未足不妨多一日以象閏月此在人神而明

之也

續補種豆之法乃後人之變法也其法造一銀管約長五寸其管之孔略小于鼻之孔可以入得鼻內先著痘痂末於管內對上鼻孔輕輕吹入鼻中此續補之一法又有以出痘之衣當長漿足漿三四日內痘氣充盛取其貼身裏衣與未出痘之兒女穿二三日夜間亦不脫下至九日十一日始發熱曾見七日發熱者十中不過一二此乃衣傳然恐氣薄不透多有不熱不出若夫狂妄之輩挑破痘漿而作種者此乃不仁之人所爲也

其種痘之法總以上好痘痂爲之藉其天地陰陽之正氣以氣相傳順而又順凡一切麝香等味俱不用謹記謹記

痘苗取出三五日之後男左女右頸項之下與咽喉相隔不遠微有小疙瘩此痘苗將發之候也然此說不可一槩而論亦有無疙瘩者其苗亦發若痘長漿之時必用藥催漿得漿充足疙瘩自消散若消散不盡勢必凝結而爲痘毒矣

凡種痘甫及一歲者爲上若長至五六歲知識漸開未免任其性情不依調理不肯服藥難於種痘學種

痘者當先知之

凡所種之幼稚男女必要辨別其精神夫所謂精神者面部有精采喜色明亮透達印堂山根年壽無青暗之色滿面紅光純粹者吉所謂神者兩目視瞻平正愈看有神至於神之完固乍見奇異而不驚就看熟識而必要神情安逸嬉笑自如更兼目有精光者吉若目無神思昏蒙倦怠者不種更要詳察其形氣夫所謂形氣者頭面胸背手足形也體之各具者也必要詳看其骨肉相稱肥不見肉瘦莫露骨肉色要繁微帶紫黑色者吉若鬆寬如發麪樣者不種所謂

氣者體之充也天柱端正頸不歪斜手執物件把持
有力站立懷中脚不倦怠小便遠而長腎囊緊小微
帶紫黑色如荔枝殼者吉若形氣倦怠呼吸之氣不
均勻出入粗細不一者不種曰無神者面無喜
色者皮肉如發麪樣者形氣瘦弱者內有疳
積者病後虛弱者吐瀉繼愈元氣未復者渾
身有疥瘡者生大毒正氣未復者聲音不亮并
不長者俱不可種

辨別七暈論

痘出而根脚有暈其名有七焉辨之不可不早也痘粒之尖圓者氣充也實也痘粒之平塌者氣弱也虛也若以暈言之老紅也紅紫也紅紫乾枯也淡紅也焦紅也鋪紅也淡白也此七暈之分別也其中有順陰逆之分焉

老紅者暈色紅而老不嬌妖也不閃爍也不乍紅而乍淡也亦不帶紫也此老紅之暈必發熱三日而始見痘苗也身體必平和不甚熱也必能飲食也二便必調也精神必清爽也此順症也痘出必稀疎卽多

有百十粒亦順症也

紅紫者痘色深紅而帶紫也必發熱二日卽見痘苗也身心熱微煩燥也當以敗毒和中散主之看其出齊卽用清毒活血湯催其長漿漿足亦歸於順

紅紫乾枯者初見痘苗卽見如此暈脚其症多係逆症必發熱一日卽見痘苗報痘必稠密必大熱蒸蒸煩躁昏沉不省人事唇焦口渴此危症也其症多不可救若大便結燥二三日不解小水短澀又黃此毒火內盛急宜下之以清其毒火仍宜用敗毒和中散加熟大黃以利之毒火必從此而少減看其出齊卽

以清毒活血湯催其長漿向之所謂紅紫乾枯者今
見根脚紅活漿在汎起此尙可救若仍復乾枯不見
起長不見泛漿加之身熱蒸蒸煩躁頓悶譫語皆沉
不省人事不思飲食痘乃平塌中有黑臍此必不可
救也

淡紅者量脚四圍淡紅有嬌燒之色以紙燈照之若
有紅色若紅色不定將來必變淡白色此乃氣血俱
虛若初見痘苗之時見此淡紅量脚寒涼之藥切不
可用倘或身不退熱微有煩躁宜用敗毒和中散去
芩連紫草茸加羌活蘇葉白芷以托其苗俟其出齊

以千金內托散催其長漿漿足仍歸於順若先悞用寒涼量轉淡白急用參歸鹿茸湯以救之緩則成灰陷矣此淡紅之量易於變淡白不可不知

焦紅者初見痘苗頂乃先焦根脚紅紫有芒角不見滋潤暈脚不圓且又帶紅紫乾枯此乃毒火內盛若初見痘苗急用敗毒和中散倍加芩連紫草茸以托之俟其出齊熱不減不能食兼之神昏不省人事煩躁頓悶水漿不入則不可救矣倘或熱少減神氣稍清能食不甚煩躁急以清毒活血湯催其長漿若漿足仍可歸順此在神而明之存乎其人也

鋪紅者痘無紅暈痘粒淡白通身皮肉盡紅故名曰
鋪紅良由毒火內盛氣不能統血散漫於皮膚之間
也若神清能食痘稀疎者可治若人事昏沉則不可
救矣

淡白者痘之根脚四圍無一絲紅色止見有淡白之
痘而亦不見其有暈也蓋因氣血兩虛或因久病之
後或因吐瀉之後或因生母有病以致折乳或因內
有積患或因生大毒膿血出多元氣傷洩之後故出
此淡白之痘初見痘苗宜用加味參蘇飲以托之俟
其出齊卽用千金內托散催其長漿如或漿不足卽

用參歸鹿茸湯以催之今日不足來日再催予曾治此等氣血兩虛之症竟至一十二日成滿漿者今之庸醫見八九日漿不滿而平塌者盡委而去之皆因內無學問知識平常未見久吾聶氏活幼心法之書又不能親敬高明未免自以爲是予業痘疹有年此七等之暈辨別極其詳細得之於心而應之於手雖前哲未曾分晰明言今特表而出之以開示後學沉潛玩味廣其知識一臨此等七暈之症內有一定之主意外用合宜之藥味舉斯世之幼穉咸出險途而躋壽域豈非仁人君子之存心哉

逆症一十三條論

蒙頭一也面部身上及手足俱稀疎獨頭上以至髮際形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

蓋面二也他處俱稀疎獨面上形若蠶種無絲毫空處此逆症也若稠密有地界又當別論

托腮三也他處俱稀疎獨兩腮頰及地角相連一片形若蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

鎖項四也他處俱稀疎獨項間形若蠶種無絲毫空處此逆症也若稠密有地界又當別論

雲錦鋪胸五也他處俱稀疎獨胸前一處上連咽喉

之下下及兩乳之間形若蠶種此逆症也若稠密有
地界又當別論

雲錦鋪肩六也他處俱稀疎獨兩肩及後頸窩形若
蠶種此逆症也若稠密有地界又當別論

前後補服七也他處俱稀疎獨心窩之下肚臍之上
脊背鳳翅骨之下脊後腰之上前後如職官穿補服
樣或方或圓一片形若蠶種此逆症也若稠密有地
界又當別論

斷橋八也他處俱稠密不分地界獨脊背腰之上下
及臍之上下前後不見痘粒此逆症也猶橋之有染

而中斷也若上下別處所出之痘有地界猶可望生
又當別論

鼈瘡癰九也徧身上下痘出稠密不分地界惟胸腹
之間不見痘粒有似於鼈瘡形狀故名鼈瘡此逆
症也若稀疎又當別論

無根十也通身上下痘俱稠密不分地界獨兩手心
兩足心無痘蓋以手足爲諸陽之本陽絕則兩手心
兩足心皆不出痘此逆症也若通身出痘稀疎又當
別論不得拘泥於此也

枯樹挂蛇十一也有單挂有雙挂有挂在手肱者有

挂在腿股者他處俱稀疎獨挂處如蛇形而纏繞之密如蠶種此逆症也倘稀疎有地界又當別論
束帶橫腰十二也他處俱稀疎獨後腰及腰周圍如束帶形密如蠶種闊不過二寸此逆症也倘或稀疎
又當別論

形如瓜瓠十三也痘初見標尙未出齊以及將出齊之際痘未見起發而面部腮頰以及兩目俱皆腫脹形如瓜瓠此毒氣內盛先攻脾肺此逆症也煩躁頓悶昏沉不省人事者決不可救

痘分十二論

治痘計日有一十二日之期乃按天時十二箇月令也其中有至理存焉發熱三日應天時正二三月也見苗以至出齊應四五六月也長漿以及足漿應七八九月也回水結痂應十月與十一十二月也此一定陰陽造化之權衡也世人不明陰陽造化之理而乃除去發熱三日不算乃於見痘苗之日算起乃曰出三日長三日灌漿三日回水結痂三日是將十五日作十二日也何其不明之甚也若曰出三日者無大關係猶可混得過去若謂長三日則長何物殊不

知長者長漿也旣云長漿又曰灌漿不亦重疊而言之乎庸醫執此當長漿三日之際總不言漿且曰長得痘之顆粒好亦不用藥催漿及後面部轉褐色乃回水之候彼方用藥催漿痘不甚稠密尙可延捱若毒火內盛及氣血虛弱鮮有不悞事者此皆長三日之一言悞其時日不能催其長漿以致膿漿不成變症蜂生雖有明醫難保其後矣或問之曰子言二日必連發熱三日而算以合天時正二三月也若痘出稠密尙爲風寒所束出得遲滯三日不能出齊者有之子今乃曰見苗以至出齊應四五六月尙後

之業幼科者遵子之定論不待其出齊而用藥催漿
不亦失之於太早乎予應之曰善哉爾之間也旣云
出痘按一十二日之期應天時一十二箇月令有春
令發生夏令長養秋令成熟冬令收藏之義焉倘未
出齊遲一日以象閏月也若明此閏月法則長漿不
能及時充滿亦可遲一日以象閏月則痘漿未有不
成者也予故曰其中有至理存焉何前代名醫於此
不深講究也今特表而出之以與業幼科者共明此
一十二日之至理也

十二日文至附忠

不緊韁羨也今辟婁道由之以周樂故修答其則也
與游也子過曰其中貴至賤亦無能為名也子過也
雖死相與誠誠也子過樂聞其則樂也子過不
出其題子曰則樂固以出吾則樂固去吾則樂也
今幾本夏令與齊楚令火燒令與蕪之退而爲安
出其題子曰則樂固以出吾則樂固去吾則樂也
子過樂聞其則樂也子過不

痘科緊要成方

藥之分兩多少俱以半歲孩童爲式大者添之再小者減之

加味升麻葛根湯

白粉葛

一錢

升麻

三分

牛蒡子

五分炒香研碎揀淨

小川芎

七分八分

蘇葉

六分

桔梗

六分

防風

七分去膿

甘草

二分生去皮

山楂肉

生薑三片同煎熟服取微汗

歌曰

升麻葛根湯十味

赤芍防芎甘桔是

山楂蘇葉及牛蒡

體氣壯強斯藥治

加味參蘇飲

此乃初發熱時所用之加味參蘇飲也

人參

二分倘元氣虛必要可

蘇葉

七分

前胡

一錢

小川芎七分

山楂肉八分

桔梗五分

白茯

芩

八分去皮

白粉葛八分

甘草二分

生去皮

陳皮七分

半夏三分

牛蒡子五分炒香

揀淨研碎

甘草二分

生去皮

生薑三片同煎熱服取微汗

歌曰

加味參蘇白茯芩

前陳甘桔半芎平

牛蒡查肉和乾葛

體氣虛羸用此靈

以上二方卽是傷感而非痘瘍服之發汗亦無妨

敗毒和中散

連翹

七分去心研碎

防風七分

荆芥七分

黃連一分

不用酒炒

牛蒡子七分同前

製

桔梗六分

陳枳殼五分

一分

炒

前胡一錢

紫草莖

五分酒
洗研末

小川芎

七分

升麻

三分

木通

七分

蟬蛻

十二隻

如有閏月
洗淨蟬去

升麻頭

麥門冬

一錢
去心

甘草

二分生

甘草去皮

生薑一片燈心五十寸同煎服

如大便秘澀加酒炒大黃八分微利之不秘者

勿加

如毒火盛加酒炒黃芩二分

歌曰

敗毒和中翹桔草

牛蟬前麥芎連好

通麻芩殼紫荆防

便秘蒸黃微利早

升消平胃散

小川芎

七分

香附

一錢

蒼朮

六分

紫蘇

七分

厚朴

六分
汁炒
薑

藿香

五分

砂仁

五分
研碎

白芷

六分
分

陳皮

六分
去白

麥芽

八分
炒

山楂

八分
去核

甘草

草

二分
炙

煨薑三片同煎帶熱服

歌曰

升消平胃朴陳芽

白芷蘇芎藿附砂

吐瀉內傷兼腹痛

須加蒼朮草山楂

參砂和胃散

卽香砂六君子湯

人參

三分
去蘆

砂仁

七分
研碎

半夏

五分

陳皮

六分

白术

一錢
去蘆

白茯苓

八分
去皮

藿香

六分

甘草

三分
炙

煨薑去皮三片同煎服

歌曰 胃氣中虛嘔吐頻 參砂和胃散尤靈

陳皮白朮煨薑引

藿半隨甘白茯苓

朮苓調脾散

白朮一錢炒去蘆

白茯苓八分去皮

真神麌八分炒研

芍六分酒炒

白萹蓄八分薑汁浸去殼炒

砂仁六分炒研

芍七分炒

厚朴六分薑汁炒

甘草三分

或加人參三分

煨薑三片大棗一枚去核同煎服

歌曰 脾土中虛泄瀉作 朮苓調脾萹蓄朴

砂仁草附或加參 神麌煨薑炒白芍

清解散

防風 七分

荆芥七分

蟬

十二隻去頭足
如有問十三隻

桔梗
六分

小川亭

前胡

連翹分七

心
大
道
名
分
乾
葛

紫草茸

研未分

升麻
升麻

卷六

通七分

卷之三

山楂肉

卷之二

前
同

黃連

酒炒分

甘草去皮

一
生

生薑三片同煎溫服

11

1

歌曰清解荆防升葛通

萃連甘桔草川

前胡蟬蛻芳翹共

查肉生薑引有

蘇解散

110

防風七分

荆芥七分

蟬蛻

十二隻去頭足
如有閑十三隻

桔梗六分

小川芎七分

前胡一錢

乾葛

升麻五分

紫草莖

五分研末

木通七分

紫蘇

七分

連翹

五分去心

牛蒡子

五分同前製

白芷七分

羌活五分

山楂肉八分

八分同前

甘草二分

生皮

生薑三片

同煎帶熱服

歌曰

蘇解前羌白芷同

荆防升葛紫翹功

牛蒡蟬蛻山楂肉

甘桔淮通及撫芎

溫中益氣湯

人參五分

白朮一錢

黃耆八分

防風七分

當歸身

七分
酒洗

白茯苓

八分
八分

南木香

三分
仁布空

川芎

七分
三分

山楂肉

八分
八分

白芷

七分
七分

官桂

二分
二分

甘草

三分
三分

生薑一片大棗一枚去核同煎服

歌曰 溫中益氣用生者

參术歸身官桂宜

白芷防芎杏肉草

木香應與白苓俱

調元化毒湯

鱔黃耆

一錢
生

當歸身

八分
酒洗

牛蒡子

七分
炒研

人

參

三分
生

白芍

七分
酒洗

連翹

七分
去心

木通

七分
七分

黃芩

五分
酒炒

黃連

二分
酒炒

防風

七分
七分

荆芥

七分
七分

桔梗

六分

前胡

一錢

蟬蛻

十二隻去頭足
如有閏十三隻

紅花

三分酒洗

紫草莖

五分酒洗研末

生地黃

一錢酒洗

山

查肉

一錢

甘草

二分生去皮

生薑一片同煎溫服

歌曰調元化毒參耆芍

紅紫牛蟬荆芥著
芩連草桔防風度

歸地前通查肉翹

加減參蘇飲

與前加味參蘇飲不同

加減參蘇飲

人參二分

陳皮七分

羌活六分

蘇葉

一錢

人參

三分

陳皮

七分

羌活

六分

小川芎

八分

防風

七分

荆芥

七分

桔梗

五分

白芷

六分

甘草

二分生去皮

冬月加麻黃

分

生薑三片同煎熱服但不可出汗

歌曰 驚搖休云作等閑

風寒外束出艱難

參蘇羌芷芎防芥

甘桔陳麻笑解顏

平和湯

人參三分

當歸六分

桔梗六分

白芍五分

紫蘇六分

黃耆一錢

防風七分

白芷七分

官桂二分

沉香二分

檀香二分

藿香二分

乳香二分

心同研

生薑一片同煎溫服

歌曰穢氣相衝不可當 教君急用平和湯

參者歸芍蘇防芷 桂桔沉檀乳藿香

薑附湯

白附子

三錢

老生薑

二錢

濃煎湯灌下一二酒杯出微汗即愈

痘出傳風眼直斜 牙關緊閉襲風邪

歌曰此時勿用驅風藥 白附薑煎汁當茶

清毒活血湯

紫草茸

七分

當歸

八分

酒洗

前胡

一錢

牛蒡子

炒研

木通

七分

桔梗

六分

生地黃

一錢

酒洗

連翹

七分去心

人參

五分去蘆

生白芍

五分酒洗

黃芩

五分

黃連

二分酒炒

生黃耆

一錢五分

甘草

二分生去皮

山楂

三錢去核

生薑

一片同煎服

煩渴者

去參耆加麥冬

一錢五分去心

花粉

七分

歌曰

清毒活血紫參耆

牛子

當前白芍宜

參歸鹿茸湯

此方有起死回生之力

山楂

薑引木通提

鹿茸

三錢酒洗

分兩內人之大小加減

嫩絲黃耆

五錢蜜炙

甘草

五分

炙人參

三錢去蘆

當歸身

一錢酒洗

薑一片好龍眼肉三箇同煎去渣入好酒一杯
溫服

兒能飲酒者濃煎藥汁與酒相半和服亦好
如困倦手足冷飲食少者加廣木香三分公丁
香三分官桂三分砂仁三分

如漿不足九十日之間或有作寒戰咬牙者再
加官桂二分熟附子三分

如大便泄瀉膿漿難成去當歸加麪炒白朮一
錢酒炒白芍七分白茯苓八分木香三分丁香
二分肉桂二分肉荳蔻五分麪裹煨熟搗去油

用柯子肉二分煨熟

倘瀉不止另用參术散

兼用七味荳蔻丸

歌曰 參歸鹿茸用三錢

蜜炙黃耆貴嫩鱗

甘草炮來薑一片

福元好酒服安然

千金內托散

人參

五分去蘆

當歸身

一錢酒洗

嫩鱗黃耆

二錢五分蜜炙

大川芎

七分

山楂肉

一錢酒洗

南木香

三分蜜炙

芍

五分炒

官桂

三分

防風

七分

白芷

七分

白

生薑

一片

好龍眼肉

三箇同煎入好酒和服

隨症加減法同參歸鹿茸湯

歌曰 千金內托十二味
歸芍參耆防芷桂
木香甘草及川芎
厚朴山楂薑酒是
參耆湯

人參

一錢五分去蘆

黃耆

三錢蜜炙

官桂

五分

甘草

一錢炙

生薑

一片同煎溫服

歌曰

血泡通紅不作漿

惟有參耆四味湯

炙草

一錢官桂五分

管教服藥得安康

參麥清補湯

人參

五分

麥門冬

一錢蒸曬乾酒

白花粉

八分蒸曬乾酒

痘疹專心錄

卷十九

蒸曬乾酒

前胡

一錢

生黃耆

三錢

牛蒡子

八分
炒研

炙甘

草

三分

生甘草

二分

酒炒白芍

五分

生白

芍

三分

當歸身

七分
酒洗

紅花

五分
酒洗

大川芎

七分

桔梗

七分

生地黃

一錢
酒洗

山楂

一錢
去核

歌曰

參麥清補甘草芍

半生半熟紅花耆

梔連二陳湯

黃連

三分
薑
汁炒

白茯苓

七分

梔子

二分
薑
汁炒

半

夏

三分
薑
製

炙甘草

二分

陳皮

五分
去白

生薑一片同煎緩緩服吐止卽勿服

歌曰行漿作吐兩般云
困倦參砂和胃散
其聞痘色要分明

加味四苓散

猪苓

七分

木通

七分

澤瀉

八分

黃芩

五分
酒炒

黃連

二分
酒炒

赤茯苓

七分

牛蒡子

五分
炒研

車

前子

七分
炒

燈心五十寸同煎食前服

歌曰行漿作瀉甚難當
加味四苓車木共
小便紅黃毒氣猖

參术散

白术

一兩用裏白無油者去蘆炒

人參

五錢去蘆

砂仁

五錢炒

白茯苓

五錢去皮

炙甘草

五錢去皮

南木香

二錢

廣

陳皮

四錢洗淨去筋膜

山查肉

五錢

炒

家蓮子

五錢去心

炒

肉荳蔻

四錢切細用紙包打去油

柯子肉

四錢去核

真神麯

五錢炒

薏苡仁

五錢炒熟

其爲極細末每用二錢清米飲調食前溫服兒有不肯服者入稀粥內和服亦可

歌曰

參苓砂草薏苡仁

蓮肉山查五麯神

南木三陳柯蔻四

其間白术兩分明

吐逆者加藿香七分砂仁七分炒研

此時有欬逆者乃胃氣上越也取真黃土鼻邊

聞之立止

歌

養胃開痰參术草

伏苓山藥山楂蜜

曰

蓮肉陳皮半桔奇

渴服麥冬五味早

若還吐逆藿香砂

黃土鼻聞須論討

建中湯

人參

三錢去蘆

黃耆

三錢蜜炙

乾薑

五分炒

肉桂

三分

白朮

一分五錢炒

當歸身

一錢

大川芎

八分

甘草

三分蜜炙

丁香

五分分上炒

大附子

五分

甘草

三分蜜炙

公

三分

生薑一片同煎溫服

歌曰 咬牙寒戰建中湯

參术黃耆熟附當

內桂炮薑須炙草

川芎薑引用丁香

溫表調中湯

黃耆

一錢五分蜜炙

人參

一錢去蘆

三茯苓

一錢

白朮

上炒
大錢

官桂

三分

大川芎

三分

防風

五分

乾薑

五分

白芷

五分

丁香

三分

當歸

七分

防風

五分

熟附子

三分

炙甘草

三分

生薑一片同煎溫服

歌

溫表調中參术耆

丁香熟附桂當歸

七味荳蔻丸

肉荳蔻五錢製同前

柯子肉去核五錢煨

白龍骨煅五錢

南木香五錢

赤石脂七錢煅五次

枯白礬七錢

砂仁五錢炒

麵糊爲丸如棗荳大每服用清米飲下或二十丸或三十丸量兒大小與之兒有不能吞丸者將丸研碎化入粥內服之亦可

歸耆湯

當歸身三錢

黃耆

二錢蜜炙

酸棗仁

一分錢五炒研

白水煎服

歌曰 漑足身涼汗不止
惟有歸耆酸棗是

養胃開痰湯

人參

一錢去蘆

白术

一錢五分土炒

白茯苓

一錢

桔梗

五分

家蓮肉

一錢心炒

山杏肉

一錢

山藥

錢

炒

陳皮

八分去白

半夏

五分薑製

甘草

五分炙

生薑

一片同煎溫服

灌漿時忌用术苓半夏恐其燥乾津液膿漿不行也至將麌時可用矣

渴者去半夏加麥冬

一錢去心

北五味

九粒研碎

曰

茯苓甘草乾薑共

白芷防芎一處施

清表散毒湯

地骨皮一錢

麥冬一錢

分去心五錢

花粉一錢

酒炒

牛蒡

子八分

連翹七分

去心七分

當歸八分

生三分

猪苓七分

澤瀉七分

炒研七分

黃芩七分

酒炒七分

甘草三分

水煎溫服

歌曰清表散毒地骨冬

牛蒡花粉草翹宗

炒芩澤瀉猪苓共

歸與同煎用木通

消毒散血湯

牛蒡子一錢

炒研一錢

生白芍一錢

六分酒洗

桃仁一錢去皮尖

炒研一錢

去皮尖

痘疹專心錄

卷十九

三

脩文堂

大黃

酒炒

乳香

五分燈心同研

沒藥

三分

紅花

五分酒洗

水煎溫服

歌曰
曆時腹痛著中腕
炒過桃仁熟大黃

清毒散血湯莫緩
紅花沒乳芍牛上

清毒保目湯

柴胡

一錢

連翹

七分去心

梔仁

三分炒

黃芩

五分炒

荆穗

七分研

防風

七分

赤芍

七分炒

當歸

八分

牛蒡子

七分

甘草

三分

生蟬蛻

十隻有開去頭足

升麻

五分

薄荷

五分

桔梗

八分

引用燈心五十寸

歌曰清毒保目荷柴蟬

翹桔荆防赤芍緣

升麻牛子歸芎草

酒炒梔芩降火全

大連翹飲

此方內涼藥多俱
要製過斟酌用

連翹

一錢去心去蘆八分

牛蒡子

七分炒研

山梔子

五分酒炒

當歸

八分

赤芍

七分酒炒

山梔子

五分酒炒

通

八分

荆芥

七分

黃芩

七分酒炒

防風

七分酒炒

蟬蛻

十二隻去頭足

車前子

八分炒

滑石

五分末

甘草

三分生去皮

生薑一片同煎服

大便秘加酒炒大黃一錢微利之

歌 大連翹飲炒梔芩

柴滑荆防赤芍勻

曰 通牛蟬蛻歸車草

便秘蒸黃蓍意尋

補中益氣湯

此方專治痘後元氣虛弱者

人參

五分

黃耆

一錢蜜炙

白术

八分土炒

柴胡

五分

升麻

五分

陳皮

七分蜜炙

歸身

八分土炒

甘草

三分蜜炙

生薑一片同煎溫服

虛渴者加麥門冬一錢去心五味子九粒研碎
寒熱似瘧者加炒白芍五分製半夏五分

歌曰

參耆歸术

升陳柴草

元參升麻湯

元參

一錢

升麻

五分

防風

七分

荆芥

七分

牛蒡子

七分
炒研

甘草

三分
生去皮

水煎溫服

有夾痳疹而出者加桔梗七分酒炒黃芩七分

同煎服

歌

赤點紛紛號夾斑

如雲爰起又名丹

曰

碎碎紛紛名夾疹

三症分明在此間

升元湯草牛防芥

夾疹須知芩桔關

參耆實表湯

此方專治痘瘡者

人參

五分
去蘆

黃耆

一錢五分
作瘡者

甘草

三分
蜜炙

官桂

三分

防風

七分

白芷

七分

川芎

七分

當歸

七分

桔梗

五分

南木香

三分

厚朴

五分
薑
汁炒

生薑

一片同煎溫服

歌曰 參耆實表保元湯 官桂芎防芷朴當
甘桔木香薑作引 氣虛作癢賴安康

參歸大補湯

人參

五分

當歸

八分

蜜炙黃耆

一錢
五分

川芎

桔梗

五分

蜜炙甘草

三分
七分

山楂肉

八分
三分

紫草茸

五分
研碎

南木香

三分
七分

防風

七分
七分

白芷

厚朴

六分
七分
分
汁炒

生薑一片同煎溫服

此方專治痘不起脹而面目頸項腫如爪瓠此危症也急以此方連進二三劑治之必要腫消痘起方有生機

歌曰 參歸大補炙黃耆

紫茸川芎白芷宣

桔梗山楂防厚朴

木香甘草用休遲

四聖膏

治痘 痘 痘 痘

珍珠

生研

豌荳

燒存性

亂髮

燒灰

冰片

各等分

用油脂脂和成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入疔內卽紅活

拔毒散

此散治痘疔及城
紫浮萍其効如神

痘

明雄黃

不拘多少研細末又將滾白水炮絲臘取濃
汁調點疔頭上

三荳漿

敷痘毒

黑荳

聖藥

赤小荳

各一合研爛爲末用醋研濃漿時時以鴛翎掃
之紅腫退去其効如神

生肌散

地骨皮

炒

黃連

炒

黃柏

炒

五倍子

生甘草

各等

共爲細末乾摻之

絲繭

散

治餘毒流注各處出清水者

出蛾絲繭不拘多少用生明礬末填在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之

髮灰散

治痘瘡

出未齊而鼻衄不止

用少壯無病人亂髮不拘男女用肥阜洗淨油垢氣又用溫湯洗淨肥阜氣焙乾量髮多少用新瓦礮一箇將髮填入內令滿用淨瓦片蓋口鹽和泥封之又全封瓦礮曬乾用木炭火圍礮一半煅一

炷香久取出候冷其灰成塊研令極細每用二錢童便七分酒三分調服立止輕者只用灰吹鼻亦

止

此方極妙不惟可用之痘瘡凡諸血症皆可用

清肺湯

花粉一錢

麥門冬一錢

分去心五

天門冬一錢

皮酒蒸

心

桔梗六分

當歸一錢

不用尾酒洗

生白芍一錢

酒洗七

分

芩

七分酒炒

知母七分蜜炒

丹皮七分酒洗

甘草三分生

黃

歌

生薑一片同煎服

人髮灰一錢調服尤妙

毒氣薰蒸鼻流血

毒氣亦因從血泄

曰 天麥丹皮知母芩 當歸白芍花甘桔

清上飲

薄荷

七分

防風

七分

桔梗

六分

連翹

七分
去心

白粉葛

一錢

牛蒡子

七分

麥門冬

一分
去心

黃連

三分
酒炒

黃芩

七分
酒炒

花粉

八分
酒炒

甘草

三分
生

生薑

一片同煎溫服

歌曰 口舌生瘡名熱毒 細察痘苗分所屬

清上荷防草麥牛 芩連花葛桔翹逐

赴筵散

薄荷葉

三錢蘇州者佳

黃柏

五錢川者佳

各等分爲末入青黛一分和勻搽之

利咽解毒湯

山荳根

五分

麥門冬

一錢

牛蒡子

炒研

元參

一錢

桔梗

一錢

防風

七分

甘草

生五分

生薑

一片同煎食後良久分二三起緩緩溫服

歌曰

利咽解毒麥元參

甘桔防牛山荳根

玉鎖匙

硼砂

一錢

朴硝

五分

殭蚕

三條

片腦

一分

共爲細末以竹管吹之

導赤散

木通一錢

赤茯苓八分

車前子一錢

麥門

冬一錢

生地一錢

人參二分

去蘆可有可無

甘草三分

燈心五十寸同煎餽時服

清毒撥醫湯

黃連三分

酒炒當歸一錢

花粉七分

酒蒸

桔梗七分

甘菊七分

甘菊七分

甘菊七分

甘菊八分

川芎七分

酒洗防風七分

薄荷七分

柴胡七分

甘菊七分

甘菊七分

甘菊七分

甘菊七分

甘菊八分

牛蒡子七分

炒研草決明七分

羌活五分

甘菊五分

甘菊五分

甘菊五分

甘菊五分

甘菊五分

甘菊五分

花七分

蜜蒙花七分

白蒺藜七分

研去刺

生地黃五分

研去刺

白粉葛七分

研去刺

穀精七分

草七分

川木賊五分

生地黃五分

研去刺

白粉葛七分

研去刺

穀精七分

研去刺

穀精七分

分七

山梔子

酒炒五分

生薑一片同煎食後良久服

大便秘滯者加酒炒大黃一錢五分通仍除之

清毒探翳草連梔

牛賊蒙精決蒺藜

歌曰 生地羌防柴菊葛

川芎花粉荷當歸

痘瘡疹避忌

避穢氣

腋下狐臭氣 房中淫液氣 行遠勞汗氣
溝糞濁惡氣 婦人經候氣 諸瘡腥臭氣
砒硫蚊烟氣 誤燒頭髮氣 吹滅燈燭氣
柴烟魚骨氣 葱蒜韭薤氣 煎炒油烟氣
醉酒葷腥氣 麝香燥穢氣

守禁忌

生人往來 言罵呼怒 對梳頭 對搔癢
勿掃地 勿對荒言 勿使僧道師巫入房

勿對飲食譖樂

以上諸避忌謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

小兒相法

欲知小兒壽夭當於相法推詳若夫富貴貧賤善惡
窮通雖由祖父之積德累仁有以栽培善根而富貴
通達隨之而至然能膺此福澤其形容氣質天資頴
悟必有大過人者所謂天之報施不爽也 聲喜清
嘵悠長最忌豺狼音韻聲如病貓不壽又喜聲如洪
鐘氣能接續 頭欲圓有骨格前天庭宜高聳日月
角宜峻峭兩傍頭角要崢嶸頭後枕骨分品字偃月
髮長宜稀而黑髮際宜高不宜低 五官宜正不
喜歪斜 人中宜深地角宜方而圓 眉喜清秀而

高眼喜黑白分明視瞻平正一身之精神全在兩目決斷最嫌雞眼羊眼以及斜視上下露白更加昏矇無神俱非吉兆耳愛有垂輪廓分明鼻喜端正豐厚如垂膽如截筒口宜濶大切忌弔唇面要豐滿大怕偏陷身肥胖不喜純見乎肉必要骨格相稱且肥胖者肉宜緊密不喜如發麵模樣色雖白必要帶些紫黑色身瘦削不喜脊骨稜崢必要肉勝於骨腎囊宜緊細紫色如荔枝殼者壽寛大白色者多疾又有看小便之法若小兒尿得遠且又長此長壽之徵也若尿最近乃腎氣不充必不壽

手腕宜長手指宜纖手背宜厚 足骨宜短足背
宜厚 肩欲平正背脊及腰俱喜豐滿 臍窩宜深
腹要下垂 鼻梁不喜帶青色紅黃色最吉青色
主有疾 兩口角宜朝上不宜平而向下 男子八
個月長門牙女子七個月長門牙先長下牙者吉
凡男女能享長年良由幼小之時形容體格有以基
之斷非僥倖勉強而致之者矣

痘疹傳心錄卷十九終

余旣刻朱濟川痘疹傳心錄因思種痘一法得以預爲調理乘春秋之和爽避冬夏之寒暑不使風寒外侵飲食內積故其所施百不失一暇日流覽醫書如赤水元珠張氏醫通間有附載皆不甚詳茲見朱純嘏痘疹定

論彼以種痘知名官太醫二十五年
南自豫章以至鴨綠江北各隨土地
施治無不奏功其技妙入神矣此書
曾刊于康熙癸巳時年已七八採
痂下苗諸法俱備有發前人所未發
并種法之不可少者悉照原本以付

剞劂附于痘疹傳心錄之後至于調
治用藥乃遵聶久吾活幼心法不出
朱濟川之範圍故不復採益種出者
與自由者同治耳讀是書者毋以兩
科歧視可也

乾隆丙午仲春瘦樵程永培志

