

05980

西漢王政曰

首卷 六

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春目錄

一卷

醫學習業

習醫先用明經

論醫

診候定式

聲色脉診

脉病逆順

論脈

脉有損至

異常生亥脉

在脉

結脉爲病

用藥法象

藥性要旨

用藥宜禁

藥味專精

用藥中病不必畫劑

君臣佐使

制方之法

治法綱要

湯散丸例

異法方宜

標本陰陽

諸陰諸陽

陰海陽海

三陰三陽氣絕

陰陽應象

陰陽虛實

陰陽主病

陰陽生死

陽有餘陰不足

問病求因

論病

主病標本

感病所因

治未病已病

病原診候

病症虛實

辯疑病名

察病輕重

病得其宜

諸夢爲病

臟腑相移

諸痛

關格

人迎氣口說

論本

上古天真

血榮氣衛

男女氣血則一

男女尺脉辯

男女天數

養老

慈幼

無子服藥戒

房中補益

相火

茹淡

夏月伏陰在內

倒倉法

飲食所傷

勞役所傷

內傷治戒

傷寒溫病熱病說

亢則害承乃制

中暑中熱辨

積熱沉寒

煎厥

小便原委

瀉南方補北方

真邪離合

脫營

音釋附卷首

二卷

脫血

汗法

下法

吐法

陽虛陰盛陽盛陰虛

春宣

藥戒

攻擊說

習醫規法

病源症治

臟腑虛實爲病

陽明病

內外傷辯

醇酒宜冷飲

受胎

乳硬

癰疽當分經絡

論診候肺疽肺痿法

論灑疽

論五發疽

論三陰三陽時日所旺

勞極傷症

臨機應變

紀用備論

臟腑配天地

運氣政令

運氣勝復

天符歲會

天符

太乙天符

歲會

同天符

同歲會

三合

歲之所直名曰承歲

藥劑評

病分氣血晝夜衰旺

病熱分治

臟傳生歟

一息

二儀

二陽病

三才

三焦

三部

三因說

四氣調神

四氣所傷

四知

四損

四肢

四海

四失

五臟生病

五臟虛實

五臟脉氣

五臟生成

五臟損益

五臟苦欲補瀉

五臟氣味補瀉

五臟相平

五臟別論

五精所并

五鬱

五臟正病

五邪爲病

五絕治病

五勞

五過

五病所發

五邪所亂

五邪所見

五行相尅

五法

六經氣血多少

六不治

六腑

七情藥性

七衝門

七訟

七表脈狀

八裏脈狀

奇經八脉

八風

八會

九道脈狀

九候

九藏

九鍼

九蟲

九竅

九氣爲病

十變

十法治病

十二經絡

十二經見症

十二原

十二官

十二月人氣所在

十二多

十二經水

十二經脉之終

十二經是動所生之病

十二經絡始終流注

十二經治法

十三陰

十五絡

二十問

臟形正面踪源

臟形背面踪源

十二經絡序

手太陰肺經形穴

總歌訣二十

十一法

手陽明大腸經形穴

總歌訣有二十法

足陽明胃經形穴

總歌訣四十有五法

足太陰脾經形穴

總歌訣二十有一法

手少陰心經形穴

總歌訣有九法

手太陽小腸經形穴

總歌訣一十有九法

足太陽膀胱經形穴

總歌訣六十有三法

足少陰腎經形穴

總歌訣二十有七法

手厥陰心包經形穴

總歌訣有九法

手少陽三焦經形穴

總歌訣二十有三法

足少陽膽經形穴

總歌訣四十有三法

足厥陰肝經形穴

總歌訣二十有三法

任脈形穴

總歌訣二十有四法

督脈形穴

總歌訣二十有七法

三卷

約方之法

藥品製度

用藥增損

六經引藥

瀉六經火藥

藥劑準則

煎熬服法

風

中氣

中惡

寒

暑

濕

疫癆

大頭天行瘟疫病

溫病

熱病

外感

內傷

四卷

上 下

瘧症

痢證

霍亂

泄瀉

嘔吐

噎膈

嘈雜吞酸睡酸

脾胃

諸氣

六慳

痰飲

五卷

上 下

咳嗽

喘證

虛勞

諸血

汗證

虛煩

消渴

諸熱

痺瘡

瘻瘡

咳逆

瘡瘍

面部

頭痛

六卷

上 下

眩暉

眼目

眼眶眉骨痛

鼻

耳

口舌

牙齒

咽喉

水腫

鼓脹

積聚

疝

心胃腹痛

肩背臂痛

腰脇痛

健忘怔忡

小兒科

調治痰疾

五臟病治

吐

瀉

驚

疳

內外傷感

斑疹痘瘡

夜啼

解顛

變蒸

小兒雜症

七卷

上 下

狂癩驚癇

瘡瘍

脚氣

瘻風

白虎歷節

瘻瘍

厥瘡

諸淋附小便不通

本草生
大便閉結

腸澼下血

赤白濁

夢遺

白淫

遺尿不禁

脫肛

墜傷金瘡

中諸毒

脫陽

尸厥

雜症

邪祟

外科

諸瘡

八卷

上下

疔腫

瘰疬

附骨疽

陰瘡

楊梅瘡

時毒

癩風

痔疾

漏瘡

破傷風

陰部

婦女科

總說

月經不調

月經不通

經漏崩中

帶下

諸積

胎前

產後

雜用奇法

目錄終

○治濕大法

濕在表宜微汗而解。經云：濕熱甚治汗爲効。而止是也。又不欲汗，故不用便大抵自外而至者皆宜汗散。自中乃濕家通用之藥。其功甚烈。凡諸濕故也。

○丹谿治濕活法

濕木土氣太熱則能生之。故夏熱也。大法以二陳湯加酒芩羌活防抵治濕宜利小便。

○如一身盡痛或無汗乃濕流關

○邪氣在表宜五苓散加羌活蒼

者白朮甘草亦効

○小便自利色青白大便泄瀉自

芩散加附子蒼朮木瓜

○如風濕身痛微腫惡風宜杏仁

麻黃各錢半杏仁十枚薑

○如濕致腫脹宜利小便健脾

○夫治濕因蒼白二朮爲君補

又不可執此當要行氣利

緩急而治不可無變

○蒼朮治濕上下部皆可用

○二陳湯加酒芩活蒼朮散風行溫

上部濕蒼木功效極速下部宜升麻提之。

○如風濕相搏。黃芪防已湯丸効。

○如濕勝氣實者。宜佑神丸。舟車丸。

○如虛氣者。宜人參茯苓。佐桑白皮。葶苈木香之類。

○凡肥白人沉困。睡怠惰多是氣虛受濕。宜人參白茯苓。蒼术。或佐之以滑石。凡黑瘦人沉困。怠惰多是濕熱。宜白朮。黃芩。

○飲食不節。脾胃受傷。不能傳送。濕熱宜枳朮丸加減。如上焦濕熱。宜用黃芩。

○肺有虛熱。宜二門冬。知母。黃芩。但不宜多用。恐傷脾氣。

○如脾胃虛熱。不能健運。而鬱悶宜黃芩。白朮。人參陳皮。或少

佐厚朴。

○如_下焦濕腫極痛，膀胱有大邪者，必用酒洗防已、龍膽草、黃柏蒼木。

○戴元禮云：東南地土脾濕多病者，多從外入，多自下起。其患脚腿氣病者，多治宜汗散，久則宜踈通滲泄。西北地高風寒燥緊盛，人多食潼銘濕熟之物，以衛外寒濕熱拂鬱於內而作。多致肚腹膨脹，或通身浮腫，治宜詳其元氣虛實，大小二便須要通之。此乃責其根在內也。雖然方土之中亦或互相有者，但多寡之不同耳。必須詳症以治，不可執一之見也。

治寒濕所傷身體重着，如坐水中，小便澀，大便溏，以滲濕湯主之。

方滲濕湯

蒼朮

白朮

各一錢
五分

甘草

各四
三分

茯苓

二錢
二分

橘紅

各一
錢

丁香

五枚
一枚

生薑

三片
三分

棗子

二枚
一枚

乾薑

病風濕相搏。一身盡痺。額上微汗。身體微腫。以麻黃、薏苡、湯主之。

方麻黃薏苡湯

麻黃

薏苡仁

各五
錢

杏仁十枚

甘草

二錢
五分

右剉一劑水煎熟食送服。

(○寒濕所傷身體重着。腰脚酸疼。大便溏泄。小便或澀或利。以除濕湯主之。

方除濕湯

半夏麌 三錢 厚朴

蒼朮各一錢 蔴香五分 橘紅

白茯苓

白朮

各一錢

甘草

炙五分

生薑

五片

枣子

二枚

○右剗一剗水煎熟食前服。

散王之

方見本卷前項內

○暑濕相合。肢體重疲。煩渴引飲。小便不利。大便反快。以五苓散其人傷濕。因而中暑。名曰濕溫。兩脰逆冷。胸滿頭目重疼。妄言多汗。其脉陽濡而弱。苔小而急切。不可而汗。汗之必死。以茯苓杏仁湯或白虎加蒼朮。

○方 茯苓杏仁湯

茯苓六錢

杏仁十枚

各一錢

甘草二錢

○右咀片。水煎熟食前服。

○白虎蒼朮湯

知毋

石膏

各二錢

蒼朮

各二分

甘草

一錢

粳米

一合

右剉一劑水煎熟食遠服

治久用傷濕大便多溏小便閉者此兩淫腹病是也以五苓散

煎下戊己丸

五苓散見前

○戊己丸

吳茱萸

湯泡七次擣淨四兩先用慢火炒汗入黃連同培色變亦不可焦了

黃連

白芍藥

另研各四兩

右件依法製度爲末麵糊爲丸如梧桐子大每服六七十丸米湯食前送下

○傷食發熱惡寒身重自汗骨節疼痛腰脚痺冷以除濕湯主

之前欬內

○濕入腎重則腰疼冷如水腹重不可轉然亦濕盛腹重相似

此名腎著。以腎著湯或滲濕湯主之。方見本卷前項下。

方 腎著湯

乾薑 二錢 茯苓 三錢 甘草 炙 一

白朮 一分

右剉一劑水煎空心服。

○汗漬衣濕坐臥當風以致風濕相感惡風身熱頰上有汗以

滲濕湯方見本卷前項內桂枝各半和服

方 桂枝湯

桂枝 三錢 白芍藥 一錢 甘草 二錢

右剉生薑七片棗子四枚水煎熟或同煎藥各半如不同依

照證另服。○合微發汗若已得汗熱猶不退以人參敗

毒散加蒼朮防已主之。

方 人參敗毒散

計三方

柴胡

一錢五分

前胡

羌活

獨活

桔梗

枳殼

人參

茯苓

川芎

各一錢

甘草

五分

生薑

五片

○如風盛加荆芥

六分

防風

六分

名荆皮敗

毒散

○加蒼朮

一錢大黃

一錢名加味敗毒散

○皮膚痒

者加蟬蛻五分

○右剉水煎熟食遠服

○傷濕兼感於寒無汗惡寒慄慄身體煩疼以五積散除濕湯各半和服得微汗復熱而渴者除濕湯五苓散各半主之

二方俱見
本卷內

○浴出身上未乾忽爾熟睡致及腎經腫痛腰背牽曲以五苓散加真武少許煎下青木香丸

方青木香丸

黑牽牛

炒香取頭末一兩二錢

補骨脂

草澄茄

青木香

檳榔

粟人飯裹外用濕紙包灰火中煨令紙焦去殼四錢

右爲細末入草牛末和勻清水和爲丸如梧桐大每服三十

丸茶湯熱水任下

治外感濕邪經云風可以勝濕又云辛以散之是以用羌活獨活藁本蔓荆子川芎防風諸辛味風藥以勝肌表之濕矣草補脾土以勝濕故以羌活勝濕湯。

勝濕

羌活

辛溫二錢

獨活

辛溫八分

藁本

苦甘溫八分

川芎

辛溫二錢五分

防風

甘辛溫一錢

甘草

炙八分

蔓荆子

苦辛溫一錢

右咀片水鍾半煎七分服○如身重腰疼沉沉然乃經中

寒濕加酒洗漢防已一錢附子五分甚加川芎六分

治濕熱內鬱致成黃疸等證治宜清熱勝濕可也是以用黃芩

黃連梔子以清熱陳皮枳實以散鬱猪苓澤瀉赤茯

利小便以參濕茵陳驅濕熱以退黃疸。

赤茯苓參濕湯

黃芩

苦寒二分

黃連

苦寒錢五分

梔子

苦寒二錢

陳皮

辛溫二分

枳實

苦辛寒八分

青皮

苦辛寒一分半

猪苓

淡平一錢

赤茯苓

甘平八分

治一切水濕腫滿腹大脹硬用大黃、甘遂、大戟、芫花以湯水濕陳皮木香牽牛疎行鬱氣以脹滿。

方舟車丸

大黃

苦寒二分

甘遂

苦寒二分

牽牛

苦辛利水各八分

芫花

逐水八分

陳皮

苦辛溫八分

木香

苦辛溫二分

大戟

苦甘寒七分

右剉一劑水鍾半煎八分溫服

治水濕致膀胱腫或作痛癟宜逐水疎利膀胱小腸之鬱可也。

是以用牽牛逐水。下氣消脹滿。茴香疎小腸膀胱壅滯之氣除疝疼。

禹功散

牽牛

苦辛寒
四兩

茴香

苦辛溫
六兩

○右二味共爲細末。每以

生薑自然汁調服三五錢。○一木加白术五兩。

治諸濕症用蒼朮燥濕爲君。陳皮甘草扶脾爲佐。厚朴行氣逐

濕爲使。

平胃散

蒼朮

苦甘溫
八兩

陳皮

辛溫留
白四兩

甘草

炙甘溫
三兩

厚朴

辛溫
三兩

右爲細末。每以薑末煎湯。或鹽湯點服三五錢。

治濕熱內甚。水腫腹脹。小便赤澁。大便注瀉。中氣不足。運動失

常。遂使水飲不得。四佈所致。治宜補中滲濕。是以用白术

茯苓。炙草。補中健脾。葶藶逐水。消浮腫。猪苓澤瀉滑石。木

通利小便滲濕木香行氣肉桂通血脉和榮衛。

方
芩
蘇
木
香
散

白术

苦甘溫
四兩

茯苓

甘溫
三兩

甘草

炙甘溫
二兩

芩
蘇

苦辛寒
八分

猪苓

淡平
二兩

澤瀉

甘一寒
二兩

滑石

利竅
二兩

木通

淡平
二兩

木香

苦辛溫
一兩

肉桂

辛甘溫
五錢

右剉爲細末每以白湯調下。五七錢日服二次。

治中氣不足風濕外乘脉浮身重自汗惡風或痛大脈浮虛也。汗出惡風乃風傷衛不能固護皮毛也身重者濕也痛者風濕相搏也四肢倦怠關節煩疼惡風自汗治宜散風濕補中氣實腠理可也故用防已驅風濕白术甘草補中燥濕黃芪補衛氣實腠理以止汗。

方
黃
芪
防
已
湯

黃芪

苦寒
五錢

白朮

甘溫
四錢

甘草

炙甘溫
三錢

黃芪

甘溫
六錢

右咀片水二鍾內加薑三片枣三枚煎一鍾服愈如喘者加
麻黃半夏有汗不必加麻黃氣上冲加桂枝寒加細辛
治一切水濕致脚細脹大實脹喘滿用輕粉燥濕大黃芫花甘
遂大戟牽牛逐水消脹滿

方二花神祐丸

輕粉

辛寒
五錢

大黃

苦寒
一兩

芫花

苦辛寒
七錢

甘遂

苦甘寒
六錢

大戟

苦甘寒
一兩

牽牛

辛寒
一兩

右剉爲細末滴水爲丸如棗豆大每以白湯下五七丸或十
丸一日三次不拘時服

○疫癘

載論附議

疫癘之病乃天地不時之疫氣其形質虛弱之人感而受之狀

若傷寒始起於一人續而傳染一方一邑皆患此症但中有輕重之分若體氣壯盛之人感之淺者輕而易療若元氣虛敗感之深者重而難愈其證自外而入當從仲景傷寒法治療但木可大汗大下宜從中治而用少陽陽明二經之藥如小柴胡升麻葛根湯之類大要仍在補養元氣爲主經云養正而邪自除學者宜致意也。

疫癘者皆溫熱寒涼失候四時不正之氣流行里巷長幼感病率皆相似謂之天行時氣與傷寒溫病熱病不同故仲景云疫氣之行無以脉診宜隨時施治以平爲期不可過汗四時通用人參敗毒散解之若熱極煩渴神思昏亂須開門牖使邪熱舒散用青布浸新汲水內絞乾搭在胸項至其熱毒傷寒溫熱亦然此證易於傳染故使人有不相通間欲其不令染者以雄黃

爲末常抹鼻孔中凡入患所要行從容知其避忌男子病穢氣出於口女子病穢氣出於陰坐立對語之間宜當面向背診視之際伺病人手出被窩少噴氣散方可近前亦須飲酒少啖蒜薑造過飲食方許省視不可空心造次逕詣

○治疫脉法

陽濡弱陰弦緊而爲瘟疫○二三日體熱腹滿頭痛飲食如故脉急而疾者八日死○四五頭痛腹滿而吐脈來細而長十二日死○八九日頭身不疼目不赤色不变而反利脈來涩按之不見舉時大心驚十七日死○汗不出出不至足者死○厥逆汗自出脉堅強急者生虛軟者死○如下利腹中痛甚者死

○疫癘大法

治疫之法有三宜補宜散宜降用芩連大黃人參蒼朮防風滑

石香附桔梗人中黃等共爲末以伸翹打糊丸如梧桐子大如氣虛宜四君子湯血虛宜四物湯多用二陳湯送下火甚加童便

○丹谿治疫傳变活法

瘟疫之證與衆一樣病者是俗謂之天行時氣與時傷寒相似宜分經而療

○如在少陽經宜以小柴胡加防風羌活微發之方見本卷前欵內。

○如兼陽明以小柴胡合升麻葛根二湯煎服

升麻葛根湯

升麻

葛根

白芍藥

以上各一錢
五分

甘草

一錢

右咀片水煎熟不拘時服

○如男太陽症或大便泄以小柴胡去黃芩加五苓散尤當育

患者之寒熱如無寒去五苓之內桂留小柴胡之黃芩。如

小便不利倍加去桂五苓散。二方俱見前。

○若入太陰經無熱症用理中湯。○若腹痛而泄則可用若痛泄止仍以小柴胡和之。二方俱見前。

○若入少陰及厥陰者以陰症傷寒傳經法治之。

○若預看未有端的者先以敗毒散治之看喘在何經再隨經治之。方見本卷前款。

○若發黃以小柴胡合去桂五苓散如不退以茯苓滲濕湯治之如作渴加知母石膏。方見本卷前款內。

○如濕甚以蒼朮白虎湯

方見本卷前款下。

○如發狂不識人以大柴胡加當歸

方大柴胡湯

柴胡 五錢

黃芩

三分

白芍藥 半夏

枳殼

各二錢

大黃

量人肥瘦
加減用

右咀片生薑七片

赤子五枚食前服

○如大便瀉以三黃石膏及柴芩湯之類

卽小柴胡
五苓散

○如胸膈滿悶加枳殼橘紅苦連與前三黃石膏等湯

○如大便不通或承氣湯或大柴胡微利之

方見前

○如陽明之邪則首大腫少陽爲邪多見於耳之前後宜防風

通聖散加減用之或用小柴胡加防風荆芥薄荷桔梗煎
眼外以側柏葉攪汁調火煅蚯蚓糞敷之或以丁香尖附
子尖南星調醋敷之或以五葉藤車前草皆可搗汁敷之
多有獲功

治臘瞯積熱發爲腫毒及時疫疔瘡頭面紅腫咽嗌填塞而藥
不下一切危要疫癘經云濕勝則腐腫大法在乎清熱爲

主故用漏蘆升麻大黃黃芩澤蘭葉玄參等諸苦寒以清熱

方 漏蘆湯

漏蘆苦寒通小腸

升麻苦寒

大黃苦寒下實熱

黃芩苦寒下實熱

葛根苦寒

澤蘭葉

玄參苦鹹寒散結熱清利

咽膈泄無根之火

右各等分咀片每一兩水煎熟服如腫甚加芒硝二錢

○春時應溫而清氣抑之故身熱頭疼目眩以升麻葛根湯

○前見

○熟甚嘔吐以小柴胡湯

○前見

方 葛根解肌湯

葛根

麻黃各一錢

五分

白芍藥

黃芩八分

一分

甘草六分

桂枝

五分

右咀片末子二枚水煎熟食送溫服

○夏時應熱而寒氣抑之骨疼身熱頭痛以人參敗毒散

○前見

若暴寒熱伏於內咳嗽嘔吐以大麝干湯

麝干

當歸

麻黃各一錢

肉桂三分

桑皮一錢

枳殼

紫苑

獨活

杏仁各六分

半夏二分

一錢

○若腹痛自利以理中湯

○往來寒熱以小柴胡湯主之

二方見前

○秋時應涼而大熱抑之身熱咳嗽以金沸草散

方
金沸草散

金沸草 荆芥

麻黃各一錢

甘草五分

赤芍藥

大黃三片

半夏

前胡

各一錢

生薑

三片

棗子二枚

○右剉一劑水煎熟食後溫服

○若煩渴以白虎加蒼朮湯

方見本卷前款內

○若熱蓄發瘧以茵陳五苓散

方菌陳五苓散

茵陳一錢

五分

澤瀉一錢

六分

茯苓

猪苓

白朮各一錢

各二錢

官桂三分

枳實六分

六分

右咀水煎食前服

○若患痢疾以人參敗毒散加陳金粟主之

方見本卷前降內

○冬時應寒而大溫抑之身熱頭疼咽痛以人參敗毒散

方見前

○或甘桔湯主之

方甘桔湯

甘草一錢

五分

桔梗三錢

三錢

○加犀角一錢名犀角甘桔

湯

五分

右咀片水煎熟食後服

五分

○或玄參甘草湯

方玄參甘草

玄參一錢

二分

升麻五錢

五分

甘草一錢

○右咀片水煎不拘時服

○喘咳擊痛。以姜蕤湯。

方
萎蕤湯

萎蕤

石膏

名一錢

麻黃

羌活

各八分

青木香

白薇

杏仁

各五分

甘草

四分

川芎

六分

葛根

二錢

右剉一劑水煎不拘時服。

○或生赤疹。以升麻葛根湯。

方見本卷前。

○發癰者。以陽毒升麻湯主之。

方
陽毒升麻湯

升麻

一分

犀角

一升五分

麝香

一分

黃芩

一分

人參

各一錢

甘草

一分

○右咀片水煎熟食遠服。

治四時不正疫氣。倘感病隨時變染。與前四氣病狀不同。當臨時應候調治。不可執一而取。宜於外感類中。相參施用。若

久陰雨得患身熱頭疼惡心以正氣散隨證加減治之見

本卷前項內。

○大頭天行瘟疫病

大頭疫病乃濕熱在高顙之上或臟腑積熱而發爲腫毒疙瘩。頭面洪腫咽嗌堵塞不下宜以羌活及酒炒黃芩并酒蒸大黃隨病加減切不可用降藥東垣謂此症乃陽明邪熱太甚挾少陽相火而成其邪多見於頭或兩耳前後治法不宜速藥速則反過其病正所謂上熱未除中寒復生是也宜用緩藥緩服慢慢少與當視其腫勢在何部分隨經治之大都此症多發於冬溫之後備具外科時毒類中相參施治。

治天行大頭瘟毒蓋此由濕熱之毒挾相火火炎所致法當清濕熱爲主經云苦可勝濕寒可勝熱是以用芩連之苦寒

勝濕清熱。生草之甘寒。以瀉火。

方三黃湯

黃芩

苦寒酒浸
晒乾五錢

黃連

苦寒酒浸
炒七錢

生草稍

甘寒
二錢

右咀片。水煎頻頻熱服。

○如未退。用鼠黏子。不拘多少。煎熟入芒硝等分。亦時時押之。以大便利爲度。

○如渴甚者。前方少加引經藥。如陽明渴。加石膏。少陽渴。加天

花粉。

○如陽明行經。以升麻芍藥葛根。少陽行經。以防風荆芥。

○頭面洪腫疙瘩。咽嗌不利。以漏蘆湯主之。方見本卷內。

○時毒疙瘩惡證。以消毒殼黃丸主之。

方消毒殼黃丸

殭蚕

牡蠣

大黃

酒蒸各等分

右件依法製度。各爲細末。凍蜜爲丸如彈子大。每服二丸。新汲水化下。○一方加桔梗。

頭面洪腫。喉痺不利。二味消毒丸主之。

方二味消毒丸

殭蚕一兩

大黃

酒蒸一兩

右件依合製爲末。生薑自然汁爲丸如彈子大。每服二丸。蜜水化下。

病初覺增寒體重。次傳頭面腫盛。目不能開。上喘咽喉不利。舌乾口燥。此亦疫癘之病。以消毒之劑主之。

方普濟消毒飲

黃芩

黃連

各五錢

人參

三錢

橘紅

玄參

甘草

生三錢

柴胡

桔梗

各二錢

連翹

鼠黏子

板藍根

馬勃

各一錢

白僵蚕

升麻

各七分

防風

薄荷

川芎

當歸

各一分

五分

升麻

一分

或依法製度爲細末每服三錢白湯食後調服。

或用煉熟蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化

如大便硬加酒浸煨熟大黃量人虛實多少

○溫病

大溫之爲病蓋因冬月傷胃寒氣伏藏肌骨至春而作此不卽病之傷寒也有春溫風溫溫毒三種之名所以自春未於夏至前也若夏至後則爲熱病矣治法不與相同但可以中和之劑輕於解肌爲佳若施汗吐下三法太峻則反變異最所忌者風溫切不可汗汗之爲大逆多不可救經曰冬不藏精春必病溫

又曰冬傷於寒春必病溫此之謂也

春溫病暎數而大散發熱頭疼不惡寒以升麻葛根湯方見本卷前

若春感而發作者以葛根解肌湯○

三方俱見本卷前

煩燥大便閉脉實方可大柴胡湯微利之

三方俱見本卷前

初感春溫發汗後身猶灼熱首汗喘息嘿嘿欲眠四肢不收名曰風溫再汗之則爲逆必譏語亦不可下及燒針但用萎

蕤湯

方見本卷前

○熟甚以知母葛根湯

方知母葛根湯

知母

葛根

石膏

錢各一

甘草

杏仁

川芎

羌活

萎蕤

升麻

麻黃

以上各五分

南星

黃芩

防風

各六分

木香

四分

人參

七分

右咀片水煎熟食前服。

○熱渴嘔吐脇脰以小柴胡湯

方見本卷前項內

○大渴者以括薑根湯

括薑根湯

石膏二錢

括薑根

人參各一錢

防風

五分

乾葛七分

甘草五分

○右咀片水煎食前服

○身重汗出以防已黃芪湯主之

方見本卷內

○冬時觸冒寒邪至春治發初在表已發汗或吐下表證未解發

爲斑癩疹以黃連橘皮湯

○列黃連橘皮湯

黃連

橘皮

枳實

麻黃

杏仁

葛根各一錢

厚朴

甘草

各五分

右剉一劑水煎熟食遠服

心煩嘔逆，以葛根橘皮湯。

方葛根橘皮湯

葛根

一錢二分

橘皮

知母

黃芩

麻黃

各一錢

甘草

杏仁

各五分

○右咀水煎食遠服。

○甚者黑膏主之。

方黑膏

生地

二兩六錢六分

豆豉

一兩六錢五分各碎

右件以猪膏十兩合露之煎。令三分城一絞去渣另研雄黃麝香如豆大納入攪和分三服。毒從皮中出則愈忌蕷夷。

○熟論

火熱本是一氣但有輕重之殊故元戎云。熱者火之微。火者熱之熾。乃心與小腸主之。經云諸嘔吐脫暴注下迫轉筋小便混

濁腹脹鼓之如鼓癰疽痔瘡氣結核吐下霍亂脅鬱脹裏
塞鼽衄衄血溢渴瀉淋秘二熱惡寒戰慄驚忽笑悲譏妄齶
血汗皆属于熱是也但中有陰陽虛實內外表裏之殊經云陰
虛生內熱陽盛則外熱是也如晝發熱而夜安靜者乃陽氣自
旺於陽分謂之重陽無陰如晝安靜而夜發熱者乃陽氣下入
陰中謂之熱入血室治療之法實者瀉之虛者補之在外者汗
之在裏者下之鬱熱疎之濕熱清之陰虛補陰陽盛瀉陽是以
經云小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗
發之發之不盡求其屬以哀之是也學者宜深詳焉

又云夫熱病亦冬月傷寒伏藏在內至夏月時熱兩感而發爲
不卽病之傷寒也只宜寒涼之劑解其内外之煩毒是以桂枝
麻黃湯其性頗熱於此難用

○熱脉訣

經曰人熱病氣熱脉滿是謂重實尺寸俱虛是謂重虛粗大者陰不足陽有餘又云浮數熱在表沉數熱在裏是以難經云熱病之脉陰陽俱浮浮而滑沉之散濶脉經云弦

數多熱數爲熱極又云數乃爲虛爲熱

○治熱要訣

凡熱症在外者以辛涼散之在內者以苦寒下之經云苦以治臟辛以治腑是也又宜養血益陰其熱自愈

○丹谿活訣

凡熱症重手按之熱甚輕手按之熱不甚乃熱在肌肉之內宜東垣升陽散火湯火鬱陽之類以發之

○凡熱症輕手按之熱甚重手按之不熱乃熱在表宜清之如

地骨皮麥門冬竹茹之類。

○飲酒人發熱難治不飲酒人因酒發熱亦難治。

○如上焦實熱須用酒洗黃芩心肺有實熱方可。如虛熱必以天門冬保定肺氣然後瀉之。

○如去中焦實熱須用黃連若脾胃虛不能轉運及中焦鬱熱者宜白朮茯苓黃芩葛根代之。

○如胃中實熱須用梔子。

○如虛煩須用人參白朮黃芩白芍藥茯苓麥門冬大棗之類爲主佐以竹葉。

○如身熱頭疼煩渴不惡寒以小柴胡湯

方見本卷內

少加川芎若渴甚加天花粉葛根麥門冬若熱極讞語加

黃連

○如身熱神昏，晝夜不眠，以退熱寧神之劑主之。

方退熱寧神湯

柴胡

二錢

黃芩

一錢

黃連

六分

甘草

生五分

山梔仁

人參

酸棗仁

麥門冬

茯神

各一錢

右剉

一劑水煎熟

食前或不拘時服

○身熱泄瀉煩渴，以柴胡三白湯主之。

方柴胡三白湯

柴胡

三錢

人參

一分

半夏

五分

白芍藥

白木各一錢

白茯苓

一錢

甘草

五分

黃連

八分

生薑

五片

右剉一劑，東二枚水煎食前服。

○身熱自汗不已，以黃芪六一湯加人參、黃連主之。

方黃芪六一湯

方見本卷前

須朝熱大便結實口乾譏語以大柴胡清熱之劑。

泛大柴胡湯

柴胡五錢

黃芩一錢三分

白芍藥半夏

枳殼各一錢

大黃多少量

人加入

右哎咀用生薑七片，處子五枚水煎食前服。

病內外實熱大便閉結用連翹大黃芒硝通大便下內熱。梔子

黃芩薄荷清表熱是以用涼膈之劑。

涼膈散

連翹

大黃

各二兩

芒硝二兩五錢

梔子一兩

黃芩二兩

桔梗一兩

黃芩一兩

甘草二兩五錢

薄荷

三兩

甘草一兩五錢

右件共爲細末以青竹葉煎湯入蜜少許調服二三分。

病風濕熱毒身熱頭疼痰喘是以散風止頭疼發表除身痛消

卷之三
熱豁痰喘潤肺補中行氣散鬱。

方知母葛根湯

防風八分羌活七分萎蕤二錢川芎七分升麻八分

葛根

知母各一錢

黃芩錢半南星

杏仁各一錢

人參二錢

甘草五分

木香六分生薑三大片

右㕮咀水煎熟溫服

方

小便

方清心連子飲

地骨皮

八分柴胡

麥門冬各

黃芩二錢

石蓮肉

人參

各二錢茯苓一錢黃芪二錢

甘草生七分

右㕮咀用水煎熟溫服

驚心神煩亂。怔忡兀兀。欲吐似懊憹。狀經云。心惡熱火熱上炎。是以心繁神亂。心爲熱擾。使血不足。怔悸足矣。

○宜瀉火熱。益陰安心神可也。是以用黃連。生甘草。瀉火熱。川歸生地。益心血。佐硃砂以安心神。

○硃砂安神丸

硃砂

另研五錢

甘草

黃連各一兩

川歸酒浸

生地黃

各三兩

右件共五味。內除砂另研。餘四味爲細末。入砂末拌勻。以湯浸蒸餅丸。如黍米大。外用硃砂五錢。研末爲衣。每以津吐熱下。三五十丸。如津吐不足。噉者薄荷湯可下。

○治下焦積熱。止便閉。通用大黃通大便瀉腸。胃中之積熱。服麥木通滑石。扁蓄。車前山梔利小便。瀉膀胱之鬱熱。生草瀉

二焦之火熱

透入正散

大黃

一兩

瞿麥

六錢

木通

七錢

滑石

八錢

扁蓄

七錢

車前子

錢

山梔

二兩

生甘草

一兩

右件共爲末。每以五錢水煎食前服。

獨肝氣熱。防風羌活以散風。龍胆草。山梔。大黃以勝熱。風能燥血。熱能耗血。是以加富歸川芎以救血。

第十一
方

瀉清丸

防風

羌活

龍胆草

梔子

大黃

各一兩

當帰

二兩

川芎

一兩

右件共爲細末。煉蜜爲丸。如芡實大海。用薄荷湯下。二三丸爲愈。

遍脾胃中鬱熱。口臭咽乾。或嘔吐等症。用梔子清胃。腕熱石膏瀉胃火。藿香和胃止嘔。吐生甘草瀉火和藥。

方寫黃散

梔子一兩。石膏二兩。藿香二錢。防風。甘草生各一兩。右件共爲細末。蜜酒拌炒香。每服二三分。

治肺熱用桑白皮瀉火。地骨皮退熱。生甘草通瀉三焦火熱。

方瀉白散

桑白皮。地骨皮各二兩。生甘草一兩。

右件共爲細末。每以麥門冬湯調下二三錢。

治腎熱用黃柏知母。佐肉桂補腎陰以勝熱。

方滋腎丸

黃柏。知母各八兩。肉桂一兩。

右件共爲細末。以鹽攬童便作糊。凡梧桐子大空心。鹽湯下。五七十丸。

病 切蒸熟。積熟及血虛發熱。脉洪實弦數。用人參當歸芍藥。益陰血以勝陽熱。黃芩解肌熱。柴胡退蒸熱。大黃下積熱。生甘草瀉火兼和藥。

柴胡飲子

人參 當歸各一錢。白芍一錢五分。黃芩一錢。

柴胡二錢 生甘草 大黃各一錢。

如骨蒸潮熱去柴胡。加黃柏一錢。若內無實熱。大便不閉。去大黃。加黃連一錢。

右㕮咀水煎溫服一本。有生薑二片。以緩寒。

病 因風邪發熱。頭疼。瘡壅氣喘。經云邪之所湊。其氣必虛。是

以用人參茯苓。甘草補中益氣。葛根。紫蘇。柴桑。前胡。桔梗。半夏。治痰定喘。枳殼。橘紅。木香。利氣。

方參蘇飲

人參二錢。茯苓一錢。甘草炙五分。紫蘇七分。乾葛八分。
前胡。桔梗。橘紅各七分。半夏一錢。枳殼六分。

右咬咀用薑二片。東一枝煎熟食後溫服。

治身熱嘔吐。以小柴胡湯加香薷。黃連主之。方見本卷前。
病熱甚。六脉皆無。神昏不醒。以生脈之劑主之。

方生脉散

人參。五味子。麥門冬。

右咬咀。用水煎熟。不拘時服。

病身熱煩渴。發出紅斑。以人參化班之劑。

杏人參化班湯

知母

石膏

人參各一錢

甘草一錢

糯米一合

右咬咀用水煎熟食遠溫服。

治中暑熱。嘔吐眩暉。及大病後。調理失宜。勞復如初。及脾胃虛損。面色萎黃。飲食不美。口吐酸水。滑泄腹鳴。飲食霍亂。吐瀉並宜服之。

二因白术散

白芷

甘草

青皮去白

白茯苓

桔梗

山藥

香附子各三兩

乾薑五錢

白术

陳皮各二兩

右咬咀生薑三片。枣一枚。木瓜一片。紫蘇葉三皮。煎食前服。治小腸蓄熱。小便赤澁。用生地黃益陰勝熱。生甘草佐木通利小便。以瀉小腸中火。

方導赤散

生芍苦甘寒

木通甘淡

生甘草甘寒

右剉一劑水二鍾煎一中調滑石末五錢服

病陰虛每發潮熱身體倦或痰喘

治經云補以去弱又云能以甘溫除大熱是以用人參白朮茯苓甘草諸甘溫補虛弱以除熱黃芩半夏治痰喘柴胡葛根退潮熱當歸白芍救陰血

方十味人參散

人參甘溫

三錢

白朮苦甘溫

二錢

白茯甘溫

一錢

甘草淡甘溫

七分

黃芩

苦寒

半夏苦辛溫

七分

柴胡苦寒

八分

葛根甘京

一錢

當歸

甘辛溫

白芍苦鹹寒

一錢

右咀片水二鍾煎一鍾溫服如半夏不用加天花粉一錢

○外感

夫外感乃是乍感風寒或行遠體熱汗未歇而去衣或沐浴當風或水澡沃以致鬱遏肌膚仍發寒熱頭目重痛骨疼脊強鼻寒聲重咳嗽痰喘比傷冬時嚴寒不同此感字與傷字猶爲輕也蓋傷寒者乃霜降後春分前時正嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒若或觸冒之者乃爲傷寒耳以傷寒之毒最爲殺厲之氣中而卽病失於解散致使傳變異證百出生死只在六七日之間故張仲景作傷寒論分析六經傳變治法三百餘條誠爲萬世不刊之典此卽病之傷寒設也若表裏受邪陰陽雙傳病名兩感經傳六日十無二全此兩感傷寒也若寒毒藏於肌骨至春變爲濕病至夏變爲熱病此爲不卽病之傷寒但渴而不惡寒也雖所受之源不殊而治法不可以卽病之傷寒用

麻黃桂枝等熟藥解表苟不慎而輕用之誠不免夫狂躁班
衄血之變而亦無功也其和解解毒等法相同有元時英蒙齋
見此論理浩博恐後學不能得造仲景之堂作指掌圖賦發明
其奧使人易達其旨實醫之幸也賴此是傷寒全書故不錄及
宜當詳究臨證攻療如指諸掌其表解溫熱仲景別有方法但
恨遺佚耳茲錄數法于左以俟高識者又有春夏之時病似傷
寒仍兼惡風惡寒者此是暴中當時風寒之新病非冬時受傷
過時而發者然此麻黃桂枝之全劑亦不可用但以小柴胡湯
加少桂枝可也有飲食勞倦寒溫不適證類傷寒此是不足之
病無分四時以脉候分辯不可作傷寒看餘之證混治李東垣
内外傷辯論中反覆詳悉學者要知古人用心諄切全人之生
若此後人豈可偏廢也其疫癘溫熱感患與類中方法有未盡

者當於此類相參施治全在酒法勿泥於膠固也。瘥後易於復作者以其毒犯於臟腑如水浸牆壁水退土尚未堅再犯熱勞隨至非但強力持重若梳浴動氣則爲勞復新瘥胃氣尚虛不能損穀但多食則爲食復俱發熱耳。總愈男與女交曰陽易女與男交曰陰易譬如交易之易互爲病也。男子則陰腫小腹絞痛婦人則裏急腰跨連腹內痛。男女俱熟上衝胸頭重不舉眼中生花百節解散小便不利。此皆新愈元氣未全有此動擾復其前證多致不救故有倍食澡身沐髮易床作勞大過之戒。治時令不正感冒發熱頭疼以十神湯主之。

五十神湯

川芎

甘草

炙

麻黃

乾葛

紫蘇

升麻

赤芍藥

白芷

橘皮

香附子

各等分

右咬咀用生薑三片水煎熟食後熱服。

治時令不正感冒發熱惡寒以香蘇散主之。如頭目疼痛加川芎。白芷名芎蘇散熱甚加柴胡。

芍香蘇散

香附

二錢

紫蘇

一錢

陳皮

一錢五分

甘草

五分

甘草

五分

右咬咀生薑五片葱白二根水煎熟食前溫服。

治四時疫癟及外感壯熱頭疼骨節疼痛咳嗽風痰鼻塞聲重通用人參敗毒散主之。

佐人參敗毒散

柴胡

一錢

前胡

羌活

羌活

獨活

桔梗

枳殼

五分

人參

茯苓

茯苓

川芎

各一錢

甘草

五分

右咬咀用生薑五片水煎熟食遠溫服。

治發熱頭疼惡風自汗逆惡心以八解散主之

防八解散

人參

茯苓

陳皮

去白半夏

白朮

各一錢

甘草炙

藿香

各五分

厚朴

七分生薑

五片

右咬咀用葱白二根水煎熟食透溫服

治傷寒咳嗽風痰鼻塞聲重以金沸草散主之

方金沸草散

金沸草

荆芥

麻黃

各一錢五分

甘草

五分

赤芍藥

半夏

前胡

各一錢

生薑

三片

右咬咀用棗二枚水煎熟食後溫服

治感冒風邪發熱頭痛咳嗽聲重沸吐稠黏以參蘇飲氣盛去

木香喘急者加杏仁陳皮熟盛加片黃芩

方見本卷前

外感風寒。身熱頭疼。鼻塞聲重無汗。治宜消風百解散主之。方見本

本卷前項下

時行喘嗽。痰熱上盛。以今連導痰湯治之。方見本

卷前

往來寒熱。頭疼。脇痛。嘔逆。耳聾。以小柴胡湯。○日晡潮熱煩燥。

讞語。大便結實。邪熱在裏。以大柴胡湯治之。二方俱見

本卷前

發熱。自利。或讞語。治宜柴胡三白湯主之。方見本 卷前 ○如氣滿加

硝砂仁。

身熱煩盛。渴飲冷物。脉絕者。以生脉散治之。方見本

卷前

神昏讞語。晝夜不睡。以退熱寧神湯主之。方見本

卷前

病吐下後。心煩氣之。身熱自汗。虛煩。神志不寧。晝夜不眠。以酸

棗仁湯主之。

方酸棗仁湯

東仁一錢

知母

麥門冬

茯苓各一錢

甘草

川芎

各五分

乾薑

三分

○右剉水煎熟不拘時服

(病)傷寒時疫瘥後虛煩不得睡臥心膽虛怯或睡而精魂散亂
異夢驚悸者治宜溫膽之劑主之

方溫膽湯

橘紅

二錢

半夏

枳實

各一錢

茯苓

一錢

甘草

五分

右咀片生薑五片棗子二枚竹茹一大團水二鍾煎一鍾食

前溫服

身熱目痛鼻乾不得眠或潮熱者屬陽明也以白虎湯加入參

若大便實以大柴胡湯

二方俱見本卷前

下利而渴不得眠者少陰也以豬苓湯治之

方猪苓湯

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠各等分

右㕮咀用水煎熟食前服。

少陰二三日以上心中煩不得眠者以黃連阿膠湯主之。方見四卷內。

有因熱汗太過胸中煩躁不得眠者發渴欲飲水少少與之勿令縱意以五苓散加黃連炒山梔仁主之。

五苓散

澤瀉

二兩五錢

赤茯苓

一兩五錢

白朮

猪苓

各一兩五錢

肉桂

一兩

右爲末用滾白湯調服或燈心湯亦可。

汗下後復晝夜不得眠或夜安靜不嘔不渴身無大熱此陽氣衰欲成陰症以乾薑附子之劑主之。

古方生藥 卷之三

七十九

方乾薑附子湯

乾薑三分 黑附子一枚

右剉一貼。用水煎熟。不拘時服。

病大熱錯語。呻吟乾嘔口燥。不得眠。以黃連解毒之劑。

方黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃蘖 孫梔子各等分

右咬咀。用水煎熟。食後服。

病譏語屬陽。鄭聲屬陰。實則譏語。虛則鄭聲。譏語則錯亂倒妄。出言無倫。常對空獨語。如見鬼狀。鄭聲者。鄭重煩繁。語雖謬而諄諄。重復不自己。有年老之人。遇事則諱語不休。此陽氣虛也。與譏語不同。

獨身熱煩渴。小便澀。大便閉。妄言者。此衰實之譏語也。以調胃

承氣湯主之

調胃承氣湯

大黃

清酒洗多少量虛實

甘草

二錢

芒硝

一合

右剉一貼用水煎熟空心服

病大便自利小便如常或發熱或煩躁妄言者乃陰隔陽譏語也以溫胆湯若無熱無煩以理中湯主之鄭聲厲虛以十全大補湯方見本卷前

溫膽湯

橘紅

二錢半夏

枳實

各一錢白茯苓

一錢五分

甘草

五分生薑

五片

棗子

二枚

竹茹

栗大一團

右㕮咀用水煎熟食前服

理中湯

人參

白朮

各二錢五分

甘草一錢七分

乾薑一錢五分

右咬咀。用水煎熟。食前服。

病得汗身和而言妄者。非實乃汗後津液不和。以小柴胡湯方。
見本卷前。合小建中湯服之。和榮衛通津液也。

方 小建中湯

白芍藥

四錢桂枝

二錢甘草

炙七分

生薑

七分

棗子

三枚

錫糖

少許

右剉一貼。用水煎熟。食前服。

病自利譏語。手足厥逆。此雖自和。必有燥薑。以調胃承氣湯和之。若亡陽脉微。下利直視。喘滿不治。
方見本卷前。

大便黑。小便利。小腹痛。其人如狂譏語。此有瘀血。以桃仁承氣湯主之。

芝桃仁承氣湯

桃仁二十枚桂枝二錢甘草一錢大黃量人虛實多少

右咀先煎減半入芒硝二錢煎再沸服之

羸婦人身熱經水通斷寒熱如瘡日晡尤甚如見鬼狀譏語者此熱入血室也以柴胡地黃湯主之經水適來不必服藥鍼刺當熟隨血去

芍柴胡地黃湯

柴胡二錢五分黃芩半夏人參各一錢五分

生地黃一錢甘草五分生薑五分棗子二枚

右㕮咀用水煎熟食前溫服

病後多於夢寐中不覺失聲如鶴此非譏語鄭聲乃氣血未復精神未全也以溫胆湯去竹茹加人參主之方見本卷前

卷之二
七
傷寒身熱無汗。病合汗解。有診其尺脉微澁。先與黃芪建中湯二貼。然後汗之。大凡汗下。豈宜輕易。

方 黃芪建中湯

黃芪 白芍藥各四錢 桂枝二錢 甘草炙七分

生薑五片 李子三枚 錫糖少許

右㕮咀。用水煎熟。食前溫服。

病時氣不和。身生疹子。已出未消。以葛根升麻湯主之。

方 葛根升麻湯

葛根 升麻 白芍藥各一錢五分 甘草一錢

右㕮咀。水煎熟。不拘時服。

病內外兩感。臟腑但病。一日太陽與少陰合病。二日陽明與少

陽合病。三日。少陽與厥陰合病。欲汗則有裏。欲下則有表。

表裏既不能一治故爲難以兩感羌活湯主之

方兩感羌活湯

羌活 獨活 防已 防風 黃芩 川芎
蒼朮 白朮各一錢 甘草四分 黃連六分

細辛五分 知母

生地黃各一錢五分

右咬咀用水煎熟不拘時服。

病熱結胸中痞滿覺疼以小陷胸湯治之。

方小陷胸湯

黃連三錢二分 半夏八錢二分

右咬咀先將瓜蒌仁一枚去穰取仁用水三錢煎減半入前
二味煎一大鍾分作二服。

病頭汗出心下緊滿無大熱此水結胸以小半夏茯苓湯主之

卷之三

方 小半夏茯苓湯

半夏 白茯苓各等分 生薑五片

右㕮咀水煎熟食前溫服。

渴飲水多停蓄心下痞疼或手足厥冷以枳實理中湯主之

方見六卷內。

治頭汗出往來寒熱以小柴胡湯主之方見本卷前

頭汗出此欲發黃以茵陳湯主之。

方 茵陳湯

茵陳三錢 大黃看人虛實加減 山梔仁一錢

右㕮咀水煎熟食遠溫服。

病發黃潮熱一身盡疼寒熱往來以小柴胡湯加山梔仁主之。

方見三

卷前

病遍身發黃大便色黑小便自利小腹急痛此有瘀血以桃仁

承氣湯主之。

方見本卷前。

病遍身熱煩渴欲飲冷水水入即吐名水逆以五苓散主之熟甚

加黃連。

五苓散

澤瀉二兩五錢赤茯苓一兩五錢白朮

猪苓各一兩半肉桂一兩

右件爲末。白湯調服或燈心湯亦可。

病發黃渴飲水漿小便赤少以茵陳四苓湯治之。

茵陳四苓湯

茵陳

澤瀉

白朮

各一錢五分

茯苓

枳實

猪苓

各一錢

山梔仁

五分

杏林生都
右咬咀用水煎熟食前溫服

病傷冷中寒脉弱氣虛小便如常發陰黃以茵陳理中湯主之
方 茵陳理中湯

茵陳 人參 白朮 各二錢五分

甘草炙一錢 乾薑一錢五分

有咬咀水煎熟食前溫服。

治時行發紅班以化班湯主之

方見本卷前。

病時疫舌捲焦黑鼻如煙煤狂言見鬼面赤發班如錦或紫黑
色以陽毒升麻之劑。

方 陽毒升麻湯

升麻一錢五分 生犀角

射干 黃芩

人參各一錢 甘草生五分

右咬咀用水煎熟食遠溫服

病身熱舌上白胎脉陰陽俱緊惡寒以柴胡桔梗湯治之。

方 柴胡桔梗湯

柴胡

三錢

黃芩

人參各一錢五分

天花粉二錢

甘草

一錢生薑

三片

東子二枚

右咬咀用水煎熟食遠溫服

治舌上焦黃未下者以大柴胡湯下之若變黑色至七八日已上反大熱者難治。方見本卷前。

治時疫外感欲愈必衄血血不止以犀角地黃湯加人參、黃芩。

方 犀角地黃湯

犀角

如無以升麻代

牡丹皮

各一錢五分

生地黃

白芍藥

各二錢

人參

黃芩

右咬咀水煎食後服。

病若強發汗致動陰血。從耳目口鼻出者。謂之下厥上竭。難治。

病虛煩不得眠。反覆顛倒心中懊惱不宜下。以梔子豉湯吐之。得吐止服。但頭汗出。小便不利。心中惱亂必發黃。或心中懊惱。飢不能食。並以此湯主之。

方梔子豉湯

梔子

四枝

香豉

五錢

右水二鍾。先煎梔子一鍾。內豉同煎七分。去滓服之。得吐止服。

病時熱發渴。大概熱盛於內。銷燬津液。及汗利過耗津液。而然亦有寒熱。若飲多欲冷。此陽渴也。以白虎人參湯。即化班前若飲少欲溫。此陰渴也。以白朮散主之。

本卷

湯方見

方白木散

白木

人參

茯苓

各一錢

甘草

五分

乾葛

五分

木香

藿香

各五分

○右咀水煎食前服。

不利而渴。屬陽明。以大柴胡湯主之。

方見本卷前

往來寒熱而渴。以柴胡括萎湯主之。

方見本卷前

瀉利亦有寒熱。若陽利糞色焦黃穢臭。出必作聲。腑下熱以五苓散加黃連白芍藥主之。

方見前

○若陰利。下必清穀。淡黃

白色。腑下多寒。以理中湯主之。

方見本卷前

少陰下利膿血。治以三物桃花湯主之。

方三物桃花湯

糯米

三合

乾薑

三錢二分五釐

赤石脂

五兩三分錢

一半入煎藥

右前米熟去渣調赤石脂末。方寸匙。食前服。

發汗後反惡寒者乃表虛以黃芪建中湯方見本
卷前

發汗後反惡熱者乃人實以大柴胡湯方見本
卷前

發汗太過遂漏不止其人發狂此亡陽陰躁極也以收汗之劑治之

方玉屏風散

防風二錢

黃芪

白朮各四錢

生薑三片

右咀片水煎熱服外以溫粉撲之

收陽溫粉

白朮

膏本

川芎

香白芷

各等分

右爲細末每藥末一兩細米粉一兩五錢和勻用夾生綢袋盛周身撲之○若四肢厥冷汗亦不止發狂如故以四芩

湯冷服

方見本
卷前

發汗多小便赤少者不可以利小便爲重竭其津液也以清心

蓮子飲治之

方清心蓮子飲

石蓮肉

黃芪

一錢
五分

黃芩

赤茯苓

人參

車前子

麥門冬

各一錢

甘草

炙五分

地骨皮

七分

右咀片水煎熟食前服

大便結實屬陽明若小便澁少不可利小便恐乏津液胃愈乾

燥也以調胃承氣湯

方見本卷前

大便結實證雖可下若老人或病虛之人血衰津少只宜猪胆
法或用蜜導法不可妄下。

方入猪膽汁法

猪膽

一枚好醋一茶匙

右用小蘆管一箇入膽袋中。以絲繩住。將蘆管入肛門內。漸捏膽汁入腹中。自通。比蜜導捷便。

煎蜜導法

好蜜

四兩

右慢火煎十數沸。色深黃。滴水中。軟硬得所。夏熱火要多些。傾在水中。狸如大棗核。長寸餘。用六七枚入穀道中。以布掩肛門口。須忍糞至方可放布。不然蜜自化不通也。

病潮熱者。乃獨發於日晡時。若潮之長落。屬陽明爲胃實也。以

大柴胡湯下之。非是先寒後熱及往來寒熱比也。

方見本卷前

病久日晡發熱至五更而涼。或自汗。狀類潮熱。此元熱未足虛熱之症。非實也。以補中益氣湯主之。

方見本卷前

瘧後肉傷心腹不寬。寒熱往來。以清脾湯主之。

方見四卷內

病時氣病自利不止厥逆無脉乾嘔以白通猪膽汁湯主之或陰伏陽遍身極冷內熱以葱熨之

方 白通猪膽湯

黑附子一枚 乾薑二錢三分 葱白四根

右用水煎減半去滓納人尿一合猪膽一枚取汁和服。病時氣咳逆痰熟乾嘔以竹茹湯若脈弱寒厥咳逆以羌活附子湯若病久胃虛痰火咳逆以人參柿蒂湯主之飽悶加

硝砂仁

方 羌活附子湯

羌活 黑附子 小茴香各一錢 木香七分

乾薑五分 盐少許

右爲細末作二服每服水一鍾煎十數沸和滓熱服。

竹茹湯

橘紅二錢 竹茹一錢 二分 甘草六分 人參一錢五分

右咬咀生薑七片 東子一枚 水煎溫服。

人參柿蒂湯

人參 柿蒂 橘紅各一錢五分 白茯苓一錢
半夏一錢 甘草炙四分 竹茹一圍 生薑五片

右咬咀用水煎 食前溫服。

邪氣將出邪與正爭其人本虛是以發戰戰已復熱而大汗解矣名曰戰汗

湯主之

知母麻黃湯

病瘥後昏沉又無寒熱終不惺惺或潮熱煩赤以知母麻黃

知母三錢黃芩中桔者麻黃各一錢甘草

白芍藥各一錢

桂枝五分

右㕮咀水煎熟不拘時服。

病時氣手足厥冷大便結實口乾內煩讝語此陽厥也以大柴胡湯下之

方見本卷前

身寒無脉或吐或嘔內無熱症者

以附子理中湯主之

方見四卷內

若厥而利能食者名除

中不可治也四肢寒謂之逆冷手足寒謂之厥指尖冷謂之清以此見輕重之分若逆冷煩躁者久忽暴亡脉絕神色不變此寒厥以迴陽法主之

方回陽法

掘地坑熾炭二百斤雜燒之極熱施薦褥坑上俾病人臥其上蓋以氈衣露頭而在外得汗則愈內以附子理

中湯溫之。

病重衣厚被或過食煎燙熟物致項熱頭重喉音不清咳嗽口燥以涼膈甘桔湯加桑白皮有痰加貝母。

方 甘桔湯

薄荷 貝母 黃芩 各一錢 山梔子

連翹 各七分

甘草 五分

桔梗 一錢五分

右咬咀用水煎熟食後溫服。

病 痘瘍後食傷復熱先以枳硝二陳湯飲食雖消身熱未退以小柴胡湯加白朮陳皮主之 方見本卷前

方 枳硝二陳湯

枳殼 一錢 硝砂仁 七枚 半夏 茯苓 各一錢五分

橘皮 一錢 甘草 五分

右咬咀。用水煎熟食。遠溫服。

病瘥後勞役復熱。自汗倦怠。以補中益氣湯煩熱不退。以麥門

冬甘草湯或殺鼠糞湯主之。

方補中益氣湯

黃芪四錢 甘草炙五分 白朮一錢 人參三錢 升麻二分

柴胡五分 陳皮八分 黃柏六分 當歸一錢 生薑三片

右咬咀。用水煎熟食。前溫服。

方麥門冬甘草湯

麥門冬

甘草各三錢

竹葉十五片

右剉一貼。東子二枚。用水煎熟食。前服。

方殺鼠糞湯

韭根一大把

殺鼠糞

十四枝兩頭尖者

右水二鍾煎八分去滓再煎三沸溫服得沾汗効未得汗再服之。

病瘥後男女陰陽易通用燒棍散或竹皮湯假風糞湯小便不利五苓散主之。二方俱見本卷前

方燒棍散

棍搘近陰處者男用婦者婦用男者燒存性用

右件爲細末水調方寸匕以小便利陰頭腫即愈。

方竹皮湯

青竹刮青一圍水一鍾半煎七分去滓服。

治汗多皮中如蟲行狀此病虛津竭以黃芪建中湯事之。方見本卷

內前款

○內傷

夫飲食失節勞役所傷寒溫不適喜怒過度乃傷脾胃脾胃既傷而元氣耗損蓋元氣者乃生發諸陽升升之氣因此脾胃虛則下流於腎肝陰火得以乘其火位陰火上衝則氣位而喘身熱而煩頭疼作渴脈顯洪大脾胸之氣下流使穀氣不得升浮是生長之令不行則無陽以護其榮衛故不任風寒乃生寒熱自汗倦怠懶於動作與外傷風寒之病形同而理異內傷勞食乃傷其氣外傷風寒乃傷其形內傷爲不足宜溫之和之調之養之皆補也外傷爲有餘宜汗之下之吐之刺之皆寫也內傷不足之證苟誤認作外傷有餘之病而反寫之則虛其虛也殊不知內傷惡寒得暖而止非比外傷惡寒雖火日禦之而不能禁內傷頭疼時痛時止非比外傷神思猛壯語言強健內傷之人神思困怠語言倦懶非比外傷神思猛壯語言強健內傷手心

熟甚外傷手背熟甚內傷則口不知味外傷則臭爲不利內傷氣口脉大於左外傷人迎脈浮而緊此特言其大概欲悉其中內外傷辨論中求之治斯證者惟當以甘溫之劑補中升陽甘寒以瀉其火則苦寒之藥所當禁也經曰勞者溫之損者溫之蓋溫能除大熱正謂此也內傷之證必有虛實之分如飲食失飢勞役所傷發熱自汗倦怠之力乃虛中之虛宜補益中和之劑調治毋施解表若飲食過飽乃虛中之實爲其所傷飲食積滯不消以致心胸痞悶仍發寒熱惡心惡食須用化導之劑伺其消尅心胸舒泰仍進益脾之藥使無重虛元氣有宿食不消日晡潮熱氣實者下之亦要詳審毋妄通利有嗜酒之人不思酒性大熱有毒氣味俱傷若傷之者止當發利利小便上下分消其濕醫者不知往往用大熱大寒之藥下之是無形元氣受

病反下有形陰血殊不知元氣已被澁熱所傷而反重瀉致損真水使陰血愈虛真水愈弱傷毒之熱大旺反增陰火元氣消亡七神何依雖不卽死而虛損之病成矣所以酒疸不可下下之久久爲黑疸蓋以此也

(○) 痘原脉訣

若內傷者則右寸氣口脉大於人迎一倍過在少陰則二倍太陰則三倍蓋右寸乃太陰肺主皮毛右關足太陰脾主肌肉故脾肺二脉皆緊盛也

右寸氣口急大而數時一代而濶濶者肺之本脉代者元氣不相接續此飲食失節勞役過甚大虛之脉也
右關脾脉大而數數中顯緩時一代也大謂獨大於五脈亦屬於虛但不甚勞役之脉也

右閑胃脈損弱甚則隱而不見但內濕脾脈之大數微緩時一
代此飲食不節寒溫失所之脉也

右閑脈沉而滑緩此宿食不消之脉也

○內傷法則

察內傷之證東垣雖是詳備後丹谿謂世人病此者甚多但中
有挾痰挾外感而動治當補氣爲主治其所挾爲標
如內傷輕而外感重謂之外感挾內傷法當先散外邪而後補
中氣或以解散爲君以補中藥爲臣使

如氣虛甚者必少加附子以行參芪之功

如挾痰者以補中益氣湯加生夏竹瀝薑汁以爲傳送

○冊谿內傷纂要

觀內傷之證乃中氣不足中氣不足則六腑之陽首絕於外而

六腑之陽氣傷也。氣傷臟乃病臟病形乃應是五臟六腑真氣皆不足也。惟止陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉必以補中益氣湯爲主法當見本方後。

如發班是胃氣虛甚相火遊行於外亦有因痰所致。如因火宜補而降之痰熱宜微汗而發之切不可下。

如病退後燥渴不解乃是蒸熱於肺宜以甘草參芪煎湯加蜜汁少許冷服或獨參湯亦可。

癥飲食失飢勞役所傷寒濕不適身熱自汗四肢無力皮膚不任風寒右關氣口脉大倍於左手懶於言語或渴不止以補中益氣湯主之如氣逆胸膈不寬加香附子硝砂仁桂

見本卷內感欬內
一本無生薑

○本方隨症增損活套

如咽乾者加乾葛

如心刺痛者乃血不足倍加當歸

如頭痛加蔓荆子痛甚加川芎項脣癟加藁本細辛

如精神短少倍加人參

如咳嗽夏加麥冬五味秋冬加黃芩麻黃春加佛耳草欬冬

花冬嗽者乃肺中伏火去參加五味

有痰加生薑半夏

如食不下者乃胸中有寒或氣滯加青皮香附陳皮木香寒

月加益智仁草豆蔻夏加芩連秋加桂榔砂仁

如心下痞悶加黃連芍藥

如腹痛者加枳實木香砂仁厚朴天寒加生薑肉桂

腹痛加白芍甘草有寒加桂心夏加芩連乾葛白芍冬加益

智草豆蔻半夏

如脇痛或喘急加柴胡甘草

如脚軟之力或痛加黃柏不已加防已

如耳鳴目黃煩領腫有脾肝腎外後腰痛腫赤肺脉洪大者

加羌活防風甘草藁本等以通其經血腫加黃芩黃連以

消腫

如咽痛領腫脉大而赤者加黃芩桔梗生甘草

如身體重者乃風濕相搏加羌活防風藁本荳木如疼止勿再服

如長夏濕土本邪太旺者加荳木白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣

因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇

夏雖熱，猶有惡寒。飢則常如飽。不喜食冷物。以升陽順氣之劑主之。

方升陽順氣湯

黃芪一錢

半夏

神翹

當歸身

橘皮各二錢

草荳蔻

柴胡各八分

升麻

人參各六分

黃蘆炒三錢

甘草炙五分

生薑三分

右剉一劑水三鍾煎一鍾食前溫服

勞役身熱骨疼腰痛頭重自汗以參芪退熱之劑治之

方參芪退熱湯

黃蘖

人參

白朮各二錢

當歸

桐皮

川芎各八分

甘草炙

升麻

柴胡

葛根

羌活

獨活

以上各五分

○右咀水煎

分服

勞役所傷寒溫不適身熱頭疼自汗惡寒脉微而弱以芪建中

湯主之

方見本卷前

病因變氣食溫麯結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣以木香化滯湯主之

方木香化滯湯

木香四分草荳蔻一錢甘草

炙

柴胡

當歸鬚

枳實各五分

半夏一錢

半橘皮八分

紅花三分

生薑三片

右㕮咀用水煎熟食速服

病久飲食自倍不能消化胸腹滿悶以枳硝二陳湯主之

方見本卷

前款
下

有氣者加香附子厚朴名寬中湯若陽魚肉加草荳蔻若傷冷物心腹疼而吐者加丁香青皮

病有宿食不消每日晡潮熱氣實者以小承氣湯主之

小承氣湯

枳殼

厚朴各三錢

大黃有人虛實

右咬咀用水煎熟食前溫服

若食傷飽滿則汗不止暫與枳殼二兩易方見本卷前

病醉飽努力或行房事致血畜胃口不時疼痛

彷和血順氣散

紅花

桃仁

香附

砂仁各一錢

陳皮

一錢

甘草

炙五分

烏藥

青皮

草荳蔻

水煎服

病過食傷中傳化不及脾濕壅塞胃氣干濁以致瀉泄腹痛小便短濶治宜疎壅溫導積滯升胃氣可也經云風勝湿是以用防風羌活等諸風藥以疎壅溫厚朴導積祛滯用甘草大棗健脾升麻柴胡升提下溜之胃氣泄瀉不無損陰血故加生地白芍收陰血以止腹瀉佐澤瀉利小水分消

其濕以止瀉。

升陽益氣湯

防風八分

羌活八分

獨活六分

厚朴一錢
薑汁炒

甘草炙五分

大棗三枚

升麻七分

柴胡一錢

生地七分

白芍七分

澤瀉八分

右剉一劑水二鍾煎一鍾溫服。

飲食停滯心胸痞悶身仍發熱頭濱有汗無汗以枳碗二陳湯

主之

方見本卷前。

大病瘥後傷食再復發熱以枳實梔子清熱導積滯。

枳實梔子湯

枳實

梔子各二錢

豆豉三錢

右咀先用水二大鍾煎退八分內枳梔先煎三兩沸入豆豉

煎八分服復令汗出。若宿食未消腹內飽脹量人虛實
加大黃大便虛勿服

病後勞役復熱倦怠乏力以補中益氣湯方見本卷前項內

病飽食過度輸化不及致傷中氣

治宜健脾導宿滯故用白朮補中健脾爲君枳實導積滯消宿
食爲臣荷葉以助生發之氣爲佐。

白朮土炒 六兩 枳實薑汁炒 一兩

右件爲末用生荷葉包飯炊燥搗末爲丸每以白湯送下三十
丸

病脾胃虛弱不思飲食嘔吐瀉利

治宜健脾和胃經云中氣不足者甘以補之是以用人參白朮
茯苓扁豆薏苡山藥蓮肉諸甘溫以補脾調胃進食止瀉

利少佐砂仁以止嘔

方參苓白朮散

人參四兩

白朮二兩

茯苓二兩

薏苡仁一兩

扁豆去殼薑炒兩

蓮肉去心三兩

山藥二兩

桔梗五

砂仁五錢

右爲細末。每食後用東湯調下。五七分。一日三服。

如噤口痢。加石蓮肉去蓮肉。和石菖蒲二兩。木香一兩。粳米湯下。休息痢。砂糖調下。

飽食過度。致傷中氣。食積不消。胸腹滿悶。喘等症。只由宿食傷脾。運化不健。以致中焦氣不舒。而爲滿悶。精液鬱而
成疾。

固宜導除宿食。而運化自健。餘證自瘳。是以用山楂。麥芽。神曲。

消宿食健脾爲君陳皮散鬱氣爲臣茯苓半夏蘿菔子等以豁痰爲佐連翹去胃中之濕熱爲使。

方丹谿保和丸

山楂四兩

麥芽三兩

神曲二兩

陳皮一兩

茯苓一兩
五錢

半夏一兩
五錢

蘿菔子一兩
五錢

連翹一兩

右件共爲末神曲打糊爲丸以米飲下三五十丸。

此藥腹中若無食積者不可服蓋山楂大能剋化食積若無食積反損脾胃正氣是以體虛之人忌此。

病中氣虛弱運動失常以致津液鬱而爲痰逆氣壅而爲痞脹治宜補中健脾運動其症自瘳經云中氣不足者補之以甘溫是以用人參白朮炙甘草諸甘溫以補中健脾爲君厚朴

檳榔木香枳實散滯氣爲臣半夏生薑陳皮豁痰爲使。

白术和胃丸

人參四兩

白术三兩

甘草一兩

檳榔七錢

厚朴一兩

木香五錢

枳實七錢

生薑一兩

陳皮去白一兩

生夏一兩

右件共爲細末以湯浸蒸餅丸如梧子大每食後以米飲下三五十丸日三服。

病勞役過度以致精神短少倦怠少氣不足以息畱血吐血等症蓋勞役則傷脾脾傷則健運失常以致膻中陽氣鬱而成火也云氣生壯火是也火愈既盛元氣愈消是以精神倦怠少氣不足以息經云壯火食氣是也火性炎上是以載血上出諸竅而爲吐衄等症

治法當以補中泄火經云虛火可補是也故用人參黃芪補中

益氣爲君。紫苑麥冬。五味泄火。清肺金爲臣。白芍。歸身。救陰血爲使。

方麥冬清肺飲

人參三錢

黃芪二錢

甘草一錢

歸身二錢

柴胡

補虛益肺止血清痰一兩

五味子七分

白芍一錢

麥門冬

滋腎水一錢

右剉一劑。水煎熱服。

病體重肢節疼痛。口燥舌乾。飲食無味。大便不調。小便短澁。不欲食。食不消。酒漸惡寒。潮熱。此皆中氣虧敗。脾濕壅遏。陽氣不伸。

治宜補中疎壅濕。升提陽氣。是以用人參。白朮。黃芪。炙甘草。補中健脾。進飲食。羌活。獨活。防風。疎壅濕。除體重疼痛。柴胡。

升麻提陽氣於冷澤泄利小水以參濕黃連以勝熱陳皮半夏以散逆氣白芍扶陰以救血。

升陽益胃散

人參三錢

黃芪二錢

白朮一錢

甘草分分七錢

羌活七分

防風一錢

獨活七分

柴胡一錢

升麻八分

茯苓一錢

澤泄一錢

黃連七分

陳皮一錢

半夏八分

白芍八分

右咀片薑三片東二枚水煎食後服

服藥小便利而病愈加增劇者是以不當利小便宜去茯苓澤瀉如古食一二日不可飽以藥力尚少恐胃氣易傷不得轉運生發以致泄瀉須稍食滋味之物或美食助藥以增升浮之氣氣順不可淡食以助邪氣之降沉宜稍復

形體使胃氣與藥轉運升降。又勿大勞使元氣復傷。○如胃氣稍完則宜少食易消化之類以助藥力。經云五果爲助是也。

病飲食勞倦失宜致傷中氣。腹脇滯悶。遇春口淡無味。夏月炎熱尚亦惡寒。飢亦如飽時。發蒸熱不喜冷物。盡由中氣虧敗。生發之氣不得伸越之故。蓋脾傷則運動失常。中焦之氣不得伸佈。是以腹脇潤悶。口乃脾之竅。春乃木旺之時。脾土愈虧。是以口淡無味。元氣已虧。夏月陽又外泄。腹中陽氣愈乏。是以時雖炎熱。身仍惡寒。脾病不能消穀。是以飢亦如飽。胃中虛寒。是以不喜冷物。胃氣下溜。陰火上乘。是以時發蒸熱。

治宜補中升陽。益元氣可也。故用參白朮甘草補中。助黃芪。

益元氣爲君。升麻。柴胡。升提陽氣爲臣。陳皮。半夏。散鬱氣以除滿悶。神麌。草蔻。和脾胃以進飲食。三者爲佐。當歸。救陰血。分理氣血各歸其所。黃柏。泄陰火。以除蒸熱。二者爲使。

升陽順氣湯

人參

五錢

白朮

二錢

甘草

炙

黃芪

五錢

升麻

五分

柴胡

七分

陳皮

一錢

半夏

七分

神翹

八分

草蔻

八分

當歸

一錢

黃柏

四分

右咀薑三片水煎食後日進三服。

脉上部有脉。下部無脉。此因飲食過飽填塞胸中。氣口大於人迎三倍。乃食傷太陰治以瓜蒂散吐之。

瓜蒂散

少蒂

赤小豆

右件等分爲細末。每服一錢。以溫水調下。取吐爲度。未得時先用帛搭束心上。勿令藥下。若尺脉不絕及胃之人不宜用此。

治飲食過甚。已服消蔻藥餌。心胸雖寬。但身熱虛倦。以補中益氣湯加神麪砂仁主之。方見本卷前。

乾葛主之

傷酒嘔逆吐出宿酒。昏冒眩暉頭疼如破。以冲和之劑加川芎

固冲和順氣湯

升麻一錢

五分

乾葛

防風

白芷

黃芪

人參

名五分

甘草

蒼朮

各半分

白芍藥

六分

右咬吐生薑三片。東子二枚。水煎熟。早飯後服。

固酒傷過多。結成酒癖。隨氣上下。以冲和湯加莪术、木香、硇砂。

仁玉之方同前

飲食酒贊之物過多。致傷中氣痞悶。不思飲食。小便赤澁。蓋中氣被傷。不能輸布水穀之氣。以致中焦之氣不得輸布。而爲痞悶。胃中宿食不消。是以不思飲食。夫酒是濕熱之飲。乃膀胱寒水之類。爲因脾病不能四布。濕熱蓄於膀胱。是以小便赤澁耶。

宜解酒毒消宿食。導濕熱爲本。補中健脾。行鬱氣爲標。是以用葛花解酒毒。以神麴。砂仁。白荳蔻等消宿食。茯苓。猪苓。澤泄等利小便。導濕熱。人參。白朮。補中健脾。生薑。陳皮。青皮。木香等。行鬱氣而除痞悶。

葛花解醒湯

葛花 五錢

神麴 一兩

砂仁 五錢

茯苓 一兩

白荳蔻 五錢 猪苓 七錢 滯瀉 一兩 人參 五錢

白朮 七錢 生薑 五錢 橘紅 七錢

木香 七錢 桔紅 七錢

青皮 導積滯
一兩

右件共爲末每用五錢食前水調服或煎湯亦可。

酒停胸膈爲痰飲者以二陳湯加枳實神曲麥蘖主之。

方 二陳湯

橘紅 二錢

半夏 一錢 五分

甘草 一錢

白朮 二錢

生薑 五片

烏梅 半枚

右剉一劑水二鐘煎一鍾食遠溫服。

久因於酒或飲灰酒遂成酒積腹痛大便窘迫以酒煮黃連丸

方 酒蒸黃連丸

黃連

右件每四兩用酒一升浸以瓦器罷。上累蒸至爛。取出晒乾爲末。滴水爲丸如梧桐子大。每服五十丸。食前溫水送下。

○惡食者乃胸中有傷物未消。以枳縮二陳湯加白朮。山楂子。川芎。蒼朮。神麴主之。

方見本
太前

病痞悶滿。膨不思飲食。喘嗽蒸熱。此皆中氣有虧所致。蓋中氣被傷。運動無力。水穀之氣不及四布。鬱於中焦。是以痞滿。不思飲食等症作矣。其胞中陽氣亦爲脾病。不得舒運。鬱而成火上炎。是以喘嗽蒸熱等症生焉。

治療之法理宜補中益氣使運達之權健行。則痞悶不食等症自息。喘嗽蒸熱之痰自療。是以用人參。白朮。茯苓。炙草。黃芪。補中益氣爲君。桑皮。麥冬。五味。清肺金止喘嗽爲臣。青皮。陳皮。行滯氣消痞悶爲佐。地骨皮。鮮恭爲使。

方參木調中湯

人參 三錢

白朮 二錢

茯苓 一錢

甘草 炙七分

黃芪 一錢

桑白皮 六分

麥冬 一錢

五味子 入分

青皮 六分

陳皮 一錢

地骨皮 八分

右㕮咀水煎熟食後溫服忌言語勞役。

傷糲米食不消心腹滿悶吞酸以白酒藥丸爲末一兩黃連末半兩和勻用米飲爲丸如梧桐子大每服一百丸米湯送下。