



M 9742

nd.

Bot Gard.

B 32.5





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

<https://archive.org/details/sertumlipsicumse00baum>

SERTVM LIPSIJVMI

SEV

STIRPES OMNES PRAEPRIMIS
EXOTICAS

CIRCA

V R B E M

OLIM MAXIME QVE NVPERRIME.

P L A N T A T A S

DIGESSIT ATQVE DESCRIPTSIT

SECUNDVM

METHODVM LINNAEANAM

IOANNES CHRISTIANVS GOTTLLOB
BAVMGARTEN

MEDIC. BACC.

L I P S I A E

EX OFFICINA HOLLIANA.

Sept. 1911
27511

1000 ft.

MUTTERSONA

ORAMIA

YUERBIA

V I R O

CLARISSIMO ATQVE DOCTISSIMO

SALOMONI CONSTANTINO
TITIO

PHILOSOPHIAE AC MEDICINAE CAN-
DIDATO

AMICO OPTIMO

IN PERPETVAE AMICITIAE ET AMORIS

MONUMENTVM

LIBELLVM HVNCCE

GRATVLANDO DEDICAT

IOH. CHRIST. GOTTL. BAVMGARTEN.

VIR CLARISSIME,
AMICE DILECTISSIME!

*I*llo statim tempore, quo *TVe* patria academia studia ad nos transtuleras, insigni amicitiam ineundam trahabar voluptate, et Fortuna hisce meis votis annuente, mox in *TVAM* veni amicitiam, quae successu temporis in ipsam familiaritatem abiit. Non poterat enim non hoc vinculum propter *TVAM* eruditionem aeque, ac ob morum *TVO RVM* humanitatem probitatemque magis inter nos firmari. Quanto igitur maioribus *TVVM* in me

*amorem documentis comprobasti, tanto magis
amor erga TE meus in dies creuit, cumque
hoc ipso ductus, animi mei sensus publice nunc
declarare studui.*

*Illucescit enim laetissima faustaque illa
dies, qua sincero gratoque animo TIBI sum-
mos in arte, cui hic usque strenue deditus
fuiſti, honores, quos hodie ex merito capis,
gratulari possum. Composui autem hoc ipso
consilio hoc Sertum Lipsicum, cum TE
non plane a plantarum studio abhorrere sciam,
ego vero eodem admodum fuerim delectatus
multumque temporis ipsi tribuerim. Ideoque
minime dubitare possum, quin hilari serenoque
vultu hunc libellum amicitiae testem accipias.
Nihil vero magis opto, quam ut hac via,
quam TIBI elegisti, doctrinarum copias stu-
dio assiduo comparatas, in aliorum usum con-*

vertere

vertere possis atque diligentiae probitatisque
fructus capias quam uberrimas. In primis
vero ex animo opto, ut iter ad exterros, quod
artis, cui TE dedisti, studio iam paras, feli-
cissime succedat, collectis multis doctrinis re-
dias atque suo tempore officia, quae patriae
debes, praestare possis.

*In huius autem utilitatem Parentis TVI
Venerabilis, cui talem filium eumque unicum
merito gratulor, gaudium, gentis clarissimae
decus, amicorum TVORVM, qui TE
amant, voluptatem, in posterum summa fru-
aris felicitate. TVVM vero in me animum
probum amicitiamque sincerissimam, quam tot
speciminibus mihi declarasti, in posterum serves
atque augeas. Evidem admodum optarem,
ut futuro tempore familiaritatis nostrae vincu-
lum eo arctius constringatur, quod eadem for-*

tunarum sedes nobis aliquando assignetur, quo
melius gaudiis, quae inter veros amicos inter-
cedunt, frui possimus. Evidem inter prima
habebo officia, ut omnem occasionem, qua
meam **TIBI** amicitiam declarare possum
avide arripiam, et quantum **TE** amicum plu-
ribus documentis probem. Ita vale mihi que
semper talis amicus, qualis fuisti. Dabam
Lipsiae d. XXVI. Martii MDCCLXC.

PRAE-

PRAEFAMEN.

Cum inter alia, quibus urbs nostra in civium
commodum pariter ac voluptatem fuit ex-
ornata, etiam id praecipue emineat, quod viam
illam circa urbem, quibus cives ad animum
recreandum atque corpus exercendum ambu-
lare solent, arboribus atque fruticibus praepri-
mis exoticis a paucis inde annis non vanum
fuscipere mihi videor negotium, si omnem ha-
rum stirpium brevem hic praeponerem enumera-
tionem. Dudum quidem viae arboribus inaio-
ribus, praecipue iis, quae longe lateque um-
bram spargunt, fuerunt septae, novissime ta-
men variis de caufis, atque in primis ad cives
delectandos atque ipsorum valetudinem procu-
randam, priscis illis multas novas adiecerunt
stirpes. Elegerunt vero in hunc finem plura
stirpium genera, quae in America septentrio-
nali, ut solo patrio, habitant, nostrum vero
clima, nisi aut frigus, aut aestus modum cesse-
rit, quoque patiuntur. Quippe quae cum no-

vitate sua, cum non ubivis obviam fint, tum iis, quae iisdem propriae sunt, virtutibus, spectatores delectant. ELECTOR enim SERENISSIMVS Pater Patriae Optimus, sua qua in cives tenetur cura, omnia illa moenia, quibus olim urbs nostra munita erat, destrui solumque planum reddi iusserat. Rediit igitur praecipua ad magistratum urbis nostrae cura, illudque negotium ILL MÜLLERVS, Consiliarius Bellicus intimus atque huius urbis Consul gravissimus meritissimusque in se suscepit, ipsumque ex omnium consensu summa cum arte atque diligentia perfecit. Evidem vero in concinando hocce catalogo hancce secutus sum rationem, ut ordine alphabeticō stirpes enumerarem, patriam assignarem, descriptiones atque synonyma ex novissima Systematis Linnaeani per MVRRAYVM editione adiicerem, simulque cum Celeberrimi du ROI et MARSHALII descriptiones interdum Linnaeanis clariores atque absolutiores fint, has suis locis inferem, denique meas qualescunque observationes hinc inde adspergerem.



SERTVM LIPSICVM.

ACER n. 1266. Class. XXIII. Ord. I.

The Maple-Tree. *Angl.* Erable. *Gall.* Ahorn.
Germ.

1. *Acer tataricum* foliis cordatis indivisis ferratis:
lobis obsoletis; floribus racemosis. LINN. Syst.
p. 911.

Tartarian Maple. *Angl.* *Erable de Tartarie.*
Gall. *Tatarischer Aborn.* *Germ.*

Habitat in Tataria.

Arbor celeriter crescit et dispescitur in plurimos ramos. Cortex ramorum est glaber et cinereus. Lignum tenax albidunque. Folia cordata, dentato-laciniata, longe petiolata. Cal. pallido-flavescens, monophyllum, saepius 5-fidum, passim 6- et rarissime 8 fidum. Cor. petala 5-10, albida, Calyce vix maiora, versus apicem magis inflexa. Stam. Filamenta 8-16 subulata, petalis multo longiora. Antherae flavae. Pist. Germen compressum. Stigmata 2-3. Per. Capsula parva, plana, ovata. Ala membranacea versus autumnum colore insciuntur rubro. Floret Iunio.

2. *Acer pseudo-platanus* foliis 5-lobis acute ferratis,
florum racemo composito, pendulo. *Du Rot*
Harpk. I. p. 4. *Acer* foliis 5-lobis inaequaliter
ferratis, floribus racemosis. LINN. Syst. p. 911.
Syc-

Sycomore Tree, or Greater-Maple, Engl. Erable blanc de Montagne. Gall. Der gemeine weisse Ahorn; Waldeſche; Spillenholz. Germ.

var. β) Acer pseudoplatanus maius foliis eleganter variegatis. Du HAMEL Arb. 2.

Greater strip'd Maple. Engl. Sycomore panaché. Gall. Gemeiner Ahorn mit gescheckten Blättern. Germ.

Sponte crescit in Europae australis montibus.

Floret Aprili et Majo. Folia inaequaliter 5-lobata, superne obscure virescens, inferne pallidiora et lanugine tecta. Semen omnium specierum maximum.

3. *Acer rubrum* foliis 5-lobis, subdentatis, subtus glancis, pedunculis simplicissimis aggregatis. LINN. Syst. p. 911.

Scarlet flowering Maple. Engl. Erable rouge d'Amerique. Gall. Scharlachrother Ahorn. Germ.

Habitat in Virginia et Pensylvania. vid. KALM.

Arbor dioica amat solum pingue humidumque, dehinc in Alnetis seri potest. Lignum durum et utile pro variis instrumentis musicis conficiendis.

4. *Acer saccharinum* foliis 5-partito-palmatis, acuminate dentatis, subtus pubescentibus. LINN. Syst. p. 911.

Sugar Maple. Engl. Erable à Sucre. Gall. Zuckerahorn. Germ.

Habitat in Pensylvania.

*Distinguitur ab *Acere glauco* foliis minoribus, leviter lobatis, minus glaucis et venosis: flore ex vicidi flavescente: ab *Acere Platanoide* foliis profundius divisis lobisque obtusioribus. Haec arbor Americanis offert succum, ex quo conficiunt saccharum.*

charum. Aqnat solum frigidum et altitudine pedum 18 etc. attingit.

5. *Acer platanoides* foliis 5-lobis acuminatis, acute dentatis, glabris, floribus corymbosis. LINN. Syst. p. 911.

Norway Maple. Angl. *Plane*. Gall. *Die Linne* f. *Lehne*; *Lein-Linbaum*. Germ.

Habitat in Europa frigidiori fere ubique.

Arbor celeriter crescens in dumetis valde apta. Lignum tenax et durum. Succens in foliis contentus acris, dehinc insecta fugiunt.

6. *Acer striatum* foliis subquinquelobis: lobis inaequaliter ferratis acuminatis, racemis pendulis, pedicillis unifloris, cortice eleganter striato. DU ROI I. p. 8. *Acer canadense*. MARSHAL p. 6. n. 4.

Striped Bark Maple. Angl. *Erable à écorce marbrée*. Gall. *Nordamerikanischer gestreifter Ahorn*. Germ.

In America septentrionali, e. g. Canada. vid. MARSHAL.

Arbor magnitudinem acquirit mediocrem: Hyemes perfert nostrates. Folia antecedenti simillima, ab illo distinguit sequenti modo: Folia profundiis lacinata, apice acutiora, caeterum dentibus pluribus inaequalibus instructa: porro sunt tenuiora, laeto virida et glabra, subtus costis et venis fortioribus intertexta. Flores solitarii. Stamina 7-8-10. Cortex glaber, a truncō in ramos usque extremos striis viridibus et albidis, vel sanguineis et cinereo-pallidioribus distinctis, ornatus. Floret Maio. Semina in nostris regionibus non matu-
rescunt.

7. *Acer Negundo* foliis compositis, pedunculis filiformibus, floribus racemosis. LINN. Syst. p. 912.

Virginian Ash-leaved Maple. Engl. *Erable de Virginie à feuilles de Frêne.* Gall. *Virginischer Ahorn mit Eschenblättern.* Germ.

Habitat in Ameriea septentrionali, e. g. in Virginia.

Arbor alte crescens praebet succum, ex quo Americae incolae praeparant saccharum. Floret Aprili et Maio. Semina parva, immatura.

AESCVLVS L. G. 498. Class. VII. Ord. I.

Horse Chestnut. Engl. Maronnier d'Inde. Gall. Rosskastanie. Germ.

8. *Aesculus Hippocastanum* floribus heptandris. LINN. Syst. p. 352.

Common Horse Chestnut. Engl. *Maronnier d'Inde.* Gall. *Gemeine Rosskastanie.* Germ.

Habitat in Asia australiori et in Europa valde vulgaris.

Floret Maio et Iunio.

AMYGDALVS L. G. 674. Class. XII. Ord. I.

Almond-Tree. Engl. Amandier. Gall. Mandelbaum. Germ.

9. *Amygdalus nana* foliis petiolatis, serratis basi attenuatis. MILL. Dict. 5. LINN. Syst. p. 462.

Dwarf Almond-Tree. Engl. *Amandier nain.* Gall. *Zwergmandelbaum.* Germ.

In Asia australi habitat.

Floret Aprili et Maio.

BERBERIS L. G. 476. Class. VI. Ord. I.

Barberry. *Angl.* Epine-Vinette. *Gall.* Berberitzenzaude. *Germ.*

10. *Berberis vulgaris* pedunculis racemosis, foliis ciliatis, spinis triplicibus. LINN. Syst. p. 543.

Common Barberry, or Pipperidge-bush. *Angl.*
Epine Vinette. *Gall.* *Gemeine Berberitzenzaude;*
Berbisbeeren; Sauerdorn. *Germ.*

Habitat in Asia orientali et Europa paeprimis in Sueciae, Franconiae et Germaniae dumetis et in agris.

Floret Maio et Iunio. Baccae maturescunt Autumno incipiente.

BETVLA L. G. 1147. Cl. XII. Ord. IV.

Birch-Tree. *Angl.* Bouleau. *Gall.* Birke. *Germ.*

11. *Betula alba* foliis ovatis acuminatis, ferratis. LINN. Syst. p. 849.

White Birch-Tree. *Angl.* *Bouleau blanc.* *Gall.*
Gemeine - weisse Birke; *Maien - Wunnebaum.*
Germ.

Habitat fere omnibus in Europae frigidioris sylvis et nemoribus.

Floret Aprili. Arbor in Oeconomia valde aestimabilis.

12. *Betula Alnus* foliis glabris, rotunde crenatis, rugosis, pedunculis ramosis. — *Betula Alnus* pedunculis ramosis. LINN. Syst. p. 829.

Common Alder. *Angl.* *Aune d'un verd foncé;*
Verne ou Vergne. *Gall.* *Gemeine Eller;* *Erle;*
Otterbaum. *Germ.*

In Europa valde communis. Floret Martio.

CARPINVS L. G. IIII. Clas. XXI. Ord. VIII.

Hornbeam-Tree. *Angl.* Charme. *Gall.* Hainbuche.
Germ.

13. *Carpinus Ostrya squamis strobilorum inflatis.*
LINN. Syst. p. 859.

*Hop-Hornbeam; Iron-Wood. Angl. Charme à
fruit d'Houblon, ou Bois dur. Gall. Hopfenbain-
buche. Germ.*

Habitat in Italia, Virginia, Canada et Ger-
mania.

CELTIS L. G. 1267. Cl. XXIII. Ord. I.

Nettle-Tree. *Angl.* Micocoulier. *Gall.* Zürgel-
baum. *Germ.*

14. *Celtis occidentalis foliis oblique ovatis acumina-
tis.* LINN. Syl. p. 912.

*Occidental Nettle, or Lote-Tree. Angl. Mico-
coulier de Virginie. Gall. Virginischer Zürgel-
baum. Germ.*

Habitat in Virginia et Pensylvania.

CERCIS L. G. 553. Cl. X. Ord. I.

Judas-Tree, or Bud-Tree. *Angl.* Guainier. *Gall.*
Judas- f. Griffelbaum. *Germ.*

15. *Cercis siliquastrum foliis reniformibus, glabris.* —
Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris. LINN. Syst.
p. 392.

*Peach-coloured Judas-Tree. Angl. Guainier
d'Ispagne. Gall. Spanischer Judasbaum. Germ.*
Habitat in Italia, Hispania, Narbone, Oriente.

COLV-

COLVTEA L. G. 954. Cl. XVII. Ord. IV.

Bladder Senna. *Angl.* Baguenaudier. *Gall.* Blasenbaum. *Germ.*

16. *Colutea arborescens* arborea, foliolis obcordatis.

LINN. Syst. p. 668.

Common Bladder Senna. *Angl.* *Faux séné ou séné sauvage.* *Gall.* *Gemeiner Blasenbaum; falsche Senne;* *Schaafslinsen.* *Germ.*

Habitat in Austria, Helvetia, Gallia, Italia.

Floret Iunio in Augustum usque.

CORNVS L. G. 155. Cl. IV. Ord. I.

Cornel or Dogwood-Tree. *Angl.* Cournouiller. *Gall.* Hartriegel. *Germ.*

* *Involucratae umbellatae.*

17. *Cornus mascula* arborea, umbellis involucrum aequantibus. LINN. Syst. 159.

Cornelian Cherry-Tree. *Angl.* *Cournouillier ordinaire;* *Acurnier.* *Gall.* *Gemeiner Kornelkirschenbaum;* *Hornkirschenbaum;* *Harlsken.* *Germ.*

Habitat in Austria, Helvetia, Carniola et Germania.

Vernali floret tempore ante frondescentiam.

** *Nudae cymosae.*

18. *Cormus sanguinea* ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis depresso HERITIER. p. 5. n. 5. LINN. Syst. p. 159.

Bloody-Twig, or Femal Cornel. *Angl.* *Cournouillier sanguin,* *ou Bois Punais.* *Gall.* *Hartriegel;* *Hundsbeeren;* *Teufelsmettern.* *Germ.*

In Europae dumetis et nemoribus vulgatissime.
Floret Iunio. Baccae maturescunt Autumno.

19. *Cornus sericea* ramis patulis, foliis ovatis subtus ferrugineo-sericeis, cymis depressis. HERITIER. p. 5. n. 6. t. 2. *Cornus Amomum arborea*, foliis ovatis petiolatis; floribus corymbosis terminalibus. DU ROI I. p. 164.

Daywood of New England. Angl. *Blaubeerigter Hartriegel.* Germ.

In Carolina et Pennsylvania habitat.

Frutex biorgyalis. Vernali floret tempore. Baccas perficit autumno. Omni regeneratur modo. Folia venosa quoad colorem varia.

20. *Cornus alba* ramis recurvatis, foliis lato-ovatis subtus canis, cymis depressis. HERITIER. n. 7. *C. alba arborea*, cymis nudis, ramis recurvatis. LINN. Syst. p. 159.

White berried Cornel. Angl. *Cournouillier blanc* Gall. *Hartriegel mit weissen Beeren.* Germ.

Habitat in Sibria et America septentrionali.

Bis vel ter anno floret. Ramuli conspicui prae-primis autumnali et vernali tempore variant ratione coloris omnium ruberrimi.

CRATAEGVS. L. G. 678. Cl. XII. Ord. II.

Wild Service-Tree. Angl. Alisier. Gall. Hagedorn. Germ.

21. *Crataegus Aria* foliis ovatis, incisis, serratis, subtus tomentosis. LINN. Syst. p. 463.

White Beam, or White Leaf-Tree. Angl. *Alouche de Bourgogne ou Drovillier.* Gall. *Mehlbeerbaum; rother Mehlbaum.* Germ.

In

In Helvetia, Suecia, Franconia, Anglia &c.
sponte crescit.

Floret Maio et Iunio. Baccae pulchre rubrae
exeunte maturescunt aestate.

22. *Crataegus terminalis* foliis cordatis repando-
angulatis, serratis, glabris. LINN. Syst. p. 463.

Wild Service, or *Maple leaved Service*. Engl.
Alisier des bois. Gall. *Darmbeeren*; *Arlsbeeren*;
Elritzen; *Eschroessel*. Germ.

Habitat in Germaniae, Gallicae, Angliae et
Helvetiae sylvis.

Floret Maio. Fructus exeunte Septembri
maturus.

23. *Crataegus coccinea* foliis ovatis repando-angulatis,
serratis glabris, (spinis longioribus) LINN. Syst.
p. 463.

Cockspur Hawthorn. Engl. *Epine à Fevilles*
d'Erable. Gall. *Nordamerikanischer Weissdorn mit*
großen Stacheln. Germ.

Habitat in America Septentrionali e. g. in Virgi-
nia, Canada.

Floret Maio. Baccae incipiente maturescunt au-
tumno et magnitudine glandis plumbeae.

24. *Crataegus Oxyacantha* foliis obtusis subtrifidis
serratis LINN. Syst. 465.

White Thorn, or *Common Hawthorn*. Engl.
Epine blanche, ou *noble Epine*. Gall. *Weissdorn*;
Mehldorn; *Unser lieben Frauen Birnlein*. Germ.

In Europae fere omnibus nemoribus, sylvis et
dumetis sponte nascitur. Floret Maio et Iunio.
Baccae virides versus Autumnum mutantur in ca-
lorem rubrum. Caro eiusdem farinosus, siccus et
flavus.

25. *Crataegus Azarolus* foliis obtusis subtrifidis, subdentatis. LINN. Syst. p. 465.

Azarole. Angl. *Azarolier.* Gall. *Azarolbaum.* Germ.

Habitat in Florentia et Carinola.

26. *Crataegus Crus Galli* foliis lanceolato-ovatis, serratis, glabris, ramis spinosis LINN. Syst. p. 465.
Mespilus Crus Galli MARSHAL.

Virginian Azarole. or *Bear-leaved Thorn* Angl
Azerolier de Virginie ou Epine luisante. Gall. *Virginischer Azarol - Weissdorn;* *birnblaettriger Weissdorn.* Germ.

In Virginia valde vulgaris.

27. *Crataegus lucida* foliis ovato-lanceolatis, lucidis, stipulis linearibus ferratis, floribus corymbosis, ramis spinosis. DU ROI. I. p. 186.

Strong Dorned Haw. Angl. *Epine à fevilles luisantes.* Gall. *Nord-Amerikanischer Weissdorn mit glaenzenden Blaetttern.* Germ.

Habitat in America septentrionali.

Floret Julio et baccae rubrae maturescunt Autumno.

28. *Crataegus prunifolia* foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, leviter ferratis; spinis sparsis brevioribus, fructu parvo, rubro. — *Mespilus prunifolia.* MARSHAL. n. 34.

Blumb-leaved Thorn Angl. *Epine à fevilles de Brunier.* Gall. *Weissdorn mit Pflaumenblaetttern.* Germ.

Habitat in Virginia.

CYTISVS L. G. 901. Cl. XVII. Ord. IV.

Base-Tree. *Angl.* Trefoil-Cytise. *Gall.* Bohnenbaum. *Germ.*

29. *Cytisus Laburnum* racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. LINN. Syst. p. 666.

Common Laburnum Angl. *Ebenier ou Fausse des Alpes*; *Aubour.* Gall. *Breitblaettriger Bohnenbaum.* Germ.

Habitat in Helvetia et Sabaudia.

Floret Iunio et Julio. Semina phaseolis mininis similia maturescunt Autumno. Lignum durum tenue.

30. *Cytisus sessilifolius* racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus. LINN. Syst. p. 666.

Smooth round-leaved Cytisus Angl. *Kleiner italienischer Bohnenbaum ohne Blattstiel.* Germ.

Nascitur Italia et Galloprovincia,
Fructus Floret Iunio et Julio.

ELAEAGNVS. L.G. 159. Cl. IV. Ord. I.

Wild Olive-Tree. *Angl.* Olivier Sauvge. *Gall.* Wilder Oelbaum. *Germ.*

31. *Elaeagnus angustifolia* inermis foliis leniari-lanceolatis. LINN. Syst. p. 163.

Narrow - leaved wild Olive. Angl. *Olivier de Bobême.* Gall. *Schmalblaettriger wilder Oelbaum.* *Paradiesbaum.* Germ.

Habitat in Bohémia, Hispania, Syria, Cappadocia &c.

Floret Julio & Augusto.

EVONYMVS. L. G. 291. Cl. V. Ord. I

Spindle-Tree. *Angl.* Fusain. *Gall.* Spindelbaum. *Germ.*

32. *Evonymus vulgaris* pedunculis solitariis, petalis oblongis, Fructibus glabris. SCOP. Carn. I. E. *Euro-paeus* floribus plerisque 4-fidis, sessilibus LINN. Syst. p. 238.

Common Spindle - Tree or Brickwood. Engl.
Fusain commun, ou Bonnet de Prêtre. Gall. Gemeiner Spindelbaum; Spillbaum; Pfaffenbüttlein.
Hahnckloetchen. Germ.

Habitat copiosissime in Europae sepibus et dumetis.

Floret Maio.

FAGVS. L. G. 1170. Cl. XX. Ord.

Chestnut-Tree. *Angl.* Chataignier. *Gall.* Kastanienbaum. *Germ.*

33. *Fagus Castanea* folijs lanceolatis acuminato-ferratis subtus nudis. LINN. Syst. p. 859.

Manured Chestnut. Engl. Chataignier maronnier.
Gall. Zahmer Kastanienbaum. Germ.

Habitat in Italia et Australioris Europae montibus.

Floret Maio et Junio, Fructus nondum tulit.
 Solum aiat pingue. Lignum magis *Quercui* simile, quam *Iuglandi*.

FRAXINV. L. G. 1273. Cl. XXIII. Ord. II.

Ash-Tree. Angl. Frêne. Gall. Esche. Germ.

34. *Fraxinus americana* foliolis integerrimis, petiolis teretibus. (fructu maiori) LINN. Syst. p. 918.
Fraxinus Caroliniana MILL. et DU ROI.

American white Ash. Angl. Frêne d'Amerique.
 Nordamerikanische weisse Esche. Germ.

Habitat in America septentrionali e. g. in Carolina.

35. *Fraxinus Novae Angliae* foliolis integerrimis, petiolis teretibus. MILL. Dict. 5.

New-England, or black Ash. Angl. Frêne de la nouvelle Angleterre. Gall. Nordamerikanische schwarze Esche. Germ.

Habitat in America septentrionali.

Distinguitur ab antecedente foliis minoribus, in apicem acuto-oblongum exeuntibus, leviter ferratis, obscure viridibus. Semina minora magis illis *Fraxinae excelsioris* seminibus similia, cortex ramorum magis niger.

GENISTA. L. G. 930. Cl. XVII. Ord. IV.

Dyers Broom. Angl. Genet. Gall. Ginster.
 Germ.

36. *Genista tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus. LINN. Syst. p. 645.

Common Dyers Broom, Wood-Waxen; Grean-Wood. Angl. Genestrole on Genet des Teinturiers. Gall. Faerbeginster. Germ.

Habitat in Anglia et Germania.

Frutex floret Iunio et Julio.

GLEDITSIA L. G. 1272. Cl. XXIII. Ord. II.

Triple-Thorned-Acacia. *Angl.* Fevier. *Gall.*
Gleditsia. Germ.

37. *Gleditsia spinosa* foliis pinnatis, oblongo-ovatis,
 caulis spinosis, spina obscure rubra inter axillas
 mucrone triplici, ad spinularum instar, obsessa.
 — *Gleditsia triacanthos* caule spinis triplicibus,
 axillaribus. LINN. Syst. p. 918.

Triple-thorned Acacia, or Honey-Locust. Angl.
Fevier à Epines à trois pointes. Gall. Dreistach-
 lichtige Gleditsie. *Germ.*

Habitat maxime in Virginia.

Floret Julio. — Siliqua in America bonum pre-
 bent pabulum.

HAMAMELIS L. G. 181. Cl. IV. Ord. II.

- With Hazel. *Angl.* Zauberhaselstrauch. *Germ.*

38. *Hamamelis Virginica nigra*, coryli foliis, glabris.
Virginian with Hazel. Angl. Virginischer
Zauberhaselstrauch. Germ.

Habitat in Virginia.

Floret Septembri exeunte et Octobri.

HIBISCVS L. G. 911. Cl. XVI. Ord. V.

Althaea. Frutex. *Angl.* Althaenstaude. *Germ.*

39. *Hibiscus Syriacus* foliis cuneiformi-ovatis, superne
 inciso-ferratis, caule arboreo. LINN. Syst. p. 630.
Syrian Ketmia, or Malloxa. Angl. Guimauve
royale. Gall. Syriscke Althaenstaude. *Germ.*

Habitat in Syria.

Frutex floret Augusto et Septembri.

HIPPO-

HIPPOPHAE L. G. 1210. Cl. XXII. Ord. IV.

Sea-Buck-Thorn. *Angl.* Chalef. *Gall.* Sanddorn.
Germ.

40. *Hippophae Rhamnoides* foliis lanceolatis. LINN.

Syst. p. 884.

Sea Buck-Thorn, or Sallow-Thorn. Engl. Chalef d'Europe, ou Rhamnoides à feuilles de Savle. Gall. Weidenblätterigter; Sandekreuzdorn: Meer- kreuzdorn; Finnische Beeren; rothe Schlehen. Germ.

Habitat in America septentrionali et Europa,
e. g. Suecia, Prussia, Helvetia, Anglia etc.

Floret Aprili et Maio. Baccae autumno ma-
turae, flavae, saporis austerioris.

Folia angustissima, lanceolata, superne glabra,
viridia, inferne cinereo-argentea, margine, sicuti
in Rosmarini foliis, reflexo. Rami cortice splen-
dente cincti colore.

HYDRANGEA L. G. 604. Cl. X. Ord. II.

41. *Hydrangea frutescens* foliis oppositis, acute cor-
datis, profunde serratis, venosis, floribus cymam
gerentibus. — *Hydr. arborescens.* LINN. Syst.
p. 410.

*Virginian Hydrangea. Engl. Strauchartige Vir-
ginische Hydrangea. Germ.*

Habitat in Virginia.

Floret Julio et Augusto.

IVNIPERVS. L. G. 1740. Cl. XXII. Ord. XII.

Juniper-Tree. *Angl.* Genêvrier. *Gall.* Wacholderstrauch. *Germ.*

42. *Juniperus communis* foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. LINN. Syst. p. 894.

Common Juniper-Tree. *Angl.* Genêvrier ordinaire. *Gall.* Gemeiner Wacholderstrauch. *Germ.*

Habitat in Germania, Dania, Suevia, Norvegia et Helvetia.

Floret vere.

43. *Juniperus Sabina* foliis oppositis erectis decurrentibus, oppositionibus pyxidatis. LINN. Syst. p. 894.

Common Savin. *Angl.* Savinier, ou Sabine. *Gall.* Sadebaum; Sevenbaum; Rosschwanzbaum. *Germ.*

Habitat in Lusitania, Italia, Oriente, Helvetia et Sibiria.

Loca amat umbrosa.

44. *Juniperus Virginiana* foliis ternis omnibus patentibus. MILL. Dict. 3.

Red Virginian Cedar. *Angl.* Cedre rouge de Virginie. *Gall.* Rothe Virginische Ceder. *Germ.*

Habitat in Virginia.

45. *Juniperus Caroliniana* foliis ternis basi adnatis; junioribus imbricatis: senioribus patulis. MILL. Dict. II. 4. *Juniper. virginiana.* LINN. Syst. p. 894.

Red Carolinian Cedar. *Angl.* Cedre rouge de Caroline. *Gall.* Rothe Carolinische Ceder. *Germ.*

Habitat in Carolina.

A priori distinguitur foliis ramorum extremis ad *Sabinam* proxime accedentibus; contra senioribus *Junipero communis* simillimis, qua de re MILLERVS hanc ab antecedente iure separavit.

LIGVSTRVM. L. G. 18. Cl. II. Ord. I.

Privet. *Angl.* Trôene. *Gall.* Reinweide. *Germ.*

46. *Ligustrum vulgare* foliis lanceolatis acutis, deciduis, paniculae pedicellis oppositis. LINN. Syst. p. 56.

Common Privet. Angl. Trôene commun. Gall. Gemeine Rainweide; Mundholz; Griesholz; Dintenbeerstaude; Zaunriegel. Germ.

Sponte crescit fere in omnibus Europae collibus, sylvis et dumetis.

Floret Junio,

LIRIODENDRON. L. G. 747. Cl. XIII. Ord. VII.

Tulip-Tree. *Angl.* Tulipier. *Gall.* Tulpenbaum. *Germ.*

47. *Liriodendron Tulipifera* foliis truncato-lobatis. LINN. Syst. p. 507.

Virginian Tulip-Tree. Angl. Tulipier de Virginie ou Bois jaune. Gall. Virginischer Tulpenbaum. Germ.

Habitat in America septentrionali.

Anglia passim *Old Womans Smock*, i. e. das *Hemd der alten Frau*, appellatur ob similitudinem partis indusii mainmas claudentis. Folia in doloribus capitis inserviunt americanis pro cataplasmate. Radicum cortex in omnibus febribus laudatur.

LONICERA L. G. 747. Cl. V. Ord. I.

Honeysuckle or Woodbine. *Angl.* Chevre Feuille.
Gall. Lonicere. *Germ.*

* *Perichymena, caule volubili.*

48. *Lonicera sempervirens* vertillis aphyllis termina-
 libus, foliis omnibus connato-perfoliatis. LINN.
 Syst. p. 215.

Ever-green, Honeysuckle. Angl. Chevre feuille
de Virginie. Gall. Immergrün; Geißblatt. Germ.
 Habitat in Virginia, Mexico.

Floret Iunio, Iulio et Augusto.

49. *Lonicera Periclymenum* capitulis ovatis imbrica-
 tis terminalibus, foliis omnibus distinctis. LINN.
 Syst. p. 216.

Wild Honeysuckle or Woodbine. Angl. Chevre-
 feuille d'Allemagne. Gall. Geschlungene Lonicere;
 wildes gemeines Geißblatt; Waldwinde; teutscher
 Je länger je lieber. Germ.

Habitat in Germania, Anglia, Helvetia.

Floret Iunio et Iulio.

Variat saepe quoad figuram foliorum et colore
 floris; dehinc passim deprehenditur flore intus albo,
 extus rubro; passim foliis sinuosis vel quercinis;
 passim denique foliis quercinis variegatis.

** *Chamaecerasa, pedunculis bifloris.*

50. *Lonicera nigra* pedunculis bifloris, baccis distin-
 ctis, foliis ellipticis integerrimis. LINN. Syst.
 p. 216.

Black-berried upright Honeysuckle. Angl. Che-
 vre feuille à fruit noir. Gall. Schwarze Hecken-
 kirsche; aufrechte Waldwinde. Germ.

Habitat

Habitat passim in Germania, copiose in Helvetia, Gallia, Delphinatu.

Floret Maio, Junio. Involucrum germinibus brevibus. Folia integerriina saepius a Papilione Canilla erosa. SMIEDEL.

51. *Lonicera tatarica* pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis cordatis obtusis. LINN. Syst. p. 216.

Tartarian Honeysuckle. Angl. *Chevre feuille de Tartarie.* Gall. *Tartarische Heckenkirsche.* Germ.

Habitat in Tataria.

Floret Iunio et Julio. Sepibus vivis humilioribus valde apta.

52. *Lonicera alpigena* pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis, foliis ovali-lanceolatis. LINN. Syst. p. 216.

Red berried upright Honeysuckle. Angl. *Chamaecerasus des Alpes à fruit rouge.* Gall. *Alpenbeckenkirsche.* Germ.

Habitat in Alpibus helveticis, pyrenaeis, Allobrogicis.

Floret Maio et Iunio.

Folia ovata, acuta, integra. Flos ruber. Fructus ruber, genuinus, duobus punctis notatus.

53. *Lonicera caerulea* pedunculis bifloris, baccis coadunatis globosis, stylis indivisis. LINN. Syst. p. 216.

Blue-berried upright Honeysuckle. Angl. *Chamaecerasus à fruit blue.* Gall. *Blaubeerigte Heckenkirsche.* Germ.

Habitat in Helvetia, Austria.

Floret rarius.

*** *Caule erecto, pedunculis multifloris.*

54. *Lonicera Symphoricarpos* capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. LINN. Syst. p. 215.

Indian Currants or Shrubby St. Peterswort.
Angl. *Indianischer Johannisbeerstrauch.* Germ.

Habitat in Virginia, Carolina.

Floret Septembri et Octobri. Frutex humilis. Folia pinnata, ovata, integra, breviter petiolata, paululum pilosa. Flores parvi, in flavo-virescentes, breviter pedunculati acuminati; pedunculi inter axillas foliorum secundum longitudinem caulis positi.

LYCIVM. L. G. 273. Cl. V. Ord. I.

Box. Thorn. . Angl. Box. f. Bocksdorn. Germ.

55. *Lycium Europaeum* spinosum, foliis obliquis, ramis flexuosis, teretibus. LINN. Syst. p. 228.

Common Box-thorn. Angl. *Europäischer Bocksdorn.* Germ.

In Europa australi. Floret aestate et Autumno.

56. *Lycium Barbarum* spinosum, foliis lanceolatis, calycibus subbifidis. LINN. Syst. p. 228.

African Box-thorn. Angl. *Chinesischer f. fremder Bocksdorn.* Germ.

Habitat in Asia et Africa.

Floret cum priori. Frutex debilis hyemes perfert nostrates. Calycis ore bilobo, passim 3-lobo a reliquis differt. Baccæ ovatae, flavae aut rubrae.

MESPILVS. L. G. 681. Cl. XII. Ord. IV.

Medlar-Tree. *Angl.* Nefflier. *Gall.* Mispelbaum.
Germ.

57. *Mespilus Pyracantha* spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. LINN.
Syst. p. 466.

Ever-green Thorn, or Pyracantha. *Angl.* *Buisson ardent.* *Gall.* *Immergrünender Dorn.* *Germ.*

Habitat in Italiae et Galloprovinciae sepibus; porro in Corsica.

58. *Mespilus germanica* inermis, foliis lanceolatis subtus tomentosis, floribus solitariis, sessilibus. LINN. Syst. p. 466.

Common Dutch Medlar-Tree. *Angl.* *Nefflier commun.* *Gall.* *Gemeiner Mispelbaum.* *Germ.*

Habitat in Europa calidiori.

Floret Junio.

59. *Mespilus Cotoneaster* inermis, foliis ovatis, integrerrimis: subtus tomentosis. LINN. Syst. p. 466.

Dwarf Quince-Tree. *Angl.* *Nefflier Cotoneaster.* *Gall.* *Zwergmispelbaum mit rother Frucht;* *wilde Quite;* *Bergquitte.* *Germ.*

In Europae frigidioris collibus et in Pyrenaeis, Ararat.

Floret Maio et Junio. Baccae pulchre rubrae maturescunt Autumno et in hyeme usque ornant fruticem.

MORVS. L. G. 1150. Cl. XXI. Ord. IV.

Mulberry-Tree. *Angl.* Meurier. *Gall.* Maulbeerbaum. *Germ.*

60. *Morus alba* foliis oblique cordatis, laevibus. LINN. Syst. p. 851.

White

White Mulberry-Tree. Angl. *Mûrier à fruit blanc.* Gall. *Weisser Maulbeerbaum.* Germ.

Habitat in China ex qua Graeciam, Italiam, Galliam et denique Germaniam translata est.

Floret Maio. Arbor, quae per plurimos annos colebatur in regionibus nostratis, frigore tacta vehementissimo, cui anno 1789. exposita est, plane fere emortua est.

61. *Morus papyrifera* foliis maxime palmatis vel lobatis, sparsim cordatis; difformibus, scabris, subtus tomentosis, fructibus hispidis. Du ROI I. p. 432. M. foliis palmatis, fructibus hispidis. LINN. Syst. p. 851.

Papir Mulberry-Tree. Angl. *Murier à Papier.* Gall. *Papier-Maulbeerbaum.* Germ.

Habitat in Iaponia, China, Carolina calidiori.

PHILADELPHVS L. G. 669. Cl. XII. Ord. I.

Syringa or *Mock-Orange.* Angl. *Pfeifenstrauch.* Germ.

62. *Philadelphus coronaria* foliis subdentatis. LINN. Syst. p. 460.

White Syringa or Mock-Orange. Angl. *Syringa à fleurs blanches.* Gall. *Wilder Jasmin; falscher Syringsstrauch.* Germ.

Habitat in Germania et Helvetia.

Floret Maio et Iunio.

PINVS L. G. 1175. Cl. XXI. Ord. IX.

Pine-Tree. Angl. *Pin.* Gall. *Fichte.* Germ.

* *Foliis pluribus ex eadem basi vaginatis.*

63. *Pinus strobus* foliis quinis margine scabris, cortice laevo. LINN. Syst. p. 860.

New-

New England or Lord Weymouths- Pine. Engl.

Pin blanc de Canada. ou Pin de Lord Weymouth.

Gall. *Weymouths f. Büschelkiefer.* Germ.

Habitat in *Virginia, Canada.*

64. *Pinus Larix* foliis fasciculatis, obtusis, deciduis, conis ovato-oblongis, squamis ovatis, subscabris, margine laceris. *Du Roi* T. II. p. 61. *Linn. Syst.* p. 860.

Common Larch-Tree. Engl. *Pin Melese, ou Mesle, Larche.* Gall.

Habitat in *Alpibus Bohemicis, Silesiacis, Helvetiis, Stiriacis, Corinthiacis, Tridentinis, Sibiriae, Hungariae etc.*

** *Foliis solitariis et basi distinctis.*

65. *Pinus Picea* foliis solitariis, subulatis, mucronatis, laevibus, bitarlam versis; conis oblongis pendulis, squamis ovalibus, planis marginibus undulatis et laceris. *Du Roi* II. p. 110. *Pinus Abies.* *Linn. Syst.* p. 861.

Common Fir or Pitch Tree. Engl. *Pice; Pece ou Pesse.* Gall. *Fichte, Holztanne; Harz f. Pechtanne; schwarze Tanne.* Germ.

Habitat in *Europae Asiaeque borealibus humidiisculis.*

Floret Maio et Iunio.

66. *Pinus canadensis* solitariis linearibus bifariam versis, ramulis glabris, cicatricibus sub foliis decurrentibus; conis ovato-oblongis, pendulis, laxis, squamis subrotundis. *Du Roi* II. p. 174.

New-Foundland white Spruce Fir. Engl. *Pin Epinette blanche.* Gall. *Weisse Nordamerikanische Fichte.* Germ.

Habitat in *Canada.*

Floret Maio et Iunio.

67. *Pinus Mariana* foliis solitariis subulatis, bifariam versis, ramulis pubescentibus, cicatricibus sub foliis sessilibus: conis ovalis pendulis, squamis ovalibus, marginibus laceris et undulatis. *Du Roi II.* p. 127. *Pinus Canadensis* foliis solitariis linearibus obtusifusculis subimembranaceis. *LINN.* Syst. p. 860.

Habitat cum priori.

Floret Iunio. Haec vero ab illa facile distinguitur, trunko iminori, debiliori, foliis minoribus, angustioribus laete viridibus, (i. e. *grassgrün*) ramis cortice fusco, vel cinereo-fusco, pilis albidis obsesto, vestitis; conis minoribus purpurascientibus: contra illa habet folia paululum latiora et longiora, obscure viridescentia (i. e. *stahlgrün*) aversus apicem curvata. Ramuli soliolis densioribus obsessi, glabri, albidi et sulcis distinctioribus exarati; caeterum arbor celerius crescit.

68. *Pinus Abies* foliis solitariis emarginatis; conis oblongis erectis, squamis subrotundis planis basi acuminatis. *Du Roi II.* p. 95. *Pinus Picea.* *LINN.* Syst. p. 860.

Silver-leaved Fir-Tree. Angl. *Sapin à feuilles d'If.* Gall. *Edeltanne;* *Weiss-Silber-Taxblättrige Tanne.* Germ.

Habitat in Alpibus Helveticis, Sueciae, Buccariac, Bohemiae, Thuringiae, Saxoniae etc.

PLATANVS L. G. 1173. Cl. XXI. Ord. VIII.

Plane-Tree. Angl. Platane. Gall. *Platanus.* Germ.

69. *Platanus occidentalis* foliis acute lobatis (profunde ferratis, subtus tomentosis, longe petiolatis.) *LINN.* Syst. p. 859.

Occi-

Occidental Plane Tree or Large Button Wood.
 Angl. *Platane d'Amerique, ou Cottonier.* Gall.
Nordamerikanischer Platanus; Wasserbuche. Germ.

Habitat in America septentrionali, i. e. in Virginia.

Floret Iunio et Julio. Arbor per paucos annos altitudine plurimorum pedum attingens loca prae-primis amat humida. Folia late expansa, acute passim obtuse angulata; saepius lobata, rare laci-niata, superne laete viridia, subtus pallidiora et lana tenui vestita.

POPVLVS L. G. 1228. Cl. XXII. Ord. VII.

Poplar-Tree. Angl. *Peuplier.* Gall. *Pappelbaum.*
 Germ.

70. *Populus Balsamifera* foliis ovatis, serratis, subtus albidis, stipulis retinosis. LINN. Syst. p. 889.

Balsam or Tacamahaca-Tree. Angl. *Peuplier noir dit Tacamahac, ou Baumier.* Gall. *Balsam-poppel; Takamahacabaum.* Germ.

Habitat in Sybiria et America septentrionali.

Arbor hyemes perfert nostrates et solum amat humidum.

71. *Populus tremula* foliis subrotundis, dentato-angu-latis, utrinque glabris. LINN. Syst. p. 889. n. 2.

Aspen-Tree, or Trembling Poplar. Angl. *Peuplier Tremble.* Gall. *Esche; Asche; Flatteraspe; Zitteraspe.* Germ.

Habitat in Europae sylvis nemoribusque.

Floret vere. Petioli apice compressi et debiles, unde motui perpetuo exponitur tremulnati.

72. *Populus Italica* foliis rhomboidiformibus, distincte crenatis, longe petiolatis, alternis. — *Populus nigra du Roi* Il. p. 141. var. β . *italica*.

Lombardey Poplar. Tree. Engl. Peuplier de Lombardie. Gall. Italienische Pappel. Germ.

Habitat in Italia.

Distinguitur a *Populo nigra* statura minori; fabrica tenuiori; foliis minoribus, obscure splendente viridibus.

73. *Populus Virginica* foliis subcordatis, obtuse dentatis, longe petiolatis.

Virginian Poplar-Tree. Engl. Peuplier de Virginie. Gall. Virginische Pappel. Germ.

Habitat in Virginia.

Differet ab antecedente, foliis magis cordiformibus et dentatis; porro quoad foliorum numerum positionemque. In hac enim plura observavi, ita infusa rami subopposita; alia alterna et ex gemma suprema 3 pluraque foliola prodeant; a *Populo heterophylla* foliis minoribus deltoideo-cordatis, petiolo rotundiore, ramo nec torto, magis rotundo, versus apicem modo sulcato, cortice cinereo-albido, ligno pallidiore ac tenaciore.

POTENTILLA L. G. 690. Cl. XII. Ord. V.

Shrubby Cinquefoil. *Angl. Fünffingerkraut. Germ.*

74. *Potentilla fruticosa* foliis pinnatis, caule fruticoso. LINN. Syst. p. 477.

Shrubby Cinquefoil. *Angl. Pentaphilloides en arbuste. Gall. Strauchartiges Fünffingerkraut. Germ.*

Habitat

Habitat in America, Anglia, Sibiria, Oelandia australi.

Floret Iunio in Augustum usque. Frutex humilis.

PRVNVS L. G. 675. Cl. XII. Ord. I.

Plumb.-Tree. *Angl.* Prunier. *Gall.* Pflaumenbaum. *Germ.*

75. *Prunus Padus* floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis LINN. Syst. p. 462.

Bird Cherry-Tree. *Angl.* Cerisier à grappes; Putier. *Gall.* Traubenkirsche; Vogelkirsche; schwarze Weide; Stinkbaum. *Germ.*

Habitat in Europae nemoribus &c.

Floret Maio et Iunio. Baccæ nigrae maturescunt exeunte aestate.

76. *Prunus Virginiana* floribus racemosis; foliis deciduis, basi antice glandulosis. LINN. Syst. p. 462.

Virginian Bird-Cherry. *Angl.* Cerisier de Virginie. *Gall.* Virginische Traubenkirsche. *Germ.*

Habitat in Virginia et Carolina.

Floret Iunio et Julio. Baccæ magnitudinis pisiformensis, primum viridescentes, deinde rubrae et si maturescunt, splendide nigrae evadunt. Arbor priori simillima, ab illo distinguitur foliis minoribus, glaberrimis, tenuioribus, viridescente splendentibus, ac ligno magis tenaci.

77. *Prunus Cerasus* var. β. flore pleno. Bauh. pin.

450. MILL. Dict. n. 3.

Double Flowering Cherry-Tree. Angl. *Cerisier à fleur double.* Gall. *Gemeiner Kirschbaum mit gefüllter Blume.* Germ.

Floret Maio et Iunio.

PTELEA L. G. 159. Cl. IV. Ord. I.

Shrub-Trefoil. *Angl.* *Staudenklee.* *Germ.*

78. *Ptelea trifoliata* foliis ternatis, ovato-lanceolatis.
LINN. Syst. p. 160.

Carolina Shrub-Trefoil. Angl. *Ptelea à trois fevilles.* Gall. *Carolinischer Staudenklee.* Germ.

Habitat copiosissime in Virginia, passim in Carolina.

Floret Maio et Iunio. Truncus erectus, arboreus, in plures ramiulos divisus. Folia composita, e tribus, passim quoque 4-5 foliolis ovato-lanceolatis. Pedunculus, florem gerens umbellatum. Petala albo-slavescentia pergratum spargentes odorem. Pericarp. Capsula suborbiculata, plana, *Vlmi* semi-nibus simillima, bilocularis. Sem. I. obtulum, basi attenuatum.

PYRVS L. G. 682. Cl. XII. Ord. IV.

Pear, or Apple-Tree. *Angl.* *Poirier ou Pommier.*
Gall. *Pirns.* *Aepfelbaum.* *Germ.*

79. *Pyrus malus sylvestris* foliis ovatis serratis, umbellis sesilibus, caule arboreo. LINN. Syst. p. 466.

Crab-Tree or Wilding. Angl. *Pommier sauvage.* Gall. *Holzapfel.* Germ.

Habitat in Europae sylvis, agris et ad sepes.

Floret Aprili et Maio.

80. *Pyrus coronaria* foliis ferrato-angulosis, umbellis pedunculatis. LINN. Syst. p. 466.

Virginian Sweet-scented Crab-Tree. Angl.
Pommier odorant à feuilles anguleuses. Gall. *Virginischer wohlriechender Holzapfel.* Germ.

Habitat in America septentrionali, maxime in Virginia.

Floret Iunio. Flores pergratum spargunt odo-rem. Fructus maturus Autumno, parvus, caro eiusdem farinosus, valde austerus.

RHAMNVS L. G. 284. Cl. V. Ord. I.

Buck-Thorn. Angl. Nerprun. Gall. Kreuzdorn. Germ.

81. *Rhamnus Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis; foliis integerrimis. LINN. Syst. p. 234.

Black-berry-bearing Alder. Angl. *Bourdaine,* *Aune noir baccifère.* Gall. *Faulbaum;* *Pulverbolz.* Germ.

Habitat in Europae dumetis nemoribusque humidis.

Floret Maio in Augustum usque.

82. *Rhamnus Catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis, divisis, foliis ovatis, caule erecto. LINN. Syst. p. 232.

Common or Purging Buck-Thorn. Angl. *Nerprun;* *Noir prun.* Gall. *Gemeiner purgirender Kreuzdorn.* Germ.

In Europae dumetis, nemoribus valde frequenter occurrit.

Floret Maio.

RHVS L. G. 399. Cl. V. Ord. III.

Sumach. Angl. Sumac. Gall. Sumach. Germ.

83. *Rhus coriara* foliis pinnatis serratis, obtusiuscule serratis, ovalibus, subtus villosus. LINN. Syst. p. 292.

Tanners Sumach. Angl. Sumac de Provence. Gall. Gemeiner Gärberbaum. Germ.

Habitat in Europa australi e. g. in Gallia, et Italia.

84. *Rhus glabrum* foliis pinnatis serratis lanceolatis, vtrinque nudis. LINN Syst. p. 293.

Smooth Sumach. Angl. Sumac glabre de Pensylvanie. Gall. Glatter Sumach. Germ.

Habitat in America septentrionali ad sepes et agros.

Floret Iulio et Augusto. Folia obscure viridia mutantur versus autumnum in colorem sanguineum. Radix valde repit.

85. *Rhus Cotinus* foliis simplicibus obovatis. LINN. Syst. p. 294.

Venice Sumach. Angl. Fustet. Gall. Peruckenbaum. Germ.

Habitat in Lombardia, Italia et ad radices Apenninorum, in Carniola, Hispania.

Floret Iunio et Iulio. Semina in regione nostro immatura. Lignum in Servia inservit pro cortice peruviano.

RIBES L. G. 301. Cl. V. Ord. I.

Currant-Bush. Angl. Grosselier. Gall. Johannisbeerstrauch. Germ.

86. *Ribes Alpinum* inerme, racemis erectis, bracteis flore longioribus. LINN. Syst. p. 243.

Sweet

Sweet Alpin Currant. Angl. *Grosselier des Alpes.* Gall. *Alpen Johannisbeere;* *Strausbeere;* *Corinthenstaude.* Germ.

Habitat in Suecia, Helvetia, Anglia.

Floret Maio.

ROBINIA L. G. 953. Cl. XVII. Ord. IV.

87. *Robinia Pseud-Acacia* racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, stipulis spinosis. LINN. Syst. p. 668.

Common Bastard Acacia, *Locust - Tree.* Angl.

Faux - Acacia. Gall. *Virginischer Schotendorn;* *Heuschreckenbaum.* Germ.

Habitat in America septentrionali, in nostris tibus regionibus quasi iudigena facta.

Floret Iunio et Iulio. Racemi penduli, albi.

88. *Robinia Caragana* pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inerimibus. LINN. Syst. p. 668.

Siberian Caragana. Angl. *Caragana de Sibirie.* Gall. *Sibirischer Erbsenbaum;* *Taubenerbsen.* Germ.

Habitat in Siberia.

Floret Maio et Iunio. Folia pecoribus pabuluum offerunt optimum et semina pilis substitui possunt in hominum pecorumque usum.

RVBVS L. G. 688. Cl. XII. Ord. V.

Raspberry-bush. Angl. *Framboisier.* Gall. *Brombeerstrauch.* Germ.

89. *Rubus odoratus* foliis simplicibus (quinquelobis inaequaliter serratis), caule inerme multifolio, multifloro. LINN. Syst. p. 475.

Virginian Rose-Flowering Raspberry. Angl.
Framboisier à fleurs odorantes. Gall. *Wahlreichender Himbeerstrauch*. Germ.

Habitat in Canada, Pensylvania et Virginia.

Floret Iunio in Septembre usque. Rami
erecti inermes.

SAMBVCVS L. G. 402. Cl. V. Ord. III.

Elder. Angl. Sureau. Gall. Hollunder Germ.

90. *Sambucus Ebulus* cymis tripartitis, stipulis folia-
ceis, caule herbaceo. LINN. Syst. p. 295.

Dwarf Elder, Danewort or Wallwort. Angl.
Hieble ou Yble. Gall. *Zwerghollunder*; *Attich Niederholder*; *Sommerholder*. Germ.

Habitat in Europa.

Floret Iunio et Iulio. *Baccae nigrae*.

91. *Sambucus laciniata* cymis 5 partitis, foliis bipinnatis; pinnis ternatis, foliolis lanceolatis, incisis,
caule arboreo, RETZ. Obs. Fasc. III. p. 30. LINN.
Syst. p. 296.

Parcley-leaved Elder. Angl. *Sureau à feuilles de Persile*. Germ. *Hollunder mit Petersilienblättern*. Germ.

Floret Iunio.

92. *Sambucus racemosa* racemis compositis, ovatis
caule arboreo. LINN. Syst. p. 296.

Red-berried mountain Elder. Angl. *Sureau à fruit disposé en grappes*. Gall. *Traubenhollunder*;
Berg-Hirsch-Waldbollunder. Germ.

In Europae australis montibus sponte nascitur.

Floret Maio et Iunio.

SORBVS L. G. 679. Cl. XII. Ord. III.

Service - Tree; Quicken - Tree. *Angl.* Sorbier, Gall.
Speierling. *Germ.*

93. *Sorbus aucuparia* foliis pinnatis vtrinque glabris.
LINN. Syst. p. 465.

Quickbeam; Roan-Tree, or Wild Service-Tree.
Angl. Cochêne; Cormier; Sorbier Sauvage;
Sorbier de Chasseurs. *Gall.* Vogelbeerbaum; Qui-
tzenbeerbaum; Eberenschenbaum; *Esch.* f. Arsch-
rösel Gerin.

Habitat in Europa frigidore et quoque in Li-
bano.

Floret Maio. Baccae rubrae versus Autuinium
mature.

SPIRAEA L. G. 686. Cl. XII. Ord. IV.

Spierstaude. *Germ.*

94. *Spiraea Salicifolia* foliis lanceolatis obtusis, serra-
tis, nudis; floribus duplicato - racemosis. *LINN.*
Syst. p. 471. n. 2.

Willow-leaved Spiraea. *Angl.* Weidenblättrige
Spierstaude. *Germ.*

Habitat in Sibiria et Tataria.

Floret Iunio in Augustum usque.

95. *Spiraea Alba* foliis lanceolatis ovatis, apice serra-
tis, floribus duplicato - racemosis. *Du Roi.* II.
p. 430.

White Flowering Spiraea. *Angl.* Weisblühende
Spierstaude. *Germ.*

Habitat in America septentrionali.

Floret Julio in Septembrem usque.

96. *Spiraea hypericifolia* foliis obovatis, integerimis, umbellis sessilibus. LINN. Syst. p. 471.

Shrub St. Johns Wort, or Canadian Spiraea.
Angl. *Spierstaude mit Johanniskrautblättern.*
Germ.

Habitat in Canada.

Floret Maio et Iunio.

97. *Spiraea Opulifolia* foliis lobatis serratis, corymbis terminalibus. LINN. Syst. p. 472.

Gelder Rose-leaved Spiraea or Nine Bark.
Angl. *Bois à sept écorces.* Gall. *Wasserholder-blattrige Spierstaude.* Germ.

Habitat in Virginia, Canada.

Floret Maio et Iunio. Stylos passim 3-5 observavi.

STAPHYLEA L. G. 404. Cl. V. Ord. III.

Bladder-Nut-Tree. Angl. *Nez Coupé.* Gall. *Pimprenuss.* Germ.

98. *Staphylea pinnata* foliis pinnatis. LINN. Syst. p. 396.

Common Bladder-Nut-Tree. Angl. *Nez-coupé;*
Baguenaudier à Pater Noster. Gall. *Gemeiner Pimprenussstrauch;* *Klappernuss;* *Todtenkopfbaum.* Germ.

Habitat in Europa australiori. Styli 2. Caps. 2-locularis.

Floret Maio et Iunio.

99. *Staphylea trifoliata* foliis ternatis. LINN. Syst. p. 296.

Three-

Three-leaved Bladder-Nut-tree. Angl. Nez-coupé de Virginie. Gall. Kleeblätteriger Pimpernussstrauch. Germ.

Habitat in Virginia.

Floret cum priori. Styli 3. Capsula 3-locularis.

SYRINGA L. G. 22. Cl. II. Ord. I.

Lilac. *Angl. et Gall. Flieder. Germ.*

100. *Syringa vulgaris* folijs ovato-cordatis. LINN.

Syst. p. 57.

Common blue Lilac, or Pipe-Tree. Angl. Lilac. Gall. Blauer Spanischer Hollunder; Türkischer Hollunder; Huck auf die Magd. Germ.

Habitat in Persia, Hispania, Helvetia.

Floret Maio et Iunio.

101. *Syringa persica* foliis lanceolatis, integris. LINN.

Syst. p. 57.

Persian Jasmine, or Common Persian-Lilac. Angl. Lilac de Perse. Gall. Spanischer Rainweidenblätteriger Hollunder. Germ.

Habitat in Persia.

Floret Iunio et Julio. Frutex humilior priori.

102. *Syringa laciniata* foliis lanceolatis, integris, dissectisque. HORT. upf. 6. MILL. Dict. n. 3.

Cut leaved Persian Jasmine. Angl. Lilas de Perse à feuilles découpées. Gall. Spanischer Hollunder mit ausgeschnittenen Blättern. Germ.

Habitat

Habitat cum priori. Frutex eandem altitudinem acquirit, ac antecedens, et modo distinctus foliis 2 - 6 - lacinas habentibus.

THVIA L. G. 1176. Cl. XXI. Ord. IX.

Arbor Vitae, or Tree of life. *Angl.* Arbre de Vie.
Gall. Lebensbaum. *Germ.*

103. *Thuia occidentalis* strobilis laevibus; squamis obtusis. LINN. Syst. p. 861.

American Arbor Vitae. *Angl.* Arbre de Vie d'Amerique. *Gall.* Nordamerikanischer Lebensbaum. *Germ.*

Habitat in America septentrionali, e. g. in Canada, Virginia etc. porro in Europa v. c. Sibiria.

TILIA L. G. 717. Cl. XIII. Ord. I.

Lime-Tree. *Angl.* Tilleul. *Gall.* Lindenbaum.
Germ.

104. *Tilia vulgaris* acuminatis serratis, subhirsutis, fructibus quadrangularibus, subpilosus. MILL. Dict. n. 2. *Tilia europaea* floribus nectario destitutis. LINN. Syst. p. 493.

Large-leaved Lime-tree. *Angl.* Tilleul à feuilles larges. *Gall.* Gemeine grossblätterige Linde; Sommer s. Wasserlinde. *Germ.*

Habitat in Europa.

Floret Iunio et Julio.

105. *Tilia cordata* foliis cordatis acuminatis inaequilater serratis, fructibus quinquelocularibus, tomentosis. MILL. Diet. I.

Female Lime-Tree. Angl. *Tillau.* Gall. *Kleinblätterige Linde;* *Winter - Stein - Waldlinde.* Germ.

Habitat in Europae sylvis.

Floret Julio et Augusto.

Difserit a priori floribus minoribus, magis pallidis, foliis minoribus, cordato-acuminatis, inaequilater dentatis, obscure viridioribus, minus glabris, subtus glauco-viridibus atque capsulis 5 - locularibus.

VIBVRNVM L. G. 400. Cl. V. Ord. III.

Piant Meally, or Way-Faring-Tree. Angl. *Viorne.* Gall. *Wasserholder.* Germ.

106. *Viburnum Lantana* foliis cordatis serratis, venosis, subtus tomentosis. LINN. Syst. p. 294.

Piant Meally-Tree. Angl. *Coudre moins fine,* ou *Viorne à manchettes.* Gall. *Schlingenbaum;* *Schwindelbeerbaum.* Germ.

Habitat in Europa calidiori e. g. in Italia, Gallia, Helvetia.

Floret versus Autumnum.

107. *Viburnum Opulus* foliis lobatis petiolis glandulosis. LINN. Syst. p. 294. et var. β . flore globoso, pleno, albo.

Marsb

Marsh Elder var. β . *Gelder Rose*. Engl. Obier sterile, (β) *Caillebotte*; *Pelote de Neige*. Gall. *Wasserholder*; *Bach-Hirschholder*. *Schneeballenstrauch*; *Ballrosen*. Germ.

Habitat in Europae pratis, sepibus, nemoribusque.

Floret Iunio et Julio.

Tantum.

Bot
gard
43
B 325

germany



