

醫方類聚卷之二百四十五

小兒門七

霍亂二

醫林方

香雲散治小兒吐瀉不止

硫黃

二錢 滑石 肆錢 簡方 等分

右為細末每服一二錢米飲湯調下

大効聖餅子治吐瀉慢驚風

天南星

半兩

半夏

青滑石 兩

硫黃

兩



右爲細末生薑自然汁和勻丸如桐子大
捏作餅子每服一餅子生薑自然汁化下

烟霞聖効方

止吐瀉右以梨葉煮汁服之

施圓端効方

玉柱杖丸治小兒吐瀉胃虛腹脹脚昏睡

不食葛雅川方

茯苓 阿子去核 藿香 丁香各壹錢半 人參

木香 甘草炒各厚朴薑製兩

右爲細末鍊蜜爲丸如櫻桃大每服一丸
白湯化下食前

麝香調中丸治小兒吐瀉諸證脾胃虛損老
人虛乏正氣不復飲食不下危困瘦弱程參政方

麝香言 當歸焙 白朮 人參 南木香

甘草炒 青皮去白 陳皮去白 茯苓各壹分

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大每服一丸
白湯化下食前

丁香溫中丸治小兒嘔吐瀉痢腹痛減食四

肢冷大名蔣安撫十一郎方

人參 白朮 甘草 乾薑炮子熟附子半兩 丁香各一分

右為細末水糊為丸如黍米大每服三十丸米飲下乳前日進二服

軟紅丸治大人小兒冷熱不和吐逆不定霍亂煩燥吐瀉不止其効如神李道淨方

明信礞 朱砂各一錢 乾烟脂二錢 巴豆七個去油 右研勻鎔蠟二錢入油七點旋丸大人菜

豆大小兒麻子大每服三四丸槐花甘草湯冷下食前一服定

乳香丸治小兒吐瀉不定或為慢驚

椽斗一對內黃丹滿燒存性 肉豆蔻 丁香 乳香各半 定粉二錢 巴豆霜一錢

右為細末鎔蠟三錢入油六點和成旋丸如黍米大每服五七丸冷水送下

豆蔻丸治小兒吐瀉不止 肉豆蔻 丁香 木香 胡粉各一錢 川烏

炮去皮各
二錢半

右為細末水糊為丸如黍米大每服二三
十九丸木瓜湯下食前日進二服渴即冷下

益黃散補脾胃進飲食腹脹吐瀉錢仲陽方

橘皮去白壹兩青皮去白訶子皮 甘草炒各半兩丁香

香二錢

右為細末每服二錢水壹小盞煎至十分
去滓食前溫服

七淘散治吐瀉不止南昌郭公度方

舶上硫黃壹兩五靈脂二兩滑石三兩

右為細末每服半錢漿水浮油月抄藥在
油月上沉下淘七次去浮油冷服

珍珠散治小兒泄瀉吐逆霍亂小便少困危

煩渴大原王氏方

石亭脂石黃一錢桂府滑石三錢

右研為細末每服半錢生薑糯米湯調下

乳前

吳氏集驗方

二黃散治小兒未周歲吐瀉下血此因乳母
氣血勞動或熱乳傷胃致有此疾

雄黃 大黃 五靈脂

右等分爲末每服壹字以磨刀水下

衛生易簡方

吐瀉

治小兒霍亂吐痢用芹葉細切煮熟汁飲任
性多少得止爲度

治小兒瀉後脾虛吐食不止用枯白礬寒水

右炮等分爲末水糊丸如黍米大每服五
七丸煎茅香湯送下

金匱釣玄

吐瀉黃疸

三稜 莪朮 陳皮 青皮 神曲 麥

芽 黃連 甘草 白朮 茯苓

右爲末米飲新効方調服 傷乳吐瀉加

山查 時氣吐瀉加滑石 發熱吐瀉加

薄荷

吐瀉有熱益原散亦可服錢氏五補五瀉之藥擇而用之

吐瀉後調脾胃平胃散入熟蜜再加蘇合香丸名萬安膏每服用米飲湯化下

霍亂食治

壽親養老書

扁豆粥治小兒霍亂

扁豆莖切焙人參二兩

右以水三升先煮扁豆莖令熟下人參煎

至二升去滓取汁煮粟米三合爲粥與乳母食臨乳兒時先將去少許冷乳汁然後乳母常食此粥佳

類聚
卷之三

五

吐衄
千金方
聖惠方
治小兒吐衄諸方
犀角散
蒲黃散
茜根散
治小兒鼻衄諸方
升麻散
生地黃煎
桂心散
桐子人散
直指小兒方
吐衄證治

吐衄

千金方

聖惠方

治小兒吐衄諸方

犀角散
蒲黃散
茜根散

治小兒鼻衄諸方

升麻散
生地黃煎
桂心散
桐子人散

直指小兒方

吐衄證治

目錄

蒲黃散 地黃汁

保童秘要

肘後方

省翁活幼口議

永類鈴方

鼻衄證治

地黃湯

新效方

餘藥無名者散見本方

吐衄

千金方

治小兒吐血方燒蛇蛻皮末以乳服之

肘後方同

并治重舌

又方取油三分酒壹分和之分再服

聖惠方

治小兒吐血諸方

夫小兒吐血者是熱氣盛而虛熱乘於血血性得熱則流散妄行若氣逆卽隨氣上故令

吐血也

治小兒四五歲已上非時吐血犀角散方

犀角屑 梔子人 生乾地黄 子芩

紫參 刺薊各壹分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減服之

治小兒吐血不止蒲黃散方

蒲黃一分 伏龍肝兩半 亂髮灰一分

右件藥同研令勻細不計時候煖生地黄汁調下半錢量兒大小加減服之

治小兒吐血心躁煩悶茜根散方

茜根兩半 犀角屑 川升麻 川大黃剉微炒

黃芩 甘草炙微赤剉已上各壹分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小盞入黑豆三十粒淡煎茹半份煎至六分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服又方刺薊自然汁不限多少

右件藥取汁膏合煖令溫不計時候調下
玄明粉半錢量兒大小以意加減

又方黃連青分去鬚

右件藥擣爺羅爲散每服一錢以水一小
盞入豉二十粒煎取五分去滓不計時候
量兒大小以意加減溫服○衛生易簡方
治小兒吐血不止用黃連末一錢豆豉三
十粒水一盞煎六分去滓溫服量大小加
減

又方右取蛇蛻皮燒灰細研不計時候以乳
汁調下一字隨兒大小加減服之

又方右取生地黃汁壹合煖令溫調下
錢不計時候量兒大小以意加減服之

又方右以亂髮燒灰細研每服以溫水調下
一字

治小兒鼻衄諸方

夫小兒經脈血氣有熱喜令鼻衄夫血隨氣
循行經脈遊腑藏若冷熱調和行依其常

度無有壅滯亦不流溢也血性得寒則凝澀
結聚得熱則散流妄行小兒熱氣盛者熱乘
於血血隨氣發溢於鼻者謂之鼻衄凡人血
虛受熱則血失其常發溢漫行乃至發於七
竅謂之大衄也

治小兒鼻衄或唾血升麻散方

川升麻

兩半

羚羊角屑

甘草

炙散赤剉

黃芩

赤芍藥

已上各一分

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小

盞入淡竹葉七片煎至五分去滓入地黃
汁半合更煎一兩沸不計時候量兒大小
分減溫服

治小兒鼻衄不止生地黄煎方

生地黄

半斤取汁

刺薊

半斤取汁

杏仁

一兩湯浸去

皮尖雙人麩

炒黃阿膠

半兩搗碎炒

別研蜜

令黃燥為末

合

右件藥都入銀鍋中以慢火熬為膏不計
時候用新汲水調下一錢量兒大小加減
服之

又方刺薊半兩亂髮灰壹分蒲黃半兩

右件藥搗細羅爲散每服以冷水調下半錢不計時候量兒大小加減服之

治小兒鼻衄心悶桂心散方

桂心壹分亂髮灰壹分乾薑半分炮

右件藥搗羅爲散不計時候以冷水調下半錢更隨兒大小以意加減

治小兒率熱毒氣攻腦鼻衄梔子人散方

梔子人壹兩槐花半兩

右件藥搗細羅爲散不計時候用溫水調下半錢量兒大小以意加減

小兒鼻衄不止方

亂髮灰半兩伏龍肝一兩

右件藥都研令勻不計時候以新汲水調下半錢量兒大小以意加減

又方刺薊汁二合地黃汁壹合生薑汁少

右調和令勻徐徐服半合仍將滓塞鼻中即差

又方右炒桑身令焦熟擣細羅爲散不計時
候以冷水調下半錢亦吹少許於鼻中量
兒大小以意加減

又方右以亂髮燒爲灰細研以少許吹入鼻
中差

直指小兒方

吐衄證治

蒲黃散治小兒吐血咯血

生蒲黃 油髮灰等分

右研細每一錢煖生地黄汁調下或米飲

亦得得效方同

地黄汁方治小兒吐血衄血生地黄汁取壹

合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

得效方同

鼻衄方生蘿苣搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

得效方醫方集成
直止經驗方同

保童秘要

吐血諸方

生薑汁 地黃汁 各一合

右相和頓服

又方大黃 黃芩 各一分 黑豈 半合

右以水五大合先下大黃黃芩煎後下黑

豈更煎取二合服之

又方黃連 一分 豆豉 一分

右以水五大合煎取三合服之

鼻衄方

艾葉 半分 葱鬚 一分 洗去土 阿膠 半分 不淡豉 壹匙

右以清酒三大合水三合煎取二合去滓

壹歲兒一服壹合空腹服之

肘後方

簡要濟衆治小兒吐血不止蒲黃細研每服

半錢用生地黄汁調下量兒大小加減進

之

省翁活幼口議

治小兒心肺蘊熱及心血妄行鼻衄出血不

止其方右將故藤紙被壹片作撚子包麝

燒熏入鼻或吹入鼻中又令患人吸呷尤
佳故藤紙被至舊亦得或燒內小瓶中留
性每服二錢入麝酒調服極妙

永類鈴方

鼻衄證治

血熱不循經壅從鼻出血隨其氣肺主氣外
屬鼻故衄也

春冬月以生地黄研取汁入生蒲黃少許
沙糖井水浸服

秋夏月用車前草洗研取汁更取姜汁同
多入蜜乙匙打和先以滓塞鼻次以井水
澆汁飲之仍服地黃湯若傷寒証小柴胡
湯煎入生地黄汁服最妙

地黃湯

川芎 生地黃 赤芍藥 當歸

右咬咀水煎入蒲黃少許微煎溫服

新效方

治咯血

咳嗽

黑豆 甘草 陳皮

右三味等分 以水煎服 余賈鈞 玄同

此方治咳嗽氣喘 痰多 胸膈不舒 宜用之

附錄

此方治咳嗽氣喘 痰多 胸膈不舒 宜用之

論

咳嗽 附痰飲 喘急 滯膈 目錄

千金方

咳嗽

竹瀝湯 紫菀湯 五味子湯 射干湯

杏人圓 八味生薑煎 四物款冬圓

苜蒲圓 桂枝湯 麻黃湯

海上仙方

小兒藥證

不食乳咳嗽

不食乳咳嗽吟

聖惠方

治小兒咳嗽諸方

貝母散 蟬殼散 人參散 天門冬散

貝母散 桔梗散 百部散 杏仁煎

麥門冬煎 杏仁煎 甜葶藶散 紫苑

散 陳橘皮散 葶藶散 菰蘆煎 甘

草丸 欬冬花丸 不灰木散

治小兒咳逆上氣諸方

紫蘇子散 五味子散 蘿蔔子散 麻

黃散 紫苑散 射干散 細辛散 牛

夏散 生乾地黄散 一字散 疑冬花

丸

治小兒咳嗽咽喉作呀呷聲諸方

射干散 陳橘皮散 蘿蔔子散 牛黃

散 蟬殼散 郁李人丸 桃人丸

治小兒痰實諸方

前胡散 半夏散 陳橋皮散 赤茯苓散 前胡散 芒消丸

治小兒多涎諸方

鈎霜散 防風散 牛蒡子散 半夏丸 和劑局方

鶴頂丹 潤肺散 人參半夏元 辰砂 半夏元 半夏散

小兒藥證直訣

瀉白散 阿膠散 百祥丸 牛李膏

鐵粉丸 漏銀丸 百部丸 葶藶元

大全本草

是齋醫方

溫胃散 金朱丹

直指小兒方

痰涎證治

風痰證治

朱砂圓 奪命散 白圓子

咳嗽喘證治

杏人膏 紫苑湯 人參枳實湯

保童秘要

宣明論

金肺散

御藥院方

利膈丸 金珠化痰丸 抱龍丸 苜浦

煎方 均氣散

得效方

痰嗽

半夏圓 蕩皮圓 人參清肺湯 澄清
飲 靈白元

滯願

溫脾圓 通心飲

肘後方

勝金方 杏人湯

衛生寶鑑

喘促胃痺

奪命散 無價散

咳嗽

塗唇膏

拔粹方

黃耆湯 人參荆芥散 瀉白散 阿膠

散

醫方大成

金沸草散 華蓋散 百部圓 人參散

三拗湯 瀉肺散 補肺散 閏肺散

省翁活幼口議

半丁圓 桃紅圓 犀角地黄膏 天南星圓

永類鈴方

冷熱咳嗽證治

麻黃湯 肉湯元 鷄清膏 雄朱化痰

定喘元 雄黃丹

滯願證治

溫脾散

經驗良方

小兒感冒咳嗽

前胡枳殼湯 桔梗防風湯 升麻葛根湯 參砂膏 防風溫膽湯 獨勝散 紫蘇飲子散 異攻散

醫林方

桔梗湯 葶藶丸 玉柱散 半夏散

玉機微義

治痰涎

青州白丸子 抱龍丸 宣風散 漏銀

丸 麻黃湯 敗毒散 紫苑散 百部

飲 紫蘇子散 葶藶丸 雄朱丸 潤

肺散 人參丸 參杏膏 補肺散 瀉

肺散

衛生易簡方

感冒嗽喘

金匱鉤玄

餘藥無名者散見本方

食治

鍼灸

咳嗽

附痰飲

喘急

滯頤

巢氏病源

病氣候

肺主氣肺氣有餘卽喘欬上氣若又爲風冷所加卽氣聚於肺令肺脹卽胃滿氣急也

滯頤候

滯頤之病是小兒多涎唾流出漬於頤下此由脾冷液多故也脾之液爲涎脾氣冷不能收制其津液故令涎流出滯漬於頤也

和劑指南

論小兒咳嗽證

痰涎壅塞咳嗽者可與人參半夏圓潤肺圓
辰砂化痰圓天麻防風圓

喘急喉中作水雞聲者可與人參定肺湯辰

砂半夏圓

管見大全良方可與人參定喘傷
湯潤肺散華蓋散辰砂半夏圓

風咳嗽可與惺惺散發散風痰次服潤肺散

細辛五味子湯人參補肺湯之類主之

小兒藥證直訣

咳嗽

夫嗽者市感微寒八九月間肺氣大旺病嗽

者其病必實非久病也其證面赤痰盛身熱

法當以葶藶丸下之若久者不可下也十一

月十二月嗽者乃傷風咳也風從背脊第三

推肺俞穴入也當以麻黃湯汗之有熱證而

赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之

若五七日間其證身熱痰盛唾粘者以漏銀

丸下之有肺盛者咳而後喘而腫欲飲水行

不飲水者其身卽熱以瀉白散瀉之若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦寧瀉丸主之後用化痰藥有肺虛者咳而哽氣時時出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先實脾後以補銀丸微下之涎涎卽補肺補肺如上法有嗽而吐水或青涎水者以百祥丸下之有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服廿桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之咳而痰

實不甚喘而而赤時飲水者可補銀丸下之治嗽大法盛卽下之久卽補之更量虛實以意增損

嗽痛訣死

東都藥鋪杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃散發散後用涼藥壓之卽愈時鑿與鐵粉丸半夏左補銀丸諸法下之其肺卽虛而嗽

甚至春三月間尚未愈召錢氏視之其候而青而光嗽而喘促噎氣又時長出氣錢曰病困十已八九所以然者面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位也肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月久即虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促噎氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛

唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛此不久生故言死也死證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

補下不同

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯及防已丸治之不愈其涎止攻吐喘不止請錢氏下瀰銀丸壹大服復以補

肺散

又一本作補脾湯

補脾散治之今段氏咯血肺

虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久即虛

痿令涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎為

甚便也蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦

使發搐故依法只宜下痰後補脾肺必涎上

而吐愈若先補其肺為逆先下其痰為順先

下後補為良也

寒熱相反

京東轉運使李公孫八歲病嗽而胸滿短氣

醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服

治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復有寒

邪節候喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已

用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也鑿曰退熱退

涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不

除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作

肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃

膏治心藥也鑿有慙色錢治愈

拔粹方

類聚

卷

暴喘

俗傳爲馬脾風也大小便硬宜急下之用半黃散奪命散後用白虎湯平之

永類鈴方

冷熱咳嗽證治

小兒初生百日內咳嗽肺葉脆弱最爲難治平常冷熱熱邪入肺無能得出又不堪吐利必明病源消解風寒化痰順氣益肺生胃胃關悉壯嗽卽漸減不可強攻冷嗽則鼻流清

涕面白痰薄日輕夜重或微有邪熱熱嗽則面微紅鼻乾熱痰稠脉孩數有胃嗽不因風寒而得以兒啼便乳壅結心肺不散卽嗽而遲以珍珠元下之

治病百法

風熱涎嗽

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少少服之不過三五日愈
千金方

咳嗽

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小
瘡復發五月中忽小小咳嗽微溫治之因
變癩壹日二十過癩四肢縮動背舛眇眼反
須臾氣絕良久復蘇已與常治癩湯得快吐
下經日不問爾後單與竹瀝汁稍進壹日壹
夕中合進壹升許發時小踈明日與此竹瀝
湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁
竹瀝湯方

竹瀝五合 黃芩叁拾銖 木防已 羚羊角 白

朮各六銖壹 大黃貳兩 茵芋三銖 麻黃 白薇

桑寄生 葶藶 甘草各三兩

右十二味咬咀以水二升半煮取藥減半
內竹瀝煎取壹升分服二合相去一食久
進壹服一方無

紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽
喉鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫苑 杏仁 黃芩 當歸 甘草 橘

皮 青木香 麻黃 桂心 各六銖 大黃 青

右十味咬咀以水三升煮取九合去滓六

十日至百日兒壹服二合半一百日至二

百日兒青服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆而青喘迫咳嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子 當歸 各半兩 麻黃 乾薑 桂心

人參 紫苑 甘草 各陸兩 細辛 欬冬花

各二銖 大黃 一兩半 白朮

右十壹味咬咀以水二升半煮取九合去

滓兒六十日至百日壹服二合半壹百日

至二百日壹服三合其大黃別浸膏宿下

一方無欬冬花大黃有大棗參枚

治小兒大人欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾

嗽出鼻膿方燒淡竹瀝煮二十沸小兒一

服一合日五服大人壹升亦日五服不妨

食息乳哺 千金翼方同

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食

方

乾地黃肆兩 麥門冬千金翼方去心 五味子各半

升大黃 消石各一兩

右六味咬咀以水三升煮取壹升去滓內消石蜜煮令沸服二合日三胃中當有宿乳汁一升許出大者服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干 麻黃千金翼方去節已 紫蔻 甘草
草 生薑各一兩 半夏五枚 桂心五寸 大棗貳拾枚

翼方肆枚

右八味咬咀以水七升煮取一升五合去

滓內蜜五合煎一沸分溫服二合翼方日三

又方中夏四兩 紫苑 桂心 生薑 刺辛

阿膠 甘草各貳兩 欬冬花貳合 蜜壹合

右九味咬咀以水一斗煮半夏取六升去

滓內諸藥煮取二升五合千金翼方壹升五合 五歲

兒服一升二歲服六合量大小多少加減

之

杏人圓治大人小兒咳逆上氣方杏人三升

千金翼方去皮尖兩入熬令黃熟搗如膏蜜一升為三分

以一分內杏人搗令強更內一分搗之如

膏又內壹分搗熟止先食已含咽之多少

自在口三每服不得過半方寸匕則利

又方半夏

二斤去皮河水洗六七度完用

白礬壹斤丁香

甘草 葶豆蔻 川升麻 縮砂 各肆兩

右七味以好酒壹斗與半夏拌和勻同浸

春冬三七日夏秋七日密封口日足取出

用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破川薑

湯下或乾喫候六十日乾方得服 疑非孫思邈方

八味生薑煎治少小嗽方

生薑 七兩 乾薑 肆兩 桂心 貳兩 甘草 疑冬花

紫苑 各壹兩 杏人 蜜 各壹升

右合諸藥為末微火上煎取如飴餈量其

大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核

杵日四五服甚有驗

四物欵冬圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼方

欵冬花

紫苑

各壹兩半

桂心

半兩

伏龍肝

陸銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令

兒飲之日三傅之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆

鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂

芫

各六銖

欵冬花

乾薑

桂心

紫苑

各銖

八銖

蜀椒

五銖

吳茱萸

陸合

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服

五疋加至十九日三兒小以意減之兒大

以意加之暴嗽數服便瘥

桂枝湯治少小十日以上至五十日卒得聲

欵吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝

半兩

甘草

二兩

紫苑

拾八銖

麥門冬

壹兩拾八銖

右四味咬咀以水二升煮取半升以酥著

湯中捉蘇滴兒口中晝夜四五過與之節
乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風
入肺方

麻黃肆兩甘草一兩桂心五寸五味子半升半夏

生薑各二兩

右六味咬咀以水五升煮取二升百日兒
服壹合大小節度服之便愈

海上仙方

小兒多喘嗽石膏火內飛研來為細末蜜調
功最奇

小兒藥證

不食乳咳嗽

凡小兒三歲已下百日已前徒定精神須調
氣候立標五藏然舉四脏生令乳食之中寒
熱致乖癰鬲七聚衝其肺部貫及心經煩亂
燥尤果延上鬲使嗽來而喘急致食滯而難
通月去日來無門整理察其原本冷熱所集

復有斯疾須憑救治列於方佐合顯篇章

不食乳咳嗽冷

桔梗微微三兩錢厚朴須調氣胃間壹分

草要伊和藥使分半貝母尤加定本源青豆分

薤也憑安藏腑刺介肉者橘皮少少最堪怜仁

參比望調氣財分一乾薑相賴桂心前各青分

右件已上九味擣為散用黑錫丸凡如紅

豆大每服三九子夜復溫水化調如飲服

之

聖惠方

治小兒咳嗽諸方

夫小兒咳嗽者由風寒傷於肺也肺主氣候

之皮毛而俞在於背小兒解脫風寒傷於皮

毛隨氣入於肺肺感微寒則咳嗽也故小兒

恒須令背暖夏月亦須生單背襠若背冷得

嗽月內可治百日外嗽者十中□兩人差矣

治小兒咳嗽心胃痰壅咽喉不利少欲乳食

貝母散方

貝母煨微黃 桔梗去蘆頭 馬兜零 百合 欬

冬花 半夏湯洗七遍去滑 乾薑炮裂 漢防已 麻

黃去根節已 甘草中兩炙 杏仁半兩湯浸

人麩炒微黃 別研如膏

右件藥搗麩羅為散每服一錢以水一小

盞人生薑少許煎至五分去滓溫服日三

五服量兒大小以意加減

治小兒咳嗽痰壅不欲乳食蟬殼散方

蟬殼微炒 桔梗去蘆頭 陳橘皮湯浸去白 人參去

頭甘草炙微赤剉已 半夏半升湯洗

右件藥搗細羅為散每服用生薑粥飲調

下一字神方萬全 日三五服量兒大小以意

加減

治小兒咳嗽心胃壅悶喘急不欲乳食人參

散方

人參三分去蘆頭 桔梗去蘆頭 赤茯苓 麥門冬

法心 前胡去蘆頭 子芩 欬冬花 甘草炙

赤剉已

類聚書

三十四

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞入竹葉七片煎至五分去滓量兒大小以意加減溫服

治小兒心胃煩悶體熱咳嗽天門冬散方

天門冬去心焙桑根白皮剉赤茯苓剉柴胡

去百合洗去藍葉剉甘草炙微赤剉

各半

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小

以意分減溫服

治小兒咳嗽咽喉不利狀如呀者貝母散方

貝母壹分煨麥門冬半兩去甘草半兩炙

蘇黃壹分去紫苑壹分洗杏仁半兩湯浸

人麩炒微黃根節去杏人去皮尖雙

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小以意分減溫

服和巧萬
全方同

治小兒卒得咳嗽吐乳桔梗散方

桔梗壹分去蘆頭 紫苑半兩去苗土 麥門冬半兩去心

甘草半兩炙微赤剉 人參一分去蘆頭 陳橘皮壹分湯洗去白

焙

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小以意分減服之

治小兒咳嗽頭熱令乳母服百部散方

百部煨微黃 紫苑洗去苗土 葛根剉各壹兩 石

膏二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一小盞以竹葉煎七片煎至六分去滓每於食後溫服令兒飲乳其佳

治小兒核嗽心煩喘羅杏人煎方

杏仁湯浸去皮尖 寒食餠壹兩 蜜壹兩 酥

參生 地黃汁 薑大 枳殼 天門冬壹兩

右件藥并搗研杏仁如膏次用地黃汁煎

貝母及天門冬臣臣分便糊絞取肉入杏

入膏等同熬如稀飴每服用溫水調下半錢已來量兒大小以意加減

治小兒咳嗽壯熱胃膈壅滯麥門冬煎方

麥門冬去心杏仁去皮尖雙入生薑升兩

酥合蜜二

右件藥先以水一大盞煎麥門冬及杏仁

至四分入砂盆內研絞取汁却入銀器中

次內生薑汁等以慢火熬成膏收於瓷器

中每服以清粥飲調下半茶匙日三服夜

一服量兒大小以意加減

治小兒咳嗽聲不出杏仁煎方

杏仁二兩湯浸去皮尖入酥蜜二

右件藥先以杏仁汁於鍋中以重湯煮減

去半入酥蜜又重湯煮二十沸入貝母紫

苑末各壹分甘草末半分更煎攪如飴收

瓷器中每服以清粥飲調下半錢日三服

夜膏服嗽山為度量兒大小以意加減

又方貝母半兩焙牛黃壹錢甘草壹分炙

微黃

微赤

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半錢日三四服量兒大小加減服之

又方麥門冬去心焙杏仁湯浸去皮尖雙甘草

炙微貝母煨微欬冬花已上各紫苑牛兩

赤判貝母黃壹分洗去

右件藥搗細羅為散每服以乳汁調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

又方杏人一兩湯浸去皮尖雙人紫苑半兩

苗土為末以冰一中盞研絞取汁紫苑洗去

右以杏人汁并紫苑木入蜜壹合同煎如

膏每服以清粥飲調下半茶匙量兒大小

以意加減

治小兒咳嗽喘癰不得睡臥甜葶藶散方

甜葶藶壹分隔紙炒令紫色桂心半貝母一分煨

右件藥搗細羅為散每服以清粥飲調下

半錢量兒大小以意加減

又方杏人拾枚湯浸

右以童子小便浸一宿取出麩炒微黃入

煎水中小盞爛研去滓三二歲已下分爲
三服

治小兒咳嗽紫苑散方

紫苑半兩洗去苗土貝母半兩煨微黃欵冬一分

右件藥搗細羅爲散每服以清粥飲調下
一字日三四服量兒大小以意加減

治小兒咳嗽胃中滿悶不欲乳食陳橘皮散

方

陳橘皮一分湯浸去白穰焙桔梗一分去蘆頭貝母半兩煨微

黃雞蘇分杏人一分湯浸去皮人參一分
頭尖麩炒微黃去蘆

右件藥壽籠羅爲散每服壹錢以水一小
盞入燈心十莖煎至五分去滓溫服日三
四服量兒大小以意加減

治小兒咳嗽喘促胃背滿悶坐卧不安葶藶
散方○永類鈴方治咳嗽有痰氣急如駒駘

甜葶藶半兩隔紙炒令紫色麻黃一分去根節貝母一分煨微

黃甘草一分赤坐杏人一分湯浸去皮尖雙○鈴方

已上三味
各乙兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小
盞煎至五分去滓分溫日四五服量兒大
小以意加減○鈐方右為末三歲乙錢水
煎

治小兒咳嗽不止心神煩悶菰蘆煎方

菰蘆一顆熟者去人以童子小便壹兩甘草

壹分生蜜兩為末

右件藥以銀鍋子中慢火煎如稀飴每服

以清粥飲調下半錢日四五服量兒大小
以意加減

治小兒未滿百日咳嗽上氣甘草丸方

甘草半兩炙桂心壹分杏仁一分湯浸去皮
微赤剉黃研如膏尖雙人麩炒微

右件藥搗羅為散入杏仁研令勻鍊蜜和
丸如菉豆大每服以乳汁研化三凡服之
日三四服量兒大小以意加減

治小兒咳嗽不差喉鳴喘急欬冬花丸方

欵冬花

甘草

洗去紫苑

洗去各一小

青節

去根貝母

微麥門冬

焙赤茯苓

去心

焙

杏仁

湯浸去皮尖雙入麩炒

右件藥搗羅為末入杏仁研令勻鍊蜜和

九如菜豆大每服以清粥飲研化五九服

之量兒大小以意加減

治小兒咳嗽不止不灰木散方

不灰木

用牛糞火

貝母

煨令

甘草

炙微赤

各半

兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以新汲水

一小盞點生油壹兩滴打令散煎至五分

去滓分溫二服日四服量兒大小以意加

減

治小兒欵逆上氣諸方

夫小兒欵逆者由乳哺無度因挾風冷傷於

肺故也肺主於氣為五藏上蓋在於胃間小

兒啼氣未定因飲乳與氣相逆氣引乳射於

肺故咳而氣逆謂之咳逆凡令乳哺傷氣搏

於肺亦令咳逆也

治小兒咳逆上氣心胃壅悶不欲乳食紫蘇

子散方

紫蘇子微炒木香微訶梨勒皮 蘿蔔子微炒

杏人湯浸去皮尖雙人參去蘆頭已青橘

皮青分易浸甘草青分炙

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水一小

盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候

溫服量兒大小以意加減○小兒藥證直

訣治小兒咳逆上氣因乳哺無度內挾風

冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之

乳與氣相逆氣不得下紫蘇子訶子去核

蘿蔔子杏人去皮尖木香人參切去須青

橘皮甘草判炒各右為細末每服壹錢水

一盞入生姜三片澹寮方水半蒸入生煎

至五分去滓不計時候服量大小加減下

微義得效方真蘇子呵了去核○承類雜

同 荀子杏人去皮尖木香人參去蘆各壹兩

兩青皮甘草各七錢洗半重右判散每服

一錢水一盞姜二片煎量大小減益溫服

鈴方右為末三歲乙錢水半盞姜三片煎

治小兒咳逆上氣睡臥不安五味子散方

五味子半兩洗黃芩一分甘草三分

赤麻黃骨分去桂心一分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞入牛薑少許煎至五分去滓不計時候

溫服量兒大小以意加減

治小兒欬逆上氣喘促羅荀子散方

羅荀子壹分皂莢子拾枚煨麻黃壹分去

草壹分炙

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

盞入燈心二十莖煎至五分去滓不計時

候分為二服量兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣喘促不得安卧麻黃散方

麻黃半兩去甘草半兩炙桂心壹分五味子

半兩根節湯洗七遍去滑

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水壹小
盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候
分爲二服量兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣痰壅不欲乳食紫苑散方

紫苑半兩去 甘草三分炙 五味子 黃芩

麻黃去根 桂心 半夏湯洗七 枳殼麩炒

去麩已上 各一分

右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小
盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候

分爲二服量兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣大小便滯澀射干散方

射干一分 木通壹分 麻黃壹分去 桂心半分 川

大黃壹分判 微炒

右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓不計時候分爲二服量
兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣心胃壅悶細辛散方

細辛兩 枳殼兩 麩炒 甘草半兩炙 麻黃

三分去杏仁十一枚湯浸

右件藥搗龜羅為散每服壹錢以水壹小

盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候

溫服量兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣心胃痰壅不欲乳食半夏

散方

半夏壹分湯洗桂心壹分紫苑半兩洗細辛

壹分五味子兩半甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候

溫服量兒大小以意加減

治小兒寒熱咳逆上氣逆滿膈中有痰食乳

即叶生乾地黃散方

生乾地黃八錢杏仁湯浸去皮尖雙麥門冬

川大黃剉微炒已消石壹

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小

盞入蜜半匙頭煎至五分去滓不計時候

溫服量兒大小以意加減

治小兒咳逆上氣喘急定命一字散方

乾蝦蟆

壹枚炙令焦黃

葶藶子

湯紙炒令紫色

五靈脂

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥各別擣細羅為散各抄一錢調和

令勻每服以清粥飲調一字服之

治小兒咳逆上氣晝夜不得睡卧欬冬花丸

方

欬冬花

壹分洗去苗土

伏龍肝

壹分

桂心

半兩

麻黃

半兩去根節

紫蘇子

壹分

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不計時候以溫水化破三丸服之量兒大小

治意加減

治小兒咳嗽咽喉作呀呷聲諸方

夫小兒嗽而呀呷作聲者由胃膈痰多嗽動於痰上搏於咽喉之間痰與氣相擊隨嗽動息呀呷有聲其咳嗽大體雖同至於治療則加消痰破飲之藥以此為異爾
治小兒咳嗽心胃痰壅攻咽喉作呀呷聲射

干散方

射干

麻黃

去根節

紫苑

洗去苗土

桂心

已上各半兩

半夏

七分湯洗

甘草

壹分炙

微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞入生薑少許煎至五分去滓入蜜半茶

匙攪令勻不計時候量兒大小分減溫服

治小兒咳嗽咽中作呀呷聲陳橘皮散方

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

杏仁

湯浸去皮尖雙

人剉炒令黃

桑根

白皮

剉甜葶藶

隔紙炒令紫色

甘草

炙微赤剉已

上各壹分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小加減服之

治小兒咳嗽喘急作呀呷聲蘿蔔子散方

蘿蔔子

壹分微炒

皂莢子

十枚煨去皮

燈心

壹分

麻黃

壹分去根節

甘草

半分行炙

微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以

意分減溫服

保童秘要同

治小兒咳欬喘急煩熱喉中作呀呬聲牛黃散方

牛黃壹分細研 蟬殼半分 柴胡壹分 菰蘆子壹分

右件藥搗細羅為散每服以蜜水調下一

字日三服二歲已上加之半錢

治小兒心胃痰雍嗽咳咽喉不利常作呀呬

聲蟬殼散方

蟬殼壹分 桔梗半分 去陳橘皮半分 湯浸

半夏一分 湯洗 漢防已壹分 甘草壹分 炙

七遍去滑 微赤剉

右件藥搗細羅為散每服以生薑粥飲調

下壹字三歲已上加之半錢

又方半夏壹分 湯洗 朱砂半分 細研 甜葶藶

一分 隔紙 五靈脂半分 杏仁壹分 湯浸 去皮

黃 少令紫色 尖雙人麩炒

右件藥搗羅為末用生薑自然汁煮麵糊和丸如菉豆大每服煎麻黃湯下三九日三服量兒大小以意加減

又方甜葶藶壹分 隔紙 杏仁半分 湯浸 去皮 尖雙人麩炒

黃麻黃 半兩去根節

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減頻
服

治小兒肺藏熱多咳嗽喘急喉中作呀呷聲
宜服郁李人丸方

郁李人 二分湯浸去皮 杏仁 壹分湯浸去

微炒研如膏 炒微黃 川大黃 壹分剉

右以大黃壹味搗細羅為散同研令勻入

藥少許和丸如梧桐子大每服以粥飲研
破三丸服之日三服量兒大小以意加減

治小兒多咳嗽咽中作呀呷聲桃人丸方

桃人 肆寸九枚湯浸去皮 琥珀末 壹分 甜葶

大蘇 右件藥先搗葶桃人如泥次下琥珀末

更搗令勻丸如菜豆大每服煎桑根白皮
湯化破五丸服日三服三歲已上加丸數

小兒之

又方右用大菰藟壹枚白麵浚瓠作餅子燒
熟却杵為末每服以清粥飲調下半錢量
兒大小以意加減

治小兒痰實諸方

夫小兒痰實由水飲停積在胃膈間結聚為
痰也小兒飲乳因冷熱不調停積胃膈之間
亦結聚成痰痰多則令兒飲乳不下吐涎沫
巢氏病源而微壯熱也痰實壯熱不止者則
涎沫變結發驚痛也

治小兒痰實壯熱心胃壅悶不欲乳食前胡
散方

前胡半兩去枳殼一分麩炒赤茯苓一分川

大黃一分剉甘草一分炙

右件藥搗羅羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓溫服日三四服更量兒

大小加減服之

治小兒痰氣結實煩壅半夏散方

半夏壹分湯洗前胡半兩去川大黃壹分

微甘草一分炙 川朴消兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

盞入生薑少許煎至五分去滓溫溫日三

四服量大小以意加減

治小兒痰壅結實時欲嘔吐陳楠皮散方

陳楠水中兩湯浸川升麻一分桑根白皮兩半

麥門冬半兩去心焙前胡壹分去蘆頭川大黃壹分

剉碎 微炒

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候溫服更量兒

大小以意加減

治小兒五六歲痰實不散宜服此方

前胡壹分去蘆頭川大黃壹分剉碎微炒枳殼一分麩

去甘草壹分炙川朴消兩壹

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹中

盞入生薑蓮子大煎至六分去滓量兒大

小分減溫服

...

治小兒痰實壅悶時復嘔不欲乳食赤茯苓散片

赤茯苓半兩甘草壹分炙陳橘皮一分湯浸

川朴消兩半旋復花一分

右件藥搗麤羅為散每服二錢以水一小

盞入生薑如蓮子大煎至五分去滓量兒

大小分減溫服

治小兒痰實心胃不利多欲嘔吐前胡散方

前胡半兩去貝母壹分煨白朮一分桑根白

皮一分人參壹分去蘆頭去陳橘皮半分湯浸

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大

小加減服之

治小兒痰實往來寒熱不欲飲食肌體羸瘦

芒消丸方

川芒消兩半川大黃半兩到半夏一分湯洗

代赭兩半甘遂一分杏仁拾粒湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大空

心以溫水下兩丸量兒大小加減服之

治小兒多涎諸方

夫小兒多涎者是風熱壅結在於脾藏積聚成涎也若涎多即乳食不下涎沫結實而生壯熱也

治小兒脾風多涎心胃壅悶不下乳食昏昏

多睡鈇霜散方

鈇霜細研牛黃細研半夏湯浸七遍去滑龍腦細研已上各半白附子炮裂馬牙消 防風去蘆朱砂細研

天竹黃細研犀角屑 細辛 黃芩 甘草

炙微赤剉已上各一分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻不計時候用薑蜜溫水調下壹字更量兒大小以意加減

治小兒脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食防風散方

防風去蘆頭羚羊角屑 黃芩 人參去蘆頭

枳殼製炒微黃去瓢甘草炙微赤剉已上各一分半夏湯洗

七遍
去滑

右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒心脾大熱多涎牛蒡子散方

牛蒡子

梔子人

甘草

炙微赤剉

川消

蘄

金

已上各半兩

枳殼

壹分麩炒微黃去瓢

右件藥搗細羅爲散入龍腦半錢同研令勻不計時候用薄荷溫水調下半錢量兒

大小加減服之

治小兒脾熱乳食不下胃膈多涎半夏方

半夏

半生薑湯洗七遍去滑

皂莢子人

半兩

右件藥搗羅爲末用生薑汁和凡加麻子大不計時候以溫水下三九隨兒大小以意加減

又方右取未行牛口中沫塗於兒口內效

又方右以白羊糞少許入水研取汁塗兒口中效

又方右取桑根白汁塗於汁口內效

又方右取鹿角末炒令焦更研令細以清粥

飲調下一字

又方右取午噍草絞取汁少少與服之

和劑局方

鶴頂丹治大人小兒風癱痰實咽喉不利口

乾煩渴睡卧不安及中暑頭痛躁渴不解

麝香研貳兩半朱砂飛研壹百兩甘草剉炒為末牙

硝林過研壹百二拾五兩寒水石粉壹百壹拾兩

右合研勻煉蜜搜和每壹兩貳錢作拾圓

大人溫生薑水化下壹圓如中暑入生龍

腦少許同研新水化下小兒壹圓分四服

量大小加減治小兒腑臟積熱心神不寧

夜卧狂叫口舌生瘡薄荷自然汁化下並

食後服

潤肺散治小兒寒癩相交肺氣不利咳嗽喘

急語聲不出痰涎壅塞竹膈煩滿鼻塞涕

咽喉乾痛

麻黃去根 人參去蘆各 阿膠炒黃 桔梗各

兩甘草炙 陳皮去白 杏仁湯洗去尖

乾姓炒黃色 貝母去心 黃炒 衛生寶鑑二兩

右為龕末管見大至 每服一錢水捌分煎

六分去滓溫服食後

人參半圓治肺胃受冷咳嗽氣急胃膈痞

滿喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下

半夏湯洗七 厚朴去蘆皮 丁香各四 陳皮

去人參 苗細辛 去苗各 貳兩

右為細末用生薑汁打麵糊為圓如麻子
大三歲兒每服貳拾圓生薑湯下食後服
量兒大小加減衛生寶鑑同

辰砂半夏圓治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胃

膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

下靈脂微炒用酒 朱砂研飛各 半夏洗七

滑杏仁湯洗去皮尖及雙 葶藶水自洗

焙成膏 冬半兩

右為末入研藥勻以生薑汁煮麩糊和圓

如小麻子大每服五圓至七圓淡生薑湯

食後下商上寶

半夏散治小兒咳逆上氣心胃痰壅不欲乳

食

五味子淨紫苑去苗半夏湯洗七次甘草炙各五兩

肉桂去鹿細辛去苗各二兩半

右爲細末參歲兒每服壹錢水一盞八生

薑一片煎至五分去滓溫服不計時候量

兒大小加減服

小兒藥證直訣

瀉白散又名瀉肺散治咳嗽而後喘面腫身熱○

御藥院方治小兒肺氣壅實壯熱飲水喘悶

及胃滿短氣氣急喘嗽痰涎壅塞唇深紅色

者並宜服之經驗良方治肺受風熱能瀉肺

桑白皮細剉炒地骨皮洗去土甘草炒

右件爲末每服一二錢方二錢水一中盞

入粳米百粒同煎至六分院方食後溫服

阿膠散又名補肺散治嗽肺無津液○御藥院方

治小兒肺氣虛怯唇白色悶亂氣麓喘促硬
氣長出氣皆肺虛損故也宜補之

阿膠壹兩半黍粘子壹分馬兜苈半兩甘

草壹分杏仁七介去皮尖糯米壹兩○

右為末每服一二錢水一盞煎至六分院

去後方同温服○玉機微義治小兒

久患咳嗽氣急有痰阿膠糯米各壹兩馬兜

零甘草各半兩杏仁十枚大力子壹分右咬咀

三歲兒一錢水煎服

百祥丸壹名治嗽而吐水或青綠者紅牙

大戟不以多少陰乾漿水煮極軟去骨日

中暴乾復內元汁中煮汁尽焙乾為末水

丸如粟米大每服一二十九研赤脂麻湯

下吐利同無時

牛李膏膏名必勝膏牛李子一名鼠李子牛

牛李子不以多少取汁石器中熬成膏下

李子野牛道邊至秋結實黑丸成穗或無

出者市肆中買乾者為末水熬代用每服

皂子大煎杏膠湯化下

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀炒子朱砂一分鐵粉一分天南星一分去皮臍

取輕粉

右同研水銀星盡為度姜汁麵糊為丸粟

米大煎生薑湯下十九至十五凡二三

九無時○御藥院方墜風涎水銀鈿朱

沙子共朱砂錢鐵粉一字輕粉錢天南

星去臍為末右壹處研至水銀星盡為

度生姜汁麵糊和丸如粟米大每服十五

丸至二十生薑湯送下

漏銀丸治風涎隔實上熱及乳食不消腹脹

麤喘等

巴豆半兩去皮油好墨八錢火燒水銀半

黑鉛二錢半同水麝香半錢

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香

陳米粥和丸如菉豆大捻漏壹歲膏丹

同議二三歲二三丸五歲以上五六丸煎

薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實增減並食後服

百部丸治小兒肺寒壅嗽微喘

百部炒乾麻黃去節先作末各三分杏仁肆合介去皮尖微炒

煮三五沸研入

右和勻熟蜜丸皂子大溫水下二三丸無

時日三四此本方也仲陽加菘子仁五十

筒糖丸之含化大妙○永類鈴方治小兒

感寒咳嗽百部焙乾麻黃去節各壹分杏仁肆拾

皮尖微炒別研右為末蜜元芡實大熱水化下一方加松子肉五十粒同杏仁入砂糖元噲化妙

葶藶元治乳食衝脾玉機微傷風咳嗽面赤

痰盛身熱喘促

甜葶藶去土於銚中黑牽牛子畧炒漢防已

碎杏仁湯去皮尖及雙仁者控乾炒黃

右為末研入杏膏拌勻取蒸陳棗肉和再

搗為劑元如麻子大每服五元至七元淡

生薑湯下乳食後或臨夜服量大小加減
大全本草

孫真人治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴
是齋醫方

治小兒鼻塞錢文子說任和卿方甚妙

白殭蠶

半兩直者水洗
刷尽所焙乾

皂子角

不蛀者
五拾箇

右將水壹盃浸皂角子壹夜次日於砂銚
內慢火熬取濃汁半盞去皂角子以殭蠶
蘸炙汁盡為度碾為細末煉蜜調成膏候

小兒睡著以抹唇上自嚙下即効

治小兒咳嗽

貝母

揀甘草

生用

右等分為細末每服半錢米飲下牙兒以
壹字亂上飲澹寮方同吳氏外孫子服之立
効

治小兒涎多留在兩口角此由脾胃有冷流
出清於頤下乃名滯頤之疾溫脾丹方俗謂
之惶破涎瀉兒者葛丞相云此方甚奇張漢

三方

丁香壹兩木香兩半夏壹兩用生薑陸青皮

半兩白木兩乾薑半兩微炒

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十元

米飲下量大小加減服之經驗良方為朱

歲拾九量兒大小加減服姜湯或棗湯或清米飲下

又方溫胃散

丁香兩肉荳蔻兩半夏兩白煩水兩白木兩乾

薑兩甘草兩人參各半兩

右為細末每服壹錢水八分盞入生薑二

片煎至五分去滓空心溫服

又有涎多乳食不下涎流不出口者乃名脾

熱命朱丹方

金箔研朱砂研牛膽天南星各半兩

湯洗七次石膏各半兩白茯苓各半兩

右為細末拌勻用牛薑自然汁和元如黍

米大每服十元煎人參湯下乳後服

直指小兒方

痰涎瘧治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥白圓子方見大方科身體加朱砂同研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并天麻防風圓方見驚風加朱砂末薑汁泡湯調下餘方見直指方痰飲門擇焉

風痰諸治

朱砂圓鎮心壓驚驅風墜痰

朱砂研拾僵蠶焙天南星煎白附子濕
煨紙乾取全蝎貳錢一焙各半兩字

右末飛白麵糊圓麻子火每服五圓薄荷湯溫服

奪命散控下風痰全活危急

青礬石一兩燄消青兩和入銀膏內硬炭
冷如金色取出碾細

右末每服壹錢七急風薄荷汁入密調下涎藥自大便出狀如稠涕次服退熱截驚

等劑慢風木杏入少蜜煎湯調下涎即墜
入腹中次服花蛇川烏等劑
青州謝家白圓子

圓白大半夏湯真川烏略炮去白附子

洗略炮圓白天南星洗略天麻各半全蝎分

右細末生薑汁煮飛麩糊圓麻子大每拾

圓熟水下諸痛白圓子研入朱砂雄黃雌

黃小首薄荷湯入薑汁調下傷風咳嗽白

圓子末紫蘇烏梅煎湯入薑汁調下寒瘧

白圓子金液丹等分爲末米飲調下大抵
小兒諸病非熱則痰治痰惟半夏爲上上
藥

咳嗽喘嗽證治

杏仁膏治小兒久患咳嗽

杏仁壹兩半茯苓一兩紫苑茸菴皂厚去皮

蜜炙黃
各半兩

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

紫苑湯治小兒喘嗽

紫苑茸 貝母 真蘇子微炒杏仁水浸去皮焙黃

比梗 陳皮 麻黃去節半夏麩 赤茯苓

桑白皮炒甘草微炙等分

右剉細每服壹錢薑參片紫蘇參葉并嫩

梗准水煎服永類鈴方同

人參枳實湯治感冒咳喘胃滿痰滯

人參一分枳實製桑白皮炒半夏製赤茯苓

五味子淨北梗 麻黃去節阿膠炒

甘草炙各半兩

右剉散每一錢薑參片紫蘇參葉水煎服

凡治喘嗽不論肺實肺虛可汗可溫可下

藥中須用阿膠使得安肺潤肺其性和平

肺經要藥○永類鈴方演山大効人參枳

實湯治小兒傷寒後无不和喘急咳嗽胸

膈痞塞日夜煩悶神困不食仍治虛痰煩

滿頭目昏暈但是傷風感冷咳嗽通用不

問肺之虛實可汗可溫可下要藥也枳實

四升米泔浸桑白皮厚夏姜湯甘草炙赤

茯苓款花五味子阿膠蘇細辛淨各八錢

麻黃節苦梗兩右咬咀每三錢水

蒸姜三小片棗半個烏梅少許煎至半服

仍以蒸合藥氣徐吸服之

保童秘要

呀諸方

葶藶子一分杏仁去皮麻黃去節各一分

右切以水五大合煎取二合頓服之

又方桔梗甘草各一分湯水煎

右以水五大合煎取二合分作兩服

氣急諸方

麻黃去節大黃去夜干各一分通草二分桂心一分

右以水五大合煎取三合頓服之

又方秋菓子壹枚麻黃壹分甘草半分葶藶

子二百粒

右以水五大合煎取二合去滓分作兩服

又方燈心壹分橘皮半分

右切以泔漿水五大合煎取二合去滓頓服

之
又方童下小便二牙消二分

又方童下小便二牙消二分

右輕煖小便下牙消攪勻頓服之

咳嗽諸方

貝母各壹分紫菀各壹分生天門冬二分杏仁三枚麻

黃壹分甘草半

右切以水七合煎取三合去滓三歲已

下壹日服盡

又方熔心壹橘皮三片貝母二分鷄蘇 桔梗

又方各壹分人參三大黃壹右切以水六合煎取二合半去滓三歲

起下木田服盡凡壹大合去滓分兩日與

又方葶藶子三百粒麻黃壹甘草各半杏仁三

切貝母壹大黃壹甘草各半杏仁三

右切以水七合煎取三合分作兩服凡

嗽不問風之與熱悉宜服之與壹合

水氣加嗽方

桑根皮 貝母各一分升麻 桔梗各壹分杏

桑根皮 貝母各一分升麻 桔梗各壹分杏

仁七枚去皮尖

葶藶子一撮

生用

粗

計對各

杏

右切以水五大合煎取二合去滓二歲已

下一日與壹合服之夜臥亦與壹合

百日已來痰實諸方煎取三合去滓兩服

柴胡半當歸

大黃

各二銖

甘草

茯苓

各三銖

銖

右以水四合煎取壹大合去滓分兩日與

服之

又方生薑

人參

各三銖

芍藥

壹銖

右以水二大合煎取半合一日內與服之

又方黃連

人參

朴消

各三銖

右以水二大合煎取半合分三度服之

三歲痰實諸方

白檳榔

壹枚

青木香

半大

黃芩

壹分

茯苓

二分

右以水五大合煎取二合去滓分爲二服

又方黃連

黃芩

各壹分

生薑

二分

新下林

一

右以水五大合煎取三合去滓服盡

四五歲痰實方

大黃 人參 各壹分 厚朴 甘草 各半 朴消 二分 湯成下

右以水五大合煎取二合去滓下朴消一
日服之

五六歲痰實諸方

前胡 大黃 甘草 各壹分 半夏 二枚 洗 生

薑仁 二杏大 秋菓子 二枚 朴消 四分 三黃連之

右切以水六大合煎取三合去滓下朴消
空腹日再服之

又方生薑 壹分 朴消 湯成下 茯苓 各三分

右切以水五大合煎取二合分作兩服第

全二服下消

又方生薑汁 二合 黃連粉 半合

右二米相溲作丸如梧子大每日三度温

甘酢化切丸至七丸服之

未入歲感實熱諸方

茯苓 人參 大黃 茶 大黃 各半

右切以水七合煎取三合

又方黃芩小前胡各壹分梔子七枚黃蓮叁分

右切以水九大合煎取四大合去滓服之

又方菴色龜骨六分茯苓生薑各四分黃蓮三分

朴消二分微熬

右以水九合煎取五合分為三服

宣明論

金肺散治小兒諸般喘嗽急驚厥神效

錫灰壹錢漢防已貳錢鬱金壹錢砒黃貳錢半夏

壹錢半湯洗七遍

右為細末每服半錢加壹錢小兒加減煎

猪肉湯下日進貳服食後

御藥院方

利膈力治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛肆兩半皂角不蚰肥者去皮子槐

角子兩半青皮半兩半夏湯洗七次

右為姜湯下姜汁麩糊和丸如黍米大每

服十五丸至二十九丸溫生

金珠化痰丸治痰熱安神志除頭痛眩運心

松恍惚胃膈煩悶涕唾稠粘痰實咳喘咽隘不利

金鉞為衣二拾片辰砂飛研二兩皂角子仁炒散

白礬光明者於鐵器內熬令汁尽放冷研盡兩鉛白霜細研天

竺黃研一兩牛白龍腦細研半兩姜製半夏肆兩

右為細末入研藥勻生姜汁麵糊和丸如

梧桐子大小兒如黍米大每服十九至十

五并食後臨卧生姜湯下

抱龍丸治壅嗽痰實欲生驚風時作潮熱宜

服

天南星牛膽製二兩天竺黃半兩雄黃另研二錢半辰

砂另研二錢半麝香另研壹錢半

口為末將研藥壹處拌和勻煉蜜和丸如

芡實大每兩作五十九煎薄荷甘草湯化

下一丸食後○玉機微義治風痰壅盛驚

搐昏睡雄黃辰砂天竺黃各四錢麝香一牛

膽南星八錢入臘月牛膽中陰乾百日用內用如無生者水浸二日焙用右

為末煮甘草糊丸如皂子大三歲一丸量

兒大小與服薄荷湯下七八三錢一匙

菖蒲煎丸治小兒肺氣壅實咳嗽痰涎喘鳴肩息

人參 石苒蒲 欵冬花 桂心 紫苑

葶已上各壹錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十丸每服

壹丸煎糯米湯化下食後服

均氣散治脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶小便不和

桑白皮二兩 陳皮去白一兩 桔梗 甘草炙赤

茯苓各壹兩 藿香葉半兩 木通肆兩

右爲麤末每服壹錢水壹小盞入生姜壹二片煎至五分去滓溫服食前

得効方

痰嗽

半夏圓治風壅痰盛咽膈不利

半夏五兩 白礬林過壹兩 人參一兩

右爲末生薑自然汁糊爲圓粟米大每服

二十元食後臨卧生薑湯下

蕩皮圓治肺壅咳嗽痰多方久嗽不宜卒

止先須調氣用參蘇飲方見大方秘傳降

氣湯蘇子降氣湯方並見大方科諸氣門並加人參

五味子烏梅桑白皮紅棗斟酌用金沸草

散治熱嗽華蓋散治肺感寒邪咳嗽聲重

人參清肺湯治肺胃俱寒咳嗽喘息方見大方科咳

嗽門

澄清飲治痰壅咳嗽不止

白礬二錢半 南星 半夏 蚌粉 知母

貝母 甘草各五錢 人參三錢

右剉散每服二錢生姜二片烏梅半箇煎

澄清徐徐吸服效亦治因飲乳逆氣觸於

肺經作嗽久不止壽星圓兼服方見諸風

靈白圓治風痰土壅右以靈砂青州白圓子

各一十粒姜蘇湯化開服效

滯頤

冷證溫脾元治滯頤涎流出而漬於頤間也

涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收
約法當溫脾

半夏 木香 丁香 各半兩 川白薑 生 白朮

青皮 陳皮 各三錢半

右爲末糕糊圓麻子大一歲十圓二歲二

十圓米湯灌下 直指小兒方同

熱證通心飲 方見泄瀉

口角瘡爛方髮灰爲細末猪脂和傅燕窠泥
亦好

肘後方

勝金方治小兒咳嗽露蜂房二兩淨洗去蜂
糞及泥土以快火燒爲灰每服一字飯飲
下

小兒咳嗽上氣杏仁湯杏仁四十枚去皮麻
黃八分切以水二升煮取膏升分溫服五
合增減以意度之大良

療小兒咳嗽方紫苑六分貝母二分款冬花
壹分搗爲散每服取如豆大著乳頭令兒

和乳咽之日三四乳母勿食大鹹醋物

又方劇者與茅藤飲子人小火黃令微下佳

小兒諸病與成人同者並宜准狀檢條

衛生寶鑑

喘促昏痺

奪命散

拔粹方名牛黃奪命散

治肺脹喘汗滿高氣急

兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲

嘎不鳴痰涎潮寒

拔粹方此下云俗云馬脾風

若不急治

死在旦夕

川大黃

白牽牛

黑牽牛

皆兩各半

大

檳榔

一箇○拔粹方一兩醫林方神効名方兼分

右為末三歲兒服貳錢冷漿水調下

神効名方

蜜水調服

涎多加膩粉少許

拔粹方無時加蜜少許

利下

涎為也

施圓端效方同

出楊氏極濟方○醫林方

右有痰涎者加輕粉壹字四味為細末

歲壹錢半漿水蜜少許同調服之有痰涎

其藥不下者玉柱散吐之立效

無價散治風熱喘促悶亂不安

拔粹方此下云俗謂之馬

脾風者

辰砂

貳錢半

輕粉

半錢

甘遂

壹錢半

長微焦焙

右為末每服壹字溫水少許滴下小油壹

點抄藥在上沉下去脚以漿水灌之立效

如神

咳嗽

塗唇膏治襁褓小兒咳嗽吐乳久不愈石燕

子唐味為末每用一捻蜜少許調塗兒唇

上日叁五次不拘妳食前後

拔粹方

黃耆湯治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是

熱入肺經為客熱

醫林方此下云可黃耆為主治人叁為補呷呀有聲

者是其證也

黃耆

兩

人參

二錢半

地骨皮

五錢

○醫

桑白

皮

二錢

○醫

甘草

二錢半

○醫

右咬咀水煎放溫時時溫清○醫林方右

為末水豈盞同煎去滓溫服食後

人參荆芥散治身熱痰嗽胃膈不利宜下膈

去熱

人參兩半 荆芥穗兩壹 大黃貳

右為細末水煎調檳榔木香細末半錢輕

粉壹字乳後服 如身熱潮熱宜服清涼

飲子去大黃三服之後壹兩日却入大黃

服之令踈利則愈不可便先動藏府

瀉白散瀉肺脾熱目黃口不吮乳喘嗽

桑白皮壹兩到 地骨皮壹兩 甘草半兩

右為細末每服壹二錢水壹盞入粳米百

粒同煎食後服易老加黃連

海藏云治肺熱傳骨蒸自汗用此以直瀉

之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

阿膠散補肺

阿膠壹兩半 馬兜苓半兩 甘草二錢 黍粘子

炒香杏仁皮尖 糯米

右為末每服一二錢水壹盞食後

海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥

門冬之補也當以意消息

醫方大成

和劑方金沸草散治肺感風寒咳嗽聲重方見

大方科傷寒門醫方集成此經驗方袖珍方同

和劑方華蓋散治肺感寒邪咳嗽聲重方見

科咳嗽門醫方集成南比經驗方袖珍方同

湯氏方百部圓治小兒感寒咳嗽

百部焙于麻黃去節各杏仁四十介去皮

研右為末煉蜜圓如芡實大熟水化下一方

加松子肉五十粒同杵入沙糖為圓含

化尤妙醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易能方同

經濟方人參散治咳嗽發熱氣喘面紅

人參 天花粉各等分

白為末每服半錢蜜水調下醫方集成南

北經驗方

和劑方三拗湯治感寒咳嗽方見大方科咳嗽門醫方集成

南北經驗方袖珍方同

錢氏方瀉肺散治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮炒地骨皮各壹兩甘草炒五錢

右為末每服二錢水壹盞杭米同煎食後

服醫方集成南北經
驗方袖珍方同

錢氏方補肺散治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒兩牛蒡子各二錢半甘草錢半馬兜鈴瓦

杏仁七分去皮尖糯米壹兩

右為末每服二錢水壹盞煎至六分食後

服醫方集成南北經
驗方袖珍方同

和濟方潤肺散治肺感風寒咳嗽喘急鼻流

清涕

貝母麩炒杏仁去皮麩炒麻黃去根人參

各二兩各二兩半阿膠炒半陳皮二錢甘草兩桔梗兩

右咬咀每服一錢水壹盞食後煎服醫方集成

南北經驗方
袖珍方同

省翁活幼口議

半丁圓治嬰孩小兒痰吐風壅所致或因感

風痰盛咳嗽作熱煩悶神不安穩睡眠不寧

可進飲食或欲飲食食之即嘔蓋由風痰在

膈飲食不下先服半丁圓次用正胃散及正

氣溫中散半丁圓良方

半夏

羊眼者半兩湯洗七次為末

丁香

一錢重碾碎

右將半夏末水搜作劑包丁香再以麩劑裏煨令熟夫麩為末生薑自然汁圓麻子大每服三二十圓淡生薑湯下

治小兒齟齬欬痰涎壅盛或作喘急桃紅

圓良方

天南星

乙分炮

白附子

炮

川烏

乙分炮

石膏

貳錢

煨

地龍

乙錢

白礬

枯乙錢

右為末自然薑汁搜圓麻子大朱砂為衣令半紅半白每服三五十圓淡生薑湯下犀角地黃膏

天門冬

麥門冬

各去心

白茯苓

茯神

生地黃

各洗

前胡

柴胡

人參

玄參

甘草

川芎

天麻

防風

羌活

右等分為末煨金墨一挺留性煉蜜圓口大金箔為衣每服一粒薄荷湯化服治小兒痰多哮喘喘急咳嗽天南星圓方

天南星 始 半夏 湯洗七次 白礬 枯各乙分 雄黃 乙錢

右為末煎熬皂角膏為圓入少許麩作糊
圓如麻子大每服二三十圓淡生薑湯送

下

永類鈴方

冷熱咳嗽證治

錢氏麻黃湯治傷風發熱咳嗽喘急

麻黃 去節寸剉 肉桂 去皮二錢 甘草 一錢 杏仁 去皮

尖炒黃

右咬咀每三錢水壹盞煎服有汗不可服

和劑金沸草散治初湯肺蓋散潤肺散治肺

感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

肉湯元治小兒咳嗽痰涎不通氣急或痰壅

成塊宜引實小兒熱嗽其之吐涎久嗽眉冷

勿劑亦不可不

射青末 錢 龍脷末 錢 欖核 錢 煎藥

右為末糊充亦恆飲三歲壯元肥猪湯下

演山和議時氣咳嗽者天時冷熱不調兒虛

得之甘夜承吐或喘痰熱盛重
者利之用大荷朴消積蕪陳及人參
柴胡等以有胸膈煩悶未快宜服無熱與
痰亦不可下

鷄清膏治小兒涎鳴喘急服藥不退者氣
兒可用川無名雞屎一個取清入輕粉抄
拾錢拌和銀器盛湯煎過頃熟三歲食
帶吐痰或瀉即差七喘或痰喘有痰可宜
嘔多則可下之用珠珍元等

演山大效雄朱化痰定喘元治因驚發喘逆
觸心肺暴急張口虛煩神困

雄黃 朱砂各青錢研 蟬退 全蝎炒 地竜淨洗

姜蠶 南星 白附地各膏分 輕粉半錢重

不為末糊元麻子大每三十元薄荷茶清
食後下

雄黃丹治齟齬喘滿咳嗽心胸煩悶傷熱觸

毒壹歲兒五元壯者七元二歲十元

雄黃 朱砂各乙錢別研 杏人十四粒炒 巴豆七粒

淡者二
十乙粒

右五味用米醋半盞乾姜乙片指大煮令
乾研成膏皂角壹寸蜜炙焦先去子及皮
弦法製牛膽南星乙分同雄朱杏膏研細
加少糊元麻子大淡薑湯送下

滯頤證治

涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收
約而清於頤間也法當溫脾

溫脾散

半夏麴

丁香

木香

各半

乾姜

炮二錢半

白

木

炮白茯苓

人參

粉草

各半兩

右為末米飲調局方理中元亦妙一方用

東行牛尾拭其口角張澳方名溫脾丹與

上散同去人參茯苓甘帶加青皮或陳皮

二錢

經驗良方

小兒感冒咳嗽

前胡枳殼湯治痰實壯熱胃中壅悶大便堅

臥喘急

前胡實枳殼炒赤茯苓 大黃 甘草各半兩

右咬咀每服參錢水壹煎陸分稍熱服

桔梗防風湯治風熱咳嗽咽膈不利

桔梗 甘草 防風各二兩

右咬咀每服三錢水壹盞煎陸分溫服

升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發

熱肢體煩疼及瘡疹已發未發疑二之間

並宜服之今人謂此藥寒涼多不肯服今

釋其疑說併片詳見傷寒小兒量大小加減服

參砂膏通心氣除膈熱去痰壅

朱砂 人參 南星 茯神 遠志去心木用

皮姜汁 天麻 白附子 姜蠶炒各分朋砂

膏半 煨許

右為末煉蜜為丸如櫻桃大金箔為衣每

服一丸麥門冬去心煎湯調下

防風濕膽湯消痰順氣踈風

半夏 枳殼炒茯苓各半兩橘皮 防風各

錢甘草 錢壹

右州散每服壹錢入生姜紫蘇同煎服

治小兒嗽用蟬蛻爵金等分為末每壹字乳

頭上點喫

治小兒連嗽

白殭蠶 半兩真者水皂角子 不蛀者 洗去灰焙 五拾个

右將小一椀浸皂角子一夜次日於砂銚

內慢火熬取濃汁半盞去皂角子以姜蠶

蘸炙盡為度研為細末煉蜜調成膏候小

兒睡着以抹唇上自嚙下即効

治小兒咳嗽

貝母 揀甘草 各等分

右為細末每服半錢米飲下兒小只以壹

字許放乳上飲

獨勝散治小兒久嗽咯唾鮮血

天花粉 不以多少 卽菰萸根

右為細末每服一錢蜜湯調下無時

紫蘇飲子散治小兒咳逆吐氣因乳哺無度

內挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

直蘇子 去核 訶子 去核 蘿蔔子 杏仁 去尖

木香 人參 去酒 各青橘皮 甘草 判炒

右為細末每服壹錢水壹盞生姜三片煎至五分量人小加減服

異功散能除風寒濕脾稟賦弱者調和陰陽滋養血氣使豆滄易出易靨不致痒塌

沐香 丁香 官桂 人參 厚朴 姜汁炒

陳皮 肉豆蔻 煨 當歸 白朮 茯苓 各

錢半 夏 乙錢 附子 乙錢

右咬咀每服三錢水一盞半姜三片棗五枚煎七分熱服三歲兒作三次服五歲作二次服壹二歲時作五六次服

醫林方

桔梗湯

桔梗 石膏 紫蘇葉 微炒 皂角 燒 人參

半夏 甘草炒減半

右件各等分爲細末每服二錢水半小盞同煎法滓時時溫服之

葶藶丸

葶藶 杏仁 牽牛 防己已上等分 棗肉和

右爲細末棗爲丸如米大每服五七丸以虛實加減已利爲效隨乳下

玉柱散治小兒肺脹喘滿胃高氣急隨氣兩脇扇動脇下作坑甚者兩鼻竅脹擡肩喘悶

煩渴咳嗽喉鳴痰涎潮塞若不急治如在朝夕世俗不識作咽喉治之或言是馬脾風切忌於胃腹上妄灸但灸者火熱轉加往往不救其疾冬後春月多有之可服此藥又可服奪命散無不效到畝山寺竹園中一僧人說其痰涎者可已吐之後大便利爲效其至死者可服此藥外入也 葶藶丸 防己 杏仁 牽牛 棗肉和 右爲細末每服一字或至半錢以大水加

減之用燈盞下油三五點蜜半匙生薑自然汁新水半小盞用銀釵子調服以嘔吐涎者為效後大便秘為度後用清心丸補半夏散治小兒嘔病咽喉中有聲者其至天蒼葇子已上各等分右將二味打破炒黃色為細末每服壹錢猪厥子壹个燈焰上燒熟與藥在土又燒三四次臨卧口中噙之大効玉機微義

治痰涎之劑

青州白丸子

南星三兩半夏七兩白附子二兩川烏半兩各

右為末絹袋盛井水攪盡為度別換水浸

三五日曬乾糯米粉丸

按此治寒痰風痰藥也

抱龍丸方見御藥院方

按此治風痰熱痰藥也

宣風散

檳榔二 陳皮 甘草各半 牽牛肆兩半

右為末每壹錢量大小與服湯調下

按此下濕痰之劑也

福銀丸方見小兒藥證直訣

按此下食痰癖積藥也

謹按小兒多痰熱宜用抱龍丸與他毒丹等兼服故茲例不多錄

治咳嗽之劑

麻黃湯治傷風咳嗽喘急無汗方見傷寒

按此治風寒之劑也

敗毒散治時氣咳嗽方見大方

按此治風溫之劑也

紫菀散治小兒咳嗽上氣喉中水鷄之聲

射干 紫菀 款冬花各參錢 麻黃四錢 細辛

二 半夏壹錢 五味子大錢

右咬咀三歲兒壹錢水煎入薑棗少許

百部飲治小兒喘嗽日夜不得睡目鮮如突出之狀

百部 生薑 各八錢 細辛 甘草 各三錢 貝母

白朮 五味子 各二錢 桂心 四錢 麻黃 二錢

右改咀三歲兒一錢水煎

按此二方太陽例藥宜分輕重選用

紫蘇子散 方見聖惠方

按此下氣導痰藥也

葶藶丸 方見小兒藥譜直訣

按此下濕之劑也

全嬰方雄朱丸治小兒咳嗽有痰潮熱

雄黃 壹錢半 巴豆 七粒半 夏 兩半

右爲末糊丸小豆大一歲二丸薑湯下

按此導風痰濕痰乳癖藥也

潤肺散治小兒涎嗽不已氣急煩渴

麻黃 二錢 甘草 一錢 人參 知母 各二錢 陳皮 壹錢

桔梗 阿膠 炒 百部 各中錢

右爲末三歲壹錢水煎

按此手太陰足太陽藥也 大三十八歲

人參丸治小兒咳嗽有痰氣急惡心

人參 半夏 白朮 川薑 南星 炮

右等分爲末姜糊丸小豆大三十九丸姜湯

下按此手足太陰藥也

參杏膏治小兒久新咳嗽氣急惡心有痰咯血

人參 阿膠 炒 杏仁 炒 欬冬花 半 五味子

甘草 訶子 貝母

右等分爲末煉蜜丸雞頭大三歲兒一丸

白湯下

補肺散 方見小兒藥證直訣

按此二方手太陰之的藥也

瀉肺散治小兒肺氣熱盛而咳 方見積熱瀉肺白散

衛生易簡方

治發熱咳嗽喘人小正公九歲餘二三寸許

治發熱咳嗽氣喘面紅用人參天花粉等分

爲末每服半錢蜜水調下黃蘗柴胡各公

治傷風發熱咳嗽喘急用麻黃去節三分杏

仁去皮尖炒黃四分肉桂甘草各壹分水

半盞煎服有汗者不宜服白朮炒咀骨炙

治肺氣壅盛咳嗽不已用桑白皮炒地骨皮
各半錢甘草炙二分水壹盞粳米三十粒
同煎食後服

治小兒盜汗寒熱往來用胡黃連柴胡等分
爲末蜜丸如雞頭大每服二丸銀器中以
酒少許化開入水五分重湯煮二三十沸
放溫食後和滓服

治小兒咳嗽用露蜂房洗淨燒爲末每服一
字米飲調下

又方用生薑四兩剉碎以水四碗同煎數沸
去滓以湯浴兒卽止

治小兒咳嗽嘔吐用輕粉壹錢百草霜一兩
同研細米飯丸如米粒大每服一九米飲
又送下立愈

治小兒喘嗽用石膏火內飛過爲末蜜調半
錢服
治小兒胸喉膈熱喘用甘遂三錢雄黃壹
錢爲末每服半錢或壹錢新汲水五七匙

小油三點調下吐涎後喘定
又方用天黃黑黍半白華半等分各半生
一半熟檳榔亦等分爲末每服半錢三五
歲每服一錢漿水半盞蜜少許調服
又方用膽礬輕粉等分爲末每服一字漿水
壹匙小油三點攪勻灌之須臾即吐喘便止
又方用銅青爲末漿水調下半錢吐涎即愈
又方用銅青蛤粉等分爲末每服壹字新汲
水半盞小油五點調勻服即吐

治大人小兒一切咳嗽痰飲用生南星生半
夏各四兩白礬二兩飛時放去殼巴豆二
十壹粒候礬冷定去豆三味爲末生姜自
然汁丸如桐子大小兒丸如麻子大每服
二十九食後姜湯下
又方用大黃酒浸黃芩各八兩青礬石壹兩
以硝煨沉香半兩爲末水糊丸如桐子大
小兒丸如麻子大一切痰飲積滯服之極
效丸散量大小虛實加減惟瀉痢并雙身

者不宜服

金匱鈎去

小兒風痰

南星

半兩 切 白凡

半兩 研

右用水浸上高一指許晒乾研細入白附

子末二兩飛羅麵為丸如鷄頭實大煎服

一丸或二丸姜蜜薄苛湯磨化服

咳嗽食治

食醫心鑑

治小兒咳嗽氣急少便澀少面目浮腫冬麻

子粥方右冬麻子三合研取汁白米三合

煮粥空心食之

備預百要方同

又方嫩桑枝

切三合 楮枝

叁合 叁合

右以水二升煎桑楮枝取汁一升去滓煮

米作粥食之

備預百要方同

備預百要方

小兒卒咳嗽好梨一顆刺作五十孔每孔入

真椒膏粒以麩水和作餅裹梨外用濕紙

裹兩重煨於塘灰中令出停冷去椒令
兒啖之

咳嗽鍼灸

拔粹方

一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉
者以草草等病兒手中指裏近掌紋至中
指尖截斷如此三莖自乳上微斜直上立
兩莖於稍尽头橫膏莖兩頭盡頭點下各
灸三壯此法多曾見愈

瘡

目錄

論

千金方

恒山湯

海上仙方

聖惠方

治小兒瘡疾諸方

- 乾漆散
- 防葵散
- 犀角散
- 知母散
- 乾蟻散
- 升麻散
- 桃人散
- 松羅散

寒瘧證治

烏梅散 黃丹丸 砒霜丸 牛黃丸

大蒜丸 恒山丸 蜀漆丸 黃丹丸

恒山丸

大全本草

直指小兒方

寒瘧證治

常山散

管見大全良方

保童秘要

得效方

瘧疾

香蘇香薷散 十神湯 五苓散 人參

湯 草果平胃散 爭功散 勝金圓

蕩脾圓 通神餅 參苓白朮散

澹軒方

食瘧

聖濟總錄

小兒瘧

類聚

卷五

大青湯 當歸湯 大黃湯 甘草湯

此胡湯 蛇蛻散

醫方大成

養胃湯 清脾湯 鬼哭飲 常山飲

草果飲 露星飲

永類鈴方

諸瘧證治

驅瘧飲 清肺湯 清肺湯

衛生易簡方 餘藥無名者散見本方

瘧

巢氏病源

瘧病候

瘧病者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而邪乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘧休作有時其發時節漸晏者此由邪客於風府邪循脊而下衛氣

日一夜常大會於風府其明日日下壹節故
其作日晏其發早者衛氣之行風府日下壹
節二十壹日下至尾低二十二日入脊肉上
注於伏衝之脉其行九日出於缺盆之內其
氣之上故其病發更早其間日發者風邪外
客於皮膚內而痰飲清於腑臟血氣不和則
陰陽交爭故寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪
入於臟與寒相搏而擊於臟氣故寒熱往來
而腹痛也

瘧後餘熱候

夫風邪所傷是客於皮膚而痰飲清於臟腑
致令血氣不和陰陽交爭若真氣勝則邪氣
退邪氣未盡故發瘧也邪氣雖退氣血上虛
邪氣干於真氣臟腑壅否熱氣未散故餘熱
往來也

患瘧後脅內結硬候

瘧是夏傷於暑熱客於皮膚至秋復爲風邪
所折陰陽交爭故發寒熱其病正發寒熱交

爭之時熱氣乘藏藏則燥而渴渴而引飲飲停成癖結於脅下故瘥後脅內結硬也

瘥後內熱渴引飲候

瘥病者是夏傷於暑熱客於皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒熱成瘥凡瘥發欲解則汗汗則津液減耗又熱乘於藏藏虛燥其瘥瘥之後腑臟未和津液未復故內猶熱渴而引飲也若引飲不止小便澁者則變成癖也

和劑指南

論小兒寒瘥證

瘥疾寒熱往來連日發或兩日或三日一次發小兒三四歲已壯者可與感應圓三兩服去傷積次服不換金正氣散草菓飲如吃乳小兒只令乳母服前件瘥藥更兩小兒潮熱似瘥非瘥不可用瘥藥治之十日口鼻皆合千金方未以水瘥者宜用此方十日口鼻皆合恒山湯治小兒溫瘥方

恒山切壹小麥二合淡竹葉切壹

右三味以水壹升半煮取五合壹日至七日兒壹合為二服八日至十五日兒壹合半為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日至六十日兒六合為三服六十一日至百日兒壹服二合半百日至二百日兒壹服三合○肘後方小兒瘡方常山五分小麥五合淡竹葉切壹升水三升煮取二升四日至六日兒取六合分服看

大小加減宜更檢瘧條中聖濟總錄常山

淡竹葉竹葉各壹兩小麥壹合右三味麤搗篩

小分為四劑每劑以水二盞煎至一盞去滓分溫三服壹日令盡以差為度更量兒大小加減

又方鹿角末臨發時先服壹錢匕○肘後方

治小兒瘡用牛鹿角細末先發時便以乳

調壹字服聖濟總錄治小兒諸瘡鹿角錢

兩右言以麤搗篩每服壹錢匕末發時水

半錢煎至三分去滓溫服更量大不加減
又方燒鼈甲灰以酒服壹錢匕至發時服三
匕并以火炙身

又方燒雞胍脰中黃皮爲末和乳與服男雄
女雌

海上仙方

小兒抱瘡子烏貓糞最靈桃仁用七個煎服

立時平

衛生易簡方同

聖惠方

治小兒瘡疾諸方

夫小兒瘡病者是夏傷於暑熱客於皮膚至
秋復爲風邪所折陰陽交爭故發寒熱而成
瘡也凡發欲解則有汗出汗出多則津液減
耗又熱乘於藏則生虛躁其虛差之後腑臟
未得復故內猶有熱故渴而引飲也若引飲
未止小便澀者則變成飲癖也
治小兒七八歲患瘡發歇寒熱心煩或渴乾
漆散方

乾漆壹分搗碎川大黃壹分剉碎恒山半兩

膏壹兩甘草半兩炙

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小

盞入小麥三十粒煎至五分去滓放溫

前服之量兒大小以意加減

治小兒瘡發後肚脹兼頭面浮腫宜服防葵

散方

防葵半兩柴胡半兩川大黃半兩剉碎桑根白

皮半兩甘草壹分炙

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓溫服日三服量兒大小

加減服之

治小兒熱瘡氣為瘡犀角散方

犀角屑半兩鼈甲壹兩塗醋炙柴胡三分

知母半兩甘草半兩炙川大黃半兩剉碎恒山

二分

右件藥搗籠羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓溫服日三四服量兒大

小以意加減

治小兒痰熱發瘧知母散方

知母壹兩 龍甲壹兩 令壹兩 黃去壹兩 裙襪壹兩 牡蠣粉兩 恒山兩

兩半

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半

錢日二服量兒大小以意加減

治小兒痰癖瘧發無時牡蠣散方

牡蠣粉兩 知母兩 恒山兩 烏梅肉兩 微炒兩 人

參兩 龍甲兩 微兩 黃去兩 裙襪兩 升麻兩 甘

草壹分 赤壹分 到壹分 豉壹分 心壹分 桃壹分 人壹分 雙壹分 人壹分 麩壹分 炒壹分 發壹分 黃壹分

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下半

錢日二服量兒大小以意加減

治小兒瘧疾發後煩熱升麻散方

川壹分 升壹分 麻壹分 恒山壹分 蜀漆壹分 川壹分 大壹分 黃壹分 碎壹分 微壹分 炒壹分

蕨壹分 蕤壹分 青壹分 黃壹分 芩壹分 一壹分 桂壹分 心壹分 錄壹分 桂壹分 去壹分 鹿壹分 皮壹分 川壹分 芒壹分

消壹分 錄壹分 一壹分 兩壹分 總壹分

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓溫服以吐利為度量兒

大小以意加減○總錄右八味金擣篩五
六歲兒每服半錢匕水半盞煎至三分去
滓發時溫服吐利爲效更量兒大小加減
治小兒瘧疾發歇寒熱小便赤黃宜服桃人
散方

桃人 三分湯浸去皮尖 知每兩 半 鼈甲 三分
鱗人麩炒微黃 炙微黃 赤茯苓 三分 川升麻 兩半 黃芩 兩半 甘草
去裙襴 青分炙 微赤到
右件藥擣羅爲散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓溫服日三四服量兒大
小以意加減

治小兒瘧腎膈間痰涎發歇寒熱宜服松蘿
散吐方

松蘿 三分 恒山 兩壹 甘草 三分炙
微赤到
右件藥擣羅爲散每服一錢以水一小
盞煎至五分去滓溫服量兒大小以意加
減以吐爲効不吐更服

治小兒瘧發作不定多渴心煩烏梅散方

烏梅肉牛兩 恒山壹兩 聖濟○ 甘草三分
赤剉 總錄半兩 炙微

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小
盞入淡竹葉七片總錄 小麥三十粒同煎
至五分總錄 去滓溫服量兒大小加減與
服

治小兒瘧寒熱發歇不定黃丹丸方

黃丹半兩 人參半兩 去蘆頭 鼈甲半兩 塗醋炙
微炒

恒山兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每
於未發利以冷水下一丸三歲已上即可
三九

治小兒瘧累發不定砒霜丸方

砒霜壹分 朱砂壹分 巴豆七枚 夫戍
細研 細研 細研 心研紙裏
壓去 母丁香四枚 相思子七枚 阿魏半錢 麩裏
油 恒山壹錢 煨麩熟為

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
丸如黍米大每於未發前以冷水下壹丸

每壹歲加壹丸

治小兒瘧疾煩熱牛黃丸方

牛黃

青分

杏人

青分

雙人

麩炒

微黃

去皮尖

右件藥同研如膏鍊蜜和丸如麻子大每服以溫水下三丸日三服量兒大小加減服之

治小兒瘧疾必効大蒜丸方

獨顆蒜

一枚

巴豆

壹枚

去皮心

右件藥取巴豆內蒜中用溫紙裹煨令熟

擣如膏凡如麻子大每服以醋湯下壹丸

以吐利為度更量兒大小加減服之五月

五日修合更佳

治小兒瘧疾恒山丸方

恒山

末

白蠟

半

鷄子

一枚

右件藥敵鷄子去黃用清與恒山末拌和冷於篋枕中鎔蠟都拌和以絲幕枕口坐甕中蒸三遍取出丸如麻子大每服以粥飲下五丸當吐即差量兒大小加減服

之治小兒久瘡不斷得脇下痞壅蜀漆丸方

治小兒久瘡不斷得脇下痞壅蜀漆丸方

蜀漆分壹分湯浸去皮尖黃連壹分

赤心分壹分甜葶藶一分川芎兩川芎兩

黃散炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每

服以粥飲下五九日三服量兒大小以意

加減

治小兒瘡疾發歇寒熱體顛黃丹丸方

黃丹半兩恒山末半兩虎睛一隻酒浸

右件藥同研令細鍊蜜和丸如梧桐子大

每未發前以溫水下二九五歲已下可服

壹丸

治小兒瘡疾發時壯熱增寒面色青黃飲食

不下恒山丸方

恒山半兩川芎半兩大黃半兩甘草半兩麝香半錢

細研

右件藥搗羅為末研入麝香令勻鍊蜜和

之治小兒久瘡不斷得脇下痞壅蜀漆丸方

治小兒久瘡不斷得脇下痞壅蜀漆丸方

蜀漆分杏仁分黃連分

杜心分甜葶藶分川芎分

黃分炒分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每

服以粥飲下五九日三服量兒大小以意

加減

治小兒瘡疾發歇寒熱體顛黃丹丸方

一

黃丹分恒山末分虎睛分

右件藥同研令細鍊蜜和丸如梧桐子大

每未發前以溫水下二九五歲已下可服

壹丸

治小兒瘡疾發時壯熱增寒面色青黃飲食

不下恒山丸方

又恒山分川大黃分甘草分麝香分

細研

右件藥搗羅為末研入麝香令勻鍊蜜和

九如梧桐子大每臨發前以煖水下之丸
三歲已下卽服壹丸

又方蛇蛻皮燒灰細研爲散於未發前以冷
水調下壹字三歲已上卽服半錢

又方鼈甲一兩兩錢一兩並煎取汁青黃煎食

右燒灰細研爲散於未發前以溫酒調下

半錢三歲已下卽服壹字三歲已下卽服

大全本草

劉氏治小兒瘡方黃丹兩錢匕以蜜水和與

服冷卽以酒和令服之良

直指小兒方

寒瘡證治

常山散治小兒發虐痰壅煩悶

常山 川大黃 甘草炙各半兩 桂心 烏

梅肉各壹分

右劉細每服一錢井水小盞煎半候冷未
發前與之

管見大全良方

若小兒因露臥而得瘧疾寒熱者以異功五
積散貳錢重加恒山一字水一中盞麥三
片酒一分煎留五分去滓露一宿次早五
更盡盪溫量兒大小而凍多少與服

保童秘要

瘧疾諸方

麝香壹包常山 甘草生大黃各二
右為末蜜和為丸如梧子大二歲已下每
服五丸溫水研化下日三服

又方蜀漆 大黃 常山各壹 甘草半 石膏

五分 卜麥 壹匙

右以水七升合煎取三升去滓二歲已下
每服壹合日再服

又方鈿丹 常山各二分 虎睛壹箇

右為末蜜和為丸如梧子大二歲已下每
服三丸溫水研化下日三服

得効力

瘧疾

表解香蘇香薷散治春傷風夏伏暑作瘧其證自汗惡風先熱後寒或但熱不寒每服三錢生薑三片葱白二根水一大盞煎服

方並見大方科傷寒門及諸暑門

十神湯治夏傷濕秋傷風作瘧其證寒熱自

汗嘔吐身疼每服三錢小豆大蒸生薑三

片木瓜二片煎秋末感風冷冬又傷寒或

感溫暖之氣先寒後熱亦服

方見大方科傷寒門

五苓散分陰陽和榮衛用人參少許茵陳

前草各一根煎湯服弱者木瓜紫蘇湯或

服通靈散亦可

方並見大方科諸暑門

人參湯治熱多寒少每服二錢生薑二片麥

門冬十粒炙心正地骨皮少許煎多服取

効自小柴胡湯方見大方科傷寒門

草果平胃散治寒多熱少

方見大方科諸瘧門

爭功散治熱虐多効

知母 貝母 柴胡 去常山 甘草 山

梔子 檳榔 各五錢 蟬退 十地骨皮 去骨

右判散每服三錢用桃柳枝各五寸煎未

効用過路葛藤五寸煎服

截瘧勝金圓 方見大方科諸瘧門

蕩脾圓什痰消積進食駐顏及治氣喘肝積

杏仁 壹斤去其尖用 牛夏 壹斤生薑自然汁浸壹宿改日

焙巴豆 十粒去殼并心膜以皮紙串油

右為末用大好北棗七枚入燈心水蒸去

皮核取肉為圓每服五圓常服澄心棗子

煎湯下注顏檳榔煎湯消宿食陳米湯空

心臨睡服化痰烏梅湯治瘡蒜湯或薤水

下消痞癖此方大效

通神餅截瘧有功

甘草末 三錢 菜豆末 敗荷葉 各壹錢 砒霜 半錢

生朱砂 壹錢半 定粉 半錢 腦子 麝香 各少許 金

銀箔 拾片

右煉蜜圓梧桐子大作餅子用歲半圓或

壹圓大者二圓而止壹日只壹服不可過

多服時用井花水或桃柳枝煎水磨化向

此服了忌燒熱飲食亦可繫於候脉處

參苓白朮散愈後調理脾胃 方見大方科脾胃門

澹軒方

食瘡

小紅元如烏梅元平胃散加草果添姜棗同

煎咽元子小兒食瘡自能痊

聖濟總錄

小兒瘡

夏傷於暑秋成瘰癧小兒血氣壅盛內挾實

熟因犯暑邪客于皮膚分肉之間至秋為風冷所折陽盛於外陰長於內陰陽相搏發而成瘰先寒後熱者寒瘡也先熱後寒者溫瘡也熱而不寒者瘰癧也若汗出過多亡陽而渴當節其飲多飲而小便澁則變為飲澀矣治小兒諸瘡大青湯方

大青 龍甲 醋炙去 赤芍藥 各半 當歸 切

茵陳蒿 麻黃 去節煎 豬苓 去黑皮

右七味雜糶篩每服半錢匕水半盞煎至

三分去滓溫服日三更量兒大小加減

治小兒瘧疾身體壯熱增寒發作有時當歸

湯方當歸切赤芍藥切龍甲醋炙去芫胡去大

黃制甘草炙桃人去皮尖人去

右七味麤搗篩五六歲兒每服半錢匕水

半盞煎至三分去滓溫服日三更量兒大

小加減

治小兒瘧大黃湯方

大黃剉常山各壹桂去甘草生各

右四味麤搗篩三四歲兒每服半錢匕以

水半盞煎至三分去滓水發前溫服吐利

為効更量兒大小加減

治小兒瘧癉實壯熱頭痛欲吐甘草湯方

甘草炙常山各一

右二味麤搗篩三四歲兒每服半錢匕水

半盞入竹葉十片同煎至三分去滓溫服

更量兒大小加減得吐即止

類聚

卷三

治小兒瘡發寒熱腹脹下痢嘔逆黃瘦此胡湯方

芫胡去苗壹分枳殼去瓢炒貳枚訶梨勒大者一顆煨取皮用

黃芩去心甘草炙芍藥炙知母焙各半兩

右七味竊搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服

治小兒諸瘡蛇蛻散方

蛇蛻煨

右一味研細每服半錢或壹錢匕冷水調

下

醫方大成

和劑方養胃湯治內傷生冷外感風寒憎寒

壯熱或發為瘧方見大方科傷寒門醫方集成南北經驗方袖珍方

同

三因方清脾湯治因食傷脾停滯痰飲發為

寒熱方見大方科諸瘧門醫方集成南北經驗方袖珍方同

湯氏方鬼哭飲治瘧疾久不愈者

常山 大腹皮 茯苓 龍甲醋炙甘草炙

類聚

卷三

等分

右爲末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之略吐出涎不妨醫方集成南北經發方袖珍方

張氏方常山飲治一切瘧疾

常山 人參去蘆 茯苓 草菓 知母 貝

毋承類鈐方 甘草 半夏麩鈐方無麩字 厚朴

薑汁製肯宿炒黃色各等分

右咬咀每服二錢水半盞薑三片棗一個

空心煎服忌雞羊牛肉諸般毒食醫方集成南北

經驗方袖珍方同鈐方又云脾虛氣弱常山作吐須審

湯氏方草菓飲治發瘧寒多熱少或遍身浮

腫者

厚朴薑汁製 青皮去白 草菓 藿香 甘草炙

丁香皮 神麩 良姜 半夏麩各等分

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一個

空心煎服醫方集成南北經驗方袖珍方同承類鈐方云壹方加檳榔紫蘇

湯氏方露星飲治久瘧成勞

秦艽 柴胡 白朮 茯苓 檳榔 常
 山 黃芩 甘草 半夏麴 官桂 各等分
 右咬咀每服三錢酒醋合 袖珍方 壹盞姜
 三片煎露壹宿次早服 醫方集成南
 永類鈴方 北經驗方同

諸瘧證治

瘧之論見於鈴方傷寒雜病之虐詳矣小兒
 瘧證之切有五 傷寒瘧則有傷寒證見大
 小便堅赤 食瘧必腹膨眼臉厚肚熱足冷

脈緊手絞紫亦先表解調脾而後可下 脾
 虛生疾其發必有痰證脾脈弱四肢或浮先
 表解中加痰藥 脾寒發瘧則面色青黃四
 肢冷大小便或自利亦可養胃湯表之 感
 暑瘧背寒面垢煩渴小便赤大便或堅香葛
 散表解後五苓散分之
 表解先用二香散蘇苓散傷寒香葛散小柴
 胡湯食瘧養胃湯後用紫霜元脾虛用草菓
 飲四獸飲脾寒理中湯加附子草菓半夏茯

苓感暑二香散香薷飲五苓散
全嬰驅癘飲治一切癘

紫蘇 白芷 檳榔 各半 草菓 淨一制半

夏兩 陳皮 白茯苓 甘草 前胡 多半

右收咀姜棗烏梅煎甚効

三因清肺湯因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

濟生清肺湯但熱不寒或熱多寒少吐苦咽

乾小便赤澀 前見大力科咳嗽門

衛生易簡方

治癘疾久不愈用常山大腹皮茯苓鼈甲醋
炙甘草炙等分為末每服壹二錢桃柳枝
各七寸同煎臨發時服略吐涎不妨

醫方類聚卷之二百四十五