

醫方類聚卷之二百六十三

小兒門二十五

傷寒

是齋醫方

傷寒

和解湯治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻
塞多涕驚悸自汗肢節疼痛及麩瘡豆瘡已
發未發者皆可服翁主薄中之傳發州醫人
方甚奇



羌活 防風 川芎 人參 各壹兩 乾葛 川升麻 經各半兩 甘草 微兩各半

右為麤末每服三歲兒壹錢水三分盞生薑半片棗子少許同煎至二分去滓服不拘時候量大小加減 朱氏集驗方

直指小兒方

傷寒證治

桂枝麻黃各半湯

桂枝 一分壹兩 芍藥 半兩 生薑 半兩 甘草 炙半兩

麻黃 半兩百沸湯煎去黃汁焙乾秤 杏仁 壹十貳箇湯大棗 貳枚

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煮至八分去滓溫服

香蘇散治四時瘟疫傷寒

香附子 炒去毛 紫蘇葉 各四兩 青橘皮 貳兩不去白 甘草 壹兩

右為麤末每服叁錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時日三服解肌加乾葛煎若作

細末只服貳錢入搥點服

升麻葛根湯治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢

體煩疼方見大方
科諸痢門

小柴胡湯方見大方
科諸暑門理中湯方見大方
科泄瀉門甘

露飲四順飲方並見大方
科積熱門五苓散方見大
方科諸

氣參蘇飲方見
疹痘人參羌活散方見大方
科眼門人

參潤肺湯方見
咳嗽紫霜元方見
驚癇人參敗毒散

方見小兒
藥證直訣

朱氏集驗方

煎

解肌湯醫方大成治傷寒發熱心煩燥渴集
成南北經驗方袖珍方永類金方同

麻黃去節半兩○諸
方冬用三分人參川芎受北芍

藥白獨活各半
兩分前胡壹

右咬咀每一錢鈔方
二錢水半盞薑一片薄荷

一葉煎三分去滓三歲以下二歲以上壹

服作二服

羌活散散風邪止驚搐退熱解肌

羌活粉草天麻生茯苓白川芎各貳

荆芥穗 白蒿蠶 白朮 白附子炮各一錢

桔梗二錢半 防風壹錢半 全蝎半錢去刺炒 朱砂半錢

天南星壹字熟炮

右為細末薄荷湯下如傷風鼻塞流清涕

葱白煎湯下或嗽氣促桑白皮煎湯下常

服白湯亦可

小麥煎湯治小兒夾食夾驚傷寒正受傷寒

咳嗽夜熱晝涼傷風瘡疹之疾大效劉道夫方

麻黃半兩去節湯泡 白朮炮 乾葛三錢半 白伏苓

甘草各二錢半

右咬咀入麥子二十壹粒同煎壹方用葱

白二寸煎服

天麻散治小兒傷風鼻涕鼻塞咳嗽身熱

並皆治之

天麻 防風 甘草 木川芎 羌活 白

芷 麻黃去節

右等分為細末葱湯食後服

木香散能和表裏通行津液

木香 大腹皮 官桂 前胡 陳皮

丁香 阿子 人參 半夏 赤茯苓

甘草 縮砂 各參 錢

右為麤散每服參錢水壹大盞生薑二片

煎至六分稍熱空肚服量兒大小以意增

減

甘露散治驚風潮熱不退

寒水石 石膏 防風 荆芥 薄荷

甘草

右為末每服半錢用井花水下或薄荷湯

調下

桃花散治驚風潮熱悶

天竺黃 白茯苓 朱砂 小腦麝香

右為末每壹字薄荷湯下 一日二服

管見大全良方

水解散治天行頭痛壯熱一二日兼治疱瘡

未出煩燥或出尙身體發熱

麻黃 去節泡 大黃 黃芩 桂心 甘草

芎藥 各一兩

右為細末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二錢相次貳服得汗利便差

治瘴木香圓見蘇沉良方

鷄心檳榔 橘紅 各二兩 青木香 一人參 去蘆

附子 炮厚朴 去租皮姜汁製炒 桂心 三稜 羌

活 獨活 乾姜 炮甘草 炙川芎 大黃

芍藥 各半 黑牽牛 壹斤淘去浮者指拭肉頭取末四兩餘不用

豆蔻 陸枚止 瀉方用

右壹十五味為末瓷器盛之密封臨服用

牽牛末二兩藥末壹兩研令停煉蜜圓如

梧桐子大 心腹脹滿壹切風勞冷氣臍

下刺痛口吐清水白沫醋心疝癖氣塊男

下腎藏風毒攻刺四肢及腸毒脚氣目昏

頭痛心間嘔逆及兩脇堅滿不消時桶

皮湯下三十圓以利為度此後每夜服二

十圓女人血痢下血刺痛積年血塊胃心

逆手足心煩熱不思飲食薑湯下三十圓

取利每夜更服二十圓 小兒五歲已上
疝氣腹脹氣喘空心溫湯下五圓小者減
圓數服

凡胃腹飽悶不消脾泄不止臨卧溫酒下
取利 食毒癰疽發背山嵐瘴氣纔覺頭
痛背膊拘緊便宜服之快利爲度壹常服
可以不染瘴疾凡瘴疾皆因脾胃實熱所
致常以涼藥解膈上壅熱者此藥通利彌
善此丸本治嵐瘴及溫瘴大効李校理敦

裕嘗爲傳刻石于大庾嶺蒙效者不可勝
數予伯氏任閩中嘗擁兵捕山寇過漳浦
軍人皆感瘴用此治之應時患愈予在江
南時值歲發瘴以此藥與人其効如神
以得快利爲度又記凡瘴服藥訖仍灸氣
海下則又灸中脘三十壯尤善

保童祕要

贈寒發熱諸方

甘草

蜀漆

大黃

各壹分
石膏六分

右以水五大合煎取三合頓服

又方葱白七葉鱉甲三分生用竹茹新者常山 大黃

各壹分

右以童子小便五合煎取二合去滓更入

細研麝香少許勻攪之分作兩服連夜服

盡

增寒面色黃諸方

麻黃去節秦膠 大黃各半柴胡壹分石膏五分

常山壹分杏仁大

右以水七合煎取三合一歲兒壹日壹合

又方朴消三分湯成下梔子二枚黃芩 大黃各壹分

右切以水五大合煎取三合如前服

御藥院方

大青膏治小兒外感風寒呵欠頓悶口中氣

熱肝主風實則目直大呵虛則前牙多欠又

胃滿短氣氣急喘嗽上氣故當發散之又治

小兒外傷寒其候伸欠頓悶口中氣熱或怕

畏人惡風脉浮者並宜服之

天麻末壹分白附子末生壹錢半朱砂研壹字七青黛

研壹錢麝香壹字七烏蛇稍肉酒浸焙乾取末半錢天竺

黃壹字七研蝎尾去毒生半錢

右同再細研勻生蜜和成膏每服半皂子
大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏
温薄荷湯化一處服之五歲已上同甘露
散服之

得効方

外感

傷寒傷風鼻塞頭痛或鼻流清涕唇紅面赤
焦啼凡傷寒宜解表幼者麥湯散一一發額
上有粘汗妙滿口生瘡頻出汗只在頭上光
如油難治
麥湯散治夾驚夾食傷寒氣急嗽聲

滑石 石膏 知母 貝母 麻黃 杏

仁炒別甘草薄紙甜葶藶盛炒人參蒸北地

骨皮去骨名

右為末每服一錢小麥二十粒煎湯下涎

盛氣促乘白皮湯下

惺惺散治風熱瘡疹傷寒時氣頭痛吐熱目
澁多睡咳嗽氣喘鼻塞清涕兼治變蒸方見
小兒
藥證
直訣

香葛湯參蘇飲治同上

方並見大方
科傷寒門

柴胡散治傷風傷寒熱氣壅涎盛胃膈不利
或時行疹痘未分或痢疾潮熱但是一切積
熱溫升皆宜

柴胡二人參

甘草

黃芩

各壹兩

半夏泡

次麻黃

寸節各
五錢

右劉散每服二錢生薑二片薄荷三皮白
竹青心許煎溫服鼻衄加生地黃以瘧
疾姜錢桃柳枝地骨皮痢疾作熱用涎

人參羌活散治傷風傷寒發熱頭痛加見

驚癇

傷暑香薷散治身熱惡寒頭痛或往來寒熱
如瘧煩燥渴甚嘔吐背寒面垢洩瀉昏悶
脉伏每服二錢水一盞茵陳車前草各二

莖煎熱服嘔吐加藿香木瓜洩瀉烏梅陳

米熱瀉黃連每服並各加少許方見大方

五苓散治法湯引同前泄瀉不止平胃散合

人和紫蘇葉烏梅煎湯下方並見大方科

傷濕香蘇散治身重脚弱關節疼發熱惡寒

小便澀大便泄自汗或浮滿因久在卑濕

或為雨露所襲每服二錢水一盞加炒蒼

朮車前子木瓜少許生薑二片煎熱服小

便多是效方見大方科傷寒門

不換金正氣散治同上

蒼朮一兩米泔浸切炒黃色藿香葉 陳皮各五錢 半

夏錢三白茯苓 粉草各五錢

右剉散每服一錢生薑二片紅棗壹枚煎

食前溫服

理中湯平胃散治傷濕腹痛泄瀉不食每服

一錢空心蘇盞湯下理中湯方見大方科嘔吐門平胃散方見

大方科脾胃門

衛生寶鑑

小兒時氣溫疫外傷風寒

天麻防風丸治壹切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎不利及風溫邪熱

乾蝎炒白殭蠶炒各半兩天麻防風人參

各壹兩朱砂雄黃麝香甘草各壹分牛

黃錢一

右拾味爲末蜜丸梧子大每服壹丸至貳丸薄荷湯化下不以時

紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胃膈痞滿嘔

吐惡心或大便酸臭乳食不消

代赭石醋淬細研赤石脂各一兩杏仁去皮尖炒別研五拾

枚巴豆去皮心出油炒研參拾粒

右爲末和勻湯浸餗餅丸如黃米大兒生叁拾日外可服壹丸一歲至叁歲可服二丸至叁丸皂角子煎湯送下米飲亦得微利爲度未利再服更量虛實加減

消積丸錢氏方

砂仁拾二筒丁香九筒烏梅叁筒巴豆貳筒去心膜出油

右為末糊丸如黍米大參歲以上參五丸
以下二三丸溫水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不
能克化而生腹脹四肢瘦弱或病色無常

蒼朮參錢炒神麴五分炒大麥蘖五分炒橘皮去白

半夏湯洗枳實炒各人參各厚朴薑製青皮各

右為末糊丸如麻子大每服二拾丸溫水
送下食前忌飽食

聖濟總錄

小兒傷寒

小兒傷寒之病有冬時冒犯嚴寒而得之者
有傷四時非節之氣而得之者所感雖不同
然皆名傷寒大率與大人傷寒證狀無異惟
用藥分劑差少爾治法兼見傷寒門中
治小兒傷寒身熱頭痛咳嗽喘鳴鼻乾不得
臥十味湯方

前胡去蘆羌活去獨活去

頭 桔梗炒 赤茯苓去黑 枳殼去瓢 芫藟

羌活去蘆頭 各半兩

右一十味 籠擣篩 每二錢匕 水壹盞 入生

薑三片 大棗二枚 擘破 同煎 至七分 去滓

分溫三服 大人半盞 小兒半盞

治小兒傷寒 頭痛 肌熱 喘 麤 白朮湯方 不同

白朮 人參 麻黃去根 甘草炙 葛根剉

藿香去梗 桔梗炒 各半兩

右七味 籠擣篩 每服一錢匕 水半盞 煎至

三分 去滓 不計時候 溫服

治小兒傷寒 外證 身熱 脈浮 人參湯方

人參 麻黃去根 赤茯苓去黑 白朮乾

葛根剉 甘草炙 各半兩

右六味 籠擣篩 每二錢匕 水壹小盞 入葱

白少許 同煎 至六分 去滓 分溫二服

治小兒傷寒 咳嗽 喘 麤 肌熱 煩躁 作渴 茯苓

湯方 人參 麻黃 赤茯苓 白朮 乾葛 甘草 各半兩

白茯苓兩 烏梅肉半兩 乾木瓜兩

右三味搗篩為麤末每服壹錢匕以水小
一盞入生薑錢子壹片煎至五分去滓溫
服不計時候量兒大小加減

治小兒傷寒頭痛肌熱喘急喉啞石膏湯方

石膏碎壹錢 白朮半兩 麻黃去根節 桔梗炒 甘草

炙水萍暴乾 杏仁湯浸去皮尖雙

右七味麤搗篩每服一錢匕水半盞葱白

少許煎至三分去滓溫服不拘時候

治小兒傷寒體熱面赤口乾或咳嗽黃芩湯

方

黃芩去黑心二兩 麻黃去根節壹兩 桂去麤皮 甘草炙

石膏碎 芍藥各半兩 杏仁拾枚湯去皮尖雙入炒

右七味麤搗篩每服壹錢匕水半盞生薑

三片煎至二分去滓量兒大小加減

治小兒傷寒胃氣不和解肌蒼朮散方

小蒼朮去麤皮生薑汁炙剉 陳橘皮湯浸去白

乾薑煨參分 甘草炙半兩

右五味搗羅為散每服壹錢匕水壹小盞

類聚

十一

入生薑大棗各少許同煎至六分熱服

拔粹方

小兒表傷則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚畜血氣未實不能勝邪故發畜也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

天麻末五錢白附子末貳錢蝎蛭去毒生朱

砂研一麝香青烏蛇稍肉酒浸焙乾青黛

錢研天竺黃研壹

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大

月中兒粳米大同牛黃膏温薄荷湯化壹處服之五歲已上同甘露散服之

小兒傷寒熱煩小便赤澁大便褐色而赤氣熱者導赤散

小生地黃 木通 甘草各等分

右為細末每服三錢南北經驗方竹葉五

七經驗方片同煎大

小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃燥煩悶

亂者瀉青丸

類聚

十一

當歸 龍膽 川芎 山梔子 大黃

羌活 防風 各等分

右為細末煉蜜丸鷄頭大每服半錢至壹
丸煎竹葉同沙糖水化下

小兒結熱於內口乾而渴身黃體重者白朮
散

人參 白朮 白茯苓 甘草 炒 藿香葉

各壹兩 葛根 貳兩

右為麤末每服三錢至二錢水煎

小兒結熱上氣喘者四順散壹名清涼飲子

大黃 蒸 甘草 炙 當歸 洗 芍藥 洗各等分

右為細末每服壹錢薄荷三葉同煎

小兒客熱在內不思乳食宜導赤散次服益

黃散

陳皮 壹兩 青子 柯子肉 甘草 各半兩 丁香

錢 貳錢 右為細末每服二錢水煎 南北經驗方

醫方大成

感冒四氣

湯氏方薄荷散治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉兩半羌活 全蝎 麻黃去節甘草分半

薑蠶 天竺黃 白附子炮各壹分

右為末每服一錢水半盞煎服加竹瀝少

許尤妙醫方集成南北經驗方袖珍方同

湯氏方七寶散治感寒頭昏體熱小兒乳母

同服

紫蘇葉 香附子炒去毛各三兩橘皮 甘草干

桔梗去蘆白芷 川芎各壹兩加麻黃許少

右咬咀每服二錢水半盞姜一片棗半枚

煎服醫方集成南北經驗方袖珍方同

湯氏方加減建中湯治傷寒發熱自汗虛煩

黃耆兩壹白芍藥兩三甘草炙○南北經驗方壹兩人參

熟地黃各半兩

右咬咀每服二錢水半盞煎服醫方集成袖珍方承

類鈔

和劑方不換金正氣散治感冒風濕頭目昏

重時發壯熱醫方集成南北經驗方

和劑方五苓散治中暑身熱煩渴嘔吐醫方集成

南北經驗方袖珍方同方見諸暑

和劑方黃連香薷散治伏暑發渴或作瘧痢

並宜服之醫方集成南北經驗方

和劑方小柴胡湯治感寒發熱或作瘧疾湯

氏方加生地黄醫方集成南北經驗方

湯氏方柴苓散治腹中伏熱候如溫壯

柴胡三分麥門冬去心人參 赤茯苓 甘

草各半兩黃芩壹兩○醫方集成半兩

右咬咀每服二錢水半盞入小麥二十粒

青竹葉一片煎服南北經驗方

湯氏方人參前胡湯治感冒發熱

前胡壹兩柴胡 半夏湯洗七次黃芩去心人參

桔梗各去甘草炙各半兩○醫方集成各壹錢

右咬咀每服二錢水半盞姜棗煎服一方

治瘧加地骨皮南北經驗方

湯氏方二黃犀角散治大腑醫方集成此下云秘熱袖珍方

類聚書
卷之十七

熱盛

犀角屑 大黃酒蒸○集成 釣藤 梔子

仁 甘草 黃芩各半

右為末看兒大小加減熱湯調服南北經

珍方同

錢氏方地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯

熱

知母 柴胡 甘草 人參 地骨皮

赤茯苓 半夏湯泡各

右為末每服二錢姜五片水壹盞煎八分

溫服醫方集成南北經

南北經驗方

和劑方紅絲散方見驚癇 治夾驚傷寒袖珍方同

省翁活幼口議

大效人參枳實湯治嬰孩小兒傷寒後氣不

和順喘急咳嗽胃膈鬱塞日夜頓悶神困力

乏不思飲食仍療虛痰煩滿頭目昏暈但是

傷風感冷咳嗽並宜服之

枳實肆簡米泔浸去瓢切炒桑白皮半夏湯先七

仍以姜甘草炙白茯苓欵冬花五味

子阿膠麩炒細辛各半兩人參壹兩麻黃去節

苦梗各半兩

才咬咀每服壹小撮水小盞生薑三小片

棗半箇烏梅少許同煎至半去滓通口服

二滓併煎

議曰小兒傷寒作熱頭痛等證或已發散

退熱或已化痰定喘或已安神定志或已

開胃進食兒孩平復父母忘憂喜之甚善

尚有壹證日夜咳嗽多方不愈良由元受

邪氣入肺葉內無能得出不堪吐利何由

而安凡兒傷寒後及感風咳嗽不愈者宜

服此方湯使煎令如法椀盛蓋將口就

吸徐徐服之不過三五次瘳痊此方瀉肺

補氣寬膈化痰滋潤五臟和益三焦不惟

理嗽調中更善

治小兒傷寒後有壹證忽然鼻中出血五七

歲以上至大人亦有此作名紅汗謂不曾解
表其汗出血故從鼻出者自解茆根湯方

生地黄汁 生蜜 酒各小茆根茸搗煎汁如

糖稠

右共煎取一盞相和温服小小半盞立效

永類鈴方

黃芩散治疹豆入眼口乾舌燥忽生翳障

黃芩 黃連 山梔仁炒 升麻 威蕤

蕤仁去殼 甘草炙 等分

右咬咀水煎食後

柴胡散治小兒疹豆眼疼壯熱口乾心煩

北柴胡 黃芩 山梔仁炒 升麻 玄參

麥門冬去心 赤芍藥 粉草炙各 等分

右咬咀每二錢淡竹葉煎食後眼睛疼加

乳香沒藥

地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛赤脉白

膜遮睛散在四邊易治若遽遮黑睛多致失

明及治疹豆入目大人亦可服

生地黄洗 當歸 熟地黄 大黃各乙

精草 木通 白茯苓炒去刺 宣連 防風

生犀角末 木賊 玄參 羌活 蟬蛻

沙苑 茯苓 粉草各乙錢

右細末每半錢長切加減煎猪羊肝汁食

後調

香葛散治傷寒夾食夾驚及四時瘟疫

香附子淨 陳紫蘇葉各二兩 棘皮一兩直指

一兩消食表汗 甘草炙半兩 解肌加粉葛壹兩

右粗末每服三錢水半盞生姜葱白煎半

溫熱服

升麻葛根湯治時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩

疼見活人方壹方加四君湯隨時等分可

代惺惺散

集驗香葛湯

乾葛壹兩 川升麻 羌活 桔梗微炒 白芍藥

川芎 白茯苓 白芷 甘草各半兩

右咬咀每三錢水半盞姜葱煎取半

簡易辛梗湯附惺惺散之下理感風傷風風熱頭痛壯熱鼻涕咳嗽有痰當先用此

人參 乾葛 各三兩 白朮 茯苓 甘草

淨細辛 桔梗 各二兩 柴胡 升麻 各三分

右咬咀每二錢水壹盞姜二片薄荷三葉煎

和劑小柴胡湯治潮熱往來半表半裏服末

愈有裏實證用大柴胡湯或清涼飲洗心

散

濟寮五拗湯治感寒咳嗽痰涎喘急或素有

喘嗽感寒而作和劑華蓋散簡易九寶飲

參蘇飲

和劑人參敗毒散傷寒頭痛壯熱惡寒及風

痰咳嗽或心經蘊熱口舌乾燥加黃芩

人參羌活散散風邪欲傳急驚風熱 方見

活人桂枝麻黃各半湯加黃芩治傷寒可汗

方見 活人 錢氏地骨皮散治傷寒壯熱及虛熱潮作 方見

錢氏地骨皮散治傷寒壯熱及虛熱潮作 方見

諸熱

和劑不換金正氣散治傷寒瘟疫發熱或吐瀉下痢

人參養胃湯治感風寒傷生冷憎寒壯熱如瘧或夾食停痰

和劑天麻防風元驚風壯熱及夾驚傷寒

殭蠶炒全蝎去毒炒天麻煨防風 人參各

兩朱砂 雄黃 麝香各二錢半牛黃壹錢甘

草炙二錢半

右為末蜜元梧子大每三元薄荷湯化下

經驗良方

葛根橘皮湯治溫毒發斑肌肉斑爛癰疹如

錦紋或咳心悶但嘔清汁

知母 甘草 麻黃 杏仁 葛根 橘

皮 黃芩各半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎至六分量大

小溫服

玄參升麻湯治傷寒毒氣不散表虛裏實熱

發於外身班如錦紋甚者煩躁兼治喉閉腫痛

玄參 升麻 甘草 各半兩

右咬咀每服五錢水壹盞煎七分量兒大

小服

大青四物湯治熱病汗下後身熱不除斑出

如錦紋煩躁不得卧

大青 阿膠 甘草 豆豉 各壹兩

右咬咀每服五錢水壹盞半先將大青甘

草豆豉煎至七分後入阿膠再煎令沸量

兒大小加減服

醫林方

麻黃散治小兒冬月傷寒咳嗽者肺之所主也
大抵秋病則實春夏病則虛更有五臟兼見
證更辨虛實若實則面赤心熱飲水身熱痰
涎盛唾咽喉不利喘而面腫吐食者痰勝皆
先補脾後瀉肺可用清肺之藥治之其嗽久
虛則面白喉中有聲唾痰用阿膠散補之

亡津液人參白朮散主之冬月傷寒咳嗽麻黃散主如連聲呷呀咳嗽不絕者

麻黃去節人參三錢杏仁三錢尖微炒皮

右為細末每服一錢水一盞生薑同煎去

滓食後溫服或百部丸者治肺虛補脾是

虛則補其母之法當依方令平胃散中加

半夏生薑製各一兩生薑汁浸餽餅為丸

每服壹二十九食後生薑湯送下又可服

青州白丸子有痰者玉壺丸

玉機微義

治寒之劑

仲景桂枝湯治感冒風寒身熱惡寒自汗

麻黃湯治冒風寒身熱鼻塞寒慄無汗桂

枝麻黃各半湯小青龍湯治感風寒脈緩

發熱腹痛或利理中湯治感寒腹痛方並見大

方科傷寒門

謹按世俗治傷寒多不本仲景初法矧小

兒乎惟近代鄭友端集全嬰方於傷寒多

採其例言桂枝湯自西北二方居人四時
行之無不驗江淮間惟冬及春可行之自
春未及夏已前桂枝證加黃芩壹分謂之
陽旦湯夏至以後有桂枝可加知母石膏
各半兩或加升麻壹分若病人素虛寒者
正用古方不在加減也可謂得其旨趣故
茲寒例與夫變證法並見本論今不詳錄
但以變法壹二附于左

葛根升麻湯

方見升麻湯

右咬咀水煎

按此方陽明藥也世俗用治小兒傷風及
發斑瘡疑似之間者皆用之故口入然亦
須審諦而行之可也故王海藏云活人言
傷寒頭痛如破者連鬚葱白湯次又不已
者葛根升麻湯恐太陽流入陽明用斷其
路故以此湯主之地黃湯內如無犀角以
升麻代之是知陽明藥非太陽藥也人或

初病太陽證便與此湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入陽明不能解也其變可勝言哉故不可不慎之况小兒乎

麻黃黃芩湯 方見無求子活人書

按此太陽例藥也

惺惺散 方見小兒藥證直訣

按此少陰例藥也

東垣麻黃升麻湯治小兒寒鬱而喘喉鳴臍中鳴腹滿鼻流涕脉沉急而數

麻黃 草豆蔻 各壹錢半 益智仁 壹分 厚朴

吳茱萸 各二分 甘草 壹分 歸尾 升麻 麴末

蘇木 各半 柴胡 黃芩 各壹分 紅花 沙 蝎

二筒水半煮取汁再煎

右段咀作二服水煎稍熱服半

按此太陽例藥也然有所兼之證故用是

變法隨證加減之也

衛生易簡方

感冒

治傷寒發熱心煩燥渴用麻黃去節人參川芎芍藥獨活各三分前胡壹分每服壹錢水半盞姜壹片薄荷壹葉煎服

治傷寒發熱自汗虛煩用黃耆一錢白芍藥三錢甘草炙人參熟地黃各半錢每服二錢水半盞煎乳母同服

治時氣或瘡癩發不出用葡萄子生爲末每服一二錢溫酒或米飲調下大效

治傷寒後肌熱咳嗽用柴胡壹錢甘草三分

水半盞煎服

治傷寒發熱如瘧大小便不利用柴胡五分半夏湯洗七次二分黃芩人參甘中炙各壹分水半盞姜一片棗壹枚同煎服

治感冒風濕頭目昏重寒熱往來霍亂吐瀉用厚朴姜製蒼朮泔浸藿香葉甘草半夏陳皮各二分水半盞姜壹片棗壹枚煎服凡四時瘟疫山嵐瘴氣水土者並宜常服

治中暑發渴或作瘧痢用香薷四分白扁豆

炒厚朴姜製各二分黃連一分水半煮煎

沉冷服

治中暑身熱煩渴嘔吐用澤瀉三分白朮猪

苓赤茯苓各分半肉桂壹分水半煮煎服

或為末熱湯調服

傷寒針灸

千金方

治小兒溫瘧灸兩乳下一指三壯

疹痘

論

疹痘

論

聖惠方

真珠散

黃藥散

黃茶散

治小兒胎痘諸方

紫草飲子 胡荽酒 黃蘗膏 蜜蒙花

散 赤茯苓散 犀角散 大黃散

治小兒胗豆瘡後滅癩諸方

滅癩膏

和劑局方

消毒散 消毒犀角飲

小兒藥證直訣

紫草散 蟬蛻散 昇麻葛根湯 四聖

散 藍根散 退陷散 水調飲子 龍

腦膏 甘露飲子 調肝散 三聖散

子肝散 仙退散 紫草散 人齒散

新大全本 藥

甘助道方 正芍州 小柴胡散 四煎

單治小兒瘡疹候

是齋醫方

簡易方

鼠精子湯 拾金散 十四聖散

直指小兒方

瘡疹證治

參蘇飲 惺惺散 升麻葛根湯 化毒湯
 消風散 加味四聖散 紫草木香湯
 紫草木通湯 快斑散 絲瓜湯
 犀角地黄湯 大連翹湯 人參羌活散
 甘露飲 五苓散 小柴胡湯 四順清涼飲
 大如聖湯 鼠粘子湯 麻黃黃芩湯
 桔梗枳殼湯 二陳湯 甘草湯
 烏梅湯 木香理中湯 加味四聖散

獨聖散 宣風散 甘露飲 五福化毒丹
 加味宣風散 調解散 不換金正氣散
 黃柏膏 人參羌活散 豆皮飲 螻蛄散

朱氏集驗方

決明散 浮萍散 蒼朮散 菊花散
 升麻湯 加味四物湯 蟬菊散 四順清涼飲
 子活而散 紫草飲 升麻散 人參散 瓜蒌散

管見大全良方

水解散 竜腦膏子 無比散 如聖湯

决明散 蛤粉散

無求子活人書

麻黃黃芩湯 升麻黃芩湯

東垣試效方

消毒救苦湯 桔梗湯 黍粘子湯

蘭室秘藏

麻黃柴胡升麻湯

人御藥院方

消毒散 無價散

賺得效方

其代瘡疹

參蘇飲 惺惺散 如聖湯 人參羌活

散 香葛湯 三豆飲 紫草飲 加味

四聖散 紫草木香湯 紫草木通湯

快班散 人參羌活散 活血散 薑附

湯 黃芩甘草湯 萬金散 藿香正氣

散 龍腦膏子 加味宣風散 獨聖散
五福化毒丹 人齒散 靈砂酒 犀角
地黃湯 如聖湯 神應膏 加減四物
湯 決明散 羌菊散 蜜蒙花散 決
明圓 獨聖散 決明散 浮萍散 塞
耳丹 消毒加味犀角飲 射干湯 連
翹飲 五福化毒丹 甘露飲 活血散
敗草散 木香散 異功散 白朮散
人參麥門冬散 五苓散 四順清涼飲

大如聖湯 枳殼桔梗湯 二陳湯 理
中湯 豆蔻圓 蘇合香圓 捷效化毒
散 仁蔘飲 木筆花散 滅癩散 蘇
蘭散
澹軒方
豆瘡不透
豆瘡痕
斑瘡變色
肘後方

澹寮方

三豆飲 升麻湯 鼠粘子散 煮萍飲

斷續膏

衛生寶鑑

白菊花散

拔粹方

升麻湯 紫草升麻湯 甘草桔梗升麻

湯 升麻葛根湯 瀉青丸 補肝丸

鎮肝丸 地黃丸 瀉腎丸 導赤散

益黃散 瀉黃散 白朮散 生犀湯

黃龍湯 犀角地黃湯 寶宜風散 通膈

丸 異功散 鯉瀉驚丸 黃耆散 味連翹

散 犀角地黃湯 丁香散 黑金丸

千金潔古老人癡論 命婦 紫雲膏

解毒防風湯 當歸丸 命婦變百祥丸

桃仁承氣湯 生地黃散 地黃丸 紫

草廻癩散 青絲膏 公認 木腰

聖濟總錄

小兒瘡疹

槐白皮湯 青黛散 必勝湯 木通湯

四味散 敗毒湯 四妙湯 發毒散

人參湯 青黛散 奪命煎 浮萍丸

千金散 龍腦散 定命散 紫雪湯

神效散 通神散 丁香散 黑金散

人參丸 神驗散 再甦散 香冲和散

南朱散 解熱丸 棟實膏 川端散

小兒門 二十七

疹豆

瑞竹堂方

痘疹方

葛根麥門冬散 生地黃散 惺惺散

四味升麻葛根湯 木香散 異功散

肉豆蔻元 人參麥門冬散 消毒散

柴胡麥門冬散 射干鼠粘子湯 桔梗

甘草防風湯 人參清膈散 前胡枳殼

湯 雄黃散 麥湯散 四聖散

王氏集驗方

清涼飲子

醫方大成

疹豆

惺惺散 五福化毒丹

南北經驗方

省翁活幼口議

透關散 點明膏

永類鈴方

加減升麻湯

升麻葛根湯

三味桔梗

防風湯

五味前胡枳殼湯

七味人參

白朮散

三味谷精草散

加減異功散

護口膏

調理安班散

四聖散

紅花

湯 大戟散

經驗良方

論小兒痘證及治方

防風通聖散

升麻葛根湯

四君子湯

惺惺散

白虎湯

涼膈散

和解散

如聖湯 安班散 黃芩甘草湯 紫草

飲子 鼠粘子湯 柴胡湯 調胃承氣

湯 麥門冬散 七退散 七味肉苳蔻

圓

醫林方

小兒瘡疹

瘡癩疹輕重論

防風湯 當歸丸 百祥丸 一聖散

犀角散

烟霞聖效方

紅粉散

施圓端效方

救生散 大快班丸 黃連阿膠湯 蟬

青煮肝散 通神散

代神効名方

透耳藥

平山居四要

新効方

外科精義

平和飲子

玉機微義

升麻湯 四聖散 調肝散 化毒湯

鼠粘子湯 活血散 犀角地黄湯 葛

根麥門冬散 連翹散 如聖飲子 解

毒防風湯 真牙湯 無價散 當歸丸

棗變百祥丸 異功散 涼膈散 地骨

皮鼠粘子湯 桔梗甘草粘子湯 桔梗

甘草梔子湯 防風芍藥甘草湯 升麻

加紫草湯 荆芥甘草防風湯 紫草甘

草枳殼湯 連翹防風湯

瘡疹方

抱龍圓 宣風散 地黃散 粉紅丸

括蕁湯 百祥丸 牛李膏 大黃丸

紫草散 小柴胡湯 連翹升麻湯 荆

芥甘草防風湯 升麻加紫草湯 連翹

防風湯 防風芍藥甘草湯 桔梗甘草

鼠粘子湯 桔梗甘草梔子湯 紫草茸

甘草枳殼湯 八正散 導赤散 瀉青

丸 白虎湯 玉露散

壽域神方

衛生易簡方

癰豆

金匱鈎玄

痘瘡

分氣虛血虛治

四物湯

備預百要方

餘藥無名者散見本方

禁忌

疹痘一

聖惠方

治小兒疹豆瘡諸方

夫嬰孩患疹豆瘡子者皆是積熱在於藏腑
蒸鬱熱毒散於四肢小兒皮肉嫩弱多成此
疾凡食乳嬰孩湯藥不可與童兒同療則藥
過劑必有損也蓋由飲啜熱乳在於藏腑熱
極方成此疾腑熱生於細疹藏熱生於豆瘡
若用湯藥宜療於乳母也又絕乳嬰孩患者

由積熱伏在於脾肺之間而不早以湯藥療於病源養熱行於四肢營衛之中漸透於皮表成疹豆而乃出於膿水也嬰兒之性自然陽盛而陰微也藏腑陰陽氣逆大小便多秘不通也纔覺是此疾即可便與踈利即輕患也若疹豆已出即不可踈轉若疹豆出定却宜利大小腸按扁鵲及倉公論云療於嬰孩服以湯散性有可餌之者不可餌之者宜先和節陰陽調治營衛方利藏腑即熱氣漸解

也凡絕乳嬰孩生於疹豆或未出已前是此疾候按扁鵲論云可先以油劑服之行解四肢熱極或疹豆已出不可以油可服平和湯藥療於肝藏解於敗熱慮熱毒攻肝後衝於眼目生於障翳令覩時醫及疾患之家疹豆未出已前多是誤認疾候皆以他藥解之其間或餌以躁藥或餌以冷藥不無夭傷時醫用藥直候瘡疹子出病家方覺患者住餌醫者拱手已患之後俗多禁餌致大小便不通

不能調於湯藥和於臟腑遂停敗熱在於臟腑之間攻於肝藏胎豆纔愈致令衝於眼目成於障翳不過醫治瞳人遂損因茲無所見也

和劑指南

論小兒疹豆證

小兒患瘡疹其證乍熱乍涼呵欠煩悶咳嗽噴嚏耳鼻冷及脚冷但只惡熱不惡風渾身熱甚者或發搐或不搐一向發熱者此乃痘

疹證也可與升麻葛根湯惺惺散消毒犀角飲已瀉者不可與它藥只服惺惺散

小兒藥證直訣

瘡疹候面燥腮赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽噴手足稍冷夜卧驚悸多睡並瘡疹證此天行之病也惟用溫涼藥治之不可妄下及妄攻發受風冷五藏各有壹證
肝藏水疱 肺藏膿疱 心藏斑 脾藏疹 歸腎變黑 惟斑疹病後或發癩餘瘡難發

癩矣木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚丸
溫驚用粉紅丸 小兒在胎十月食五藏血
穢血穢生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五
藏之液肝生淚肺主涕心主血脾爲裏血其
瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青
小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主
心血色赤而小次於水疱脾爲疹小次斑瘡
其主裏血故色赤黃淺也涕淚出多故膿胞
水疱皆大血營於內所出不多故斑疹皆小

也病疱者涕淚俱少譬疱中容水水去則瘦
故也 始發潮熱三日以上熱運入皮膚卽
發瘡疹而不其多者熱留膚腠之間故也潮
熱隨藏出如早食潮熱不已爲水疱之類也
瘡疹始出之時五藏證見惟腎無候但見
平澀耳聾涼耳涼是也聾耳俱屬於腎其居
比方主冷也若瘡黑陷而耳聾反熱者爲逆
也若用百祥丸牛李膏各三服不愈者死病
也凡瘡疹若出辨視輕重者一發便出盡者

必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫瘡疹方陷睡昏汁出不止煩燥熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風冷必歸腎而變黑難治也有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下更看時月輕重大抵瘡疹屬陽出則爲順故

春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又常辨春膿疱夏黑陷秋斑子冬疹子亦不順也雖重病猶十活四五黑者無問何時十難救壹二其候或寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒不已身冷出汗耳聾反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾生勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下下則內虛多歸於腎若能食

而痲頭焦起或未焦而喘實者可下之 身
熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐
此當利小便不差者宣風散下之若五七日
痲不焦是內發熱熱氣蒸於皮中故瘡不得
焦痲也宜宣風導之用生犀磨汁解之使熱
不生必着痲矣 瘡疹由內相勝也惟斑疹
能作瘡疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來
勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不
安因搖成癩班子爲心所生心生熱熱則生

風風屬於肝二臟相搏風火相爭故發瘡也
治之當瀉心肝補其母括婁湯主之 瘡黑
而忽瀉便膿血并痲皮者順水穀不消者逆
何以然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾
藥脾氣得實腎雖用事脾可制之令瘡入腹
爲膿血及連痲皮得出是脾強腎退卽病出
而安也米穀及瀉乳不化者是脾虛不能制
腎故自洩也此必難治 傷寒瘡疹同異傷寒男體重而黃女面赤喘

急憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則顯赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發散之治疹行溫平有大熱者解毒餘見前說瘡疹有悞睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍元三服李以藥下之李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疾始出未有化證不可下也但當用平和藥類與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或

或出不快卽微發之發之不出卽加藥加藥不出卽大發之如大發後 及脉平無證者卽瘡本稀不可更發也有大熱則當利小便小熱者當解毒若出快勿發勿下故止用抱龍丸治之瘡痴若起能食者大黃丸下之瀉一二行卽止今先下壹日瘡疹未能出盡而稠密甚則難治此悞也縱得安其病有三者瘡二者癰三者目赤李不能治經三日黑陷復召錢氏錢氏曰幸不發寒而病未困也

遂用百祥元爲藥以牛李膏爲助各壹大服
至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎
也腎旺勝脾土不剋水故脾虛寒戰則難治
所用百祥元春以瀉膀胱之腑腑若不實臟
自不盛也何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉故
二服不效卽加寒而死

熱傳瘡疹四文

瘡疹方四大王宮五太尉因墜鞦

韃發驚搐醫以發熱藥治之不愈錢曰本急
驚後生大熱當先退其熱以大黃圓玉露散

惺惺圓加以牛黃龍射解之不愈至三日肌
膚尚熱錢曰更二日不愈必發斑瘡蓋熱不
能出也佗醫初用藥發散發散入表表熱而
斑生本初驚時當用利驚藥下之今發散乃
逆也後二日果斑出以必勝散治之七日愈
瘡疹標本睦親官按粹方瘡疹方作官十太尉病瘡疹
衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言謂
按粹方瘡疹方作胃大熱一醫言傷寒不退竟醫言在
母腹中有毒錢氏曰若言胃熱何以乍涼乍

熱若言母腹中毒發屬何臟也鑿曰在脾胃
 錢曰既在脾胃何以驚悸鑿無對錢曰夫胎
 在腹中月作瘡疹方至六十拔粹方則已成形
 食母穢液入兒五臟食至十月滿胃腕中至
 生之時口有不嚙產母以手拭淨則無疾病
 俗以黃連汁壓之方下臍糞及涎穢也此亦
 母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒入而
 成瘡疹未出五臟皆見病證內一臟受穢多
 者乃出瘡疹初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍

涼乍熱手足冷面腮燥赤咳嗽時嚏此五臟
 證具也呵吹拔粹方頓悶肝也時發驚悸心
 也乍涼乍熱手足冷脾也而目顯頰赤咳嗽
 肺也惟腎無候以在府下不能食穢故也凡
 瘡疹乃五藏毒若出歸壹證則肝水疱肺膿
 疔心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸毒瘡黑
 者屬腎山不慎風冷而不飽內虛也又用抱
 童丸數服愈以其別無他候故未發出則見
 五臟證已出則歸壹臟也拔粹方海藏云木
先因微寒入壹句

并由不慎風冷而不飽內虛壹句勿認作寒證當識用抱龍丸即知癩疹多熱也

小兒耳冷鼈冷手足乍冷乍熱面赤時嗽時
嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服昇麻
葛根湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽
酒黃蘗膏暑月煩燥食後與白虎湯玉露散
熱盛與紫雪咽痛或生瘡與甘桔湯甘露飲
于餘依錢氏說大人證壹無證乙一同小兒
多因受惜過當往往三兩歲未與飲食致脾
胃虛弱平生多病自半年已後宜煎陳米稀

粥時時與之十月以後漸與稠粥爛飯以助
中氣自然養少病惟忌生冷油膩甜物等
小兒治法大槩與大人同惟劑料小耳如昇
麻葛根湯惺惺散等雖人皆知之倉卒亦難
檢今並載于下錢氏已有方者今不復錄
直指小兒方

瘡疹方論

小兒瘡疹大抵與傷寒相類癘熱煩燥臉赤
唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰

涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為竄眼禁牙驚搐如風之證或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀瘡從口腹中山故痛或為煩燥狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷骹冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與骹足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之

間或中或否不若視其耳後有紅脉赤縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已如欲解肌乾葛紫蘇可也其或小兒氣實煩燥熱熾大便秘結則與犀角地黃湯人參敗毒散輩或紫草飲多服亦能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與參蘇飲為當虛者益之實

者損之冷者溫之熱者平之是為權度借喻
 而言亦如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟
 妄汗則榮衛既開轉增瘡爛如苟妄下則正
 氣內脫變而歸腎身體振寒耳靴反熱眼合
 肚脹其瘡黑壞十無壹生舌黑者何者瘡隨
 五臟有證未發則五臟之證悉具已發則歸
 於膏臟受毒多者見之故肝臟水疱淚出如
 色肺臟膿疱其涕稠濁心臟發斑血疱色
 青肺臟膿色白而大臟發疹赤而小脾
 臟發疹色黃微赤惟歸腎則變而黑焉青紫

瘡疹屬陽本無腎證腎在腑之下不陽取火
 也腎取水也以吹用事為水所制豈不殆哉
 然則欲救黑瘡將何如曰先瀉膀胱而後急
 瀉脾是爾錢氏云黑陷青紫者百祥圓下之
 不黑者謹勿下余知其所下者瀉膀胱之邪
 也小兒腎主虛不可瀉但瀉膀胱以虛其府則腎邪去矣又云下後身
 熱氣瀉欲飲水者可治水穀不消或寒戰者
 為逆余知其脾强者土可以制水也百祥圓
 太峻當以宣風散代之瀉後瀉脾則人參茯苓

苓白朮等分厚朴木香甘草各半爲妙蓋瘡
發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不
可消勝已泄之腎水平此錢氏不刊之秘旨
也雖然瘡黑本爲惡證治之有方猶有幸而
生者至於調衛之際乳母不能謹口流毒於
小兒或粥乳不時使之飢虛或衣被不週致
傷風冷以至闔房有觸外邪有忤則亦冰硬
變壞而歸於腎自我致寇又誰咎耶能調衛
者以溫散湯劑釀乳蔭之謹護風寒使之氣

體和適其於粥餌則勿令飽而氣實飢而內
虛斯得矣此尤在瘡家垂意焉

瘡疹備論

瘡疹之論秦漢以來其詳可得聞也粵自扁
鵲倉公作古以爲嬰孩湯散當先和節陰陽
調治榮衛方利臟腑卽熱氣漸解而黃汲張
洵初虞世栖真子諸醫認贅爲嫡每曰瘡疹
諸候初覺卽疎利之以宣其毒又曰已出者
不可疎利瘡出已定却用利之余竊惑焉蓋

嘗深索古書之意見其諄復持重不直曰利
臟腑而必以和陰陽調榮衛先之則知古人
所謂利者暢達流行之謂而非勇決峻下者
比也如曰已患之後俗多禁餌大小便不通
不能調湯藥以和臟腑遂停敗熱於其間是
古人之利大小便不過調劑以和之而已如
曰已出者可服平和湯藥療其肝臟解其敗
熱以防熱毒攻眼是其解熱又曷嘗不用和
平之劑乎然則破諸家似是之非開後世未

明之惑惟錢氏直訣朱氏活人書其說爲甚
正錢氏療瘡疹證候惟用溫涼藥治之不可
妄下及妄攻發朱氏曰瘡疹已發未發但不
可踈轉此爲大戒又曰瘡疹首尾皆不可下
輒用利藥卽毒氣入裏殺人以此觀之瘡疹
證狀雖與傷寒相似而瘡疹治法實與傷寒
不同傷寒所傳從表入裏瘡疹所發從裏出
表蓋毒根於裏若下之則內氣壹虛毒不能
出而返入焉由是土不勝水黑陷者有之毒

發於表若汗之則榮衛虛重令開泄轉增
瘡爛由是風邪乘間變證者有之汗下二說
古人所深戒也調解之法將何如曰活血調
氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得兼
而已溫如當歸黃耆木香輩涼如前胡乾葛
升麻輩佐之以川芎芍藥枳殼桔梗羌活木
通紫草甘草之屬則可以調適矣繼自今小
兒升覺身熱證似傷寒但未經瘡豆疑似未
明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散輩

熱甚則與升麻葛根湯人參敗毒散瘡豆已
出則少與化毒湯出不快者加味四聖散紫
草飲子紫草木香湯紫草木通湯或快斑散
絲瓜湯出太盛者人參敗毒散犀角地黄湯
小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓
散大便秘結內煩外熱者小柴胡加枳殼湯
或小小四順清涼飲咽喉痛者大如聖湯鼠
粘子湯喘滿氣壅者麻黃黃芩湯胃腹脹滿
者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯煩渴者甘草

散烏梅湯下痢嘔逆者木香理中湯甘草乾
 薑湯幼兒泄利稠者米泔用匙送下未可與乳陷入者加味四聖
 散更以葫荽酒薄傅其身厚傅其足噴其衣
 服併以厚絁蓋之若猶未也獨聖散入麝香
 老酒調劑或不用酒則木香煎湯若其瘡已
 黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之然而瘡
 疹用藥固有權度大便小便不可不通其有
 大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與
 湯劑但少用化毒湯可也大小二腑一或閉

焉則腸胃壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄
 眼閉聲啞肌肉蠶然不旋踵而告變矣凡小
 兒先發搐而後發瘡者生瘡已瘥而後發風
 或吐或瀉者死先發熱自利而後瘡出者存
 瘡已發而後泄不止者亡瘡黑而忽瀉膿血
 痂皮者順腹中有瘡也瀉血而水穀不消者逆脾胃
 也虛或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救也胃爛要
 之陽明主肌肉胃氣不可一日而不強也世
 俗無知每見瘡疹不論男女稟受虛實槩用

胡荽酒以傅其身酒麪毒物以充其腹猥曰
使瘡出快其間兒氣素怯或遇天時陰寒猶
可扶之而無恙設若春夏之間陽氣發越或
兒氣素強酒麪助虐則以火濟火胃中熱熾
毒蓄血聚瘡山愈難亦或爲之黑陷當此之
時能用紫草煎湯入生猪尾血和腦子少許
以解之猶可措手或者更與熱毒之物遂使
咽喉結閉耳目口鼻腫滿悉平大便秘堅小
便出血而死矣又或妄施巴粉取積之劑則

臟氣暴脫熱又不除邪氣愈甚變爲喘滿便
血癰爛破裂而死矣吁自詒伊阻如是其可
畏哉雖然瘡亦有再發者特間有之瘡皮厚
而色頑濁者發於臟其候重瘡皮薄而色精
明者發於腑其候輕臟熱則爲豆瘡腑熱則
爲細疹熱重者瘡亦重熱輕者瘡亦輕平復
以還消解餘毒甘露飲參蘇飲人參羌活散
輩常須與之否則敗熱留滯肌肉之間亦令
凹者再發或癢黑而不變猶更飼之以毒必

致發癩患痢腮腫鼻衄眼翳之患瘡爛成片者黃牛糞乾傅膿多痛甚者乾淨黃土爲末傳之瘡遍口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸清黃栢取汁啖之爲愈凡瘡欲成痂類以而油乳酥清蜜潤之可揭卽揭血出無害若乾硬已久必成癍痕如茶如醋如猪肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必爲之點慘然而瘡痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也葫荽酒能辟惡氣左右

所不可無或蒼朮降真用之亦可瘡曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平復如舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出爲甚易若實實虛虛損不足而益有餘則瘡出爲甚難調解之法無以逾此故備論之以解世俗之惑云脉證于後

瘡疹證候

瘡疹證候面色燥臉唇赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳尖冷髑冷鼻冷身熱或乍

涼乍熱頭痛腰脊痛咳嗽噴嚏呵欠煩悶搖跳驚悸昏昏多睡小便赤少大便不通不惡寒惟惡熱方其身熱未即發瘡迨其身涼然後發出 三部脈洪數往來大小不應指而疾

壞瘡治法

一曰內虛泄瀉二曰外傷風冷三曰變黑歸腎蓋內虛泄瀉者或因臟腑虛怯其證已滿初發以來自然作瀉或未發之前誤服涼藥

以致泄下凡此者其瘡不發每形見小點淡紅而白或白而微黃如水泡之狀治之當用參苓白朮散南木香煎湯調下先與止瀉然後以溫和之劑發之外傷風冷者或因煩燥惡熱出頭露面點點方萌遽爲風冷所折或瘡出如珠妄與解脫以取涼快而風冷襲之凡此者輕則其狀如螯色紅而不發重則陷如石巨脚色白而冰麤治之當溫血散寒邪用不換金正氣散加川芎若惡寒隈人更加

官桂紫蘇然後與發瘡之劑或內虛泄瀉或外傷風冷荏苒經日胃氣虧損由是而變壞焉故令耳聾反熱其瘡青紫變黑此則腎證曉然矣蓋腎屬北方水是以其色黑其證逆治法先瀉膀胱之府而後急與溫脾若其瘡不黑則斷非腎證謹不可下請詳審之瀉膀胱法先用桂枝芍藥大戟等分爲末每服寺錢棗湯調下次用宣風散一錢加青皮煎服若瀉下惡物急以溫脾湯劑繼之瘡豆爲

陰邪穢氣所傷令變壞可用醋炭蘇合香圓解之

論升麻葛根湯

升麻葛根湯按和劑方瘡豆已發未發者皆可服世俗習爲常談不問小兒虛實冷熱自首至尾率多用之甚者方發而不快既發而復陷亦以升麻湯爲常用之劑其爲害可勝嘆哉何者葛根解表升麻差寒小兒氣盛熱多服之猶可以消毒萬一內虛胃弱則以水

濟水寧不虧損胃氣冰凝血脈而瘡疹轉爲
之逆陷乎夫古人所謂未發者方身熱尚疑
似之時也所謂已發者既透徹欲成痂之候
也曷嘗以發而不快與發而復陷爲可用升
麻哉若不辨明殆恐世俗相傳枉死者半矣
又况人之齒牙大熱大毒或者相習變陷不
透者不問虛實一槩用之其害又有甚於妄
用升麻之不審也蓋瘡豆變陷有因外感風
寒而壓之者治法則當解散寒邪有內氣太

實榮衛不得調暢而出不快者治法則當流
行氣脈安可槩曰冰冷直川人牙遂使小兒
服之鬱悶聲啞迨其發出稠疊異常往往訟
此而不救矣曷不用紫草黃耆川芎甘草輩
爲愈哉

瘡疹惡證

瘡疹屬陽春夏爲順秋冬爲逆冬月寒盛腎
水得時多歸於腎或先如瘡後發渴其瘡色
如黯血此腎證也不治 春膿疱爲金尅木

夏黑陷爲水尅火秋斑子爲火尅金冬疹子爲土尅水並逆 舌黑或鼻有黑氣並不治 瘡已出而譫語者爲惡證 燥渴小便澀泄瀉不入食不治 瘡成餅搭黯慘不發其聲 焦啞不治 兩眼閉而黑睛濛昧無塊不治 而腫鼻陷目閉頻嚙齒者不治 頭面腫大瘡盡爪破或臭不可近或脚冷至膝前不治 瘡小黑而焦風攻頤頰唇項腫硬或胃高而突並不治 小兒諸病但見兩眼無精

光黑睛無運轉日睫無鋒芒如魚眼猫眼之狀簡簡不治或神藏於內但外若昏困者無妨其有病篤而眼中神氣不脫者猶可以活 眼者五臟六腑神氣之所萃神氣已脫脉雖僅存亦未能保 三因方 斑瘡證治 夫斑瘡病內經與張仲景皆不載尋據方論蓋自魏朝方有以白頭赤根者俗呼爲豌豆

卽班瘡也細粟如麻者俗呼爲麻卽膚疹也
又有大者俗呼爲羊爲萍此皆輕重之不齊
故命名異耳百問云悔不得轉利以瘡疹發
於表利之則毒氣入裏龐安常云身疼壯熱
須少解散藏閉毒攻非利不愈必令汗下初
虞世亦云瘡疹發於肌肉屬陽明古人治法
皆以承氣湯利之諸說矛盾不無疑誤令皆
存之要當分其未發已發爲治若其始發必
作寒熱如傷寒狀方證所載耳冷尻冷痰嗽

者皆瘡疹證又小兒初得手足搐搦如風癩
者亦瘡疹候便可與宣熱拔毒必須利之千
金治豌豆瘡初發欲發者單煮大黃服之卽
明文也若其已發只須解肌用升麻紫草昔
是也如是分之諸說自泮又此病多因傷寒
失於汗用或時氣勝復歲主客氣及天行疫
病長幼相染者當隨因辨證治之其間惟倒
屨敢危宜早爲治
朱氏集驗方

疹豆勸戒文

一小兒疹豆蓋因在胎時食母血穢生下口有餘而生婆取去不盡啼發聲則入腹遇天氣溫熱搏動而發所以大小皆須壺出若遇久晴暄暖間有病此其未病者可預服三豆湯能令不發

一此乃熱病熱極生風或發驚搐但當通心散熱切不可投冷驚藥及著艾炷灸則火助熱熾投冷驚藥則毒氣內伏反爲大害

一人多用升麻飲然當明其已發未發之說方其身熱昏睡皮膚無迹疑貳之間謂之未發及其結痂有諸般熱證謂之已發此二證可服亦不可多若纔有形迹及瘡未乾謂之正發則不可服蓋升麻性冷比犀角服多必致陷伏動臟腑况未必有穿者

一最忌諸般臭穢煎炒油烟父母行房等犯觸未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜禁戒仍燒帶

諸香及打醋炭以防之不可以田舍兒不忌
為常法

一醫書有飲酒法為天寒氣怯者設若天熱
氣旺則不宜飲飲多則發瘡班爛大渴泄瀉
本草云酒乃醞釀而成有大熱毒此是熱毒
病豈可又飲熱毒物

一病此者多不服藥豈知未敢已發則合解
散正發則合活氣血若依此非惟出疎亦易
乾斂仍免後慮若不依此則邪盛瘡密收亦

費力餘毒為患致便生血癰疽疥癩赤眼咽
喉口瘡之類

一病若經曰請醫至常先說病源然後診視
庶無差失東坡言之詳矣醫家亦當遵活人
書未診先問之說况此病腥臭其旨詳視者
幾何人哉克鶴家世講習療病垂三十年熟
視此弊今撮方書要法以為勸使無夭枉之
失幸矣廬陵范克鶴伯英施其書

管見全良方

小兒瘡豆證治

凡小兒患瘡豆者其證乍熱乍涼呵欠煩悶咳嗽噴嚏耳鼻冷及脚冷但只惡熱不惡風渾身熱甚者或發驚搐或不搐一向發熱者此乃瘡癰證也可與升麻葛根湯惺惺散消毒犀角飲若已自利者只可與惺惺散不可與他藥詳見前書至若小兒患瘡豆者無求子活人書

小兒瘡疹與傷寒相類頭疼身熱足冷脈數

疑似之間只與升麻湯緣升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可踈轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣又云瘡豆已出不可踈轉出得已定或膿血太盛却用踈利亦非也大抵瘡疹首尾皆不可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥即毒氣入裏殺人但與化毒湯紫草木通湯鼠粘子湯出得太盛即用犀角地黃湯

解之若瘡豆出不快煩躁不得眠者水解散
麻黃黃芩湯升麻黃芩湯活血散主之黑瘡
倒壓猪尾膏無比散竜腦膏子無不驗也若
熱毒攻咽喉痛如聖湯瘡豆入眼決明散撥
雲散蜜蒙花散通聖散蛤粉散主之治瘡疹
之法無出此矣升麻湯方見傷寒治傷寒中風頭
痛增寒壯熱支體痛發熱畏寒鼻乾不得睡
兼治小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治
寒暄不時人多疾疫乍暖脫著及暴熱之次

忽變陰寒身體疼痛頭重如石

犀角地黃湯

方見傷寒

治傷寒及溫病應發汗而

不發汗內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有
餘瘀血而黃太便黑者此方主消化瘀血兼
治瘡疹出得大盛以此方解之

傷寒百問歌

小兒瘡疹歌

小兒瘡疹類傷寒已發未發疑似閒身熱足
冷脉且數只與升麻無不安瘡疹首尾下最

忌輒用利藥毒入裏咳嗽身熱尻耳冷化毒
湯中加糯米心煩眼赤鼠粘湯紫草木涌亦
其次黑瘡倒靨候最惡毒入藏時人必死治
法無如猪尾膏入腦同研調用水若加狂躁
氣喘急妄語有時見神鬼此證當須龍腦膏
得睡心神應定矣瘡雖已發却陷伏若欲透
肌用無比散無比散 瘡瘡未出煩不昏出後仍兼
熱在體先冷浴罷服水解得汗利時當自己
春夏應須去大黃強實人增至二匕升麻苓

與二黃湯升麻黃芩湯活血服之當痛止活

散毒攻咽痛如聖湯入眼蜜調决明是散

撥雲通聖蜜蒙花蛤粉煎煉能去翳撥雲散

蜜蒙花散通聖散 蛤粉散 大盛只進犀地黃瘡疹之法無出

此

儒門事親

小兒瘡疱丹燦癰疹舊蔽記

兒之在母腹也胞養十月蘊畜濁惡熱毒之
氣非一日及歲年而後發雖至貴與至賤莫

不皆然輕者稀少重者稠密皆因胞胎時所感濁惡熱毒之氣有輕重非獨人有此疾凡胎生血氣之屬皆有蘊畜濁惡熱毒之氣有壹二歲而發者有三五歲至七八歲而作者有年老而發丹燦癢疹者亦有傷寒中溫毒而發斑者亦有陽毒發斑者斑有小大色有輕重大者爲陰小者爲陽均是熱也但色重赤者熱淺色輕赤者熱深凡治者輕者因而揚之重者因而減之內經曰少陽客勝則丹

疹外發及爲丹燦手少陽者三焦少陽相火也啓玄子云是五寅五申歲寅申之歲卽少陽相火司天故也他歲亦有之但內經獨明瘡疹者少陽相火之所爲也俗呼曰癩疥傷寒此言却有理爲此證時與傷寒相兼而行必先發熱惡寒頭項痛腰脊強從太陽傳至四五日燦疹始發先從兩脇下有之出於脇肋次及身表漸及四支故凡小兒瘡疱丹燦癩疹皆少陽相火客氣勝也內經曰諸痛痒

瘡瘍皆屬心火豈有寒乎故治瘡瘍與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡疱之候也其脈息皆浮大而有力亦與傷寒時氣胃風驚風宿乳一槩難辨宜先解之有二法遇亢陽炎熱之時以辛涼解之遇久寒凝冽之時以辛溫解之辛涼之劑者涼膈通聖之類是也辛溫之劑者升麻葛根之類是也此二法慎勿互用之既用此二法之後次以白虎湯加人參冷服之勿輟蓋防瘡

疹發喘喘者必死人參止喘故也或云立秋之後不宜服白虎湯者非也假如秋深發瘡瘵者中暑而得之白虎大解暑毒既有白虎湯豈可問以秋冬乎瘡疱癰疹丹爛皆是火之用也是肺命之不及也故曰白虎湯加人參一日不可闕也瘡疱燥疹或出不均大小如豆黍相雜見其不齊也相天之寒溫以蠅殼燒灰抄半字或一字以淡酒調少許飲之大人以淡酒溫調之不半日則均齊如或

用百祥丸紫草飲子皆可服之俗以酒醋薰之者適足增其昏瞶耳至六七日疱疹出全可調胃涼膈下之同調理傷寒法或言瘡疱首尾俱不可下者此朱奉議公之言也適足使人戰戰兢兢而不敢用藥也錢仲陽之用百祥丸其間有大戟豈奉議公獨不見耶自奉議公斯言一出死者寒路矣予家其親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎湯加人參涼膈散加當歸桔梗連進數服

上灌下泄晝夜不止又使睡卧於寒涼之處以新水灌其面目手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方爲瘡疱外潘沃以冷水使陰氣循經而入達於心肺如醉得醒是亦開昏破鬱之端也如此救活者豈啻千數夫瘡疱黑陷喘而滿者十死八九若依此法尚能活其六七何世醫與病家至今猶未悟也近年予之症隣于蔡河來往之舟常艤於此一日舟師偶見敗蒲壹束泐流而下漸迫舟次

似聞啼聲而微舟師疑其人也探而山之開
視之驚見壹兒四五歲許瘡疱周匝密不容
隙兩目皎然飢而索食因以粥飽其舟師之
妻怒曰自家兒女多惹瘡疱傳染奈何私料
此兒必蔡河來其流緩必不遠持兒一鞋逆
流而上徧河之人皆曰無此兒行且二十里
至一村落舟師高唱曰有兒年狀如許不知
誰氏瘡疱病死棄之河中今復活矣聞酒邸
中飲者誼譁有人出曰我某村某人也兒四

五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣
曰真吾兒也奔走來視驚見兒活大慟流涕
拜謝舟師喜抱兒歸今二十余歲矣此兒本
死得水而生伏諗來者瘡疱之疾熱耶寒耶
經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火啓玄子注云心
寂則痛微必燥則痛甚百端之起皆自心生
瘡疱之疾豈有寒歟余承醫學於先人閱病
多矣苟誑後人罪將安逃誠如此法則原上
之丘以瘡疱而死者皆誤殺之也故療小兒

惟錢仲陽書中可採者最多但其方為閭孝
忠所亂有識者宜擇而取之
十形三療

疱後嘔吐

河間劉光濟之子纔二歲病疱後嘔吐發昏
用丁香荳蔻之類不效適麻先生寄其家乃
謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從
乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻
先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡疱張戴

人用之如神况內經言少陽所至為嘔涌少
陽者相火也非寒也光濟欣而從之比日利
二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡
疱首尾不可下麻自悔其多言葉也已然始
待之比至食時下黃涎壹合日午問之兒已
索遊于街矣

治法雜論

二火類

凡小兒瘡疱癰疹麤瘡丹爛等疾如遇火運

勝時熒惑亂行之者不可便用升麻散解之
升麻湯味辛性溫內經曰積溫而成熬是謂
重火止可以辛涼之劑解之如遇平者以可
辛溫蓋平者無事便同水化然而更宜審察
病甚者亦不可以辛溫但發散之後便以涼
鬲加當歸及白虎湯玉露散煎服之更甚者
解毒湯調胃散下之古人云癩疹瘡疔首尾
拘不可下皆悞矣豈不聞揚湯止沸不如抽
薪內經曰五寅五申之歲多發此病者蓋明

相火之所爲也又曰少陽客氣勝丹疹外發
又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火主太關又謂百
端之起皆自心生豈可便用辛溫發散乎致
熱勢增劇漸成藏毒下血咬牙發搐大熱明
矣如白虎湯加人參涼鬲加當歸桔梗勿問
秋冬但見瘡疹用之神良
凡小兒瘡疱癰疹癩瘡丹燦斑毒之後藏毒
下血內經曰少陽客氣勝則丹燦瘡疹發于
外也蓋餘熱不解故臟毒下血治以黃連解

毒湯自虎湯涼隔散臨證選用而用之所謂自
虎舊說秋冬勿用皆誤也但有此證使用之
蓋其證屬相火故也大人亦同
凍垣試效方

癩疹論

夫癩疹如出之證必先見而燥腮赤目胞亦
赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴足稍令多
睡睡驚並瘡疹之證或生膿胞或生小紅癩
或生癩疹此三等不同何故俱顯上證而後

乃出蓋以上諸證皆太陽寒水起於右腎之
下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上
頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上
故顯是證蓋壬癸寒水剋丙丁熱火故也諸
癩證皆從寒水逆流而作也醫者當知此即
乃取用藥失胞者一名赤宮一名丹田一名
命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為
生化之源非五行也非水亦非火此天地之
異名也象坤土之生萬物也夫人之始生血

海始淨壹日二日精勝其血則爲男子三日
四日五日血脈已旺精不勝血則爲女子乃
二物相搏長生先身謂之神又謂之精道釋
二門言之本來面目是也其子在腹中十月
之間隨母呼吸母呼亦呼母吸亦吸呼吸者
陽氣也而生動作滋益精氣神飢則食母血
渴則飲母血兒隨日長皮肉筋骨血脈形氣
俱足十月降生口中尚有惡血啼聲壹發隨
吸而下此惡血復歸命門胞中僻于壹偶伏

而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下溜合
於腎中二火交攻營氣不從逆於肉理惡血
乃發諸癩疹皆出於膀胱壬水其瘍後壞肉
理歸於陽明故三番癩始顯之證皆足太陽
壬膀胱剋丙小腸其始出皆見於面終歸於
陽明肉理熱化爲膿者也二火熾盛反勝寒
水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也當
外發寒邪使令消散內瀉二火不令交攻其
中令濕氣上歸復其本位可壹二服亦已仍

令小兒已後再無二者癩出之患此內經之

法覽者詳之令諸部內為二火不令交氣

蘭室秘藏

辨小兒癩證呵欠噴嚏入睡中發癩疹

急驚風或耳尖冷眼澀拔粹

或辨復食拔粹方瘡疹方口熱或口澀氣

姪辨不消或腹中痛

澹寮方

班瘡

瘡頭白而根脚赤者俗呼為豌豆即班瘡也

此證發於臟故重水細粟如麻俗呼為麻子

豆者發於腑故輕即膚疹也又有大者俗謂之芋謂之萍皆輕

重之不齊故命名各異內經與仲景皆不言

此證自魏朝方論始有之百問云慎不可轉

利以瘡發於表利之即入裏龐安常云身疼

壯熱雖少解散藏閉毒攻須少利之初虞世

亦云瘡疹發於肌肉屬陽明宜以承氣湯利

之諸說予盾如此可不審之歟要之大腑閉

方可利下疑二之間只當與升麻湯參蘇飲也重者不可喫冷藥冷藥滯其氣血漸有倒靨之慮身熱時未出身涼方出初發則熱如傷寒而異於傷寒者不惡風惟惡熱身冷尻冷咳嗽噴嚏亦有不如此者或發搐搦如癩之狀乃其證也又脣紅眼赤咽喉及胃脘緊痛口舌腹中亦痛亦此證也俱當詳悉而辯問之否則不能不誤事介

拔粹坊

海藏老人癩論

夫癩之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣既盛正氣又王邪無所容或因天冷或因傷表或因傷裏癩由是而生焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其癩自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執膏為哉

大抵傷寒同治最爲高論隨經用藥不可闕也假令五日已裏諸病與癰疹不能別辨者不可疑作癰疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨癰出若強發之其變不可勝數矣前人言首尾俱不可下者何也曰首不可下者爲癰未顯於表下則邪氣不得伸此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者爲癰毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切裏證下之則癰氣逆陷故禁尾不

可下也有如所言溫煖蓋覆不令通風以其癰未出或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫煖蓋覆不令通風也癰若已出身熱天暄何必用蓋覆而不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令通風不知天令之所加人身之所感致使悞人多矣大抵前人之言隨時應變以其所可者而言之後人不知其變故執常而不移也噫首尾俱不可下者以其始終藏府元無凝滯也若有一切

裏證及大便結者安得不下溫煖不使之通
風以其發在冬時故如此也若發在夏時癱
雖未出亦不用於此也癱之用藥大率以脉
爲主浮中沉之診平舉按之候察其虛實定
其中外則可以萬全矣
未顯癱證所用之藥
外傷升麻湯主之
內傷枳實丸主之
大便
便溲者枳朮丸主之
若傷冷者溫之神應
丸主之
惡寒者發之宜防風蒼朮湯
表

大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛則
氣必上行言奪者治法不令上行也
渴者
清之大渴者白虎湯小渴者涼膈散
大便
秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲
子選用藥其在氣在血
小便不通者利之
導赤散八正散之類當求上下二焦何經而
用之驚者安之涼驚丸重者瀉青丸
泄者
分之寒則吳功散四君子湯熱則澤瀉茯苓
湯

已顯癩證所用之藥

出不快 風化毒湯 犀角地黃湯 地骨皮鼠粘子湯
咽不利 八桔梗甘草鼠粘子湯 二味附子湯
煩者 枳梗甘草梔子湯 小劑不取苦味
肺不利 不紫草茸甘草枳殼湯 附子紫葛湯
太陽出不快 白荆芥甘草防風湯 羌活
陽明出不快 升麻加紫草湯 升麻
少陽出不快 連翹防風湯 升麻

四肢出不快 防風芍藥甘草湯

瘡疹輕重候

凡出未而發痛者是外感風寒之邪內發心
熱之所作也當用茶粉下解毒犀角地黃湯
主之一發便密如針頭形勢重者合輕其表
而涼內連翹升麻湯

若癩已發密重微喘飲水者有熱證用去風
藥微下之 若出不快清便自調知其表不在裏當微

發散升麻葛根湯

若青乾黑陷身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下宜風散

若身表大熱者表證未罷不可下

若癩疹已出見小熱小便不利當利小便入

正散瘡疹方有導赤散

若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉下解毒丸瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也瘡疹未出先聲音不出者

乃形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不出

者是形氣俱病也當清其肺氣宜用八風湯

并涼膈散去梢大黃亦可

小兒瘡疹之由皆始生之時啼聲豈發口中

所舍惡血隨吸而下還於右腎包絡之胞中

其瘡之發下焦相火熾也三等之瘡皆出於

足太陽寒水之經外為大寒內為二火交攻

化血肉為膿寒為發寒邪可令內瀉二火又

令濕氣上歸本位豈一服瘡疹即愈已後再

無一番癩山之患而損生命者矣

陳氏小兒痘疹方

夫小兒在胎之時乃由五臟所養成形也其

母不畏禁忌恣意所欲加添滋味好啖辛酸

或食毒物其氣搏於胎胞之中所以小兒在

胎胞之時受得此毒名曰三穢液毒今瘡疹

者是三穢液毒所出也

一者五臟六腑穢液之毒發為水疱瘡

二者皮膜筋肉穢液之毒發為膿水疱

瘡

三者氣血骨體穢液之毒發為膿血水

疱瘡

永類鈞方此下云人生無不發疹

豆者自幼及長必生壹次又名百

歲

三毒既出發為疹痘瘡也子母當須慎口

即不可食葱韭薤蒜酒醋塩醬猪兔鷄犬

小河海虫魚等物世俗未曉將為發舉往往

不顧其後悞傷者多矣

論痘疹治法

小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹病證自然憎寒壯熱身體疼痛大便黃稠此乃是正病也若無他疾不宜服藥凡療瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治

如表裏俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難靨也小兒瘡疹已出未出之間或瀉渴或腹脹或

氣促謂之裏虛速與丁香壹味木香散治之以和五臟之氣

小兒痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣小兒痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送下七味肉荳蔻元治之以助五臟六腑表裏之氣

小兒瘡疹始出壹日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必光澤必起發必肥滿必易靨而不致損傷也
小兒瘡疹發熱口乾煩渴不止者切不可冷水亦不可與蜜喫及不得與紅柿西瓜類鈴方西類等冷物食之又不可妄投清涼飲消毒散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰噤牙則難治之咬牙者齒槁也乃血氣鈴方不榮也卽不可妄作熱治之

小兒痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解散致令腑臟受冷榮衛澀滯則氣血不能衝貫皮膚肌肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多痒塌煩躁喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生而必罕矣大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生成者也今瘡疹之病腑臟調和則血氣充實自然易出易屬蓋因外常和暖內無冷氣之所由也

異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血
 使痘瘡易出易靨不致痒塌文中代代為醫
 不敢妄處藥餌思人身難得因果非輕
 小兒纔覺傷風身熱未明是與不是瘡疹便
 宜發散可服四味升麻葛根湯
 如瘡疹始出壹日至五七日之間雖身熱或
 腹脹足稍冷者不宜升麻葛根湯或身熱瀉
 渴者亦不宜升麻葛根湯或身熱驚悸腹脹
 者即不宜升麻葛根湯或身熱汗出者不宜

升麻葛根湯已止四證宜服十一味木香散
 治之
 如瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十壹
 味木香散送下七味肉荳蔻元治之
 止者
 多服
 若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起
 亦不能靨也如身溫腹脹喘牙喘渴者難
 治口木穀去多津液枯竭而欲飲水不止者
 蕩散真氣故多死矣速與十一味木香散救

之不愈者十二味異攻散治之

木香散性温平能和表裏通行津液滯上實
下扶陰助陽之藥也善治小兒腹脹瀉渴其
效如神不能盡述
如四五日不大便者可用肥嫩猪脰一塊以
淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子
大與兒食之令臟腑滋潤使瘡痂易落百無
滯礙切不可妄投宜瀉藥恐內虛瘡毒入於
裏傷兒真氣

如六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味

消毒散微得利即住承類鈐方又云不大便而不服也

小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩三日至十三

日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒

痕疹承類鈐方同房云初出至未愈欲愈已愈之際父母又事或乳母月候尤忌觸

許常以葫荽酒噴酒坐卧屋壁間

輕者作三次出大小不一等頭面

稍少眼中無根窠紅肥滿光澤

重者一齊並出如蠶種灰白色

稠密 瀉渴 身温腹脹 頭温足

冷

輕變重 犯房室 不忌口 先曾瀉


飲冷水 餌涼藥 壽域神方又云見產婦孝子生人間

諸香諸臭已上皆忌因犯之故也

重變輕 避風寒 常和暖 大便稠類

鈔方又云不喘渴忌外人

初出圓



根窠活



倒陷圓



已屬圓



若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散若痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜若與者轉渴而死急煎十壹味木香散救之

若痘瘡欲靨已靨永類鈔方未靨之間頭溫足指冷或腸脹瀉渴氣促者不可與水蜜與者卽死速煎十二味異攻散救之

痘瘡十日至十壹日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則哽氣煩渴嚙牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物者殺之太速文中納忠誠告告賢明君子當宜詳審

十二日十三日瘡痂已落其瘡癢猶黯或凹

或凸肌肉尙嫩不可澡浴亦不宜食炙煨物及不宜食五辛五味并有毒之物恐熱毒薰於肝膈眼目多生翳障若不依此當爲兒子終身之患用兩味穀精草散治之

若痘瘡靨已其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西瓜紅柿等冷物食之若與之轉生焦渴或頭溫足冷或腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散以救之若身壯熱經日不除則無他證六味柴胡麥

門冬散治之熱退者住服如不愈只服七味
 人參白朮散極妙一朮木香散以效之
 若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛
 皆是瘡氣餘毒未盡四味射干鼠粘子湯治
 之如不愈者七味人參白朮散主之
 若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風
 湯治之如不愈者七味人參白朮散主之
 若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤
 十六味人參清涼散治之如不愈只服七味

人參白朮散立效
 若痰實壯熱胃中煩悶大便堅實卧則喘急
 五味前胡枳殼湯治之
 黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不
 知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛
 陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治
 之何如故陽盛則補陰木香散加之以丁香
 官桂陰盛陽虛異攻散加之以木香當歸每
 一兩藥共加一錢

小兒痘瘡首尾不宜與水喫若悞與之瘡磨
之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成疔蝕
瘡而水不絕甚則面黃唇白以致難愈者何
也蓋脾胃屬土外主身之肌肉衹緣飲水過
多濕損脾胃搏於肌肉其脾胃肌肉虛則津
液衰少津液少則榮衛澀滯榮衛澀滯則氣
血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而身生
癰腫

若有小渴者六味人參麥門冬散治之如不

愈者只服七味人參白朮散極妙

若身熱大渴者七味人參白朮散治之如不
愈者只服十一味木香散

如腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚
悸渴者或身溫渴者或身熱面眇白色渴者
或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水
轉渴不已者已上九證卽非熱乃脾胃肌肉
虛津液衰少故也宜服十壹味木香散治之
如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏

官桂發表其表裏俱實而瘡不致痒場喘渴死矣

小兒瘡疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液澁滯故成疔蝕瘡也宜用雄黃散懸蠶散等藥治之久而不瘡者潰骨傷筋以致殺人夫小兒斑駁疹毒之病俗言疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤班遍體也

凡發赤班者十生壹死發黑班者十死一生省翁活幼口議

瘡疹證候方議

凡兒所患瘡疹水痘麻子蚊丁火痘等諸家之說或有異同大抵此證出乎五臟肺曰水痘肝曰膿疱心曰血疱脾曰黃疱腎曰黑子小兒不問長幼所出黑子陷者最爲惡候或因風吹或由觸毒皮下隱隱出而不透名黑陷子死者多矣良由服藥有誤冷冰其內毒

不發出爲害甚重凡瘡疹之候證有幾端其
欲發出之時或有作熱者不作熱者有驚有
掣者有狂燥者有叫哭者有煩燥者有自汗
者有讖語者有呵欠者有遁悶者有神昏者
有嘔吐者乃緣所發於五臟虛實之不同耳
或謂耳鼻脚梢中指冷爲之驗者屢究之或
中或否今得至要妙訣凡兒作熱有如傷寒
候疑惑之間不敢直謂者但看耳後有紅脉
赤縷定是瘡疹證候更無可疑若發驚不可

下驚藥有熱不可退熱有汗不可止汗或吐
不可理吐但順□□□□□□□□而發出或
曰首尾不可下或曰首尾皆可下或疑謂之
非說愚曰二家所說皆善也且兒氣脉充實
宜微下之恐作煩躁若也氣虛直不可下恐
瀉易脫如欲利下卽用消毒飲子七寶洗心
散或四順清涼飲壹二服以通爲度切不可
用真珠圓及有巴粉之類並宜禁之如有熱
煩躁與順大連翹飲加紫草茸功效但戒黃

芩今人纔見瘡疹已出未出便與升麻葛根湯其性頗寒只宜少少與服其或不常者蓋用大過反壞其表凡服葛根湯宜加白芍藥糯米人參紫草葶川當歸功效甚良

醫方類聚卷之三百六十三