

編註醫學入門外集卷之四

用溪朱先生雜病纂要

詳格致餘論局方發

附錄併各名

家方書如巢氏病源好生書
儒醫纂要惜乎未之見也

雜病提綱

外感

內傷 脾胃氣血 痰鬱積熱諸虛 癆冷

外感

風

頭眩

口舌

牙齦

面風

眼

耳

鼻

遊風

中風卒倒分真似

風為百病長善行數變為卒中昏倒為
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則

筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則

筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則
熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則
筋則掣急入骨節則陽經則狂入陰經則

病有真中者有熱陰病身涼烏附行經不可藥用者陽病身

初入反發正氣反急牽引口眼喎僻或左或右急插人中

拔頂髮灸耳垂珠粟米大艾三五壯外用南星草烏各一

兩白芨一錢姜蠶七枚為末姜汁調塗咽喉正即洗去內

用正舌藥白附子姜蠶全蝎等分為末酒調服二錢○不

語有數端有風中心脾者資壽解語湯有風中心經者小

續命湯去桂附加菖蒲有痰塞心竅者導痰湯加菖蒲人

參竹茹或芩連有舌本強硬語言不正者用蝎梢二錢半

茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有

風熱壅者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽

言不出者干全大補湯去桂加菖蒲遠志

痰塞喉中聲

噫同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出

散加黃連或平黃清心丸虛者星

香散子生飲導痰湯小省風湯半身或只

變智不亂病在脣四肢麻此名風癱智亂不能言者難治

急則一身皆仰或左癱右瘓或一臂不隨時復轉換

脾實者膏梁之疾并肝腎虛癯搜風順氣九有

脾虛者升全大補湯獨活寄生湯萬寶回春湯又有五痺

類風狀後四症風癱風痲風痺全魚莫浪猜中暑中寒中濕

虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搖擗之症為異雖

內傷蕪中亦然但四症見一便作風治惟有輕重緩急之

分輕者發過如故或口舌無恙手足顛拽者天省風湯加

人參沒藥等分水煎熱服得汗即愈或四肢無恙口喎語

澁者古防風湯入麝一釐調服或自西北高真中宜分治

醒能言能食惟身體不遂者地仙丹

東南濕蒸中似密實虛主火河主氣垣或主濕肝內傷蒸

中似中盡相須三子所主雖殊而實同也况濕則中氣不

見氣衰賊邪容易襲氣血壯盛腠理緻密邪不能入推中

也年氣血始衰腠理空疎加以七情勞

後飲食內傷元氣門巷賊風乘虛襲入臟腑血脈故有兼
中者東垣所謂非外邪徑傷乃木氣病也。有醉後當風頭

面多汗善渴者名曰漏風。宜黃芪六一湯加參朮牡蠣乾
尊有房勞中風下體多汗曰內風。十全大補湯加附子防

風如入風府曰腦風。入係頭曰日風。在腠理為淺風。與漏
風同。但身盡疼耳久則為腸風。食後曰胃風。又名夾食中

風。久則為下血。有傷食變為暴厥亦類中風。但停食則胸
中滿悶。須探吐及理脾胃。有酒濕病亦類中風。當分清以

瀉濕毒。有內傷熱症似中風者。有雜
病虛症似中風者。均不可以風治。有雜
火動氣中魚涎汚氣

脈沉身涼無痰涎為異耳。如思慮肉脫憂愁肢廢悲哀筋
學過喜皮稿盛怒腰膝即河澗所謂將息失宜。五志過極

則心火暴甚。腎水難制。熱氣拂鬱昏倒。筋骨不用。久則癱
瘓。忌服風藥。宜釐香正氣散。合星香散。虛者八味順氣散

實者四
真中中腑着四肢
手足拘攣或中身前身後身側
可治。脈浮有表而見五色惡寒

宜小續命湯或排風湯。風從汗散。通因通用是也。如脈浮
不語者用防風黃芪煎水一担置床下薰入鼻中。良久能

藥言進
中臟閉塞九竅多昏危
中臟之絡者口眼俱閉可治
如入臟深者心絕口闕用絕

眼閉脾絕手散肺絕痰如拽鋸。鼾睡腎絕遺尿或大吐太
瀉下血吐血者皆死。宜三化湯。搜風順氣丸。麻子仁丸。九

攻裏忌臍腐牛黃引風入骨。荒花其遠損傷氣血。如汗多
尿少者忌滲利。赤竭無以制火。煩熱愈甚。候熱退汗止。小

便自
中血脈也。絡則歪口眼。從小續命湯加減。微汗或近於
臟內亦有便溺阻隔。則又有中經亦要知內阻。隔外魚

從三化湯加減微利。則又有中經亦要知內阻。隔外魚
六經
症從中治。血不可汗下。蓋風本於熱。熱勝則風動。宜養

形
活愈風湯如欲微汗愈。風湯加麻黃欲微利愈。風湯加
大黃中腑宜汗汗多則亡陽。中臟雖宜下。下多則亡陰。

若臟腑兼見者或先汗而後利。口不能言肢不持。手足不
或表裏兼攻者。防風通聖散。

乃血弱不能
左為死血
留滯與少血
內物湯火加防風羌
營筋與舌也
經絡與少血
活主之。瘀血加菴仁

紅痰與氣虛身右居
久則痰火鬱結
後以防風通聖散
物湯俱姜汁炒過
瘦人火動加黃柏
濃煎參芪加附子
右痰痰盛者二陳
雜病通
法也
用南星五分龍腦
擦牙熱自開痰甚
吹入鼻中
汁投之
藥吐法
能轉動
以開關
漸復痰飲
川芎於調散
以西北風
中宜分氣
且治臟腑
臟腑經絡
表裏法祛風
者先用調補
分臟腑經絡
肌勻蠕動
如眉稜骨痛
亦堪推
冒風惡風多屬肺
籬飲寒月麻黃杏
胡桂枝湯防風冲和湯

紅痰與氣虛身右居
血虛則痰火流注於左而為癱氣虛
則痰火流注於右而為瘓急治則愈

久則痰火鬱結神治痛者為實先以二陳省風之類治痰
後以防風通聖散瀉青丸之類瀉火不痛為虛血虛者四

物湯俱姜汁炒過加竹瀝姜汁肥人濕痰少加附子行經
瘦人火動加黃柏氣虛者四君子湯虛甚遺尿聲鼾睡者

濃煎參芪加附子姜汁勞傷者補中益氣湯加竹瀝煎治
右痰痰盛者二陳湯加姜汁竹瀝能食者換劑瀝此丹溪

雜病通
法也
開關散吹鼻有嚏可治無嚏
者縮牙關緊急入藥不得吞

用南星五分龍腦一字端午日午時合勿用一字至五分
擦牙熱自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微吐

吹入鼻中
吐用酸養升調下如再不吐用熱蒸

汁投之
藥不可輕用吐後宜服降火利氣安神定志之
藥吐法見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆槁不

能轉動
以藥壓下
順氣活血風自祛
風症皆痰

以開關化痰為先急則祛風緩則順氣又則活血如真氣
漸復痰飲漸消或尚有風和未退羌活愈風湯調之實者

川芎於調散虛者萬寶回春湯未可全以風治也抑論舊
以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東南地濕兼中似

中宜分氣血虛實痰火多少調治然真中兼中南北互有
且治臟腑者可不分氣血之虛實乎治氣血者又可不分

臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先頭分
表裏法祛風為主次用氣血痰法調治內傷重而外感輕

者先用調補氣血痰法為主次
分臟腑經絡祛風此活法也
若覺膚頑肌蠕動足麻木
肌勻蠕動如有虫行心神橫亂宜烏藥順氣散
如眉稜骨痛者風之心也宜古防風湯加奉連預防之法

亦堪推
禦風州五參散史國
公浸酒方單稀發丸

冒風惡風多屬肺
肺主皮毛通膀胱最易感冒新咳軟惡
籬飲寒月麻黃杏仁飲重者頭疼身痛寒熱咽乾音啞
胡桂枝湯防風冲和湯頭痛甚者川芎茶調散痰多者杏

沸草散。挾熱人參敗毒散。升麻葛根湯。挾寒十神湯。挾寒濕消風百解散。挾濕神木散。挾暑香葛湯。時行紫胡升麻湯。挾內慎勿專攻外。服食過厚素有痰火。時常臭塞流涕。聖散或大黃黃芩等分為九。白水下。素虛者只用防風羌活川芎隨宜加入。補藥痰藥中。傷食加白朮。陳皮。青皮。山查麥芽。挾形寒飲冷。加姜桂。挾房勞加參朮。歸地。挾勞後傷氣者。補中益氣湯。加羌活。防風。風虛甚者。羌活九加味。

烏荆丸。重則傳變輕不傳。風重傳裏。一久甚能為氣血害。風

燥血散。氣故古用桂附八物等湯。久不愈者。只宜三白湯。加減斂之。切忌味泄。雖物起非寒。月無汗。麻黃禁用。

寒 心脾痛 腹亂

中寒魚汗肢僵仆。傷寒循經漸入。中寒不問冬夏。或當風入臟腑。昏倒四肢拘攣。強直厥冷。與中風相似。牙緊四肢不動。為異。可急用葱餅熨。或灸氣逆手足反溫。暖則止。如

一捷縮者。須臾即死。急分三陰。煖下元。急煎姜附。中救之。次審中脘。疼痛中太陰者。理中湯。脉沉足冷。中少陰者。四逆湯。加吳萸。或臍腹疼痛。五積散。加吳萸。小腹疼痛。中厥陰者。當歸四逆湯。加吳萸。或五味子。如陰盛煩燥。轉藥冷飲。或加吐涼藥。為引。溫中散冷。補煖下元。陽氣復而

寒自消矣。切忌吐下。感胃尋常和表裏。西比苦寒。中傷寒。補血者。寒泣血故也。者多。東南溫。和

中傷者。少尋常感冒。表症見者。九味羌活湯。苦芷香蘼散。寒入腸胃者。霍亂轉筋。洞泄下利。乾嘔吐逆。藿香正氣散。或五積散。挾食停痰者。人參養胃湯。夏秋暴寒。折熱於裏者。調中湯。微下之。凡帶漏遺精。痰癢疝瘕。脚氣腰膝冷。虛

勞。陰痿。諸痛。皆寒所為也。挾內傷。補益加辛溫。內傷勞後。風眩暈。不仁。挾濕四肢腫痛。內傷。補益加辛溫。內傷勞後。中湯。如內傷。房室感寒。厥冷。四逆湯。脉脫。三建湯。煉臍法。

暑 痢 瘧

暑 痢 瘧

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴面垢而已餘症皆

弱或大病大勞後縱暑中傷者宜清暑益陰陽經絡最難

氣素強盛壯實無虛損病者宜祛暑和中

拍動作田野道途得病似傷風症屬膀胱經者名中暈陽

症其實一也但自襲暑氣而言曰中暑自被日逼而言曰

中暈然暑初入自口鼻牙頰達手心主胞絡以火從火故

古法暑還取冷水灌漑勿嚥入肝則眩暈頑麻入脾則昏

睡不覺入肺則喘咳痰變入腎則消渴非專心主而無傳

入中驟傷緩胃淺伏深分輕重中暑歸心神昏卒倒傷暑

或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也胃暑

入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即胃暑久而藏伏三焦腸胃

之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐

瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血等症但暑病多無身痛

間有痛者或為濕暑風暑厥又何如即暑暈者但以手足

為厥厥與傷寒熱厥義同黃連香茹散暑風乃暑後內動

五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香茹散加蒼朮

或六和湯合消風散素有痰飲因暑觸動痰熱生風者六

和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫難治急扶

陰涼處不可卧濕冷地搦道上熱上放臍上撥開作窠令
人尿於其中待求生姜或蒜嚼爛以熱湯或童便送下外
用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以大劑滋補
藥服之如心神恍惚用五苓散燈心同煎入硃砂末調服
有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者水桂加黃連或神昏
驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火
治煩熱利濕**痰火絞腸俱可吐**暑毒痰火壅塞胸中量體
止渴之要藥

也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調磨二聲

服○絞腸痧腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有

冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯調益一兩灌入
即安或行用陳艾陳樟木陳壁土各等分水煎連進三四
服刺血法祛暑和中利濕消痰其雜症自除夏月人多飲水食冷
見急救

汗多者忌凌。祛暑香如散黃連解毒湯清肺生脉散。白虎湯加參朮寒熱不穴。小柴胡湯。和中。大小調中湯。如桂苓甘露飲六和湯。寒鬱甚者須及治。伏陰在內之時。外既受寒。內復傷冷。加乾姜砂仁神蘇。若外觸暑氣。內傷冷食。以致外熱內寒。宜清暑益氣湯。若外不受寒。止是內傷生冷。腹痛嘔瀉。宜理中湯加麥芽砂仁。或大順散。或二氣丹。冷水下卅九。皆治因暑傷冷。非溫散治。內傷滋補免暑之謂也。誤服發黃發。蓋血悶。而。死。

清瘴。內傷勞後。或素氣血虛弱病暑者。一以滋補為主。慎。倦者。補中益氣湯。或為丸。中陽暫加香。三伏炎蒸尤可畏。如篇。豆陰虛者。滋陰降火湯。胃氣丸。大熱傷氣。養生家謂此。時縱酒恣色。令。預防不獨羨香茹。人內腎腐爛。至秋方甚。甚則化水而死。預防不獨羨香茹。時常禦暑。體實者。方如散。益元散。虛者。忌用。蓋脾虛者。不。體弱。名注。夏病宜補中益氣湯。去升。加黃柏芍藥五味。子麥門冬。有痰加半。夏姜汁。實三伏。卻暑之聖藥也。如氣。衰精神不足。煩渴懶食者。生脉散。誘行丸。通用。謝傳萬病無不真。散。

濕氣覺來分內外。風寒暑暴傷人。便覺濕氣薰襲。人多不。兩行濕汗。透沾衣。多腰脚腫痛。有自內得者。生冷酒麪。帶。脾生濕。鬱熱。多肚腹腫脹。西北人多內濕。東南人多外濕。內外又分上下中。濕在上宜微汗。在中。下宜利二便。或升提。初入身沉重。多困。倦。或肢節痛。或二身盡痛。甚則濕聚。土薰喘咳。痰。目如。為痰昏。不知人。為直視。為。聲。

泄。未附場。三白。着腎脚腰小便濃。濕下先受之。故腰脚。痛。獨活寄生湯。常。歸。枯。蒙。首位高氣清。濕薰則如有。着脾。浮腫脹。瀉。或。膝下。大便。物以蒙之也。單。椿木。膏。妙。

濕症。滯。赤白濁。腰酸痛。黃疸。水腫。脹。痛。脚氣。赤白濁。腰酸痛。黃疸。水腫。脹。痛。脚氣。赤白濁。腰酸痛。黃疸。水腫。脹。痛。脚氣。

濕氣覺來分內外。風寒暑暴傷人。便覺濕氣薰襲。人多不。兩行濕汗。透沾衣。多腰脚腫痛。有自內得者。生冷酒麪。帶。脾生濕。鬱熱。多肚腹腫脹。西北人多內濕。東南人多外濕。內外又分上下中。濕在上宜微汗。在中。下宜利二便。或升提。初入身沉重。多困。倦。或肢節痛。或二身盡痛。甚則濕聚。土薰喘咳。痰。目如。為痰昏。不知人。為直視。為。聲。

泄。未附場。三白。着腎脚腰小便濃。濕下先受之。故腰脚。痛。獨活寄生湯。常。歸。枯。蒙。首位高氣清。濕薰則如有。着脾。浮腫脹。瀉。或。膝下。大便。物以蒙之也。單。椿木。膏。妙。

泄。未附場。三白。着腎脚腰小便濃。濕下先受之。故腰脚。痛。獨活寄生湯。常。歸。枯。蒙。首位高氣清。濕薰則如有。着脾。浮腫脹。瀉。或。膝下。大便。物以蒙之也。單。椿木。膏。妙。

泄。未附場。三白。着腎脚腰小便濃。濕下先受之。故腰脚。痛。獨活寄生湯。常。歸。枯。蒙。首位高氣清。濕薰則如有。着脾。浮腫脹。瀉。或。膝下。大便。物以蒙之也。單。椿木。膏。妙。

痛湯腎着治外微汗通經絡微汗功已黃芪湯或羌活勝湯青娥丸治內滲便利大為妙工加茵陳一倍身

痛加羌活一倍濕盛膨脹者又當以車前木通葶利水行氣為君而以參木茯苓為佐或以二木為君而以利水藥為佐濕鬱肢脹或遍身浮腫者皆自內四氣相兼濕感而出也量虛實利之不敢利者退黃丸妙四氣相兼濕感

濕熱甚除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯敗毒散兼寒

兼風則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或寧痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉倦四氣相兼惟寒濕濕熱為病濕熱尤多以尿赤有濁為濕熱多黑瘦膏梁之入便清不渴為寒濕多肥白淡食之人昔有專用

五積治寒濕防風通清熱燥濕兼補中此治濕熱法也內傷勞役七情飲食以致脾虧火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化

筋痿熱勝筋縮者尤宜通用濕熱燥脾并升散水丸大安丸單蒼木丸升陽除濕湯通用二陳湯或平胃散加桑

白皮為主濕在上焦加羌活蒼木微汗有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連下焦濕加水麻防風升提熱加防已黃柏龍膽草肥人多濕加蒼木滑石瘦人多熱加茯苓沉因加參朮又實者大便方可攻元氣實而濕熱四製蒼相丸三精丸甚者藜水丸或

舟車丸

燥消渴燥結

燥有內外屬陽明外因時值陽明燥令又晴不雨黃埃蔽

火磨或大病吐利亡津或金石燥血或房勞竭精或饑飽勞逸損胃或多燒酒蓄厚味皆能偏助火和消燬血液

總來金被火相刑六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖

被熱傷木無以制而生風。風勝濕熱耗津。入肝則筋脉助強。緊急口禁發為風癩。或手足癱瘓偏枯。或十指反而莫能搔痒。或為雀目内障。入心則昏胃僵。什語言寒澁。入脾則膈滿不食。或善纖而瘦。或傷積變為水腫腹脹。入肺則毛焦乾疥。膿鬱咳嗽。入腎則津液竭而煩渴及**皴勁渴秘**骨蒸秘結。總皆肺金所主。陽明與肺為表裏也。

雖風熱表裏俱宜潤衛榮

表病皮膚皴揭。四物湯去川芎。合生疎散。加知栢天花粉。或單

天門冬膏如筋攣不能運動者。大秦朮湯。○裏病消渴活血潤燥生津飲。○燥結因肝木自旺。或肺風入大腸者曰風燥。搜風順氣丸。因臟腑積熱。或久病鬱熱者曰熱燥。四順清涼飲。當歸龍薈丸。因脾胃伏火便閉不食者曰血燥。四物湯加大黃桃仁。或為丸服。大便偏秘者。煎帶通幽湯。小便偏秘者。煎氣除燥湯。陰虛火燥者。曰虛燥。單黃栢丸。補陰丸。腎氣丸。勞役氣虛燥者。補益氣湯。通用四物湯。去芍為君。天麥門冬為臣。瓜蒌為佐。升麻紅花牡丹草為使。風加秦朮或牛膝。熱加黃芩。血倍生地。渴加天花粉。五味子。潤之養血之謂也。蓋燥則血澁而氣液為之凝滯。潤則者潤之養血之謂也。蓋燥則血澁而氣液為之凝滯。潤則血旺而氣液為之宣通。由內神茂而後外色澤矣。然積液固能生氣。精氣亦能生液。常用氣虛者。瓊玉膏。津虛者。單五味子膏。血虛者。地黃膏。凡病遇天燥。亦宜量加此等潤劑。

火瀉痛

小便不禁

夢遺

脫肛

小便不通

火因內外分虛實

外因邪鬱經絡。積熱藏腑。此為有餘之。內因飲食情慾。氣盛似火。此為有餘之。

中不足。陰虛火動。乃不足之火。大要以性暴魚常主病多。脉弦數無力為虛火。實大有力為實火。

火病死人甚暴。變化無常。一動便傷元氣。偏勝殺害他經。內經病機十九條。而屬火者五。劉河潤推廣五運為病屬

肝者。諸風之火。屬脾胃者。諸蒸痰火。屬心。肺者。諸熱實火。屬腎者。諸虛之火。散於各經。浮遊之火。入氣。水魚根之火。

入血。分消陰伏火。故曰諸實火。渴閉執魚間。實火內外皆病尋痰矣。痰火生異症。

實火渴閉執魚間。實火內外皆病尋痰矣。痰火生異症。

潮熱大便閉虛熱有間口魚何虛火潮熱有渴海實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小辨胡湯
入裏大承氣湯燥渴白虎湯因金石灸燔者黃連解毒湯
防風當歸飲三黃丸大金匱丸狂者黑奴丸○虛火氣虛
火感因勞倦傷胃無力身熱宜保赤湯補中益氣湯加芍
藥黃柏或四君子湯滲之如大病及吐瀉後身熱如焚命
門脉脫為陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子
理中湯薛慙散主之○血虛火動因傷色慾午後發熱宜
四物湯滋陰降火湯如味迨廷散腎氣丸人中白散若腎
水受傷生地玄參前膏土之相火旺甚氣從臍下起者正
氣湯汝離丸如氣從湧泉穴起入腹者虛極難治四物湯
加馬鹿膠骨降陰火以代芩連或人中黃亦好外用附子
未津調塗足心亦有濕熱鬱者○飲食鬱火因外傷生冷
及飲食不化抑遏陽氣於脾胃四肢熱如燄以升散之劑
起宜隨各經調之大怒火起於肝則手掉目眩清肝湯加
龍膽草古萊通丸醉飽火起於胃則吞酸腫滿瀉黃散或
已丸單石羔丸悲哀火起於肺則氣天賢鬱白散加黃
芩葶藶單黃芩丸單舌參丸勞勞火功口賢則骨蒸潮熱
大補陰丸滋腎丸單黃柏丸心火輕則煩熱痛癢單獨心
湯重則自焚面青發燥脉絕暴死故曰五志之火動極不
治○總論虛火可補實火可瀉輕者可降重者從其性而
升之君火正治可以補實伏可以水滅可以直折相火反治
不可以水濕折惟從其性而伏之即如實火發狂宜三黃
硝黃正治虛火發狂先與姜湯然後補陰其火自降允火
盛不可猛用涼藥必酒炒過或煎溫散
并緩又有可發汗者風寒生冷鬱也
五行惟火有二心為君火一身之主腎為相火遊行於身
常寄肝膽胞絡三焦之間又膀胱為民火亦屬於腎此皆
天賦不可無者若五志之火則由枯人是內傷火多外
感火少意火不妄動動由於心靜之一字其心中之水毛

內傷

調理脾胃傷食
痞塊

積聚
蠱瘴

調理脾胃濕與熱脾性濕主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯太乾則血燥濕熱調停

則能食能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善食而瘦由是脾胃不和

之交相為病胃變為寒脾變為熱大槩以脈浮緩而遲或

澀脈為寒濕脈浮緩而實或細而數為燥熱又肥人多濕瘦人多熱更參以

飲食厚薄可也且按心口疼不疼勞傷手按心口刺痛食傷手按心口刺痛

食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生勞倦傷於起熱中宜宜辛熱温中飲食傷初起寒暴宜辛

燥消導又為濕熱宜辛甘苦寒潤之熱病多火痰眩暈吐

足痿或大便閉濕病腫脹馮難停消補清熱與燥濕勞傷元氣

益食傷和氣有餘宜消導勞役飲食俱傷補益消導兼行

其中或兼清熱或兼燥濕痰補劑補中益氣湯主之消

導停食枳梗陳湯湧山查麥芽枳木先停飲胃寒湯加

枳木先停飲胃寒湯加枳木枳木先停飲胃寒湯加

君子湯理中湯生胃升牽蒼木膏乘勝虛實脈堪疑脾胃

臟主風寒暑濕燥一氣偏勝亦能損傷假旁脈弦風和所

勝胃風湯黃芪建中湯三白湯脈洪熱邪所乘瀉黃散清

胃散調胃承氣湯脉瀼燥和所乘八珍湯錢氏白朮散脉

沉細寒和所乘益黃散八參養胃湯九附子理中湯九補

真丸脉緩濡無力或時隱伏正氣虛而損也四君子湯為苓白朮散脉緩太過濕和自甚也平胃散

氣氣滯氣刺痛

諸氣皆因火作孽七氣喜怒憂思悲恐驚又曰九氣首核

升降流行榮衛生養臟腑惟七情火炎傷肺閉塞清道以

致上焦不純中焦不運下焦不滲氣濁火盛薰蒸津液成

痰痰鬱成積初起宜四七湯已氣湯辛温消散稍久宜二

陳湯加荜連山梔或當歸龍薈丸木香檳榔丸辛凉以折

之最忌辛助火耗氣之劑雖木香亦好上升必佐以知

自覺其冷也。問傷生冷。寒熱。挾傷飲食生冷。嘔逆積痛者。非真冷也。或七情後過飽。大實痛者。黃芩。因七情過。胃脘痛者。四君子湯加木香。挾寒則腠理密而氣斂於中。五積散入裏。四逆湯挾風。心氣斂。挾風寒。犯臆。滯活。附子湯。挾寒濕。五苓散。五苓能升降諸氣。通利三焦。非特分利而已。凡此熱劑。明知口傷冷物。身受寒氣。而後敢用。亦變法也。高陽生專謂冷生氣。卷泥矣。挾暑熱。則腠理開。而汗泄於外。黃連香薷散。加喜樂。恐懼。驚嚇。勞動。散真。蔘根。或清暑益氣湯。加木香。

元。喜動心。氣散不斂。過則健忘。歸脾湯。恐傷腎。精怯不升。過則下焦脹痛。白和散。補中益氣湯。驚傷膽。神亂不定。過則証中失志。炒香散。平味溫膽湯。此三者皆冬真元耗散。多見不足之症。又勞則喘息汗出。亦冷氣散。尤宜補益。

怒。惱。憂。愁。悲哀。思慮。滯結。怒傷肝。氣上逆。過則嘔。暴。香湯。熱者。料棟湯。憂傷肺。其氣聚。過則喘。提。種子降氣湯。其氣急。過則狂。狂者。氣。亮者。散。升陽順氣湯。思傷脾。其氣

結。過則痞滿。退熱清氣湯。溫膽湯。不香化滯湯。禾香。枳。木。凡此四者。皆冷邪氣鬱結。多有餘之症。又逸則結。為積。氣滯。亦冷氣結。輕者行動即愈。重者橘皮一物湯。結為積。

聚散虛中。益煎散。阿魏撞氣丸。木香分氣丸。大黃備急丸。○氣散則中虛。倦怠無力。短氣不足。以息。宜調中益氣湯。人參養榮湯。自汗喘急者。養正丹。俗云。氣無補法。不思氣

虛不運。邪着為病。不補氣何由行。且如喘嗽氣鳴。以枳。梗。姜。橘。蘓。桂。調其氣。以星。半。細。辛。豁其痰。而終不下降者。氣之所藏。無以收也。必佐以補骨脂。補腎。則走注眩暈。吞酸

噎。素無積者。濁氣入茶衛。則攻刺肩背。四肢有積者。屬氣。滯。胸腹。腸胃。脇肋。着於一處。則眩暈。嘔吐。反酸。噎膈。痞

痺。泄瀉。心腹絞痛。流氣飲子。主之。或水香。勻氣。胸痞。痺腫。散。梔。姜。飲。苦。黃。連。丸。梔。更。丸。清。膈。卷。成。丸。選用。胸痞。痺腫

二便難。胸膈痞塞。枳。梗。湯。胸痺氣塞。以。橘。湯。浮腫。不。香。流。氣。飲。大。便。難。三。和。散。四。磨。湯。秘。傳。降。氣。湯。煨。者。麻

散。梔。姜。飲。苦。黃。連。丸。梔。更。丸。清。膈。卷。成。丸。選用。胸痞。痺腫

二便難。胸膈痞塞。枳。梗。湯。胸痺氣塞。以。橘。湯。浮腫。不。香。流。氣。飲。大。便。難。三。和。散。四。磨。湯。秘。傳。降。氣。湯。煨。者。麻

散。梔。姜。飲。苦。黃。連。丸。梔。更。丸。清。膈。卷。成。丸。選用。胸痞。痺腫

二便難。胸膈痞塞。枳。梗。湯。胸痺氣塞。以。橘。湯。浮腫。不。香。流。氣。飲。大。便。難。三。和。散。四。磨。湯。秘。傳。降。氣。湯。煨。者。麻

散。梔。姜。飲。苦。黃。連。丸。梔。更。丸。清。膈。卷。成。丸。選用。胸痞。痺腫

子仁丸。熱者小承氣湯。如壯盛人。氣閉胸滿。蕪血蕪痰。宜百藥不効者。五香連翹湯。小便閉者。五苓散。蕪血蕪痰。宜審別。仁紅花。或復元通氣散。四物湯。加香附。側柏葉。枳實。血加桃

穉。升降氣湯。甚者。治分痰積少與多。降火清心尤妙。訣不稀涎散。微微吐之。

內傷外感。久皆鬱熱。滯為痰積。况七情之火。無日不起。五味之偏。無日不積。此丹溪河澗力主為火也。雖然。七情總發於一心。七氣總隸於一氣。氣暢也。動則為火。故以降火

化痰消積。分治。量其所稟厚薄。而加減之。大柴氣虛。四君子湯。氣實。古烏附湯。為主。火多。合黃連解毒湯。加知母。枳

壳。痰多。合二陳湯。積多。合平胃散。痛加玄胡索。青皮。蒼朮。寒加官桂。吳萸。便閉。加水。香檳榔。男

子血虛。及婦人胎產氣痰。合四物湯。

血 嘔血 咳唾咯 血 瀉血 腸風臟毒

諸血先頃分格經逆則上行順下行血乃水穀之精變成

陰道易腐。一有感傷。調理失宜。以致陽盛陰虛。錯經妄行。火載則上升。拔濕則下行。是以上溢清道。從鼻而出。為

留滯濁道。從胃脘而出。為咳唾。滲入腸間。從下部而出。為

血痢。結於腸胃。則成積。而為血瘕。分經言之。嘔吐。胃也。咳

唾。肺也。痰帶血。脾也。咯血。系腎也。溺血。小腸膀胱也。下

血。大腸也。牙宣。胃或腎虛炎也。又血從汗孔出者。謂之肌

衄。從舌出者。謂之舌衄。心與肝也。從委中穴出者。謂之肌

逆。行難治。順行易治。外症有潮夜及重。重。潮盛。脉大者。死

然。痰血亦能作潮。日輕夜重者。血屬。量人虛實。氣須清。血

陰也。如九竅出血。身熱不則者。即死。量人虛實。氣須清。血

氣行。氣行則行。氣止則止。氣溫則滑。氣寒則凝。故涼血必

先清氣。知血出其經。即用其經清氣之藥。氣涼則血自歸

隊。若有瘀血。凝滯。又當先去瘀。而後調氣。則其血立止。或

元氣本虛。又因生冷。勞後。損胃失血者。却宜溫補。斂而降

之。切忌清涼。致致停。外感積瘀宜涼。血散劑。外感四氣邪

瘀。胸膈不散。量之。外感積瘀宜涼。血散劑。外感四氣邪

醫學入門卷之四

誤下以致邪逼經血妄行。風症色青多鼻衄者金佛草散
去麻黃加桔梗枳椇杷葉桑白皮或參耨飲加黃芩。寒症
色黯臭似點濁者九味羌活湯。麻黃升麻湯。暑熱過血
色紅甚則黑者茅花煎湯調五苓散。暑毒攻心嘔血者稅
杷葉散。去丁香加黃連。濕症色如烟塵。多下血者胃風
湯。當歸和血散。時毒身熱吐膿者陽毒升麻湯。積熱
因飲酒炙烤蓄熱三焦者黃連解毒湯。黃連枳殼二味湯
龍腦鷄種丸。凶生丸。天金花丸。槐角丸。瘀血因打撲損
傷。煎聚胸膈者犀角。內傷滋陰。補火自平。內傷七情。暴喜
地黃湯。桃仁承氣湯。暴怒傷肝。不能藏血。積憂傷肺。過思傷脾。失志傷腎。皆能
動血。治宜開痰行氣。二陳湯加酒。紅花升麻歸身黃連。虛
者加參朮及附子一片。熱者加山梔牡蛎皮。苗草生地。木
香。氣急者加瓜蒌仁。枯梗。勞心無汗者。茯苓。補心。湯有汗
者。歸脾湯。素鬱者。清肝解鬱湯。氣壅者。種子降氣湯。如失
血後。被七情。四物湯加木香。檀香。陰虛者。去木槿。加玄參
黃栢。枳殼。內傷飲食生冷。滯胃清道。氣濁血亂者。理中
湯。加乾薑。芎藭。芩。治初起。陰陽定。如淋。冷。暈。刺。者。如。桂。枝。
衰火盛者。犀角參湯。或四君子湯。加蒲黃。人乳。藕節。傷力
吐血者。猪肝。蘆白。芩。末。食。或。花。藥。石。制。內。傷。氣。散。汗。出。污
衣。甚。如。汪。染。者。黃。芪。建。中。湯。以。香。散。或。男。胎。髮。燒。灰。膏。之
膠。龜。十。全。大。補。湯。內。傷。思。慮。色。慾。血。衰。火。燥。者。吁。嗟。男

女血為疾。人知百病生於氣。而不知血為百病之胎也。凡
寒熱。踈。痺。痺。疔。瘡。癰。疹。搔。痒。好。忘。好。狂。驚。惕。迷。悶。
疝。塊。痰。癆。癰。疔。遺。溺。等。症。及。婦。人。經。閉。崩。中。帶。下。皆。血。病
也。通用四物湯。涼血心。加黃連。小腸。中。指。仁。木。通。肺。加。枳
朮。大。腸。實。於。肝。加。條。大。膽。加。黃。連。腎。膀。胱。加。黃。柏。脾。加。生
地。胃。加。大。黃。三。魚。地。骨。皮。心。胞。絡。牡。丹。皮。清。氣。心。與。胞。絡
加。麥。門。冬。肺。加。枳。殼。肝。加。青。皮。柴。胡。脾。加。白。芍。胃。加。石。燕
乾。葛。大。腸。三。焦。加。連。翹。小。腸。赤。茯苓。膀。胱。滑。石。瓊。珀。瘀。血
加。紅。花。桃。仁。非。汁。童。便。以。行。之。血。來。暴。者。加。薄。荷。玄。參。以
歸。經。血。止。後。加。炒。黑。乾。姜。引。血。保。全。脾。胃。可。長。生。血。病。每
還。元。血。虛。加。龜。板。血。燥。加。人。乳。

醫學入門卷之四

醫學入門卷之四

收功胃氣一復其血自止他如區吐後發熱及傷寒汗下後發熱但用調和胃氣自然熱退可見脾胃能統氣血

痰

喘 膈噎 驚悸怔忡健忘 嗜 嘈雜

惡心 關格

嘔吐 疰癘

鉅逆 鎮狂

痰分新久內外邪痰乃津血所成隨氣升降氣血調和則

輕者形色青白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結

咯之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦但痰症初起頭痛發

執類外感表症久則朝咳夜重類內傷陰火又痰飲流注

肢節疼痛類風症但痰症胸滿食減肌色如故脉滑不勻

不定為 游溢諸經主病除人多氣血為病而不知痰病尤

異耳 腫脹世溼名曰濕痰若挾食積鬱血遂成痰囊痞塊又各

食痰留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火

痰若因飲酒乾嘔喉痛又各酒痰升於肺多毛焦面

白如枯骨帶口燥多痰動於肝多眩暈頭風眼目暈動

顛狂夢寐奇怪名曰熱痰動於脾多眩暈頭風眼目暈動

昏遊耳輪搔痒脇肋脹痛左癱右瘓麻木眩暈奇症名曰

風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰

寒痰又名虛痰凡渾身百骨如虫行或身中結核不紅不

腫或頸項結核似瘰非瘰或走馬喉痺或胸腹間如有二

氣交紐或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或吐

咽 喉 驚悸怔忡健忘 嗜 嘈雜

惡心 關格

嘔吐 疰癘

鉅逆 鎮狂

胸骨撲傷刺痛不已散血之劑罔功續以自已風青寒黑

小傾飲之須臾吐痰其痛立止百病煎痰如吐風青寒黑

濕色白風痰外感賊邪或腎枯木動或內風鬱熱色青而

痰九面神丹竹悉膏○寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰

善唾或喘輕者五積散藿香正氣散重者温中化痰丸古

半碗丸○濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者十

綱湯心痛者單半夏丸或神木丸濕熱色黃者甲和丸清

膈蒼液丸在裏者青礞石丸熱黃甚則帶紅此感誤溫所致因厚味積熱或外

帶血或紫清氣化痰丸火鬱稠粘氣如絮火痰因飲食玄

煎服美金花丸痰疾丸火鬱稠粘氣如絮火痰因飲食玄

液成痰稠濁二陳湯加芥連山施或抑上丸稠下丸鬱

痰即火痰鬱於心肺之久者疑滯胸膈稠粘難咯忌南星

半夏燥藥宜開鬱降火清金潤肺緩以治之節齋化痰丸

謝傳清金丸單貝母丸霞天膏氣痰七情鬱成咯之不

出燕之不下形如破絮或如梅核四七湯久者食痞酒臂

換蘆子加黃芥山施海右三仙丸子金指迷丸食痞酒臂

脇痛加食痰因飲食不化結成痞塊橋半枳木丸痰壅端

傷水心中堅大如杯首名氣分枳木丸料煎服痰癖硬如

杯時有水聲者神保丸酒痰小調中湯香附瓜萎青黛

凡痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差痰伏胞絡自肺竅

口前流出飲生胃府從食噎吐出五飲六症留飲伏飲合

滑或伏眼下皮如灰黑痰飲水停腸胃腹響轉轉有聲

令人暴肥暴瘦懸飲水流在脇咳唾則痛懸懸思水溢飲

水流四肢身體重痛支飲水停膈上飢逆倚息短氣留飲

痛引缺盆咳嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒

腰背痛淚出或身惕仲景治諸飲在皮裏膜外表分者

大小青龍湯汗之在胸膈者瓜蒂散吐之在四肢經絡脇

助者五苓散分別之在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治

標之霸道也從輕汗以參蘓飴吐以二陳湯加防風桔梗

探之分利五飲湯下劑開結枳木丸中潤間以小半夏湯

古葶藶散枳木丸溫中化痰丸清氣化痰丸半夏溫肺湯

隨靈實加減常法順氣與分導古法順氣為先分導吹之

不必太泥痰氣順氣煎痰湯因火動者曰痰火清熱瀉痰湯因濕動

者曰濕痰瀉痰湯主之通用二陳湯能使大便潤而小便

長尤為分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏

加姜附姜汁火加石羔青黛濕加蒼木白木煨加瓜蒌杏

仁老鬱痰加海石苦硝瓜蒌食積加山查神麩麥芽陳水
 加檳榔痰在脇下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰
 在經絡用此探吐痰在皮裏膜外下溫中潤肺家痰原
 加白芥子竹瀝姜汁氣實用荆瀝
 動按脾胃客於肺水升火降脾胃調和痰從何生○陽虛腎
 寒不能收攝和水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者八味丸
 三味安腎丸黑錫丹以鎮墜之如痰壅發厥者藟子降氣
 湯三生飲苦瓠禾用○脾虛不能運化者宜補中燥濕六
 君子湯加竹瀝姜汁勞役傷脾失升降者補中益氣湯加
 半夏竹瀝姜汁○氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜
 溫中燥脾二陳湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯○陰
 虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加員
 母麥門冬瓜蒌仁桔梗潤而降之或腎氣丸三一腎氣丸
 語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有
 拒格之患風寒痰氣內鬱不用溫散亦何以開結帶吐皆
 難拘於無補也凡痰喘聲高脉散汗出如油身冰冷者死

六鬱仍分痰火積

痰鬱則血不行血鬱則食不消而成癥瘕六者皆相因
 為病以致當升降不得升降當變化不得變化故法以順
 氣為先降火化痰消積分多少治與諸氣大同凡病
 當先尋六鬱與痰火有則急治於此無則依雜症治久則

升散三焦通鬱本病久不解因服藥雜亂而成又有鬱久
 等開提其氣以升之如食在氣上提其氣則食亦自消痰
 鬱火和在下二便不利者二陳湯加升麻柴胡小芎防風
 以升發之熱鬱升陽散火湯火鬱火鬱湯主之當氣痰滿

看發在何經加各經火藥又五鬱治法見第七卷
胸血能食 陳湯時以六鬱湯料泰之此雜病治法總要也
 氣鬱胸滿脇痛脉沉瀉加木香檳榔烏藥蒼朮小芎倍香
 附破仁痰鬱胸滿動喘急起則怠惰寸脉沉滑加南星

香附瓜蒌仁海石血鬱四肢無力能食小便食脹濕痛熱
 淋大便結脉沉芫瀉加桃仁非汁牡丹皮

目蒙

盛加山查神麩麥芽傷冷食胃脘痛加草豆乾姜濕
濡週身關節走痛首如物蒙足重亦然遇陰寒便發味沉
加黃連倍山桅車翹六翳不言風寒者風寒翳則為熱
故也但諸翳挾風加防風苦參挾寒加吳茱香附紫蘇月

營愚者眠食廢

先順後逆雖不中刑病從內生令人飲食
用香鹽散暗時擦牙有鬱結在脾半年不食或午後發熱
酉戌時退或煩悶作渴加嘔或因時如癡向裏坐亦喜向

暗處婦人經水極少男子小便點滴皆憂思氣結治宜溫
暗湯或二陳湯加參木紅花痰火甚者以痰藥吐之

後用越婢有志養陰神自充
先調理有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充
有志養陰神自充

積熱

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒
實熱因日服金石灸
在中焦則胸滿乾嘔作渴在臟腑則大小便閉法當清心

解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱
熱三黃湯大金箔丸虛熱因消燥腎水相火炎上口燥

煩渴精神短少心憊自汗懶於動作夜卧睡語法實分氣
常降火滋水三補丸主之或只清之潤之而已

血清各經血分實熱回順清涼散氣血俱實熱洗心散耳
露飲澤瀉湯心熱單瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉黃散

肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱瀉赤散胃熱瀉胃湯大
積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒
積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒
積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒

一二外因新損容易復外因感寒久則損陽自上而下

便是一因新損容易復損於肺則皮聚毛落二損於心則

為肌膚治宜幸其若淡過於胃則不可治矣感熱久則損

陰自下而上。一損於腎則骨痿不能起於床者死。二損於

肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消越治宜

酸苦若鹹過於脾則不可治矣。又於外因驚而奪精汗

出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗

出於脾則損肉飲食飽甚汗出於胃則損腸持重遠行汗

出於腎則損骨治宜酸苦若辛散於心則不可治矣。抑論

陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾

者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其

精是以古方肺病見四君子湯心損症見四物湯心脾

俱損者八物湯心脾及脾胃俱損者十全大補湯肝腎俱

損者牛膝丸雜症新虛遺者桂枝湯加龍骨牡蠣四肢

煩熱酸疼心悸腹痛者小建中湯汗多力火筋骨拘急者

續養樞中湯氣弱脈虛者滋陰湯熱者八寶散有汗朝

虛有汗潮熱者人參養榮湯血虛魚汗潮熱者茯苓補心

湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加勞

半夏大病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸

慾又虛成內傷內因五勞六極七傷積虛成損積損成傷

即六慾應六腑蓋心勞曲運神機則血脈虛而面無色驚

悸寢遺盜汗極則心痛咽腫肝勞蓋力謀慮則筋骨拘攣

極則頭目昏眩脾勞意外過思則脹滿少食極則吐瀉肉

削四肢倦怠關節有背強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹

冷胸背痛極則毛焦津枯咳嗽開熱腎勞矜持志節則腰

骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也若

原因腑虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰

精極令人精濁壅弱核小故又曰六極極即傷也七傷者

惟原勞極之由又視傷血又卧傷氣又坐傷肉又立傷骨

又行傷肝房勞思慮傷心腎則陰血虛勞夜饑飽傷胃腑

則陽氣虛此傷症之至要也。陰虛因物湯二宜丸腎氣

先火動外潮者四物湯加知母黃栢或滋陰降火湯丸加

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

未道遙散補陰丸火燥甚者大補陰丸單天門冬膏○湯

虛四君子湯保元湯火衰中寒身冷者鹿茸大補湯養

散加減內固丸三仙丹溫腎丸溫肺補天丸英龍丸○陰

陽俱虛八物湯固真飲子或丸八參養榮湯或十全大補

湯加茯苓附子半夏麥門冬或八味丸有火者二至丸異

類有情丸○心虛入參固本丸慶授天王補心丹朱子讀

書丸肝虛天麻丸鹿茸四斤丸脾虛參苓白朮散橘皮煎

丸養木膏白朮膏參苓造化焦太和萎肺虛單人參膏單

五味子膏腎虛小兒絲子丸玄調和心腎養脾胃不論陰

兔固本丸三味安腎丸太極丸調和心腎養脾胃陽損傷

皆因水火不濟火降則血脈和暢水升則精神充滿或心

腎俱虛或心脾俱虛或心肝俱虛或肺腎俱虛或五臟俱

虛但以調和心腎為主兼補脾胃則飲食進而精神氣血

自生○謂和心腎虛中有熱者舌卷心腎丸虛中有寒者

究源心腎丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸挾熱與

兼補脾胃二神交濟丹還火丹天真丸返本丸挾熱與

索細酌量虛者下虛也熱者上熱也又言虛寒者正氣虛

勞邪熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞則熱則尿赤陰赤肝

鳴溺閉三白湯士之心熱加黃連木通麥門冬生地肝熱

加黃芩防風當歸龍膽草赤芍脾熱加山梔石斛升麻肺

熱加知母桑白皮秦元草薏腎熱加玄參赤茯苓車前子生

地更黍積熱門虛炎冷法○挾氣者交感丹古菴云心腎

主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉

肺脾也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是

補肺脾而瀉心腎也芎藭力藥川辛香燥劑以能健脾進食

然陰血消而心腎損以致虛極火炎而紅發喘痰多身熱

如火跌腫溇泄脈緊不食者死噫凡虛從來養性延年藥

皆陰血陰氣虛也若真陽虛亦不可為從來養性延年藥

只是中和効更長氣自充非溫藥峻補之謂也精不足者

補之以味必天地自然之味非膏粱之謂也今人無病貪

補而致病者有之有病貪補而不依症用藥反增痰火者

有之非惟不足御疾延年亦非養心養性之道且少年慾

火正燥左直戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體

軍從緩治不可責効目前反致奇疾大槩腎虛者要玉膏
還元秋石九延年益壽不老丹耳以衰者還元丹西聖不
老丹松栢實九腎虛無火者何首烏九卻老烏鬚健陽卅
腎虛有火者八仙添壽丹流瘦者天造九紫烏車卅血疾
者女貞卅摘葉煎楮脂九符金卅風疾胃火者松脂九松
榜九風疾無火者仙人飯痰火湧泄者茯苓煎氣弱者單
人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎
俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沉痼大補氣煖胃脾人身真陽耗散脾胃虛弱加以食啖

謂之沉寒積冷不飮謂之痼冷宜十全人補湯鹿茸大補
湯加姜桂雄附以滋氣血補煖下元若原只因生冷傷脾
者四柱散附子理中湯補真丸專補脾胃可也又有陰虛
內熱因傷冷藥及將息失宜變成寒中之全以養脾為主只
宜理中丸二神交濟卅夫白芍男精女帶生駕奇或暴下
或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沉香韓滄放

遺精金鎖正元丹究源心腎丸疏苓丸崩帶見婦人門膠

寒肢冷心腹痛腦髓寒者三五七散四肢冷者古姜附湯

附湯血虛冷者古草附湯過身冷昏暈者三建湯順元散

心腹絞痛甚者椒附丸復陽丹挾外感者正氣補虛湯

剛劑慢投恐腎衰金液丹黑錫丹養氣丹逐除卅蓋皆金

常服恐水枯火躁元陽取陰取陽魚過治玉冰此語亦吾

脫矣陽臟性急者禁服取陰取陽魚過治玉冰此語亦吾

師古以三建湯治心經之元陽虛者責其無火也火補陰

者陰陽之氣耳不善調攝偏熱偏寒病未至甚治之不難
若夫積熱始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之
從之不愈則技窮矣由是苦寒痼歲而弗停沉寒始而溫
和次而熱取熱取不愈則因寒而從之不愈則技窮矣
由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者
由於真水之不足也以熱治寒而寒不衰者由於真火之

醫學入門卷之四
不足也。不知水火不足。泛以寒熱藥治。非惟臟腑習熱藥。反見化於其病。而有者弗去。無者復至矣。故取之陰。所以益腎水之不足。而制心火之有餘也。取之陽。所以益心火之不足。以勝腎水之有餘也。火之原者。陽氣之根。水之主者。陰氣之根。非謂火為心而原為肝。水為腎而主為肺也。此太僕達至理之妙也。又積熱用苦寒藥。必姜汁酒制。沉寒用熱藥。如附子必用童便蜜製。蓋寒因熱用。熱因寒用。恐相違逆故也。

右雜病提綱。雜病者。或兼外感風寒暑濕燥火之氣。

或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情。外感驟則為四中。內傷久則為沉痾。所以提之於前。以見其為百病大綱。

其餘症皆由此變出。醫能知此門戶。又能知從頭至足。

問症之法。第一辨其為內傷。取為外感。即外感。手背熱而口能知味。內傷。手心熱而口不知味。外感傷風惡風。

面光有汗傷寒。惡寒面慘魚汗。傷暑惡熱煩渴面垢傷。

濕惡濕重着面黃。內傷勞後傷氣。則惡勞而心口不痛。

飲食傷脾。則惡食而心胃刺痛。若夫色慾傷腎。則愈好。

色而骨蒸。口多嗜味。陰虛火動故也。七情思慮傷心。與。

脾則益善思。而恍惚不寐。憂怒傷肺。與肝則愈動氣。而。

痞滿眩嘔。口仍失味。諸氣怫鬱故也。一切血症。日輕夜。

重。一切痰症。食少肌色如故。一切火症。性急潮盛。一切。

水症。脇硬心下怔忡。至於辨症虛實。俱以似傷寒陽症。

者為熱且積也似傷寒陰症者為虛且寒也又辨其內
外有魚相兼多寡或不內不外而為本經自病男子必
審勞勞女人先問經孕與所處順逆及曾服其藥然後
証之以脉萬無一失噫機括熟而門類顯者惟不脉而
藥可以廣及然亦難乎其人之妙悟也病家一時緊急
尋醫辨症且將此提綱理會亦不致差門戶以後分類
有言外因風寒暑濕內因七情痰血痰火食積而不詳
言其症者正以括之於此也以意會之醫門斯可入矣

雜病分類

風類

頭眩

頭眩欲倒辨瘦肥

或云眩暈或云眩冒眩言其患暈言其轉言其昏一也虛者內外之邪乘虛

入表而上攻實者內外之邪搏痰上結而下虛大輒肥白人
人多濕痰滯於上火起於下痰因火而上衝所謂魚瘦不
作眩者是也治宜以痰為主煎補氣降火瘦人多腎水虧
少相火上炎而眩暈所謂風勝則地動火得風則煽旋是
也治宜滋陰降火化痰抑肝此以肥瘦為主亦丹溪常法也後倣此
眼花昏暗屋旋飛經曰招尤狗蒙者如以物蒙其首招尤者招搖不定如立舟車
之上起則欲倒眼昏耳聾屋如旋轉甚則卒倒不省人事
乃肝筋主也又曰諸脉皆系於目臟腑筋骨氣之精而與
脉并為系上屬於腦後山於項中故和中於項因逢其身
之虛其入深則隨眼系入於腦則虛弱老年陽陷越內傷
勞役

氣虛不能上升或汗多亡陽宜補中益氣湯色慾傷腎氣逆不能歸元四君子湯加天麻防風或十全大補湯胃氣先加鹿茸血虛因產後金瘡及吐衄亡血孤陽浮越舌少歸湯加炒乾姜痰血滯胸如章便老年每早起眩暈頭史自定有風痰虛火者果係陽虛順氣散吞黑錫丹以鎮墜之上機謂丹藥金石助火火竄散氣多致飛越之亢豈能鎮其不火痰暈甚氣痛肩加本連蒼朮羌活二陳湯歸之氣耶

實屬陽明者單大黃酒炒為末茶清下或古荊黃湯加防風等分屬太陽少陽者酒芩白芷等分為末茶清一虛火半夏白朮天麻湯七情臟氣不平運迷心竅眩暈眉稜骨痛眼不可開者七氣湯七夜湯補虛飲風則項

強寒拘痛 外因風脈浮有汗項強熱者芎藭茶調散或參朮更散或四物湯加秦艽羌活通用單白朮九又大風頭眩手足麻痺胃脘發痛乃風寒濕痺合至必有停飲在

上宜量吐之○寒脈紫魚汗四肢拘急筋掣頭制著煩渴痛而欲飲喜熱手按者用升散湯頭五此散

外邪和解清痰火內虛本固標自移 凡

湯或腎着湯加川芎風濕玉壺丸因量施補益昔丹溪治婦人帶下頭眩專治帶而眩山安蓋頭眩頭痛咳嗽病之標也經曰治病必先其本○通用一陳湯七情加丁香砂仁白朮風痰加天麻白附子荆芥防風寒痰加乾姜良姜熟痰合解毒湯濕痰合芎藭湯停水心悸合五苓散酒食傷加乾生薑胸中宿痰眼滿手麻痺髮脫健忘者用本方探吐吐後宜服清上辛涼之藥調之氣虛倍參芪血虛倍芍歸痰盛加竹瀝姜汁火盛加童便如眩暈氣上衝胸戰者只宜茯苓其水甘草湯加減○凡眩暈言亂汗多下利時時有胃者虛極不治

頭痛

厥頭痛將內外交 真頭痛引腦黃泥先盡痛手足冷至節驚學入門卷之四

甚則發厥。頭分之外感寒熱表家論。外感頭痛。必有寒熱。宜

內外二因治之。消風散。風熱川芎石羔散。風寒三五七散。風寒

入腦連齒痛者。尋辛湯。或羌活黑附湯。去附栝加桂枝。腦

風項背快寒。腦戶極冷者。用麻黃細辛全蠍。藿香各五分

為末。荆芥煎酒。或茶下。寒症連鬚葱白湯。葛根葱白湯

○暑症香薷散。加茵陳葱白。或大半夏湯。姜汁為丸服。○

濕症芎朮湯。濕熱心煩痛起耳中。古防風湯。加酒芍蒼朮

蒼朮子細辛。為末茶清入姜汁。少許調服。熱多者酒芍為

末。茶清下。○通用。陳湯加芎並為主。太陽惡風寒。脈浮

緊。加羌活麻黃川芎。陽明白汗發熱惡寒。脈浮緩長。加升

麻芍根白芷。渴者宜合白虎湯。加吳萸白芷。少陽寒熱往

來。脈弦。加柴胡黃芩。如三陽胸膈宿痰痛。久不止。令人喪

明。宜合川芎茶調散。探吐。太陰體重腹痛。脈沉。必有痰。加

蒼朮南星。少陰寒厥。脈沉細。加附子細辛。厥陰吐沫厥冷

脈浮緩。加吳萸頭項皆俱痛者。宜合羌吳湯。肥人加三

苦頭痛。加細辛。巔頂痛。加藁朮升麻防風。內虛氣滯。太陽

痛。中益氣湯。倍川芎。加知母蔓荊子。或四君子湯。六病後

及諸虛痛者。四

血虛魚尾上生。嗔。古芎歸湯。或回物湯。加

桂散。加茶一撮。

腎虛巔痛七情。嘔。腎厥下虛

氣血兩虛者。調中益氣湯。加

川芎細辛。挾火者安神湯。

痛不可忍。麻藥之則弦。按之則堅。宜五真丸。七情氣厥

心腹脹滿。嘔吐酸水。宜古芎烏散。新蓋也散。挾痰如聖餅

子。頭與心換痛。痰火食積皆同因。痰厥頭旋。眼黑。言亂。患

者。古薑蒼湯。

痰火食積皆同因。痰厥頭旋。眼黑。言亂。患

者。古薑蒼湯。

木天麻湯。鱉殼湯。加芎辛。三生丸。○痰火痛甚。如破。三陳

湯。加芎連。或清空膏。清上瀉火湯。如世實人。只宜酒炒。大

黃為末。茶清下。○痰飲喘痛者。神芎丸。有伏痰者。瓜蒂散

吐之。○積聚痛者。大黃備急丸。○九頭痛。數日不食。百藥

不効者。三氣用。無熱者。黑錫丹。常服。點頭散。斷根。○尋常

頭日不清。似痛非痛。參蘊飲。主之。風熱者。徹清膏。茶連煎

湯。調下。沐浴後

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

者。單白逆丸

頭風 附眉稜骨痛

頭風項強分偏正

風入腦入項入耳入鼻自頸項已上耳

目口鼻眉稜之間有一處不若吾體皆其漸也。有頭皮浮

下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作眩暈

之狀甚則項強硬身體拘急宜川芎茶調散或祛風通氣

散上之此正頭風也。偏左痛者多血虛或有火常風熱

偏右痛者多氣虛或鬱滯或痰或濕要知正痛常燕左

右病和凡頭痛**兼濕兼熱陰煖定**風濕腫痛連有背或過

久則為風也。湯加刺防薄荷便閉更加大黃微利之熱微三陳湯加酒

湯加刺防薄荷便閉更加大黃微利之熱微三陳湯加酒

六防風**濕痰痛窠多右邊**濕痰發則痛窠無間三陳湯加

考並

血虛脫種為左病血虛者朝輕夕重古勞歸湯或四物湯

陽虛甚者單白芷九用參附煎湯下**久甚火鬱暴重**綿

發時悶痛必欲綿怕暴包者熱鬱也宜涼血瀉火為主在

以辛溫散表從治三陳湯加酒炒黃芩及荆芥薄荷川芎

石羔細辛或消風百解散同風通聖散。有三陽熱鬱頭

痛不敢見光喜置水於頂者宜辛涼汗吐下三法併行乃

愈又有偏痛年久便燥目赤眩暈者乃肺乘肝氣鬱血壅

而然宜大承氣湯下之外用大黃羊硝為末井底泥調塗

兩太陽穴**不妨外感相兼併**寒頭面多活宜分偏正專治

上乃愈

頭風而外感自散如頭風發方愈而後外感自汗者加冰

烏荊丸因七情發多吐逆寒熱者參薈飲主之無寒熱者

三陳湯加**眉稜眶痛或羞明魚非痰與風熱甚**風痰眉心

烏藥川芎

湯吞青州白丸子眉稜骨痛連目不可開晝靜夜劇身重

者真痰湯濕痰眉眶骨痛體重者尋辛湯合真痰湯加川

烏白木寒濕尋辛湯加川烏附子姜桂南星。風熱眉稜

骨痛甚者尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

尋防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

醫考... 金棗... 湯加... 氣虛... 扶風... 安神... 湯... 痛甚... 者... 熟地... 黃芩... 或... 河物

面風

面腫虛食熱不食

面腫乃食後胃風所致能食者風虛面

熱內傷氣促者升麻... 頰腮同此分虛實

仍以能食為風虛不食為風熱... 齒腫出血者胃火

也清胃散... 益氣湯... 後微腫者腎虛也

中益氣湯... 耳後微腫者腎虛也... 腎氣九料水煎服詳外科

腮陽盛面執陽衰寒... 手足陽明經氣盛則身已前皆熱風

加黃連... 犀角... 下兩三行... 以升麻葛根湯加黃連川芎

芥薄荷調之... 如陽明氣不足則身已前皆寒寒濕上逆則

回反不能耐寒... 先以附子理中湯數服... 以升麻葛根湯

乾姜散... 生瘡總是胃家疾... 腫者俱宜金沸草散倍黃芩或升麻胃風湯加減

用杏花煎湯洗之... 如生五色瘡只用鹽湯綿浸搭瘡上日

五六易如生粉刺... 搗免絲子汁塗之內服樽皮散○面皮

裏痛者用何首烏為末姜汁調... 敷以帛蓋定灸熱鞋底熨之

眼病須先分表裏

外風中腦火濕漬頭上熱逼冷灌睛

枕血帶痰壅或胃砂塵或撞刺撲損湯泡火燒皆傷目之

標內因五辛炙燥酒麪濕熱痰火房室損精勞後傷氣泣

淚刺頭傷血暴喜暴怒暴驚極目遠視夜書細字鏤刺轉

寐傷神皆傷目之本初起在腑為表當除風散熱久則入

厥入裏當養血安神然內因物五輪八廓亦此理屬三陽

部分裏症多屬三陰部分要知以肝為主表裏虛實不遇
五行生剋之理。八廓不必深泥舊說七十二症今纂計于
內更不重。五輪白肺烏珠肝白屬肺氣之精曰氣輪氣症
七情氣滯則血凝紅膜薄如

復便覽。傘紙日久變成白膜者難治。熱症白睛潤濕浮而赤腫
筋多重者生紅花翳痛澁有淚年深睛變碧色滿目如凝
脂赤路橫直如絲宜四物湯去芩。換土當歸加甘草。虛
症白睛枯槁氣沉而濁。烏珠屬肝筋之精曰風輪風症

睛因兩臉不歸中如轆轤轉開難治。熱症赤暈浮聚重
者烏珠忽然如針刺痛雙日緊急或突出豆許如鑽睛者
忌點或生翳似旋螺尖突起或周圍生翳如錐齒如棗花
四五枚相合赤色刺痛或生翳四邊皆白中間一點黃心

或生翳如王色浮滿不痛者忌針割或生青色翳兩皆澁
痛或翳如木色堅實傍觀逼透瞳人。虛症輕者枯黃遠
睛重者烏珠上一點圓翳口中見之。差小陰處見之。差大
或一點黑翳如小豆疼痛淚出者忌點。又肝虛雀目曉明

晚暗乃所稟血虛有火也。年深則盲黃風雀目者木表土
底膠結黃睛振如宛宜都有淚。不治生翳木橫如筋肝
下面微微甚薄不赤不痛或浮翳如水光白色環連瞳人

物生自小背頭至烏珠上不痛痒魚血色相潮或翳如凝
脂邊厚邊薄形如缺月色光無瑕或生翳經年如銀釘也
入烏珠或因他病生翳。心與小腸內外皆內皆屬心外皆
屬小腸血之精

物甚微後遍睛俱白。曰血輪熱症輕者赤脈纏皆重者赤脉漸七。侵睛或皆頭
結聚生瘡流出膿汁涎水粘睛上下乃風熱留臉中宜白
薇凡。氣在努向攀睛或先赤爛多年肝熱所衝或用力
作勞有傷肝氣而成或痛或痒兩皆勞出心氣不牢憂思

不已遂乃攀睛或起筋膜宜大黃黃芩。上下兩胞胃與脾
防風薄荷等分入蜜煎服或定心丸。肉之精曰肉輪又上胞險內銳皆係足太陽起脉。風溢
輕者胞弦緊急重者上上胞險似珠塗而生瘡久則生翳乃

風熱也。或眼皮有如膠凝腫似充李時出熱痰乃風毒也
宜點花草膏又爛弦風痒甚。双手背揉日久兩險赤爛粘
滯經年不安宜三稜針刺日。眶外以濕熱內服消風散
桑白皮煎湯調服。又倒睫拳毛淚出消消翳膜漸生午愈

乍發經年不安眼皮膚漸急如針刺痛腫人不安乃脾受風熱當去內熱退火邪令眼皮緩則毛出翳退外用手法翻內臉向外以三稜針橫刺用左手爪逆其針鋒出血再用木鑿子搗爛綿包成條左患塞右右患塞左鼻中其毛白必先宜瀉肝散後服五退散又上下臉俱翻出或一臉翻出在外乃脾風熱也○熱症輕者臉紅赤硬睛疼淚出羞明重者兩臉上下初生如粟漸大如米或赤或白不甚疼痛堅硬乃肝壅瘀血也宜加味荊黃湯又臉內生如鷄冠蜆肉或青或黑阻碍睛痛乃脾風熱也須翻出看之用規音草每日輕七微七漸七括圭毫釐血出用金匙挑洗風毒藥水按而止之刮後不復腫

腎水一點黑瞳子

時將藥水點入則不復腫腎水一點黑瞳子骨之精曰水散大視物不真火盛則瞳人焦黃虛冷則瞳人青綠火勞則痛○熱症瞳人內湧輕者如不患眼人但微有頭旋生花或勞力轉加昏蒙或頭旋相牽瞳人連鼻漏皆痛時起紅白或黑花吐逆肝熱則先左肺熱則先右肝肺熱則左右齊發重則生翳瞳人上如凝脂色溢痛無淚或滑翳如右銀珠于微含黃色懸遮瞳人或散形如魚鱗或如魚鱗下起粟子而爛瞳人痛甚又白翳旋遠瞳人點點如白花鱗砒皆肝肺相傳風熱也又黑水上橫深瑕藍青色沉沉深入痛甚乃分臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺乃肝血無歸宜通血丸又瞳人被物撞打驚痛昏暗眼睜停留血宜貼地黃膏次經決明散如撞刺生翳經久復被物撞轉加昏暗者難治經効散救之又飛絲砂塵入眼瞳人不妄單瞽麥為未驚涎調敷或新筆蘸京黑點之又湯泡火燒腫痛者不可用冷藥即點待一口後以五行湯溫洗及地黃膏敷之○風症則瞳人青或瞳人連皆頭皆痒不能收臉乃膽受風熱宜防風一字散○不治症瞳人乾缺痛流無淚或白藏在黑水下向日細視方見或內眼相傳疼痛早輕夜重或內障五色相間頭痛無淚日中如坐暗室或雷頭風熱毒氣衝入睛

八廓寄位始有名

八廓寄位始有名廓位兩退白睛中間屬肺與大腸坎為水廓位瞳子屬腎良為山廓位神光屬膽震為雷廓位白睛上截向小背屬小腸巽為風廓位烏珠瞳人外屬肝離為火廓位大小背屬心與命門坤為地廓位上下臉屬脾胃兌為澤廓位白睛下截

向大皆婦人小兒大同耳婦人活血為主有孕忌用脂點

屬勝脫服眼毒散外洗解毒湯切忌披針灸。小兒初生胎風

雙目紅而垂邊赤爛至三四歲不愈宜消風散桑白皮煎

湯下又小兒通睛欲觀東邊則見西畔若振掉頭則睛

方轉此肝受驚風宜牛黃丸又小兒眼胞患奕瘡熱氣衝

透睛中疼涌淚出翳如銀片腫難開宜柴胡散神醫散

又小兒臉中筋生如麻仁日漸如豆懸垂臉內乃風熱攻

脾宜五退散加減又小兒并眼物起造疔久生瘡翳腫痛

乃肝風所衝或病後虛熱上攻者俱忌點宜還睛散疔瘡

眼詳疹疔。小兒不治疔胎中受風五臟不和嘔吐黃汁

兩眼青盲不明及物生視物近看轉睛不快至四五歲瞳

人結白昏暴赤腫痛澁且痒或飲食積熱或天行赤目可

暴赤腫痛澁且痒或飲食積熱或天行赤目可

血熱痰壅則目暴赤腫痛為熱痒為風澁為毒不可藥用

涼藥因成內障亦不可誤用溫藥助熱致令昏澁淚努

齒繫睛等狀是成外障決明散主之又有瞻竟目赤腫良

度而痛者名曰肝勞但須閉目調護又中惡崇卒痛翳膜

如針刺或如火灸及太陽穴痛早輕夜重宜決明散

眩昏總是表暴赤後黃膜從下生而上衝黑睛痛澁難開

乃脾受風食毒可治如赤膜從下生上遮覆黑睛名垂簾

膜乃客熱上衝也難治又重則生翳障狀如珍珠碎米紅

色自下而上者易治狀如梅花葉白綠自上而下者難治

治法宜先去翳而後清熱若先去熱則翳難去。眩淚熱

而交流兩臉赤者屬肝熱之甚或衝風淚出由熱甚而水

化制之也又肺受風寒則風冷則流淚尤甚者白美人散

風淚不止。食後吞常婦龍脊丸數粒。目昏者熱鬱也甚

則平白日無所見故傷寒病熱極則目昏而不識人目微

昏者至近則轉難辨物或如隔簾視或視如蠅翅或見黑

花皆目之玄府閉塞而致榮衛精神不能升降故也若患

風疹者必多眼暗攻其風則暗自去。抑論脾家受毒則

眼白亦腫神勞則眼暗亦痛心熱則血灌瞳人傷風則淚

亦出虛煩則眼亦昏勞力則背亦赤生瘡。裏虛昏昧最羞

乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變。

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

裏虛昏昧最羞

明上虛屬肝虛必頭暈目眩耳聾下虛屬腎虛必眼花睛

日但內虛全內障黑花瞳散香內障昏蒙外無翳膜因

色或菜豆色或如雲烟或見五色治比外障更難如脂

凝結瞳人反背者不治○黑花者腎虛也五色花為腎虛

客熱者瞳人散大視物昏冥○近視陰虛遠視陽能遠視不

散者一或二屬肝腎虛宜腎氣丸地芩丸或如降火淚冷晴

之劑○能遠視不能近視者屬心虛宜定心丸

疼多縹緲散有肝虛客熱迎風冷淚者歸葵湯古木賊外因

風熱濕挾痰外因風則胞白兩眼拘急牽引嚼斜痺而青

氣敏撥雲散外因風毒散防風一字散犀角飲選用○熱則

珠突明散癰紅刺痛洗心散還睛散通肝散瀉肝

散決明散癸羊角散蔓刺散加味刺黃湯瀉青丸涼膽丸

升麻葛根湯歷考眼科魚寒而有虛豈寒泣血而內傷氣

不上攻取○挾痰者則痛甚宜小背風湯南星丸

血精神火內傷七情氣壅臃腫而軟酸澀微赤水膏

羌活石羔散因過思勞神大志丸育神夜光丸因驚恐者

定心丸因怒者當歸龍膏丸○內傷飲食勞倦損脾胃氣

火盛血脈沸騰益氣聰明湯磁砂丸還睛丸氣弱甚者單

人參膏補中益氣湯如脾胃熱薰有宿食者秦艽大黃為

未砂糖調服利之脾胃濕傷內外障者椒目丸鹽水散傷
熱酒胃氣汚濁血死目盲者繡水煎湯調入參末連真與
手掌紫黑者四物湯加桃仁紅花蘇木煎湯調入參末服
○內傷色慾腎氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸服
血虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎虛者駐景丸○抑論五
臟六腑精華皆稟於脾注於目故理脾胃則氣上升而神
清也又肝之系雖總於目而照徹光彩實腎精風熱蕪虛
心神所主故補精氣安神者乃治眼之本也

亦有之

風熱防風黃芩湯火為君黃連當歸養血為臣柴胡赤芍

風熱防風

黃芩湯火為君黃連當歸養血為臣柴胡赤芍

白芷消腫

止痛為使白睛紅者加白豆蔻火許瘦人血虛

宜口裏

瘧疾肥人多風虛者防風一字散四生散補肝散還

熟地黃丸

○通用羊肝丸久甚者退翳丸活命羊肝丸

古人只消

一火字了也肉輪赤腫火乘脾也黑珠五色花

翳腎虛火也

神光青睛被翳肝虛火也赤脉乘血貫目溢

痛心火自甚也

故童子水在上則視明瞭老人火在上則

視昏眊實火氣有餘

宜前風熱藥中加枳壳杏仁以破氣

虛火血不足

宜前養陰藥中加知母黃柏以降火黑睛有

翳者倍之

蓋散有餘之火在於陽衰火少却宜溫或勞慾

破氣陰不足

之火在於枝葉陰

涼藥過多

以致渾身手足麻木九竅不利兩目緊急青白

睛視大眊

視物無力者宜補陽湯黃芪湯或壯火之主

陰翳養陽是也

今人不分陰陽專以龍腦辛香石藥搽點

而不知幸散

外治點洗要手巧

血稍虛者

宜服藥以塞其源藥水洗之生有雲膜方可用

點若無翳膜

縱火但可洗之却忌過用涼藥冷水洗水血眼

耳

耳聾虛熱

分新舊新聾多熱少陽陽明火多故也宜散風

也宜滋補

通竅之劑脉虛以腎為主遲濡為

虛浮動為火

浮大為風沉澹為氣按實為熱

相火右

耳聾色怒動相火則左右耳聾三者忿怒為多痰火

香子香
飲酒過
味上香
布疾交
作清痰
多角者
久在左
及為惡
得者星

風濕氣閉可通
痰火因膏梁胃熱上升兩耳蟬鳴蒸筋甚
則氣閉漸響眼中流火宜二陳湯加黃柏

木通篇蓄瞿麥因酒若通聖散加南星枳壳大黃或因痰
丸○風聾因風邪入耳必內作痒或兼頭痛風熱或因聾

者防風通聖散先將大黃酒煨又酒炒三遍後入諸藥俱
用酒炒煎服風塵連頭目不清者清神散風虛者排風湯

桂香飲考並散○濕聾因雨水浸漬必內腫痛涼膈散加
羌活防風俱用酒炒或丑為散加陳皮枳壳紫蘇生薑濕

痰神考九濕熱挾氣求香檳榔丸○氣聾因臟氣厥逆上
難入耳寐寐不通必兼眩暈實人因怒者骨歸龍丸虛

人因思者或香散憂滯者流氣散子加
膏蒲上威下虛者秘傳降氣湯加首蒲**虛勞精氣脫難救**

虛聾因久瀉或大病後風邪乘虛入耳咳氣相搏嘈嘈而
鳴或時眼見黑花陰虛者四物湯加知柏首清遠志或腎

氣丸如磁石故紙充絛子黃柏陽虛者天味丸益腎散磁
石湯○勞聾昏聩噴噴瘦瘁乏力因勞力耗氣者補中益

氣湯加首蒲行火者加知柏茯苓因房勞脫精者又參養
藥湯加知柏或補骨壯丸如久聾腎虛氣虛絕不聞者難

治耳鳴乃是聾之漸
惟氣閉多不鳴便聾風熱鳴者飭甚
湯加生地知母或通聖散痰火鳴甚

當歸龍益丸挾濕神考丸或青木香丸腎虛微鳴滋
腎丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下陰虛虎潛丸**停膿**

痰皆風熱湊
停耳原有油液風熱搏擊結核鳴欲聾者外
用生豬脂地龍銅煉等分姜汁和丸棗核大

綿裹入耳令閉桃去重者內服胡聰耳湯○膿耳風熱
上壅流膿外用枯礬五分陳皮明脂俱燒灰各二分藜五

種為末吹入或枯礬末亦可疼甚用吳萸烏頭尖
乾痛者風熱或屬虛火有血水者風濕外用蛇退燒存性

為末吹入或枯礬末亦可疼甚用吳萸烏頭尖
大黃搗爛倉足掌心重者內服東垣用粘子湯**大要調氣**

與開關
竅腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣一
身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣開
竅間用磁石羊腎丸開竅蓋聾皆痰火鬱結非磁石鎮降
烏桂椒辛薑蒲辛散流通則老痰鬱火何由而開然亦切
劑也愈後以通外治暴聾亦可透暴聾用耳遂為九塞耳
聖散和之可也

松香五錢溶化入巴豆甘草粒葱汁搗丸綿裹塞耳左聾塞
 右聾塞左雙聾次第塞之○凍耳用攪核燒灰油調搽
 如爛貝母末乾糝○百虫入耳用清油灌入○口吸氣久自
 出如蜈蚣入耳用信花雄黃各一錢為末先用一字點耳
 中次用循尿灌之取循尿以生薑擦牙自出又方用琴弦
 一段將絃頭畧軟二分蘸鵝膠入耳粘出九即不宜厚被
 覆塞耳氣久則不通故養
 生者常摩耳廓以防聾也

臭

臭塞須知問火新。臭竅於肺而能知香臭者心也。人身水
 息而已。苟或寒傷皮毛則臭塞不利。火鬱清道則香臭不
 知。新者偶感風寒。臭塞聲重。流涕噴嚏。宜以風寒治之。尤
 味羌活湯。參蘆飲。消風百解散。久則累感風寒。臭塞等症
 便發。乃肺伏火。火鬱甚則喜熱惡寒。故畧感冒而內火便
 發。宜清金降火。薰通氣之劑。京匾散。加荆芥白芷。或川芎

降。宜清金降火。薰通氣之劑。京匾散。加荆芥白芷。或川芎
 湯。澄茄丸。不知香臭者。通氣湯。內有硬物者。單南星飲。貼
 顯單撥餅。餅外用石蒲。皆皂角等分為末。久成麩。衄淵流澤
 綿包塞鼻。仰卧片時。虛寒者通草丸。久成麩。衄淵流澤
 鼻乃清氣出入之道。清氣者胃中生發之氣也。臭塞久則
 氣壅不轉。熱鬱於腦。清濁混亂。為麩。為衄。為淵。○麩者。鼻
 流清涕。熱微。三陣易加。尋歸細辛白芷。防風羌活。桔梗等
 分。姜煎入薄荷少許。久不止者。用黃散。去薄荷。加荊芥黃
 芩。神麩。南星。半夏。等分。食後煎服。計用細辛膏。○淵者。鼻
 流濁涕。熱盛。全沸草散。倍黃芩。入鳳凰壳一枚。燒存性。調
 服。肺風消風散。加髮灰。肺火流涕。咳吐膿血。桔梗湯。入參
 平肺散。○騰移熱於腦。流涕濁臭。防風通聖散。加薄荷黃
 連。或黃連散。外用蒼耳根。垂于燒灰。醋調塗鼻內。○有
 流臭。黃水者。甚則腦亦作痛。俗各腦砂。有虫食腦。用絲
 瓜藤。近根五尺。燒存性。為末。酒調服。虛者川烏散。外用白
 牛尾毛。撥葉等分為末。吹鼻中。倘有血出。加中梔。亦不妨
 ○衄者。鼻流血。臭淵。久則傷酒。鼻衄。傷熱。痛。鼻衄。准頭
 必衄。防風散。主之。詳後。衄血。傷酒。鼻衄。傷熱。痛。鼻衄。准頭

茶黑因飲酒血熱入肺復被風寒鬱久則血凝濁而色充或不飲者乃肺風血熱俱宜四物二陳湯去半夏加紅朮黃本水煎入酒少許調五靈脂木麻和氣飲吞瀉青丸以除病根外用黃連末天吊藤燒灰桐油調敷或硫粉散○鼻癢因風邪入鼻與正氣相搏鼻道不通故痛香正氣散祛風通氣散有痰火衝肺者鼻膈隱鼻瘡鼻痔熱同因膏手陳身加黃奉山拖栝梗麥門冬

輕為鼻癢重為鼻齋皆肺熱也鼻中生瘡者枇杷葉煎湯候冷調消風散食後服忌煎炒姜蒜熱物外用辛荑為末入腦脂少許綿裹塞鼻○鼻痔肺氣熱極日久凝濁結成瘻肉如棗蒂塞鼻甚者又名鼻齋宜防風通聖散加三稜海藻末調服外用辛荑為君細辛杏仁少許為末和羊髓猪脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許為丸綿裹塞鼻數日即脫甚者加硃砂少許或瓜蒂散亦效又食積熱痰生痔者單蒼耳丸內服外敷最消食積或用白礬二錢細辛一錢白芷

疎風降火真要法 風寒外感者溫以散風熱有自內鬱者或外感久則鬱而為熱或因飲食不節久宜養血補腎過暖肝熱五風亦鼻塞流涕宜降火清金

久宜養血補腎 真凡鼻涕孰淵颯又甚不愈者非心血虧則腎水必養血則血生而火自降補腎則水升而金自清雖鼻瘡痔久亦宜又鼻塞久不愈者必內傷脾胃清氣不能上升非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論

口舌唇

口病有熱亦有虛 心主舌脾主唇口然心脾二氣恒相通也心勞味厚病根株

心貴安靜七情煩擾過度則心火炎盛加之飲食厚味積熱而口生瘡或鼻旁心者犀角瑠璃珀膏心勞味厚者氣出腥臭唾涕稠粘口乾舌燥瀉白散加桔梗知母麥門冬葉岑五味子痰熱淺者薄荷煎深者五福化毒丹**熱極**

偏勝口糜爛 熱甚一臟偏勝則口味失常心熱口苦生瘡涼膈散黃連阿膠九肝熱口酸而苦小柴胡湯加龍膽草青皮其草甚者當歸龍薈丸謀慮不決膽虛

口舌人參遠志茯神其草為君柴胡龍膽草為使甚者腎

氣丸脾熱口甘或臭瀉黃散四順清涼飲日露飲三黃丸
肺熱口辛耳枯湯瀉白散腎熱口鹹滋腎丸然肝移於膽

則口亦苦木乘脾則口亦酸胃熱或淡或甘腎化火則苦
而甘要之熱勝則苦寒勝則鹹宿食則酸煩燥則澀虛則

淡疸則其勞傷傷肺則口臭則口糜傍眈後熱小腸瀉
虛熱口瘡糜爛者柴胡地骨皮等分水煎服甚者加硝黃

心胃壅熱水穀不化者瀉赤散合四苓散如熱虛并大
便不通臍痛喘急口瘡潰爛者瀉白湯血熱者鷄納丸中

虛炎上亦難哺口瘡久不愈服涼藥反甚者乃虛炎上攻
中焦不足理中湯甚者加附去下虛甚者

秘傳降氣湯吞黑錫丹二十九陰虛者四物
湯加知栝或補陰丸年久不愈者黑參丸

赤白中瘡赤者心熱用栝若未糝之或喻良久水漱又
喻口中瘡白者肺熱用黃栝單搗等分為末醋調

搽水漱口中瘡赤白者心肺俱熱用文胡索一錢黃栝黃
連各五分青黛陀僧各二錢為末頻搽之或單文蛤末亦

好夏月西瓜水徐徐飲之虛炎口瘡者其早乾姜和勻
如飛翕脫口瘡下寒者黃連乾姜等分噉且服之口

中瘡口瘡生瘡自爛者檳榔燒灰入輕粉火炒為末吹入小
兒口瘡不食以狐惑治之必死用白礬煎湯浸脚半日頃

寬更以黃栝姜薑為末敷之口瘡疼痛巴豆半枚生
研和米飯一豆大杵和此印堂對眉間約半

刻許覺紅就去不可泡起小兒減半用之穢氣含香暫
可除虛火鬱熱遍於胸中乃作口臭因與前同外

舌病內外因可詳候肝脈循陰絡於舌本腎之津液出
於舌端分布五臟心實主

外因強短內腫長外感風寒傳
之故口諸經皆會於口

自白而黃而黑者死卒中者則舌強而短舌卷不言者死
大聚風用小續命湯寒用理中湯熱用栝栝湯加防風枳

壳黃萎風寒濕舌強者用白礬附桂末等分安舌下或四
卷一葉正舌藥內因七情氣鬱腫滿不得息者全沸草

散父不愈者黑參丸外用去霜鹽散因怒者車綉鉄粉塗
之舌腫滿口氣不得吐者各木舌用陳忝陳白梅入巴

醫學入用卷之四

豆七枚同搗成膏清荷水調刷口中得下咽片時即下一
 二行以粥補佳如生瘡連頰腫者參升麻湯○舌腫
 前口不能嚥藥即飲食不通者名重舌用蒲黃刷舌上自退
 如猪胞者以針刺舌下兩傍大脉血出即消切勿刺中脉
 冷血不止誤刺以火燒銅筋烙之血再不止者死或醋調
 鍋煉敷舌上下脫去再敷須臾自消不食者亦死○舌腫
 舌下有舌如蛤蟆則驚頭小白有尾可燒鐵烙烙舌頭上
 即消○舌長過寸腎虛火淡黑一二點宜以生姜蜜水洗
 者單水片未敷之腎虛火淡黑紅後用補腎兼痰火藥
肺痰脹痰熱舌強壅腫肝衄肝熱舌山血如泉心脾裂作
 瘡心熱生瘡破裂卑黃連煎湯服脾熱舌胎乾澀如雪道
 荷蜜水藥丸心脾熱者升麻葛根湯加薄荷黃芩枯梗
唇屬脾家病幾般風潤動寒掀熱裂乾血虛無色氣瘡
重唇唇不食療應難唇緊小不能開合飲食不得不急
 毛燒灰猪脂調搽或撒攪燒灰或黃柏散○內治實者煎
 黃散虛者菊睛丸
 腫者意改仁湯

牙齒

牙齒屬腎胃大腸牙齒骨屬腎之標也精完則齒堅腎衰
 則齒鬆虛熱則齒動足陽明胃絡脉入

齒上縫止而不動喜寒飲而惡熱飲手陽明大腎虛滋陰
 腸終脉入齒下縫動而不休喜熱飲而惡寒飲

腸胃涼多因飲食色慾過度以致濕熱上攻口湧酸水則
 牙床不清而為腫為痛或出血或生虫動搖黑爛

脫落大抵齒銀宜露動搖者腎元虛也宜滋陰補腎入味
 九三味安腎丸虎潛丸惡寒熱而口臭穢者腸胃熱也宜

涼藥瀉火祛**開口便知風與熱**風牙因腸胃原有風邪更
 風清胃散

吸風則痛甚獨活散消風散○風熱因外風與內熱相搏
 齒根腫痛加之膿汁臭者犀角升麻湯或用石羔一兩火

卷之四

煨酒淬防風荆芥細辛白芷各五分為末隨時水煎一二服甚効○風冷入於齒齦不腫不蛀日漸動搖者溫風散

○熱牙因腸胃積熱開口臭穢難近者敗毒散加荆芥升麻石羔或調胃承氣湯蜜九服如腸胃素積濕熱偶被風

寒於飲鬱於齒開作痛者當歸龍腦散○虛熱攻衝齦肉腫痛口舌生瘡宜開地骨皮等分薄荷減半水煎熱飲

者乃骨蒸濕熱之火也調胃承氣湯加黃連下口或涼指止

麻白芷防風荆芥薄荷客寒犯腦痛難當寒氣犯腦反風

枯梗甘草等分水煎服

痛動搖肉脫者白枳殼毒痰鑽掣血痰熱毒氣攻注齒痛

追湯羌活黑附湯

加細辛枳殼姜棗烏梅仍以姜黃草捲等分煎湯候溫以

舌浸內涎自流出血因風熱上攻頭面搏血冷齒間

血瘀不消鑽刺掣痛耳露

飲加升麻或犀角地黃湯

齦有黑點被虫傷凡飲食不能

氣淹漬口久蒸之風熱上攻齒齦有孔生乎蝕一齒盡又

其其如耳聾牛其重約公於耳而後用

虫牙宜之因只有二牙縫流血風熱者消風散加苦確肉

牡丹皮知母黃柏陰虛氣鬱者四物湯加香附側柏葉牛

膝外敷綠袍散或香道散常擦變骨經風出血骨露者玉

痛風

辛溫藥

其本外宜辛溫以治其標通用擦牙方謝傳笑去

散腎虛胃熱方風虫牙疼方延平方劫痛擦牙先須擦牙

方烏鬚固齒方消齒壅法取牙不犯手方

床凡遇日月蝕未平時勿進飲食誤食多患齒疾養生

家晨興叩齒求無齒疾已上五岳并咽喉謂之雜科

痛風歷節分怯勇

形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其循歷遍身曰歷

痛必夜甚者血行於陰也痛多兼腫或不腫痛多痰火腫

火雖內因六慾七情或病後亡津血熱已自沸騰亦必累感外邪而後發動骨節痛極又則手足蹇蹇風濕雖外因法冷坐濕當風取涼然亦必血熱而後凝滯汚濁所以作痛甚則身體塊瘰痰火風濕全者舌龍虎冊主之 詳

分上下與週身 傷寒週身節痛乃風寒侵入肌骨雖病週

蒼木白芷酒芍藥姜汁或挾痰血者再加桃仁紅花濕痰瘀血週身兩脇走痛者控涎丹加杏仁泥為丸或小便

卅下之如半身不遂及左右手足蹇蹇者烏頭湯微汗之

虛者地仙丹詳中風門上體痛者宜祛風熱豁痰二陳湯主之痰熱客太陽頭項強動則微痛者加酒芍羌活紅

花濕痰攢注肢節痛者加干木歲靈仙草黃柏羌活白芍結陽肢腫者倍加黃芩濕痰橫行手臂痛加南星蒼木

酒芍香附蘆靈仙臂重難舉者加一木羌活枝葉靈仙黃芩臂軟難舉者加南星枳實木香姜黃如臂痛不能舉

或連指掌腫痛者舒經湯有忽痛者小柴胡湯去半夏加防風當歸生地大黃黃連滑石有指痛因食積者車龜板

白芥子麥霜花各一錢半為末酒糊丸四物湯加杜草陳皮煎湯下背心常一片水冷者煎痰湯合龜子降氣湯

下體痛者宜流濕行氣四物湯主之陰虛醫尖痛者防朮有火加知母貞栝及杜少許有痰合二陳湯加澤瀉前胡

木香為引痛甚加乳香沒藥煎者合大承氣湯下之兩腿痛者加牛膝陳皮吞加味三妙丸兩腿痛甚素虛性急或

痢後血流通絡作痛者加杏仁牛膝陳皮杜草姜汁煎熟調若行散如兩腿間忽一二點痛入骨不可忍若用羌花

根為末醋調敷痛處以帕緊扎產後有此疾者亦宜兩足痛者當歸拈痛湯○凡痛風先散佐使在上加羌活廣靈

仙在下加牛膝防己木通黃柏在手臂加杜風毒髓痛共枝引至痛處如遍身痛者則問所起處加之

一種痛風百節酸疼無定處久則變成風毒痛入骨髓不

腫痛挾濕熱者麻濕痛如脫風汗黃外因濕症腫滿身痛

黃赤芍湯主之

者兩子六物湯提虎九濕熱者丑芍散加蒼朮防風羌活

白芷黃栝竹瀝姜汁走注者四妙散散肢節腫脹滑者加南

屋木香檳榔蒼朮黃柏防已○濕氣皆偏侵足掌成廢若

用其遂一錢為末入猪腰內煨食之上吐下瀉○風症黃

汗出面微紅掣痛熱者防風通聖散或小續命湯去附子

加羌活黃芩虛者烏藥順氣散獨活寄生湯上體全棗丹

下體換腿丸○風中肩背太陽氣鬱不可回顛或肺氣鬱

搏痛者罌瓜子丸神仙飛步丹龍虎活絡湯○風濕相

丹活血應痛丸○風濕毒生瘡者單蒼耳加羌活防風十

分之二為末蜜丸梧子太每百丸酒下或單絳蒼丸一斤

加四物湯料各五錢防風羌活各三錢川烏一錢半為末

蜜丸空心茶酒任下○風寒濕熱成痺臂髀腰脚骨熱水

痛行步艱難者二炒蒼柏散等分加虎脛骨或半為末水

調暑熱煩疼寒掣骨髓暑濕相搏面赤尿赤者五苓散合

散○結陽肢腫熱毒流注大便閉者犀角湯○寒症肢節

掣痛小筋急痺者五積散合順元散加麻一鴛鶴膝痛者

五積散加松節杉節○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

骨痛痛者五積散○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

散○結陽肢腫熱毒流注大便閉者犀角湯○寒症肢節

掣痛小筋急痺者五積散合順元散加麻一鴛鶴膝痛者

五積散加松節杉節○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

骨痛痛者五積散○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

散○結陽肢腫熱毒流注大便閉者犀角湯○寒症肢節

掣痛小筋急痺者五積散合順元散加麻一鴛鶴膝痛者

五積散加松節杉節○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

骨痛痛者五積散○七情刺痛食停痰內因七情肢節的

血氣虛勞不榮

養廉理

血虛四物湯加芎藭秦元有火者調着行散有痰血者加

大黃桃仁紅花微利之性急發熱者加酒吞黃柏股節腫

痛脉澁者加桃仁歷年不愈者倍加木通出汗或脫紅丹

即愈苦不愈者痛風丸二炒蒼柏散三炒丸○氣虛悉節

各五分桑朮二錢陳皮芍藥各一

錢其草三分羌活二分水煎服

骨節蹉跌恐為癩癩宜蕪瘻湯加減痰飲者古半硝九氣

短倦怠者六君子湯加南星○酒濕痛者用黃栢葳靈仙

痛狀如虫蠶過痒而進飲食則虫亦饜飲其間庶不致煩

類齒也宜麝香丸○留飲四肢歷節氣短脉沉久則令人

痛如虫蠶過痒而進飲食則虫亦饜飲其間庶不致煩

類齒也宜麝香丸○留飲四肢歷節氣短脉沉久則令人

痛如虫蠶過痒而進飲食則虫亦饜飲其間庶不致煩

類齒也宜麝香丸○留飲四肢歷節氣短脉沉久則令人

痛如虫蠶過痒而進飲食則虫亦饜飲其間庶不致煩

類齒也宜麝香丸○留飲四肢歷節氣短脉沉久則令人

痛如虫蠶過痒而進飲食則虫亦饜飲其間庶不致煩

類齒也宜麝香丸○留飲四肢歷節氣短脉沉久則令人

痛如捷鍛者。四君子湯加桂附白芍。○血氣俱虛。挾痰火者。八物湯加羌活防風黃栢龜板。○勞傷者。越痛散。血風九。切勞散。陰虛者。治外流濕與踈風。痛風。因外風熱風濕。虎骨丸。補陰丸。似宜分表裏治之。表症九味羌活湯。氣虛表實骨節痛者。六一散加香附黃芩水煎。或姜汁糊丸服。○裏症。用續交加散加大黃。痰濕熱者。煎水丸。病愈後大便閉。稍虛者。麻手仁丸。噤痛不可忍者。用楓寄生焙乾。浸酒常服。微醉。○

通用史國公浸。調內活血和氣爾。屬內因者。宜消痰血。養活氣。自和痛無不止。又不愈者。間用升降之劑。或專養血補肥。如久病及亡血產後病此者。俱不宜純用風藥燥血。

痺風 附麻水

五痺皮脉肌筋骨。痺者。氣閉塞不通流也。或痛痒。或麻痺。虛火盛。肺焦而成。痺屬風寒濕。三氣侵入而成。然外邪非但純乎中風。則陽受之。痺久外難成。痿又痺為中風之。為病更重。况宋明醫錢仲陽。自患周痺。偏廢不能全愈。可

見上多風濕下寒濕。經言春為筋痺。夏為脉痺。仲夏為肌筋骨。各以時而受風寒濕之邪也。大槩風濕多侵于上。肩背麻木。手腕硬痛。寒濕多侵于下。脚腿木重。若上下俱得身如板快。脚如石墜。頭分風寒濕多治之。風多痛走不定。寒多掣痛。週身拘急。手足冷痺。與痛風無異。濕多浮腫重着。一處不移。○風多為藥順氣散。三痺湯。越婢湯。車稀發丸。○寒多。五積散。加天麻附子。或獨痺湯。寒濕五積交

加散。○濕多。川芎茯苓湯。當歸祛痛湯。防己黃芪湯。羌活勝濕湯。續斷丸。○又冷痺身寒不熱。腰脚沉冷。即寒痺之甚者。三痺湯。合三五七散。或舒經湯。附子理中湯。○又熱痺。或濕生熱。或風寒鬱熱。身止如鼠走。唇口反縱。肌肉變色。宜明非麻湯。○風寒濕熱痺。二炒蒼皮頑脉瀉症多煩

肌肉不仁筋骨屈。風寒濕三邪交侵。在皮則頑不自愈。遇寒則急。遇熱則緩。應乎脉。其症氣喘煩

筋骨不仁筋骨屈。風寒濕三邪交侵。在皮則頑不自愈。遇寒則急。遇熱則緩。應乎脉。其症氣喘煩

滿在脉則血滯六脉瀋而紫面黃色應乎心其症急情嘔吐
氣盛乾善嘔在肌肉則四肢不仁應乎脾其症急情嘔吐
在筋則屈而不伸應乎肝其症夜卧多驚溺澀小腹脹
骨則重不能舉尻以代踵脊以代頭應乎腎其症心腹脹
滿初入皮膚血脉邪輕易治留連筋骨久而不痛不仁者
難治久久不愈五痺復感三邪入五臟臥不起痿瀉不仁者

少亦如中風祛邪後分氣血痰初起強硬作痛者宜疎風
入臟者死 祛邪後分氣血痰初起強硬作痛者宜疎風
久病須分氣血虛實痰多少治之○氣虛痺者關節不
乞一身如從水中出陽虛陰盛也○西君子湯加肉桂生附
或川附丸○血虛痺者皮膚不仁濟生防風湯或黃芪建
中湯去飴加桂枝○挾瘀血者西物湯加桃仁紅花竹瀝

姜汁○挾痰者手足麻痺多睡眩暈濟生茯苓湯或二陳
湯加竹瀝姜汁○腎脂枯涸不行體少筋弱凍慄擊急者
十全大補湯地仙丹○補早及令經絡鬱初病驟用參芪

通用五痺湯擦痺法 補早及令經絡鬱初病驟用參芪
而邪帶經絡不散虛者烏麻厲氣虛木痰瘵此聖言之耳
有因歷而不風

寒濕三氣乘之麻木攢作者有氣血俱虛但痺而不風
蓋麻犹痺也雖不知痛癢尚覺氣微流行在手多蕪風濕
在足多蕪寒濕木則非惟不知痛癢氣亦不覺流行帶水
為疾血碍氣問木為濕痰總皆經絡凝滯血脉不貫謂之

不仁或垂虛火則肌肉動不可誤作風治○週身擊痛
麻木者謂之週痺乃肝氣不行也宜先汗後補黃芪湯○
開目麻木暫退閉目甚者并陽和中湯○皮膚麻木者補

氣湯○手足麻氣虛者補中益氣湯去當歸陳皮加五味
子白芍生甘草虛甚挾風者補中益氣湯正料加烏藥附
子羌活防風天麻○十指麻木胃有濕痰死血者二陳湯

加二木紅花莖仁少加附子以行經○左手脚腿偏麻疼
痛右口角併眼牽引側視者表有風也宜天麻黃芪湯○
兩腿麻木者煎氣湯○兩治同痺風戒酒醋九味酸傷筋

骨則痿令人發熱變為痛痺麻木等症慎疾者須戒魚腥
麪醬酒醋肉屬陽助火但可量喫若厚味過多下必遺溺
上必痞悶先用二陳湯加芍藥黃連降火然後用水煎藥

醫學入門卷之四
疔疹各類。今合。以其因治同也。

赤白遊風屬肝火。白者謂之白癩。方肝風搏於皮膚。血氣不和所生。赤者謂之赤癩。白者謂之白癩。方肝風搏於皮膚。血

翹。或四物湯加柴胡。山梔。牡蛎。丹皮。虛者消通散。加山梔。或

腎氣丸。○白濁氣熱者。敗毒散。或小柴胡湯。加防風。連翹。虛者補中益氣湯。加羌活。防風。如果係風毒者。胡麻散。車

秦耳丸。單浮萍丸。此疾辛苦者。只宜滋養氣血。則火自愈。風自定。痒自止。若用祛風辛苦之劑。則肝氣愈燥。風火愈熾。

元氣愈虛。虛痒不止。血難勻。身上虛癢。血不榮於腠理。故

變為難治。虛痒不止。血難勻。身上虛癢。血不榮於腠理。故

萍末調服。或單凌霄花為末。酒調服。遍身及頭上。風屑痒者。單苦參丸。或薄荷。蟬退等分為末。酒調服。○已上疔癩

丹疹癩癬大同小異。諸方通用。

寒類

咳嗽須分痰與聲。痰聲俱有。肺脾經。咳因氣動為聲。嗽乃

然以肺為主。故多言咳。則包嗽在其中。實者痰稠聲且重。

虛者聲利痰亦清。咳必先審肺脈。虛實者。浮大有。若

沉細帶數。則外因四氣隨時令。風乘肺。咳則鼻塞聲重。口

火鬱極也。飲加桑白皮杏仁。或柴胡半夏湯。後用諸咳丸。如久咳夜

咳冬咳。風入肺竅者。宜薰之。○寒乘肺。咳則胸緊聲啞。二

陳湯加麻黃杏仁。或蘇沉九寶飲。華蓋散。單生薑丸。有寒

熱者。小柴胡湯。又有一種遇寒則咳者。謂之寒喘。乃寒包

熱也。解表則除。枳梗湯加麻黃。防風杏仁。陳皮。紫蘇。木通。黃芩。如風寒鬱熱。夜咳者。三拗湯加知母。黃芩。○暑乘肺

濕乘肺。咳則身重。骨節煩疼。酒洗五苓散。不換金正氣散。

醫學方內卷之四

五

○大槩春氣上升。潤肺抑肝。夏火上炎。清金降。內傷火鬱。

火。秋濕熱甚。清熱瀉濕。冬風寒重。解表行痰。勞食情瀉。白散加知母。或古二母散。上半午咳多者。胃有

實火。車石羔九。加知母貝母。使閉喘渴痰稠者。涼膈散。取

毒散。古芍羊九。下半午咳多者。陰虛。四物湯合二陳湯。加

知母黃栢麥門冬。順而下之。如陰虛火燥。寒熱盜汗。黃昏

見血。諸四物湯。加竹瀝。或滋陰降火湯。加味二母九。黃昏

咳多者。火浮於肺。潤肺九以飲之。不可純用涼藥。通用二

陳湯。去半夏。加貝母瓜。麥青黛山。施黃芩桑白皮。○鬱咳

即火咳。久者乾咳無痰。乃腎水焦枯。邪火獨炎於肺。瀉白

散。加舌硬為君。以開之。久者訶黎丸。虛者腎氣丸。不得志

者。霞天膏。如肺燥皮枯。瘡痒便閉者。活血潤燥生津飲。○

勞咳。五勞虛咳也。疲極傷肝。咳而左脇疼。引小腹者。二陳

湯加芍藥。芍藥青皮。柴胡。草龍。膽黃。芩竹。菴。或黃芪。建中

湯。加芍藥。傷心。咳而咽乾。咯血者。劫勞散。夢授天王補心丹。

勞倦傷脾。咳而氣短。無力者。調中益氣湯。補中益氣湯。牛

勞傷。傷腎。咳而腰背痠痛。宜蛤蚧天靈蓋。非黃。硃砂。之類。

須於癆瘵條參之。○食咳。因食積生痰。蓋氣衝胸。腹痛者。

二陳湯加厚朴。山查。麥芽。傷生冷。致致肺胃不清。噯酸吐

瀉。惡風寒者。五積散。理中湯。異攻散。傷前炒熱物者。葶麻

○七情臟氣不。則咳。久不已。則入六腑。怒傷肝。咳。兩脇

下痛。入膽。則嘔吐。舌汗。喜傷心。咳。心痛。嘔腫。入小腸。則咳

與氣俱失。思傷脾。咳。右脇引有背痛。甚則不可必動。入胃

則嘔吐。痰沫長。憂傷肺。咳。喘息。咽血。入大腸。則遺糞。恐

傷腎。咳。重。逆。腰背引痛。入膀胱。則遺尿。入三焦。則腹滿。不

欲食。始則閉於肺。終則聚於胃。故也。宜平陳湯。加瓜。萎。仁

蘿蔔子。加味瀉白散。參。蘆。飲。四七湯。龍子。降氣湯。

○瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

瀉白散。子。古。橘。甘。散。古。橘。羹。九。加。減。三。奇。湯。選。用。痰。咳。胸

多或結胸者。二陳湯加枳梗瓜萎黃芩貝母。甚者鵝頂丹痰積流。入肺腕。久咳不得睡者。堯鈴丸。痰因火動者。三陳湯加灸連。或清氣化痰丸。痰因宿食者。化痰丸。痰因酒濕者。峰姜丸。全因酒者。瓜連丸。如痰甚能食便閉者。小承氣湯下之。不能食便閉者。厚朴湯。或滾痰丸。疎導之。○水咳因欲吞水。停蓄為涎。上湧。身熱。胸滿。怔忡者。小青龍湯。身寒。胸硬者。玄武湯。結胸者。小半夏湯。大便閉。痰血碍氣脹者。干棗湯。小便澀者。五苓散。詳傷寒水症。

且腥 痰血咳則喉間常有腥氣。腥者瀉仁大黃。姜什為丸。服或壯肝皮。麥門冬。枯梗。重者。桃仁大黃。姜什為丸。服或去毒。加入黃蘗。木為末。酒調服。利去心。肺間痰血。即止。後服人參養榮湯調理。○肺脹滿。即痰與血得氣。所以動則喘急。或左或右。眠一邊不得者。是四物湯加桃仁。詞丁。青皮。竹瀝。姜汁。若虛脹喘者。單人參膏。若百化膏。有水停蓄。脹者。飲水則逆轉不入。三白湯。加澤瀉。結梗。五倍子。若因火傷。極。魚水以升而脹者。必乾咳。魚痰。謂

其本 清之。久咳有痰者。燥脾化痰。魚痰者。清金降火。蓋外感久則鬱熱。內傷久則火炎。但宜開鬱潤燥。其又有七情氣逆者。則以枳殼。香附。順氣為先。停水宿食者。則以南星。檳榔。分頭為要。氣血虛者。補之。欬之。苟不治本。而用參。藥性。氣虛最宜。若肺熱有火。及風邪初盛者。又甚還將脾俱宜。砂參。或玄參代之。故咳不拘於寒也。

腎寧 久咳。曾經利下。及勞倦。餓飽。以致脾胃寒。而飲食少。進者。只理脾而咳自止。然腎為氣臟。咳嗽動引百骸。自覺氣從臍下逆奔而上者。乃腎虛氣不歸元。宜所服藥中。加抽骨脂。五味子。或三味安腎丸。陰虛者。腎氣丸。陽虛者。黑錫丹。以鎮之。凡咳至肺。肺及因瘡失音者。必死。

霍亂 霍亂暑濕乾三種。一種暑霍亂。即濕霍亂。但吐疾至。秋惟甚。經寒月亦多。由伏暑故名。一種濕霍

霍亂 霍亂暑濕乾三種。一種暑霍亂。即濕霍亂。但吐疾至。秋惟甚。經寒月亦多。由伏暑故名。一種濕霍

霍亂 霍亂暑濕乾三種。一種暑霍亂。即濕霍亂。但吐疾至。秋惟甚。經寒月亦多。由伏暑故名。一種濕霍

霍亂 霍亂暑濕乾三種。一種暑霍亂。即濕霍亂。但吐疾至。秋惟甚。經寒月亦多。由伏暑故名。一種濕霍

霍亂 霍亂暑濕乾三種。一種暑霍亂。即濕霍亂。但吐疾至。秋惟甚。經寒月亦多。由伏暑故名。一種濕霍

亂有聲有物。一種乾霍亂。有聲無物。治見二卷四十九葉。病本中焦濕熱壅。標因外感

問感熱。夜間受冷。或內素蓄熱。外又感寒。一時陰陽錯亂。然病本因飲食失節。或醉醢酒漿生冷。以致濕熱內甚。中

焦脾土失運。當升不升。當降不降。是以上吐下瀉。味多伏。絕又有挾七情鬱氣。痰症氣膈。痞塞不通者。外見痰喘眩

暈。亦必由傷飲。心腹本痛或熱寒。先心痛者。則先吐。先腹

者則吐瀉俱作。輕則吐瀉而已。凡吐瀉時切不可與飲食。雖米湯一啣。下咽立死。死後待吐瀉盡。過半日飢甚。方可漸

食稀粥。偏陰分則多寒。熱而不渴。痰喘煩渴却可恐。痰喘加味半

湯。偏陰分則多寒。熱而不渴。痰喘煩渴却可恐。痰喘加味半

碗。凡虛煩不眠。既濟湯。煩渴九君子湯。桂苓甘露。轉筋舌

卷囊縮危。小陽明胃與大腸以養宗筋。暴吐暴瀉。津液驟亡。體轉筋手足厥冷。若欲絕者。倉卒之際。宜以鹽填臍中。均

散。不計壯散。雖已死而胸中有暖氣者。立甦。急用木炭散

者亦効。如血熱轉筋。服百研生蒜。塗胸掌心。雖昏危入腹

南星水藥。如手牽乳近兩邊。如舌卷囊縮。轉筋入腹者。死。分

利升降消食。霍亂乃濕熱薰風。木為官。治宜散風寒。利

寒濕之要藥。寒月厥冷。狀不渴者。五積散。理中湯。古姜

附湯。暑月煩渴者。黃連香薷散。冷服。俱宜合五苓散。以分

消上下。或更合益元散。降火尤妙。此皆分利法也。又當引

清氣上升。使濁氣自然下降。吐瀉未徹者。宜用二陳湯。加

芍正香朮。防風探吐。以提其氣。如吐瀉不止。宜所服藥中

加木瓜。檳榔。以降其氣。又自可下者。但不可純用涼藥。挾

七情者。七氣湯。古參萸湯。傷飲食者。糾丸子。併利丸。俱姜

湯送下。通用四君子湯。有汗加桂枝。無汗加麻黃。吐利轉

筋腹痛。體重。脈沉細。加白芍。良姜。四肢拘急。脈沉遲。屬女

陰。加姜附厚朴。吐利轉筋。脇痛。脈弦者。木越土也。平胃散

加木瓜。或小建中湯。加柴胡。木瓜。四肢厥冷

脈微。緩。屬厥陰者。小建中湯。加當歸。附子

心痛

厥心痛先問火新真心痛因內外邪犯心君一日即死厥
 犯心之支脉謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又痛
 極則發厥也○新者身既受寒口又傷冷鬱遏元陽宜早
 豆蔻丸鷄舌香散濕散之或神保久温利之稍久寒鬱為
 熱或因七情者始終是火此古方多以舌寒瀉火為主辛
 熱行氣為痛甚發厥有二因寒厥外因風寒客背之血脈
 向道也皆俞與心引痛暴發手足厥
 逆冷汗甲青似傷寒陰厥古姜附湯三味玄胡散○熱痛
 內因酒食積熱痰滯發厥手足雖冷而身熱甚則煩躁吐
 逆額汗古玄全散三味川練散或芩
 微甚者大承氣湯下之後服與末丸七情怔忡不安九
 悸痛虫痛來去痛症痛飲痛食痛風痛冷痛熱痛○悸痛
 內因七情輕則怔忡驚悸似痛非痛妙香散四匕湯小膏
 危熱者連附六一湯重則兩目赤黃手足青至食即真痛
 不治○重痛蒸熱生虫攻心痛發難當痛足能食則區

化靈垂散烏梅痰火來去症昏神則發熱者槐姜飲蠟礬
 丸痰積三螺壳丸痰火墜痰丸○症痛辛感惡背尸注素
 虛者腎經陰氣上攻神昏卒倒蘊合香丸痛引背僵僕者
 沉香降氣湯或五苓散倍棊非汁為丸小苗前湯下胃脘
 素實者腎火上攻小承氣湯癆瘵尸疔者栗河車丹胃脘

脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻胃脘當心而痛脾臟連心

痛亦必脾胃痛多且七情四氣歸脾虫痛攻脾入胃痰痰
 脾胃所主但心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食胃痛善噎

兩脇咽膈羊利脾痛舌強喜嘔腹脹便不通右方寬痛
 以黃連治心山梔治胃虛痛以參雞小膏治心下秋豆菴

治胃亦未嘗混大槩傷水飲聚涎心痛如刺若温膽湯加
 白朮傷食生冷遇熱食暫散者香薷散加生姜菖蒲半夏

枳壳或入參養胃湯加枳桂吳萸或木香化滯湯感應丸
 九心痛數日不食魚鮫痛止恣食即發○胃火梔姜飲胃

寒烏藥沉香湯上熱下寒者右梔附湯○脾痛海石散右
 二胡散風冷挫刀散蠟葱散燒脾散二炒香良散濕者小

十法
 心痛
 厥心痛
 犯心之支脉
 極則發厥也
 豆蔻丸
 鷄舌香散
 熱或因七情者
 熱行氣為
 向道也
 逆冷汗甲青
 內因酒食積熱
 逆額汗
 微甚者
 悸痛虫痛
 內因七情
 危熱者
 不治

卷之四 心痛

胃丹噎嘔五膈寬中散腹脹厚朴温中湯連脇痛復元通
氣散痰滯便閉順氣煎痰湯氣聚便閉日利散西磨湯小
便閉通靈散又有心外感三般風冷熱連脇腰背少舒伸
脾俱痛者手拈散

風因肝邪乘心痛則兩脇引小腹陰股桂枝湯加附子便
閉入蜜一匙同煎或分心氣飲加厚朴枳殼蘿蔔子木香

或阿魏撞痛九日冷因形寒飲冷小涼腎氣乘心痛則心
懸若饑腰痛下重泄痢五積散便閉加大黃或肺寒乘心

痛則短氣季肋空痛者瀉氣飲于鹽煎散或脾寒乘心痛
則腹脹便難者霍香正氣散挾濕者除濕湯○熱因心胞

絡暑毒乘心痛微背俞掌熱黃連香茹散加麥草或單黃
連丸凡諸經心痛引背多屬風冷諸腑心痛難以俛仰噫

瀉多氣血虛勞按則止虛痛按之暫止素虛多芩或誤服
屬熱心氣血輔者四物湯去地黃加乾姜心氣不足者六君

子湯加肉桂氣血俱虛者百歸木散挾痰火食積者三六
丸大實胸高痰餓嘔實痛素有寒熱頭痰或因怒而發

九大實痛因怒後飲食卒痛注悶心胸高起手不可按便
閉者天貽胸湯或者黃九下之後服占葶菴湯以去餘邪

○痰血痛飲湯水燕下作餓乃素食熱物血死胃脫飛仁
承氣湯輕者四物湯加桃仁紅花或玄胡索丸失笑散○

婦人瘀血入心脾痛甚者五積散加三稜義木經行未盡
血衝心痛加桃仁紅花經行已往作痛者一氣湯加當歸

產後痛者桂化痰消積氣已降凡痛皆痰粘胃通用二陳
心湯木槿湯

有汗加桂枝裏寒加草豆蔻濕加蒼木川芎熱加山梔鍋
煉童便或少加炒乾姜反佐之冷加丁香良姜氣虛加參

木血虛加當歸大虛厥逆加姜附肝火加青黛青皮黃連
痰飲加白螺壳滑石南星食積加砂仁香附痰血加韭汁

桔梗虫痛加苦練根或木香檳榔急痛加胡椒零用斑蝥
炒過痛不可忍加細茶乳香或石礪凡痛攻走腰背發厥

嘔吐諸藥不効者加蒼木川芎劫痛丸丹可入唇寒者九痛
芎山梔探吐積痰碗許乃愈

熟者散痛丸通靈散有精神保元瘀血車
乾漆丸通用手拈散如意丹神聖代針散

九散痛丸通靈散有精神保元瘀血車
乾漆丸通用手拈散如意丹神聖代針散

腹痛 附腹中卒秋

腹痛大小分陰陽

大腹痛多食積外邪臍腹痛多積熱痰
小腹痛多乘血及痰與溺澀

大痛人中黑者中惡客忤不治
陰症痛腹牽痛自利或
嘔喜按少食綿綿不減宜溫之
陽症腹中覺熱甚則大

便閉澀脹滿怕按
寒痛綿綿熱不常
時痛時止宜下之
深不可太泥經謂寒氣入經
客於衛分則血凝急痛按之
熱則止寒氣客於榮分則氣鬱
滿痛甚怕按寒氣客腸胃

募原血絡急引皮痛按之則氣
血散而痛止寒氣逆喘寒
特俞之脉則滯按之不能及也
寒氣客關元則氣逆喘寒

氣客厥陰脉終則脇助與小腹
或陰股引痛寒氣客小腸
募原之間則血氣凝聚成積
寒氣客三臟則痛死復生治傷

寒腹痛詳三卷四十八葉
尋常外感胃寒痲卒痛吐利
俱嗜喜熱物慰者而精散加
吳艾木瓜煨葱或羅香正氣

症香茹散加生薑陳壁土紅
蓼木瓜或五苓散濕症除濕
湯或香薷散加蒼木枳殼
積熱時痛時止痛處亦熱子

不可逆便閉喜冷宜山頂清涼
飲食積有形便後減
大承氣湯二黃丸老人麻子仁
丸食積有便後減

腸胃作痛得大便秘則成者
宜平胃散加消導藥或保和
丸散水丸紅丸升調之或木香
檳榔丸大黃備急丸神保

丸如意丹下之又有食填胸
濕痰溺澀火鳴腸
瀉心胃作痛者宜大吐之
瀉痰溺澀火鳴腸

便不利或二便俱不利宜導
木散如清痰留滯胸腹作聲
者桂涎卅小胃丹○痰火痛
乃火欲升水欲降相擊腸鳴

者二陳湯加芥連山柘如怒
火攻衝痛無定處定時者更
加香附芍藥青皮又有糞結
腸鳴作痛不大便者大黃備

急丸之類通之如鹹寒冷結
腸
鳴者宜分三陰以溫藥治之
虫痛吐水定能食
虫痛吐

律來絞痛痛定能食發作有時
不七情氣痛痞胸堂
比諸痛停聚不散烏梅丸化
虫丸

胸痞悶或攻注脇背虛者七
氣湯求氣勿中虛全不思飲
氣散木香化滯湯實者曰和
散分心氣飲

胸痞悶或攻注脇背虛者七
氣湯求氣勿中虛全不思飲

氣散木香化滯湯實者曰和
散分心氣飲

食中虛脾弱隱隱冷痛全不思食者人參養胃湯加蒼木
肉桂吳茱萸木香素氣虛挾痰者六君子湯加蒼木

痛必着一方 瘀血痛有常處或憂思逆鬱跌撲傷瘀或婦
人經來產後惡寒不盡而疑四物湯去地黃

加杏仁大黃紅花○又血虛鬱火燥結阻氣不運而痛者
四物湯倍芍藥加炒乾姜○九痛多屬血虛通用芍藥

草湯為主惡寒而痛屬脾腎加肉桂惡熱而痛屬脾胃加
黃芩味緩傷水加桂枝脉澁傷血加當歸脉遲傷寒加乾

姜膈下痛加熟地惟氣分諸痛不宜芍藥酸枳宜
木香檳榔青皮陳皮香附辛散之○劫痛手拈散

溫實宜蕩 係宜辛溫消散燒脾散踏葱散丁香脾積丸果
者散之是也○實宜辛寒推蕩經曰通久則升消理胃房

因通用痛隨利減是也方與積熱痛同
腹屬坤又病宜和脾胃如脉弦急水尅土也小建中湯加

當歸取芍藥味酸於土中瀉木為君如脉沉細水侮土也
理中湯取芍藥味酸於土中瀉木為君如脉緩腹痛自利

君胃氣下陷者加升麻胡荽木以升之有積者加山楂
麥芽枳實黃連木香以消之上熱下寒升降失常腹痛有

吐者黃連黃連生之○疝痛引睪丸疝痛拘急積聚痛有形
可按腸癰痛脞生香小便秘如淋脉沉破症痛甚嘔吐脉沉

治見腹中窄狹性偏躁魚非痰火善為殃 腹中自覺窄條
各條痰濁氣攻於心脾以致升降失常肥人多濕瘵宜二陳湯

加蒼木燥濕香附行氣瘦人多火宜二陳湯加黃連清熱
蒼木流濕心神不斂者俱加遠志麥門冬酸棗仁

暑氣虛者六君子湯加芩歸養血流濕自然平復

暑類

瘧

瘧疾先要陰陽定 陽為外感和氣其間陽為風暑有汗陰
為寒濕無汗陰為內傷正氣虛其間陽

為氣虛陰為血虛陽為升發在春夏陰為降發在秋冬陽
為肅和茂與榮衛並行一日一發陰為臟抑滯橫連募原

不能與正氣并行故間日畜積乃發或三四日一發久則必有瘡母陽為日發和淺榮衛盡行皆與脊故也陰為夜發和深榮衛夜行的與腹故也又有二日連發任一日者及日夜各一發者乃氣血俱受病也陽為子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於申未或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須隨症用藥趨早或移時分定陰陽然後陽瘡截住陰瘡升散今俗以似瘡誤治變成溫瘡為分陰陽謬矣殊不知瘡有凌密之狀在傷寒久則為壞疽在內傷久則為癆瘵豈美疾哉

陽熱陰寒如期應陽和與榮爭而和火發於外則為熱陰和與衛爭則正氣退於內則為寒衛虛則先寒榮虛則先熱未和爭則寒多裏抑多則熱多表裏相半

寒熱相等諸瘡惟食積挾火寒已復熱上已復寒謂之寒熱相併又暑瘡單熱濕瘡單寒寒瘡先寒後熱風瘡先熱後寒餘皆先寒後熱陰陽

寒瘡太陽熱陽明寒瘡腰背項俱痛屬太陽熱陽明

陽寒多熱火汗出難已者柴胡加桂湯單寒無汗者五積散若兼利湯本熱瘡用黃連湯或黃芩湯加桂少許

風瘡少陽風瘡口苦嘔吐惡心脇痛屬少陽

寒熱並風瘡口苦嘔吐惡心脇痛屬少陽

黃芩身疼者敗毒散咳嗽者參蘇飲已上三湯氣少受病發在處暑前者俱謂之暴瘡乃傷之淺者

少陰

四正厥四旁火陰瘡發於子午卯酉四正之日舌乾口燥嘔吐欲閉戶牖輕者小柴胡湯倍半夏重者合四物湯

陰如淋輕者小建中湯重者四物湯加玄胡索全鈴子附子

太陰辰戌丑未病太陰瘡腹滿自利善嘔嘔已乃衰輕者異攻散重者理中湯如濕偏陰分

單寒氣虛作泄者古東附湯附子理中湯身重腹脹者五苓散木附湯浮腫退黃九已上三陰血分受病發在處暑後者俱謂之溫瘡乃隔冬感溫氣藏於腎與骨髓至夏秋重感新邪觸發自臟而達之腑乃傷之重者

山嵐瘴疫一方瘴瘡山溪蒸毒令人迷困發狂或嘔不伏水熱作有乍無者涼膈散加柴胡故抑不伏水

工者久參養胃湯○痰瘧一方長初相似。須參運氣寒熱用藥。大禁不換金正氣散五積交加散加減。如意丹最妙。

鬼瘧卒感異常性鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱日作。憂寐不寐。或用燒人場土為丸。塞男左女右耳中。詳分寒熱汗且和。外感寒多非溫。

散熱多非柴胡黃芩。不能清解。陽瘧無汗。須加柴胡升麻川芎。有汗蒼水葛根甚加麻黃。陰瘧無汗。須加柴胡升麻川芎。有汗蒼水。

以和之。或吐或下。須體盛。然亦三五發後。後時乃可。用之。早則延綿稍久。不取吐者。勝金丹。○三陰瘧便閉者。宜

下以截之。暑瘧黃連香薷散加大黃青皮烏梅煎服。寒瘧二陳湯加青皮良姜煎。五粒。痰熱胸滿便閉者。

大柴胡湯。來血發狂好忘者。養仁承氣湯。虛閉麻子仁丸俱清。晨一服。取內傷善食。惟七情。善食多汗。五臟之氣不

和。畧被外和動痰。宜四散飲量。勞瘧微虛損症。微惡寒亂虛實。加各經開鬱行氣之藥。勞瘧微虛損症。微惡寒

發熱寒中有熱。熱中有寒。最難調理。或半月十日。小瘧復來。經久不瘥者。芎藭鱉甲散。主之。熱多者。生犀散。因勞後

驚甲丸。○氣虛汗多無心。飲食不進者。六君子湯。因勞後昏倦。少食者。補中益氣湯。加黃芩。半夏。○血虛夜發。若小

柴胡湯。合四物湯。加升麻。紅花。知母。黃柏。水煎。露服。趨早不愈。用勝金丹。截之。有痞者。陰瘧。如陰虛火動。下後寒

熱。至晚微汗。乃解。似瘧非瘧也。宜加味逍遙散。加地骨皮。若誤用瘧藥。必死。○氣血俱虛。滿頰食少。或遺精咳嗽者。

人參養榮湯。加地骨皮。烏梅。麥門冬。或介厥不省者。十全大補湯。加柴胡。黃芩。陽虛去柴。麥。加附子。吞黑錫丹。有痞

者。橘皮。痰瘧嘔沫多昏迷。痰瘧外感。內傷。鬱聚成痰。熱多頭疼。肉跳。吐食。嘔沫。甚則昏迷。

卒倒。宜柴陳湯。加草菓。嘔吐者。二陳湯。倍白豆蔻。流行三焦。嘔瘧。自止。氣虛嘔者。單人參湯。或用常山炒過。又不上

者。露姜。食瘧腹脹寒熱併。食瘧因飲食。益成痰火。寒已復飲。截之。食瘧腹脹寒熱併。熱已復寒。寒熱交併。苦饑不

食。食則吐痰。脘滿腹脹者。二陳湯。合小柴胡湯。或平胃散。俱加枳實。白朮。山查。神麩。青皮。寒熱者。清脾飲。寒多者。人

參養胃湯。○痰瘧一方長初相似。須參運氣寒熱用藥。大禁不換金正氣散五積交加散加減。如意丹最妙。

鬼瘧卒感異常性鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱日作。憂寐不寐。或用燒人場土為丸。塞男左女右耳中。詳分寒熱汗且和。外感寒多非溫。

散熱多非柴胡黃芩。不能清解。陽瘧無汗。須加柴胡升麻川芎。有汗蒼水葛根甚加麻黃。陰瘧無汗。須加柴胡升麻川芎。有汗蒼水。

以和之。或吐或下。須體盛。然亦三五發後。後時乃可。用之。早則延綿稍久。不取吐者。勝金丹。○三陰瘧便閉者。宜

下以截之。暑瘧黃連香薷散加大黃青皮烏梅煎服。寒瘧二陳湯加青皮良姜煎。五粒。痰熱胸滿便閉者。大柴胡湯。來血發狂好忘者。養仁承氣湯。虛閉麻子仁丸俱清。晨一服。取內傷善食。惟七情。善食多汗。五臟之氣不

參養胃湯。腹痛者。緝九子。腹脹因濕痰。或瘡氣歸腹者。古龍虎丹。用杏仁煎湯。迎發時下。久不愈者。用辰砂阿魏等丸。人參煎湯下。截之。

清痰飲汗補胃脾。瘡無痰不成。內傷濕痰為主。內傷瘡皆汗多。陽瘡飲以參木黃芪。陰瘡飲以歸地知柏芍藥。大抵有汗要止。汗以補其虛。魚汗要發。汗以散其邪。稍久者。一補一發。丹久虛補中。利水消痰瘡母。益氣湯。加山查麥芽扶脾。自止。極忌吐瀉。

利水消痰瘡母。淨。凡瘡經年不瘥。謂之老瘡。必有痰水乘血。結成疔塊。藏於腹脇。作脹且痛。乃瘡母也。雖內虛者。非常山檳榔決不能除。但須製熟。則不損胃。老瘡丸是也。血虛者。鱉甲丸。體盛有汗。癩者。暫用羌花丸。仍須以補脾化痰湯藥輔之。

老瘡飲宜量氣。有時瘡後痢相兼。或瘡後痢。痢後瘡。或瘡血虛實。加減。有黃連木香常歸。或信。或四散飲。補中益氣湯。總要祛邪。和湯清脾飲。加瘡分利。虛者補脾和血。三白湯。加黃連木香常歸。或信。或四散飲。補中益氣湯。總要祛邪。

與扶正。外感汗吐下。詳扶和為主。內傷飲補養正為主。內夏傷暑。秋感風濕。遇七情。飲食鬱痰。而後發。雖三四纏至。錯亂氣血。然始於暑成於瘵。故捷徑以祛暑消痰為要。

通用二陳湯。外感魚汗去痰。加紫胡。胡黃芩。青皮。少陰加芩。歸黃連。黃柏。太陰加二木。紫胡。此三味瘡家必用。厥陰加桂枝。姜附。渴加知母。麥門冬。大便閉加大黃。枳實。小便利。赤加澤瀉。山。施瘡瘡加檳榔。截瘡加常山。檳榔。貝母。內傷無汗。加紫胡。川。芎。氣。虛。合。四。君。子。湯。血。虛。合。四。物。湯。汗。多。加。黃。芪。食。少。加。山。查。麥。芽。勞。瘡。加。地。骨。皮。鱉。甲。七。情。加。紫。蘇。香。附。痰。加。南。星。姜。汁。食。積。加。義。木。久。瘡。倍。參。朮。寒。甚。加。桂。附。草。菓。夜。瘡。加。升。麻。柴。胡。以。提。之。停。水。倍。半。夏。痰。血。加。朮。仁。花。吐。瀉。不。食。腫。脹。者。不。治。

痢。痢憑色症分熱寒。身熱口渴。渴溺澀。大便急痛。色赤者為熱。身涼不渴。溺清。大便順利。色白者為寒。

痢憑色症分熱寒。身熱口渴。渴溺澀。大便急痛。色赤者為熱。身涼不渴。溺清。大便順利。色白者為寒。

痢憑色症分熱寒。身熱口渴。渴溺澀。大便急痛。色赤者為熱。身涼不渴。溺清。大便順利。色白者為寒。

但病因於暑熱者多寒者少然陰陽變化亦而淺者為寒白而稠者亦熱必色症兩參而後寒熱可辨

濕火氣血滯。腸滯下為白。火傷血分。則血瘀從小腸滲下。為赤。氣血俱傷。則赤白相兼。其因有外感暑濕。內傷酒麪。炙燔消燻。或七情氣鬱。而為火之實者。有外感寒濕。內傷酒麪。生粘硬物。積滯。或房慾損傷。精血而為火之虛者。皆冷腸胃粘溢。又積成毒。經口欲食不節。起居不時者。陰受之。則入五臟。閉塞。下為殮泄。利也。法當利下耳。

表症頭疼或。故名滯下。又云痢者。利也。法當利下耳。

渴。初起發熱。惡寒。頭疼。身痛。帶表症也。熱者九味羌活湯。初起發熱。惡寒。頭疼。身痛。帶表症也。熱者九味羌活湯。

梅蜜飲。虛者錢氏白朮散。嘔吐有寒熱者。犀半表。紫苓湯。頑痰在膈者。芩連二陳湯。加防風。桔梗。蘆探。吐胃火衝上者。清六九。毒滯上攻者。平胃散。加黃連。木香。檳榔。○虛嘔。食少者。四君子湯。加陳皮。厚朴。麥門冬。竹茹。或溫六九。日夕陰虛者。八物湯。合二陳湯。加枳殼。○嘔吐全不食。花謂之噤口。胃火甚也。大馬大熱。香連丸。加蓮肉。各一。為

不米飲下。又人參四錢。姜炒黃連一錢。濃煎。終口細細呷之。如吐再服。但一呷下。咽便開。有去毒。蓮心。肺者。敗毒散。加蓮肉。陳米。或單蓮肉。留心。為末。每二錢。陳皮煎湯下。外用大匠螺二箇。入麝少許。搗碎。敷臍中。以太乙膏貼之。引熱下。行間。白朮散。去山藥。加芩朮。○裏急後重。墜。火性急者。參苓白朮散。去山藥。加芩朮。○裏急後重。墜。火性急

或化或不化。食物痰穢。欲出而氣反滯。所以欲便不便。腹痛窘迫。拘急。大腸重而下墜。甚則肛門作痛。宜木香。檳榔。通氣。木黃。降火。不連解毒。歸芍和血。枳壳。陳皮。行滯。經云。和血則便膿。自愈。行氣則後重。自除。聞有虛火者。參朮歸芍。補之。寒疑者。乾姜。肉桂。溫之。又素有積聚。偶因一臟之氣發動。干犯腸胃。成痢者。須察何臟相乘。以平治之。

熱赤紫黑寒白清。偏熱純赤。見暑症。輕者黃芩湯。重者導者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為

疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

者。疾血也。腹痛後重。異常。杏仁承氣湯下之。或因誤溫。以致血瘀者。犀角地黃湯。加黃連。木黃。或加味清六九。自父地榆散。單苦參。九黃連。阿膠。丸。要知諸痢。皆血瘀。惟黑為疾甚耳。○寒痢。白如鴨。瀉腸。鳴。痛。墜。不甚。不換。金正氣散

加烏梅陳米或煎料五積散肢冷便清古姜附湯理中湯
日夕黃連補腸湯○冷熱不調赤白各半苦姜墨丸或下
痢苦莫連丸 濕如豆汁風青是 濕痢腹脹身重下如豆
當歸和血散升陽降濕防風湯升陽益胃湯除濕湯猪苓
湯戊己丸○風痢惡風臭塞身痛色青或純下清水若蒼
防湯神木散青色帶白者風寒五積散帶紅胃風湯香綠
雜色屬風火濕及五色俱下者乃脾胃食積及四氣相併
而作古更連丸救之○已上外感痢疾如一方長幼相併
者名曰疫痢敗毒散加陳皮或姜茶煎以防之更添運氣

調七情蟹渤食積黃 古更連丸六磨湯熱者解毒湯加知
母枳殼或木香檳榔丸冷者木香勻氣散煮黃丸小便閉
者五苓散又不止者氣痢丸○積痢色黃或如魚腦漿腹
脹痛惡食者保和丸急痛神保丸一切酒食積聚或黃或
赤通玄二八丹傷酒甚酒蒸黃連丸傷水飲腹脹痛者瀉
六九體實 虛勞消脫多困憊 虛痢困倦食難化腹微痛
緒通玄二八丹日久四物湯加升麻香附調經藥○房勞
傷精血成毒者腎氣丸虛癆挾痢者香連猪肚丸凡痢經
下後痛墜不減虛坐努責及久不愈者皆陰血虛也胃風
湯去桂加熟地主之○氣虛色白如鼻涕凍膠四君子湯
理中湯俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪分水道開胃脫
日久者補中益氣湯虛甚厥逆味微者四順散黑錫丹○

滑痢不禁甚則脫肛血分四物湯加參朮地榆樗 惟有休
白皮氣穴真人養臟湯大瀉下丸靈砂蒼榆湯 惟
息最難禁 休息痢經年不瘥有過服涼藥以致氣血虛
者八物湯加陳皮附膠參連少許或十全大補
湯脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散腎虛者四神丸赤
石脂丸有誤服泄藥餘毒不散者古苓木湯神効丸六神
丸有積者通玄二八丹積消毒散脾胃已和氣血將復
然後用百中散以止之若更泄早則纏綿胃敗難救 豔

疰如肝不可治 豔疰痢黑如鷄肝發渴五內切痛乃服五
齒根丸救之亦有宜溫熱藥者○凡痢下如竹筒或如屋
漏水糜腐色氣短飢逆者不治或純下血小便不通唇紅

五九
三九
九丸

五九
三九
九丸

五九
三九
九丸

五九
三九
九丸

下後身熱脉弦 物宜通解或分消 亦謂之通 初病元氣實

者可行 若五七日 脾胃虛者 只宜和解 又乃升滋補脾胃

及分利小便 消導食積 無積不成病也 乃升滋補脾胃

稍久以氣血藥中加升麻柴胡防風蒼木以提之 又甚乃

用粟壳肉豆蔻龍骨牡蛎訶子以澁之 斂之 食火者專調

脾胃飲食進而氣血自和 蓋痢以胃氣為本也 其間有裏

急甚而無表者 即宜通利 有虛而不敢通者 或和解 或即

升舉 有氣陷下痢如注者 即暫止澁 有滑脫痛甚者 痰火

盛也 宜吐宜升 痰消火降 而大腸自斂 瀉憑脉症斷之

愈後餘痰却當防 木九 白湯 六神九 枳 恐成腫痛鶴膝類 有

足腫者 有遍身懸節痛者 俱餘痰留滯經絡 不可純用風

藥 鶴膝風 大防風湯 五積交加散 脾細者蒼龜丸 詳外科

濕類

痞滿

痞滿先分便秘難 痞與否卦義同 精神氣血出入流行之

若脹滿外有脹急之形 大要大便易 外感半表同傷寒 外

而利者為虛 大便難而閉者為實 外感半表同傷寒 外

邪氣自肌 天傳至胸膈 為半表裏 症宜和詳 或已經

下胸滿而痛者 為結胸 不痛者 為痞滿 同傷寒治法 雜病

食壅蒸養血 雜病食積下之太過 或誤下 則脾胃之陰 頭

其所蓄之邪 又且不散 宜理脾胃 兼以血藥調之 若用氣

藥 導利 則氣愈降 而痞愈甚 又則變為中滿 鼓脹 蓋痞皆

自血中來 但傷寒從外之內 宜以苦泄 雜病從內之外 宜

以辛散 人徒知氣之不運 而槩用枳梗檳榔 而不知養陰

調血 惜哉 古方食滯胸中窒塞者 三陳湯 探嘔傷飲食

胸痞者 枳木丸 食後感寒 以致飲食不化者 三陳湯 加山

查麥芽神麴 虛寒不散 或寬或急 常喜熱物者 痰火氣鬱

理中湯 加枳實 稍久 鬱成濕熱者 平補枳木丸 痰火氣鬱

利脇間 痰火因厚味鬱成 痰滯者 小陷胸湯 或枳梗二陳

湯 瀉痢湯 火盛者 二陳湯 加麥連瓜萎 或黃芩利

膈丸。用白朮陳皮煎湯下。或吞莫連丸以瀉肝補脾。清濕
 熱開痞結。久病者黃連消痞丸。如痰火濕熱太甚者。方敢
 用。三黃瀉心湯加減。量下之。虛者只宜分消上下。與濕同
 治。○七情氣鬱成痞。不思飲食。食之不散者。朱香化滯湯
 或順氣中虛如刺。痞碍阻。有稟受中虛。痞帶不運。如饑如
 瀉。痰湯中虛如刺。痞碍阻。微刺者。六君子湯加香附砂仁。
 有內傷勞後。濁氣犯上。清氣下陷。虛痞痞痞。補中益氣湯加
 黃連枳實芍藥。便閉加大黃。嘔加黃連生薑陳皮。冬月加
 黃連丁香。食已心下痞者。平補枳朮丸。停飲中寒者。枳實
 理中丸。○乘血結成窠。聚而心下痞者。用桃仁紅花香附
 大黃等分。為末。酒調服利之。或犀角地黃湯。血虛挾氣。遇
 勞則發。心下不快者。四物二陳湯加桔梗瓜萎降之。氣血
 供虛者。枳實消痞丸。王道消補。總可安。王道消補。不輕吐下。故台方
 實消痞丸。王道消補。總可安。王道消補。不輕吐下。故台方
 半夏辛散。參朮甘苦溫補。茯苓澤瀉瀉淡滲。隨病所在。調之
 ○通用。二陳湯為主。肥人多濕。痰加蒼朮砂仁滑石。倍茯苓
 苓半夏。瘦人多鬱。熱中焦。加枳實黃連乾葛升麻。稟受素
 實。實者。枳實升胃氣。更合四物湯以濟陰血。飲食積滯。加枳殼
 砂仁姜汁炒黃連。食後感寒。加藿香草豆蔻。吳萸砂仁。氣
 痞痰痞。加木香枳殼商陸。中虛加參朮香附砂仁。瘀血合
 四物湯。加
 桃仁紅花

泄瀉

五瀉須知瀉赤清

五瀉。瀉瀉。即濕瀉。腸垢。即熱瀉。鳴瀉。即
 寒瀉。虛瀉。滑瀉。大要。熱者小便赤。濕瀉。即
 瀉瀉。中熱。穀或不化。而色變青黃。或紅赤黑。身能動。作聲
 響。亮手足溫。寒者小便清白。不渴。腹中冷。完穀色亦不變。

瀉瀉。中熱。穀或不化。而色變青黃。或紅赤黑。身能動。作聲
 響。亮手足溫。寒者小便清白。不渴。腹中冷。完穀色亦不變。
 變亦白色。身懶動。作目睛不明了。飲食不下。機要。濕瀉身
 芒。暴瀉。非陽。又瀉。非陰。正如傷寒。始寒而終熱也。濕瀉身
 重注如傾。濕瀉如水。傾下。腸鳴。身重。腹不疼。外濕者。胃本
 湯。白水。茯苓湯。二白丸。風濕相
 持者。麩芩丸。痛甚者。治瀉瀉方。協風完穀寒急痛。風瀉。惡

湯。白水。茯苓湯。二白丸。風濕相
 持者。麩芩丸。痛甚者。治瀉瀉方。協風完穀寒急痛。風瀉。惡

湯。白水。茯苓湯。二白丸。風濕相
 持者。麩芩丸。痛甚者。治瀉瀉方。協風完穀寒急痛。風瀉。惡

湯。白水。茯苓湯。二白丸。風濕相
 持者。麩芩丸。痛甚者。治瀉瀉方。協風完穀寒急痛。風瀉。惡

或帶清血即太陰發瀉反其所食原物由春傷風寒夏感
於濕發動故其瀉暴一方長幼相似不可溫瀉以致變為
痢脹要知四季脾受風濕亦名發瀉春苦蒼防湯暑芍湯
夏二香散秋神木散冬不換金正氣散微汗之稍久者三
白湯麴芍丸帶血虛者胃風湯寒瀉惡寒身痛腹脹切
痛雷鳴鴨瀉清冷完穀不化甚則脾敗肢冷理中湯倍加
茯苓厚朴治中湯加神佐或大已寒丸又有一種
臘冷瀉以熱手按之則緩者四桂散古姜附湯身熱煩

渴暑分明暑瀉如水煩渴尿赤暴瀉實者始冷湯加黃連
湯有潮熱者粟冷湯或桂苓甘露飲虛者六和湯清暑益氣

日夕香連丸黃連阿膠丸來復丹內傷飲食痛且臭食積
瀉後痛減臭如抱壞鷄子嗜氣作酸須先消穀所傷之物
傷冷食者感應丸非胃散加香附砂仁草菓山查麥芽傷

熱食及酒者二黃丸加神麴傷酒晨瀉者理中加生薑乾
葛或香茸丸熱者酒蒸黃連丸傷麴者八參養胃湯加藜

藿香傷性飲者痞脹不順傷七情七情瀉腹常虛癉欲去
五苓散溫丸

氣帶加丁香砂仁良姜或木香勻氣散痰瀉多少火暴速
七氣湯古黃連丸調其氣而瀉自止矣

瀉瀉或瀉不瀉或多或少此因痰流肺中以致大腸不固
二陳湯加白木神麴實者海青丸虛者六君子湯○火瀉

實火口渴喜冷痛一陣瀉一陣肝門虛者其求暴速調劑
五苓散去桂加黃連芍藥或黃芩湯加木通六一散煎嘔

者加姜朮又火性急或未救不化者姜汁炒黃連不能疑聚
虛火氣虛不能必別水救者瀉生湯陰虛火動不能疑聚

者三白湯欬之虛瀉厥汗面多青虛瀉困倦無丸脾虛飲
者四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米為末砂糖湯調服

者只加升麻白芍或平胃蒜肚丸有停蓄飲食數日乃
瀉腹脹者名養瀉椒木丸沒石子丸煩渴或煎嘔者錢氏

白木散參苓白木散食少腸鳴四肢困倦者并陽除濕湯
日止夜瀉者啓脾丸又脾瀉久傳腎為腸癖經年不愈者

謂中健脾丸又老人脾腎虛瀉者用吳茱萸鹽水浸透以
積諸臟頭一截洗去脂膜將茱萸入內札兩頭蒸爛搗丸
豨豆大每五十九米飲下暖勝勝清水道固大腸進飲食

○腎虛色慾所傷。瀉多足冷。久則肉削。五鼓臍下絞痛。或
只微響。瀉瀉一次者。古味莫散。二神丸。四神丸。陽虛者。三
味安腎丸。金鎖正元丹。養氣丹。陰虛者。腎氣丸。○肝虛忿
怒所傷。木剋脾土。門戶不束。厥而面青。當歸厚朴湯。或熟

料五積散。去麻黃。汗多者。黃芪建中湯。○凡瀉滑瀉不禁
脉細皮寒。前後瀉利。飲食不入。是謂五虛。不治。滑瀉不禁

氣陷脫。瀉久不止。大孔如竹筒。直出魚禁。氣陷者。升陽補
者。訶子散。及石于丸。或舌蕈連丸。罌粟壳煎湯下。氣欲脫

者。負人春。臍湯加附子。或四柱散。夫斷下丸。苦蘆附丸。香
茸丸。婦人四製香附丸。又有大

交腸似痢何由名。交腸瀉
腸滑瀉。小便精出者。萬全丸。

便易位而出。此因氣不循故道。清濁混淆所致。當分利陰
陽。使氣順各安其位。胃寒湯。木香勻氣散。腎氣丸。○似痢

非痢。寒熱不調之症。或熱積於中。而以冷物。冷藥水之。或
冷積於中。而以熱物。熱藥壓之。故熱與冷搏而成瀉。或泄

或泄。裏急後重者。戊巳丸。香風宜微發寒。溫瀉虛補積消
瀉。或理中湯。加黃連。木香。

瀉。必滑脫不禁。然後用藥。蓋之。其間有風勝。瀉以解
表。寒勝。瀉以溫中。滑脫。蓋住。虛弱。補益。食積。消導。濕則淡

滲。暗則升舉。隨症變用。又不拘於次序。與痢大同。且補虛
不可純用甘溫。太甘則生濕。清熱亦不太苦。苦則傷脾。每

煎淡。瀉利竅為妙。○抑考難經云。胃泄。飲食不化。色黃。脾
泄。腹脹。嘔逆。言瀉也。大腸泄。食已窘迫。色白。腸鳴。切痛。小

腸泄。澀而便膿血。小腹痛。大瘕泄。裏急後重。致至闔而不
能便。室中痛。而溺澀。言痢也。觀此瀉與痢。亦惟膿血與糞

之異。除傷寒三陽三陰。傳變自利。雜病濕熱。食積之根。皆
責腸胃。蓋泄瀉。瘡痢。同由暑月。飲食所致。輕者便作泄瀉

重者。停為瘡痢。痰衝胸脇。則為瘡積。滯腸胃。則為痢。局方
有分難經五瀉者。

不免失之牽強。

吞酸

吞酸吐酸皆濕熱。經云。諸嘔吐皆屬於熱。又云。少陽之勝
瘴酸。蓋酸者。肝味。火盛制金。不能平木

醫管卷八 月卷之四 天發

則肝木自甚為酸譬之飲食熱則酸但吐酸乃平時津液上升之氣鬱為痰火留飲不化釀為酸水吐出吞酸乃濕熱伏於脾胃咯不得上噯不得下宿食鬱遏而作其因治一也惟濕多則吞而便利熱多則吐而便閉東垣言寒者

標論其大要初起宜反折鬱酸味刺心或即吐或欲吐不吐胸中魚奈或得熱湯暫解蓋風寒鬱在肌表得暖則腠理開泄譬之傷寒表熱以麻黃熱藥發表而愈不問外感

風寒內傷生冷初起俱宜生薑半夏夏湯或三陳湯加香木香肉桂乾姜砂仁藜藜前服暫與開鬱叫反佐之藥

非正治也中病即止如中寒停水者神麴丸上觸寒者三味參更湯上熱下寒者黃連一兩附子七錢神麴糊丸漆

姜湯下姜湯久則鬱熱宜以寒藥調之下之結

素食者恐滯氣也○宿食通用二陳湯或生料平胃散加香附砂仁神麴山查麥芽山楂仁黃連或枳木丸宿食留

飲酸蝨心痛牙齒亦酸者麴木丸專吐清水者用蒼朮茯苓滑石白木陳皮水煎服煎麴糊丸和丸○痰水停食

一月半日腐化酸水吐出黃臭或酸心不安通用二陳湯加中查神麴枳椇南星枳椇葉黃連竹茹姜煎隨熱入姜

汁一匙調服或丸味黃連丸挾痰血者四味黃連丸煎嘈雜者清痰丸○通用大便閉者透膈湯大便自利者用六一散七兩加吳

萸一兩飯丸服陰虛暮劇須養血朝食甘美至脯心腹刺酸止出血虛火感宜

因物湯加陳皮黃連黃芩桃仁紅花麻仁甘豆便閉結者更加大黃氣虛者更合四君子湯

黃疸

黃疸須知有濕乾發黃譬如會麴五疸同歸濕熱蓋濕熱

體俱黃黃即疸也乾黃熱勝色黃而明大便燥結濕黃濕

勝色黃而晦大便潤利又濕病與黃病相似但濕病在表

一身盡痛黃病渴多喘滿治之難九疸以十八日為期十

在裏一身不痛面黑者死要知疸兼雜症最多脾胃稍汗溺俱黃身體腫

實更饒厚味可治酒色傷恣口腹者難

汗出染衣亦黃身腫者曰黃汗因陽明表熱多汗帶汗入水宜拜技音酒湯衰陳湯○小瀉面目牙齒腫如金曰黃疸因暴熱用冷水洗滌熱留胃中故食已善饑安卧顛動宜茵陳三物湯加水通瓜萎仁石羔或單挑根煎湯服

頭眩懷發赤斑

過食停滯胸膈宜小柴胡湯加藜蘆

枳實山梔或殺疸丸結九疔傷冷食賊厥者四逆湯加前陳○心胸懷懷欲吐不食腹如水狀足心熱脛痛面發赤斑服黃真癰曰酒疸因大醉當風入水酒毒留於清道初起令病人先含水後以瓜蒂末一字搗鼻吐出黃水次服

葛根湯探吐亦可熱者小柴胡湯加茵陳白朮豆豉乾葛黃連澤瀉便閉者棗鼓枳實湯加大黃或酒蒸黃連丸如

酒後犯房痲熱入心成疸者妙香散痰火入肺甚則額黑成疔咳其見血喉腥及婦人血崩龍鵬鷄蘊丸

小腹瀉

額上黑微汗手足心熱薄原即發勝脫小便不利者曰白湯秦光飲子小兒經塗經嘔吐湯熱寒諸疸發於

小半夏湯發於陽繼必有虛勞口淡脚軟弱淡吐中耳鳴寒熱小柴胡湯加山梔

脚軟微寒發熱白濁氣虛四君子湯血虛四物湯合四散散加茵陳麥門冬氣血俱虛入參養榮湯六味丸如飲食

勞役失節中寒生黃者黃芩建中散外感瘀血詳傷寒行感湯理中湯食積者二陳湯加砂信

胃及伏暑解毒未盡蓄熱在內及宿食未消皆能發黃大要時疫瘡胸發黃瘡疔九風風色黃帶青小柴胡湯加茵

陳寒症酒煎黃帶理中湯加茵陳青皮枳實魚汗者用麻黃三錢酒煎溫服以汗之暑濕症色黃帶赤五苓散加茵

陳最妙○痰血發黃喜治疸表症小柴狂喜忘便黑詳傷寒

治分表裏滲為妙胡湯微汗之表少裏多者茵陳五苓散滲之半表裏者梔子白皮湯茵陳

三物湯一清飲子和之裏急者茵陳湯下之詭中尤以滲利為妙通用五苓散為主濕多倍茵陳食積加三稜莪朮

神仁神藥熱加麥連草龍膽小便不利加山梔胃弱合平胃散去厚朴加茵陳

溫中兼補腎與肝疸屬脾胃不可驟黃連山梔防已枳實

用涼藥傷胃輕則

嘔歲重則喘滿又酒疸下之則成黑疸不渴便利者俱宜
 六君子湯加茵陳蒼朮山藥以溫中甚者小溫中丸大溫
 中丸退黃丸若虛損猶宜滋補肝腎真陽之精一升而邪
 火自斂若必用茵陳強利小便枯竭肝津腎水則疸瘕幸
 瘥而雀目腫脹又作慎之

水腫

水腫上下陰陽微
陽水多外因涉水胃兩或兼風寒暑氣而見陽症陰水多內因飲水及茶酒過多或饑飽勞夜房慾而見陰症
 陽水先腫上體肩背手膊
 陰水先腫下體腰腹胫足三陰經故男從脚

下腫起女從頭上腫起男濕熱變化總屬脾人身真水真火
 者為逆陰陽微妙如以濕熱變化總屬脾人身真水真火
 生脾病水而為濕火炎為熱火則濕熱鬱滯經絡盡皆濁

腐之氣津液與血亦化為水初起目下微腫如卧蠶及至
 水浮膜外則為膚脹流下焦則為附腫手按隨手而起如

接之作水聲指乃氣虛下注腎經陰附腫腎主水也惟脾
 不能宣泄久成水瘕

下注腎經陰附腫
腎主水也惟脾不能宣泄久成水瘕
 滋真水非惟腎精宜削而濕熱下注陰附獨腫皆有之其
 則泛濫遍體魚歸必上實而後足以收攝利水腎氣歸元

上升氣喘肺孤危
氣孤危而失降下之令參道不通且濕
 熱濁氣上升為喘為咳必上實而後降下之令參道不通且濕
 源或曰獨魚寒濕者乎寒則上堅水清間有亦更易治陽

水熱渴二便閉汗下分消要得宜
經曰諸附腫痰酸皆屬於火又曰結陽肢腫是也

也○治與水症濕症大同大法腰已上腫宜汗腰已下腫
 宜下表症喘咳小青龙湯越婢湯舌麻甘湯桂枝音酒湯

粟症腹腫脇硬千棗湯澤瀉湯澤瀉湯瀉瀉湯瀉瀉湯瀉瀉湯
 神祐丸唐川丸布海丸然症雖可下又當權其輕重若年

衰久病及虛者黃米丸初起只宜上下分消其濕五苓散
 用桂枝合六一散加橘皮木香檳榔生薑煎服或單山梔

左木香白木煎湯下兼陰水身涼大便利補中行濕或升
 黃者茵陳五苓散散之

陰水身涼大便利補中行濕或升

黃者茵陳五苓散散之

黃者茵陳五苓散散之

提經曰陰蓄於內水氣脹滿是也○治宜補脾土以復運

化之憲清心火降肺金俾肝木有利而滲道又且開通

此補中行濕蕪全虛而有濕熱者最宜若中寒者溫補則

氣煖而小使自通氣陷者升提則陽舉而陰自降故曰行

濕非五苓神祐之謂也○補中氣六君子湯加木香瀉者

參芎白朮散升陽除濕防風湯嘔者赤茯苓湯中寒者玄

武湯實脾散揆食積者紫皮丸千金養脾丸揆濕熱者中

瀉分消湯加濕甚者退黃丸○虛甚氣陷口無味者六君

子湯加升麻柴胡以提之從元用切忌淡滲○腎虛腰重

脚腫濕熱者加味八味丸滋腎丸陽虛小便不利者古沉

附湯二便俱利者陰多久病或產後久病喘咳瘧痢或誤

木附湯復元丹

症也俱宜補脾為上○大柴胡喘者承氣紫蘇飲五皮散葶

應丸久病加味八味丸○瘧退黃丸○產後腫必大補氣

亟使水自降入物湯加蒼朮陳皮半夏香附有熱加麥門

冬黃芩氣不順加水香砂仁懷胎氣過水道腫者去半夏

加紫蘇大腹皮飲食無阻陽煎食毒與瘡癩食積香平丸

胃苓湯○喉瘡燥藥愈後發腫敗毒散便閉升麻和氣散

乾瘡洗浴水氣入腹者赤小豆湯○瘡久倦怠皆因腫者五

苓散加橘皮木香檳榔滑石甘草枳殼大腹皮砂仁姜煎

風腫走注皮麻木

惟腸管石瘕乃婦人病也○風腫血腫

痛風腫者腫面多風熱腫脚多風濕開脈浮洪弦者風熱

濕三氣鬱而為腫因脾土不足木火太盛胃中結是風氣

所以清氣不升腹作脹脹濁氣不降大便閉澀經曰中滿

瀉之於內者是也外症走注疼痛面皮癢麻木不信先服

三和散次服示續命湯大便閉去附子加檳榔牽牛日夕

者金丹風從汗散故也虛弱不敢汗者因檳榔牽牛日夕

柴胡蒼朮防風汗氣腫隨氣消長之○脾肺俱病四肢瘦削

腹脇脚脹與水氣相似但以手按之成凹不起者濕也

按之皮厚不成凹者氣也六君子湯加木香木通喘者木

香流氣飲大便閉者三和散六磨湯木香檳榔丸小使閉

者外心氣飲嘔瀉者四炒枳殼丸瀉者單香附丸故痰腹

木湯控涎丹。痰血之腫如何識皮間赤縷血痕兒。湯加

挑仁紅花或續斷飲加味八味丸婦人經閉敗

血腫者腎氣丸加紅花或紅礬丸詳婦人經候

陰陽候。王莖與陰囊伸縮痠強乃身中陰陽之機有陽火

四苓散加山梔木通金鈴子莖囊腫大通明者木香泥氣

飯加木通煎吞青木香丸暴風客熱陰挺腫脹者龍膽瀉

肝湯。膀胱熱甚囊腫二便不通者三白散入正散腫痛者

用木茴全蝎穿山甲木香等分為末每二錢空心酒下有

陰寒濕腫瘦弱者五苓散加茴香或八味丸腎大如斗者

荔枝散上熱下虛王莖腫痛者滑心蓮子飲陰腫大如升

核者用馬鞭草搗爛塗之或乾地龍為末鴉子

清調敷囊軟者可塗婦人陰腫便穢如掃髮

通治忌甘

與刺皮。九陽水宜辛寒散結行氣治寒濕火燥濕陰水宜

針刺犯之流水而死。通用。陳湯去甘草加蒼水白木

為君。佐以猪苓澤瀉山梔滑石。冬黃桑為使。青肺

作肝。腹脹加厚朴。瀉加南豆寇訶子。喘急加桑白皮杏仁

氣壅加香附。食積加山楂麥芽。陽水便閉加甘遂少許。陰

水氣弱加入參。風腫加羌活防風白芷。夏月加香薷。寒加

鼓脹

與喘 泰看

痛。下腫加防已。木火。陰囊腫加小茴木香。外腎如石引鴉

痛。下腫加防已。木火。陰囊腫加小茴木香。外腎如石引鴉

黃木通。陽明加茯苓椒目。太陰加甘遂。苦意。少陰加澤瀉

連翹。巴戟。厥陰加大戟吳萸。此推廣。占法。不可妄用。蓋甘

遂大戟。羌花。損氣。破血。巴豆。損腎。陰氣。輕粉。傷齒。毒。留腸

胃。土。狗。劫。奪。消。而。復。腫。慎。之。凡。先。腫。腹。而。後。潰。於。四。肢

者可治。先腫四肢而後歸於腹者難治。若肌肉崩潰。疔疔

流水。唇黑耳焦。缺盆平。臍凸背平。手足掌平。肉硬。腹多青

筋。大便滑泄者不治。又面黑者肝死。兩手魚紋者心

死。臍凸者脾死。兩肩凸者肺死。下注脚腫者腎死。

鼓脹虛軟實則堅。鼓脹中空外堅。有似於鼓。又曰。蠱者若

虫侵蝕之義。虛脹陰寒為邪。此利不食

醫學八月卷之四

時脈時減。按之則陷而軟。實脈陽熱為邪。身熱咽乾。常脈內痛。按之不陷而硬。大槩肥人氣虛多寒濕。瘦入血虛多濕。都緣脾濕少運布。今內傷外感。脾陰受傷。痰飲結聚。飲食之精華。不能傳布。上歸於肺。下注膀胱。故濁氣在下。化為血。乘鬱久為熱。熱化。成濕。濕熱相搏。遂成鼓脹。或在臟腑之外。或在榮衛之分。或在兩脇。或在

皮膚。雖各臟腑見症。亦總歸於脾。或在

胃痛癰閉小腹墜。心脈煩心。肝脈脇痛。脾脈善嘔。噦。肺脈

鳴。痰泄。小腸脈小。便引腰痛。膀胱脹小。外感寒鬱為裏邪。

便瀉。開三焦脈氣痛。皮膚脹。口苦。

外感風寒。傳至陽明裏。大實大滿者。承氣湯。古云。下之

脈已者是也。尋常感風。脹者。舟麻葛根湯。加蒼朮。或升

麻胃風湯。感寒。脹者。不換金正氣散。加檳榔。枳殼。乾姜。風

寒。兩感。脹者。五積散。若脹二便不利者。香薷散。加滑石。枳

殼。黃連。二便利者。六和湯。濕脹。腰內傷氣滯閉且利。七情

重感。嘔者。白瀉湯。者。二日湯。內傷氣滯閉且利。七情

氣道。升降失常。腹脹大而四肢多瘦。四七湯。七氣湯。四妙

枳殼丸。因怒傷肝。勝脾者。赤痛喘急。平肝飲子。甚者當歸

龍薈丸。虛者。禹餘糧丸。因怒傷肝。乘肺。傳大腸者。腹鳴氣

走有聲。二便或閉或瀉。六君子湯。加藶子。大腹皮。木香。草

菓厚。枳實。便閉者。三和散。西磨湯。憂思氣鬱者。木香化

滯湯。采香。枳木丸。溫膽湯。退熱清氣湯。恐傷腎。精氣怯。却

益氣湯。加水香。檳榔。故紙。食脹有熱亦有寒。因食向果菜

不。上。升。而。下。焦。脹。者。補。中。養。胃。湯。加。香。附。砂。仁。甚。者。沿。中。湯。加。下。香。或。厚。朴。附。子。二

味。煎。服。久。則。濕。熱。乘。脾。大。便。乾。燥。者。和。左。傷。向。者。黃

連。阿。魏。等。分。醋。浸。蒸。餅。為。丸。或。三。補。丸。用。香。附。山。查。煎。湯

下。傷。雜。果。者。苦。桂。香。丸。或。鹽。湯。探。吐。膏。梁。厚。味。大。便。閉。者

大。承。氣。湯。加。棗。或。厚。朴。湯。積。熱。者。牽。牛。丸。虛。者。林。香。積。散

丸。滋。九。敷。脹。痞。滿。心。如。醋。因。穀。食。不。化。曰。穀。脹。朝。陽。感。能。食

腎。丸。寬。中。散。濕。熱。者。古。黃。連。丸。清。曠。香。菹。虫。積。善。食。癢。不。眠

丸。俱。穀。芽。煎。湯。下。或。單。鷄。醴。散。最。妙。虫。積。善。食。癢。不。眠

魚積脹腹痛善喫茶鹽之物千金散雷公丸小兒更君子丸大人虛者木香檳榔丸靈寶散化虫丸○積塊癥瘕心腹堅硬咳嗽不眠者積木九龜甲丸

水脹漉漉血便疥因安丸紅九子輕者積木九龜甲丸

水飲茶酒不散曰水脹腸中漉漉有聲怔忡喘息三陳湯加枯梗槿柳消飲丸酒脹桂苓甘露飲○痰血脹便黑多

跌墜及產後所致入參一

治黃芪厚朴木香食積加山查麥芽扶濕熱加黃連青皮白芍木香清氣而者木香順氣湯有血虛者兩物湯加白

木水通厚朴枳殼熱加芩連有食滯者平胃散加山查麥芽或煨木丸九虛脹及久病瘡痢脹者但依此分氣血調

治補中行濕法相共更難蓋水腫飲食如常鼓脹飲食不及常病根深固必三五年而後成治腫惟補中行濕足矣

治脈必補中行濕無以消積更難治腫惟補中行濕足矣

効乃可萬全勞單腹腫大而四肢極瘦者名蜘蛛蟲方

生相備乃其腫痛也治補中六君子湯去甘草加大

腹皮厚乃為君佐以澤瀉利濕黃芩麥門冬制肝朝寬慕

急為血虛去參合四物湯朝急募寬為氣虛倍參木朝慕

皆急血氣俱虛合八物湯肥人多濕合平胃散瘦人多火

加香附黃連寒加附子厚朴熱加大黃食脹散砂仁神麩

痰脹倍半夏加檳榔猪苓瘀血加桃仁五靈脂積聚堅噎

加三稜莪朮大怒加薑香山梔氣脹及虫積加木香檳榔

氣下陷加升麻芎藭丸議下頭眩實人盛按之堅者先與

赤白濁

赤白濁

男 女 皆因濕熱脾胃濕熱中焦不清濁氣滲入膀胱為濁如夏月天熱則萬木沅津

○赤者血水濕熱甚心與小腸主之瀉赤散兩物二陳湯加檳白皮青蘆滑石○白者氣分濕熱微肺與大腸主之

醫學入門卷之四 赤白濁

清心蓮子飲或五濕痰濕火理一同肥人多濕痰二陳湯加蒼木白朮赤濁加

積散合四君乎湯白芍氣虛加參芪傷暑加澤瀉麥門冬人參傷風加防風

扶寒加姜桂甚加附子有熱加知母黃柏山梔或星半蛤

粉丸因七情生痰者四七湯瘦人多濕火加味對進散

四物湯加知母黃柏或真珠粉丸擗栢丸虛挾痰火腎氣

丸補陰丸不可純寒藥傷血亦不可純燥藥

助火蓋寒則堅疑熱則流通俱宜清上固下

間有虛勞下

部冷思慮勞心虛者妙香散干味溫膽湯金蓮丸房慾傷

腎俱虛無火者還少丹虛冷小兒則升提斂胃宮清思亦

腹痛不可忍者酒煮當歸丸

傷脾精生於穀故久則宜升胃補脾二陳湯加苜麻柴胡

以升胃氣素有痰火恐升動痰火胸滿者再加枳克香附

神她白朮或用此吐以提之如虛勞者補中益氣湯脾濕

不飲者蒼朮難名丹內炒固真丹白朮膏威喜丸又甚五

龍躑丸石道

散遠志丸

腰
痛
新
久
總
腎
虛
漸
痛
宜
疎
外
利
清
濕
熱
久
則
補
腎
蒸
理
必
腎
虛
而
後
邪
能
湊
之
故
不
可
純
用
涼
藥
亦
不
可
純
用
參
茸
補
氣
痛
甚
面
上
忽
外
感
暴
痛
寒
背
拘
傷
寒
必
依
六
經
症
見
紅
點
入
中
黑
者
死
外
感
暴
痛
寒
背
拘
傷
寒
必
依
六
經
症
三
葉
尋
常
感
風
暴
痛
不
能
轉
側
如
寒
傷
腎
者
遇
天
寒
發
連
背
拘
攣
脈
沉
弦
緊
五
積
散
加
吳
萸
桂
仲
排
仁
痛
甚
加
黑
牽
牛
少
許
服
厥
者
古
姜
附
湯
連
有
背
濕
痛
重
着
執
煩
燥
處
者
通
氣
防
風
湯
摩
腰
卅
屈
伸
熨
法
濕
痛
重
着
執
煩
燥
處
早
濕
雨
露
侵
淫
為
濕
所
着
腰
重
如
石
冷
如
水
喜
熱
物
熨
不
渴
便
利
飲
食
如
故
着
腎
湯
加
附
子
停
水
沉
重
小
便
不
利
五
苓
散
參
濕
湯
腰
重
痛
單
角
箇
散
久
不
已
單
牛
膝
浸
酒
服
青
娥
丸
加
草
薢
最
妙
濕
熱
者
長
夏
暑
濕
相
搏
或
因
膏
梁
成
濕
熱
者
亦
同
實
者
二
炒
蒼
柏
散
加
柴
胡
防
風
煎

腰痛

腰痛新久總腎虛漸痛宜疎外利清濕熱久則補腎蒸理

必腎虛而後邪能湊之故不可純用涼藥亦不可純用參

茸補氣痛甚面上忽外感暴痛寒背拘傷寒必依六經症

見紅點入中黑者死外感暴痛寒背拘傷寒必依六經症

三葉尋常感風暴痛不能轉側如寒傷腎者遇天寒發

連背拘攣脈沉弦緊五積散加吳萸桂仲排仁痛甚加黑

牽牛少許服厥者古姜附湯連有背濕痛重着執煩燥處

者通氣防風湯摩腰卅屈伸熨法濕痛重着執煩燥處

疝本濕熱標則寒醉飽勞後房慾怒動火火鬱父則生

又暴為外寒所束是以痛甚有專言寒者論其標耳大要

熱者遇熱則發二便赤澀小腹肛門俱熱外腎累垂玉莖

挺急寒者遇寒則發二便皆利腸腹清冷外腎緊縮又小

腸膀胱總由肝局方多以為小腸氣膀胱氣腎氣者亦由

而上入小腸又肝腎所屬於下與衝任督相附腎與膀胱

為臟腑其氣相通連為外腎系於辜丸此三經相連相會

然肝主筋等九雖名外腎非厥陰環而引之與玉莖無由

伸縮在女子則為篡戶經云邪在小腸連辜系屬於腎貫

肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃薰肝散於背結於臍惟

取厥陰以下之及論三臟脈皆以滑為疝每云風疝者非

外風病也乃肝木陽臟氣動之風論三陽疝發寒熱言膀胱

非受病之虞也傳於肝而後為疝又明堂穴法治病皆厥

陰部分可見疝主肝經○小腸多氣少血之經愈怒憂思

起於肝而心氣因之鬱結○小腸為表裏膜外氣聚

胞絡真氣膀胱氣脈然皆肝所主也所以病發不特外腎

小腹作痛或攻刺腰膈或遊走胸背或捺心痛或連臍痛

男子遺精女人不月令人羸瘦少氣洒淅寒熱令少嘔吐

疝者有連小腹痛者感於觸怒則塊物逆上

囊根心和氣平則塊物自循骨系歸入囊中

水筋氣血狐

癩寒水亦囊腫如水品或囊痒而流黃水陰汗自出小腹

疝陰壹腫脹或挺長不收或痛痒至極得於房勞○血疝

如黃瓜在小腹兩傍俗云便毒得於春夏大燠氣勞於使

內血滲入浮囊結氣癰腫○氣疝上連腎俞下及陰囊得

於號哭忿怒氣鬱而脹或勞役坐馬致核腫脹備有大小

皆難治○狐疝狀如仰瓦即則入小腹如狐之晝出穴而

夜入穴而不澀亦與氣疝大同○癩疝亦有四種詳後○

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控辜丸而痛得於寒濕

使內過勞久而無子此七疝之名從經旨也餘皆謬妄不

論

論

論

論

論

取丸病久則成精盛附勝陰癩腫痛硬如石此即癩病在婦人則為陰

之上下左右為癩為癩

力突出寒勝則痛濕勝則腫寒濕相搏熱毒又重則腫硬

如石○腸癰即小腸氣吊外腎偏墜腫癢○疝癰王堯腫

硬引臍絞痛甚則陰縮肢冷囊上生瘡成癰二症出水不

止者死○氣癰素有濕熱因怒激起相火昏眩手搐如狂

面黑羸丸能左右相過氣痛飲黃連梔石丸寒冷者五積

散蠅忽散當歸四逆湯承香勻氣散青木香丸菜蕪內消

丸黑錫丹○水癰外腎腫大如斗如乳不痛不痒得於早

濕五苓散加小茴非汁為丸卑竹茹湯熱者三白散橘核

散又者硬木不通腫偏左此又言癰疝之中有木腎者有偏墜者○木腎堅硬頑痺不痛

痛核丸不降腎水不濕治腎丸西製菜更丸肉炒川練丸

乃心火不降腎水不濕治腎丸西製菜更丸肉炒川練丸

或單用雄豬樹葉不結子者是晒乾為末酒糊丸梔子大

每五十升空○盧酒下又有跌傷驚氣與敗血攻入者當

消赤血○偏墜腫有大小偏左多病血怒火或腎氣虛搗

偏右多濕痰食積是知癰疝在皮散治宜詳審故特抽

信文治癰疝○小兒胡湯合四物湯加龍膽草青皮治詳內外宜疎

固者小兒胡湯合四物湯加龍膽草青皮治詳內外宜疎

利疝雖濕熱然生於陰起於下○腸氣每先傷足三陰剖分

痛筋頭桂枝湯有泄者凶君子湯加羌活附子○寒疝心

痛筋頭桂枝湯有泄者凶君子湯加羌活附子○寒疝心

食鹽少許四製黍更丸硫荔丸○暑疝小腹脹急瀉熨香

菴散加瞿麥木通○濕疝身重小便不利大便或溏五苓

○痰病海石香附二味姜汁調服痰飲食積者守効丸○
 食積痰血者梔桃枳查散失笑散食積被熱者積疝丸食
 積缺虛者入味茴香丸○虛疝暴痒四君子湯加川練子
 前香枳實山查山桅按之不痛者加肉桂姜汁按之不定
 者用桂枝烏頭山桅為末姜汁糊丸姜湯下大能劫癩久
 者三萸內消丸九虛疝不宜預補經云邪之所湊其氣必
 虛留而不去其病則實必先瀉其所蓄之熱而後補之是
 以諸方多借巴豆氣者此也虛甚上為吐逆下有遺精者
 危要知濕熱為病俱宜瀉南補北不可妄用剛劑○久成
 癥瘕腹痛氣積如臂者白葱散或理中湯加阿膠腹痛有
 塊盛臍傍者聚香飲子新蘆芭丸腹痛有塊附臍下者去
 鈴丸欲作奔豚者茯苓甘湯奔豚疝痛者丸七氣湯加
 炒牽牛○通用○陳湯加姜汁積加枳實山查熱加山桅
 痛加枳核煎血加玄胡索桃仁積加木香茴香川練子痛
 甚加乳香沒藥荔枝核腎大如毛加茴香青皮昆布海藻
 為丸服水煎加消芩澤瀉以逐水筋疝加黃連白茯苓
 以降火血亦合四物湯以調血不食清肝益米湯或清胃
 益氣湯氣疝加栗胡青皮香附行魚孤疝加青皮香附蒼
 木逐氣流疝更以坡蝟十四枚桂枝五錢為末密丸米飲
 下癰疝加白朮蒼朮猪苓澤瀉煎調荔枝散菓茹加吳黃
 姜桂溫散○常用辛平破血消痰積之劑癰核散辛溫散
 氣溫散之齊五炒川練丸河炒川練丸金鈴丸四味茴香
 散古玄竭散辰砂一粒
 冊神聖代針散選用

脚氣

脚氣須知有濕乾

脚氣內經名厥兩漢名緩風初病不覺

類傷寒但初起則卒然脚痛發則旬月又作為異○濕者
 筋脉弛長而軟或浮腫或生腫瘡之類謂之濕脚氣宜利
 濕疎風○乾則熱也乾者筋脉縮攣內因食積外風寒
 痛枯細不腫謂之乾脚氣宜潤血清燥

內因好食乳酥醇酒濕熱下流肝腎加之房勞故富貴之
 人亦有脚疾外因久坐久立濕地或貪著跋涉山溪瘴毒
 夏月則感濕熱之氣發則四肢多熱冬月則感濕冷之氣
 發則四肢多冷加以當風取涼汗出先足醉後入房故成

節週身初起察其起處腫痛最妙濕勝腫弓寒勝痛

加痰藥赤裂腫痛甚用甘遂為末水調敷腫處另用甘

草煎湯服之立消或敗毒散加蒼木大黃搜風順氣丸

○濕蕪集則痛五積散不換金正氣散附子六物湯勝駭丸

○濕蕪風則走注不常烏藥順氣散地仙丹甚者用赤芍

草烏等分酒糊丸服以劫之扶痲血者復元通聖散合消

風散○濕蕪熱則腫痛異常希味蒼柏散二炒蒼

柏散清燥湯○食積濕痰下注者橫痃蒼柏丸 虛火軟

緩痺且頑軟痺者乃膏梁火乘肝腎以致血氣流則痺厥

順氣丸然腎主骨虛則骨軟陽虛附虎四斤丸陰虛虎潛

丸腎氣丸胸軟筋痛者天補丸去地黃加白芍知母耳

真卅所腎脾俱虛者五獸三置卅 在下升之衝上降丸

氣腫在下隨氣血痰藥中加防風蒼木升提其濕衝心則悅

氣腫在春正卅有火者四物湯加黃柏以降之再用附子

末津調塗湧泉穴引勢下行入腹不仁喘急欲死者木更

散腹脹煩燥者松節湯入肺喘咳小青龙湯加檳榔入肝

頭目昏眩喘滿逼促烏藥平氣散入腎腰胸腫脹小便不

利目額皆黑左尺絕者死牛膝散加大黃救之如少陰腎

氣入心乃水尅火也急宜八味丸救之有脾氣寒熱足腫

心煩體痛垂死者杉節湯不食加砂仁青皮木瓜外用桃

柳桑槐楮五枝煎湯洗之消腫住痛須先喫酒三五盃最

忌熱藥蒸泡恐通邪入經絡 表汗裏下任湯丸 濕熱注

故治脚以疎通氣道為佳 火鬱成毒腫上于三陽寒熱嘔惡身痛且重者左陰湯主

之或香薷散加木瓜檳榔七情再加五加皮木香痛加赤

芍忍冬藤浸人加當歸○三陰裏毒胸滿怔忡遍體轉筋

二便閉或自利者着滑瀉湯除濕丹煎水丸搜風順

氣丸挾痰者三花神祐丸挾食積者開結導飲丸裏虛

者獨活寄生湯換腿丸表裏兼見者左經湯加大黃

跟痛轉筋皆血熱亦有痰火及風寒 脚跟痛有血熱者四

物湯加知母黃柏牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

膝有痠者五積散加木瓜。或開結瀉飲丸。○脚轉筋有血熱者。凶物湯加酒。芍藥花。有筋動者。足大指上。至大腕。近腰結了者。此奉養厚。因風寒而作。又當加蒼木。南星。感濕者。除濕丹。常用。松節。二兩。乳香。一錢。慢火焙。存性。為末。每日一錢。木瓜煎酒調服。○有踝上生一孔。約深半寸。至下半日。疼異者。此濕毒注成漏也。用人中白。灸出水。滴入瘡口。

燥類

消渴

消渴先明氣血分。

經曰。二陽結謂之消渴。二陽者。手陽明。大腸。主津液。足陽明。胃。主血。津血不足。

發為消渴。又有燥結者。肺與大腸為表裏也。有氣分渴者。因外感傳裏。或服食燥燥。熱耗津液。喜飲冷水。當與寒涼。參劑。以清其熱。熱去則陰生。而渴自止矣。有血分渴者。因內傷勞役。精神耗散。胃氣不升。或病後胃虛。亡津。或餘熱在肺。口乾。作渴。喜飲熱湯。當與甘溫酸。總是火炎。不必熱。以滋其陰。其陰生則燥除。而渴自止矣。

問。消者。燒也。如火。身燒。物理者也。三消。上中既平。不復復。下。上輕。中重。下危。總皆肺被火。煎薰。日久。氣血凝滯。

故能食者。未傳癰疽。水自溢也。不能食者。未傳脹滿。火自炎也。皆危。上消引飲便如常。熱在

心。肺。煩燥。舌赤。唇紅。少食引飲。小便數者。西物湯。合玉脂散。加天花粉。地黃。汁。藕。汁。乳。汁。酒。客。加葛。汁。能食者。百虎

加參湯。不食者。錢氏白朮散。清心蓮子飲。又膈滿者。謂之膈消。門冬飲子。火留肉分。變為癰腫者。忍冬。藤。丸。黃。芪。汁。

元散。益中消善饑。魚。尿。糞。熱蓄中。焦。脾。胃。消。穀。善。饑。不。甚。渴。小便便赤。數。大便硬者。西物湯。

加知母。黃。柏。石。羔。黃。芩。滑。石。以。降。火。熱。甚。者。調。胃。承。氣。湯。三。黃。丸。物。病。寒。中。陰。勝。陽。鬱。後。變。為。熱。中。者。拜。麻。葛。根。湯。

瀉。黃。散。濕。積。毒。者。消。渴。痞。丸。虛。者。錢。氏。白。朮。散。硬。閉。者。當。歸。潤。燥。湯。泄。瀉。者。白。朮。均。藥。湯。上。中。二。消。者。蘭。香。飲。子。心。

火。乘。脾。者。黃。連。猪。肚。丸。肝。侵。氣。衝。肌。熱。不。食。食。即。吐。蛔。者。烏。梅。丸。鐵。粉。丸。有。虫。耗。其。津。液。者。單。杏。練。湯。水。停。於。下。變。

為。疔。腫。者。五。苓。散。或。腎。消。溺。濁。陰。莖。強。熱。伏。下。焦。腎。及。精。去。捷。加。入。參。朮。丸。

去捷。加入參朮丸。

溺下小便便混濁如膏淋然腿膝枯細面黑耳焦形瘦者同
 物湯加小使母黃柏五味子玄參人乳汁善調水火或補陰
 丸腎氣丸先坎離丸八味丸六附子加五味子玄參丹鹿
 兔丸麥授天王補心丹威喜丸麝香散單蘭系湯或十全
 大補湯去桂枝地黃加知母黃柏上熱下冷者清心蓮子
 飲○有五石過度之人真氣既盡石氣獨留陽道與莖不
 交精泄者謂之強中小便便或油膩或赤黃或淋白或濁而
 且利或渴而不利或不渴而利飲食滋味入腹如湯漉雪
 隨小便而出落於溝中結如保肺滋腎脾自運養肺降心
 白脂肌膚日瘦者無治法

久則滋腎養脾蓋本在腎標在肺腎煖則氣上升而肺潤
 腎冷則氣不升而肺焦故腎氣丸為消渴良方也然心腎
 皆通乎脾養脾則津液自生麥冬白朮散是也三消通劑
 單文蛤為末水調服回津止渴單瓜萎根丸消渴神藥大
 忌半夏燥劑○和論水包天地人身臟腑亦津液真水所
 包然有形者凡水也兌也坤也無形者天一所生之水原
 也坎也乾也能以無形之水沃魚形之火是謂既濟雜病
 治法

燥結

燥結兩字亦有辨

燥結有能食燥熱燥火燥氣血虛燥詳燥門
 結有能食燥實數者為陽結不能食燥

弦微者為陰結亦有燥潤結通魚後患燥屬少陰津液不
 年高氣血虛結者燥潤結通魚後患燥屬少陰津液不

太陰有燥糞若以瀉之凡結後仍服潤濕鬱脹滿熱有時
 血生津之劑免其再結再通愈傷元氣燥結有時者為

濕熱佛鬱心腹脹滿有虫積者橫痃丸凡燥結有時者為
 實無時者為虛有藥石毒者大小便閉氣脹如鼓者汗和

散合三黃湯飲食毒者津少臟寒七情慣津以因發汗利
 香連丸胃火者白虎湯津少臟寒七情慣津以因發汗利

後失湯等症血液枯者五仁丸腎氣丸大補陰丸或填精
 通幽湯加檳榔條芩陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯挾

七情者古菴沉丸○臟寒則氣逆臟冷則血枯有症癖冷
 氣結滯者古半碗丸古姜附湯五積散水冷與之其病雖

宜服陽藥若大便不通者亦當暫與潤劑微通大便不令
 閉結○七情氣閉後重窘迫者曰利散六磨湯如脈浮晝

便難者。用陳皮杏仁等分蜜丸服。麻沉夜便難。宿食秘喘者。換桃仁。痰滯不通者。二陳湯加枳殼檳榔。

審熱寒。傷熱物者。二黃丸。傷寒物者。丁香脾積丸。流行肺

氣無遲慢。肺與大腸為表裏故也。積梗湯加紫蘘。或蘘子

弱約束津液不能四布。但輸膀胱。故小便數而大便難。此

脾約丸之由制也。但脾屬陰。虛火燔金。則肺失傳化。尤

宜滋陰養血。在西北壯實者。以脾約丸開結可也。東南氣

血虛者。潤燥為主。通用冷熱熨法。掩臍法。麻油煎法。

火類

脇痛

脇痛本是肝家病。痛引小。宜分左右審實虛。左右者。陰陽

肝陽血。陰右肺陰氣。陽實者。肝氣實也。痛則手足煩燥不

九。虛者。肝血虛也。痛則悠悠不止。耳目眩瞶。善恐。如人將

捕四物湯加柴胡。或五積散去麻黃。加青木香。青皮。虛

甚。成拍。脇下常一點痛不止者。名乾脇痛。其痛入物湯。左

加木香。青皮。枳實。有火去桂。加山梔。或吳茱萸。水炒。黃連。左

為怒火與死血。大怒氣逆及謀慮不決。或外感風利。皆冬

九。輕者。小柴加黃連。牡蠣。枳殼。瘀血必歸肝。經夜痛。或

午後發者。是刀梁胡湯。合四物湯。加桃仁。紅花。乳沒。痛甚

右食痰飲七情居

食積。脇下如扛。梗起一條。作痛。神

痰飲流注。肝經喘咳。引痛者。三陳湯加南星。蒼朮。川芎。柴

胡白芥。子。或入青黛。少許。姜汁三匙。痰甚者。控涎丹。如胸

背脇痛。喘急。妨悶者。瓜蒌實丸。飲水停滯。脇下如插。痛

者。濃煎葱白湯。調枳殼。煮散。甚者。用傷寒水。症治法。如子

情凝滯。如有物刺痛。氣促嘔吐者。分氣紫菀飲。流氣飲。子

調中順氣丸。鬱氣挾食。連乳痛者。推氣散。煎散。悲哀傷

者煨壳煮散茵陳實散一
脾氣丸素有醫者越劍丸
兩脇常兼左右症濕熱盛則

歸龍養丸諸脇痛皆効如痛不可舒伸者用此丸二錢半
加姜黃桃仁各五錢蜜丸或煎服○外感脇痛寒熱者小

柴胡加枳實丸成積還有餘脇痛二三年不已者乃痰積
櫻詳傷寒結成積塊肝積肥氣肺積息

責發作有時雖皆肝木有餘不可峻攻宜枳木丸加官
桂陳皮枳梗甘草蜜丸服或復元通聖散附脇脾方

夢遺

夢遺之病全屬心而元精以為此精之木貴實在乎心日
有所思夜夢而失之矣治宜黃連清

心依或干味溫膽湯或香散定志丸相火一動走精金入

之精貴於全寶初因君火不熾又則用火鹽權精元一於
走而不固甚則夜失連連則亦滑溜不已宜先戒離丸有

火感精中多有紅絲令弱於漏查視之便見後不信魚夢
而遺者念頭將動精先沉念氣宜降精宜升慈心一動精隨

欲小便然或從小便而出或不從便出而自流者謂之遺
精比之夢遺尤甚宜芻蕘分清飲或八物湯真蛤粉丸

日久有虛水虧火益燥滋陰降火脾胃濕熱亦相侵
火乘脾濕與熱合脾土全是死陰火運飲食易於侵犯宜

樗因飲酒厚味乃濕熱內鬱中氣不清所化之精亦皆濁
氣歸於腎中而水不寧靜故遺而滑也宜補陰藥中加人

參升麻比胡以升胃中清氣更宜節飲食以固命根
也噫精字從米從青生於穀之清氣也養生者味之固

年高陽虛脫者四十以後步履傷氣而不能固守者為早
加減吞卑樽皮丸或小兒兔絲子丸如早

慈過陽脫者究源心腎丸青娥丸黑錫
丹縮泉丸金鎖正元丹氣隨者神弓湯却魚精滿溢而淋

有以年壯久不御女精滿而溢者深為可笑入之臍臍惟
氣與血神則主宰其中而無形迹可見精乃一時交感二

醫學入門卷之四

夢遺

六

焦之火吸撮而成。豈先有蓄積於中耶。惟節色氣血漸盛而精不清。薄理也。其不御女而漏者。或聞淫事。或見羨色。或思想無窮。所願不得。或腎入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。而精自出者。謂之白淫。蓋腎藏天一以裨為事。至意內治。則精全而固。夫思外淫。居室太甚。服藥滋陰戒酒色。清宜乎滲漏而不振也。單黃柏丸最妙。

心先要斷真淫

亦有清心靜坐。養精神者。但好色種子。猶益之說。以為可以止精不流。然對景忘情。實墜不復。懸乎。限褻之事矣。故曰。學仙不漸淫。蒸砂飯不成。養生者慎之。

通用單五味子膏。金櫻膏。水陸二仙丹。金鎖思仙丹。吳實丸。秋石固真丸。固精丸。單非子散。威重丸。右蓮散。金櫻丸。

淋

五淋氣血石膏勞

下淋。小便澀痛。欲去不去。不去又來。滴瀝。益元散。加回香木香。檳榔。血淋。澀滯。餘瀝不盡。沉香散。或

湯加知柏。選用色鮮者。心與小腸。歷熱也。煎赤散。去中。加黃芩。色如豆汁者。腎與膀胱。火也。五淋散。又有一種小

便見血。而不痛者。為溺血。非淋也。四物湯。加山梔。滑石。牛膝。或單香。質菜。飲單髮。灰散。單琥珀散。石淋。溺有砂石。石

室強痛甚。單牛膝膏。單驚中。為末。酒調服。膏淋。血凝如膏。用黑豆一百廿粒。甘草一寸。水煎。脂熟。入滑石末一錢。

空心調服。或海金沙散。勞淋。痛引氣衝。遇勞則發。痛墜及尻。透膈。散勞傷。四物湯。加知柏。滑石。琥珀。虛甚者。鹿角

霜。凡○熱淋。暴淋。痛甚。八正散。或五苓散。合敗毒散。加末石羔湯。急痛者。六一散。二錢。加水香。攪物。小箇各一。或為

末服。冷淋。必先寒。候。而後洩。便澀。數。竅中。腫痛。坐。附散。二木散。淋。皆屬熱。間有冷者。外因。當風。取涼。冒暑。濕熱

鬱滯。胞內。痿痺。神不應。用。內因。七情。心腎。氣鬱。小腸。膀胱。不利。或忿怒。勞勞。忍瀆。酒肉。濕熱。下流。膀胱。干。於。用。經。廷

孔。鬱。結。物。則。熱。淋。血。淋。久。則。火。湯。不。渴。間。差。釐。毫。熱。在。上。燥。為。砂。石。淋。如。湯。罐。煎。父。生。燻。湯。不。渴。間。差。釐。毫。熱。在。上。

渴。而。小。便。不。利。者。肺。中。伏。熱。水。不。能。降。宜。氣。薄。淡。滲。之。藥。清。金。瀉。火。以。滋。水。之。上。源。清。肺。飲。子。熱。在。下。焦。血。分。不。渴。

清金瀉火以滋水之上源清肺飲子熱在下焦血分不渴

而小便不利者腎與膀胱魚陰而陽氣不化水枯火升宜氣味俱陰之藥除熱瀉閉以滋水之下源滋腎九腎氣在前消渴以渴為主而分氣血故血分亦有渴者此以淋為主而分氣血故血分有不渴者但渴而多汗亡津又未可

以輕**清熱利便人人曉**治暑淋熱淋血淋山梔仁**開行滋**滲也

破東垣高治骨節石淋鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣痛

腹痛用青皮疎肝黃柏滋腎**小腸澁脹脾經濁**小腹痛蓋小腹小便乃肝腎部位

湯火府丹凡小腸有氣則脹有血則澁有熱則痛文士燻水濁宜西吞子湯加滑石澤瀉麥門冬淡竹葉痛者用甘草

子湯加知柏**肝家莖脇刺如刀**稍五錢青皮黃柏澤瀉各石蓄琥珀

一錢水煎服或三味葶藶散莖脇引脇者參苓琥珀湯腸痛引腰背者磁石湯虛者滑肝解鬱湯肝益榮湯腎

虧惡症精敗竭腎虛淋瀝莖中澁痛者加減八味丸以補五味子以滋肺腎小便頻而黃者四物湯加參朮麥門冬

五味甘藥以補脾腎熱結膀胱者五淋散以清熱燥肺氣燥者承樞二味以清肺若膀胱陰虛陽無生者滋腎丸

膀胱陽虛陰魚以化者腎氣丸○精敗竭者童男精未成而御女老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗

莖中痛澁為淋者八味丸料加車前子牛膝煎服若精已竭而復耗之則大小便中牽疼愈疼則愈欲大小便愈便

則愈疼倍附子救之凡此當滋化源不可誤用知極淡參等劑既瀉真**中虛總難利膀胱**下輸膀胱者補中益氣湯

陽復損真陰**痰飲**滯轉脬何足異吐提凡汗多亡津瀉又胃乾諸瘡失

一法免呼號積痰在肺以致膀胱不通譬之水壺上竅閉血俱宜滋補不可過利小便

以開上竅也蓋膀胱雖主水道而肺金為水之化源也以脬系轉脬脬下併急而痛小便不通各曰轉脬有因熱逼

或強忍小便氣逆脬轉者二石散加車前子木通等分水煎外用炒鹽熨脬冷即易之○因氣者先用良姜葱白熨

者其人月余之口小便不通

葉煎湯。薰洗小腹。外腎壯門。拭乾神脚。仰臥。後用葵子赤
茯苓赤芍白芍等分。入鹽一字煎調。蘊合香丸服之。○忍
尿疾走。及忍尿飽食者。二陳湯探吐。○忍尿入房者。補中
益氣湯。畏之。陰虛兩尺脉絕。服諸滑利藥不効者。腎氣丸
湯。虛者入味丸。或附子澤瀉等分。燼心煎服。此
危症也。體薄性急人多有之。妊孕轉脬。見婦人

小便不通

小便不通本實熱。經曰。膀胱不利為癃。候其鼻頭色黃者
實相通也。然腎應於心。心火盛則小腸熱。縮熱微則小便
難。而僅有熱甚則小便閉。而絕無宜清熱生津為主。單朴
硝散五苓散。臍下服者。加琥珀。或單琥珀為末。蜜丸入參
茯苓煎湯下。或搗生車前子自然汁入。蜜一匙調服。有利
大便行而後。小便利者。黃或麻子仁丸。於熱熨中。瀉
痛者。須赤散。加山柅大黃。或麻子仁丸。於熱熨法。

有痰有氣結。虛損久病。自入參養精湯。有精竭不痛。莖痺者。八
黃芪升麻。有脾枯亡血。及勞傷血虛者。四物湯。氣血俱虛
者。八物湯。○痰涎阻滯氣道不通者。導痰湯。加赤麻。○忿
怒氣結。閉遏不通者。二陳湯。加木香。香附。木通。俱先服一
盞。後煎查探。吐以提其氣。氣升則水自尋常。赤澁宜清心
降矣。實熱砂糖調牽牛末一二錢。探吐。尋常赤澁宜清心
上熱者。蘘芥散。加黃連。燈心。下虛者。胞痺腸痺分利訣。胞
滋腎丸。上盛下虛者。清子蓮子飲。胞痺腸痺分利訣。胞
即寒淋。小便痛引臍腹。上有清涕。着腎湯。熱者。瀉腎湯。
○胞痺。小便澀。小便閉澀。津液偏滲。後便宜分利而已。

小便不禁

小便不禁不自覺赤者為熱白者虛。實熱乃膀胱火動。因
味子山茱萸。少許。虛熱。四苓散。合四物湯。加山柅赤麻。○
虛乃腎與膀胱氣虛。十全大補湯。加益智仁。或縮泉丸。大
兔絲子丸。二苓丸。遇夜陰盛愈多。內虛自汗者。秘元丹。內
虛濕熱者。腎氣丸。八味丸。減澤瀉。附子。加五味子。杜仲。故

腎氣丸。月卷之四。小便不禁。元工。八二。

紙倍山茱萸內虛寒冷者古心脾勞者頻頻少勞於不禁
桂附湯天兔絛子九加肉桂
香散桑螵蛸散勞夜傷脾者不約多遺或漑餘下虛內損
補中益氣湯脾約症見傷寒
約便弱自遺或尿後餘瀝皆火盛水不得寧治宜補勝脫
陰血瀉火和為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可
溫藥古方補陰丸最妙婦人產後
傷胞小兒胞冷鷄腫散主之

脫肛

脫肛全是氣下陷雌經曰病之虛實入者為實出者為虛
產育用丸久病久瀉小兒呼能氣俱有此症宜參芪芍
歸脾麻水煎服血虛加芍藥地黃虛寒加炒黑乾姜虛挾
熱者縮間有熱者病乃暫熱則流通意也氣熱者用條芩
破散

者四物湯加黃芩升麻風和者敗大補肺腎兼升提肺與
為表裏肺熱則肝門閉結肺寒則肛門脫出必須溫肺臟
補腸胃宜補中益氣湯加訶子檉皮火許或升陽舉經湯
蠟皮散鈞腸丸挾濕熱者升陽除濕湯有蕪麻者四外治
物湯加槐花黃連升麻有腎虛者腎氣丸八味丸

敷藥洗藥亦可攪

內傷類

傷食

傷食惡食分上下次審寒熱行吐瀉胸滿有噎噉心口腹

疼發熱胃有伏火皆因食不化停於上脫氣壅痰盛者宜

氣不酸惡心欲吐不吐宜平胃散入益少許探吐如傷熱
物或酒麪發熱心口刺痛停痰停飲伏火宜二陳湯加黃

連枳實探吐傷重填塞胸中下部魚臍體實年壯者方敢
瓜蒂散吐之尋常飲食過飽在臍以手探止為好停宿中

下脘者宜下以逐之。如傷冷物腹脹滿痛者。木香見現起
 丁香脾積丸。感應丸。如傷熱物痞滿者。二黃丸。日哺潮熱
 下藥。煎補保和丸。九傷食乃中焦血病。如牽牛。猛烈傷氣
 及一切峻攻反傷胃氣。又現有吐者。二陳湯加砂仁。黃連
 青皮。枳實。現有瀉者。胃冷湯加山查。麥芽。或三白湯。隨時
 令寒暑選用。如身受寒氣。口又傷冷。初得便。吐下未淨。消
 宜辛溫理中。稍久鬱而為熱。當兼辛涼散之。

導之 糾九子。枳木九。保和九。大安丸。吐下已虛。補益借。子湯。丸。平補。枳木九。單山查九。

酒客分消與調中 飲酒與水過者。宜上汗下。中益氣湯。酒成積。腹痛大便窘迫者。酒蒸黃連丸。香連丸。如傷酒嘔。

逆眩暈頭痛如破者。補中益氣去白木。加半夏。白芍。茶。栝
 乾。葛。川。芎。有塊者。更加義木。木香。如善飲。每早長。噯。不吐
 者。小調中湯。最妙。一月三五次服之。亦可為丸。如醉飽行

類有痛。飢不醉。忽糟。痛出。而窺。邪。弱。出。後。窺。物。湯。加
 海金沙。木香。檳榔。木通。桃仁。數服可安。與茶成癖者。星

木憂思鬱抑藥 憂思傷脾。不思飲食者。清六九。加香
 丸。不食者。溫膽湯。神效。憂思。兼傷食者。木香。化滯湯。瘦。港

氣抑不食者。二炒蒼。宿散。加香。附。白。芍。陳。皮。半。夏。黃。連。扁
 拓等分。白木為君。姜汁。麩。凡服。濕痰。

氣滯不食者。三補丸。加蒼木。倍香。附。

積聚

五積六聚皆屬脾 經曰。積聚。癥瘕。痞滿。皆太陰濕土之氣。
 成積。積者。陰氣。五臟所主。脉沉伏。或左或右。發有根。痛
 有常處。肝積左脇下。曰肥氣。言風氣有餘。而血隨氣。不行
 也。令人脇痛。痰癢。心積。臍上。曰伏梁。言如梁之橫。架心下
 令人煩心。乃火之鬱也。忘熱。葉與炎。又腸癰。與此相似。但

身肢皆腫。環臍而痛。為癰。脾積。胃腕稍左。曰痞氣。言陽氣
 為濕所蓄也。令人黃瘦。倦怠。飲食不為肌膚。仍忌熱藥。肺

積聚。因外感內傷。氣鬱。醫誤。補而留之。以

積聚。因外感內傷。氣鬱。醫誤。補而留之。以

積右脇下曰息賁言喘息奔而上行也令人咳嗽肺癰腎

積發於小腹或素心下曰奔豚言若豚之奔衝上下無時

也令人喘逆骨疼最為難治諸積勿輕吐下徒損其氣積

亦不去奔豚尤不可吐五積古有五方今增損五積九更

妙○聚者陽氣六腑所成脉沉結或隱或見於魚根痛左

魚常處散聚湯七氣湯香稜丸大阿魏丸大安丸加參

右中間移不移形之物不能作塊成聚塊乃痰與食積聚血有

不能移動者曰癥言堅硬貞固或有或無或上或下左

或左或右者曰瘕言假血而成蠱動之形且有活性

死血芍右氣積五錢加桃仁姜黃各一兩蜜丸○治右調

氣青皮湯不香分氣丸有積者消積正元散紅丸當中痰

子小阿魏丸或當歸龍薈丸係和丸俱加鴉鳴屎成痰石瘰

結一團而丸白芥丸丸痞塊在皮裏膜外俱宜二陳湯加

術氣行有餘消導分新久積物為寒宜辛溫消導痰世氣

八川消稜丸通用纂積丹生漆膏有虫者妙應丸外治三

聖膏三稜煎不足平補是上腎以峻補痞積又忌滯藥止

宜早服滋補藥中加鱉甲龜板秋石丹午服枳朮丸大安

丸或醋鱉丸善消融化為妙若痞積滯冷貫膈誤為沉寒

痼冷投以姜附熱藥初服甚與病情相宜久則痞積益甚

傷脾滯氣亦所不宜古云衰其大半而止又如栝門冬寒疝

除皆為虛損有積而言也平補之外更能滋厚味歸脾色慾

戒暴怒正思死氣自斃人則有之胃中積食而東四有積者清

慮庶乎萬全

蠱瘴 皆因飲食起

中蠱害人俗不妍 據方書蠱有數種皆妖昧變惑之氣其

之類以瘻盛之使其自相啖食其間一物獨存者多取以酒

肉祭之取出放毒於酒肴中以害人毒發令人面目青黃

醫學入門卷之四

蠱瘴

皆因飲食起

中蠱害人俗不妍

據方書蠱有數種

皆妖昧變惑之氣

其

之類以瘻盛之

使其自相啖食

其間一物獨存者

多取以酒

力乏身痛。嘔吐鮮血。小便淋瀝。大便膿血。唇口乾燥。胸膈妨滯。腹痛如虫。蟻。又如虫行。病人所食之物。皆變化為虫。侵蝕臟腑。蝕盡則死。死則病氣流注。復染傍人。人死則精。竟反為其家。代力致富。不知有此事否。萬病解。毒冊。東坡。雄蟾丸。主之。或於足小指尖。灸三壯。即有物出。酒飯得。之。隨酒飯出。肉菜得之。隨肉菜出。凡中蠱毒。不論年月遠。近。但煮鷄卵一枚。去壳。以銀釵插入。卵中。併入口中。含一。飯頃。取出視之。釵如俱黑。即為中毒。一法。令患人唾津於。水。沉。則是蠱。浮。則非也。又法。口含大豆。豆脹爛。而皮脫者。有聲。凡中蠱。亦非也。如出外。須預知。子置衣領中。遇毒。則。冷。若飲食帶冷。則兇氣乘之。毒亟復生。竟不能救。更有挑。生及毒泉。嶺南多有。桃生毒者。乃挑毒於魚肉菜菓酒醋。灑刺。滿十口。則物生能動。行上胸。痛。沉下腹。痛。在上。腸。卷。用膽。糝。米。五分。投入熱茶內。溶化。通口。服之。探吐。在下。焦。者。用鬱。金。末。二錢。米。湯。調。服。瀉。下。惡。物。後。以。四。君。子。湯。去。牛。草。調。之。如。協。下。忍。便。頓。頓。生。毒。後。以。四。君。子。湯。去。

二錢。冷。熱。水。調。連。服。瀉。出。如。葱。根。其。斷。即。消。後。以。平。胃。散。煎。進。白。粥。調。之。○江。南。溪。澗。中。有。射。工。毒。或。因。雨。潦。逐。水。而。入。人。家。含。沙。射。人。之。影。得。之。寒。熱。悶。亂。頭。目。俱。痛。亦。如。中。屍。卒。不。能。語。又。有。水。毒。亦。一。名。溪。濕。得。之。病。同。射。工。但。有。爛。瘡。為。射。工。魚。瘡。為。溪。濕。又。有。沙。虱。細。如。芥。虫。過。陰。雨。則。行。出。草。間。著。人。則。入。皮。真。痛。如。針。刺。是。三。者。為。病。朝。輕。暮。重。手。足。冷。至。肘。膝。二。三。日。腹。中。生。虫。食。人。下。剖。臍。中。生。瘡。不。痛。不。痒。急。視。下。部。有。瘡。赤。如。截。肉。者。為。陽。毒。最。急。如。鯉。魚。齒。者。為。陰。毒。稍。緩。要。皆。殺。人。不。過。二。日。也。用。蒜。搗。濃。汁。煎。溫。洗。之。是。水。毒。身。休。當。發。赤。斑。否。則。非。也。當。以。他。病。調。治。消。水。瘡。氣。寒。熱。胸。滿。不。食。此。毒。從。口。鼻。入。也。宜。清。上。熱。鮮。內。毒。降。毒。寒。熱。胸。滿。不。食。此。毒。從。口。鼻。入。也。宜。清。上。熱。鮮。內。毒。降。氣。行。痰。不。宜。發。汗。平。胃。散。加。荊。芥。連。非。麻。比。胡。枯。痰。探。壳。木。香。木。通。姜。煎。服。如。寒。月。外。感。風。寒。氣。閉。發。熱。頭。疼。自。汗。如。瘡。南。人。氣。壯。或。胸。滿。痰。壅。飲。食。不。進。與。北。方。只。傷。表。而。裏。自。和。者。不。同。宜。解。表。清。熱。行。痰。降。氣。二。陳。湯。加。北。胡。黃。芩。蒼。朮。羌。活。川。芎。水。煎。服。微。汗。即。止。如。內。傷。飲。食。得。者。理。脾。

卻瘧湯補中益氣湯不換金正氣散屎水丸虛甚或挾房
 勞者一粒金丹熱者粟麥湯承氣湯三黃湯合竹葉石膏
 湯或三黃不服水土與瘴同源平洋土堅水熱山谷土潤
 水土風氣冷熱加咸或寒瘴痢黃疸瘡癰俱於各類求之
 然以扶脾胃為本凡縱酒色及食魚肉時新菜菓筍蕨生
 穢氣半夜失蓋早行沾露空腹出外皆能發瘴仕宦商賈
 遊外俱宜節飲食謹起居以防之

氣類

氣滯 此即諸氣專抽氣
 滯一邊詳言之耳

氣滯不行辨久新濕熱痰積是其因 發天之氣清淨不息
 妄為雲霧為雷雨者

山澤濕熱熏蒸也人身元氣與血循環無端彼衝擊橫行
 滯滯刺痛等症多因七情飲食不節濕熱成痰此積初起

宜辛溫開鬱行氣豁痰消積久則宜辛寒降火以除根

滯膈痞滿滯下 秘氣滯上膈為嘔咳痞滿枳滯湯枳梗湯
 枳烏附湯濕熱者清膈蒼朮丸實熱者解毒湯加知母枳

下焦為腰痛脹墜者枳氣湯加橘核或不香勻氣散吞青
 娥丸便閉者四磨湯只磨湯不香順氣丸不香順氣丸

滯中刺痛或週身 者神保丸一塊氣丸不香分氣丸阿魏
 撞氣丸枳巴丸濕熱者更連丸貫連拖石丸○氣滯於

外則週身刺痛瀉氣飲子主之或手足浮腫者和散合
 五苓散或五皮散

散火破氣雖古法 古法散火之法必先
 加桂青木香丸

養血補虛同婦人 男子虛勞失
 矣但枳壳青皮破帶要藥

月後因氣者 四物湯加木香檀脚除虛氣帶者去木槿加
 玄參黃柏或炒黑山梔一味入姜汁煎服開五臟結益少

醫學入門卷之四 氣滯

八六

陰血最效。有婦人平時性急，適月事不行，氣填胸膈，嘔思全不入食，食則吐痰，或有一塊窒胸，喉而痛，或一塊如卵，集觸心下疼痛，或腹中塊物動，作攻刺腰背，時發調熱，四肢乏力，脚不能行，小便白濁，帶下日乾，瘦弱全似虛勞，若飲食不入，却喜果子雜物者，乃有孕也。產前安胎，產後調氣，俱以四物湯主之。通用二陳湯，上焦氣滯，加枳梗，香附、砂仁、中焦加厚朴、枳實、三稜、義水，下焦加青皮、木香、檳榔。因怒者，加山梔、香附、痞滿，加黃連、枳實、痰盛，加瓜蒌、脇痛，加青皮、柴胡、芍藥、草龍膽、刺痛，加枳殼、氣實，加烏藥、香附、氣虛，加參、朮、木香、喜動心火，加黃連、怒動肝火，加柴胡、思動脾火，加黃柏、成鬱不解者，煎吞交感丹。

血類

吐血 此即諸血特分言之耳

吐血屬胃審陰陽陽盛身熱陰盛涼內傷外感及飲食房

聚膈間從胃脫出者則為嘔吐從鼻出者則為衄陽多

盛身熱多渴陰盛身涼不渴然血陰也身涼者易愈陽多

積熱并怒火蘊飲子主之因酒者舌葛連九亦調中湯吐

膿血者名肺疽括便湯大怒氣逆上衝暴甚者四物湯

加蘊子陳皮沉香童便或茅根煎湯磨沉香服之若血聚

蒲膈間則吐者蘊子降氣湯加人參阿膠或暴吐紫黑成

塊者來血也雖多亦不妨四物湯合解毒湯調之竟胸中

氣塞者桃仁承氣湯下之五志陰為心力暴勞傷陰盛多

火動熱者解鬱湯虛者保命散陰為心力暴勞傷陰盛多

傷氣吐血鮮紅心腹絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡

山藥百合前胡姜棗煎服或用蓮心糯米等分為末溫酒

下。勞傷氣虛挾寒陰陽不相為守血亦錯行所謂陽虛

陰必走者是也外症必有虛冷之狀法當溫中使血自歸

經絡如胃虛不能化食其氣逆上吐衄者理中湯加木香

胃寒不能約血者并草乾姜湯或七氣湯加川芎自汗者

小建中湯舌挂附湯下虛極而氣壅喘嗽血不歸元者黑

錫丹金液丹。勞力傷肺唾內有血咽痰不利者鷄蘇散

良湯主之

衄血

衄血熱溢肺與胃 肺竅於鼻，鼻通於腦，血上溢於腦，又行

行，則口鼻俱出。大熱衄血者，用萱草、涼血行血。治同。古人

去根，搗汁一盞，生薑汁半盞，和勻服。方：物宜黃芩湯，加鬱金，或茅花冬青子止之。久宜清肺生

成，衄者防風散，或犀角地黃湯。凡初衄不可處止，去多恐

量急用百草霜末三錢，水調服，仍取一捻吹鼻中，或用人

中白末湯調服，更加髮灰一錢，磨一字，仍用少許搐鼻，立

止。或將患人頭髮分開，井水濕紙頂上搭之，亦好。如鼻乾

燥，以麻油滴入潤之，如吐衄甚不止，防其血暈，用茅根

燒烟，將醋酒之，令鼻嗅氣，以渴其熱，或蒸然以水噴，便

常驚則止。吐法非特衄血，雖上吐下便，諸般血藥不能止

必缺氣鬱血魚藏。涼血散火藥不効者，伍步

嗽痰帶血本脾經。虛者六君子湯，加桑白皮、黃芩，以有咳

屬肺恐難噤。火升痰盛身熱者，龍騰鷄蘇丸、蘇散、瀉陰

歸湯、八物湯，或二陳湯，加嫩桂、桑白皮、杏仁、桔梗，知母、貝

母、阿膠、生地、山梔、蓋嫩桂枝，能治上焦故也。愈後調理，交

霜骨咳血，咽。血隨唾出自腎來。滋陰降痰血聚肺火相煽

唾中紅絲，乃咯出血屑，為咯血。或帶紅絲細如線，有血

是肺痿難治。咯出血屑，為咯血。或帶紅絲細如線，有血

下咯不出者，甚略則有之者，此精血竭也。西物湯加竹惡

姜汁、童便、青黛，或聖餅子，地黃膏，蓄血在上，閉塞清道，喜

忘者，犀角。此是肺腎真臟傷，滋陰降火，非偏見。

地黃湯。此是肺腎真臟傷，滋陰降火，非偏見。

溺血

溺血純血全不痛血從精竅中來乃心後熱小瀉四物湯

酒湯下單苦實暴熱實熱利之宜煎服實熱者承氣湯加

當歸下之或小蓴飲子後以四物湯加山梔調之心經

熱者真赤散暑熱者益元散升麻煎湯下或五苓散虛

損房勞兼日久滋陰補腎更魚疑牛膝或單牛膝膏房勞

傷精火動溺血者膠艾四物湯腎氣丸小兒緣子丸虛甚

病久者鹿角膠丸秋石固真丸金櫻膏痛不可忍者單豆

政一燥煎湯溫服甚効此疾日

以中乾非清心靜養不可救也

便血瀉先分內外自外感得者曰腸風隨感降見所以色

來也又有不拘糞前後來者氣血俱病也皆因七情六淫

飲食不節起居不時或坐臥濕地或醉飽行房或生冷停

寒一陰結一升二陰結二升三陰結三升蓋抑化五臟則三

陰脉絡不和而結聚血因停滯溢則滲入大腸陰非陰寒

之謂也針經云陽絡傷則血外溢風清熱紅甚則烏寒黯

而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺

毒濁濕不痛此屬外感風者色青或純下清血實者入參

虛者胃風湯古博參散苦參丸結陰丹○熱者鮮紅用黃

蒼地丸龜栢丸扶風者職頭丸暑月黃連香茹散熱甚則

黑者鮮毒湯合四物湯加大黃有瘀血者桃仁承氣湯○

寒者色黯平胃散合理中湯加葛根赤麻益智神麴當歸

地榆姜棗煎服○毒者病和蘊久色濁後重疼墜四物湯

加木香檳榔或四味香連丸○濕者直濕癖血箭最難除

來不痛自栢丸濕熱者苦連壳丸

醫學入門卷之四 淋瀝 九 一千三百七

原因傷風。犯胃。飧泄。久而濕毒成癘。注於大腸。傳於火陰。各曰腸癖。俗呼血箭。因其便血。即出有力。如箭射之遠也。又有如篩四散。漏下者。初起濕熱。或發。當長夏者。當歸和血散。淨血地黃湯。加木香。檳榔。久而色紫黑者。濕毒甚也。升陽除濕和血湯。升陽補胃湯。或補中益氣湯。去柴。陳加茶。連川芎。槐角。枳殼。內傷食積糟粕。混內傷飲食。腹必脹滿。漕拍與血同來。平胃散。加槐角。枳殼。當歸。烏梅。甘草。或通玄二八丹。虛者。六君子湯。加香。扁神麩。或六勞傷氣陷鬱悶。內傷勞傷。元氣下陷者。補中益氣虛弱者。四君子湯。或單人參湯。加炒乾姜。少許。古卷。柘散。古烏劑。加剪紅丸。陽虛甚者。附丹。內傷陰虛。血弱者。四物湯。加乾姜。龜。栝。全。活。龜。九。內傷。脈絡。下火。寢有汗者。歸脾湯。或寒熱。脇痛。小腹。悶。墜。拘。急。者。逍。散。六君子湯。俱加柴。胡。山。梔。或木。香。少。許。已。上。糞。前。俱。加。吳。萸。糞。後。俱。加。黃。連。二。味。須。用。熱。湯。同。浸。拌。濕。再。煎。滾。湯。半。日。久。令。藥。氣。相。和。方。炒。各。陳。出。若。生。則。偏。寒。偏。熱。

初起和血祛風濕。附。歸。和。血。散。或。解。血。地。黃。湯。實。者。櫟。角。以。離。丸。通。用。四。物。湯。祛。風。加。栝。葉。防。風。荆。芥。秦。朮。槐。花。蠟。皮。栝。葉。刺。芥。枳。殼。芩。連。近。血。加。檳。榔。枳。實。槐。花。條。芩。瀉。大。腸。火。遠。煎。加。木。通。吳。萸。炒。黃。連。瀉。小。腸。火。熱。者。加。山。梔。槐。花。黃。連。大。下。不。通。加。血。見。愁。少。許。姜。汁。和。服。虛。者。加。炒。乾。姜。濕。熱。加。蒼。木。秦。朮。黃。芩。藥。按。加。香。附。枳。殼。或。單。香。附。丸。又。古。考。歸。湯。調。血。上。品。熱。加。茯。苓。槐。花。冷。加。茯。苓。木。香。凡。大。小。便。血。俱。不。可。統。用。涼。藥。宜。辛。味。為。佐。並。升。舉。及。酒。妙。藥。婦。人。胎。前。患。者。古。考。木。湯。古。考。歸。湯。六。一。散。三。方。合。服。產。後。患。者。補。中。益。氣。湯。加。吳。萸。黃。連。或。一。物。湯。隨。症。選。用。久。以。補。脾。泄。劑。俱。補。劑。補。中。益。氣。湯。參。苓。白。朮。散。厚。

一。復。血。自。循。軌。不。受。補。者。宜。泄。劑。香。梅。丸。腸。風。黑。散。單。方。糞。前。酸。石。榴。皮。為。末。一。錢。荔。枝。煎。湯。下。糞。後。文。葉。為。末。生。姜。汁。下。或。乾。柿。燒。灰。為。末。米。飲。下。亦。好。抑。考。腸。風。虛。毒。血。自。腸。臟。中。來。重。痔。之。血。肛。門。傍。生。小。瘻。射。如。血。線。未。

肚門既脫腐血浸淫化為疔毒。每傷腸口。滴血淋漓。當以
蘇莢艾葉苦練根等化。或燒鱧鱗骨薰之。內服黑玉丹

喘

喘急先分肺實虛。呼吸急促者謂之喘。喉中有響聲者謂
之哮喘。身熱便硬。其次當知有火無。經曰諸逆衝上皆屬火。虛火

胃火炎得食喘暫止。下稠痰則止。食已入胃反助火痰上
喘及人作。宜降火清金。導痰湯加芥連山柅

杏仁瓜蒌如胃有痰聲風痰。干縉湯或合導痰湯痰氣蘊子
鷄吹。痰喘必有痰聲。風痰。干縉湯或合導痰湯痰氣蘊子

降氣湯四磨湯食積痰。古二母散神保丸大薤皂

九七情氣急。魚聲即驚。驚氣鬱揚。揚悶悶引息。鼻張氣喘

因服補藥。補者。三拗湯外感裏逆。只氣粗。外感表利傳裏

逆上詳見傷寒。尋常感冒風寒。相干肺脹逆而喘者。隨
時令祛散。風喘。金沸草散。麻黃杏仁飲。寒喘加減三拗湯

香正氣散加五味子杏仁。或蘇沉九寶。水喘怔忡或腫

脹。水喘水氣。鞭轆有聲。怔忡者。小青龍湯。苦葶藶散。白前

相因。皆小便不利。肺主氣。先喘而後脹者。宜清金降火。而
行水。次之。脾主濕。先脹而後喘者。宜燥脾行水。而清金。次

之。已上諸喘皆有餘陰。虛火從臍下起。陰虛喘者。血虛則

奔。宜四物湯倍芍藥。加人參五味子。以收之。有小腹下火

起衝上而喘者。宜降心火。補真陰。四物二陳湯。加知柏枳

壳黃。氣短不能續吸。又病氣短不能接續。似喘非喘者。

湯勞。過者。香參散。飲食熱者。葶藶散。痰阻短氣者。道氣
痰湯。濁陰在上。清陽陷下。咳喘嘔吐者。加味瀉白散。腎
醫學入門卷之四

冷元氣不能納

八味丸甚者黑錫丹以鎮墜之煩躁無肺

身冷神昏者死

胃虛極則氣上逆

九加胡椒救之仲景云髮汗如油汗出如珠不流

數者皆死但婦人喘病尤亟未發扶正治其本

補血氣虛補氣無以已發辟邪痰火踈喘非風寒乘肺則

散痰火嗽道但火急甚者亦不可純苦藥宜溫以切之用

喘目五七錢為未姜湯下喘止後因痰治痰因火治火諸

入參清肺飲倍粟壳澁之抽奇九定喘化痰散久者

淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出

六腑身熱喘呼不得卧此喘之名同而所感各異耳

哮喘

即痰喘甚而常發者

哮喘喉中痰作聲吐法必須量體行

體質者用紫金丹二

止服二三丸則不喘臨發時用此劫之丹溪方去豆豉更

痰散之挾水挾寒須帶表水學者因幼時被水停蓄於肺

防半夏或古葶藶散藥水丸有寒包熱者麻黃湯加枳梗紫

勿令膜破放尿缸中三日夜取者食之効斷根扶正金宜

清欲斷根者必先淡滋味然後服清肺金扶正氣之劑如

睡者飛鈴丸單方貓兒頭骨燒來酒調服二三錢一服即止

惡心

惡心欲吐不得吐。一見飲食心便惡。二陳湯加白朮不渴

胃虛與胃寒。胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各等分胃虛

煩渴胃家痰火聚。痰盛者大小半夏湯火盛者二陳湯加姜汁炒芩連解量惡心治同

嘈雜

心嘈似饑又煩雜。似饑非饑似痛非痛或煎愛氣痞滿惡

縱食多憂痰火合。食鬱者積木丸加山查麥芽有熱更加

和丸。憂鬱者飛麩丸香連丹濕痰氣鬱不喜食者二補

先二陳湯加姜汁炒芩連山施為君。南星半夏為佐。熱多

加枳實。○火動其痰者二陳湯加姜炒芩連山施火鬱更

加撫芩蒼朮痰火。五更曹者思慮傷血分稍虧宜補接

噯氣

噯轉食氣名噯氣。有痰有火滯於胃。胃中鬱火嘔上稠痰

丸。潤下丸。實噯食罷噯方形。氣盛實噯食罷噯轉腐氣甚

致。二陳湯加蒼朮神麩麥。虛噯濁氣填胸次。不因飲食常

胃有濁氣。膈有濕痰。俱能發噯。六君子湯加沉香為君。厚

朴蘧子為臣。吳萸為使。父者勻氣丸。或蘧合香丸甚者靈

嘔吐

嘔吐須知胃冷熱。大槩肥白肉浮多寒濕瘦黑骨露多燥

熱更奈脉症。○胃冷面青手足厥。食久

乃吐。二陳湯加姜桂甚加丁附或丁香半夏丸。○胃熱回紅手足熱食已即吐。二陳湯加姜煨麥連山梔。暴甚畧加檳榔木香胃口痛加姜汁或葛根竹茹湯。加味橘皮竹茹湯。或小柴胡湯加竹茹。如時常口吐清水。冷涎自下湧上者。此脾熱所致也。二陳湯加白朮白芍升麻炒。次分三焦。本連山梔神麩麥芽乾生薑等分。或丸。或煎服。有妙括眩暈不食氣上攻。上焦吐者氣衝胸膈食已暴吐。而渴治當降氣和中。只君子湯加木香藿香桔梗枳朮葉或七氣湯。熱氣衝者古荆黃湯加人參甘草檳榔。胸滿酸悶食作孽中焦吐者食積與氣或先吐而後痛。或先痛而後吐。治當以木香檳榔等分為末調服。行氣藥沉丸消積。尋常甲日散。白豆蔻山查神麩調之。厥冷下焦停有寒。下焦吐者寒也。朝食暮吐暮食。胡吐久則小便清利大便不通。乃陰氣偏結不與陽和。治當溫其寒而通其秘。復以中焦藥和之。兩子理中湯木香芫氣散合理中湯。四逆湯。丁胡椒三陽熱壅大便秘結。噤噤。連湯。古丁半湯。養正州苦牛疏。三陽熱壅大便秘結。噤噤。

大小腸膀胱結也。熱者大柴胡湯下。虛者潤之。痰火不

已水怔忡。嘔吐痰火為多。二陳湯加姜炒。或連或。小調中

汁化服。脾經濕痰鬱滯上中二焦。時時惡心。吐出清水。或

如豆汁者。胃苓湯加半夏檳榔。○水嘔心下怔忡。先渴後

嘔者。赤茯苓湯。先嘔後渴者。腥臊薰心多痰血。腥氣臊氣

嘔者。湯水入即吐者。五苓散。腥臊薰心多痰血。腥氣臊氣

治膿盡自愈。四物湯倍赤茯苓牡丹皮。虛者入珍湯。加陳

皮。客風翻翻暑渴煩。風和在胃翻翻不定。或酸水全不

凡不宜輕用參木補。住邪氣反甚。惟久病胸膈痛者。木仁土

也。方敢用。六君子湯加青皮芍藥。胡升麻。川芎。木仁。神

散。氣虛痞滿虫痛切。嘔者。四味藿葉湯。或四君子湯。去茯苓

參加香附參苓胸痞短氣者調中益氣湯胃虛寒痰作嘔者增半湯○或吐時常惡心胃口作痛口吐清水得食暫止蟻則甚者胃中有蛔也○二陳湯加苦練根史君子白木烏梅或用錫灰攪御等分米飲調服亦可○九吐如清菜汁者死○此是乍然嘔吐非翻胃比也○又嘔暈大吐渴飲水者多死惟童便飲之最妙

飢逆

飢逆分不足有餘不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面

大飽多面紅肢熱便閉有餘可治不足者危不足火炎陰氣虛火乃元氣之賊

氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾相火直衝清道而上及虛之甚也○膏梁蒸熱者子味小

柴胡湯吞單黃栢丸或調益元散胃大善食者小半夏湯加山梔黃芩吐之火盛者益元散加黃連黃芩自利更加

參木白芍陳皮○父病泄下及婦人產後從膝下逆勞役上夜分轉甚者皆屬虛虛勿易加知百病中益氣湯或

傷脾故有此合生麻散加黃栢附子少許挾房勞者嬰王膏腎氣不歸元父病寒搏火為辜極是危症脈數為火刑

者九味安腎丸雜病父每逆者皆火欲上行為胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜丁香柿蒂散走活附子湯理中湯倍參父者二

香散或木瓜根煎湯呷之中虛有餘飽食胸中失升降

香贖脈結者炙甘草湯救之痰閉於上火動於下魚別症忽

湯加枳痰鬱何由得泰舒痰發餒從胸中起者參連二陳

壳破仁湯或只陳皮半夏姜煎服或入參蘆煎湯吐之停痰或因

怒鬱痰熱者亦宜蓋參蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣

○七情氣鬱者本香牙氣散陽症失下多潮熱地道不通

用薤藹煎湯下襍子降氣湯汗吐下後胃熱宜寒藥下之犬柴胡湯陽極脈微將脫者宜索膈散解毒湯養陰退陽不可大下

未除小柴胡加橘皮竹茹或有餘湧吐泄平人食物太速橘皮竹茹湯半瀉心湯飲水入肺喜笑

醫聖之門者之曰
○太多亦屬有餘食。餓矣。餓以紙燃。莫嘔。或久閉氣。可止。不
○水。餓。小。隔。胸。湯。水。青。龍。湯。去。麻。黃。清。之。利。之。而。已。
足補。補。有。溫。平。涼。莫。拘。
凡汗吐下服涼藥過多者當溫補
脾胃。陰火上衝者當平補。扶熱者
宜涼補。為方率用可附。溫煖助火。損
不足而益有餘。宜乎。餓。逆。之。必。死。也。

膈噎

三焦枯槁成膈噎

飲食不下而大便不通名膈噎。晁云。膈
有拒格意。即隔食反胃也。王机云。噎塞

大便不通。通出湯。故以膈噎為題。局方以噎近咽。膈近胃
而遺下焦。又妄分十膈。五噎。皆非經旨。病因內傷憂鬱失
志。及飲食淫慾。而動脾胃。肝腎之火。或因雜病。誤服辛香
燥藥。俱令血液衰耗。胃腕枯槁。其槁在上。焦黃門者。食不
能下。下則胃腕當心而痛。頌史吐也。乃止。費門即胃腕上
言。水穀自此奔入於胃。而氣則傳之於肺也。其槁在中
焦。黃門者。食物可下。良久復出。此門與中腕相近。言其位
皆黃門中水穀也。開門膈下。瀾約水液。分入膀胱大腸。而
食。暮。吐。暮。食。大。水。腸。勝。腕。乃。氣。血。津。液。流。通。之。道。路。也。陽

而為糞。溺是。大。水。腸。勝。腕。乃。氣。血。津。液。流。通。之。道。路。也。陽

火上升有虛熱

經曰。三陽結。謂之膈。小腸結。結則血脈燥
三陽熱結。脈必洪。數有力。前後閉塞。下既不通。必交而上
行。所以噎食不下。縱下復出。乃陽火上行。而不下降也。

實火黃連解毒湯加童便姜汁。或益元散入姜汁。澄白脚
為小丸。時時服之。溫六九尤妙。甚者陶氏六一承氣湯。久
參利膈丸。虛火衝上。食不入者。積梗二陳湯加厚朴白
木及木香。少許。或舌更連丸。渴者錢氏白木散。大便閉者
導滯通出湯。或參仁丸。麻子仁丸。當噎未至於膈之時。便
宜服此。防之。膏肓之疾。豈可忽忽。聞有身受寒氣。口傷
冷物。以脾胃火衰。膈上苦冷。腸鳴。脈必滑微。宜暫用丁香
煮散。五膈湯。五噎湯。單附子散。以劫之。若不求其本。偏認
為寒。槩用辛香燥。為痰為積。本七情。古云。膈壅神思。問病
藥。必至燥陰不救。為痰為積。積久則血愈衰。針經曰。怒氣所
火黃。薰蒸津液。為痰為積。積久則血愈衰。針經曰。怒氣所
至。食則氣逆不下。勞氣所至。為膈噎喘促。思氣所至。為中

痞三焦閉塞咽隘不利。痰飲脉滑或伏。二陳湯。舌參夏
 湯。化痰九。衣萎實丸。或用黃連吳萸貝母瓜蒌仁牛膝草
 水煎。食積脉滑而短。積木丸。加黃連陳皮半夏。或狗米
 平胃丸。虎脂平胃丸。或用保和丸。二錢。加姜炒黃連三錢
 山查二錢。為丸。麻仁大。臘脂為衣。每六十丸。人參煎湯入
 竹瀝下。七情鬱結。脉沉而濇。飲食喜靜。胸背痛者。四七
 湯。溫膽湯。痞滿煩悶。微嗽。二便不利者。分心氣飲。四磨湯
 或木香檳榔二味等分。為末。白湯下。傷神不睡者。干味溫
 膽湯。硃砂安神丸。腹脹腸鳴者。木香勻氣散。有氣血兩虛
 積聚者。阿魏撞氣丸。惡聞食氣者。五膈寬中散。氣血兩虛
 多口沫。沫大出者。死。氣虛不能運化。生痰者。脉必緩而
 君下湯。加吐子大黃。酒毒加井藤汁。單人參湯。人參膏丸
 妙。血虛不能滋潤。生火者。脉必數而魚。四物湯加童
 便竹瀝。姜汁。大便閉加桃仁紅花。有瘀血加牡丹皮。韭汁
 防生。至加驅水。血虛甚加乾姜。血燥加牛。羊乳汁。不可以
 人乳代之。蓋人乳反有七情飲食之毒。金水二臟須扶持
 血。陰血自生。津液傳化。合宜。何膈噎之有。腎氣丸。主之。益
 養陰血。自生。津液傳化。合宜。何膈噎之有。腎氣丸。主之。益

陰養胃是總訣

不問虛實。俱以益陰養胃為主。庶免後患。

熱加土炒。麥芽。連。瓜。萎。桔。梗。七情加香。射。干。木。香。檳。榔。不
 納。食。加。麥。芽。神。麩。熱。結。食。返。土。齊。加。大。黃。桃。仁。氣。虛。合。用
 君子湯。血虛合四物湯。七情加香射干。木香檳榔。不
 天膏。神仙奪命丹。古阿膠散。或靈砂燒酒下。凡五十歲後
 血枯。莖。如。羊。屎。及。年。火。不。淡。
 薄飲食。斷絕房室者。不治。

關格

與嘔吐膈噎
 淋症。泰看。

關不小便格吐逆

經云。人迎脉大於氣口四倍。格曰。上寒
 格。氣口脉大於人迎四倍。名曰關。上寒

下熱中焦窒

關乃陽不下。以寒在胸中。寒而不入。格乃陰

擦亂。中氣不足。陰陽不能相榮。故既關且格。中虛者。補
 中益氣湯。加檳榔。以升降之。中虛痰盛者。六君子湯。去木

加栢子仁及麝少許。虛甚吐提其氣非為痰。關格與壅積吐利俱不得者。醃濟丸。欲降不降。欲食不食。宜二陳。或治下焦不湯。加木通。吐其橫格之氣。不必在出痰也。獨為關非格也。大承氣湯下之。若但吐而不得小便者。胃滲利水之藥。詳前淋症。凡開格見頭汁者死。

瘥

瘥症虛柔實則剛。

陽極則為剛瘥。多類風症。宜清熱化痰。法風陰極則為柔瘥。多類厥症。宜溫補。

化痰降火。此丹溪謂實則為剛。口噤不醒通身強。虛則為柔。昔老症也。餘詳傷寒。則身強。

不醒。癩病發則身軟。時內外因皆挾痰火。或外因風邪。或

搦痰火而後發瘥。痰壅發瘥不醒。或只手足搐搦。左右

動搖。宜祛風蕪痰湯。加竹瀝姜汁。風痰盛者。或毒散加

防風天麻黃芩全蝎生薑薄荷。或通聖散加人參芫朮。調

服壽星丸。姜汁竹瀝下。火盛則遍身戰掉。猶火炎而旋

轉也。火能燥物。而使氣液不足。宜四物二陳湯。加木連。牙

柏竹瀝童便。補而散之。實火則胸滿口噤。交牙脚攣。則

不着床。大便閉者。天承氣湯下之。仍忌風藥。蓋火

為風燥之本。能治其火。則風自散而燥自潤矣。欝悶諸

虛甚則方。七情鬱悶者。鴛鴦順氣散。八味順氣散主之。

血虛胎。無以主持養筋。此等尤不可純用風藥。經曰。諸瘥

強直皆屬於濕。濕極反兼風化制之。實非風也。虛也。故又

有言曰。虛為本。痰火外邪為標。氣虛者。補中益氣湯。加竹

瀝。或六君子湯。加黃芪。附子。柴胡。血虛者。四物湯。加防風

羌活。或大棗朮湯。瘥病比癩

更重。甚則因而昏死者。有之。

癩。癩與顛狂相似。但癩病時發時止。邪

流五臟。顛狂經久不愈。邪全歸心。

癰有陰陽只是痰

內傷最多。外感極少。蓋傷飲食積為痰。

舍含空痰塞。丹溪云。癰因痰塞。心竅後則頭眩卒倒。手足

搖擗。口眼相引。胸背強直。吐衄。食頃乃醒。病先身熱。時師

者陰癰。屬五臟難治。若神脫目眩如愚痴者不治。時師

何必究五三。癰久必歸於五臟。肝癰面青。捶頭喜驚。作鷄

利吐舌。羊乳。肺癰面白。吐沫腹脹。牛乳。腎癰面黑。舌視如

尸。猪叫。此五癰病狀。偶類之耳。其實痰火與驚三者而已。

○小兒風驚。食痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

三。癰見五卷。痰挾火與驚多。少。肥人多痰。動則有聲。沫

顛狂

顛狂痰火閉心堂。都緣喜怒太魚常。素問註云。多喜為顛。

屬肝。二經皆火有餘之地。但喜則氣散。畢竟謀為不遂。鬱

結不得志者多有之。大槩痰迷心竅者。粟底清心丸。金箔

鎮心丸。硃砂安神丸。心風顛者。牛黃清心丸。追風祛痰丸。

散。控涎丸。桑金鉞。

調中補北馮東南

癰本痰熱挾驚。

痰為主。故古法用二陳湯加瓜蒌。麥南星。黃連。探吐。吐後必

服硃砂安神丸。以降南方之火。當歸龍薈丸。以平東方之

木。但化痰必先順氣。順氣必先調中。頑痰膠固。非辛溫熱

藥為佐。何以開道。是以古方治驚癰。皆有溫劑。又如錢仲

陽治小兒癰。經吐馮。及服涼藥過多。身冷閉目不食。後用

益黃散。補中能食。次服腎氣丸。補北。腎水能語。此須從

權以收癰之壞症。

亦可以為成法。

當歸龍薈丸。因驚者抱膽丸。驚氣丸。丹溪云。五志之火鬱而成痰。為痰為狂。宜以人事制之。如喜傷心者。以怒解之。以恐勝之。憂傷肺者。以陽明熱結膏梁味。陽明發狂。見傷寒

以喜勝之。以怒解之。陽明熱結膏梁味。雜症。胃與大腸實熱燥火鬱結於中。大便閉者。涼膈散加大黃下之。○膏梁醉飽後發狂者。止用鹽湯吐痰即愈。或亦調中湯。○服芳草石藥熱氣慄悍發狂者。三黃石羔湯。謾議重陰與重陽

難經云。重陰者顛。重陽者狂。河澗以顛狂一也。皆屬痰火。重陰之說非也。但世有發狂一番。妄言妄語。而不成文。顛者。又有痴迷。顛倒。縱久而不發狂者。故取河澗合一於前

難經分析於後。○顛者異常也。平日能言。顛則沉默。平口不言。顛則呻吟。甚則僵仆。直視。心常不樂。此陰虛血火。心火不寧。大調中湯主之。不特倒暈者。滋陰安神湯。言語失倫者。定志丸。悲哭呻吟者。燒蠶退。故酒調二錢。草麻仁煎湯常服。可以解根。○狂者凶狂也。輕則自高自是。好歌好舞。甚則棄衣而走。踰牆上屋。又甚則披頭大叫。不避水

而然。小調中湯。三黃丸。控涎丹。單苦參丸。狂則專於下。痰降火。顛則蓋乎安神養血。經年心經有損者。不治。妄言未見如神鬼邪祟由來痰作。視聽言動俱妄。老謂之

見聞事。及五色神鬼。此乃氣血虛極。神光不足。或挾痰火。壅盛。神昏不定。非真有妖邪鬼祟。大槩內服傷寒瘟疫條。人中黃丸。照依氣血痰湯藥為使。或單入中黃亦好。服或

單石菖蒲末。猪心血為丸。服亦可。有婦人夜夢鬼來交者。定志丸料加赤小豆水煎服。有婦人月水崩漏過多。血氣

迷心。或產後惡露上衝。而言語錯亂。神志不守者。此血虛神耗也。宜寧神膏。但亦不可純服。補心欽神藥。血熱者小柴胡湯加生薑生地煎服。百餘帖即安。血迷心胞。踰牆上

屋歌唱魚時者。逍遙散加遠志。桃仁。紅花。蘇木。服後病退。用平胃散少用厚朴。倍加蒼朮。升麻常服。以絕病根。又男子挾痰血者。陶氏當歸活血湯。有卒中屍惡吐利如乾霍亂狀。或狂譫如醉。人有起心。先知其肇。或已死口禁不開者。急用傷寒門追寬湯灌之。即醒。外法研和丹灌鼻法一。

驚悸怔忡健忘

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳或

咽喉 附失音骨鯁

種種咽喉總是火

咽喉氣之呼吸食之出入乃人身之門

知一左單蛾二右單蛾風形圓如小筋頭太生於咽喉關

上可治生於關下不見者難治三雙蛾風兩箇生於喉關

關下難治四蟬舌風舌下再生二舌五牙蟬風牙齦腫毒

成瘡六木舌風舌腫大如煮熟猪舌不能轉動七舌黃風

舌上腫痛黃色八魚口風口如魚吸水不治九塞喉風疾

痺聚毒涎重稠實而發寒熱關上可治關下難治十懸蟬

蠱毒風上脰腫水食不下形腫如鷄勾十一擒食風因食

纏喉惡物發泡十二獵煩風腮頰結腫牙蓋癆腫破十三

大恐以致心虛停痰

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

或耳聞大聲目見異物

臨危觸事便覺驚悸甚則心跳

又有健忘非質

三症雖有淺深然皆

痰火濁氣

清氣不足

痰火濁氣

清氣不足

痰火濁氣

清氣不足

痰火濁氣

清氣不足

痰火濁氣

清氣不足

痰火濁氣

皮膚赤腫作寒熱尋常咽膈痛者多是虛火。意種類雖繁同歸於火。蓋火陰君火。少陽相火。二脈並絡於咽喉。君火勢緩則熱結而為痰。相火勢速則腫甚不仁而為痺。痺甚不通而痰塞以死矣。故曰一陰一陽結謂之喉痺。一陰肝與心胞。一陽少陽三焦。四經皆有相火。火者痰之本。痰者火之標。故言火則痰在其中矣。言咽喉則牙舌亦包在其中矣。

火有虛實從何知實火便閉胸必緊

實火因過食煎炒。蓋熱積毒煩。

渴二便閉澁。風痰上壅。將發喉痺。必先三日胸膈不利。脉弦而數。治宜先去風痰而後解熱毒。涼膈散加黃連。荆芥。石羔。或古荊黃湯。防風通聖散。三黃丸。含化。又風燥咽喉乾枯。常如毛刺。吞燕有礙。厥毒散加黃芩。半夏。倍桔梗。薄荷。生薑煎服。痰盛加石羔。凡服此藥。子服午安。午服子安。如嘔吐咯傷。因食熱物。及穀芒刺流風熱併與血氣相搏。腫痛者。消風散加薄荷。玄參。全蝎。或射干湯。丹莖子湯。木舌。重舌者。如聖金鎖。舌根腫者。麝香。硃砂。丸。時行咽痛者。簡濟消虛火便閉亦微。虛火因飲酒則動脾火。忿怒則動肝火。色慾則動腎火。火炎上

者。因物湯加桔梗。梗荆芥。知母。黃柏。氣虛者。四君子湯加其

草。桔梗。玄參。升麻。甚則乾姜。附子。以為向導。徐徐服之。如痰盛者。二陳湯料入青魚膽一箇。其膽先以糯米入內。陰乾為末。姜汁調服。亦可探吐。或千縉湯。曾服涼藥。白利。或聲音有壞者。秘傳降氣湯。救之。暴感風寒。則咽喉緊縮。妨碍者。煎梗半夏湯。猪鬃湯。腎傷寒。及陰症者。半桂湯。附子。通用。母桔湯。利膈湯。水梅。九犀。角。玳瑁。或單。草。霜。為末。草。丸。彈子。大。每。三。丸。新。及。水。化。服。丸。咽。喉。不。可。純。用。涼。藥。草。藥。取。劫。目。前。上。執。未。除。中。寒。復。起。毒。氣。垂。虛。入。腹。胸。前。高。腫。上。喘。下。泄。手。足。指。甲。青。繳。吐。引。痰。直。捷。法。茶。七。日。以。後。全。不。入。食。如。魚。口。者。死。繳。吐。引。痰。直。捷。法。繳。法。用。青。魚。膽。未。繳。二。次。紅。腫。即。散。吐。法。用。冬。月。寺。魚。膽。以。枯。磨。入。內。臨。用。加。百。草。霜。炒。鹽。少。許。醋。調。以。鴨。毛。蘸。藥。引。吐。痰。盡。如。魚。魚。膽。用。白。礬。半。斤。巴。豆。肉。十。枚。同。枯。過。去。巴。豆。用。引。吐。痰。神。效。吐。後。用。金。鎖。匙。映。之。常。服。其。枯。湯。最。妙。如。牙。關。緊。者。用。後。開。關。藥。或。急。甚。神。針。一。發。之。火。鬱。發。二。仙。散。不。省。人。事。者。一。字。散。急。甚。神。針。一。發。之。火。鬱。發。醫。學。入。門。卷。之。四。夫。音。骨。便。百。三。趙。精。川。

汗也咽瘡忌不最不誤合惟發針出血即汗之之義也血
出多則愈有針瘡者姜汁調熱水時時呷之畏針者委曲
針之九關上血泡最宜開下不見者令病人含水一口用
蘆管前尖入鼻孔刺出血妙惟腎傷寒及帝中腫者忌針
用蛇床子於瓶中燒烟毒結開開還可救腦破毒散玉鑰
冷病人吸入喉中立愈
匙或用巴豆壓油紙上取油紙捲成條子點燈吹滅以烟
薰入鼻中一時口鼻涎流牙關自開一方用巴豆肉以綿
裹定隨左右塞於鼻中左右俱有左右俱塞立透蓋方喉
中以巴豆治走馬喉痺者以熱攻熱七則流通之意也
失音者却難醫喉痺失音者秘傳降氣湯去陳皮加黃芩
汁潤之或椰子散血虛受熱咳嗽聲嘶者用青黛蛤粉蜜
調含化或潤肺丸審臟前尋常聲音不清者加味固本丸
內傷虛損咽瘡失音者魚治法○骨硬用朴硝為末對入
龍腦雞蘇丸內為丸彈子大噙化下過三五丸自然消化
魚骨鯁食橄欖或以核為末順流水調服
外用細瓜爬之自下條詩！卷急救方

虛類

發熱 附惡寒

發熱原魚表裏症明是內傷虛損病

外感發熱人迎緊盛隨表裏見症汗下即

雖惟內傷虛執經久不鮮無表裏二症雖食積勞役力倦
類傷寒初症右脉氣口緊盛身節不痛為異

慾昏神中真傷勞後發熱脉虛而弱倦怠無力不惡寒乃胃
慾陰虛發熱便硬能食者滋陰降火湯而味遺通散清生

胃散○內傷思慮神昏恍惚眼燒者歸脾湯樹神湯
冷鬱遏四肢甚心熱肌膺不甚熱自汗不食者火鬱湯

晝熱口淡是陽虛九錢飽勞後傷胃陽虛口中魚味晝熱
夜輕者俱宜補中益氣湯甚加附子

盛下虛者清夜執晝輕陰弱定凡房勞思恐傷腎陰弱口
心蓮子飲

心蓮子飲

四物湯加知柏黃芩甚者加重便陰陽兩虛熱魚時

龜板峻補其陰有鬱抑者下甲丸而魚目痛鼻乾者古歸

晝夜發熱煩渴不止症似白虎而參地骨散久虛積損者八物湯

八參養榮湯甚者既濟湯去半夏加五味子當歸地黃入

童便少許或一至九八味丸二神交濟冊○抑論肥人及

脈大魚力者氣虛於血宜甘溫補氣氣旺則能生血若

瘦人及肺弦帶澆者血虛於氣止宜苦寒為主佐以甘溫

若氣血平補依舊氣旺而陰愈消矣凡虛熱皆因精神外

馳者慾無厭陰氣耗散陽無所附遂至浮散肌表而發熱

實非布骨蒸傳變須防命骨熱因氣虛不能化血而乾則

熱也五心俱熱或兩脇如火或子午相應或晝微惡寒而夜

反大熱雖腎經所主傳變不常蒸上則見喘咳痰而唇焦

舌黑耳鳴目眩等症蒸下則見遺精淋濁泄瀉腰疼脚酸

陰物自強等症蒸中則見腹脹肋痛四肢倦怠等症古云

肝症發熱肉下骨上寅卯尤甚濕熱青丸人中白散心症發

發熱在肌肉遇夜尤甚海黃散三白湯肺症發熱在皮青

日西則甚瀉白散甚者涼隔散腎症發熱在骨亥子清其

兩手足心如火滋腎丸主之。大要脈弦而濡者秦升扶瀉

湯加味逍遙散脈弦而數者節齋四物湯而用五蒸湯

二參湯香連猪肚丸大虛煩內煩不得眠。頭昏口燥

胡連丸補髓冊。大造丸。虛煩內煩不得眠。頭昏口燥

外熱也。仍分氣虛血虛。或大病後津液枯竭。煩而有渴者

人參門冬湯。溫膽湯。不眠者六一散。甚加牛黃勞心者妙

陽

兩

虛

熱

魚

時

兩

虛

熱

魚

時

兩

虛

熱

魚

時

兩

虛

熱

魚

時

兩

虛

熱

惡寒陽虛不自任

尋常外感惡寒頭痛微汗即止內傷表

氣湯加黃芪桂枝內傷陽虛自汗全不任風寒者四君子

湯減茯苓倍加黃芪桂枝或附子如晝夜惡寒甚者單用

參芪桂附峻補其陽如久病陽氣鬱隔惡寒者升

麻葛根湯去芍加參附白芷草立盡蒼朮葱煎服

酒泚陰

虛痰火盛陰虛微惡寒而發熱者陳四物湯加知母黃

一錢為末非汁調服探吐吐後以川芎南星蒼朮黃芩糊

丸白湯下冬月去芩加姜汁為丸調之○素病虛熱忽覺

惡寒須史戰慄如喪神守乃火炎痰鬱抑遏清道不能固

密腠理四物湯加黃芪黃連黃柏或合二陳湯如火起肺

酒泚惡寒者理桔湯加酒芩山梔麥門冬五味子惡寒驚

燥者四物湯加大黃下之○病過服熱藥惡寒者先探吐

痰後以通聖散加生地當歸或四物湯去芩倍地黃加白

木黃柏參芪甘草通一炒熟煎服如酒熱內鬱惡寒者黃

芪一兩芩根五錢煎服大汗而愈○抑者內鬱陰虛因

勞倦氣衰則火薰胸中而生內熱陽虛則不足衛護皮膚

而外寒陰盛則血脈不通而中寒陽盛則腠理閉塞而外

熱仲景謂陽虛陰盛宜汗散其陰邪陰虛陽盛宜下瀉其

陽邪東垣謂晝熱陽氣旺於陽分夜熱陽氣下陷陰中皆

名熱入血室重陽者晝夜俱熱夜寒陰血旺於陰分晝寒

陰氣上溢陽中重陰者晝夜俱寒丹溪謂惡熱非熱明是

虛症惡寒非寒明是火症王水謂熱之不執是無火也當

治其心寒之不寒是無水也當治其腎意寒熱陰陽虛實

汗

自汗

元陽真液因飲食驚恐勞勞行動

汗者曰自汗乃陽氣不足衛護發熱者補中益氣湯加麻

黃根浮小麥但升柴俱宜蜜水炒過以殺其升發之性又

附湯順元散間有氣血俱虛者黃芪建中湯亦有痰濕

外和初服多汗身乾者濕也心主熱脾主濕濕熱相搏如

也之濕蒸氣為雲霧為雨各臟皆令有汗。獨心與脾胃為濕熱主耳。宜調衛湯。五淋風散。火炎上蒸。胃濕作汗者。涼膈散。胃熱者。三升湯。是知自汗亦有實者。故外感初症。亦多自汗。風症。相枝湯。加附子。寒症。古桂附湯。暑症。五苓散。心與或汗乾仍熱者。必外感風。宜參蘓飲。病止住眠。是反也。盜汗全是陰分弱。腎火脾濕。心勞。睡者出汗。醒則漸也。於裏而表虛。醒則氣散於表。而汗止。心火炎盛。以致肺失衛護者。當歸大黃湯。陰虛火動者。四物湯。加知柏。蒸氣虛者。加參朮白朮。腎火動甚者。正氣湯。脾濕者。四製白朮散。肝熱者。用防風龍膽草等分。為末。米飲調服。心虛者。用人參當歸各二錢。半。先用猪心血。煮湯澄清。以汁煎藥。服。思慮過度。以致心孔獨有汗出者。用艾湯調下。茯苓末一錢。或青桑第二。番葉帶露。採陰乾。火焙為末。米飲調服。或五並砂散。通用黃芪六一湯。加手小麥。牡蠣。麻黃。根。外用五倍子白礬為末。津液調封。脐中一宿。即止。或用牡蠣麥。法麻黃根。糯米。糯米。防風。白芷。等分為末。周身撲之。

痿

諸痿不痛火尅肺

經曰諸痿皆主於肺。肺熱葉焦。脾弱。發為諸痿。悲哀失志。上發喘而下。沒血。乃心熱。五臟受之。肺痿則膝脛筋脈縱緩。而不能任。用於地。思色無算。或入房太甚。口苦白淫。乃肝熱。騰津滲也。曰筋痿。則筋疏乾急。膝響。居處早濕。肉蠕動。而口渴。乃脾熱。胃燥也。曰肉痿。則肌肉麻痺。不仁。有所勞行。大熱而渴。則陽氣內伐。熱舍於腎。水不勝火。骨髓空虛。色黑齒稿。名曰骨痿。則腰膝與脊不舉。骨痿不能起於床者。死。

肺傷木旺肢體廢 師被火傷。則水寡。畏而肺傷。則不能管攝一身。脾傷。則不能運。用四肢。而痿廢矣。五痿總屬陽明。陽明者。宗筋之會也。陽明實。則宗筋潤。而機關利矣。馮南補比是大經。馮南則肺金清。而東方不旺。脾不利矣。不虛。肺不焦。而崇衛通矣。清焯湯。虎潛。先。腎氣丸。調和金水二臟。治痿之大經也。

慎勿滾同風

額發腸癰不治驚者死陽明厥逆喘咳身熱善驚嘔血
手太陰厥逆虛滿而咳善嘔沫手心主少陰厥逆心痛引
喉身熱死不可治手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰
不可以俛仰手陽明心陽厥逆發喉痺益腫瘡若三陰俱
逆不得前後使人

外感寒泣暑相煎

者理中湯四逆湯暑

耗氣發厥脉虛者自虎湯或香茹散加羌活夏月勞役犯
房以致陽氣煩擾目盲耳閉內經謂之煎厥言熱氣煎逼
損腎與膀胱而成也宜四君子湯加遠志防風赤芍
麥門冬陳皮凡外感發熱者宜解散藥中加姜汁

內傷

薄厥痰火挾內因喜怒傷氣傷志氣逆而不下行則血積
井而成古法暴厥氣逆身冷者羅合香丸八味順氣散怒
氣逆甚嘔血跳颯發厥若四物湯去地黃加赤茯苓人參
桔梗陳皮麥門冬檀香美煎服或六鬱湯氣實多怒忽大
叫發厥者乃痰閉於上火起於下而上衝用香附五錢川
芎七錢生甘草二錢薑汁煎服又青黛人中白香附
為丸服稍愈用酒痰湯加黃連香附煎吞歸龍奮丸因

勞後飲水被驚發厥者只君子湯加承連竹瀝姜汁○內
傷痰火發厥脉弦滑者三陳湯加竹瀝扶寒加生附子挾
火加奔連山梔竹瀝肥人加人參姜汁凡厥症為醜為胸
仆為妄見或腹脹二便不利或嘔或心痛皆痰火鬱氣病

總因酒色陰陽衰

熱厥因醉飽入房濕熱鬱於脾胃不
能滲榮四肢陽氣獨盛故手足心熱

宜補中益氣湯升陽散火湯火鬱湯○寒厥因多慾奪精
元陽大有所損不能滲營經絡陰氣獨在故手足皆寒宜

十全大補湯加附子或當歸四逆湯○尋常氣虛發厥者
西君子湯血虛發厥者西物湯有火加知母黃柏虛寒加

附子但厥冷多以不勝乘其所勝如腎後寒於脾則為寒
厥心移熱於腎則為熱厥六經皆然抑論陽症煩渴譫語

身熱陰症不渴靜倦身涼與傷寒陽厥陰厥大同但雜病
多因酒色七情痰火所致外感者少故經曰陽衰於上則

為寒厥陰衰於下則為熱厥陽極似陰陰極似
陽與傷寒因雖不同而病狀變化亦相似也尸厥亦是

下虛擾凡有吊死問疾或入廟登塚卒中外和與賊氣相
忤氣過不行經絡脉伏昏不知人忽手足逆冷頭

面青黑，牙關緊急，昏暈卒倒，或錯言妄語，決不可作風治。先宜穩合香九灌之，候醒以木香、牙氣散合平胃散調之。素虛者用煇硝五錢、礞黃二錢為末，作三服。用陳酒一盞煎，覺煇硝起傾於盞內，蓋着溫服，如人行五里，又進一服。如魚前藥用百參附湯入姜汁酒煎服，外灸百會穴。如素三大文九帖氣海百壯身溫者生，暴死者遺寬湯灌之。

味厥見傷寒接補陰陽本內經補陰寒厥補陽正經所謂血厥見症後接補陰陽本內經補陰寒厥補陽正經所謂壯水之主以鎮陽光益吐下還為實者設以蘊合香九灌火之源以消陰翳也

亦可熱甚者犬承氣湯雙餅散下之

癆瘵

癆瘵癆瘵先須辨陰陽熱癆陽病口乾舌燥咽痛涕唾稠結虛癆陰病唾痰白色胃逆口惡飲食難化小便多遺精白濁大便溏泄又有嗽痰仰卧不得者必陰陽虛病也

因十五六歲或二十前後血氣未定之時酒色虧損精液而或全屬陰虛間有因外感又積久嗽而成者多屬陽虛

熱癆咽痛失音者死陰陽傳變最重久持能傳變男子虛癆泄不止者死

自腎傳心肺肝脾女子自心傳肺肝脾腎五臟復傳六腑而死亦有始終只傳一經者有專着心腎而不傳者人嬰

以脉為潮汗咳或遺精泄分輕重輕者六症調作重者六症驗為咳血為潮熱火動於下則為精濁為泄瀉若見血止

血為先其餘流傳變症雖多亦必歸重於一經如見有精濁又加之腰酸腰背拘急知其和在腎也現有咯血多

汗加之驚惕口舌生瘡知其和在心也現有喘咳數血加

之皮枯鼻燥聲沉知其和在肺也現有夢遺加之腸痛多

怒頭核知其和在肝也現有泄瀉加之腹癢痞塊飲食無

味四肢倦怠知其和在脾也當隨其和之所任調之○勞

熱清胃散內熱保真湯補熱黃芪湯甲湯○勞血咯血因

平丸嗽吐咳咯保和湯血去多三黃補血湯而不止平丸

直藥石改酒色過遷善天理回穹蒼

諸虫

九虫皆因臟氣弱濕熱薰蒸痰形成諸虫皆因飲食可節

腥繪炙燔或驚莧同食以致中脘氣虛不運而成積積久

成熱濕熱薰蒸痰與血凝結隨五行之氣變化而為諸

般奇怪之形若腐草為螢是也九虫一曰伏虫長四寸許

為諸虫之長二曰蛔虫長尺許貫心即殺入三曰白虫長

一寸母子相生其形轉大而長亦能殺人四曰虫狀如爛

杏五曰虫其狀如蠶六曰虫狀如蝦蟇七曰虫又名腸虫

狀如爪辨八曰虫狀如生肉心煩咳嗽多嘔唾肉虫令人

九曰虫狀如菜虫形至細微心煩咳嗽多嘔唾肉虫令人

肚虫令人咳嗽蠅虫令人嘔吐飽逆嘔噦嘈雜

愛吹泥炭生米茶塩姜椒等物弱虫令人多嘔瘡癰痔漏

與腸鳴蛭虫居黃腸多則為痔劇則為癩癰又有感觸蠹

動物心腹刺痛藥不靈或山淵地水蛭遺精誤飲其水

心腹刺痛或引腰脇時作時止諸婦人鬼胎兒血驚婦人

藥不効乃虫症也雄砂丸止之經閉腹大僅一月間便能動作乃至過期不產或有腹痛此必

虫症雄砂丸或萬應丸主之血驚小兒最多大人間有蓋驚因積痰而成故也追虫打驚丸不收下者

釣虫黑白丸亦好但釣後須服調脾和胃藥眼鼻下黑

蟹爪明

凡虫症眼眶鼻下青黑面色痿黃臉上有幾條血

不早治相生不傳屍癆虫十八種人相似故又曰疰化精

已貫心殺人

血歸於元陽之內變幻種類最多古謂第一代虫如嬰兒

或如鬼或如蝦蟇遇丙丁日食起醉歸心俞第二代虫如

亂髮或如守宮或如蜈蚣或如蝦蟇遇庚辛日食起醉歸肺

俞第三代虫如蚊或如蠅或如蝶或如刺蝟遇庚辛日食

起醉歸厥陰第四代虫如亂絲或如猪肝或如蚯蚓如蛇

遇戊巳日食起醉歸脾俞第五代虫如蟹龜或有頭無足

遇庚申日食起醉歸腎俞

遇辛酉日食起醉歸心俞

遇壬戌日食起醉歸脾俞

遇癸亥日食起醉歸腎俞

遇甲子日食起醉歸心俞

遇乙丑日食起醉歸脾俞

遇丙寅日食起醉歸肝俞

遇丁卯日食起醉歸肺俞

或有足無頭或如鼠或如精血遇甲乙日食起醉歸肝俞
第六代至如馬尾有兩條一雌一雄或如鷺有頭足尾或
如爛麩或長或短遇丑亥日食起醉歸腎俞週而復始凡
取勝虫依五臟方選用必俟其大醉日方可取之取後隨
補各臟如取脾虫後則補脾取腎虫後則補腎若病甚者
不分臟腑只用退病丹以斷其根又有輕者只用錫鱸魚
煮食或紫河車丹陽虛者金液丹最妙○取勝虫法先令
病家用皮紙糊一密室不留此罅隙擇一老成人過廨以
安息香水酒其過廨之人身以雄黃雌黃塗耳口鼻上
安排鉄鉗一把布巾一幅用香油二斤以鍋盛頓微煎令
沸仍用高桶一箇以石灰在桶內生布巾蓋桶口俟月初
虫頭向上却服取承藥五更初一服五更三點時一服服
藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至己時必頭下虫或取于
臭穢如膠漆或吐瀉膿血癥塊皆於灰桶中其虫或從汗
出紫蚕前伏或從耳鼻口中出或小便中出異般形狀不
一或青黑或黃紅大者急用鉄鉗取入油中煎當日將虫
紙裹虫入瓦罐內石灰填實埋於深山遠僻之處免再染
人其患人衣被床席並皆棄去磨大分付藥後亦頭遠避

其取下虫色白者食臟腑脂膏可三十日服藥補之虫色
黃赤者食血肉可六十日服藥補之虫色紫黑者食人
精髓病傳至腎可謂極矣莫其萬一或為子孫除害則
可又虫頭白者亦難治此危氏說也丹溪謂不必深恐居
肺咯血必損聲 癆虫須分五臟嘗居肺間正所謂膏之上
育四花為佳若蝕肺系則咯血吐痰聲嘶思食無厭諸患
至此未易治療○又有應聲虫每語喉中如有物作聲相
應者有人教誦本草至雷丸則無聲者則無聲者相
乃須服數枚而愈欲惑蟲疰見各條**虛先溫補後追逐** 虛
者俱宜先用溫補扶其元氣然後用王道之藥佐以一二
殺虫之劑如化虫丸史君子丸五臟下氣丸之類或追虫
後而繼以溫補亦可不然**實則吐下量體行** 體實虫攻上
用葶米屑濃煎湯服之大吐虫痛咳後煎甘草湯與之
和胃如有積自吐虫者用黑錫灰攪柳等分為末米飲下
湯萬應丸萬病解壽丹豈體選用

○下虫用追虫丸取積藥各練根

求嗣

求嗣之理非玄微

山無不草木人無不生育婦人要經調

虛靜流而不能直射子宮多不成胎蓋因平時嗜慾不節

施泄太多所致宜補精元兼用靜工存養無令妄動候陽

精充實依時而合一舉而成矣女人陰血衰弱雖投真精

不能攝入子宮雖交而不孕雖孕而不育是以男女配合

必當其年未算之數陰氣未完慾感之婦所生多女性行

和者經調易挾性行如者月火不勻相貌惡者刑重顏容

媚者福薄太肥脂滿子宮不能受精太瘦精血病交合

子宮無血精不能聚俱不宜子不可不知精血充盈別

時男精女血皆魚氣血陰陽總屬腎與命門精血充盈別

血未盛情勝其血男胎成矣四日至六日新血漸長血勝

其精交胎成矣六日至十日鮮有成者縱成亦皆女胎欲

求子者全在經盡三日以裏衣夜上子時生氣馮精受姪

必男斯時男女無暴怒毋醉飽勿食炙煇辛熱毋用他術

質益陰陽和平精血調暢交而必孕孕而必育育而必子

日壽娠後宜內遠七情薄五味大冷大熱之物皆在所禁

清心為上策

寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動故能

主精而藏志心神外馳則腎志內亂其於交會之際味無

靜一清寧之氣所泄之物同歸虛濁而已安能發育長養

於其間哉慾寡神完不惟多了服藥陰陽貴得宜門脈微

抑亦多壽故養生莫善於寡慾

細或絕陽事痿弱法當補陽若見命門脈洪大鼓擊陽事
堅緊是為相火妄動法當滋陰若或腎脈浮大花紫遺精
尿血法當補陰若帶洪救兼以瀉火若見腎脈微甚欲絕
別魚相火為病法當陰陽雙補陽脫痿弱精冷而薄或來
慢不能直射子宮命脈微細者還少丹打老兒丸精清淡
者雀卵丸陽慶不舉命門脈虛欲脫者巨勝子丸壯陽冊

腎氣欠旺來慢不能直射子宮者續嗣丹溫腎丸精漏無
火者金鎖思仙丹陰虛有火者大造丸腎氣丸補陰丸虎
着丸四十以後縱有火動者只宜小毛絨子丸天門冬膏
忌用知柏芍藥寒涼陰陽兩虛者八味丸二神交濟丹通
用種子大補丸玄牝太極丸五子衍宗丸十子丸加味養
木膏何首烏丸○女宜鼓動微暖交金丹益斯丸大小烏
雞丸調養經血回製香附丸七製香附丸十味香附丸
附丸單醋附丸育子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加
味益母膏滋陰百補丸大造丸補陰丸○依症選用不可
藥方名之美珍藥之異而先自傷根拔本亦不可過服熱
藥以遺子患古云父吞剛劑子忠熱淋且性燥多火男女
皆然况造化之妙豈可專恃藥餌必也改過遷善懲忿窒
慾人倫日用無所欺肆買賣交易不致刻
剝自然德可動天生子必賢且壽勉之

養老

附髮顏形項

老人魚非血液衰

兩腎中間白膜之內一點動氣大如筋
頭鼓鼻變化大闊週身薰蒸三焦消化

水氣外禦六淫內當萬慮晝夜無停年老精血俱耗平始
七竅反常啼號魚淚笑如雨流莫不遠而出涕耳無聲而
蟬鳴契食口乾寐則涎溢淺不利而自遺便不通而火動
或泄晝則對人臨睡夜則獨卧惺惺此老人之病也火動

風痰百病摧

陽虛氣盛兩手脉大緊數飲食倍進臉紅神
徙雖時有煩渴膈熱大便閉結但以平和湯

藥消解切不可用若寒踈瀉○火症風症戰掉氣亂目昏
口禁筋急者通聖散痰症二陳湯三子養親湯清氣化痰

九節齋化痰丸凡年老覺小水短少即是病進宜得病延
壽湯小便頻數者腎氣丸去澤瀉加茯苓益智五味太

便燥者搜風順氣丸陰虛筋骨痛亦有脾虛多積滯若從
痿弱足膝無力者加味補陰丸

陽之氣一向憊乏之人全在斟酌湯劑當加溫補調序體
將以為養治宜補中益氣湯橘半枳朮丸平胃散附應枳

木溫和丸散可扶培任有外邪忌大汗吐下宜平和藥調
子神仙訓老丸遇仙益壽丹秤金丹毛仙丹及諸虛門養

性延年之藥皆可用厭服藥者只宜食治詳前二卷

髮屬少陽髮腎水精不上升白似灰膽茶在鬚腎華在髮精氣上升則鬚潤而

黑六八以後精華不能上升秋冬令行金削肺枯以致鬚髮焦槁如灰白色養生者宜預服補精血藥以防之然捺亦非上策○染鬚方用大烏龜一箇餓一二日將飯與肉

骨果子烟火之食倒之三五月後夜間以漆盃盛之用薄竹片置盃縫口通氣外放燈一盞盃內作熱龜在內旋轉

不已自然撒尿緊急只用麻油烟薰真其尿即出先用五倍子攷醋如膠若龜尿得一小鐘入五流醋半鐘同入

罏內炷一漆即止牛角確收貯每用新筆畧蘸搽鬚表上

多用則面黑○又方炒五倍一兩銅末四分生食鹽生白

若白麩各二分為末濃茶調膏搽鬚上俟鬚乾以手擦下

○內服烏鬚丸胎髮青藍各四兩共入確內封固火煨三

炷香久冷定取出為末用何首烏冬青子九蒸九晒旱蓮

草枸杞子生地當歸白茯苓各四兩小參一兩以水十碗

煮汁五碗去查藜青柳二味入內攪勻分作幾小罐盛

之每空心滾水酒調下三五茶匙因下血多而鬚髮易白

者尤宜燻金丹亦效○因吐衄失血多者樓王鬚丸○因勞

室損精易白者還元丹還元秋石丸女貞丹有少者天選

丸○因濕痰瘰癧等疾衰白單膏木膏胎味卷木膏○皮

膚肌骨有風痛痒者荷首烏丸陽虛者荷老烏鬚健陽丹

風年益壽不老丹有火者八仙添壽丹是烏鬚亦必因

症用藥若不顧臟腑專務鬚髮而鬚髮脫落非因老內風

血燥亦奇哉

年來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落

天門冬膏主之內風甚者稍兼煎單方用自已髮或胎髮

童男女髮洗淨泥固煨過為未空心酒下一二分燕烏鬚

髮入補藥尤效外用黑附子蔓荊子桐子仁等分為末烏

鷄脂搗勻瓦罐封固一月取出塗之即生餘詳瀨風條

編註醫學入門外集卷之四終

縣庠緝吾劉君一名時熙贈刻

